

এক খণ্ডী পর্ব অল্পমাত্র গাজদাহাভব কবিত্তে লাগিল। এই সমস্ত এবং বোগী তবল ঔষধ সেবনে অসম্মতি প্রকাশ কবায় নিয় লিপিতরূপ পিক্রেট অব এমোনিয়া বটিকা প্রস্তুত কবিয়া অব বিমিশ্রিত অবাবর্ত্ত পর হইতে সেবনের, পবামণ দিয়া প্রস্থান কবিলাম।

R

পিক্রেট অব এমোনিয়া ২ গ্রেণ

কুইনাইন . . . ৬ ,,

এক্সট্রাক্ট অব জেন্শন বর্ণা প্রয়োজন।

উক্ত রূপ মিশ্রিত কবিয়া ছবট, বটিকা প্রস্তুত কর, এক এক বটিকা প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

পবদিবস (২৪এ আগষ্ট) প্রাতঃকালে বোগী ব নিকট উপস্থিত হইয়া বোগীকে উক্ত অবস্থায় দেখিলাম এবং পুনর্বার ই প্রকার ৪টা বটিকা দিয়া ই প্রকারে সেবন কবিত্তে বলা হইল। অপরাহ্ন পাঁচটাব সময় উপস্থিত হইয়া বোগী ব নন্দ্য টেম্পাবেচাব দৃষ্ট হইল। ২৫শে তাবথে প্রাতঃকালে বোগীকে ই প্রকার আব চাবনী পিল দিয়া অতঃপর্ব ঔষধ সেবনের আবশ্যক নাই বিয়া প্রস্থান কবিলাম এবং এ পর্যন্ত ই বোগী কোন অসুখের সংবাদ প্রাপ্ত হই নাই।

৪র্থ প্রোগ। ২৮ সেপ্টেম্বর তিনটা পর্যায় অবগ্রস্ত বোগী চিকিৎসাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই তিনটাব মধ্যে ছুঁতী ১০ বৎ সবেব বাশক, একটাব নাম হরমত ও অপরটাব নাম হরিপদ এবং আর একটা পুণবয়স্ক পুরুষ নাম বেহারী কক্ষাব। বাক দুইটা ১/২ মাত্রায় ও বেহারীকে ১/৪ গ্রেণ মাত্রায় পিক্রেট অব

এমোনিয়া দ্রবাকাবে প্রযুক্ত হইতে লাগিল। এককপে চাবি দিবস ক্রমাবয়ে ঔষধ সেবন কবিয়া ৫ জন্মে শুভজনক পরিবর্তন লক্ষিত হইয়া না, এবং ছবমতের জন্মে বিরাম কাল ক্রমেই অল্প হইতে লাগিল। ৫ম দিবস (৬ই সেপ্টেম্বর) বাহিতে হরিপদের ৪ বার তবল ভেদ হইয়াছিল এবং তিন জনেরই প্রস্রাব দোষ হবিদ্রাবর্ণ হইয়াছিল। ৬ষ্ঠ দিবস (৭ই তাবথে) এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, হরিপদকে দিাব জন্য পিক্রেট অব এমোনিয়া বন্ধ কবিলাম এবং ছবমতের অল্প ছাড় নাই শুনিয়াও, বিবামাধ্যায় সেবন কবিত্তে হইবে বলিয়া পূর্ববৎ ৪ ডোজ ঔষধ দেওয়া হইল। বেহারীব ঔষধ পূর্ববৎ। পব দিবস ৭ম দিবসে শুনা, গেল ছবমতের অল্প ছাড় নাই, অদিকন্তু তাহাই উপর আবাব অব হইয়াছিল, বালক মধ্যে মধ্যে উদ্ধদিকে দৃষ্টি পাত কবিয়া থাকিতেছে এবং অন্য দিবসেব ন্যায় কপার্তাও কহিতেছে না, যে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল তাহা সেবন কবান হব নাট, এই সমস্ত দোষিয়া তাহাব অতিশয় ভত হইবাছে এবং আমাকে লইয়া বাহবা জন্য অপেক্ষা করিতেছে। বেহারীর ও অব বন্ধ হব নাট শুনিয়া, পিক্রেট অব এমোনিয়া বন্ধ কবিলাম। দেলা ৮টার সময় ছবমতের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখা গেল—টেম্পাবেচব ১০০ ডিগ্রী, নাড়ীর সং ৯০ ভিহ্রা হরিদ্রাবর্ণ লেপ দ্বারা আচ্ছাদিত ব্রাঙ্কাইটিস আদি কোন উপসর্গ ঘটে নাই, কেবল লিবরে কঙ্কেশন হইবাছে; প্রস্রাব দোষ হবিদ্রাবর্ণ ও পরিমাণে অল্প; মুখ ও পদের দৃশ্য হবিদ্রাবর্ণ। এই সমস্ত দেখিয়া

শুনিয়া পিক্রেট অব এমোনিয়া বন্ধ করিয়া যথাবীতি চিকিৎসা দ্বাৰা চাবি দিবসে আবোগ্য লাভ করিল।

৭ম প্রয়োগ। ৬ই সেপ্টেম্বর প্রাতে পর্যায় জবগ্রস্ত ৩টা বাঁশক চিকিৎসার্গ আমাব নিকট অনীত হইল। এই তিন বাঁশকেই দ্রবাকাবে পিক্রেট অব এমোনিয়া প্রয়োগ করা হইল, ২টা প্রথম দিবস সেবন করিয়াই জব মুক্ত হইল, একটা ক্রমান্বয়ে পাঁচ দিবস সেবন করিয়াও তাহার জবের পর্যায় বাবণ হইল না, সুতরাং পিক্রেট অব এমোনিয়া বন্ধ করা হইল।

৮ম প্রয়োগ। ৮ই সেপ্টেম্বর গদাধব নামক এক ব্যক্তি তাহার কন্যার জব হইবাছে বলিয়া ৪ ডোজ ঔষধ ($1\frac{1}{2}$ গ্রেন পিক্রেট অব এমোনিয়া) লইয়া যায়। পূৰ্ণ দিবস শুনা গেল অতঃপর মাত্র জব হইয়া চিল। এই দিবস (২ই তা বগে) ২ ডোজ ঔষধ সেবন করিয়াই জব মুক্ত হয়।

৯ম প্রয়োগ। ১০ই সেপ্টেম্বর বোণী পাঁচু, বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর, অত্র টোল অফিসের পাক্ষীক মাজি। ৪ দিবস ক্রমান্বয়ে পূৰ্ণোন্নতি প্রকাৰে পিক্রেট অব এমোনিয়া প্রয়োগ করা হইল, তথাপি বোন হিতকল দৃষ্ট হইল না, বরং জবের বিরাম বাণ ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল। সুতরাং পিক্রেট অব এমোনিয়া বহিত করিয়া অপর ঔষধ ব্যবহা করা হইল।

১০ম প্রয়োগ। ৫ জন মাজি ইহা দিগের সকলেরই নিবাস ধুলিমান। মালদহ হইতে পাট বোঝাই করিয়া কলিকাতায় যাহতেছিল, পথে উহাদিগের জর হয়।

পতোক্বেবই পর্যায় জব। এই সকল বোণীক জন্য ৬ গ্রেন পিক্রেট অব এমোনিয়া ২০ আউন্স পৰিষ্কার জণে দ্রব করিয়া প্রত্যেককেই ১ আং মাত্রায় ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে বলা হইল। ৩ দিবস ঔষধ সেবনেও কোন কল দর্শিল না দেখিয়া তাহারা চিন্তিত হইয়া উঠিল, সুতরাং এই ঔষধ বন্ধ করিয়া অন্য ঔষধ প্রযুক্ত হইল।

১১শ প্রয়োগ। ১৫ই সেপ্টেম্বর অপবাক্ষ সপদায় জবগ্রস্ত একটা গোপ বাসক (বয়স ১৪ বৎসর) অনীত হইল তাহাকে নিম্ন লিখিত রূপে বটিকা প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করা হইল।

R

পিক্রেট অব এমোনিয়া ১ গ্রেন

কুইনাইন সল্ট ৫ গ্রেন

একট্রাইট অব জেনশ্যান যথাক্রমে।

উক্তনকপ মিশ্রিত করিয়া ৫টা বটিকা প্রস্তুত কর, এক একটা দুই ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

এই প্রকার বটিকা প্রত্যহ চারিট করিয়া ৪ দিবস সেবন করিয়াও বিশেষ কোন কল দেখা গেল না এবং ইহা দ্বাৰা উপকারেরও সম্ভাবনা বোধ করিলে না, সুতরাং ইহা বহিত করিয়া অন্য ঔষধ ব্যবহৃত হইল এবং শীঘ্রই আবোগ্য লাভ করিল।

১২শ প্রয়োগ। ৮ জন মাল্লা, ইহার সকলেই পশ্চিম প্রদেশীয়, পূৰ্ণ বয়স্ক। ইহাদিগের প্রত্যেককেই $\frac{1}{2}$ গ্রেন মাত্রায় পিক্রেট অব এমোনিয়া ১ গ্রেন কোরাইনার সহিত পূৰ্ণোন্নত প্রকাৰে বটিকাকারে প্রয়োজিত হইয়াছিল প্রত্যহ (চারিটা পিল এক

একটা দুই ঘণ্টাস্থ) একটা ব্যতীত কেহই ফল লাভ করে নাট, তাহাদিগকে তিন দিবস প্রয়োগের পর অপর ঐষধ দ্বারা চিকিৎসা করা হইয়াছিল।

১৩শ প্রয়োগ। বোগী সতীশ, বয়স ১৮ বৎসব, স্কালব চ্যাস, সপর্গায়্য জবে পীড়িত। নিম্ন লিখিতরূপ ৬টা বটিকা প্রয়োগ করা হইল।—

R

পিক্রেট অব এমোনিয়া ১ ½ গ্রেণ

কোয়াহনা ১৫ ,,

এক্সট্রাক্ট অব জেনশান যথা প্রয়োজন।

উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া ছয়টা বটিকা প্রস্তুত কর এক একটা ২ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

প্রথম দিবস (২০ এ সেপ্টেম্বর) এই কয়েক বটিকা সোন করিয়া অল্প অব হয়। পর দিবস এই পকাশ ছয় বটিকা পুনরায় দেওয়া হয়, তাহা সেবন করিয়া আব অব হয় নাট।

১৪শ প্রয়োগ। (বোগী নবমাসী, বয়ঃক্রম ৩০ বৎসব, পৃষ্ঠ নিবাস কটক জেলাব অন্তর্গত কোন গ্রামে। তিন বৎসব হইতে এই স্থানে (স্বকপগণ্ডে) মর্শীর ব্যাধি নিযুক্ত আছে। ১৮শে সেপ্টেম্বর তাহার পর্গায়্য জবে চিকিৎসাধি মানাব নিকট আটসে এবং নিম্নলিখিত বটিকা দেওয়া হয়।

R

পিক্রেট অব এমোনিয়া ৪ গ্রেণ

কোয়াইনি সলফেটস ৩০ ,,

এক্সট্রাক্ট অব জেনশান যথা প্রয়োজন।

উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া ১২টা বটিকা প্রস্তুত কর। প্রত্যহ ছয় বটিকা।

এই কয়েক বটিকা সেবনের পর তাহার আব অব হয় নাট।

মন্তব্য। যে কয়েকটা বোগীর বিষয় প্রকাশিত হইল, তদ্ব্যতী পিক্রেট অব এমোনিয়াব পর্গায়্য নিবারক শক্তিব বিলক্ষণ পবিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাঠতেছে, অতএব অবশিষ্ট বোগী দিগের বিবরণ দেওয়া, কেবল প্রবন্ধে অনাবশ্যক বিস্তার ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রথম তিনটা বোগীর ফল দৃষ্টে ইচ্ছা প্রতি অত্যন্ত অনুভব জন্মাইতেছিল, কিন্তু পরে ত্রমেই ঐ অনুভব হ্রাস হইয়া গেল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ প্রয়োগ কালে যে ফল দৃষ্ট হইতেছে, তাহা অবশ্যই কুইনারিনের ফলে ঘটনাছে।

—•—

ভিষক-দর্পণের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও চিকিৎসা-বিভাগে ক্রমিক বাস্তবিক উন্নত-মনা ডাক্তার ঐযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী দাস মহাশয় পিক্রেট অফ এমোনিয়া—অব চিকিৎসার ব্যবহারপূর্বক যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা তাহার স্বীয় প্রেনিত পত্রে আপনাতক সমুদয়ই প্রকাশিত হইল। এই সুধাঙ্গ আমবা অন্য স্থান হইতে যাহা কিছু এতটু অবগত হইয়াছি তাহাও এই স্থান প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। অতি অল্প দিন হইল আমাদিগর সম্পাদক মহাশয় পাবনায় বেড়াইতে যান; তিনি তথায় বিশ্বস্ত হৃদ্রে অবগত হইলেন, আমাদের “ভিষক-দর্পণ”—প্রকাশিত পিক্রেট অফ এমোনিয়া প্রবন্ধ পাঠ্যঃসব পাবনা কাবাগারে সপর্গায়্য জবে উক্ত ঐষধ ব্যবহৃত হইতেছে। আশা করি, তথাকার

চিকিৎসাকল অন্যান্য চিকিৎসকগণের এ বিষয়ে বহুদর্শনসহ সময়ে আমাদের এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে।

(২) পেপারমিষ্ট ওয়েলের পচন নিবারকগুণ।

জেলা মোজাকফবপুরের অন্তর্গত শ্রুতচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ মিত্র মহাশয়ের পেপারমিষ্ট তৈলের পচননিবারক গুণসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এই স্থলে সংক্ষিপ্তরূপে বিবৃত হইল। ডাক্তার বাবু লিপিকৌচন—ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের লিখিত ও “ভিষক্-দর্পণ” প্রকাশিত পেপারমিষ্ট তৈলের পচননিবারকগুণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ্যবধি পেপারমিষ্ট তৈল পচননিবারণার্থ ব্যবহার করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্টি লাভ করিয়াছেন। তিনি যে চিকিৎসালয়ে অবস্থিত কবেন সে চিকিৎসালয়ে স্মট অয়েলের পবিবর্ত্তে তিসিতৈল ব্যবহার হইয়া থাকে, তিনি তজ্জন্য কত দুঃখ প্রকাশ করেন যে, যদি স্মট অয়েল পওয়া যাইত তাহা হইলে বোধ হয় অপেক্ষাকৃত মনো-

হর ও সন্তোষজনক ফল দর্শিতে পারিত। তিনি উক্ত ঔষধেব তৈল ও তৈল ব্যবহার কবেন এবং তদ্বাচা নিম্নলিখিত বোগীগুলি প্রতিকার প্রাপ্ত হয় :—

(১) কার্কঙ্কল	..	২।
(২) হুইটলা	..	২।
(৩) সুফিংআল্‌সাব	..	১।
(৪) বিউবো	...	৪।

বলেন ইহার সুন্দর গন্ধ বোগীর মনো-হর ও উছা হাঁস্পাতালে ব্যবহার হইবার উপযুক্ত, কারণ উচাব ম্‌লা অতি অল্প। উপযুক্ত বোগীদিগের মধ্যে কেবল একটি কার্কঙ্কল রোগীর প্রতিকার পাঠিতে ১২ দিন কালের প্রয়োজন হয়, তদ্ব্যতীত আর সমুদয় বোগী দুই সপ্তাহ কাল মধ্যে প্রতিকার পায়।

আমরা আশা করি, আমাদের অপব অপব বিদ্বান্ চিকিৎসক বন্ধগণ আমাদের ভিষক্-দপণ প্রকাশিত নবচিকিৎসা পদ্ধতি চিকিৎসায় পবিত্র করিয়া তাহা স্বদল আমাদের নিকট এইরূপে প্রকটিত করেন।

ম্যানেজার, “ভিষক্-দর্পণ”।

রাজনীপোত্রে পীড়া ও মৃত্যু-ববরণ ।

পুত্র জনকবিরোধে যে বিষাদ সাগরে নিমগ্ন, তাহা কে না জানে ? তাঁহার হৃদয়ে যে শোকসাগর প্রতি মুহূর্ত্ত উদ্বেলিত, তাহা কাহার অবদিত ? বাস্পাকুল স্রোতনে তিনি ধবাতল তিমিবাচ্চর দেখেন, জগদ্বিভূতি বিভূতি বাশি প্রায় তুচ্ছ ও অসাব জানেন যেন অনাদব ও অবহেদ পাপদ চইতে লাগে । পিতা জ্ঞাত পুত্রের পথমপদ এবং সেই পথমপদ সেবনই মানবজীবনের উৎকর্ষতাব পবিচায়ক । প্রজাও পুত্র, এবং বাজা জনক দ্রুপ, যদি বাজা অলম্বনীয় জগদ্বিধায়িনী শক্রিব বশবর্ত্তী হইয়া মানবীনা সম্বরণ পূর্ণক পাবাগতিক বাজ্যেব শোভা বর্দ্ধনার্থ ঈচ্ছামক পবিত্রাণ করেন, দীন প্রজা যে অনাথভাবে শোক সাগরে ভাসিতে থাকিবে তাহার বিচিহ্ন কি ? আজ সমগ্র ভারত ভূমি সেইরূপ শোক সাগরে অহনিশি ভাসিতেছে, শোকে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিলে সেই শোকোৎপাদক ঘটনাবলী এবণে প্রবল পিপাসা উপস্থিত হয় এবং তাহা নিবারণ জন্য সেই শোকের বিশাল বর্ণন কীর্ত্তন করা হইয়া থাকে । আমবাও অদ্য আমাদের বন্ধুবর্গেব শোকসমুদ্র পিপাসা বিদগ্ধনার্থ নিম্নে একটা শোককীর্ত্তন লিপিবদ্ধ কবিলাম । আমবা ভাবতেশ্বরীর নয়নভাবা ও মদবাজ প্রিন্স অব অয়েল্‌সের প্রাণপ্রতিমা ডিউক অব ক্লাবেন্স্‌ মহোদয়ের শেষ পীড়াব অদ্যাস্ত সংবাদ নিম্নে লিপিবদ্ধ কবিলাম ।

ভারতের ভাবী ভবসা কুমার ডিউক অব ক্লাবেন্স ও আভাওণ বর্ত্তমান সালের ৬ই জানুয়ারী তারিখে ইন্দুয়েজিয়া পৌড়াক্রান্ত হন, কিন্তু ৮ই জানুয়ারী তারিখেই তিনি বাস্তবিক অমুস্থ হইয়া ছিলেন । ৯ই তারিখে তাঁহার বাম ফুসফুস তলে একটা ক্ষুদ্রতলে নিউমোনিয়া জনিত কন্সলিডেশন (consolidation) পাওয়া যায় ; এতদ্ব্যতীত তাঁহার কোন বিশেষ কম্প হয় নাই ; কেবল ৭ই তারিখে অল্প পরিমাণে শীতামুভূতি হয় । ১০ই তারিখে প্রাতে স্ক্যাপুলার পশ্চাদ্দেশ পর্য্যন্ত আঘাতনে সগ-র্ভতা ও টিউবিউলাব ত্রিদিং প্রাপ্ত হওয়া

যায় এবং সেই দিন সন্ধ্যার মধ্যেই উক্তরূপ ভাব উল্লেখ স্ক্যাপুলার স্পাইন পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়, ও দক্ষিণ ফুসফুস তল হইতে স্ক্যাপুলার কোণ পর্য্যন্ত উল্লেখ বিস্তৃত হইয়াছে, ক্রিপি-টেশন ক্ষত হয় নাই এবং কন্সলিডেশন পার্শ্বেও বিস্তীর্ণ হয় নাই । শরীর তাপ ১০৩ ডিগ্রী, নাড়ী ৯০ এবং উত্তম চলিত-হেছে, শ্বাসপ্রশ্বাস ৩০ এবং জ্ঞানের কোন গোলাযোগ উপস্থিত হয় নাই । ৯ই দিন গতে রাজি কুমার অতি অস্থিভাব অতি-বাহিত করেন ও ১০ই তারিখে সময় সময় তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হয় এবং শরীর তাপ ১০২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত নামিয়া আইসে । ১১ই তারিখে তাঁহার অবস্থাব বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই, কিন্তু অসংখ্য পরিমাণে পীত শ্লেষ্মা উদ্গিরণ করেন, এই শ্লেষ্মা কখন কখন বজ্রাক্রান্ত পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা কখন তত আঁটাল বা ফেনিল হয় নাই । বাম ফুসফুস তল অনেকটা পরিমাণে পবিদ্ধার হইল কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্বব ফুসফুসেব মধ্যম গণ্ডট বোণাক্রান্ত হইয়া পড়িল । ১১ই হইতে ১২ই পর্য্যন্ত ব্যাধি নিদ্রা হয় নাই, এবং পবদিন প্রাতে কুমারের অবস্থা সান্ত্বায় জনক ছিল না । পর্ব্বে ক্ষয় বোধ হইল দিনেব মধ্যে ফুসফুস আবণ্ড পবিদ্ধার হইয়াছে, পথ্য অনায়াসে গ্রহণ কবিতোছেন ; নাড়ী উত্তম চলিতেছে, কিন্তু সন্ধ্যার সময় অতিশয় উত্তেজিত হইয়া রাজি প্রলাপাবস্থায় অতিপাত করেন । পরদিনও এই প্রলাপাবস্থা চলিল এবং তখন এই অবস্থায়ই বোগেব প্রধান অঙ্গ হইয়া পড়াইল । বৃদ্ধাব (১৩ই তারিখে) কন্সলিডেশন আর পাওয়া যায় নাই নেবল কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম ক্রিপিটেশন বর্ত্তমান ছিল । ১৩ই দিবাগতে রাজি প্রথমার্শ্বে বিশেষ উপকার হইয়াছে দেখা গেল, প্রলাপ তত ভয়ানক ও একধার বাহী ছিল না বরঞ্চ মধ্যে মধ্যে নিদ্রা হইত কিন্তু ব্যাধি দুইটার সময় সহসা কল্যাণ হইয়া পর দিন (১৪ই তারিখে) প্রাতে ৯-১০ কালে পরলোক যাত্রা করেন ।

কলিকাতা মেডিকেল সোসাইটি।

১৮৯১ সালের অক্টোবর মাসে এই সভার দশম অধিবেশনে ডাঃ হঃ হেবলড জাউন সাহেব নিম্ন লিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া সভাপ্ত সমস্ত সভ্যগণের চিত্তাকর্ষণ করেন।

বীৰ্য্যজুর তীক্ষ্ণ প্রাথমিক প্রদাহ।

অন্য সন্ধ্যাব সময়ে যে বিষয় পাঠ করা গেল, আজিও পর্য্যন্ত এ বিষয়ে বিশেষ বেশ নবো-
ৰোধ দেন নাই। মার্জারীর প্রচলিত পাঠ্য
পুস্তক সকলে এই পীড়ার কদাচিত কোন
উল্লেখ পণ্ডরা যায়, কিন্তু এই পীড়ার সংখ্যা
ততো নূন নহে, এত ছুই মাসের মধ্যে
আমি উক্ত পীড়াগ্রস্ত পাচটা বোগী দেখি-
ছি। এরিকসেন এই পীড়ার ব্যাখ্যা
২৭ কথায় মাত্র বর্ণনাছেন এবং ইহা
হইতে আর আর উপস্থাপন উদ্ভব হইত
মারে তাহাব কোন উল্লেখ করেন নাই।
গ্রোস এবং এগনিউ বলেন এই পীড়া আপনা
আপনি স্থায়ীভাবে কদাচিত সংঘটিত
হইয়া থাকে এবং ইহা হইতে কদাচিত পূর্ণ
উৎপন্ন হয়, কিন্তু ইহা ভিন্ন তাহাবা এবিষয়ে
আর কিছু অধিক বর্ণনা করেন নাই। এতদ্ব্য-
তীত হীত, হোমস্, ব্রাভাট, গ্যার্ট, আশ্‌গাষ্ট,
হানসেল বোলিন, টিউস, জে, বি, রবার্টস,
বিলরত এবং কলিং এই পীড়ার কোন
উল্লেখ করেন নাই। ইহাব অদ্যক্ষাৎ বিভা-

ই (secondary from) গ্রন্থস্থতার উল্লে-
খ করিয়াছেন এবং তাহাই প্রচুর দৃষ্ট হইয়া
থাকে, এবং ইহাব প্রাথমিক প্রকার সম্ভবতঃ
অস্বাভাবিক দেশের নানাবিধ ব্যাধির মধ্যে,

একটি ব্যাবি এবং তাহা হইলে এই সভাই
এই ব্যাবি সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক ও বিচার
করিবার উপযুক্ত স্থান।

প্রথম বোগী দর্শনে আমি অভ্যন্ত গোল-
মালে পতিত হই, ইত্যাগ্রে যাহা কিছু আমি
সেই ব্যাধি তাহাব কিছুই সঙ্গে এই বোগের
ইকংবন ; না লক্ষ্যে দর্শনে কিছুক্ষণ
পন্থা আমি কিছুই আধ্বাবণ করিতে পারিয়া-
ছিলাম, যদিচ লক্ষণগুলি স্পষ্ট স্পষ্ট ও
প্রমাণ্য ছিল এবং প্রথম হইতেই আমি
বিশেষ যত্ন সহকাবে দেখিয়াছিলাম। বোগীর
নাম শামসিংহ, একজন শিখ পোশিসমান,
বয়স্ক্রম ৩৪ বৎসর; গত জুলাই মাসে অব ও
তনপেটের বেদনার চিকিৎসার্পে পুরী
গোবিন্দ হাসপাতালে ভর্তি হয়, হাসপাতালে
ভর্তি হইবার তিন দিন পূর্ণ হইত সে পীড়িত
হয় বোগী প্রথমে বাম ইন্দ্রিয় প্রদেশে
এক প্রকার কাঠিন্য অনুভব করে, এই
কাঠিন্য ক্রমশঃ বেদনায় পরিণত হইয়া
অব প্রকাশ পায়। সেদিন বোগী
হাসপাতালে ভর্তি হয় সে দিন প্রাতঃ-
বালে তাহাব শরীবোস্তাপ ১০০ তাপাংশ
এবং নাড়ী ১১০, পূর্ণ ও কোমল। রোগীর
চেষ্টা পীড়িত বলিয়া বোধ হইল, অন্তর্ভুক্ত
বেদনাব কথা বলিতেছিল, বামপদে বিশ্রাম
করিয়া শুইত পাবে না। ইংল্যান্ড প্রদেশ
পত্রিকা করায় বিস্তীর্ণ স্থলতা দেখিলাম;
ইহাব চতুঃসীমা অনিয়মিত রেখাক, ক্ষীণ
স্থান কঠিন, প্রতিরোধক; এবং বরলক্ষণম
পরীক্ষায় অত্যন্ত কষ্টসাধ্যক। পৃষ্ঠের স্থান

হিত বলিয়া বোধ হইল কিন্তু স্পষ্ট চতুঃ-
সীমাবদ্ধ বলিয়া বোধ হইল না, টংকটন্যাশ
প্রদেশস্থ এন্টিচয় অনাক্রান্ত, অণ্ডকোষ ও
এপিডিডিমিস এবং বীর্ষাবজ্জ্ব নিরাস্রাংশ
ক্ষীতি বা সঞ্চাপনে বেদনা নাই; অঙ্গ
বৃদ্ধিও নাই; উদর ক্ষীত নহে, প্রত্যহ
নিয়মিতরূপে মাতাগ হইয়া থাকে এবং
অন্য প্রান্তেও সহজে বায়ু হইয়াছে।
উদর প্রাচীরস্থ ফোটক বলিয়াও বোধ
হইল না, এতদ্ব্যতীত আমি এই রোগ নির্ণয়
করিতে বিষম গোলযোগে পতিত হইলাম।
প্রথম বেদনা ও সঞ্চাপনে কষ্টাতিশয় এবং
অঙ্গ দর্পনে নবপ্রদাহ স্থির কথিয়া পীড়িত
স্থান পুনঃ পুনঃ কোমেন্ট করিতে এবং
বোগীকে শয্যা রাখিতে আদেশ কবিলাম।
সেই দিন সন্ধ্যাকালে শরীর তাপ ১০৪
(ফাঃ) তাপাংশ পর্যন্ত হয়, কিন্তু অন্যান্য
লক্ষণনিচয় প্রায়ই সমভাবে ছিল।

পাশ্চাত্য প্রান্তে দেখা গেল ক্ষীতির বৃদ্ধি
হইয়াছে, এক্ষণে অনাক্রান্তে নয়নাগোচর
হইতে পারি, এমন কি, যখন ঔদবিক প্রাচীর
গম্বুঃ বাহির হইয়া আসিয়াছে, বাহুদিক
ক্ষীতিব সীমা স্পষ্ট অল্পভরণে এবং
বর্ধিত ও অনিয়মিত বেগাবদ্ধ; উদরদিকে
বীর্ষাবজ্জ্ব পর্যন্ত ইহা বিস্তারিত হইয়াছে এবং
এই বীর্ষাবজ্জ্ব সারা ঔদবিক ছিন্ন দিয়া
বাহির হইয়া ক্ষীত ও সঞ্চাপনে কষ্ট দায়ক
হইয়াছে। আমি এক্ষণে বোগ নির্ণয় কবি-
লাম। বীর্ষাবজ্জ্ব উপর্যংশ প্রদাহগ্রস্ত হই-
য়াছে, বোধ হয় আভ্যন্তরিক ঔদবিক ছিন্ন
স্থানেই প্রদাহ সংঘটন হইয়া উভয়দিকে
অঙ্গসরণ কথিয়াছে, অর্থাৎ সেমিন্যাল

ভেসিকুলস্ এবং এপিডিডিমিস এই উভয়
দিকেই প্রদাহিত হইয়াছে। কিন্তু এই অবস্থা
কখন কথিয়া সংঘটিত হইল ভাবিয়া
বিশ্বাস্য হইল না। বোগীবাধা পীড়া
(Gonorrhoea) নাহি বা কখন যে হইয়াছিল
তাহার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না অথবা
যে কখন মূত্ররুদ্ধতা হইয়াছিল তাহার কোন
সংবাদ নাহি, অণ্ডকোষ তস্থ, কখন কোন
আঘাত প্রাপ্ত হয় নাহি, কেবল গত ছয়
মাসকাল রোগী ম্যালেরিয়া জনিত সর্বাঙ্গ
অর ভোগ করিয়াছে, তাহাও সময় সময়
প্রকাশ পাইত, কিন্তু বোগী নিজ বর্তমান
পীড়াব সঙ্গে সেই অরের উল্লেখ করে না।

এতদ্ব্যতীত এই রোগকে আমি নব
স্বজাত প্রদাহ (Acute idiopathic
Inflammation) বলিয়া স্থির করিলাম কিয়
একপ রোগী আর কখন দেখি নাহি, এমন
বিশেষ যত্নসহকায়ে রোগীবাধা অবস্থা লক্ষ
করিতে লাগিলাম। ক্ষীতিব উপর বেলে
ডোনা ও অহিবেণের প্রয়োগ দেওয়া হইল
সময় সময় তাপ প্রয়োগ, একটা লাবণি
মিশ্র আভ্যন্তরিক প্রয়োগার্থে ব্যবস্থা ক
হল এবং বোগী শয্যা হইতে উঠিতে পাইত
না, তাহার বিশেষ আদেশ করা হয়।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় রোগীর শরীর
তাপ ১০৫ (ফাঃ) তাপাংশ পর্যন্ত হয় এবং
এক মাত্রা ফেনাসিটিন প্রয়োগে ৪ তাপাংশ
হইয়াছিল; এপিডিডিমিস ক্ষীত ও সঞ্চাপনে
কষ্টদায়ক এবং ২৪ ঘণ্টা মধ্যে স্ফোটন ক্ষী
লোহিত ও সটান হয় কিন্তু অণ্ডকো
অনাক্রান্ত ছিল।

ইত্যবসরে প্রথম ক্ষীতির আরম্ভ

হইয়াছে কিন্তু উক্ত ক্ষীতি এখনও অতি কঠিন, এক্ষণে ইহা স্বল্পতরুপে ক্ষীত হইয়া ক্রমনিম্নভাবে দ্রুত হইয়াছে, ইহার সক্ষা-পেক্ষা প্রাপ্ত স্থান ৩" এবং অণুপ্রস্থে প্রায় $\frac{2}{3}$ " ইহার সীমা বক্ররেখাবদ্ধ এবং মৃদু মৃদু ডিম্বাকার পদার্থ সংযুক্ত (Nodular) এই ক্ষীতি এখনও সক্ষাপনে কষ্টসাধ্য এবং বোগী অতি কাতর হইয়াছে বসিয়া বোগ হইতে লাগিল। বসনা নীচস হইয়া উঠিলে মূহমূহঃ ত্রাণ্ডি এবং ডাইলিউট নাটোমিউবিষেটিক এসিড, সিনকোনা সহ-বোগে প্রত্যেক তারি ঘণ্টান্তর সেবন করান হয়। ইদমপাতালে ভর্তি হইবার পাবে চতুর্থ দিবসে সক্ষার সময় ফ্রোটিম পাকিয়াছে বসিয়া বিবেচনা হইল, এবং পব দিন প্রাতঃ অদীর্ঘ অন্ত্রাঘাত কবির স্থির কবিশান কিন্তু সেট দিন ব্যতিক্রমে পক্ষপান স্বতঃ বোগ হইয়া প্রভূত পরমাণে পুষ নিঃসৃত হয়।

ফ্রোটিম স্বতঃ বিন্যাস হইয়া অধিক মাত্রায় পুষ নিঃসৃত হওয়ায় বোগী আগ নাকে অনেক স্বত বিবেচনা করে এখন ফ্রোটিম ও বীর্ঘ্যজ্জ উভয়েই বেদনা হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু বীর্ঘ্যজ্জ এখনও অনেক কঠিন, রোগের প্রত্যকার বিলম্ব হইতে লাগিল, ক্ষুদ্র মৃদু মৃদু ক্রমে ক্রমে তিন সপ্তাহকাল ধরিয়া ফ্রোটিম হইতে বহিগত হইতে লাগিল এবং তৎপরে পবিকার মাংসাত্মক উৎপন্ন হইয়া ক্ষত সত্তর শুকাইয়া গেল, তথাচ বীর্ঘ্যজ্জ ক্ষীত অনেক দিন রহিল কিন্তু তাহা বেদনা বা সক্ষাপনে কষ্ট রহিত থাকে। ইহার পরে তিন সপ্তাহকাল এই ক্ষীত-স্থানোপরি সার্বরোডিন বাহ্য প্রযুক্ত হয় এবং বোগী

সেই সময় সামান্য পরমাণে মূলভাসহ হাস-পাতাল হইতে বিন্যাস প্রাপ্ত হয়। ইংগুই-ন্যা'ল কেনা'ল অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষা করায় আভ্যন্তরিক ঔদরিক দ্বিত্ব বীর্ঘ্যজ্জ অর্থাৎ ইচার ঔদরিকাংশ এখনও বাণাক্রান্ত রহিয়াছে এমত জানা গেল কিন্তু এক মাসকাল পর রোগীকে পরীক্ষা করিয়া দেয়ায় বোগী সম্পূর্ণভাবে নীর্বোগা-বস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিতে পাঠ্যম বীর্ঘ্যজ্জ ক্ষীতি আর নাই এবং এপিডি-ডিমিস ও বিবৃদ্ধিও বদনাশূন্য হইয়াছে।

এই বোগীর বোগ-পৰিণামকাল সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, বোগের প্রথমাবস্থায়ই বোগীকে দেখা হইয়াছিল এবং রোগেণ বৃদ্ধি, প্রসাধন ও শেষতক সমুদয় বিশেষরূপে লক্ষ্য করা হয় একারণ বোগ নিগমে কোন সন্দেহ জন্মিতে পাবে না।

ব্যাখ্যা। উল্লিখিত বোগীর চিকিৎসাধীন বাণে তখনক দীর্ঘ ও সুগঠন শরীর মননমান পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি হয়, ইহারও প্রকৃপ লক্ষণ সকল বর্তমান ছিল। বীর্ঘ্যজ্জ ফ্রোটিমদিকেব অস্ত্র আক্রান্ত হইয়াছে, ইংগুইন্যা'ল কেনা'ল ক্ষীতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে এবং তথায় অধিক বেদনা ও সক্ষাপনে বটোতিশয়া দেখা গেল। বোগী নিজ বোগবিবরণ একই প্রকার প্রকাশ করিল, ধাতুপীড়া (Gonorrhoea) ও ছিল না এবং অণুকোষের কোন রোগও ছিল না, কখন কোন আশ্রিতও লাগে জ্বাই কিন্তু পাঁচ সপ্তাহ কাগাবরি কম্পন্নর aguthe ভোগ করিতেছে। মীহার বিবৃদ্ধি নাই এবং রক্তাক্ততাও নাই; বোগীর শাস্ত ভালই

চিশ এবং হাসপাতালে থাকি বলে। উচ্চতম
জীবিতাল ১০৩৬ (ফান) তাপাশ পর্যন্ত
হয়।

বাম পার্শ্বের বীণাবজ্র বোগগ্রস্ত,
এপিউডিমস সহবই আক্রান্ত হইল এবং
শ্রোতম ক্ষীত ও সটান হইয়া উঠিল।
ক্ষীতস্থান পূর পবিষিত হইলে একটা শুদোর্ধ
অন্নদাত্রে সেট ক্ষীত স্থান কর্জন করায়
প্রভূত পবিমাণে পূর নিঃসৃত হইল এবং
লক্ষ্যনিচয় হ্রাসতা পাঠিল, কিন্তু বীণাবজ্র
কাঠিন্য এক মাস কাল ছিল এবং বোগীব
সাম্প্রদায়িক স্বাস্থ্যের অনেক ক্ষতি জন্মিয়।
অবশেষে সাত সপ্তাহকাল হাসপাতালে
অবস্থিতি করিয়া বোগী হাসপাতাল হইতে
বিদায় গ্রাপ্ত হয়।

৩য় বোগী। দ্বিতীয় বোগী চারি দিন চিকিৎসাধীন হইবার পরে এই তৃতীয় বোগী পুৰীপিগ্রাম হাসপাতালে আগন্তু মানে উপস্থিত হয়। বোগী উত্তর পশ্চিম প্রদেশে শীঘ্র জনৈক তীথযাত্রী, ক্ষীগোপ, দেবগিরি অস্থায়ী বলিয়া বোধ হয়, বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর, জ্বর, দক্ষণ কুচকী প্রদেশে বেদনা সহ ক্ষীতি এবং ক্ষীত ক্ষোভমসহ হা পাতালে আইসে। বোগী আপনাব বৃত্তান্ত আপনকহিল, অনলজ্ঞত সত্য সংবাদ পাইবার বা অন্যর আমি মাধাবগতঃ যে সকল প্রসঙ্গ প্রথমতঃ বলা হইয়া থাকে তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই। চাই সপ্তাহ কালাবধি বোগী জ্বর ভোগ করিতেছিল এবং মণ্ডবব জনৈক কবিবাজ তাহাক চিকিৎসা করেন। হাসপাতালে ভর্তি হইবার পর জ্বর পূর্বে প্রকাশ্য কান কাণ বাতীত রোগীর কচকী প্রদেশে একটি স্থান ক্ষীত

হটয়া সমস্ত সাতিশব বেদনাযুক্ত হইয়া উঠে এবং পূৰ্ণ হঠাৎ ফ্রোটমে কোন পীড়া ছিল না কিন্তু এক্ষণে কূলয়া উঠিল। পরীক্ষাভে মাতৃপীড়ার (of gonorrhoea) কোন লক্ষণ পাওয়া গেল না, বিয্যবজ্জু অতিশয় ক্ষীত ও কঠিন, এপিডিডিমস ক্ষীত ও মক্ষাপনে কষ্টদায়ক এবং ফ্রোটম রক্তবর্ণ, স্থিতিস্থাপক ও ক্ষীত। দেখিলে তীক্ষ্ণ প্রদাহবিশিষ্ট জলদোষেব পীড়া বলিয়া বোধ হয়, এ কাবন বোগীকে ক্রোবোক্ষ্ম করিয়া সুদীর্ঘ অন্ত্রাঘাতপূৰ্ণক টিউনিকা হেজাই-নেলিস বর্জন কবি। ষড় ষড় লিঙ্কসই প্রায় চারি আউন্স সিনাপস বস পাওয়া যায়, গত পাবদ ভলে দোঁত কবিয়া আইয়োডো-ফল্ফচূর্ণ মিশ্রিত লিটট্রাবা পূরণ কবা হয়। এই অন্ত্রোপচাবে তীক্ষ্ণ লক্ষণসমূহের অনেক উপবাব কবিল, অব কমিয়া গেল, এবং বেদনা হ্রাস হইয়া সমস্ত অস্থিহিত হটল; বীণ্যরক্তুর কাঠিন্য ক্রমে দুব হটল, ফ্রোটম ক্ষত নাগাসক্তুর দাবা শুকাইয়া গেল এবং বোগী সেক্টেব্বের প্রারম্ভে বিদায় পাইল।

অপর দুইটি রোগীর অবস্থা ১ম বোগীর অবস্থার সঙ্গে এত সাদৃশ্য আছে যে, তাহা-
দিগের সম্পূর্ণ অবস্থা বর্ণন করা অনাংশ্যক
বলিয়া বোধ হয়। উভয়ই যুবাণুরুষ এবং
শোগের প্রথম প্রথম অবস্থায় হাঁস্পাতালে
আনিয়াছিল, একজনেব বার্খারজুর ফ্রোটম
দিবের অস্ত্র আক্রান্ত হয় নাই এমনত সময়
হাঁস্পাতালে আইসে এবং অন্য জন বার্খার-
জুর সপ্তদশটা পীড়াগ্রহ হইলে হাঁস্পাতালে
আইসে। উভয়েরই পীড়া বাহ্যিকিক হয়,
এবং এপিডিডিমিস এবং ফ্রোটম পীড়াগ্রহ

শেষোক্ত অঙ্গে পুষ্কর্য হইতেছে; সুদীর্ঘ অজ্ঞাণাতে পূর নিঃসারণ কবা হয় আরোগ লাভ হইতে যদিচ অনেক বিলম্ব হয় কিন্তু অবশেষে সম্পূর্ণ আবেগ্য লাভ কবে।

এই বোগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবে:—

১। বোগ অতি তীক্ষ্ণ এবং অর সহ বর্ন্তমান।

২। এই বোগ স্বতঃস্ফূর্ত, কারণ সাধারণতঃ যে সকল কাবণে প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা কিছু দেখা যায় না।

৩। বীয়াবজ্রব যে অংশ ইংগ্ৰটনাল কেনালস্থ, প্রদাহ সেই অংশেই প্রথম প্রকাশ পায় বিশেষতঃ ইহাব উদরিক অন্তের নিকটেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

৪। এই প্রদাহ সর্ব বীর্ঘাবজ্রব অণে দিকে গমন পূরক এপিডিমিস ও ক্রোটম আক্রমণ কবে এবং শেষোক্তস্থানে উল্লিখিত বীয়াবোগীর মধ্য ষ্টীতে পুষ্কর্য হইয়া ছিন্ন ও অবশিষ্ট বোগীব তীক্ষ্ণ জলদোবেব পীড়া জন্মিয়াছিল।

৫। রক্ত পূর নিঃসরণ পূর্ণ পবিকার করিয়া দিলে বীর্ঘাবজ্রব তীক্ষ্ণ লক্ষণনিচয় উপশমিত হয়।

৬। বীর্ঘাবজ্রব প্রদাহ জনিত পদার্থের প্রতিকার অতি বলঘে হইয়া থাকে, অর্থাৎ এই প্রদাহ আক্রমণকালে অতি তীক্ষ্ণ ভাবাপন্ন এবং সেই তীক্ষ্ণতার সহকারেই ক্রোটমে পুষ্কর্য হয় কিন্তু ঐতপরে বীর্ঘাবজ্রব হইবার পুরাতন ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

৭। উপর্যুক্ত পাঁচটা বোগীর মধ্যে চাপিটিতে বামগাশ্বে বোগ প্রকাশ হয়। অল্প বৃদ্ধি প্রকৃতিতেই ইয়াছে, সেসকল বাধ হয় না।

৮। সমুদয় বোগী গুলির এই পীড়ার অগ্রে ম্যালেন ববা কনিষ্ঠ জর ভোগ করাব সংবাদ পাওয়া যায়, স্বতবাং এই প্রস্তুতি স্বতঃই উৎপন্ন হয়, এই বোগেব যে, কাবণেব সঙ্গে ম্যালেরিয়াব সঙ্গে কি কোন সংন্ধ আছে? টিউনিকা ভাজাইনেলিসেব হাডোমীল বঙ্গদেশেব অতি সাধারণ পীড়া এবং এই বোগকে অনেক গ্রন্থ কর্তাবা ম্যালেরিয়া জনিত বলিয়াছেন ও সম্ভবতঃ এই উপস্থিত বোগেবও কাবণ গুল্যভাবে ম্যালেরিয়াতে নিহিত আছে।

এতদ্বারা আমার এইরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ক্ষীণ ও বতিন বীর্ঘাবজ্রব সহ তীক্ষ্ণ হাইড্রোসীস বা ক্রোটম প্রদাহগ্রস্ত বোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেই ক্রায়ই আমার জানিতে পারিব যে পীড়া উপরি স্থান হইতে নিম্ন দিকে আসিয়াছে, আমার এরূপ বিবেচনা হয় যে, বীর্ঘাবজ্রব তীক্ষ্ণ স্বতঃস্ফূর্ত (Idiopathic) প্রদাহ যেরূপ অচম ন করা যায় তাহা হইতে অনেক অধিক, তবে আনরা যে তাহা দেখিতে পাই না তাহার কাবণ এই—বোগী রোগের প্রথমাবস্থায় অর্গ্য যখন রোগ বীর্ঘাবজ্রবতে থাকে তখন বোগী কদচিৎ চিকিৎসাধীন হয়। যখন ক্রোটম আক্রান্ত হয় রোগী তখন প্রতিকারের প্রার্থনা করে এবং তৎকালের সর্ব প্রধান লক্ষণই সর্ব প্রথম রোগাবস্থা বদিলার সিদ্ধান্ত হইয়া তদনুযায়ীও চিকিৎসা হয় এরূপ সময় বীর্ঘাবজ্রব লক্ষণাবলী প্রাথমিক

জ্যোতম প্রদাহের লক্ষণ নিচয়ের অপেক্ষা
ন্যূন এবং এতদ্ব্যতীত তত লক্ষ্য হয় না।

ডাঃ ম্যাক্‌লাউড সাহেব বলিলেন, ডাঃ
ব্রাউন সাহেবের উল্লিখিত বোগীর মত বোগী
নিজের অনেক দেখিয়াছেন এবং উক্ত
প্রদাহেব ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে প্রাপ্ত হইয়া
ছেন, এবং কখন কখন এক পার্শ্বে এং
কখন কখন উভয় পার্শ্বেই উক্ত পীড়া হইতে
দেখিয়াছেন।

ডাঃ শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাশ চন্দ্র বসু উক্ত
রোগগ্রস্ত একটা বোগীর কথা উল্লেখ করি-
লেন সেই বোগীর গ্যাংগ্রিন হয় এবং তজ্জন্য
সুদীর্ঘ ইনসিশন প্রদান বরিতে হইয়াছিল,
রোগী রোগ হইতে মুক্তি পায়।

ডাঃ শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ
বলিলেন, ঐরূপ রোগী অনেক দেখিয়াছেন
এবং উক্ত বোগেব সহযোগী অর ম্যালেরিয়া
জনিত বলেন না, বরঞ্চ এলিফ্যানটায়সিস
বোগসহ যে অর হইয়া থাকে সেইরূপ অর
হইবে বলিয়া বিশ্বাস করেন।

ডাঃ শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল চক্রবর্তী
উক্ত বোগী অনেক দেখিয়াছেন বলিলেন।
একটা ডায়াবিটিস বোগাক্রান্ত ব্যক্তির এই
পীড়া হইয়া প্রদাহ গ্যাংগ্রিন ভাব অবলম্বন
করিয়া বীর্ঘ্য বজ্জু হইতে জ্যোতম, পেরি-
নিয়াম্, ইন্টিমো বেবটাল ফসা এবং পেন্-
ভিক ফ্যাসিয়া আক্রান্ত হইয়া রোগী পরি-
ণামে কালকবলে পরিত্ত হয়।

নবঔষধাবলী ।

৬। এসিড ক্লাইসোফেনিক ।

(Acid Chrysophanic)

গোষা পাউডার হইতে উৎপন্ন। মস্ত
কর দ্রব্যবোগে, লুপাস, সোব্যাসিস এবং
অন্যান্য চক্ষুবোগে বাহ্য প্রয়োগরূপে ব্যব-
হৃত হইয়া থাকে, ইহার আভ্যন্তরিক
প্রয়োগে বমনসহ ভেব হয়। ডাঃ জে
আর্শবার্টন সাহেব বলেন যে, এই ঔষধ
সেবনে অল্প একরূপ সহব ও সম্পূর্ণ রূপে
পরিত্ত হয় যে, অন্য কোন ঔষধ দ্বারা সে
রূপ হইতে পারে না। তিনি মাত্রাঃ
৫ হইতে ১৫ গ্রেণ পর্যন্ত ব্যবহার করেন।
চক্ষুবোগে এক ষষ্ঠাংশ হইতে অর্দ্ধ গ্রেণ।
মগম ২ ড্রাম এক আউন্সে।

৭। এসিড ফ্লুওরিক Acid Fluoric

এই ঔষধ ক্রমাগত ৪১ বৎসর কাল
গুগোণ (ব্রঙ্কোসিল বা গয়টার) বোগে
ব্যবহারপূর্বক ডাঃ এডওয়ার্ড নোকস্ (Dr
Edward Noakes) শতকরা ৮৭টা বোগীতে
কৃতকার্য হইয়াছেন। উক্ত ডাক্তার মহো-
দয় মাত্রা পবিত্রাব পুনঃ পরিত্ত
ফ্লুওরিক এসিডেব শতকরা অর্দ্ধ ভাগ দ্রব
অপ্‌ড্রাম হইতে দুই ড্রাম পর্যন্ত ব্যবহার
করিতেন। শতকরা ১ ভাগ দ্রবে ১৫মিনিম
হইতে ১ ড্রাম।

৮। এসিড হাইড্রাইওডিক ।

(Acid Hydriodic.)

আইওডিনের অম্লভেজক এবং ক্যাম-

হাবোপযোগী প্রকরণ কবিতা এক্ষণে সকলে ইহাকে স্বীকার করিতেছেন। এই ঔষধ সিরাপকপে ব্যবহাব হইয়া থাকে। মেডিক্যাল সামবী (Medical Summary) নামক সংবাদ পত্রে ডাক্তার অয়াইল্ডমান বলেন, ১ হইতে ২ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যেক ৩ ঘণ্টাস্তর প্রয়োগ দ্বাৰা নূতন বাতবোগের বেদনা নিবারণে অহিফেনের ব্যবহাব বাতিরেকে কৃতকার্য হইয়াছেন এবং উপসংশীয় চক্ষুরোগে (Secondary Syphilitic) ও গণ্ডগোল ইত্যাদি রোগে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ডাং ডব্লিউ সি, উইল (W. C. Will) সাহেব মেম্ফিস মেডিক্যাল মন্থলী (Memphis Medical Monthly) পত্রে বলেন, খাসকাশ বোগেব নানাবিধ

উপসংগে ইহা একটি উত্তম ঔষধ। মাত্রা অৰ্দ্ধ হইতে ২ ড্রাম সিরাপ।

৯। এসিড পিক্রিক্ (Acid Picric) ল্যান্সেট (Lancet) সংবাদ পত্রে ডাং কালভেলী (Dr Calville) ১৮৮৯ সালের ৬ই এপ্রেল তারিখে পিক্রিক এসিড দ্রব (১০০০ ভাগ জলে ৬ ভাগ) ইবিসিপলাস বোগে প্রশংসনীয় বলিয়া লিখিয়াছেন। যে সকল বোগীৰ জীবনীশক্তির অতি হীনাবস্থা উপস্থিত এবং অতিশয় উত্তাপসহ প্রলাপ বর্তমান উক্ত দ্রব পীড়িত অঙ্গে ৫ হইতে ১০ বাব দিনে বাহ্য প্রয়োগে শীঘ্র ক্ষীতি বিদ্যমিত ও অবস্থাস্থি প্রাপ্ত হয়। উপযুক্ত চিকিৎসা লিম্ফ্যাগ্ৰাইটিস ও একজেমা বোগেও প্রশংসিত।

সংবাদ ।

সিভিলসার্জন ও এপোথিকারিগণ ।

সার্জন মেজর কে, পি, গুপ্ত ১৮৯২ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নোয়াখালী জেলের কার্য ভার এঃ সার্জন বাবু নবীনচন্দ্র দত্তকে দিয়াছেন।

সার্জন মেজর এফ, সি, নিকলসন (ডাক্তার সিঃ সার্জন) পাটনার সিঃ সার্জনের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং সিঃ সার্জন সার্জন মেজর ই, জি, রাসেল দারজিলিংয়ের সিঃ সার্জনের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা মেঃ কলেজ হাসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জন সার্জন ই. এইচ, ব্রাউন সাহেব কোচবিহার রাজ্যে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার পদে চট্টগ্রামের অফিসিঃ

সিঃ সার্জন সার্জন ডি, এম, মন্ডের সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৮৯১ সালের ৫ই নভেম্বর হইতে সার্জন মেজর আব, এল, দত্ত সাহেব মেদিনীপুরের সিঃ সার্জনের পদে অফিসিয়েট করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

নোয়াখালীর সিঃ সার্জন সার্জন মেজর কালীপদ গুপ্ত বাকরগঞ্জের সিঃ সার্জনের পদে অফিসিয়েট করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৮৯১ সালের ৮ই এপ্রেল হইতে সার্জন জে, আর, এডি সাহেব বাকরগঞ্জের সিঃ সার্জনের পদে কার্য করিতে আবস্থ করেন।

১৮৯২ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখের অপরাহ্নে সার্জন ডি, এম, মন্ডের সাহেব এঃ সঃ হরিমোহন সেনকে চট্টগ্রামের জেলের কার্যভার অর্পণ করিয়াছেন।

এঃ এপোথিকারী জিঃ এসঃ ওনীল সাহেব কার্য্য স্থানে উপস্থিত হওয়া তাবিধ হইতে স্যাণ্ডহেডস এর মেঃ অসিসবকপে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

সার্জর্ন মেজর ডবলিউ এফ, মাবে সাহেবের অতুপস্থিতে বা অন্যতর আদেশ পর্য্যন্ত দলান্দা বাতুশাস্রম । (Lunatic Asylum) এব ডিপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট এপোথিকারী জে, জি, ফেলুইং সাহেব চট্টগ্রাম সিঃ হোশন ও জেলাব মেঃ চার্জ করিয়াছেন এবং তাঁহার পদ ছাবডা ফেনাবেল চসপিটালের এপোথিকারী ডবলিউ এ, উইলিয়ামস সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন ।

এসিস্ট্যান্ট সার্জনগণ ।

১৮৯১ সালের ২১ শে অক্টোবর হইতে ১৪ই নভেম্বর পর্য্যন্ত ডিহবী ইবিগেশন হাস-পাতালের ডাক্তার এঃ সঃ বাবু কালীপ্রসন্ন বোম্বাল বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

এঃ সঃ বাবু কৃষ্ণলাল সন্ন্যাসের অতু-পস্থিতে বা অন্যতর আদেশ পর্য্যন্ত এঃ সঃ বাবু অধিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বর্শাল ডিপেন্সারীর কার্য্যভার অস্থায়ীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

১৮৯১ সালের ২৩ শে ডিসেম্বর হইতে ১৮৯১ সালের ৩রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত সিঃ সার্জটেনব অতুপস্থিতে পুরী চেবিরেবল ডিপেন্সারীর এঃ সার্জর্ন বাবু উপেন্দ্রনাথায়্য সাহেব আপন কার্য্য ভাড়া তথাকার সিঃ হোশনের কার্য্য অতিরিক্ত ভাবে করিয়াছেন ।

বর্শাল দাক্তার ঔষধালয়ের এঃ সঃ বাবু অধিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আপন কার্য্য

ভাড়া ব্যবসগতের সিঃ হোশনের কার্য্য অতিরিক্ত ভাবে কবিত্তে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

১৮৯২ সালের ২৪শে জানুয়ারী তারিখে এঃ সঃ বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী পালার্মো ইন্টারমিডিয়েট জেলের বার্য্য ভাব এঃ সঃ বাবু কৃষ্ণলাল সন্ন্যাস কে অর্পণ কবিয়াছেন ।

১৮৯২ সালের ২৪শে জানুয়ারী তারিখে এঃ সঃ বাবু পূর্ণচন্দ্র দাস শাহাবাদীর অতু-গত ডিহবী ইবিগেশন হাসপাতালে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

১৮৯১ সালের ৭ঠা নভেম্বর পূর্ণাঙ্ক হইতে ১৭ই নভেম্বর পূর্ণাঙ্ক পর্য্যন্ত আবু দাক্তার ঔষধালয়ের এঃ সঃ বাবু নৃত্যগোপাল মিত্র আপন কার্য্য ভাড়া তথাকার সিঃ হোশনের কার্য্য অতিরিক্ত ভাবে কবিয়াছেন ।

১৮৯২ সালের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে এঃ সঃ বাবু মহিলাল মুখোপাধ্যায় বালস-রের জেলের কার্য্য ভাড়া জি, শিওয়ান সাহে-বকে অর্পণ কবিয়াছেন ।

১৮৯২ সালের ৩০শে জানুয়ারী তারিখের পূর্ণাঙ্কে এঃ সঃ বাবু গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপা-ধ্যায় পাবনা জেলের কার্য্যভার ডাক্তার কুমার ভূপেন্দ্রনাথায়্যকে অর্পণ কবিয়াছেন ।

১৮৯২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী পূর্ণাঙ্কে এঃ সঃ বাবু ললিতমোহন লাহা বগুড়া ইন্টারমিডিয়েট জেলের কার্য্যভার এঃ সঃ বাবু গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অর্পণ কবিয়াছেন ।

কলিকাতা মেঃ কলেজের পরীক্ষাকর্তার ভাড়া বাবু হরেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৮৯১ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে এঃ সার্জনের পক্ষে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

হস্পিটাল এসিস্ট্যান্টগণ।

(১৮৯২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের পদস্থ,
স্থানাবিত ও অর্ধদণ্ড হওয়া)।

কমিরা ডিসপেন্সারী হইতে তৃতীয়
শ্রেণীর হঃ এঃ মীর আব্দুলবারী ঢাকার
সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়া-
ছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ নাবাগণ মিশ্র
হুটীর পর কটকে সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত
হইয়াছেন।

কাউনিয়া ও যাক্সাপুরের মধ্যে ই, বি,
এস, রেলওয়ের অফিসিঃ টাঃ হঃ এঃ প্রথম
শ্রেণীর হঃ এঃ অধিকাচরণ বহু রঙ্গপুরে
সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

চাঁদপুর সর্ভভিজন ও ডিসপেন্সারীর
অফিসিয়েটিং কর্মচারী দ্বিতীয় শ্রেণীর হঃ
এঃ কার্তিকচন্দ্র দালালের পাঁচদিনের বেতন
অর্ধদণ্ড হইয়াছে।

রাঁচির পুলিশ হাঁস্পাতালের কর্মচারী
তৃতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ নেজামুদ্দীন আহমদ
ছোট নাগপুরে কমিশনারের ইন্টার্মিনমেণ্টে
অফিসিয়েট করিতেছেন।

কমিশনারের ইন্টার্মিনমেণ্টে অফিসি-
য়েট করিতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত তৃতীয় শ্রেণীর হঃ
এঃ আসীরুদ্দীন মণ্ডল রাঁচি পুলিশ হাঁস্পা-
তালে অফিসিয়েট করিতে নিযুক্ত হইয়া-
ছেন।

বাগরা ও করঝোলা মেসার ডিঃ হইতে
তৃতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ সরেদ একবাল হোসেন
পূর্বরার জেল ও পুলিশ হাঁস্পাতালে অফি-
সিয়েট করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ আনন্দের সেন
১২ নং সার্ভে পাটিসহ ডিঃ করিতে আদেশ
প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু সেই আদেশ ক্যান্সেল
হইয়াছে।

ক্যাথেন হাঁস্পাতালের সুপারঃ ডিঃ
হইতে তৃতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ হরবল্লভ দাস
গুপ্ত ব্রহ্মদেশে ১২নং সার্ভে পাটিসহ ডিঃ
করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সাগর মেসার স্পেশিয়াল ডিঃ হইতে তৃতীয়
শ্রেণীর হঃ এঃ কামাখ্যাচরণ চক্রবর্তী আলি-
পুর পুলিশ কেস হাঁস্পাতালে সুপারঃ ডিঃ
করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

নদিয়ার ফিবার ডিঃ হইতে তৃতীয়
শ্রেণীর হঃ এঃ তারাকান্ত সেন গুপ্ত নদিয়ার
সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

নদিয়ার সুপারঃ ডিঃ হইতে তৃতীয় শ্রেণীর
হঃ এঃ তারাকান্ত সেন গুপ্ত বর্ধমান জেল
হাঁস্পাতালে অফিসিয়েট করিতে নিযুক্ত
হইয়াছেন।

গরার অন্তর্গত নওয়ালা সর্ভ ভিজন
ও ডিসপেন্সারী হইতে প্রথম শ্রেণীর হঃ
এঃ কালীপ্রসন্ন হাজরার দুই দিনের বেতন
অর্ধদণ্ড হইয়াছে।

চাঁদপুর সব ভিজন ও ডিসপেন্সারীর
অফিসিয়েটিং কর্মচারী দ্বিতীয় শ্রেণীর হঃ
এঃ কার্তিকচন্দ্র দালালের দুই দিনের বেতন
অর্ধদণ্ড হইয়াছে।

চট্টগ্রামের পুলিশ হাঁস্পাতাল হইতে
তৃতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ শম্ভর চট্টোপাধ্যায়
চট্টগ্রামে কলেরা ডিঃ করিতে নিযুক্ত
হইয়াছেন।

চট্টগ্রাম জেল হাঁস্পাতাল হইতে দ্বিতীয়

শ্রেণীর হঃ এঃ জগীৰথ বড়ুয়া আপন কার্য্য সমাপ্তে হাজারীবাগে ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

রঙ্গপুরের সুপারঃ ডিঃ হইতে প্রথম শ্রেণীর হঃ এঃ অধিকাচরণ বসু চট্টগ্রামে কলেরা ডিউটিতে নিযুক্ত রহিয়াছেন ।

বনবিভাগের সীতাপাহাড় কুলি হাস্পাতাল হইতে তৃতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ শ্রীধর বড়ুয়ার দুই দিনের বেতন অর্থদণ্ড হইয়াছে ।

রামপুরহাট সর্ভভিজন ও ডিস্পেন্সারীর প্রথম শ্রেণীর হঃ এঃ প্রিয়নাথ বসুর পাঁচ দিনের বেতন অর্থদণ্ড হইয়াছে ।

ক্যাম্বেল হাস্পাতাল সুপারঃ ডিউটির তৃতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ ললিতকুমার বসু ফরিদপুর ডিস্পেন্সারীতে অফিসিয়েট করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

মধ্যপুর সর্ভভিজন ও ডিস্পেন্সারীর অফিসিঃ প্রথম শ্রেণীর হঃ এঃ অধরচন্দ্র চক্রবর্তী ভাগলপুরে সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

হুগলি জেল হাস্পাতালের তৃতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ১৮৯১ সালের ১লা আশ্বিন হইতে ১৮ই পর্য্যন্ত হুগলি পুলিশ হাস্পাতালে অতিরিক্ত ভাবে ডিউট করেন তাহা মঞ্জুর করা হয় ।

হুগলি জেল হাস্পাতালের তৃতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ১৮৯১ সালের ৪ঠা নবেম্বর অপরাহ্ন হইতে ১৩ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এমামবাড়া হাস্পাতালে ডিউট করিয়াছেন তাহা মঞ্জুর করা হইল ।

তৃতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ আবদুল্লাহ খাঁ ছুটি

সমাপ্তে হাজারীবাগে ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

পাটনার সুপারঃ ডিউটি হইতে প্রথম শ্রেণীর হঃ এঃ সয়েদ আশ্ফাক হোসেন বাড় সর্ভভিজন ও ডিস্পেন্সারীতে অফিসিয়েট করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

ঢাকার সুপারঃ ডিঃ করিতে আদেশ প্রাপ্ত তৃতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ মীর আব্দুল বারী ব্রহ্মদেশে ২০নং সার্ভে পার্টিতে ডিউটি করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

হাজারীবাগ সুপারঃ ডিঃ হইতে তৃতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ আবদুল্লাহ খাঁ রঙ্গপুর জেল হাস্পাতালে অফিসিয়েট করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

পূর্ণিয়ার থাপড়া মেলা হইতে তৃতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ সয়েদ একবাল হোসেন পূর্ণিয়ার সুপারঃ ডিঃ করিবেন ও আবদুল হইলে করাজোলা মেলার ডিউটি করিবেন ।

রাঁচির সুপারঃ ডিঃ হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ তারিণীমোহন বসু গরার কলেরা হাস্পাতালে অফিসিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

ক্যাম্বেল হাস্পাতাল সুপারঃ ডিঃ হইতে প্রথম শ্রেণীর হঃ এঃ পার্শ্বভীচরণ ভট্টাচার্য্য বিষ্ণুপুর সর্ভভিজন ও ডিস্পেন্সারীতে অফিসিয়েট করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

তৃতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ তন্দক হোসেন ছুটির পর সুজের সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন । ক্যাম্বেল হাস্পাতাল সুপারঃ ডিঃ করিতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ গোপালচন্দ্র বর্মান বন বিভাগের রাজারহা-থোরা হাস্পাতালে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

বনবিভাগের রাজারহাথোরা হাস্পাতাল

ভানের অক্সিজেনিট কার্য হইতে তৃতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ সেথ আম্মাহদার জলপাই-ওড়িতে সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সুন্দরের সুপারঃ ডিঃ হইতে তৃতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ তসদক চোমেন ২৪ পরগণার হাড়ওয়ার মেলার নিযুক্ত হইয়াছেন।

রাজ্যমাটির ডিঃ হইতে তৃতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ বিনোদলাল চট্টোপাধ্যায় ক্যাম্বেল হাঙ্গাভালে সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ঢাকার সুপাঃ ডিঃ হইতে প্রথম শ্রেণীর হঃ এঃ মুকন্দচন্দ্র নিরোগী রাজ্যমাটিতে ডিউটি করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাড় সর্ভভিজন ও ডিস্পেন্সারীতে অক্সিজেনিট করিতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর হঃ এঃ সরেদ আশুজক হোসেন পাটনার নীতি ডিস্পেন্সারীতে অক্সিজেনিট করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ঢাকার সুপারঃ ডিঃ হইতে প্রথম শ্রেণীর হঃ এঃ মুহম্মদ নিরোগী ১৮৯১ সালের ৩১শে অক্টোবর পূর্বে হইতে ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বিনামপুরে সুপারঃ ডিঃ করেন; তাহা সম্বরণ করা হইল।

দিনাজপুর সুপারঃ ডিঃ হইতে প্রথম শ্রেণীর হঃ এঃ কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী ক্যাম্বেল হাঙ্গাভালে সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইরিগেশন হাঙ্গাভাল হইতে তৃতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ বৈকুণ্ঠচন্দ্র ওহ মেদিনীপুরে সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সর্ভভিজন ও ডিস্পেন্সারী

সরী হইতে তৃতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ উজ্জয়ন্ত বহার মেদিনীপুরের পাঁচকরা ইরিগেশন হাঙ্গাভালে নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রথম শ্রেণীর হঃ এঃ কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্য ছুটার পর নদিয়ার সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

পটুয়াখালী হইতে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান হইয়া ক্যাম্বেল হাঙ্গাভালে সুপারঃ ডিঃ করিতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ হিরানাল সেন চম্পারণ বরহরওয়া ডিস্পেন্সারীতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

আলিপুর রিকম্পেন্সারী স্কুল হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ ইজ্ঞচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ক্যাম্বেল হাঙ্গাভালে সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বারাণসী সর্ভভিজন ও ডিস্পেন্সারী হইতে তৃতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ অধোনাথ ভট্টাচার্য্য ক্যাম্বেল হাঙ্গাভালে সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ধরকপুর ডিস্পেন্সারী হইতে প্রথম শ্রেণীর হঃ এঃ অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বারাণসী সর্ভভিজন ও ডিস্পেন্সারীতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

পাটনা সুপারঃ ডিঃ হইতে তৃতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ শেখ মহম্মদ আব্রাহিম কলেক্তা ডিঃ করিতে ২৪ পরগণা বদলী হইয়াছেন।

ইরগালা ডিস্পেন্সারী হইতে তৃতীয় শ্রেণীর হঃ এঃ উজ্জনাথ মিত্র ১৮৯১। ২৫শে আগষ্ট হইতে ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বড়ী ডিস্পেন্সারীতে কার্য করেন তাহা সম্বরণ করা হয়।

বড়ী ডিস্পেন্সারীর দ্বিতীয় শ্রেণীর হঃ

এঃ জীবনকৃষ্ণ দত্ত ১৮৯১ সালের ২৬ আগষ্ট
হইতে ২২শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হাজারীবাগে
সুপারঃ ডিঃ করিয়াছেন তাহা মঞ্জুর করা
হয় ।

হাজারীবাগে সুপারঃ ডিউটির দ্বিতীয়
শ্রেণীর হঃ এঃ জীবনকৃষ্ণ দত্তকে সিঃ সার্জন
বটী ডিস্পেন্সারীর কার্যভার লইতে আদেশ
করেন তাহা মঞ্জুর হইল ।

হস্পিটাল এসিস্ট্যান্টগণ ।

১৮৯২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ছুটি ।

শ্রেণী	নাম	কোথাকার	ছুটির কারণ ও ছুটিকতদিন
২।	সুয়েদ একবাল হোসেন	লাংলে বাইতে আঙ্গা প্রাপ্ত	পীড়া, ছুটি ৩ মাস
৩।	দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়	ছোটনাগপুর	প্রিভিলেজ লিভ ১ মাস
২।	জগবন্ধু গুপ্ত	পুর্নিয়ার জেল ও পুলিশ হাস্পাতাল	” ”
১।	ফীরোদচন্দ্র গোস্বামী	ফরিদপুর ডিস্পেন্সারী	” ”
৩।	কালীকুমার চৌধুরী	রঙ্গপুর জেল হাস্পাতাল	” ”
১।	রজনীকান্ত গুহ	গয়া কলেরা হাস্পাতাল	” ”
১।	অন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য	বিষ্ণুপুর সবডিভিজন ও ডিস্পেন্সারী	” ৭০ দিন ।
৩।	ললিতকুমার বসু	ফরিদপুর ডিস্পেন্সারী	{ ১৮৯১ সালের ১৬ই সেপ্টে- ম্বর হইতে ১৮৯২ সালের ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত পীড়াবশতঃ ছুটি ।
৩।	রজনীকান্ত আচার্য	ছুটি	{ পীড়াবশতঃ অতিরিক্ত ছুটি এক মাস ।
১।	প্রসন্নকুমার সেন	{ ব্রাহ্মণবাড়িয়া সবডিভিজন ও ডিস্পেন্সারী	{ পীড়াবশতঃ ছুটি ৩ মাস ।
১।	নালাধর মুখোপাধ্যায়	আলিপুর জেল হাস্পাতাল	পীড়াবশতঃ ছুটি ২ মাস ।





বঙ্গভাষার চিকিৎসা-তত্ত্ব-বিষয়ক মাসিক পত্র ।

সম্পাদক—ডাক্তার মৌলভি জহির-
দিন আহমদ, এল, এম, এস ; এফ,
সি, ইউ ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার
দেবেন্দ্রনাথ রায়, এল, এম, এস ।

কর্মচারী—শ্রীযুক্ত আব্দুল অজেদ খাঁ
চৌধুরী ।

তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার
বাবু গিরীশচন্দ্র বাগচী ।

১ম খণ্ড ।] কলিকাতা । এপ্রেল ১৮৯২ । [১০ম সংখ্যা ।

সূচিপত্র ।

বিষয় ।	লেখকের নাম ।	পৃষ্ঠা ।
১। সংক্রান্তক অর্কদ ...	শ্রীযুক্ত ডাক্তার যোগেন্দ্র নাথ মিত্র, এম, আর, সি, পি (লণ্ডন) ৩৯১	৩৯১
২। মাসাজ ...	শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর, এল, আর, সি, পি, (এডিনবরা) ৩৯৩	৩৯৩
৩। পথ্যবিধান ...	শ্রীযুক্ত ডাক্তার কৃষ্ণবিহারী দাস ।	৩৯৭
৪। জলকোশ চিকিৎসা ...	শ্রীযুক্ত ডাক্তার গিরীশচন্দ্র বাগচী ।	৪০১
৫। শৈত্য ও ফসফস-প্রবাহ ...	শ্রীযুক্ত আব্দুল অজেদ খাঁ চৌধুরী ।	৪০৯
৬। চিকিৎসা-বিবরণ— ছইটি বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট সতিচ্ছদ	শ্রীযুক্ত ডাক্তার গিরীশচন্দ্র বাগচী ।	৪১৩
ওভেরিয়ান সিষ্ট ...	শ্রীযুক্ত ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম, আর, সি, পি, (লণ্ডন) ৪১৮	৪১৮
৭। ইংরাজী সাময়িক পত্র হইতে গৃহীত ...	...	৪২২
৮। বাবস্থাপত্র ...	শ্রীযুক্ত ডাক্তার গিরীশচন্দ্র বাগচী ।	৪২৪
৯। প্রিসক্রিপশন ...	...	৪২৬
১০। নব ঔষধাবলী ...	...	৪২৭
১১। সংবাদ ...	...	৪২৯

মিলন যন্ত্রে

শ্রীমুনীন্দ্রমোহন বসু দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

৪নং নীতীরাম ঘোষের ষ্ট্রিট—কলিকাতা ।

১৮৯২

ভিষক্-দৰ্পণের নিয়মাবলী ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬ টাকা । ছয় মাসের জন্য ৩ টাকা । তিন মাসের জন্য ২ টাকা । প্রতি খণ্ড ৫০ আনা ।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম ।

প্রতি বার প্রতি লাইন ৭০ আনা হিসাবে । অধিক দিনের হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে । এক টাকার কম মূল্যের কোন বিজ্ঞাপন লওয়া যাইবে না ।

শ্রীজহিরুদ্দিন আহমদ,
সম্পাদক ।

ভিষক্-দৰ্পণ কার্যালয়,
৪৮ নং ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড, কলিকাতা ।

বিজ্ঞাপন ।

ঘড়ি

ঘড়ি !!

ঘড়ি !!

আর লায়েল এণ্ড কোম্পানি ।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ; ১৩২নং রাধা বাসার, কলিকাতা ।

সহকারী সম্পাদক ও লেখক মহোদয়গণ
সকলেই আমাদের বিশেষরূপে জানেন ও
অনেকেরই আমাদের সহিত কারবার আছে ।

নিকেল সিলভার ওপেন ফেস কিলেস
রেগুলেটার ঘড়ি ৮, ঐ লিভার ১৩, হান্টিং
ও হাফ হান্টিং ১৩, কিলেস নিকেল সিল-
ভার পাকা ঘড়ি ছোট ও বড় সাইজ ৬০ ।
রূপার কেলেণ্ডার ঘড়ি বার ও তারিখ
আপন হইতে দেখাইবে ১৮, ঐ লিভার ২০,
রূপার ডবল টাইমের ঘড়ি অর্থাৎ কলি-
কাতার ও মাস্তাজ সময় এবং তারিখ আপনা
হইতে দেখাইবে ১৮, রূপার হান্টিং ইন-
জিনটারগ বা এনগ্রেভ কেস হরিজেণ্টল,
ইস্কেপমেন্ট ছোট ও বড় সাইজ ১১, ঐ
কুরভাইজার কোম্পানির ১৩, ঐ ঐ লিভার
১২, কুরভাইজার ফেসাস সিলভার ১৫, ঐ
লিভার ১৭, এই সকল ঘড়ির গিল্টি হাপ
হান্টিং ও ওপেনফেস লইলে ২ টাকা অতি-
রিক্ত লাগিবে । রূপার লেডিস্ হান্টিং বা

হাপ হান্টিং ঘড়ি উত্তমরূপে এনগ্রেভ করা বা
ইনজিনটার্গ ফেল হরিজেণ্টল স্কেপমেন্ট ১৬,
ঐ লিভার ১৮, লগুন মেড রূপার পেটেন্ট
লিভার হান্টিং ঘড়ি ২২, বি টাইমপিস ৩,
গোল টাইমপিস ২১০ হইতে ৩১০, ঐ এলা-
রম, ৩১০ হইতে ৪১০, ঐ রিপিটার ক্লক ৫১০,
ফেরেজ ক্লক ৮, ব্রেকেট বা ওয়াল ক্লক ৯,
হইতে ১৩, কেনেডিয়ান গোল্ড চেইন
নিকল পেঃ ৫, তারা, পাতা, নাকো পেটার্ণ
৬, রূপার বোতাম ২১০ । জিনিয় সকল
ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠান হয় ।

প্রত্যেক ঘড়ির সহিত ১ ছড়া নিকেল
সিলভার চেইন ১ থানি গ্লাস ও স্ক্রিং এবং
৩ বৎসরের গেরান্টি দিয়া থাকি ।

আমাদিগের নিকট ঘড়ি মেরামত কার্য
সুদক্ষ কারিগর দ্বারা হইয়া থাকে ।

ঘড়ি সকল ডাকে পাঠাইলে মেরামত
করিয়া পুনরায় ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠান হয় ।

ভিষক-দর্পণ।

চিকিৎসা-তত্ত্ব-বিষয়ক মাসিক পত্র।

“ব্যাধিতসৌখ্যং পথ্যং নীকজস্য কিমৌষধিঃ।”

১ম খণ্ড।]

এপ্রেল, ১৮৯২।

[১০ম সংখ্যা]

সংক্রামক অর্বুদ।

কুষ্ঠরোগ।

(Leprosy.)

লেখক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার বোণেন্দ্রনাথ মিত্র, এম. আর. সি. পি (লণ্ডন)।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে বিশেষতঃ পূর্ব এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ও বিষুব রেখার নিকট প্রদেশে ও দক্ষিণাংশে ইহা স্থানিক ও স্থিতিশীল রোগ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ৪র্থ খৃঃ অঃ হইতে ১৪শ খৃঃ অঃ পর্যন্ত ইউরোপে ইহা বহুল পরিমাণে বিস্তৃত ছিল, ক্রুসেডের যুদ্ধ সময় ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্মানী এবং ভূমধ্যসাগরের নিকটস্থ দেশ সকলে ইহার প্রাকৃতিক অত্যন্ত অধিক ছিল, ১৫শ খৃঃ অঃ প্রারম্ভ হইতে ইহার প্রাকৃতিক ক্রমশঃ হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়, বর্তমান শতাব্দীর শেষাংশে ইহা ইউরোপে অতি সামান্যই দেখা যায়, কিন্তু ইহার

পরিবর্তে উপদংশ রোগের প্রাকৃতিক অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, ইউরোপের কোনও কোনও স্থানে বিশেষতঃ নরওয়ে, সুইডেন এবং আইসল্যান্ড দেশে এই রোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ইহা দুই প্রকার (১) যাহা প্রদানতঃ চন্দ্রকে আক্রমণ করে, ট্যুবারকিউলার (Tubercular); (২) যাহা মায়কে আক্রমণ করে, এনেস্তেটিক (Anæsthetic)।

(১) টিউবারকিউলার:—এই প্রকার কুষ্ঠ রোগে ত্বকের স্থানে স্থানে প্রথমে রক্তাধিক্য হইয়া স্থূল হয়, পরে বড় বড় আঁচিলের আকার ধারণ করে। ইহার মূম, হস্ত ও পদে একটা বিধা বহু সংখ্যক একত্রে

উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভিন্ন সময়ে কতকগুলি একেবারে জন্মে, প্রথমে ইহারা দৃঢ়, লাল বা কটা বর্ণের হইয়া থাকে, পরে কোমল ও বিবর্ণ হয়। কিন্তু অনেক দিন অবধি কোনও আঘাত না লাগিলে ইহাতে কোন ক্ষত উৎপন্ন হয় না। ক্ষত উৎপন্ন হইলে তত্ত্বর ধ্বংস অধিক পৰিমাণে হয়; সুতরাং বিকৃতি আনয়ন করে, কখন কখনও ক্ষত আরোগ্য হইতে পারে। শরীরের অন্যান্য শে বিশেষতঃ উর্দ্ধাধঃ শাখার (Extensor) দিকে এবং চক্ষু, নাসিকা, মুখ-গহ্বর এবং লেরিং সের অন্তরস্থ স্নায়িক ঝিলিতে দৃষ্ট হয়।

(২) এনেস্থিটিক্ কুষ্ঠ বোগ :— ইহাতে শ্মাযু উপবে লম্বাকার মূলার ন্যায় ক্ষীণতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। অশ্রুনা এবং বাহ্য পল্লিটিয়াস শ্মাযুর উপর সতত দেখা যায়, চর্মের যে অংশ ইহাদেব দ্বাৰা পোষিত হইয়া থাকে, সেই স্থান প্রথমে বেদনা যুক্ত, অমৃতত্ব শক্তিব প্রাপ্ত (hyperaesthesia) হইয়া থাকে, পবে অমৃতত্ব শক্তিহীন হইয়া পড়ে এবং ঐ স্থান মলিন ও ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কখনও কখনও ঐ সকল স্থলে ফোঁসা উৎপন্ন হয়, উহা শুকাইয়া যাইতে পারে অথবা ক্ষতে পরিণত হইতে পারে, এই উভয় প্রকার কুষ্ঠ রোগ পৃথক ভাবে উৎপন্ন হইতে পারে; আবার অনেক সময় উহাদিগকে একস্থলে দেখা যায়। এনেস্থিটিক্ অথবা দ্বিতীয় প্রকার কুষ্ঠবোগ প্রায়ই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে উৎপন্ন হয়। শরীরের উপরিস্থ ও অভ্যন্তরস্থ গ্রন্থি সকল ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে কখন কখনও অভ্যন্তরিক যন্ত্র যথা—যকৃত,

গ্রীহা ও অণ্ডকোষ ইহার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। শরীর ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হই অথবা অন্য কোন রোগ উপস্থিত হইয়া মৃত্যু হইতে পারে। টিউবারকিউলার প্রথম প্রকারের কুষ্ঠ রোগ দ্বাৰা আক্রান্ত হইলে রোগীবা প্রায় ৮ হইতে ১০ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিতে পারে। আর এনেস্থিটিক বা দ্বিতীয় প্রকার কুষ্ঠ বোগাক্রান্ত হইলে ইহার দ্বিগুণ সময় পর্যন্ত বাঁচিতে পারে।

নিদানতত্ত্ব :— দেখিতে ধূসর কিম্বা দ্রব হবিদ্রাবর্ণ এবং দ্রব স্বচ্ছ। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বাৰা দেখিলে একপ্রকার মাংসাস্থি তন্তু (Granular tissue) দেখা যায়। উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার লিউকোসাইটের (Leucocytes) ন্যায় কোষ থাকে, কতকগুলি বৃহদাকার, ইহা বা মাকু আকার বা শাখা যুক্ত ইহাদিগকে লেপ্ৰোসেলস্ বলে। ইহারা সিফিলিস্ ও টিউবারকুলের কোষ অপেক্ষা দৃঢ়। ইহাতে অল্প সংখ্যক শোণিত প্রণালী দৃষ্ট হয়। ঐ শোণিত প্রণালীর চতুর্দিকে ঐ সকল কোষ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শোণিত প্রণালীর এণ্ডোথিলিয়াম বৃদ্ধি পায়।

কারণ তত্ত্ব—এক প্রকার সংক্রামক বোগ বলিয়া স্থিৰ হইয়াছে। এবং ইহার মধ্যে এক প্রকার ব্যাসিলাই কুষ্ঠ রোগের বিশেষত্ব বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। নূতন রোগে ইহা সর্বদা পাওয়া যায়, পুরাতন রোগে ইহা প্রায়শঃই পাওয়া যায় না। ব্যাসিলাই শরীরের রসে ইতস্ততঃ নড়িতে দেখা যায়। যদিও ইহারা টিউবারকিউলার ব্যাসিলসের অনুরূপ হইতে দেখা যায় ইহারা এক নহে।

লেপ্রাসির ব্যাপিলির বিস্তার—শোণিত প্রণালীর দ্বারা ইহার বিস্তার হইয়া থাকে। ইহা নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীর শরীরে প্রবিষ্ট করার তাহাদের স্থানিক রোগ উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু বৈহিক রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় নাই। ইহা, পোষ্টমার্টমের সময় বস্তুর একটা ছাত্রে সংক্রামিত হইয়াছিল (১৮৮৬ বৎঃ)। ১৮৮৮ সালে একটা ফাঁসিন চক্রম প্রাপ্ত করেদীকে বলা হয় যে, যদি সে তাহাব শবীবে কুষ্ঠ বোগের বিষ সংক্রামন কবিত্তে দেয় তাহা হইলে তাহাব জীবন দান কবা হইবে। সেই করেদী তাহা স্বীকাব কবিলে তাহার শরীরে ইনোকুলেশন দ্বাবা

কুষ্ঠবোগ উৎপন্ন করা হইয়াছিল। এই সকল পরীক্ষা দ্বাবা আমরা বলিতে পারি যে, কুষ্ঠরোগ এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রামিত হইতে পারে। কুষ্ঠরোগ সকল দেশেই উৎপন্ন হইতে পারে, খাদ্যের অন্নতা, ও লবণাক্ত মাংস বা মৎস্যাহারই ইহার কাণ বনিয়া বোধ হয় না এবং বংশ পবম্পবাগত বনিয়াও বোধ হয় না। যে সকল বালকদিগের পিতামাতা কুষ্ঠরোগা-ক্রান্ত, তাহাদের কখনও কখনও এই রোগগ্রস্ত স্থানে থাকা বশতঃ ঐ রোগাক্রান্ত হইতে পারে, বংশ পবম্পবাগত কাণ না থাকিতে পারে। (ক্রমশঃ)

ম্যাসাজ

বা

অঙ্গ মর্দন ও অঙ্গ চালন।

লেখক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাধাগোবিন্দ বসু, এল, আব, সি, পি, (হুডিন্‌বরা)।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পব)

সারেটিকা রোগে, বিশেষতঃ রোগ পুরাতন হইলে এবং সার্ভাইকেল ত্রেকিরেগজিয়া, টাইভিমিনাল দ্রাবু-শূল, ইন্টারকটাল দ্রাবু শিরঃ-শূল প্রভৃতিতে ম্যাসাজ আশ্চর্য্য উপকার করে। বিবেচনা পূর্বক ও অধ্যবসার সহকারে নিরমিত কাল অঙ্গমর্দন ও অঙ্গচালনা ব্যবহা করিলে, এ চিকিৎসা নিষ্ফল হয় না। সারেটিকা রোগ সচরাচর হইতে সপ্তাহকাল চিকিৎসার আয়োজ্য হয়; কিন্তু রোগ অত্যন্ত পুরাতন হইলে অনেক দিনের আট সপ্তাহ চিকিৎসার প্রয়োজন

হয়। যত অধিক সংখ্যক পেশী শূলগ্রস্ত হয়, ব্যায়ামের প্রণালীও তদনুযায়ী বিবিধ প্রকারের হয়, অর্থাৎ শূলের ব্যাপ্তি দৃষ্টে ম্যাসাজের প্রণালী বাবস্থেয়। ম্যাসাজের প্রণালী নিরুপণ চিকিৎসকের বিবেচনা, জ্ঞান ও বহুদর্শিতার উপর নির্ভর করে। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, অধিকাংশ স্থলে এ চিকিৎসার আরম্ভে রোগী বস্ত্রপার বন্ধি পাইয়া থাকে; ইহাতে চিকিৎসার নিরত হওয়া বড়ই ভুল, কারণ দুই এক দিন মধ্যেই রোগের উপশম হইতে আরম্ভ হয়। সচরাচর

দেখা যায় যে, বিবিধ প্রকার শিরঃশূল মস্তক চাপ সহযোগে ঘর্ষণ দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। শিরঃশূলরোগে ও টিক্‌ডলক রোগে মস্তক মর্দন দ্বারা অনেক সময়ে চমৎকার ফল লাভ হয়। এতদ্বিন্নিবিবিধ প্রকার পক্ষাঘাত রোগে, যথা—শৈশবীয় পক্ষাঘাত, অর্দ্ধাঙ্গপক্ষাঘাত, প্রোগ্রেসিভ্‌ মাস্কুলাব এট্রফি (ক্রমশঃ শৈশবী শীর্ণতা সংযুক্ত পক্ষাঘাত) রোগে ম্যাসাজ মহোপকারক। পূর্কোক্ত রোগ সকলে প্রত্যেক স্থলে কোন প্রণালীতে ম্যাসাজ প্রযোজ্য তাহা বর্ণন করিলে এ প্রহের কণেবর অযথা বৃদ্ধি করা হয়; পরন্তু তন্ন তন্ন সমুদয় প্রণালী বর্ণনও অনাবশ্যক, কারণ চিকিৎসকের শব্দ ব্যবচ্ছেদ জ্ঞান ও চিকিৎসার উদ্দেশ্য জ্ঞান থাকিলে ম্যাসাজের প্রণালী নিরূপিত করণ নিতান্ত সহজ। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটি প্রণালী বর্ণিত হইল।

সারেটিকাগ্রস্ত রোগীর সচরাচর জুরাগ হ্রাস-শূল তদসহবর্তী থাকে। দেখা যাউক ম্যাসাজ দ্বারা এস্থলে কিরূপে চিকিৎসা করা যায়। দক্ষিণ অঙ্গ রোগগ্রস্ত। রোগীকে বৎসরান্ত বৎসর ধরিয়া ভেবিটাম, একো-নাইট, বেলাডোনা মলন, আর্সেনিক, কুইনাইন, পিচকারি দ্বারা মর্ফিয়া, ফোকা-কারক ঔষধ, ডাউং, আইরোডাইড অব পোটাসিয়াম প্রভৃতি প্রয়োগ ব্যর্থ হইয়াছে। রোগী বহু অবলম্বনে অসহনীয় ব্যগ্রতা সহ্য করিয়া কোন মতে দেহস্তর টানিয়া লইয়া যায়। প্রতি পাদবিক্ষেপে অপরিণীম যন্ত্রণা। বাহ্যঘর্ষের সাহায্য ব্যতীত রোগী উঠিতে বা বসিতে অক্ষম এবং শয্যা হইতে উঠিতে বা

লোপানারোহণে অন্যের সাহায্য প্রয়োজ্য নিত্যব্রতেনে বেছান্নে সারেটিক হ্রাস নিগ হয়, সেইস্থানের স্পর্শ-বোধ অত্যন্ত অধিক এবং উরুর অভ্যন্তর ও বাহ্যিকস্থানে স্থানে বেদনা বর্তমান। রোগগ্রস্ত অঙ্গের অবস্থানের বিশেষ অবস্থা দৃষ্ট হয়; উরু অভ্যন্তরগতিস্থে ঘূর্ণিত ও উরুগতিক আকৃষ্ট, জামু-সন্ধি দীর্ঘ বক্র, পদতল সম্পূর্ণরূপে ভূমিস্পৃষ্ট নহে, পদের অঙ্গুলিমাাত্র ভূমিস্পর্শ করিয়া থাকে। রোগী কোন দিকেই উরু স্থাপন করিতে পারে না। একপ স্থলে ডাং শ্রীবার্ অনেকাংশে নিম্ন লিখিত প্রণালীতে চিবিৎসা করিয়া থাকেন।

১ম দিবস। রোগীর উরু উত্তোলন করিবার বা উরু-সন্ধি খুটাইবার ব্যবস্থা দেন। উরু উঠাইবার শৈশবী শক্তি থাকিলেও বহুকাল উরু নিশ্চল থাকিতে উত্তোলনকারী হায়মুলের ক্রিয়ার ক্ষীণতা বা লোপ হয়। এ কারণ রোগী চেঁচা করিয়াও পা উঠাইতে পারে না। রোগীকে দাঁড় করাইয়া সমুখে আট ইঞ্চ উচ্চ একটি কাষ্ঠফলক রাখিবে; রোগীকে তৎপরি পা উঠাইতে আদেশ করিবে। রোগী প্রাচীর ধরিয়া বা চিকিৎসককে ধরিয়াও স্বভাবতঃ পা তুলিতে পারিবে না। একপ হইলে, রোগীকে দিগাল ধরিয়া এই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত যন্ত্র বিণেবের দণ্ড ধরিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইতে বলিয়া চিকিৎসক, তাহার পা ধরিয়া ভূমি পদতল ফলকের উপর স্থাপন করিয়া দিবে। এক হইতে তিন মিনিট কাল এই অবস্থায় পা রাখিয়া পুন

ভূমিতে নামাইতে আদেশ করিবেন; রোগী অপারক হইলে পা ধরিয়া নামাইয়া দিতে হইবে। এইরূপে পা উঠান নামান দশবার করিতে হইবে। পদ কত উচ্চে উঠাইতে হইবে তাহা চিকিৎসকের বিবেচনার উপর নির্ভর। ইহা নিশ্চয় যে, অধিক উচ্চে উঠাইলে বোগীর অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প সময়ের মধ্যে বোগের প্রতিকার হয়। এই প্রথম ব্যায়ামের পর রোগীকে শুইয়া দুই হস্তে পা ধরিয়া উরু নোরাইয়া আঙ্গুল বন্ধ স্পর্শ করাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রথম প্রথম অত্যধিক বল প্রয়োগ অবিধি, কারণ তাহাতে রোগীর অসহ্য যন্ত্রণা হয় ও রোগী চিকিৎসকের অধীনস্থ ভাগ করে। এই অঙ্গ প্যাডিব অঙ্গচালনার নিয়ম শাখার পেশী সকল শিথিল থাকে, কিন্তু সায়োটিক স্নায়ু লক্ষীকৃত হয়, ও এতদ্বারা শুলের উপশম হয়।

অনন্তর উরু ও নিতম্ব প্রদেশের সমুদয় পেশীর উপর দশ মিনিট কাল তর্জনী, মধ্যাঙ্গুলি ও তৎপরঙ্গুলি এই তিন অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা নীড়িং ব্যবহারে পূর্বোক্ত বিবিধ প্রকার ম্যাসাজ মধ্যবর্তী বিরাম সময়ে রোগীকে একপা ভাবে শুয়াইবে যে, তাহার পদস্থূল স্থিতি থাকে; ইহাতে এতাবৎ নিতম্ব পেশী সকলে বৃহৎ টান পাইবে, এবং স্নায়ু সকল কতক পরিমাণে লক্ষীকৃত হইয়া উত্তেজিত হইবে। এই প্রথম পেশীর চিকিৎসার শেষ। সচরাচর ইহা যন্ত্রণার সাক্ষ্যের বৃদ্ধি পাইয়াও পেশীর অসহ্য হয় কিন্তু কয়েক দিন

চিকিৎসার পরই যন্ত্রণা ও লক্ষণাদির উপশম হইতে আরম্ভ হয়। এই সকল বিবরণ রোগীকে জ্ঞাত করা আবশ্যিক।

২য় দিবস। আজ রোগীকে প্রথম দিবসের ন্যায় সমুদয় প্রকরণ ব্যবস্থা করিবে; তন্ত্রের উরু অভ্যন্তর দিকে ও বহির্দিকে সঞ্চালন করিতে আদেশ করিবে। যদি বোগীর উদাম বার্ষ হয় তাহা হইলে চিকিৎসকের সাহায্যে এই প্রক্রিয়া সম্পাদিত হইবে। শায়িত অবস্থা অপেক্ষা দণ্ডায়মান অবস্থায় ইহা সহজে সাধিত হয়, ও ইহা নিয়মিত দশবার মাত্র ব্যবস্থা করিবে। অতঃপর রোগীকে শায়িত করিয়া উরু ও অঙ্গ উরু সঞ্চালন, আন্তরিক ও বাহ্য দিকে উরু সঞ্চালন বিধান করিবে। পরে, পূর্ব দিবসের ন্যায় কিন্তু অপেক্ষাকৃত সবেল নীড়িং প্রয়োগ করিবে। তদনন্তর আজি গভীরস্থিত পেশী সকল পর্যন্ত পিকিং ব্যবহের।

৩য় দিবস। দ্বিতীয় দিবসের ন্যায় চিকিৎসা; অধিকন্তু অঙ্গুলি দ্বারা নীড়িং।

৪র্থ। আজি চিকিৎসার প্রকরণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উরু কাঠ ফলকের উপর স্নহ পদ স্থাপন করিয়া উল্লঙ্ঘন। ইহাতে স্নহ পদে ভর দিয়া দেহভার উত্তোলন করা যায় তখন স্নহ অঙ্গই শরীরের সমুদয় ভার বহন করে; আবার যখন স্নহ পদ উত্তোলন হয় তখন কক্ষ অঙ্গের পেশী সকলকে দেহভার রক্ষা করিতে হয়। এই ব্যায়ামে সচরাচর রোগীর কোন অবলম্বন আবশ্যিক হয়। এতদ্বিত্ত, স্থল পেশী সকলে পূর্ব বর্ণিত প্রকারে অভিন্যত প্রক্রিয়া ব্যবহের।

৫ম দিবসে চিকিৎসা! প্রয়োজন মত দুই তিন দিবস অন্তর কাষ্ঠকলক উচ্চ করিবে। অল্প অসচাণনিয় ক্রমশঃ অধিক তর বাণ প্রয়োগ করিবে। নতুন ব্যাণামের মধ্যে রোগীকে গদি সংযুক্ত ঠুল বা তাকি-য়ায় একবার দক্ষিণ একবার বাম জামু পাতিয়া প্রতিবাহ অক্রমিত হইতে এক মিনিট কবিয়া বসিতে হইবে।

৬ষ্ঠ দিবসের চিকিৎসা। জামু পাতিয়া উপবেশন। বোগীকে শুবাইয়া বিস্ত্র করের দ্বারা রুগ্ন অঙ্গের পেশী সকল যথোচিত বল সহকায়ে আঘাত, যেন অস্থি উপর আঘাত না লাগে বাবণ তাহাতে অতিশয় যত্নগা হয়।

৭ম দিবস। আভ্যন্তরিক ও বাহ্য আবর্তক (রোটের্ণ) পেশী সকলের অল্প ও উগ্র ব্যায়াম ব্যবহৃত।

বাহ্য দিকে পদ আবর্তন করিতে হইলে রোগীকে উভয় গোড়ালি সংলগ্ন সমান দণ্ডায়মান করাইয়া উভয় পায়েব অঙ্গুলি দিক বাহ্যদিকে ঘুরাইতে আদেশ করিবে। প্রথমে রোগী এতৎ সাধনে অক্ষম হইবে কিন্তু ক্রমশঃ পদ এত ঘুরাইতে পারিবে যে, ক্রমে উভয় পদের অঙ্গুলি দিক পরস্পরের ব্যবধান বৃদ্ধি পাইবে এবং গোড়ালি সংলগ্ন উভয় চরণের অভ্যন্তরিক সমবেশ্য হইবে। অভ্যন্তরদিকে আবর্তন করিতে হইলে ঠিক বিপরীত প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়, অর্থাৎ গোড়ালি পরস্পর দূরে থাকিবে। একবার গোড়ালির দিক একবার অঙ্গুলির দিক পর্য্যায়ক্রমে পরস্পরে পৃথক করিলে আবর্তক পেশী সকলের এবং বাহ্য ও

অভ্যন্তর দিকে নিম্নশাখা আকর্ষণকারী পেশী সকলের ব্যায়াম সাধিত হয়।

পরে অল্প ব্যায়াম করিবে। বোগীকে চেয়াবে বসাইয়া স্তম্ভ পদ কুলাইয়া দিবে, ও রুগ্ন পদের জামু শুটাইয়া স্তম্ভ পদের জামুর উপর “পা মুড়িয়া” রাখিবে; চিকিৎসক সেই রুগ্ন পদের জামুর উপর ক্রমশঃ ক্রমশঃ চাপ প্রয়োগ করিবেন, ইহাতে অতি সুন্দর বাহ্য আবর্তন হয়।

আজি হইতে অঙ্গমর্দন সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত প্রণালী অবলম্বন করিবে; প্রথম, প্রেসিং ও নীডিং। দ্বিতীয়, পিন্‌চিং ও হ্যাকিং। এই সকল প্রক্রিয়ায় দিন দিন অধিকতর বল প্রয়োগ করিবে। সচরাচর প্রথম সম্বন্ধে শেষভাগ হইতে রোগীর যত্নগা লাগব হইতে আরম্ভ হয় ও বোগী কতকগুলি অঙ্গচালনা করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু এ সময়েও কোন উপকার লক্ষিত না হইলেও নিবাস হইবার কোন কারণ নাই।

৮ম দিবস। আশাশ্রুত উপকার দর্শিলে বোগীকে স্তম্ভে চলন, বিবিধ প্রকার উপবেশন, শয়ন প্রভৃতি অঙ্গচালনা চেষ্টা করাইবে। অনেক কাল এই সকল অঙ্গচালনা না করার রোগীকে যেন এ সকল প্রকরণ নতুন শিখিতে হয়, সুতরাং এ সকল স্থলে চিকিৎসকের বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায় প্রয়োজন, রোগী চলিতে রুগ্ন পা ভূমিতে ঘেসড়াইয়া না লুপ্ত এ উদ্দেশ্যে নিয়মিত ব্যবধানে কাষ্টকলক বা ইষ্টক স্থাপন করিবে ও রোগীর হস্ত ধরিয়া চলিয়া লইয়া বাইবে, তাহা হইলে অগত্যা রোগী পা কুলিয়া ফেলিতে হইবে। এতদ্বি

পূৰ্ণদিনের সকল প্রকার অজ্ঞ ও উগ্র
ব্যায়ামের পুনবহুষ্ঠান করিবে ।

৯ম দিবস । ষোণীকে চেয়াবে বসিতে
ও উঠিতে চেষ্টা করাইবে এবং পূৰ্ণ
ব্যায়াম সকলের মাত্রা ও বল বৃদ্ধি করিবে ।

আর প্রতিদিনের ব্যায়ামাদি তালিকা

না দিয়া সংক্ষেপে এই বলিলেই যথেষ্ট যে,
চিকিৎসক বিবেচনাপূৰ্ণক বিবিধ প্রকার
ব্যায়াম ক্রমঃ ব্যবস্থা বিবৃত পাবেন ।
দশ দিন অন্তর এ যোগের চিকিৎসা এক
দিন করিয়া বিশ্রাম আবশ্যক । (ক্রমঃ)

পথা-বিধান ।

লেখক -- দ্বিতীয় ডাক্তার বৃদ্ধবিহারী দাস ।

(পূৰ্ণ-প্রবাসিতের পন)

খাদ্য দ্রব্যের প্রতি বিশেষ রূপ মনো
যোগ স্থাপন করাই আমাদের সৰ্বপ্রধান
কর্তব্য কার্য, যেহেতু এতদ্বারা শরীরের
রক্তরসাদি বর্দ্ধিত বা হ্রাসিত, গাঢ় বা
তরল, কিম্বা দৃঢ় বা কোমল হইতে
পারে, এবং এক মাত্র ইহাবই প্রভাবে উক্ত
রক্ত রসাদি শরীরের যে কোন স্থানে সঞ্চিত
হইতে পারে, অথবা আবদ্ধ রক্তরসাদি মুক্ত
হইয়াও যাইতে পারে । অতএব শরীরের
স্বাস্থ্যস্বাহ্যের প্রতি খাদ্য দ্রব্যের প্রভাব
কদাপি কম বিবেচনা করা যাইতে পারে
না ।

এস্থলে আমরা আমাদের ব্যবহৃত
যাবতীয় খাদ্য দ্রব্যের স্বাদ গুণগুণের বিষয়
আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি না,
সচরাচর সংঘটিত ব্যাধি সমূহের প্রতি,
খাদ্য দ্রব্যের প্রভাব জনিত ফলের বিষয়
বর্ণনাই, আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ।

আমাদের যাবতীয় খাদ্য দ্রব্যগুলি
প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে
পারে; উত্তম ও ক্ষতিব। এই উভয়

শ্রেণীর পদার্থই পথ্যার্থ ব্যবসত হইয়া থাকে,
তন্মধ্যে কতকগুলি কেবল পীড়িতাবস্থা
ব্যতীত ব্যবহার করা হয় না, অপর কতক-
গুলি আমাদের সুস্থ ও অস্থস্থ এতদুভয়
অবস্থাতেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে । বলকরণ ;
স্নিগ্ধ কৰণ, পোষণ, রক্ত রসাদির ভারণা
সংস্থাপন অথবা উদ্ভাদিগকে প্রয়োজনানু-
কূপ গাঢ় কৰণ প্রভৃতি বিবিধ উদ্দেশ্য
সংসাধনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার খাদ্য
দ্রব্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে । বাস্তবিক
উপযুক্ত পথ্যবিধান ব্যতীত, কেবল মাত্র
ঔষধ দ্বারা যে সমগ্র অভিপ্রায় সংশ্লিষ্ট
হইতে পারে না, তাহা নিশ্চিত । ক্রোড়ো-
সিস্ অথবা গ্লীহাবশতঃ যেস্থলে রক্তাক্ততা
সংঘটিত হয়, সেস্থলে দুগ্ধাদি উপযুক্ত পথ্য
বিধান না করিয়া, কেবলমাত্র কোন প্রকার
লৌহ বটিত ঔষধ ব্যবস্থা দ্বারা যে ব্যাধির
কোনই হিতফল অনুভূত হইবে না, তাহা
পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হইতেছে । বিশেষতঃ
দীর্ঘকাল পীড়া ভোগের পর শরীর কীপ
হইয়া পড়িলে, কেবল মাত্র উপযুক্ত পথ্য

ঘারাই, শরীর পুনরায় বলশালী এবং পুষ্টি হইয়া থাকে, আরই কোন ঔষধের প্রয়োজন হয় না।

উল্লিখিত উক্ত প্রণালীর খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে, যে কোন প্রণালীর খাদ্যই পর্যাপ্ত ব্যবস্থিত চটক না কেন, তাহা যাগাতে সহজে পরিপাক হয় অথচ তাহার আবশ্যিকীয় পুষ্টিকারী অংশ প্রাপ্ত হওয়া বাটতে পারে, পথ্যবিধান কালে আগাদিগকে সম্বন্ধে সেই দিকেট লক্ষ্য রাখিতে হয়। এই উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্যই পীড়িতাবস্থায় যে সমস্ত খাদ্য ব্যবহার করা হয়, কখন কখন তাহাদিগের কিছু রূপান্তরেরও প্রয়োজন হয়, এবং এট সকল পদার্থটি পথ্যের জন্য বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সমস্ত খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে কোনটী কোন রোগের পক্ষে বিশেষ ফলোপধারী তাহা যদিও চিকিৎসকগণের অবিন্দিত নাট, ইহা সত্য বটে, তথাপি অন্যান্য অনেক চিকিৎসক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিগণ কর্তৃক এই সকলের অমুচিত ব্যবহার প্রযুক্ত পীড়িত ব্যক্তিগণ যে নিরর্থক যত্ননা ভোগ করিয়া থাকে, তাহা আরই দৃষ্টি গোচর হয়। কতিপয় দিবস হইল একটা ডিসেন্টারি রোগের চিকিৎসার আহত হইয়া এই বিষয়ের এক জাজলামান দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে। জনৈক চিকিৎসক সঙ্কটক ঔষধ দ্বারা এই রোগীর চিকিৎসা করিতেছিলেন। বিসময়, পলত ক্রিটি আরোহম ওশিও এবং ডোভার্স পৌডার ব্যবস্থা করিয়াও বিশেষ কোন ফল প্রাপ্ত হন নাই, তাহাও তাহার অনুখাৎ ক্ষত হওয়া খেল; বিশেষতঃ রোগীর আহারে

বিকৃষ্টা সম্বন্ধে চক্ষু সাঙ এবং বধমত প্রযুক্ত, হইতেছিল। ডিসেন্টারি রোগে পরিচ্ছন্নতার প্রতি সর্বাঙ্গে মনোযোগ স্থাপন করা যে অমাদিগের অবশ্য বর্তব্য কার্য, তাহার কণামাত্রও এই রোগীতে দৃষ্ট হইল না। ফলতঃ এই অপরিচ্ছন্নতারূপ কুপথ্য বশতঃই যে ব্যাধির হিতফল বিকাশ হইতে বিলম্ব ঘটিতেছিল তাহা নিঃসন্দেহ; বিশেষতঃ উল্লিখিত খাদ্য দ্রব্য সকলও এই ব্যাধির অরোগ্য পথের কণ্টক স্বরূপ হইয়াছিল। ডিসেন্টারি রোগে অস্ত্রের যে বিরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটে, তাহার প্রতি কিকিণ্ডাজ অমুখারন করিয়া দেখিলেই ইহা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইবে যে, যে সমস্ত খাদ্য পাক যন্ত্রের মধ্যে যত অধিককাল থাকিয়া জীর্ণ হইবে, সেই সকল খাদ্যই তত অধিক পরিমাণে এই রোগের পক্ষে অহিত ফলপ্রদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

যে গৃহে পীড়িত ব্যক্তির অবস্থান করে, বিবিধ প্রকারে তাহার বায়ুহ দোষ পরিষ্কার করা বাইতে পারে। রোগীকে কোন উচ্চ স্থানে শয়ান রাখিলে অজারিকার বাত্মের আক্রমণ হইতে অনায়াসে পরিভ্রাণ পাওয়া বাইতে পারে, যেহেতু বায়ু অপেক্ষা ইহার গুরুত্ব অধিক প্রযুক্ত, ইহা নিয়ত্যাগেই ন্যস্ত থাকে। ভিনিগার (সির্কা), লেমন জুস (অধিরাস) অথবা অন্য কোন প্রকার তেজস্কর ভেজিটেবল এসিডস্ বিক্ষেপ দ্বারাও বায়ুকে নুতন করা বাইতে পারে। সংক্রামক পীড়ার আক্রমণ কালে বায়ুর সংক্রামকতা নিবারণের জন্য ক্লোরিন, অজার, চূর্ণ, গন্ধকবাণ, গর-

স্যানিট অব পটাশ, টার, (আলকাতরা), ক্রোরোজোট প্রভৃতি ডিস্টিন্ফেকট্যান্টস অর্থাৎ সংক্রামণ পদার্থ দ্বারা বায়ু সমুদায় দোষ বিনষ্ট হইতে পারে। পীড়িত ব্যক্তিদিগের গৃহস্থ বায়ুর সংস্কার নিবন্ধ, এবশ্পকার সতর্কতার প্রতি মনোনিবেশ করা সকলেরই অবশ্য প্রয়োজনীয়।

অবিশুদ্ধ বায়ু ন্যায় অবিশুদ্ধ জলও অনেক পীড়ার উৎপাদক, এবং এতদ্বারা ঐ সমুদায় ব্যাধি উগ্রমূর্তী ধারণ করে। কলেরা বোগে অবিশুদ্ধ জল একটা মহদনিষ্টকর পথ। বিজ্ঞানবিৎ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে ইহা স্বীকার করেন যে, অবিশুদ্ধ জল এই মারাত্মক রোগের একটা প্রধানতম উৎপাদক। কলেরা রোগে অবিশুদ্ধ জল পান করিতে দেওয়া এবং বোগীর জীবন বিনাশক পদার্থ সেবন করান উভয়ই এক। বাস্তবিক কলেবা বোগে এবশ্পকার কুপণ্য সেবন সবে ঔষধ দ্বারা যে, কোনও হিতফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা নিঃসন্দেহ। একমাত্র বিশুদ্ধ জল পান দ্বারাও যে এই রোগের প্রতীকার লক্ষ হইয়াছে, তাহা দৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ সর্ব প্রকার ব্যাধিতেই অবিশুদ্ধ জল মন্দ প্রভাব বিস্তার করিবার অতীব সম্ভব। অতএব পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে সর্বদাই বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করিতে যত্নবান হওয়া সকলেরই অবশ্য কর্তব্য কার্য।

পীড়িতাবস্থায় খাদ্য দ্রব্যের একান্ত প্রয়োজন, ইহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু অরাদি অনেক রোগে এরূপ অবস্থা ঘটে যে, সর্বপ্রকার খাদ্য দ্রব্যেই

বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়। ইহাতে আপাততঃ এরূপ বাধ হইতে পারে যে, ঐ সকল স্থলে বোগীব ক্ষুধা লোপ (ওয়ান্ট অব এপিটাইট) উপস্থিত হইয়াছে; বস্তুতঃ বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলে এই অবস্থাকে প্রকৃত ওয়ান্ট অব এপিটাইট বলা যাইতে পারে না, যেহেতু লস অব এপিটাইট যে সমুদায় কাবণে সংঘটিত হয়, তৎসমস্তই ইহা বহির্ভূত। এ সকল স্থলে ব্যাধিবশতঃ পাক-যন্ত্রের বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়া উহা বার্গ্যেব যে এবশ্পকার ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে তাহা নিশ্চিত; এবং এই হেতুবশতঃ যতদিন পর্যন্ত পীড়ার উপশম বা ব্যাধির উগ্রতার হ্রাস না হয়, ততদিন পর্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেকই হয় না। অতএব এতদ্বারা ইহা অস্বীকৃত হইতে পারে যে, ঐ সমুদায় ব্যাধিতে ক্ষুধার উদ্রেক ব্যতীত খাদ্য দ্রব্য গ্রহণের আবশ্যকতা নাই; কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন। এই সকল স্থলে কোনও কারণ বশতঃ ডিফিসিয়েন্ট এসিডিটি অর্থাৎ পাচক রসের অল্পত্ব হ্রাস কিম্বা ঐ রসের অল্পত্ব বৃদ্ধি, পাকযন্ত্র মধ্যে অত্যধিক শ্লেষা নিঃসরণ, পাকস্থলীর নর্মাল টেম্পারেচারের হ্রাস এবং পাচক বস্তুগুলি সমূহের অসাড়তা প্রভৃতি সম্ভাব্য কাবণ বলিয়া বোধ হয়। পাক-যন্ত্রেব এগধি অসুস্থতা নিবন্ধন, শরীরের ক্রমিক ক্ষীণতা বর্দ্ধন সবে এবং এমন কি, কখন কখন দৌরল্যাবশতঃ সুস্থকাল পর্যন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে, তথাপি ঐ ক্ষীণতার সংবেদন জন্মে না। এমতাবস্থাতেও সময়ে সময়ে খাদ্য দ্রব্যের অজ্ঞা

বশ্যক হইয়া উঠে, সুতরাং অতি সহজ পাচ্য অথচ শরীর পোষণোপযোগী হয়, এইরূপ জব্যই গ্রাহ্য ।

অন্ন রোগের একিউট অবস্থায় উপ-বাসের মঙ্গলময় প্রভাব পুনঃপুন প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে এবং ব্যাধির হ্রাস হইলে ক্ষুধারও বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া বোধ হয়, ঐ ব্যাধির তরুণাবস্থায় অনশন সমধিক প্রশস্ত এবং ক্ষুধার বর্দ্ধন হইলে, ব্যাধির অনেক পরিমাণে হ্রাস হইতে দেখিয়া ইহাও অসু-মিত হয় যে, ঐ ব্যাধির তরুণাবস্থায় উপবাস প্রাকৃতিক রোগোপশমক শক্তির ইঙ্গিত মাত্র । অসুস্থ পশু পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, তাহারা যতদিন পর্য্যন্ত পীড়া ভোগ করে, ততদিন পর্য্যন্ত অনশন অবলম্বন করিয়া থাকে, পীড়ার উপশম হইলে অন্ন ভক্ষণ করিতে আরম্ভ কবে । এক্ষণ স্থলে প্রকৃতিই চিকিৎসকের ন্যায় উপদেষ্টা হইয়া, তাহাদিগকে যে এই উপদেশ প্রদান করে তাহা নিশ্চিত । মঙ্গল বিধায়িত্রী প্রকৃতি হইতে আমরাও এই জ্ঞান লাভ করিতে পারি, কিন্তু আমরা আমাদের জ্ঞানকে অজ্ঞান বোধ করিয়া প্রকৃতিস্বক এই জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া থাকি এবং উহার প্রতিফল কার্য্য কবিত্তে আবদ্ধ করি, প্রকৃত্য এই প্রতিফল কার্য্যের ফল যে অপরিমার্জনীয়, তাহা নিশ্চিত ।

পীড়িতাবস্থায় অনশন প্রশস্ত হইলেও শিশু, বৃদ্ধ, দুর্বল, গর্ভিনী প্রভৃতি বোগী-দিগের প্রতি এই ব্যবস্থা সুযুক্তিসম্পন্ন নহে । দীর্ঘকাল অনশন শিশুদিগের পক্ষে

অতীব মন্দ ফলপ্রসূ । অনশন কেবল মাত্র তাহাদিগের শরীরস্থ রসাদিকেই যে নষ্ট করে তাহা নহে, উহাদিগের বর্দ্ধনের পক্ষেও বিস্তর ব্যাঘাত জন্মায় । অনশন দ্বারা বৃদ্ধ দিগের পাকস্থলী শূন্য রাখিলে, মুচ্ছা, শিরঃপীড়া, অট্টেচন্য প্রভৃতি উপসর্গ সকল সমানীত হইতে পারে । যে যে স্থলে পীড়িত ব্যক্তিদিগের প্রতি অনশন আদিষ্ট হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত এই সকল বর্দ্ধন অবশ্য দ্রষ্টব্য, নচেৎ তত্ত্ব সকলের ধ্বংস হইয়া অতিশয় অনিষ্ট সংঘটন করিতে পারে ।

রোগীর প্রতি খাদ্য দ্রব্যের বিধরক কোন এক নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য কবা বাস্তবিকই চঃসাধ্য । রোগীর অবস্থায় প্রতি সম্যকরূপ দৃষ্টি রাখিয়া খাদ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা করাট পরামর্শযুক্ত । যেহেতু ব্যাধির কোন কোন অবস্থায় খাদ্য দ্রব্যের বিধান না করায়, বহল পরিমাণে উপকার হইয়া থাকে, আবার কখন কখন এক্ষণ অবস্থা উপস্থিত হয় যে, উহার ব্যবহারে বিস্তর অপকার সংঘটিত হয় । তজ্জা, মোহ, চিন্তাচঞ্চল্য, দর্শন ও শ্রবণ শক্তির হ্রাস প্রভৃতি উপসর্গ সকল কেবল মাত্র অনশন দ্বারাই সংঘটিত হইয়া, পীড়িত ব্যক্তিগণ অশেষ যত্নগা উপভোগ করিতে পারে । অত-এব এতদ্বারা সুন্দররূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অল্পপুঙ্ক্ত সময়ে রোগীকে খাদ্যদ্রব্য বিধান কবা যেমন বিপদজনক, দীর্ঘকাল অনশন অবস্থায় রাখাও তদপেক্ষা অধিক ব্যভীত ন্যূন বলিয়া বোধ হয় না ।

পীড়িত ব্যক্তিদিগকে খাদ্য দ্রব্যের

প্রধানকালে, তাহাদিগের জিহ্বা প্রদত্ত সঙ্কেতগুলির প্রতি বিশেষরূপ মনোযোগ স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। যেহেতু পরিষ্কৃত জিহ্বা বিশুদ্ধ পাচক ক্রিয়ার একটা প্রধানতম নির্ণায়ক সঙ্কেত।। যেহেতু জ্বর বা স্থানিক পীড়ার অভাব সত্ত্বেও জিহ্বা লেপযুক্ত দৃষ্ট হয়, তথাপি অন্নবহা নাগী (এনিমেণ্টরী ক্যানাল) বা তৎসংক্রীয়

কোন যন্ত্রের কার্যের অবশ্যই ব্যতিক্রম ঘটরাছে, আমাদেরকে এক্ষণে বিজ্ঞাপিত কবে। এমতাবস্থায়, জ্বর নাই বলিয়া রোগীকে আহার প্রদান করা অপরিণাম দর্শিতার ফল মাত্র। জিহ্বা প্রদত্ত অন্যান্য লক্ষণগুলি দ্বারাও পাকস্থলী ও তাহার কার্যের সুন্দর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(ক্রমঃ)

জলকোশ-চিকিৎসা।

লেখক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার গিরীশ চন্দ্র বাগচী।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর্ব]

তাড়িত-শ্রোত প্রয়োগের পরিণাম

কোশ মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ তাড়িত শ্রোত প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইলে একবার মাত্র প্রয়োগ করিলেই আরোগ্য করিতে সক্ষম হওয়া যায়। জ্বালা, যন্ত্রণা অতি সামান্যই অনুভব হয়। তৎপরে—অণুকোশের প্রবাহ এবং জ্বর—আইওডিন প্রয়োগ করিলে ইহাই প্রধান কষ্টজনক; তজ্জন্য অত্র চিকিৎসকগণ বহুদূর হইতে প্রবাহ এবং জ্বর না হয় এমন কোন উপায় উদ্ভাবন জন্য সচেষ্ট আছেন। তাড়িত শ্রোত প্রয়োগে এই আশঙ্কা অনেক পরমাণে তিরোহিত হইয়াছে কিন্তু অত্যধিক মাত্রার প্রয়োগ করিলে উক্ত আশঙ্কা হস্ত হইতে পরিভ্রাণের উপায় নাই। অস্ত্রোপচারের পর দিবস স্টি-বিদ্ধ স্থান সামান্য ক্ষীণ হয়, কিন্তু ২৩ দিবস মধ্যে তাহা স্বেচ্ছাই পর্যাবসিত হইতে দেখা

যায়। এতদ্বারা বিবাহিত কোশ এবং অণুকোশ যত অল্প সময় মধ্যে স্বাভাবিক আৱতনে পরিণত হইয়া থাকে তাদৃশ অপর কোন প্রকার চিকিৎসা প্রণালীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। টিউনিকা ভেজাইনেলিস যিহ্নি অতি শিঘ্রই স্বাভাবিক অবস্থার উপনীত হইতে দেখা যায়। কেবল দোষের মধ্যে এই যে, অনেক সময়েই একবার মাত্র তাড়িত শ্রোত প্রয়োগ করিয়া কৃতকার্য হওয়া যায় না। ২৩ বা তদধিক বার প্রয়োগ করা আবশ্যক হইতে পারে। অপিচ ব্যাধির পুনরাক্রমণের আশঙ্কাও সম্পূর্ণ রূপে তিরোহিত হয় না।

তাড়িত শক্তি চিকিৎসকের কতৃদ্বাণীনে বহুদিবস বাবত আসিলেও সন্মদিন মাত্র সর্বপ্রকার চিকিৎসার ব্যবহৃত হইতেছে; সুতরাং আরও কতক দিন অতীত না

হইলে ইহার ফলাফল সম্যকরূপে অবগত হওয়া অসম্ভব। তজ্জন্য এতদধিক প্রকাশ করা নিশ্চয়োজন।

সূচি-বিস্কন।

বর্তমান উনবিংশ শৃষ্টাব্দেব প্রাবল্যে ইহাও একটা আরোগ্য জনক চিকিৎসা মধ্যে পরিগণিত ছিল। একটা সামান্য সূচ পবিকার করতঃ জলকোশেব ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কয়েক বাব বিদ্ধ কবা হইলে এতদ্বাৰা কয়েক বিম্বু রস কোষিক বিধান মধ্যে প্রবেশ পূৰ্বক প্রদাহ উৎপন্ন কবে। তজ্জন্য নিঃসৃত রস কয়েক দিবস মধ্যে শোষিত হইয়া পীড়া আবেগ্য হয়। এই প্রণালীতে বালক দিগের পীড়া এককালীন আবেগ্য হইতে পারে। কিন্তু যুবা বা বয়স্ক ব্যক্তি সমূহের পুনর্বার বস সঞ্চয় হওয়াব বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

চ্ছেদন।

কোশস্থ জল বহির্গত কবণানন্তর মাংসা-
ছুর দ্বারা কোশ মধ্যস্থ স্থল পূর্ণ কবাই এতৎ
প্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য।

অস্ত্র প্রণালী—প্রথমে জল কোশেব
সমুখ মধ্য ভাগে—অণু কোশের মধ্য
রেখার সমস্থানে একটা লম্বা ছেদ করিব—
এমন সতর্কভাবে অস্ত্র প্রয়োগ কবিবে যে,
কেবলমাত্র চর্ম বিভক্ত হয়, অথচ টিউনিকা-
ভেজাইনেলিস কোশ অক্ষত থাকে। তৎ-
পর বিবেচনামুযায়ী ছেদকে উদ্ধাধঃ দিকে
বিবর্তিত করিয়া দিলেই জলকোশ সমুখ
ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তদনন্তর
চকটা শলাকা দ্বারা কোশ এবং চর্মস্থ

সংযোগ সমূহ বিযুক্ত করিয়া টিউনিকাভে-
জাইনেলিস বিভক্ত করতঃ র-
বহির্গত করিবে, তৎপর গহ্বর মধ্যে
কার্ষণিক তৈলাক্ত গিণ্ট দিয়া বন্ধন
করিবে। অতঃপর ক্ষতের অবস্থামুযায়ী—
চিকিৎসা করিবেই মাংসাস্থুর দ্বারা পীড়া
আবেগ্য হইবে। বর্তমান সময়ে এ
পদ্ধতিও বিশেষ প্রচলিত নাই।

টিউনিকা ভেজাইনেলিস

দূরীভূত করণ।

এই ঝিল্লি কর্তনান্তর দূরীভূত করা
অত্যন্ত বিপদজনক। তজ্জন্য বিশেষ
আবশ্যক না হইলে, কখনই এতদন্তঃক্রিয়ায়
প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। যখন উক্ত
ঝিল্লি অত্যন্ত স্থূণ বা উপাস্থিতে পরিণত,
অথবা তদ্রূপ কোন পীড়াক্রান্ত হইলে
আবেগ্যাব অন্য কোন উপায় না থাকে
অথচ আবেগ্য কবাও বিশেষ আবশ্যক,
তদ্রূপ স্থলে এককালীন দূরীভূত করা ভিন্ন
আবেগ্যাব অন্য কোন উপায় নাই।
আইওডিন প্রভৃতিবিশিষ্টকারী প্রয়োগ অথবা
অগব্যাপব সাধাবণ চিকিৎসা প্রণালী উপ-
যুক্ত পবিমাণ প্রদাচোৎপাদন করিতে কথ-
নহ সম্মত হয় না। তজ্জন্য আরোগ্য
কবা বিশেষ আবশ্যক হইলে বহুবিধ উপাধি
থাকা সত্ত্বেও এই পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ
করা কৃতব্য। কিন্তু দ্বন্দ্বল, ক্রম এবং
বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের ইহার অনুসরণ করা
সর্বথা অবিধেয়।

অস্ত্রপ্রণালী [১]—জলকোশের সমুখ দেশে
দুইটা অর্ধ চন্দ্রাকৃতি ছেদ করিবে। ছেদ

টি একটির প্রকার হওয়া কর্তব্য যে, উভয় ক্ষেত্রে উর্দ্ধ এবং অধঃ অস্ত্র পরস্পর সম্মিলিত হইয়া বাদ্যমাত্রি এক ঋতু বহু ছুরিকা দ্বারা পৃথক করিয়া বহিষ্কৃত করা যায়। সাবধান হস্তে অকোমলন করিলে জল পূর্ণ টিউনিকা-ভেজাইনেলিস কোশ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ জল পূর্ণ থলী কাঁচি দ্বারা বিদ্ধ কবতঃ একটা ছিদ্র করিয়া ঐ ছিদ্রটা উর্দ্ধ এবং অধঃ ধারে বিস্তৃত করিয়া দিতে হইবে। তদনন্তর শুক্লরক্তের সন্নিবিষ্ট পর্থাণ্ড সমস্ত বিগ্নি কর্তন করতঃ দূরীভূত করিবে। ঐ সময় বিশেষ সাবধান হওয়া কর্তব্য যেন ধমনী বা শিবা আহত না হয়।

অস্ত্র প্রণালী [২] —

সামান্য স্ফোটক কর্তনের ছুরিকা দ্বারা মুকের সম্মুখে অস্থূল ভাবে একটা ক্ষেদন করিলে টিউনিকাভেজাইনেলিস এবং জল-পূর্ণ থলী সম্মুখে বাহির হইয়া আঁইসে। তাহাকে টেনাকিউলম দ্বারা আনয়ন করতঃ আবণ্ড কিয়দংশ বহিষ্কৃত কবতঃ কাঁচি দ্বারা বহিষ্কৃত অংশ কর্তন পূর্বক দূরীভূত করিবে।

অস্ত্রোপচার শেষ হইলে কাক্সলিক তৈলাক্ত লিণ্ট দ্বারা কোশ গম্বব পূর্ণ করিয়া বাঁধিয়া দিবে। অস্ত্রোপচারের পূর্বে অস্ত্র, মুক, হস্ত এবং ব্যবহার্য অপর সমস্ত জব্য, কাক্সলিক, বোরাসিক এসিড বা রস কপূর জলে ধোত করিয়া ব্যবহার করা কর্তব্য। পচন নিবারণ নিয়মের বশবর্তী থাকিয়া চিকিৎসা করিলে ক্ষত সত্তরে শুষ্ক হইয়া আরোগ্য হইতে পারে। বর্তমান সময়ে পচন নিবারণ চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত হওয়াতে যদিও বিগলন ইত্যাদি

আশঙ্কা অনেকাংশে তিবোহিত হইয়াছে। তথাচ এক্ষণে স্থলে সাবধান হওয়াই কর্তব্য।

অপব্যপক যত চিকিৎসা প্রণালী জল কোশ আরোগ্যার্থ অবলম্বিত হয়, তৎসকল অপেক্ষা ঐ প্রণালীতেই নিশ্চিত আরোগ্য হইতে পারে। কিন্তু ইহার অনিশ্চিত ভয়ঙ্কর পরিণাম দৃষ্টে এই মহত্বপূর্ণ এককালীন বিস্তৃত হইতে হয়।

দাহক-উষধ।

জলবোণ চিকিৎসার অবলম্বিত প্রণালী সমূহের মধ্যে ইহাই সর্ব নিরুপে। বর্তমান সময়ে এই কয়েকটা অস্থবিধা মনে করিয়া কোন চিকিৎসকই আর ইহার আশ্রয় গ্রহণ করেন না। পূর্বে আমাদের দেশে এক সম্প্রদায় কোরও আরোগ্য-কাণী চিকিৎসক ছিল, তাহারাও এই প্রণালীতে চিকিৎসা কবিত, কিন্তু ইউরোপীয় চিকিৎসা প্রচলিত হওয়াতে ধীরে ধীরে ঐ সম্প্রদায় এখন বিলুপ্ত প্রায়। ১ম, আবোগ্য পক্ষে অনিশ্চিত। ২য়, অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। ৩য়, প্রায়শ সাংঘাতিক। ৪র্থ, অনাবশ্যক জ্ঞান সত্ত্বেও স্থানিক চর্চা নষ্ট করা। ৫ম, অনর্থক যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতোৎপাদন। ৬ষ্ঠ, পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ কবা আবশ্যক।

কষ্টিক দ্বারা দুই প্রকারে চিকিৎসা হইতে পারে। ১ম—কষ্টিক পটাল বা উদ্ভগু লৌহ যন্ত্র দ্বারা কোশের সম্মুখ ও নিম্ন ভাগে ক্ষতোৎপাদন পূর্বক ঐ ক্ষতকে ক্রমে গভীর করতঃ বিগ্নির অভ্যন্তর পর্যন্ত প্রদাহ বিস্তৃত করা। ২য়, কোশ মধ্যে কষ্টিক শলাকা পরিচালিত করিয়া প্রদাহ উৎপাদন করা।

এই শেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইলে আর-
জেনটাই নাইটাস উদ্ভাপ সহযোগে দ্রব
করতঃ উপযুক্ত পরিমাণ মত একটি প্রোবে
সংলগ্ন করিয়া শীতল করিলে কষ্টিক শলাকা
প্রস্তুত হয়, এখন সাধারণ প্রণালী ক্রমে
কোশস্থ জল নিষ্কাশিত করতঃ ব্যাঘ্রলা
মধ্য দিয়া উক্ত শলাকা প্রবেশ কবাটয়া
ঝিল্লির গাত্রে নানা স্থানে যাহাতে ঐ
শলাকা সংলগ্ন হইতে পারে, তদ্রূপ পরি-
চালিত করিতে হইবে। এই উপায়ে শলাকা
সংশ্লিষ্ট কষ্টিক ঝিল্লির অভ্যন্তরে সংলগ্ন হওয়ায়
প্রদাহ উৎপন্ন হইলে সাধারণ নিয়মে উক্ত
ঝিল্লি স্বাভাবিকাবস্থা প্রাপ্ত বা সংযোজিত
হইয়া পীড়া আবেগ্য হইতে পারে। কিন্তু
আমাদের দেশীয় প্রণালীতে কষ্টিকের
পরিবর্তে অন্যবিধ দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া
থাকে। প্রদাহ প্রবল হইলে প্রদাহ নাশক
চিকিৎসার আশ্রয় লওয়া কর্তব্য।

টেণ্ট ।

কোশে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে লিট, স্পঞ্জ,
স্বব্বারের নল, ক্যানিউলা ইত্যাদি বাহ্য বস্তু
সংস্থাপন করতঃ কয়েক দিবস রক্ষা করিলে
প্রথমে প্রদাহ, তৎপর পুরোৎপত্তি হইয়া
মাংসাস্তুর দ্বারা কোশ গহ্বর পরিপূর্ণ হইলে
জল কোশ পীড়া আবেগ্য হইতে পাবে,
অথবা কেবল প্রদাহ দ্বারা ঝিল্লির নিরাময়
অবস্থা আনীত হইলে পুনরায় রস সঞ্চয়ের
সম্ভাবনা তিরোহিত হইতে পারে; কিন্তু
উদ্ভেজক ঔষধের পিচকারী প্রয়োগাপেক্ষা
ইহাও নিষ্কট। আমি একটি রোগীর কোশ
मध्ये একটি ত্রুমানি পরিধি বিশিষ্ট স্বব্বারের-

নল প্রবেশ করাইয়া ষ্টিকিন প্লাষ্টার দ্বারা
আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। প্রথম তিন
দিবস কোনই পরিবর্তন লক্ষিত হইল না।
চতুর্থ দিবসে সামান্য প্রদাহ লক্ষণ দৃষ্ট হইলে
নল বহির্গত করিলাম। পঞ্চম দিবসে প্রবল
প্রদাহ এবং জ্বর উপস্থিত হইয়া রোগী
অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। সপ্তম
দিবসে কোশের কয়েক স্থানে ক্রকর্ষণ বিগল-
নেব লক্ষণ মাত্র হইয়া নবম দিবসে বিগলিত
ক্ষতে পরিণত হইল। তৎপর মাসাধিক
কাল রীতিমত চিকিৎসা করায় রোগী
আরোগ্য লাভ করে। এই ঘটনার পর
হইতে আব একপ চিকিৎসায় প্রস্তুত হই
নাই। কিন্তু অনেকে এথম এই প্রণালী অব-
লম্বন করিয়া থাকেন। পিচকারী প্রয়োগের
অনুবিধা হইলে অপবাপর উপায়াপেক্ষা
ইহা মন্দ নহে। ইহা আমাদের দেশীয়
শুল্কের অমুরূপ মাত্র।

সিটন ।

সিটন দ্বারা জল কোশ আরোগ্য করিতে
হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি দ্রব্যের প্রয়োজন।

১। সাধারণ জল কোশের ব্যবহার্য্য
ট্রোকার ক্যানুলা।

২। উক্ত ক্যানুলা মধ্য দিয়া সহজে
প্রবিষ্ট হইতে পারে এমন একটি পাচ ইঞ্চি
দীর্ঘ রোগ্য নল।

৩। ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ, এক অঙ্ক তীক্ষ্ণ,
অপর অঙ্ক ছিদ্র বিশিষ্ট একটি শলাকা।

৪। রেশম বা অপরবিধ অক্ষতক্ষত
শলাকার ছিদ্র মধ্যে পরিমিত দীর্ঘ পুত্র
সংযুক্ত করিয়া লওয়া কর্তব্য।

অল্প প্রণালী—সাধারণ নিয়মে জল নিষ্কাশিত করণান্তর কাঁহুলা মধ্য দিয়া রোপ্য নলটি উর্দ্ধ দিকে চালিত করিলে কোশের উর্দ্ধ এবং সমুখ অংশে যাইয়া আবদ্ধ হইবে, তৎপরে সমুদ্র শলাকাটির তীক্ষ্ণ অস্ত্র শূন্য নল মধ্যে দিয়া চালিত করিলে কোশের উপরস্থ বন্ধ বিদ্ধ করিয়া বহির্গত হইবে। এখন ঐ শলাকা উর্দ্ধ দিকের দ্বিতীয় দিয়া বহির্গত করিয়া লইলেই সূত্র রোপ্য নল মধ্য থাকিবে। তৎপর উভয় নল বহির্গত করিয়া লইলেই অস্ত্রক্রিয়া সম্পন্ন হইল। উভয় অস্ত্রের সূত্র গুলু, শিথিল ভাবে পবম্পর বন্ধন করিয়া রাখা কর্তব্য।

দ্বিতীয় মত—একখান তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা কোশ বিদ্ধ করিলে কিয়দংশ রস বহির্গত ও বন্ধ এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ লোল হইলে ঐ লোলিত চর্ম্মের অধিকাংশ বাম হস্তের তাম্বনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কুঞ্চিত করিয়া ধৃত করিবে, তদনন্তর দক্ষিণ হস্তের ছুরিকা দ্বারা অঙ্গুলি সংস্পৃষ্ট চর্ম্মকে ছিঁড় করিতে হইবে, ছিঁড়টি এমনত হওয়া আবশ্যিক যে উভয় পার্শ্বের চর্ম্ম ভেদ হয়; এখন ঐ ছিঁড় মধ্য দিয়া সূত্র প্রবেশ করাইয়া উভয় অস্ত্র বন্ধন করিয়া রাখিবে। সামান্য সিটন নিডল দ্বারাও এই অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হইতে পারে।

তৃতীয় মত—একটি অল্প বক্র ৪।৫ ইঞ্চি দীর্ঘ সূচিকায় সূত্র প্রবেশ করাইয়া কোশ গহ্বর মধ্যে নির হইতে উর্দ্ধদিকে প্রবেশ করাইয়া উর্দ্ধস্থ ছিঁড় দ্বারা সূচিকা বহির্গত করতঃ সূত্রের উভয় অস্ত্র পরস্পর শিথিল ভাবে বন্ধন করিয়া রাখিবে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মতে অণ্ডাধার, ত্ত্র-

রজ্জু ও রক্ত বহানাদী সমূহ আহত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তত্ক্ষণাৎ বিশেষ সাবধান হওয়া কর্তব্য।

এই মতেরও কয়েকটি বিশেষ দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ অনেক সময় অত্যধিক প্রদাহ হইয়া জীবন শঙ্ক্যাপন্ন হইয়া উঠে। কখন বা টিউনিকাভেজা-ইনেলিস ঝিল্লির সমস্ত অংশে প্রদাহ উৎপন্ন না হইয়া কেবল মাত্র সমুখ অংশেই প্রদাহ উৎপন্ন হয়, এবকম স্থলে পীড়া আরোগ্য হইতে পারে না। কতদিন সিটন রাখিতে হইবে তাহার কোন নিশ্চয় নাই। আমি একটা বোগীর বিষয় জানি, তাহাতে এক সপ্তাহ সিটন রাখিয়াও উপশ্রুত প্রদাহ হয় নাই। আবার কখন কখন এক দিবস পরেই এত প্রদাহ হইয়াছে যে তাহাতে বন্ধের কোন অংশ বিগলিত হইয়াছে। এই সকল অসুবিধা বিধায় পিচকারী প্রয়োগের সুবিধা পাইলে ইহার আশ্রয় লওয়া অকর্তব্য। যখন পিচকারী ব্যবহার করিয়া অক্লান্তকাৰ্য্য হওয়া যায় অথবা অন্যবিধ অস্ত্রেরা থাকা জন্য পিচকারী অব্যবহার্য্য; তত্ক্ষণ স্থলে এই প্রণালী অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ। কদাচিত্ত এমনও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে সিটন প্রয়োগ দ্বারার অতি সামান্য প্রদাহ হইয়াছে, তত্ক্ষণ স্থলে আইওডিন ব্যবহারের বেদনা, অর ইত্যাদির যন্ত্রণাপেক্ষা ইহাই প্রশস্ত বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে তত্ক্ষণ ফল আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

সাধারণ মধ্যে প্রায় অপ্রচলিত এবং বিপদাকীর্ণ বিধায় উপরোক্ত প্রণালী কয়েকটি সামান্যভাবে নিষিদ্ধ হইল। বর্তমান

সময়ে পচন নিবাবক চিকিৎসা প্রণালী
প্রচলিত হওয়ার যদিও বিপদাশঙ্কা বহুতক
পরিমাণে অন্তর্হিত হইয়াছেন, তথাপি নিম্ন
বর্ণিত পিচকারী প্রয়োগ প্রণালী অপেক্ষা
যে সমূহ বিপদজনক তদ্বিষয়ে অমুমান্যও
সন্দেহ নাই। তজ্জন্য চিকিৎসক মাত্রেরই
কর্তব্য যে জলকোশস্থ ঝিল্লি মধ্যে উত্তেজক
ঔষধের পিচকারী প্রথমে প্রয়োগ কর্তব্য।
তাছাড়া আরোগ্য সম্বন্ধে অন্তর্ভুক্ত্য অথবা
অভাব জন্য কিম্বা অন্য পীড়া জন্য পিচ-
কারী ব্যবহার নিষিদ্ধ হইলে উপযুক্ত কোন
উপায় অবলম্বন করিয়া পীড়া আরোগ্য
করিতে চেষ্টা করিবে। নতুবা আশঙ্কা
জনক কার্য্য মধ্যে সহসা হস্তাক্ষপ অবি-
ধেয়। টেট ও সিটন এখনও কেহ কেহ
স্বভঃ প্রবৃত্ত হইয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন
এবং উহাই আমাদের দেশীয় প্রাচীন রীতি।
দাহক ঔষধ ব্যবহার আমাদের দেশীয়
প্রাচীনরীতি হইলেও বিলুপ্ত প্রায়। কেবল
চন্দ্র মূলত্রে পরিণত হইলে কদাচিত তৎ
ঘিনটে করণার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঝিল্লি
পীড়াগ্রস্ত হইলে তাহা দূরীভূত করাই এক
মাত্র উপায়। ভিন্ন মতাবগমী হইলে
কেবল যন্ত্রণা প্রদায়ক এবং অনর্থক কাল
বিগল্য করা ভিন্ন অপর উপকার কিছুই
আশা করা নিশ্চল।

পিচকারী ।

টিউনিকাভেজাইনেলিস ঝিল্লি উত্তেজক
ঔষধ দ্বারা প্রদাহিত করিয়া তাহার
নিরাময় অবস্থা আনয়ন করা এই প্রণালীর
প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু কখন কখন তজ্জন্য

ফলের পরিবর্তে প্রদাহ দ্বারা উত্তর ত্ব
একত্র সংযুক্ত কিম্বা মাংসাত্মক দ্বারা কো
গহ্বর বিলুপ্ত হইয়া থাকে। কদাচিত
প্রদাহাধিক্য বা ব্যবহার্য্য ঔষধের উত্তেজনা জন্য
উক্ত ঝিল্লি এককালীন ঘিনটে হইতেও দেখা
গিয়াছে। অসাবধান, ঔষধ নির্ণয়ের ব্যতি-
ক্রম অথবা দুর্বল প্রকৃতিতেই এই শোথাক্ত
ফল ফলিবার অধিকতর সম্ভাবনা। আবার
এবস্থিৎ ঘটনাও নিত্যস্ত বিরল নহে যে
উপবোক্ত কোন উদ্দেশ্যই সংশ্লিষ্ট না
হইয়া অল্প ক্রিয়া সম্পূর্ণ নিষ্ফল প্রদ হই
য়াছে। একপ ঘটনা স্থলে জ্ঞাণ যন্ত্রণা,
প্রদাহ, অব ইত্যাদি প্রায়ই হয় না। অথবা
এত সামান্য হয় যে তাছাড়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ
হওয়া সন্দেহ স্থল। নিম্ন লিখিত কয়েকটি
স্থলে পিচকারী প্রয়োগ ব্যর্থ হইবার বিশেষ
সম্ভাবনা।

১। টিউনিকাভেজাইনেলিস ঝিল্লি
অত্যন্ত স্থূল, প্রায় উপস্থিত ন্যায় হইলে

২। পিচকারী ব্যবহার্য্য ঔষধেতে
উপযুক্ত পরিমাণ প্রদাহ উৎপাদন করিতে
অক্ষম হইলে।

৩। ঝিল্লি দুর্বলতা বশতঃ পিচকারী
প্রয়োগের পর ২৩ দিন মধ্যে যে রস সঞ্চয়
হয় তাহা শোষিত না হইলে।

অত্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়। প্রদাহ
দ্বারা ঝিল্লি স্বাভাবিক নিঃপ্রাণন এবং শোষণ
ক্রিয়া পুনঃ স্থাপিত না হওয়াই উক্ত ঘটনার
প্রধান কারণ। অপিচ এতৎ বিশরীত
নিম্ন লিখিত তিনটি স্থলে প্রায়ই ফোটক
উৎপন্ন হইয়া প্রদাহ গুরে পরিণত হইবার
বিলম্বন সম্ভাবনা।

১। টিউনিকাভেজাইনেলিফিসিনি দুর্বল কর পীড়াগ্রস্ত।

২। রোগীর প্রকৃতি স্থূল, প্রদাহ প্রবণ।

৩। ব্যবহার্য ঔষধ অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতি বিশিষ্ট।

ইতিহাস—ইন্জেকশন প্রথা বহুদিনস যাবত প্রচলিত আছে। ডাক্তার মন্সে মছোদয় সর্ব প্রথমে স্পিবিট ব্যবহার করিয়া সফলতা লাভ করেন। কিন্তু তদুপায় এক প্রদাহ হইয়াছিল যে, তদপেক্ষা কোন মৃদু উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক মনে করিয়া ছিলেন। সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে মধ্যভাগে এই প্রথা প্রথম প্রচলিত হয়, তৎপা হইতে ক্রমিক উন্নতি লাভ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও নির্দোষ ঔষধ আবিস্কৃত হয় নাই। তৎকালে সোডা, শীওল জল, জল মিশ্র সুবাসার, চুণের জল সহ রসকপূর, পোট, সলফেট অফ জিঙ্ক ড্রব, টিংচারআইওডিন, ইত্যাদি বহুদ্রব্য ব্যবহৃত হইত। কিন্তু এখন তাহার অধিকাংশই পরিত্যক্ত হইয়াছে। সার এন্টলি কুপার মছোদয় এক ব্যক্তিকে বিজ্ঞ হৃৎ ইন্জেক্ট করার অত্যন্ত প্রদাহ হইতে দেখিয়া ছিলেন। ঐ প্রদাহ শেষে ক্ষেটিকে পরিণত হইলে অল্প করণাস্তর দুই সংবৎসর দেখা গিয়াছিল। দুইয়ের দ্বারা পরিণাম ফল এতাদৃশ শোচনীয় হইবে পূর্বে তাহা ধারণা করা হয় নাই।

পিচকারী প্রয়োগ অন্য জলকোশ বিদ্ধ করিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

১। অন্য কোন বকম প্রদাহ থাকিলে আবেগ্য হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা কর্তব্য।

২। অণ্ডাশয় পীড়াগ্রস্ত হইলে পিচকারী প্রয়োগ না করিয়া ঐ পীড়ারই অগ্রে চিকিৎসা করা কর্তব্য।

৩। নানাবিধ পীড়াক্রান্ত হইয়া দেহ দুর্বল হইলে সে সময়ে পিচকারী প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে।

৪। ক্ষুদ্র প্রকৃতি এমন এক অবস্থায় উপস্থিত হয় যে, তৎকালে সামান্য প্রদাহও বিকৃত হইয়া (ট্রিবিডিপেনাস ইত্যাদি) শঙ্কটাপন্ন হইতে হয়। তদ্রূপ সময়ে পিচকারী প্রয়োগ সমথা অবিধেয়।

৫। ট্রোবার ক্যাথুলা দ্বারা কোণবিন্দু করার সময় প্রথমে পশ্চাদিকে প্রবেশ করাইবে, কিন্তু ট্রোকার নিক্ষেপিত করার সময় ক্যাথুলা পশ্চাৎ ও উর্দ্ধমুখে রাখিয়া বহির্গত করিবে। এই ভাবে কার্য্য করিলে (ক) কোণস্থ রস দ্বারা চিকিৎসকেন বস্ত্র আদ্র হইবার আশঙ্কা থাকে না। (খ) কিল্লি সঙ্কচিত হওয়ার সময় অণ্ডাশয় ও ক্যাথুলাব বর্ষণ দ্বারা আহত হয় না। (গ) অধিকন্তু ব্যবহার্য ঔষধ প্রথমে উর্দ্ধাভিমুখে দাবিত হওয়ায় কিল্লির সমস্ত অংশই সংলিপ্ত হইতে পারে।

৬। ক্যাথুলা যথার্থ টিউনিকাভেজাইনেলিস কোশ মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে কি না দেখা উচিত, নতুবা বৌলিক বিধান মধ্যে উগ্র দ্রব্য প্রবেশ করিয়া অনিষ্ট সংঘটন হইতে পারে।

৭। ক্যাথুলা নিক্ষেপন সময়েরও সাবধান হইবে যেন উগ্র পদার্থ এরিওগলার

টিস্র মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে। নতুবা
যদি নিম্নে একটি ক্ষুদ্র স্ফোটক উৎপন্ন হইবার
সম্ভাবনা।

৮। যুদ্ধ রসের সহিত উদর গহ্বরের
সংযোগ থাকিলে তাহা বোধ না করিয়া
উগ্র দ্রব্যের পিচকারী প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

৯। কোণস্থ বসেব পরিবর্তে, পুষ, বক্র ইত্যাদি অন্যবিধ পদার্থ পাইলে পিচ-
কারী প্রয়োগ কর্তব্য কি না? বিশেষ
বিবেচনা করা কর্তব্য।

১০। তরুণ প্রদাহজাত রস সঞ্চয়ের
জন্য যে অর্কুদ, তাহাতেও সহসা পিচকারী
প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

১১। বালকদিগের ক্ষুদ্র জলার্কুদ
আরোগ্যার্থে পিচকারী প্রয়োগ অনাবশ্যক
কেননা তদ্বিধ পীড়া অন্যান্য সহজ উপায়
দ্বারাও আরোগ্য হইতে পারে।

১২। বৃহৎ এবং বৃদ্ধ দিগের জলকোশে
পিচকারী প্রয়োগ কবিলে প্রদাহজাত রস
সহজে শোষিত হইতে পারে না। ইহা
পূর্বেই বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য।

১৩। প্রথম বাব কেবল মাত্র সাধাবণ
নিয়মে জলকোশ বিদ্ধ করতঃ রস বহির্গত
করিয়া দেওয়া উচিত। তৎপর কয়েক
দিন পরে পিচকারী প্রয়োগ করিলে সুফল
লাভের সম্ভাবনা।

পিচকারী দ্বারা উগ্র দ্রব্য কোশ মধ্যে
প্রবেশ করাইলে এক দিন পরে প্রায় বন্দ
হইয়া অর আইসে এবং মুক ও অত্যন্ত ক্ষীণ
ও বেদনা যুক্ত হয়, এই প্রদাহের উপর অল্প
ক্রিয়ার পরিণাম নির্ভর করে। সুতরাং

এতৎ প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।
ভাবে উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিয় উপস্থিত হইয়া
সম্ভাবনা। যদি উপযুক্ত পরিমাণ প্রদা-
না হয় তবে অল্পলি সঞ্চাপন দ্বারা যাহাতে
প্রদাহ বৃদ্ধি হইতে পারে তদুপায় অবলম্বন
করিবে। রোগীকেও ক্রমাগত পরিভ্রমণ
করিতে দিলে সময় সময় প্রদাহ বৃদ্ধি হইতে
পাবে। প্রবল প্রদাহ হইলে সাধারণ রীত্যানু-
সারে প্রদাহনাশক চিকিৎসা করিবে। গোলা
উস্ লোশনের সহিত টিংচার ওপিরাই মিশ্রিত
করিয়া ক্রমাগত আত্ম করিয়া বাখিলে যন্ত্রণার
অনেক উপশম বোধ হয়। সুস্থিরাবস্থায়
ক্রমাগত শয্যা থাকা কর্তব্য। অর আরোগ্য
না হওয়া পর্যন্ত লঘু পথ্য দিবে। এই
প্রদাহ জন্য অণ্ডকোশ প্রায় পূর্ণাঙ্কতি
অপেক্ষা বৃহৎ এবং সঞ্চাপনে দৃঢ় বোধ হয়।
এই অবস্থা হইতে স্বাভাবিকাবস্থায় উপস্থিত
হইতে প্রায় মাসাধিক কাল সময় আবশ্যক।
প্রদাহ সময়ে আইওডাইড অফ পটাশ দ্রব্য
প্রয়োগ কবিলে প্রদাহজ ঘনীভূত উপবিধান
সত্তবে শোষিত হইতে পারে। কদাচিত্ত
দুই সপ্তাহ মধ্যে শোষিত হইতে দেখা
গিয়াছে। কেহ কেহ প্রদাহের শেষাবস্থায়
নিঃসৃত রস নিষ্কাশিত করিতে উপদেশ দিয়া
থাকেন।

ব্যবহার্য অস্ত্র ইত্যাদি—একটি সাধারণ
টৌকার ও ক্যানুলা; এই নলের মধ্যে
উত্তমরূপে আবদ্ধ হয় এমন সুখবিশিষ্ট
একটি পিচকারী; এতৎ ভিন্ন অন্য কোন
যন্ত্রের বা অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না।

ক্রমশঃ

শৈত্য ও ফুস্‌ফুস-প্রদাহ।

লেখক—ঐআদুল আজেম খাঁ চৌধুরী।

অগধিধারিনী শক্তি যে পক্ষপাতিনী নহেন, তাহা শুণিগণ স্ব স্ব জ্ঞানগোচর করিয়া পরমানন্দে পরিপ্লুত হইতে থাকেন। আমরা যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেট সর্ব-মঙ্গলা শক্তির অভ্রান্ত বিকাশই সর্বত্র বিরাজমান দেখিতে পাই: যে গরল সংস্পর্শে বা ভোজনে জীবগণ জীবন হারাধ, দেখ, ভৈষজ্যবিদ্যাবিদ্বুধগণ সেই বালবদনোদগত বিষসহকারে বোগবিণেষে মুমূর্ষুজনের প্রাণ রক্ষা করিয়া থাকেন। শৈত্য স্লেম্মা উৎপাদন করে, আবাব, সেই শৈত্য স্লেম্মার জীবন হরে। এই কাণ্ড যদিও নতুন নহে, তথাপি অনেকের অবিদিত অহুয়ানে উপ-যুক্ত “শৈত্য ও ফুস্‌ফুস-প্রদাহ” প্রবন্ধটি ভিষক দর্পণের প্রিয় পাঠকবার্গের নিকট উপহার স্বরূপ প্রেরিত হইল, যদি অহুয়াজ্ঞ ও তাঁহাদের জ্ঞানপুন্নে আধিক্য জ্ঞান্য ও কণামাত্র উপকারে আইসে লেখক নিজ প্রয়াসসাক্ষ্য বিবেচনা করিবেন।

একই প্রকার পথ্য-বৈপর্য্যিত্যে যে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে, সে কেবল সেই সেই ব্যক্তির সেই সেই জন্মের ও যন্ত্রের আত্মপুর্নিক প্রকৃতি ও ঘটনাবলতঃ দৌর্লভ্যের কারণ সংঘটিত হয়। এই নিরসার্কসারে কোন কোন ব্যক্তি শৈত্যসংযোগে লব ফুস্‌ফুস-প্রদাহ পীড়িত্ত্বিত হইয়া অত্যন্ত ভীষণ বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকেন। বাতবিক, ফুস্‌ফুস-প্রদাহের

অনেকবিধ কারণ আছে, [ক] শ্বাস-প্রণালীর শৈল্পিক ঝিল্লির প্রদাহ প্রসারণ, [খ] যক্ষ্ম ও অন্যান্য নিকটস্থ স্থানের স্ফোটক বিদীর্ণ হইয়া ক্রমে ফুস্‌ফুস আক্রমণ করণ; (গ) অত্যুত্তাপবিশিষ্ট বিবিধ প্রকার জ্বর রোগ; (ঘ) জ্বর প্রভৃতি নানা প্রকার পুরাতন পীড়া যাহাতে বোগী দৌর্লভ্যবশতঃ সত্য উদ্ভানশয় থাকে; (ঙ) কোন কোন বিশেষ ব্যাধিজ নগোদ্ধৃত পদার্থের ফুস্‌ফুসে প্রকাশ হওয়া, (চ) আঘাত ও (ছ) শৈত্যসংযোগ ইত্যাদি।

উল্লিখিত কারণ নিচয়ান্তর্গত—“শৈত্য-সংযোগই” আমাদের উপস্থিত সময় বিবেচ্য। আমাদের দেহাত্মন্তরে যতগুলি যন্ত্র আছে, সেই সমুদয়ের মধ্যে ফুস্‌ফুসকেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাহ্য উন্মানোদ্রতা সহ্য করিতে হয়, কি অজ্ঞ, কি বিজ্ঞ সকলই নিশ্বাস প্রশ্বাস করিতে বাধ্য; অতিশয় শীতল সমীরণ, যাহার সংস্পর্শে কৈশিকা-জ্বগত সঞ্চলনশীল রক্তের গতিমান্য বা রুদ্ধ হয়, অথবা হতাশননিশ্বাসস্বরূপ বিষম উত্তপ্ত বায়ু; বায়ু যে প্রকারেরই হউক, আমরা নিশ্বাস প্রশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না। যেমন অনেক সময় আমরা বিষম উত্তপ্ত সমীর সেবন করিয়া বহু কষ্টে প্রাণ ধারণ করিতে বাধ্য হই, ঐরূপ কখন কখন বিষম বীতোত্তাপ বায়ুও আমাদেরকে সেবন করিতে হয়। ফুস্‌ফুসে পূর্ব প্রকৃতিজাত দৌর্লভ্য থাকিলে এবিধ

প্রকার শৈত্যসংযোগে ভাব্য প্রদাহ উৎপন্ন হয়। কেবল যে শৈত্যসংযোগ আর ফুস্-ফুসে আন্তর্পুর্কিক প্রকৃতিবশতঃ দৌর্ভাগ্য, এই দুয়ের একত্র সংঘটনেই ফুস্-ফুসে প্রদাহ উৎপন্ন হয়, তাহাও বলিয়া বোঝা যায় না, কারণ, ডাক্তার ট্যানার ও ডাক্তার মেডোস উল্লেখ করেন যে জুর্গেন্সেন (Jurgensen) বলিতেন, ফুস্-ফুস-প্রদাহ ম্যালেরিয়াব মত কোন বাহ্য বোগবীজ কাণে উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। ইদানীন্তন প্যালামো নগরনিবাসী ডাক্তার জি, লিপারী সাহেব শৈত্য সংযোগে যে ফুস্-ফুস-প্রদাহ উৎপন্ন হয়, তাহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন, নিউমোককা বোগবীজ আক্রমণে মৃত জন্তুগণের ফুস্-ফুস-প্রদাহোগত শ্লেষ্মা, অথবা তাহাদিগের ফুস্-ফুস-আবরণসমূহ ক্ষণে অন্যান্য সুস্থ জন্তুদিগের শ্বাস-প্রণালীর ভিতর প্রবেশ করাইলে, তাহারা ফুস্-ফুস-প্রদাহ দ্বারা আক্রান্ত হয় না, কিন্তু উক্ত প্রকারে পরীক্ষা করিয়া হইয়া পূর্বে কিছা পবে যদি সেই সকল জন্তু শীতল বাতাস ও শীতল স্থানে সংরক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহাব ফল সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপ পরীক্ষীকৃত ৮টি জন্তুর মধ্যে ৬টি ফুস্-ফুস-প্রদাহ-রোগগ্রস্ত হইয়া মরিয়া যায়। এতদ্বারা ডাক্তার লিপারী সাহেব অনুমান করেন শৈত্য-সংযোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাস প্রণালীর সিলিয়েটেড এপিথেলিয়াম কার্য ও স্পর্শশক্তি-বহিত হয় এবং উক্ত শ্বাস প্রণালী সমূহের নৈমিত্তিক শিল্পী ফাট হইয়া উঠে। এই

উক্ত নৈমিত্তিক ঘটনা উপযুক্ত সংক্রামক পদার্থের অধোগমন কার্যে ও তৎসহ এলভিয়োলাই (Alveoli) অভ্যন্তরে প্রবেশনে সাহায্য করে।

শৈত্য-সংযোগে যে কি নৈমিত্তিক নিয়ম-মাত্রসাবে প্রদাহ উৎপন্ন হয়, তাহা এতদূর বিবৃত করিবার উদ্দেশ্য ছিল না বলিয়া এখানে তদ্বিষয় কিছু মাত্র বর্ণনা করা হইল না, তবে এটুকু আমাদের চিত্ত ফলকে স্পষ্ট অঙ্কিত হইল যে, অবস্থা বিশেষে শৈত্য সংযোগে কোন কোন লোকের ফুস্-ফুস-প্রদাহ জন্মিয়া থাকে।

ফুস্-ফুস-প্রদাহ যেমন বিবিধ প্রকৃতি বিশিষ্ট ও অবস্থাপন্ন হইয়া থাকে, উহার চিহ্নসমূহ ও তদ্ব্যবহারী বিবিধ প্রকারের প্রচলিত আছে। এতদূর শীতোৎপন্ন ফুস্-ফুস-প্রদাহ শৈত্যসংযোগে উপশম প্রাপ্ত হয়, তাহাও বর্ণিত হইবে। প্রায় ২০ বৎসর কাল অতীত হইল সুবিখ্যাত ডাক্তার নাই-মেয়ার (Niemeyer) সাহেব ফুস্-ফুস-প্রদাহ বোগে কোণ্ড কপ্তোপ রূপ শৈত্য প্রয়োগ ব্যবস্থা করেন, কিন্তু তিনি নিজেই কিছু দিন পবে এই ব্যবস্থা রোগীদিগের মনোনীত নহে বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। ডাক্তার ট্যানার ও ডাক্তার মেডোস মহোদয়গণ তাহাদের প্রাকটিস অফ মেডিসিন পুস্তকে শৈত্যের বাহ্য প্রয়োগ ফুস্-ফুস-প্রদাহে ব্যবস্থা করেন নাই বটে কিন্তু শীতল জল ও বরফ বহুল পরিমাণে রোগীকে দিতে বলিয়াছেন। উক্ত ডাক্তার দ্বয় ঐ পুস্তকে স্থানান্তরে ফুস্-ফুস-প্রদাহে অরোক্তাপ লাঘব করণার্থে শৈত্য ব্যবস্থা করিয়াছেন; ইহাও

কেবল উত্তাপহাবক সেবনীয় ঔষধাবলী না বুলিয়া এক্ষণে আমরা উত্তাপহাবক বাহ্য প্রয়োগও বুলিতে পারি। ঔষধদের বান-চিকিৎসা পুস্তকে জুর্গেন্সেন সাহেবেব ফুস্ফুস প্রদাহের চিকিৎসা সম্বন্ধে অন্যান্য প্রকরণেব মধ্যে ১০৪ ডিগ্রী তাপ হইলে কোল্ড বাথস্ (Cold baths) ও ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করেন। ফুস্ফুস-প্রদাহে ডাক্তার ডি. এ. ষ্ট্রাম্পেল (Dr A. Strumpell) সাহেব টেপিড বাথ (tepid bath) সহ কুণ্ডুশ (cool douch) ব্যবস্থা বলেন এবং বলেন এই চিকিৎসায় লবিউশাব নিউমোনিয়া কপ ফুস্ফুস-প্রদাহেব বৃদ্ধিব ব্যাঘাত জন্মান ও সম্ভবতঃ ঐ পীড়ার বিস্তৃতি প্রতিবোধ করে। তিনি আরও বলেন, এই বোগে কোল্ড প্যাক্স (cold packs) অতিশয় উপকার ববে।

রিম্মাব সাহেব স্বীয় পুস্তকে বহুক ব্যবহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, ডিক্‌দোনিয়া এবং গলদেশেব অন্যান্য প্রদাহযুক্ত রোগে বহুক ব্যবহারে বিশেষতঃ প্রদাহেব প্রথম অবস্থায় বরফ ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। উল্লিখিত পুস্তকে স্থানান্তরে ডাক্তার মহোদয় বলিয়াছেন, পুনঃ পুনঃ বরফ ব্যবহার কবিলে উত্তাপের হ্রাসতা, রক্তস্রাববন্ধি, প্রদাহ দমন ও অসাড়তা উৎপাদন করে। তিনি শীতল স্নান (cold baths) দ্বারা শারীরিক অভ্যুত্তাপ চিকিৎসায় বলিয়াছেন, এই চিকিৎসায় কদাচিত ব্রুসাইটিস অথবা ফুস্ফুস-প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং

অরমহ যদি উপযুক্ত দুইটা পীড়ার কোনটা বর্তমান থাকে, তাহা হইলে শীতল স্নান দ্বারা চিকিৎসা প্রতিবিদ্ধ নহে। লাইবাম্মিষ্টার (Liebermeister) সাহেব শীতল স্নান দ্বারা চিকিৎসা সম্বন্ধে এত প্রশস্ত ভাব প্রকাশ করেন যে, হাইপোথেটিক নিউমোনিয়া উপস্থিত হইলেও শীতল স্নান (cold bath) বন্ধ করিবার প্রয়োজন নাই বলেন, বরঞ্চ হাইপোথেটিক নিউমোনিয়া শীতল স্নানে অদৃশ্য হয় বলিয়া স্বীকার করেন।

ডাক্তার বিম্মার সাহেব পুনরায় অন্য স্থানে একপ বসেন যে, ফুস্ফুস-প্রদাহ রোগে কেহ কেহ কেবল বন্ধঃস্থল সিক্ত বস্ত্রাবৃত (wetpacket) করেন এবং এই প্রয়োগ বস্ত্রাবৃত পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করায় বেদনা দূরীভূত, নাড়ীৰ সাম্য সংসাধন, শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়াৰ স্বাভাবিক ভাব, এবং জ্বৰোত্তাপ হ্রাস হয়।

ডাক্তার রবার্টস (Dr Roberts) সাহেব স্বীয় প্রাক্টিস অফ মেডিসিন গ্রন্থে একিউট ক্রপস নিউমোনিয়া (acute crupous pneumonia) রোগ চিকিৎসায় স্থানিক শৈত্য প্রয়োগার্থে বলেন যে, কেহ কেহ পুনঃ পুনঃ ওয়েট কম্প্রেস (wet compress) বা মস্‌লিন-আবৃত আইস-বাগ্ প্রয়োগ করিতে বলেন। পুনরায় ক্যাটারেল নিউমোনিয়া (catarrhal pneumonia) চিকিৎসা কালে বলেন, অনেকে বন্ধঃস্থলে কোল্ড কম্প্রেস সহকারে আবৃত করিয়া চিকিৎসা করিবার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

শীতল স্নান দ্বারা ফুস্ফুস-প্রদাহ

চিকিৎসা অভিনব কাণ্ড নহে, কেননা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর চিকিৎসকগণও এই চিকিৎসা করিতেন বলিয়া জানা যায়। উত্তরিক ও ব্রাণ্ড সাহেব শীতল জল প্রয়োগে অনেক ব্যাধি বিমোচন হয় দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু তথাপি ফুস্ফুস-প্রদাহের এই শীতল জল চিকিৎসা সমভাবে সকলে স্বীকার করেন নাই। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সদেশে শীতল জল কেবল সংক্রামক অব সন্দেহেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রায় দুই বৎসর হইল, ডাক্তার বার্থ সাহেবের চিকিৎসাধীনে জনৈক ৩৩ বৎসব বয়স্কার রমণী ছিলেন, তাঁহার দক্ষিণ ফুস্ফুসের উপবিভাগ (Apex) নিউমোনিয়া আক্রান্ত হয়, ক্লোরফর্মের লক্ষণচয় উপস্থিত ছিল, এবং ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শারীরোত্তাপ ১০৬.৫ (ফার) হয়। এই বিষম উত্তপ্তাবস্থায় ডাক্তার সাহেব রোগিণীকে শীতল জলদানে অতি চমৎকার ফল লাভ করেন।

এই মনোহর ফল প্রাপ্তির পরে তিনি স্বীয় ফুস্ফুস-প্রদাহগ্রস্ত ও অত্যাভাপ বিশিষ্ট জরাক্রান্ত সমুদয় রোগীদিগকে শীতলজলান বিধান করিতেন, কিন্তু স্বভাবতঃ এই চিকিৎসাপদ্ধতি দুর্বলতা, যান্ত্রিক পীড়া ইত্যাদি থাকিলে বিধেয় নহে।

এতদ্বিবন্ধন ইহা যুক্তিযুক্ত বটে যে শীতলজল প্রয়োগের পূর্বে আমরা রোগীকে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করি, তাঁহার দৈহিক যন্ত্রগুলি এই উপস্থিত শৈত্য প্রয়োগ সহ-নোপযোগী কিনা পূর্বেই তাহা স্থির করি এবং অনার্থ জলের তাপ অগ্রেই নির্ণয় করি। ডাক্তার বার্থ (Dr. Barth)

মহোদয় বলেন, ঈষদ্রুষ্ণ জলে জ্ঞান আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সেই জলের উষ্ণতা লাভ করিতে হইবে এবং সেই সময় কেফেইন-ইন্জেকশন ও স্পিরিটস সেবন করাইতেও ব্যবস্থা দেন।

সম্প্রতি ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল সংবাদ পত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৮৯১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখের ইণ্ডিপেন্ডেন্সিয়া মেডিকা (Independencia Medica) নামীয় সংবাদ পত্রিকায় মলিনার (Molmer) সাহেব নিউমোনিয়ার (Abor-tive) চিকিৎসায় বলিয়াছেন, ফুস্ফুস-প্রদাহ জীবাণুজনিত বোগ, জীবাণুগণ মুহূর্তে শতগুণ্য সঞ্চারিত হয়, ও এই পীড়াক্ষমতবে বৃদ্ধি পায়, তজ্জন্তু যে কোশলে সেই জীবাণুগণের সন্তান সন্ততি বৃদ্ধি না হইতে পায় ও যাহারা আছে তাহাদের বিনাশ সাধন হয় একরূপ উপায় প্রথম ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে করিলে অতি সুন্দর ফল উপলব্ধি হয়। তিনি বলেন, কৃত্রিম কুম্যণুপালন পরিদর্শনে ইহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে শৈত্য সংযোগে ঐ কুম্যণুদিগের বার্ষ্যপন্নতা ও বিবর্তন নষ্ট হইয়া যায়, এবারণ ফুস্ফুস-প্রদাহগ্রস্ত বোগীদিগকে বক্ষ্যেব যে অংশে উক্ত প্রদাহ প্রথম উৎপন্ন হয়, সেই অংশোপরি বৎকের বাহ্য প্রয়োগ ও শীতল সমীর সেবন করাই জ্ঞান-সম্মত চিকিৎসা। এই স্থানিক শৈত্য প্রয়োগে রোগের প্রতিকার সাধিত হয় কিনা তাহা ডাক্তার লীস (Dr. Lees) সাহেবের ফুস্ফুস-প্রদাহ চিকিৎসা তালিকা দর্শনে জানা যাইতে পারে।

ইদানীন্তন ডাক্তার লীস (Lees) ফুস্ফুস-প্রদাহ রোগে স্থানিক শৈত্য প্রয়োগ বিষয়ে বিশেষ উন্নতি প্রদর্শন করিয়াছেন। গত চারি বৎসর হইতে ডাক্তার মহোদয় যখন স্বযোগ পাইতেছেন বরফ ব্যাগ ব্যবহারে নিউমোনিয়া চিকিৎসা কবিত-ছেন। তিনি বলেন, এতদ্বারা অতিশয় ভীষ্ম ক্রিয়া করা হয় এবং এই আইস্-ব্যাগ প্রয়োগ রোগীরা পসন্দ করে। তিনি এই চিকিৎসা পদ্ধতি-ক্রমে ১৮ জন ফুস্ফুস-প্রদাহগ্রস্ত রোগীকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন; তাহাদিগের মধ্যে কেহই মরে নাই। এই ১৮ জন বোগীর মধ্যে দুই জন রোগীতে উক্ত আইস্-ব্যাগ প্রয়োগ না করিলে নিশ্চয়ই মরিয়া বাইত এবং অপর দুইটা রোগীকে আইস্-ব্যাগ প্রয়োগ করা হয় নাই, তাহারা মরিয়া যায়। যে সকল রোগীদিগকে বরফ-ব্যাগ প্রয়োগ করা হয় তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই বরফ-ব্যাগ ব্যবহার করার পর হইতে বিশেষ উন্নতি লাভ হইয়াছিল। বরফ-ব্যাগ প্রয়োগ মাত্র এই শারীরোত্তাপ আচার্য্যরূপে হ্রাসতা প্রাপ্ত হয়। নাইমেয়ার সাহেব বলিয়াছেন, কোল্ড-কম্প্রেস প্রয়োগে সম্পূর্ণ এক তাপাংশ তাপ কমিয়া যায় কিন্তু এই বরফ-ব্যাগ প্রয়োগে ৩ ডিগ্রী, ৪ ডিগ্রী অথবা কখন কখন ইহা হইতেও অধিক পরিমাণে উত্তাপ হ্রাস হয়। বরফচাপ স্বাভাবিক প্রযুক্ত হওয়ার পরে যদি কখন উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, তবে সর্বদা পূর্বকার উত্তাপ হইতে ন্যূন হয়; আর যদি প্রযুক্ত স্থান হইতে বরফ-ব্যাগ উত্তোলিত করিলে

উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়া পূর্বকার অপেক্ষা অধিক তাপাংশ পর্য্যন্ত হয়, তবে পুনরায় প্রয়োগে ঐ উত্তাপ সম্বরই কমিয়া যায়। এই চিকিৎসায় যে কেবল উত্তাপ হ্রাস হয়, এমন নাহ, অনেক রোগীর আঙ্গিক ও সার্ভাসিক লক্ষণাবলীও উপকার করে। কোন কোন সামান্যরূপ আক্রান্ত রোগীকে বরফ-ব্যাগ প্রয়োগে কখন কখন তৎক্ষণাৎ রোগীর বোগান্ত হইয়াছে। ব্রাঙ্কোনিউমোনিয়া আক্রান্ত দুইটা শিশুও চিকিৎসা রোগের অতি প্রথমাবস্থায় আবস্ত করায় শিশুদ্বয় তৎক্ষণাৎ প্রতিভার পাইয়াছিল। ডাক্তার লীস সাহেব ফুস্ফুস-প্রদাহ বোগে বরফ ব্যাগ প্রয়োগ কবিয়া কখন কোন অনিষ্ট উৎপন্ন হইতে দেখেন নাই, কেবল একটা টাইফয়েড বোগীর শীতাহুত্ব ও মুখশ্রী রক্ত শূন্যতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহা উত্তাপ ও স্ফূর্তি প্রয়োগে বিদ্রবিত হইয়াছিল। ফুস্ফুস-প্রদাহে বরফ ব্যাগ প্রয়োগে এবিধ দুর্ঘটনা শিশু ও দুর্বল বোগীদিগেরই ক্ষতিবার বিশেষ সম্ভব। এজন্য অতি সতর্কতার সহিত রোগীর শারীরোত্তাপ পরীক্ষা করিতে হইবে; যদি রোগীর শারীরোত্তাপ ১০০ ডিগ্রী তাপাংশ পর্য্যন্ত হয়, তবে বরফ-ব্যাগ রোগীর প্রযুক্ত স্থান হইতে উত্তোলন করিতে হইবে, পুনরায় একণত দুই তাপাংশ পর্য্যন্ত হইলে পুনর্বার বরফ-ব্যাগ প্রয়োগ করিতে হইবে। এই দুর্ঘটনা দূরীকরণার্থে বরফ-ব্যাগ প্রয়োগ কালে কোন কোন রোগীকে চরণে বা উদরে তাপ প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত জানিবেন।

ফুস্ফুস-প্রদাহ রোগে বরফ-ব্যাগ বন্ধে বাহ্য ব্যবহার করিতে গেলে জ্বরের সম্ভব

জ্ঞানে যেন প্রয়োগ না করা হয়। ডাক্তার মহোদয় দুর্বল শিশু, বৃদ্ধ ও অন্যান্য তেজোহীনাবস্থায় বরফ-ব্যাগ প্রয়োগ করিতে বলেন না। এতদ্ব্যতীত আর সমুদয় রোগীতে এই চিকিৎসায় সুফল প্রাপ্তি হয় বলিয়া ডাক্তার সাহেব স্বীকার করেন।

ডাক্তার ফুস্‌ফুস-প্রদাহ বোগে ডাক্তার গুড্‌হাট সাহেব ১৮ মাস পর্যন্ত বরফ-ব্যাগ বাহ্য ব্যবহাৰ করিয়াছেন এবং ১৮টি রোগীর বিবরণে এইরূপ বলেন যে, ৮টি বোগীতে অত্যন্ত ফল প্রাপ্তি হইয়াছিল, কাস ও তাহাদের শাবীবোতাপ সম্বন্ধে হ্রাস হয়, নাড়ীর বেগপ্রার্থার্থে মান্দ্য আনয়ন করে এবং রোগান্ত্য দুর্বল অবস্থা শীঘ্রই উপস্থিত করিয়াছিল। অবশিষ্ট ১০টি রোগীর মধ্যে ৭ টির কোন উপকার হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না এবং অপর ৩টি রোগীর অল্প কাল স্থায়ী পতনাবস্থা উপস্থিত হয়। ফুস্‌ফুস-প্রদাহ যদি ফুস্‌ফুস আবরণ প্রদাহের সহিত এক সঙ্গে এক রোগীতে উপস্থিত থাকে তবে বরফ-বস্‌গবাহ্য প্রয়োগে কোন বিশেষ ফল পাওয়া যায় না।

ডাক্তার লীস সাহেব যেমন বরফ-ব্যাগ প্রয়োগের পক্ষপাতী, যদিও অন্যান্য চিকিৎসকগণ তেমন ইহার পক্ষপাতী নহেন বটে, কিন্তু এই বরফ-ব্যাগ বাহ্য প্রয়োগে যে বেদনা দমন, উত্তাপ নমন, নাড়ী ও শ্বাস কার্যের বেগপ্রার্থার্থে মান্দ্য আনয়ন ও নিদ্রার উন্নতি সাধন সম্পাদিত হয় তাহা সর্ববাদীসম্মত। বরফ-ব্যাগ প্রয়োগের সুফল তত ভয়ানক নহে; কোন বোগীতেই প্রদাহকার্য বরফ-ব্যাগ প্রয়োগে বর্ধিত হয়

নাই, কেবল কোন কোন রোগীর শরীরে রোতাপ সম্বন্ধে হ্রাস হওয়ার নাড়ীর গতি মান্দ্য উপস্থিত হয়, মুখশ্রী বিবর্ণ ও হস্ত-পদাদি শীতল হইয়া যায়; কিন্তু এই প্রতিকূল লক্ষণনিচয় উত্তাপ প্রয়োগ ও ত্রাণ ব্যবহারে অবিলম্বে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পাঠক মহাশয়, অগ্রেই বলা হইয়াছে, “শৈত্য শ্লেষ্মা উৎপাদন করে, আবার সেই শৈত্য শ্লেষ্মাব জীবন করে” এই কথাটি কার্যে পরিণত হইয়া নিশ্চিত ও সত্য ভাবে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইল। আমাদের এই আংশিক জ্ঞান সহ আমরা মন-মন্দিবে জগদ্বিধায়িনী শক্তির পক্ষপাত রহিতা মূর্তি অদ্বিষ্টতা কবিত্তে পারি না? চিকিৎসা-কার্যে আমাদের অনেক সময় মনে রাখা কর্তব্য যে ব্যাধিক্রিয়া ব্যাধিবিমোচনের উপায়, যে কোন কারণে হউক, কাহারও ভেদ হইতে লাগিলে, কোন কোন সময় সেই রোগীকে হেচক ঔষধ প্রয়োগে প্রতি-কাব পাওয়া যায়, এবং শৈত্য সংযোগে কাশ হইয়া কিছু পনিমাণে শ্লেষ্মা কাশিতে কাশিতে উঠিয়া বাইতেছে, সময় সময় এমত বোগীকে শ্লেষ্মা নিঃসারক ঔষধ ব্যবস্থা কবিলে প্রতিকাব হয়। যদি শরীর সহনোপযোগী হয়, তাহা হইলে কিছুদিন পরে গীড়া নিজে নিজেই প্রতিকার প্রাপ্ত হইতে পারে। অনাহারে ও অনৌষধে অল্প উপশমিত হইতে বোধ হয় অনেকেই নয়ন গোচর করিয়াছেন। আমার স্পষ্ট স্মরণ হইতেছে আমার জনৈক পরমাত্মীয় বৃদ্ধ অনেক দিন হইল এক সময় অস্বাস্থ্য হইয়া আমাকে প্রত্যহ প্রাতে হাত দেখাই-

তেন; তিনি অনাহার ও অনৌষধে থাকি-
তেন, কিন্তু প্রত্যহ আমাকে তাঁহার হাত
দেখিতে হইত। আরর সপ্তম দিবসে
তাঁহার নাকী অনেকটা ভাল হইয়াছে
দেখিলাম; অষ্টম দিবসে মাড়ী প্রায় স্বাভা-
বিক হইয়াছে বলিয়া আমার নিকট বোধ
হইল, এবং নবম দিনে প্রাতে অন্ন পথ্য ও
ঈষৎ জলে স্নান করিবেন স্থির করিয়া অন্ন
ও জল প্রস্তুত করিতে আদেশ করিয়া
আমাকে হাত দেখাইলেন, তাঁহাকে অতি
উৎকৃষ্ট সুস্বাদু পাইলাম ও অন্ন পথ্য
করিতে কহিলাম; তিনি বলিলেন আমি
অন্ন পথ্যও করিব ও গরম জলে স্নানও করিব।
তিনি তদনুযায়ী স্নানাহার করেন কিন্তু
তাঁহার পুনরায় কোন অস্থি হয় নাই।
পাঠক মহাশয়গণ জানিবেন যে, বৃদ্ধ যে
স্থানে অরাক্ত হইয়াছিলেন সেই স্থান
অতি ৬ মাসক ম্যালেরিয়া পূর্ণ এবং ইতস্ততঃ
অনেকের অর হইতেছিল।

যে স্বভাব রোগোৎপাদনে সহায়তা করে,
আবার সেই স্বভাবের রোগনাশিনী শক্তি
আছে; কৃত্রিম কুম্যুপালন পরীক্ষায় পরী-
ক্ষিত হইয়াছে, কুম্যুগণ কোন বিশেষ

পরীক্ষাধার মধ্যে প্রথম ২৪ ঘণ্টার বৃত্ত
বহুল পরিমাণে সস্থান সন্ততিতে সংখ্যায়
বৃদ্ধি হয়, তৎপরে ২৪ ঘণ্টার আবর্তত বৃদ্ধি
হয় না; এরূপ ক্রমে ক্রমে সংখ্যা বৃদ্ধি
হইয়া কমিয়া যায়। অবশেষে আর এক
বাবেই উৎপন্ন হয় না। কথিত আছে, এই
পীড়া প্রবর্তক জীবাণুগণের জনন ও বর্ধক
কালে এক প্রকার বস্তু নিঃসৃত হয় এবং
সেই নিঃসৃত বস্তুই তাহাদের বিনাশনের
মহোষধ (১৮৯১ সালের ১৯ শে ডিসেম্বর
তারিখের ল্যান্সেট নামক সংবাদ পত্রের
১৩৮৫ পৃষ্ঠায় দেখ)। ইদানিস্থান পণ্ডিতেরা
প্রায় সকল পীড়ার কারণ এক প্রকার না
এক প্রকার কুম্যু বলিয়া থাকেন এবং
কুম্যু জনন ও বর্ধক সত্ত্ব উক্ত নিঃসৃত
পদার্থ তাহাদের ধ্বংস সাধন করে, সুতরাং
পীড়ার কারণ বা পীড়াই পীড়া উপশমের
বারণ হইতে পারে। এবিধ অজ্ঞমিত
ব্যবস্থাই হটক অথবা চিকিৎসা ফল
পরিদর্শনবলেই হটক, শৈত্যলংঘ্যে কুস্কুস্-
প্রদাহ জন্মিতে পারে এবং সেই শৈত্য
সংযোগে তাহার উপশম সাধিত হইতে পারে,
ইহা আমাদের বিশেষরূপ অবগতি হইল। •

• ডাক্তার লী ও ডাক্তার গুড্‌হাউ ও ডাক্তার বার্থ সাংযোগের বিষয় ১৮৯১ সালের
মেডিক্যাল ম্যাগাজিন দেখ।

চিকিৎসা-বিবরণ ।

দুইটা বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট
সতিচ্ছদ ।

লেখক—ঈশ্বর ভাঙ্গার গিরীশচন্দ্র বাগচী ।

নাম—বামা ; বয়স—২০ বৎসর ;—
সধবা ; জাতি—গোয়ালী, ব্যবসা—দধি,
দুগ্ধ বিক্রয়, নিবাস ২৪ পরগণা ।

পূর্বাৱস্থা—উপযুক্ত বয়সে যৌবন সঞ্চা-
রের অপবাপব লক্ষণ উপস্থিত হইলেও ঋতু
হয় নাই । বিলম্বে উপস্থিত হইবে মনে
করিয়া কতক দিন কোন চিকিৎসা কবে
নাই, কিন্তু ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অপেক্ষা
করিয়াও যখন রক্ত-চিহ্ন দেখা গেল না ;
তখন অগত্যা চিকিৎসকের আশ্রয় লইল ।
প্রথমে নানা লোকের পৰামর্শ মত অনেক
ঔষধ সেবন করিয়া ফল না পাওয়ায় শেষ
একজন ডাক্তারের আশ্রয় লয় । তিনি
নানা রকম ঔষধ সেবন করিতে দেন ;
এমন কি, স্তনে এবং তলপেটে ব্রিষ্টাব দ্বারা
ক্ষত পর্য্যন্ত করিয়াও কৃতকার্য্য না হওয়ায়
চিকিৎসা জন্য কলিকাতায় আইসে ।
ঋতুর নির্দিষ্ট দিনে স্তনে এবং সমস্ত শরীরে
কেবল মাত্র বেদনা অনুভব করিত ।

অন্ত্রকালীন অবস্থা—রোগিণী দৃষ্টা,
পৃষ্ঠা এবং বলিষ্ঠা, শরীরের অন্যান্য গঠনের
তুলনায় স্তনদ্বয় তেমন বর্দ্ধিত নহে । স্তনে
এবং তলপেটে ক্ষতব দাগ আছে । অবশ্যব
দৃষ্টে অনেকটা পুরুষ প্রকৃতি বলিয়া অনুমিত
হয় । নিতম্বদ্বয় তত বিস্তৃত নহে । সমস্ত
যোনি প্রাচীর একখান পাতলা পর্দা দ্বারা

আচ্ছাদিত, ঐ পর্দার অন্তর্ভাগ জরায়ু
মুখে সংলিপ্ত জন্য উক্ত যন্ত্র অদৃশ্য ।
অত্যন্তরে তরল স্রাবের সঞ্চালন
অনুভবনীয় ।

অস্ত্রোপচার—ক্লোরফরম দ্বারা অচেতন্য
করতঃ উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া জাহ্নবয়
পৃথক ভাবে বক্ষঃপার্শ্বে একজন আবদ্ধ করিয়া
রাখিলেন । অপর একজন উভয় হস্ত
দ্বারা যোনি প্রাচীর পৃথক করিয়া ধরিণে
ফর্মসেফ্‌স দ্বারা টানিয়া ধরিয়া কাঁচি দ্বারা
চতুঃপার্শ্বে কর্তন করতঃ বহির্গত করা হইলে
দেখা গেল যে, ৪।৫ ইঞ্চি দীর্ঘ, স্থিতিস্থাপক,
স্বচ্ছ, পাতলা ঝিল্লির একটা থলীমাত্র ।
যোনি প্রাচীরের স্থানে স্থানে এবং জরায়ু
২-তম দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল, তাহা ছুরিকা
দ্বারা পৃথক করা হয় । তজ্জন্য কর্তিত
স্থান হইতে সামান্য রক্তস্রাব হইয়াছিল ।

রক্তস্রাব রোধ হইলে দেখা গেল—জরায়ু
অতি ক্ষুদ্রাকৃতি বিশিষ্ট, উভয় ঔষ্টদ্বয় প্রায়
সংলিপ্ত, অতি কণ্ঠে একটা বোঁপা শলাকা
জরায়ু মধ্যে প্রবেশ করান গেল, কিন্তু তৎ-
গত্বের এক ইঞ্চির কিঞ্চিদধিক মাত্র দীর্ঘ,
তন্মধ্যে কিছুই নাই । মৈত্রিকঝিল্লিতে
রক্তস্রাবের লক্ষণ বর্তমান ছিল । লিষ্ট
দ্বারা যোনিদ্বার পূর্ণ করিয়া রাখা হইল ।

৩য় দিন । যে যে স্থানে হাইমেন যোনি
প্রাচীরের সহিত সংযুক্ত ছিল, সেই সকল
স্থানে ক্ষত হইয়াছে । হাইমেনের আরম্ভ স্থলে
প্রাচীরের পরিধি খেঁচন করিয়া গোলাকার

একটা ক্ষত হইয়াছে। লিণ্টে কার্বলিক তৈল দ্বারা যোনিপথ রুদ্ধ করা হইল।

১২শ দিবস। অপরাপর স্থানের ক্ষত ক্ষতগুলি শুক প্রায়। কেবল আরম্ভ স্থানের পরিধি বেষ্টিত ক্ষতটি ক্ষতাক্রমে দ্বারা উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে তজ্জন্য তাহাতে কটিক দ্রব্য লাগাইয়া পূর্বের ন্যায় তৈলাক্ত লিণ্ট দেওয়া হইল।

২০শ দিবস। ক্ষত শুক হইয়া যোনিপথ সঙ্কুচিত কলিগাছে। লিণ্টের প্রসারী দ্বারাও তাহা রোধ করা যায় নাই।

২৫শ দিবস। রক্তোরক্ত প্রকাশ হইয়াছে এমত প্রকাশ কবিল। যোনিপথ সঙ্কুচিত।

৩০শ দিবস। বজ্রচিহ্ন দুই দিন মাত্র ছিল। শোণিত নির্গম অত্যন্ত সামান্য হইয়াছিল। যোনিদ্বার এত সঙ্কুচিত হইয়াছে যে, দুইটা অঙ্গুলি একত্রে প্রবেশ করাইতে কষ্ট হয়।

অতঃপর ইহা নিজে গ্রামে গমন করা হেতু অপর কোন সংবাদ জানা যায় নাই।

দ্বিতীয়ার বিবরণ ।

নাম—হিন্দু, কায়স্থ বর্ণের বয়সের কন্যা।

বয়ঃক্রম—১৬। সধবা, স্বতঃ হস্ত নাই।
নিবাস—জোড়শাকৌ, কলিকাতা।

পূর্ব বিবরণ—প্রায় এক বৎসর পূর্বে তলপেটে বেদনা হয়। কিন্তু কতক দিন তাহা কাহারও চিন্তাকর্ষণ করে নাই। অনেকেই ঋতু প্রারম্ভের লক্ষণ বলিয়া মনে করেন; ক্রমে তলপেটে ক্ষীভি, বেদনার আধিক্য, হ্রস্বগতা, স্খামান্য, কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইল। এই সময় চিকিৎসক

দেখান হইলে দুই একজন ঐ ক্ষীভিকে শুষ্ক নির্গম করেন এবং তদনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়, কিন্তু তাহাতে কোন উপকার না হওয়ায় নিম্নলিখিত চিকিৎসার বন্দোবস্ত হয়।

অস্ত্রোপচার কানীন অবস্থা—রোগিণীর বয়ঃক্রমানুযায়ী সমস্ত অঙ্গই সুবর্ত্তিত, কোমল প্রকৃতি। রক্তারত্নতা অল্প পাণ্ডু বর্ণের ন্যায় দেখাইতেছে। বহিঃদেশে একটা সামান্য নারিকেলের আকৃতির ন্যায় অর্কুদ আছে এমত অহুমান হয়।

অস্ত্রোপচার—ক্রোরোফরম দ্বারা অটো-তন্য করতঃ প্রথম রোগিণীর অবস্থার স্থাপন পূর্বক দেখা গেল—যোনি দ্বারের প্রায় দেড় ইঞ্চি উপরি ভাগে এক ঋণ কঠিন চর্ম দ্বারা যোনি পথ অবরুদ্ধ রহিয়াছে। ছুরিকা দ্বারা অমূল্যভাবে একটা ছেদ করায় মাত্র শুষ্কের ন্যায় বিকৃত রক্ত অজস্র ধাবে বহির্গত হইতে লাগিল। তৎ সন্ধে সন্ধে বহির্দেশস্থ অর্কুদটিও অদৃশ্য হইল। রক্তনিঃসারণ শেষ হইলে কার্বলিক জল দ্বারা সমস্ত যোনি এবং জরায়ু গহ্বর ধৌত করণান্তর জরায়ু সাউণ্ড দ্বারা তৎ গহ্বর মধ্যে প্রায় তিন ইঞ্চি দীর্ঘ নির্গম হয়। যোনি পার্শ্বস্থ হাইমেন চক্রাকারে ছেদন করতঃ বহির্গত করিয়া দেখা গেল যে, তাহার স্থিতিস্থাপকতা শক্তি অতি সামান্য, উপস্থিতি কঠিন, জৈব লালবর্ণ এবং পূর্ব বর্ণিত হাইমেন অপেক্ষা অত্যন্ত দুগ্ধ। তৎপর যণারীতি ঔষধ প্রয়োগ করা হইল।

এতৎপর আর এই রোগিণীকে আশ্বি দেখিতে পাই নাই।

মস্তব্য। উভয় রোগিণীরই অস্ত্রক্রিয়া
অগ্রসরিত অস্ত্রচিকিৎসক ক্রীকৃত রায়
রাম নাথরাম দাস বাহাদুর মহাশয়
কর্তৃক সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয়া রোগিণী
সম্পূর্ণ তাঁহারই কর্তৃত্বাধীনে ছিল এজন্য
আমি বিশেষ কোন বিষয় অবগত নহি,
দ্বিতীয়ার চাইমেন অস্বাভাবিক স্থল জনা
এত রক্তের ভার বহন করিতে এবং বৎসবা-
দিক কাল রক্তঃশোণিত বিকৃত হইয়া
অর্জুনদেব ভ্রম জন্মাইতে সক্ষম হইয়াছিল।
বালিকা অত্যন্ত লজ্জাশীলা এবং চিকিৎসক
ভ্রমযুক্ত না হইলে ইহাব এতদূর পবিণাম
হইত না।

প্রথমা রোগিণী সম্পূর্ণ আমার কর্তৃত্বা-
ধীনে ছিল। সতিচ্ছদ প্রতিস্থাপক এবং
পুনঃপুনঃ সঙ্গম ক্রিয়ায় ঐরূপ এঘটি গলি
নিশ্চিত হইয়াছিল, নতুবা ঐ রকম ধরণের
সতিচ্ছদেব বিবরণ কোথাও দেখিতে পাওয়া
যায় না। যোনি পরীক্ষাব যন্ত্র দ্বারায় প্রথমে
ঐ সতিচ্ছদ সহজে নির্ণয় হয় নাই। কেবল
জরায়ু মুখ আবৃত থাকায় ধৃত হইয়াছে।
রক্তঃশোণিতের অভাবেব সতিত ইহার
কোনই সংশয় নাই। কেননা এতদ্বারা
বজ্রঃ আবদ্ধ থাকিলে অস্ত্র ক্রিয়া কালীন
তাঁহা দৃষ্ট হইত। এত যুবতীর জবায়ুর
গঠন, অন্যান্য অবয়ব দৃষ্টে এরূপ অস্বাভাবিক
করা যাইতে পারে যে, আভ্যন্তরিক জননে-
স্ত্রের অসম্পূর্ণ গঠনই রক্তোভাবের
প্রধান কারণ। তবে সতিচ্ছদ দূরীকৃত করার
পর রক্তঃ প্রকাশ পাওয়ায় এই মাত্র বলিতে
পারা যায় যে, অস্ত্র ক্রিয়ায় এই উত্তেজনায়
অসম্পূর্ণভাবে সামান্য মাত্র রক্তঃ চিহ্ন প্রকাশ

হওয়া অসম্ভব নহে। অথবা ঐ শোণিত,
রক্তঃশোণিত নাও হইতে পারে।

ওভেরিয়ান সিস্ট।

লেখক—ক্রীকৃত ডাক্তার বোপেননাথ দ্বিঃ,

এম. আর. সি. পি (লণ্ডন)।

বোগী ক্রীলোক—ব.ক্রম ২৪ বৎসর;
জাতি—হিন্দু, বৈবর্ত্য; গৃহস্থের অন্তঃপুরিকা,
বিবাহিতা; নিবাস তমলুক, জেলা
মেদিনীপুর। ১৮৮৯ সালের ১২শে আগষ্ট
প্রথমে আমার চিকিৎসাধীন হয়।

পূর্ব বৃত্তান্ত—১৭ বৎসর পূর্বে একবার
রিমিটেটে ফিবার হয়, তাহাতে রোগিণী ২০
দিন শয্যাশায়ী থাকেন, এই সময় হিষ্টার
ফিটের ন্যায় ফিট দুই বার হইয়াছিল।
এট রোগের ১ বৎসর পর ৪ মাস সস্বা-
বস্থায় প্যারোটাইটিস হইয়া গুরুত্বাব
হয়। এই সময়ে প্যারোটাইটিস জন্য
মাসাধিক বিশেষ কষ্ট পান, উহা পাকে ও
চারিবার অপারেশন হয়। যদিও বেদনা,
ক্ষীতি অনেক পরিমাণে উপশম হইয়াছিল
তথাচ প্যারোটাইটি রিজনে একটা ক্ষত ও
নালী প্রায় এক বৎসরকাল ছিল। এই
সময়েও বোগীর পূর্বের ন্যায় হিষ্টারফিট
কয়েকবার হইয়াছিল। এতদ্বিধ অন্য
কোন কঠিন রোগ হয় নাই। রোগিণীর
পরিবারে স্বকুল, যন্ত্রা প্রভৃতি বংশ পর-
ম্পরাগত রোগের কোন বৃত্তান্ত পাওয়া
যায় নাই। এই ঘটনার পর দুই বৎসর
কাল বেশ ভাল ছিলেন, তৎপরে ডারেরিয়া
রোগে আক্রান্ত হইয়া তিন মাস কষ্ট পান।
রোগিণীর আর সন্তান হয় নাই, বহু কষ্ট

সময়ে হইয়া থাকে কিন্তু ঐ সময়ে বিলক্ষণ বেদনা অনুভূত হয় এবং প্রায় অতি অল্পই হইয়া থাকে ।

বর্তমান রোগের বৃত্তান্ত ।—

প্রায় ২৭ দিন হইল, ঋতু হইয়া গিয়াছে । উহার অব্যবহিত পরে কোষ্ঠ বন্ধ হওয়ায় সোণামুখি পাতা ও মাগনেশিয়া সটের জোলাপ লওয়া হয় । কিন্তু তাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় নাই । জোলাপের এক সপ্তাহ পরে দক্ষিণ ইণ্ডিয়াক রিজনে প্রথম অল্প বেদনা অনুভূত হয় । ঐ বেদনা বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে অসহ্য হইয়া উঠে । এক সপ্তাহের পূর্ব উক্ত স্থানে ক্ষীতি দৃষ্ট হয় তজ্জন্য ক্রমাগত পুলটিস দেওয়া হয় ও আন্তরিক হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক একে'না'ট ও বেগেডোনা প্রয়োগ করা হয়, উভাতেও রোগের কোন উপশম হয় নাই, বরং রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে । অনিবার্জন্য ক্লোব্যাং হাইড্রেট ও মরফিয়া প্রয়োগে ৩৪ ঘটনা অধিক নিদ্রা হয় নাই । কলিকাতা অসিবার ৪৫ দিন পর হইতে দিবারাত্রি আদৌ নিদ্রা হয় নাই । দক্ষিণ ইণ্ডিয়াক রিজনে একটা ছোট কমলানুবর ন্যায় ক্ষীতি দৃষ্ট হয় উহা অত্যন্ত টেণ্ডার ও বেদনাবৃত্ত এবং ঈষৎ লালবর্ণ । দক্ষিণ উক্রে দ্রাঘপুংগের ন্যায় বেদনা রোগের আরম্ভ হইতেই গ্রহিয়াছে এবং উহাতে মধ্যে মধ্যে অসহ্য ক্রম্প হইয়া থাকে ।

বৈকালে স্বল্প কল্প দিয়া প্রত্যহ অল্প অল্পই, সেই অল্প কোন কোন দিন প্রাতঃকাল ৮৯টা পর্যন্ত থাকে ।

কোষ্ঠ এক প্রকার পরিষ্কার হয় । অন্য কোন যন্ত্রের বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় নাই ।

১৯ আগষ্ট ৮৯—বৈকালে শারীরিক তাপ ১০১° ৪ ডিঃ ফারেনহিট, নাড়ী ১২০, ক্রীণ, শরীর দুর্বল ও এনিমিক ।

রোগ নির্ণয়—স্থানিক ক্ষীতি, বেদনা, ঈষৎ লালবর্ণ, কল্পের সহিত অল্প প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা উক্ত স্থানের ফোটক বলিয়া স্থির করিলাম এবং এম্পিরেটব দিয়া পূর্য বাহির করা বিধেয় তাহা রোগীর স্বামীকে জানাইলাম । ২১ আগষ্ট ডাক্তার রে কে পরামর্শ জনা ডাকান হয় । রোগীকে ক্লোরোফর্ম দ্বারা অচেতন করাষ্টয়া বিশেষরূপে পরীক্ষার দ্বারা ফোটকই সিদ্ধান্ত হয় । এম্পিরেট করতে কোন পূর্য নির্গত হইল না কেবল ৫৬ আউন্স ঈষৎ পীতবর্ণ তরল পদার্থ নির্গত হইল । তখন উহা ওডোরিয়ান সিষ্ট বলিয়া নির্ধারিত হইল, ডাক্তার রে (Dr Raye) বলিলেন, এই কষ্টের সূত্রপাত হইল । যদিও আমি এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইলাম বটে তথাচ আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, কোন পেগডিক-সেলুলাইটিস অথবা কোন ডিপএবসেস বা প্রদাহ ওভারির পশ্চাদিকের তত্ত্ব হইয়া থাকিবে, ওভেরিয়ান সিষ্টটা উহার আনুসঙ্গিক মাত্র । হুর্ভাগ্যক্রমে আমার ডেব্রাইনাল পরীক্ষা করিতে পারি নাই ।

২১ আগষ্ট বৈকাল—শারীরিক তাপ ১০০° ১ ডিঃ ; সে স্থানে পীতবর্ণ রা হইয়াছিল, তথায় অত্যন্ত বেদনা, টেন্ডারনেস কিয়ৎ পরিমাণে কম বোধ হইয়াছে ; ক্ষীতিও হ্রাস হইয়াছে ।

২২ আগষ্ট—শরীরতাপ স্বাভাবিক, কোষ্ঠ পরিষ্কার নহে, বেদনা প্রায় সেইরূপ, ক্ষীণত, উরতে ক্রাম্প ও বেদনা অধিক।

নিম্ন লিখিত ঔষধ দেওয়া হয়—

কালক্স সলফিউরেট ৫ গ্রেণ

পটাস আওডাইড ৪০ গ্রেণ

পটাস এসিটাস ২০ গ্রেণ

টিঃ পলপেটিং ১ ড্রাম

টিঃ পডফিলিন ১ ড্রাম

ডিঃ সিনকোনা ৮ আউন্স

উহাতে ১২টা দাগ করি। এক দাগ করিয়া দিবসে তিন বার সেবন বিধি।

লিঃ বেলেডোনা

লিঃ একোনাই

প্রত্যেক ২ আউন্স একত্র করিয়া দক্ষিণ উরতে মালিশার্থে দেওয়া হয়।

২৪ আগষ্ট—অর নাই। দক্ষিণ ইলিয়াক রিজনে দৃঢ় ক্ষীতি অল্পভূত হয়, অপাবেশনের পর যেটুকু কমিয়াছিল তাহা পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণ আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। বেদনা সেইরূপ। উরুর বেদনার কিছু মাত্র উপশম হয় নাই, ক্রাম্পস্ও মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। তজ্জন্য ক্লোরোফর্ম লিণ্টে ভিজাইয়া উরুর সমুদ্রাগে স্থাপন করিয়া কলাপাতা চাপা দিয়া ৫ মিনিট কাল রাখা হয়। উহাতে বেদনার অনেক উপশম হয় এবং পরদন হইতে বেদনা ও ক্রাম্প একেবারেই অপস্থত হইয়া যায়।

২৫ আগষ্ট—ইলিয়াক রিজনে বেদনা কিছুই কমে নাই, উরুস্থানে ডবল পরসার আকারে এমপ্ল্যাট্রুম ক্যাথারাইডিষের একটা বিলিটার দেওয়া হয়।

২৭ আগষ্ট—ইলিয়াক রিজনে বেদনা অনেক কম, আর একটা এমপ্ল্যাট্রুম ক্যাথারাইডিষ উহার সন্নিবৃত্ত স্থানে দেওয়া হয়। মিক্চার পূর্বের ন্যায় চর্চিত হইতে।

২৯ আগষ্ট—ইলিয়াক রিজনে বেদনা কিয়ৎ পরিমাণে কমিয়াছে। ক্ষীতিও কিছু কম বোধ হয়। ঋতু দেখা দিয়াছে। মিক্চার হইতে পডফিলিন উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং টিঃ পলপেটিং এক ডামের স্থলে দেড় ড্রাম দেওয়া হয়।

৩১ আগষ্ট—এইবার ঋতু আর কিছু বাড়িয়াছে এবং এই সময়ে বেদনাও অল্প ছিল।

৪ সেপ্টেম্বর—কোষ্ঠ কাঠিন্য অমুযোগ্য করায় এক আউন্স ক্যাঠারওয়েল দেওয়া হয় এবং মিক্চার বন্ধ থাকে।

৫ সেপ্টেম্বর—কোষ্ঠ বেশ পরিষ্কার হইয়াছিল কিন্তু কম্পের সহিত প্রবল অর হইয়াছে। শরীরতাপ ১০৪ডিঃ ফার্ন হিট, রোগী বিবমিষা বলিয়া থাকে।

সাধারণ কিবার মিক্চার সহিত টিঃ একোনাই ১ মিনির ও ডাইগিউট হাড্রসিয়া-নিক এসিড ১ মিনিম দুই ঘণ্টা অন্তর দেওয়া হয়।

৬ সেপ্টেম্বর—শরীরতাপ ১০২ডিঃ ফার্ন, বেদনা অতি সামান্য আছে। ক্ষীতি অধিক কম হইয়াছে দেখিয়া আমি আশ্চর্য হইলাম।

৮ সেপ্টেম্বর—বত কল্য অল্প অর ছিল অদ্য সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কোষ্ঠ অপরিষ্কার। নিম্নলিখিত পিল দেওয়া হয়

কুইনাইন সল্ফ	৪ গ্রেণ
কার্বস সল্ফ	$\frac{3}{8}$ গ্রেণ
পলভ ইপিকাক	$\frac{3}{4}$ গ্রেণ
পডফিলিন বেজিন	$\frac{3}{8}$ গ্রেণ

এক্সট্রাক্ট জেনসিয়ান যথাপ্রয়োজন ;
একটা পিল বাধিবে। দিবসে তিনটা
খাইবে।

১১ সেপ্টেম্বর—আজ করেক দিন অব
মাই ; কোষ্ঠ ৪৫ বার হইয়া থাকে। পিল
বন্ধ করা হয় এবং ২৩ দিন আব কোন
ঔষধ দেওয়া হয় নাই।

১৬ সেপ্টেম্বর—রোগিণীর সকল কষ্ট দূর
হইয়াছে। ইলিয়াক রিজনে বেদনা, ক্ষীতি
বা কাঠিন্য কিছুই নাই। দক্ষিণ উরুর
বেদনা ও ক্রাম্প সকলই গিয়াছে। শয্যা
পরিভ্রমণ করিয়া অল্প চলিয়া বেড়াই-
তেছে। অনেক পরিমাণে সচ্ছন্দতা লাভ
করিয়াছে। রোগিণীর স্বামী বাড়ী যাইতে
ব্যগ্র দেখিয়া অগত্যা নিম্নলিখিত ব্যবস্থা
লাইলেন ও রোগিণীকে বাড়ী যাইতে অমুমতি
দেওয়া হইল।

কেরিপটাস টার্ট	৬০ গ্রেণ
পটাস আইওডাইড	৫০ গ্রেণ
টিঃ কলবা	৭ ড্রাম
স্পিরিঃ এমন এরোমেট	৫ ড্রাম
টিঃ জিঞ্জার	৬ ড্রাম
ইঃ কোয়াসিয়া	১২ আউন্স

একত্রে মিশ্রিত করিয়া উহাতে ১৬টা
দাগ করিবে। এক দাগ করিয়া দিবসে
দুই বার সেবন বিধি।

পলভ ইপিকাক	৪ গ্রেণ
------------	---------

কার্বস সল্ফ	৬ গ্রেণ
সিবাট অকসিলাই	১২ গ্রেণ
এক্সট্রাক্ট নক্সটমিকা	৪ গ্রেণ

পিল এলোজ এট্ফেবি ১ ড্রাম মিশ্রিত
করিয়া ২৪টা বটিকা বাধিবে, একটা প্রতিদিন
শয়নকালে খাইবে।

রোগিণী উক্ত ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ গ্রাহ
দুই মাস সেবন করে। মধ্যে মধ্যে রোগি-
ণীর সংবাদ আতও পাইয়া থাকি। শেষ
সংবাদ ১৮৯২ সালের জানুয়ারি মাসে পাই-
য়াছি। রোগিণী সম্পূর্ণ ভাল আছে।
ডাক্তার রেও আমি যে আশঙ্কা করিয়া-
ছিলাম ওভেরিয়ান সিষ্ট পুনঃ প্রকাশিত
হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে এবং অপারেশন
ভিন্ন আবোগ্য হইবে না তাহা সৌভাগ্য
ক্রমে ঘটে নাই। আশা করি, উক্ত
দুর্ঘটনা ঘটিবে না।

মন্তব্য—প্রথমতঃ যদিও আমাদের ডায়াগ-
নোসিস ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রতীত হইয়াছে
তথাচ আমি স্থানিক প্রদাহ ওভেরিয়াম
সিষ্টের সহিত বর্তমান আছে স্থির নিশ্চয়
ভাবিয়া কার্বস সল্ফ দিয়াছিলাম। আমি
ইহা অনেক রোগীর প্রদাহ ও ফোঁটকে দিয়া
সুফল পাইয়াছি। ষড়্ বৈলক্ষণ্যে লাইকার
কলোফিলিএট পলসেটিলা কোঃ ও কেবল
পলসেটিলা বিশেষ উপকারী দেখিয়া এই
স্থলে পলসেটিলা দিয়াছিলাম। আইওডাইড
দৈহিক অলটারেটিভ ও নিঃসৃত রস শোষক
বলিয়া এস্থলে দেওয়া হয়।

অপারেশনের পরে যদিও ক্ষীতি কিয়ৎ
পরিমাণে কমিয়াছিল বটে, তথাচ ২৩ দিন
পরে উহা পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, ঔষধ ও স্থানিক বিলিঙারে কীতি, কাঠিন্য ও বেদনা সকলই অপহৃত হইয়াছে। উক্ত ঔষধের মধ্যে কোনটা যে কি কার্য্য করিয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। ক্রোনোকরম স্থানিক প্রয়োগে যে মাসাবধি স্থায়ী দক্ষিণ উরুর

অসহ্য বেদনা ও ক্রাম্প একেবারে অপহৃত হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। উপসংহার স্বপ্নে একথা বলিতে পারি যে, এই কেসটা সাধারণ শ্রেণীর নহে এবং ইহাতে ভাবিবার বিষয় ও শিক্ষার বিষয় অনেক আছে।

ইংরাজী সাময়িক পত্র হইতে গৃহীত ।

একটা কেশহীন রোগী দ্বারা কেশ-
হীনতা রোগে পাইলোকার্পিণের
ব্যবহার সপ্রমাণিত ।

লেখক—লিওল্ড সার্জন বি.ডি. বয়, চাই, এম. এস.,
নিউচমন, বেল্জিয়াম।

নাম—, রোগী নিউচমনবাসী জটনক পান্সারী পাল চৌধুরী, বয়স ৩৫ বৎসর; এলোপেসিয়া (alopacia) রোগ চিকিৎসার্থে ১৮৯১ সাল ২০ শে আগষ্ট তারিখে আমার নিকটে আগমন কবে। রোগী কছিল, ২৫ বৎসর পূর্বে ১০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে নিজে সপর্ধ্যায় অরে আক্রান্ত হইয়াছিল। অর উপশম হইলে কেশচর উদ্ভূ-
লিত হইয়া পড়িয়া গেল এবং সেই অবধি রোগীর মস্তক কেশবিহীন। দাড়ী বা গোঁপ কখন জন্মে নাই। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম অক্ষিপুট পত্রকেশ ভিন্ন রোগীর মস্তক, ক্রমশঃ, কক্ষ গম্ভব ও পিউবিল প্রদেশ প্রভৃতি অঙ্গে কোথাও কেশ পাইলাম না। আমার

অরণ হয় না যে এরূপ কেশহীন লোক আর কখন দেখিয়াছি। বোগী অনেক চিকিৎসা-
সালয় ও অনেক চিকিৎসকের নিকটে চিকিৎসার্থে গমন করিয়াছে এবং বহুবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছে কিন্তু কোন উপকার দর্শে নাই। কাহারাইডিসের কোন প্রভুত ঔষধ উপস্থিত না থাকায় আইওডিন অয়েন্টমেন্ট প্রয়োগ করিলাম কিন্তু কোন ফল প্রাপ্ত হইলাম না; পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া লাইবর এমন কেশির মস্তক ও অন্যান্য কেশহীন ংদ্রে বাহ্য প্রয়োগসহ লাইবর ট্রিক্লিন ১০ মিনিম দিনে তিন বার ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। এতদ্বারাও কোন উপকার উপলব্ধি হয় নাই এবং এভির আবণ্ড অনেক প্রকার উদ্ভেদক লিনিমেন্ট ও অয়েন্টমেন্টও ব্যবহার করিতে দেই, কিন্তু কিছুতেই কোন উপকার হইল না।

১৮৯১ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখ হইতে আমি রোগীকে পাইলোকার্পিণ দ্বারা চিকিৎসা করতঃ পরীক্ষা করিয়া দেখি-
তেছি।

নাইটেট আন্ড পাউলোকার্পিগ শতকরা ৪ ভাগ জব ও মিনিম পবিসংগে মস্তকোপরি প্রত্যেক পবদিবসে চিকিৎসা দ্বারা অধো-দ্ব্যতিক প্রবেশ এবং উক্তক্ৰম বিনিষ্ট দ্বাৰা অন্যান্য বংশহীনাদি পানক বাহ্য প্রবেশ কপে, ব্যবহার করা হয়। বেগী বোন ওষধ সেবন করিতেছে না। বহুমান দিন পর্যন্ত (৭ই ডিসেম্বর ১৮৯১) উক্ত ওষধ প্রবেশ করা চরিত্র হইতে এবং এই চিকিৎসা সূত্রে পরিণত হইয়াছে। মস্তক প্রায় দুই ইঞ্চি দীর্ঘ বেশাবী দ্বারা আবৃত হইয়াছে এবং অন্যান্য সৰল স্থানে ও কেশ প্রকাশ হইয়াছে। উৎপন্ন বেশ-ক্ষান্তি প্রথমতঃ বর্ণহীন কিন্তু এক্ষণে ক্রমশঃ গাঢ় তিমিরাভ ভাব অবলম্বন করিতেছে। এ পর্যন্ত পাউলোকার্পিগ প্রয়োগে কোন কাম্বিক গোণযোগ উৎপন্ন হয় নাই। কনী শিকা বিক্লিৎ কৃষ্ণ হইয়াছে এবং মাধ্যম দৃঢ়করা ভাব অল্পভব হইতেছে। এই পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় বোগগ্রস্ত ব্যক্তির উক্ত ওষধ ব্যবহারে যে আশা অধিক উপকার হইবে তাহা আমি বিবেচনা করি না এবং এই পুনঃ কেশোৎপত্তির স্থায়িত্ব বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়।

পাইলোকার্পিগ দ্বারা কেশহীনতার চিকিৎসা যে অভিনব, তাহা নহে। প্রাক্টিশনার (Practitioner) নামক সংবাদ পত্রে পাইলোকার্পিগ দ্বারা কেশহীনতা চিকিৎসার কতকগুলি সূক্ষ্ম প্রাপ্তির উল্লেখ দেখা যায় কিন্তু কি ইংলেণ্ডে কি এই ভারতবর্ষে আমি যত্নবান পাইলোকার্পিগ দ্বারা কেশহীনতার চিকিৎসা আজ পর্যন্ত যে পরিমাণে

করা কল্পনা তাহা করা হয় নাই। এখানে সাধারণতঃ উওজক লিনিমেন্ট ও অরল্ট মেন্ট সন্নিব যথা, কাথবার্টিডিস, আইসো-ডিন, 'মিটিসি', ও পেট্রোলিয়াম স্পিরিট, ব্যবহার হইয়া থাকে। হিন্দু এবং মুসলমান চিকিৎসকগণ 'সিমিকার্পাস ভিম্বেরা' (Semicarpus anacardium) তৈল বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন কিন্তু পাইলোকার্পিগেব প্রেষ্টতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে অন্যান্য ওষধে ঘোষা ও বেরনা উৎপাদন করে। মূত্র ও জননেন্দ্রিয়ের অতি-জনক দ্বাশাশায় বিশেষতঃ কাথবার্টিডিস বহুদিন ব্যবহার করা যাব না এবং এবস্থির ওষধ বাহ্য প্রয়োগে মুখমণ্ডলাদি বাহ্য স্থানের বিকৃতি উৎপাদন করে বলিয়া ব্যবহার করা হইতে পারে না। কাথবার্টিডিস এবং অন্যান্য ওষধ অপেক্ষা পাইলোকার্পিগ প্রয়োগে নিম্ন লিখিত সুবিদগুণ পাওয়া যায়।

(১) প্রয়োগে বেরনা বা কোষ্ঠা হয় না।

(২) বাহ্যিক সন্নিব বিকৃত হয় না।

(৩) কাথবার্টিডিসের মত কোন কাম্বিক গোণযোগ উৎপাদন করে না।

ইহা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় যে ভাবতবর্ষে পাইলোকার্পিগ দ্বারা কেশহীনতা চিকিৎসা করিয়া দেখা হয়।

(Ind, Med, Rec, Jan-92)

সম্পূর্ণ লক্ষণাভাবযুক্ত ফুস্‌ফুস- ক্ষত বিশিষ্ট একটি রোগী ।

লেখক—প্রভাতীপুর হিল জেলের সুপার্টেণ্ডেন্ট ও
ডাক্তার হেনরী ছেভারসন সাহেব ।

১৮৯১ সালের ২৫ জুন তারিখে ৩৮
বৎসর বয়স্ক মধু নামক জর্মনিক বোগী প্রভাতী-
পুর হিল জেল হাসপাতালে ভর্তী হয়,
বোগীর স্বক্কেব দক্ষিণ দিকে, কক্ষগহ্বরে
এবং ক্রোটম ও পিনেসেব চতুর্দিকে রুপিয়া
ক্ষতের মত ক্ষত বহিয়াছে, ক্ষতগুলো শুষ্ক
বঠিন, ও কোণাকাব ক্ষতাবরণ দ্বারা আবৃত,
দস্তমূল ঈষদ্বিবর্ণ, যাত্ৰা হ্রস্বব নহে; পূর্বে
বোগীর একবার উপদংশীয় ক্ষত হইয়াছিল ।

চিকিৎসা :—

পিল, হাড্‌জার্মাই—৫ গ্রেণ

দিনে দুইবার ।

পথ্য :—ফুল ডায়েট ।

বাহ্য প্রয়োগ—সিট্রন অয়েন্টমেন্ট ।

এই জুলাই তাবিখে বোগী গলদেশে
অসুখ বিবেচনা করে ও মুখে তাম্রাস্বাদ
প্রাপ্ত হয় । দস্তমূল কিয়ৎপরিমাণে ক্ষীত
ও রক্তাধিক্যবিশিষ্ট হইয়াছে । পিল রহিত
করা হইল; দিনে তিনবার আয়োডাইড
অফ পটাশিয়াম প্রত্যেক বারে ৫ গ্রেণ
করিয়া ব্যবস্থা কবা হইল । ১৬ই জুলাই
তারিখে রোগী সম্পূর্ণরূপ আবাগ্য লাভ
করিয়া হাসপাতাল হইতে বিদায় প্রাপ্ত হয় ।
বোগী পুনরায় ৯ই সেপ্টেম্বর তাবিখে অব্যে
পীড়িত হইয়া ভর্তী হয়; শরীবোতাপ
১০৩ ডিগ্রি নাড়ী পূর্ণ ও উল্লক্ষন সহ চলি-
তেছে; গায়ে কোন চর্ম বোগ চিহ্ন নাই;

কোথাও বেদনা নাই । হাসপাতাল হইতে
বিদায় প্রাপ্ত হইয়া উপস্থিত পীড়িতাবস্থা
না হওয়া পর্যন্ত রোগী বেশ ভাল ছিল ।

প্রথমে সাধারণ ঘর্ষকারক ঔষধাবলী
দ্বারা রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ করা হয়,
কিন্তু তাহাতে উত্তাপ সমতাব থাকায়
এন্টিফেব্রিণ দেওয়া হইয়াছিল ।

এন্টিফেব্রিণ প্রয়োগে উত্তাপ স্বাভা-
বিক হয় কিন্তু সন্ধার সময় ১০৩° ডিঃ হইয়া-
ছিল । রোগীকে তৎপরে কুইনাইন ও পাটাল
ব্রোসাইড ও ঈষদ্রুষ্ণ জল দ্বারা গাত্র
মুচাইয়া দেওয়া হয় । পর দিন উত্তাপ
১০০° ৪° ডিঃ হয় এবং তবল মল নির্গত হইতে
আবস্থ হইল । ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে
বোগীর আব জ্বর ছিল না কিন্তু রোগী
অত্যন্ত দুর্বল । এ অবস্থায় তাহাকে ব্রুথ
দ্রুষ্ণ এবং উত্তেজক ঔষধ ব্যবস্থা করা হয় ।

তবল মল নির্গত হইতেছে, কিন্তু রোগী
কোন বেদনা বা কাশের কথা বলে না,
আহারীয় খাইত । অসাড়ে মলমুত্র ত্যাগ
করিত এবং ১লা অক্টোবর তারিখে মরিয়া
যায় ।

মৃত্যুস্ত-পরীক্ষাঃ—দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের
মধ্য-খণ্ডের সমুখ ও নিম্নদেশে সুবিশীর্ণ
ক্ষত । ক্ষত পুরু সুফীডিস্‌চার্ভ দ্বারা আবৃত;
প্রায় $\frac{1}{2}$ ইঞ্চ গভীর; মধ্যখণ্ডে অগ্রপক্ষা-
ভাবে মধ্যস্থানে স্থিত প্রায় $\frac{1}{2}$ ইঞ্চ ব্যাসযুক্ত
একটি নালী; এবং সমুদয় দক্ষিণ ফুস্‌ফুস
কঠিন ও রক্তাধিক্যবস্থা প্রাপ্ত ।

বাম ফুস্‌ফুস ঈষদ্রুষ্ণাধিক্যবিশিষ্ট, প্রায়
নচেৎ অন্যপ্রকারে হ্রস্ব আছে । যক্‌ৎ প্রাণী
ঈষদ্বর্জিত । অন্যান্য বস্তু সকল স্বাভাৱিক ।

মন্তব্য—আশ্চর্যের বিষয় এই যে রোগী কখন বেদনা বা কানের কথা জানায় নাই, না, এমনত কোন বাহ্য লক্ষণ ছিল যে তদ্বারা আমরা বোগীব ফুস্ফুসেব ভিত্তি এত ভয়াবহ অনিষ্ট হইতেছে বলিয়া অনু-

মান করিতে পারি। এই রোগ যে উপ-দংশজাত কাবণসম্বৃত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

(Ind Mad. Rec., March 1892)

ব্যবস্থাপত্র ।

সেপক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিবীশচন্দ্র বাগচী।

বসন্ত-রোগীর জন্য ।

R

জাইলোল	...	..	১০	গ্রান
মিন্‌থল	..	..	১	"
ভাইনম্‌ গ্যালিসাই			১	ড্রাম
সিরপ সিনামোমাই	...	১	"	
পরিষ্কৃত জল	..	..	১	আং

একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা ।

রোগীর অবস্থানুসারে প্রতি ২১৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে হইবে।

জাইলোল (Xylol) একটা নবা-বিষ্কৃত ঔষধ। সুতবাং এতৎ সম্বন্ধে অনেকেই কোন তথ্য অবগত নহেন বিবেচনার কিছু লেখা আবশ্যক মনে করিলাম।

জাইলোল—খনিজ কয়লার আল-কাতরা উৎপন্ন ন্যাক্‌থল (Naphthol) হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। রাসায়নিক উপাদান—জলজান এবং অক্সিজেন।

ইহা বিশেষ সফল এখন পর্যন্ত বিশেষ

কোন তথ্য আবিষ্কৃত হয় নাই তবে পচন-নিবারক এবং অল্প উত্তেজক হইয়া কার্য্য করে।

মাত্রা ১০ হইতে ১৫ মিনিম।

ডাক্তার ওট্‌ভাস সাহেব বলেন যে, জাইলোল বসন্ত রোগীর পক্ষে অতি উত্তম ঔষধ। তিনি ৩১৫ জন রোগীর চিকিৎসা করিয়া বিশেষ সন্তোষজনক ফল লাভ করিয়াছেন। উপরোক্ত ব্যবস্থাপত্র তাঁহা-বট মতানুযায়ী। টাইফস্, টাইফয়েড, মলিপাত, স্থতিকাক্ষর বিকার প্রভৃতিতে যখন জীবনীশক্তি ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আইসে শরীরেব রক্ত দোষিত হওয়ার রোগী অব-সন্ন হইয়া পড়ে। অথবা নানা প্রকার ক্ষতাদি হইতে অত্যধিক পুষ্টি নিঃসরণ এবং পুষ্টি শোষিত হইয়া রক্ত দোষিত করে, তখন অনেকেই সোডিয়াল্‌ফ কার্বোসেটিস ব্যবহার করিয়া থাকেন। বসন্ত বোগীর তজ্জন্য অবস্থার জাইলোল বিশেষ উপকারক।

প্রিস্ক্রিপশন্স ।

১। অশ্ব রোগে আলিংহামেব মলমঃ—

R	
বিসমণ সানবাট্টাস	১ ড্রাম ।
হাইড্রাজ সাল্ফারাইড .	২০ গ্রেণ ।
মর্ফাইনাই .	৩ গ্রেণ ।
মিসিবিনাই .	২ ড্রাম ।
ভ্যাসেলিনাই ..	১ আঃ ।

মিশ্রিত করিয়া পাইল পাইপ দ্বারা ব্যবহাৰ
করিতে হয় ।

(Ind Med Rec Janv 1892)

২। রজোহীনতা—

বাই ক্রোবাইড অব্ মার্কবী . .	৩ গ্রেণ ।
আর্সিনাইট অব্ সোডিয়াম	৩ ”
সাল্ফেট অব্ ষ্ট্রিক্‌নাইন	১ ½ ”
কার্বনেট অব পটাস	৪৫ ”
সাল্ফেট অব্ আয়রন	৪৫ ”

এতদ্বারা ৬০ টি বটিকা প্রস্তুত করিয়া
প্রত্যেক বাব আহারান্তে এক একটা বটিকা
সেব্য ।

(Ind Med Rec Janv 1892)

৩। মূত্রাধার প্রদাহ বা দিস্টাইটিস

R

অধ্যাপক ব্যাংস দিস্টাইটিস পীড়া

চিকিৎসায় মূত্রাধার বোরো-স্যালিসিলিক
দ্রব দ্বারা ধোত করতঃ নিম্ন লিখিত
আয়োডোকর্ম-ইনাল্‌শনেব ১ ড্রাম হইতে

৩ ড্রাম পর্য্যন্ত ইঞ্জেকট করেনঃ—

আইয়োডোকর্মাই . . .	২ ড্রাম ।
মিসিবিনাই—	১/৪ আঃ
মিউসিগ একেসিই . . .	ঐ

জল (সর্বসমেত) . . ৮ আঃ
আইয়োডোকর্ম মিউসিগেজ সহযোগে মর্দন
পূর্বক মিসিবিন এবং পবিশেষে জল যোগ
করিতে হইবে ।

(Ind Med Rec Janv. 1892.)

৪। পুৰাতন বাতজ উপসর্গে স্যালল

R

কোন কোন প্রকার অল্প দিনের পুরা-
তন বাতবোগেব বেদনা স্যালল দ্বারা
উপশান্ত হয় এবং বোধ হয় অনেক
পুৰাতন বাত বোগজ ক্ষতিও এতদ্বারা
গমন হয়। স্যালল দিবসে দুইবারে ৪৫
হইতে ৬০ গ্রেণ পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে,
ক্যাপসিউল প্রস্তুত করিয়া আহারের প্রায়
তিন ঘণ্টা পবে সেবন করা শ্রেয়ঃ ।

(Ind Med Rec. Janv 1892)