

নব ঔষধাবলি ।

১০। এসিড পাইরোগ্যালিক
(Acid Pyrogallie)

টেরিলো সাহেব এই ঔষধ উপদংশীয় ক্ষতে শতকরা ২০ ভাগ মলম দিনে একবার বা দুইবার প্রয়োগ করিবাব প্রশংসা করেন। প্রথম বার প্রয়োগের পরে ক্ষতের বিষভাব দূর হয়। মলম বাতাপ্রবেশ্য বোতলে রাখিতে হইবে।

১১। এসিড অক্সি-ন্যাফথোইক, (Acid Oxy-naphthoic) ।

ডাক্তার এ. শুকিং (Dr A Schucking) একটা বিয়ানা মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশ করেন যে, এই এসিডের পচনানবাবক গুণ আছে। ইহা দ্বিবৎসর বয়সবিশিষ্ট চূর্ণ, গন্ধ নাই, জলে দ্রব হয় না কিন্তু আল্ কোহল, ইথার, কষ্টিক অল্ ক্যালিস্, এবং আল্ ক্যালিন কার্বনেট সমূহে শীঘ্র দ্রব হয়। তিনি বলেন, ইহার এন্টিজাইমোটিক (antizymotic) গুণ স্যালিসাইলিক এসিড অপেক্ষা পাঁচ গুণ অধিক এবং আয়োডোফর্মের পরিবর্তে ইহা অনেক দ্রুত উত্তমরূপে কাণ্ড করিয়াছে।

ভেজোহীন ক্ষতাক্তের উপর চূর্ণরূপে ব্যবহার করিলে যুগ্ম কষ্টিক ও উত্তজ্জ্বলের কার্য্য করে। যোনি প্রদাহনার্থে তিনি

সল্ফেট অব সোডা সহ ইথার মিশ্র প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতেন।

১২। এসিড স্যালিসাইলিক, ন্যাচারাল, (Acid Salicylic, natural)

ইহা উইটাগ্রিনের তৈল চর্মেতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ডাক্তার এম. শাটারি (Dr M Chartens) এবং মিঃ ডবলিউ, ম্যাক্লেল্যান (Mr W Maclellan) এম. বি, অম্মসন্ধান করিয়া স্থিতি করিয়াছেন যে সচবাতন যে কৃত্রিম স্যালিসাইলিক এসিড পাওয়া যায় ও তাহার সোডিয়াম সল্ট সমুদয়তে অনেক দুর্ঘণীয় বস্তু মিশ্রিত আছে যাহা অধিক পরিমাণে সেবনে জন্মগণের প্রাণনাশক হইতে দেখা গিয়াছে এবং যে সকল দুর্ঘণীয় বস্তু থাকার উক্ত কৃত্রিম ঔষধ ব্যবহারে রোগিদিগের অস্বৈর্য্য ভ্রম ও প্রলাপ আদি উৎপন্ন করিয়া থাকে। এজন্য এই স্বাভাবিক এসিড ও তাহার সল্টস ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ, কারণ সেই সমুদয়ে এই সকল আপত্তি নাই। এই বিষয় ১৮৮৯ সালের ৩০ শে নভেম্বর তারিখের ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল সংবাদ পত্রে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

১৩। এসিড স্কেরোটিক (Acid Sclerotie)

ইহার অপর নাম এসিড স্কেরোটোটিনিক (Acid Sclerotinic) আর্গট অব রাই হইতেই প্রাপ্ত এক প্রকার চূর্ণ। কোবার্ট (Kober) বলেন ইহার প্রায় অধিকাংশ আর্গটোটিনিক এসিড (Ergotinic Acid) ইহা পীতাত্মক ধূসর বর্ণ বিশিষ্ট, জলে বেশ দ্রব হয় কথিত আছে আর্গটের মত কাৰ্য্য করে। অধোদ্বাচিক প্রয়োগের উপযুক্ত।

মাত্রা :— $\frac{2}{3}$ হইতে ১ গ্রেণ অধোদ্বাচিকরূপে।

১৪। এসিড ট্রাইক্লোরাসে- টিক, (Acid Trichloroacetic)

১৮৯০ সালের ১১ই জানুয়ারি তারিখে ল্যানসেট নামক সংবাদ পত্রে ডাঃ জে, মটিমার গ্রান্ভিল সাহেব বলেন এই ঔষধ দ্বারা মূত্রের আলবুমেন পবীক্ষা

করা যায়। ইহা দানাদার ও জলে দ্রবনীয়। এই ঔষধের এক অতি সামান্য অংশ টেষ্ট টিউবস্থ মূত্রে নিক্ষেপ করিলে মূত্রে আলবুমেন থাকিলে তাহা ঘোলা হইয়া যায়। ইহাতে অধ্যুস্তাপ দিতে হয় না। ১৮৯০ সালের ২২ শে মার্চ তারিখের ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল সংবাদ পত্রে ডাঃ ডি, এম্ রিস (Dr D. M. Reese) উপর্যুক্ত বিষয় স্বীকার করিয়াছেন।

ডাঃ এলমান (Dr. Ehrmann) সাহেব এই ঔষধ ১৪০টি পুস্তক প্রদাহ রোগী এবং নাসিকা ও ফ্যারিংস প্রদেশের নানাবিধ বিরুদ্ধি রোগে ব্যবহার করিয়াছেন ও ১২২ জন সম্পূর্ণ আবেগ্য লাভ করিয়াছেন। টনসিলস প্রভৃতি স্থানে ইহার দানা ঘর্ষণ করিয়া প্রয়োগ করিতে হয় এবং যদি ইহা হইতে তেজস্কর স্কেচক প্রয়োগ প্রয়োজন হয়, তবে ইহা গ্লিসেরিন সহ কিছু পরিমাণে আওডিন ও আয়োডাইড অব পটাশিয়াম মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

সংবাদ ।

সিঃ সার্জেন ও এপথিকারীগণ ।

পূর্ণিয়ার অফিসিয়েট সিঃ সার্জেন সার্জেন ডিঃ জিঃ ক্রফোর্ড সাহেব সাবণের সিঃ সার্জেনের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

সার্জেন আব, আর, এইচ, ছইটবেল সাহেব টিপাবা জেলের কার্য্য ভার ১৮৯২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের বৈকালে এঃ সার্জেন বাবু বজ্রিকানাথ মুগোপাধ্যায়কে অর্পণ করিয়াছেন ।

ডাঃ সিঃ এম, বাসেল সাহেব ১৮৯২ সালের ৩রা মার্চ তারিখের পূর্নাঙ্কে সিঃ জন, ই, ফিলিমোব সাহেবকে সাবণ জেশের কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন ।

১৮৯২ সালের ১লা মার্চ অপবাহে অনারাবী সার্জেন ডব্লিউ, এফ, ব্রাউন সাহেব হুমকার ইন্টার্মিডিয়েট জেলের কার্য্য ভার ডাঃ জে, কেলী সাহেবকে অর্পণ করিয়াছেন ।

কটকের সিঃ সার্জেন সার্জেন মেজার জে, এম, জোরাব সাহেব ৩মাসের প্রিভিলেজ লিড প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

নদিয়ার সিঃ সার্জেন সার্জেন এইচ ডব্লিউ, পিলগ্রিম সাহেব সার্জেন জে, এইচ, টি, ওয়ালশ সাহেবের স্থানে প্রিসিডেন্সি জেনারেল হাঁসপাতালে দ্বিতীয় রেসিডেন্ট সার্জনের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং উক্ত ওয়ালশ সাহেব উক্ত হাঁসপাতালে সার্জেন জে, ক্লার্ক সাহেবের স্থানে প্রথম রেসিডেন্ট সার্জনের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন

ক্লার্ক সাহেব নদিয়ার সিঃ সার্জেনের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

১৮৯২ সালের ১০ই এপ্রেল তারিখ হইতে চাম্পাবণেব সিঃ সার্জেন সার্জেন মেজাব আব, ম্যাকুরে সাহেব ৮মাসের বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

১৮৯২ সালের ১৬ই মার্চ তারিখের অপবাহে সার্জেন মেজার আব, কব্ সাহেব বর্ধমান জেশের কার্য্য ভার এঃ সার্জেন বাবু সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্পণ করিয়াছেন ।

১৮৯১ ১২ই নভেম্বর এপথিকারী ডব্লিউ, হোগ্যান সাহেব অস্থায়ী ভাবে দক্ষিণ লুশাই পার্কীয় প্রদেশে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

১৮৯১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর হইতে ১৮৯২ সালের ৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত এপথিকারী জে, এ, আন্টোনিও দক্ষিণ লুশাই পার্কীয় প্রদেশস্থ ফোর্টট্রেজিয়ার স্থানে কার্য্য করেন ।

১৮৯২ সালের ১লা এপ্রেল বা ইহার পরে যে কোনদিনে সুবিধা হয় সাওহেড্-সের ডাক্তার এঃ এপথিকারী এস, জি, অনীল সাহেব একমাসের বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন । এবং তাহার পদে এ, এ, এলিসন সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন ।

১৮৯১ সালের ২৭সে ফেব্রুয়ারী হইতে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালের এপথিকারী সিঃ জে, গিব সাহেব, ইতিয়া গভর্ণমেন্টের সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন

ইচাব পদে—এঃ এগণিকারী দ্বি, কারী
সাহেব পদস্থ হইয়াছেন ।

এসিষ্টেন্ট সার্জনগণ ।

১৮৯২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৫কাল
হইতে এঃ সাঃ বদ্রিকানাথ মুখোপাধ্যায়
অস্থায়ী ভাবে জিপুরাব সিবিল টেসনে নিযুক্ত
হইয়াছেন ।

১৮৯১ সালের ৩০ শে নবেম্বর হইতে
৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং ১৮৯২ সালের
৪ঠা জানুয়ারি তারিখে বর্দ্ধমান দাতব্য
চিকিৎসালয়ের ডাক্তার বাবু সুরেশচন্দ্র
বন্দ্যোপাধ্যায় আপন কার্য ছাড়া তথাকার
সিবিল টেসনের কার্য অতিরিক্ত ভা
কবেন ।

১৮৯২ সালের ৪ঠা হইতে ২০ শে ফেব্রু-
য়ারি পর্যন্ত চট্টগ্রামেব সদর চেব্রিটেবল
ডিস্পেন্সারীর ডাক্তার বাবু হরিমোহন সেন
তথাকার সিবিল টেসনের কার্য অতিরিক্ত
ভাবে করেন ।

১৮৯১ সালের ২১ শে জুন পূর্বা হইতে
১৮৯১ সালের ৫ই জুলাই অপবাহ পর্যন্ত
এঃ সাঃ মোলবী দাউদর রহমান মেডি-
কাল কলেজ হাসপাতালে সুপারঃ ডিউটি
করেন ।

সিবিল সার্জনের অস্থগস্থিতিতে ১৮৯১
সালের ১৯ শে হইতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত
দারবঙ্গ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার
বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত আপন কার্য ছাড়া
অতিরিক্ত ভাবে তথাকার সিবিল টেসনের
কার্যও করেন ।

১৮৯২ সালের ৯ই পূর্বা হইতে ১৮ই
পূর্বা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এঃ সাঃ বাবু কালী-

প্রময় কুন্ডার কলিকাতা মেডিকাল কলেজ
হাসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জনের কার্য
কবেন ।

১৮৯২ সালের ১২ই মার্চ পূর্বা হইতে এঃ সাঃ
বাবু গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বগুড়া
ইন্টারমি ডিয়েট জেলের কার্যভার অনারারী
সার্জন ডবলিউ, ব্রাউন সাহেবকে
অর্পণ কবিয়াছেন ।

বাহেল মেডিকেল স্কুলেব ধাতুবিদ্যার শিক্ষক
এঃ সাঃ বাবু নন্দলাল ঘোষ ১ মাসের বিদায়
প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহার অস্থগস্থিতি
কালে উক্ত স্কুলেব এনাটমি ব্রিটিশ ডিম্ন
ট্রেটর এঃ সাঃ বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ
আপন কার্য ছাড়া ধাতুবিদ্যার শিক্ষকের
কার্য কবিবেন ।

এঃ সাঃ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম,
বি, কাটিহার রেলওয়ে হাসপাতালে নিযুক্ত
হইয়াছেন, কিন্তু অন্যতর আদেশ পর্যন্ত
কৃষ্ণগঞ্জ সবডিঃ ও ডিস্পেন্সারীর কার্য
করিবেন এবং কাটিহার রেলওয়ে হাস-
পাতালেব এঃ সাঃ বাবু যোগেন্দ্রনাথ সেন
বঙ্গপুবেব অন্তর্গত গাইবান্ধা সবডিঃ ও
ডিস্পেন্সারিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

বর্দ্ধমান ডিস্পেন্সারীর অফিঃ কর্মচারী
এঃ সাঃ বাবু সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য-
তর আদেশ পর্যন্ত কলিকাতা মেডিকাল
কলেজ হাসপাতালে সুপারঃ ডিউটি করিতে
আদিষ্ট হইয়াছেন এবং তাহার স্থানে এঃ সাঃ
বাবু চাণ্ডকুমার গুপ্ত নিযুক্ত হইয়াছেন ।

কাটিহার রেলওয়ে হাসপাতালের
অফিঃ কর্মচারী এঃ সাঃ বাবু রমানাথ দে
হাবড়ার অন্তর্গত উলুবেড়িয়া সবডিঃজন ও

ডিসপেন্সারীতে এঃ সঃ বাবু কুঞ্জবিহারী নন্দীর স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি কাটিহাব বেলওয়ে ইঁসপাতালে কার্য্য কবিবেন। এবং এঃ সঃ বাবু রমানাথ দেব অহুপস্থিতে বা অন্যতব আদেশ পর্য্যন্ত কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ ইঁসপাতালে স্থপারঃনিউমাবারি এঃ সঃ বাবু রাধা নাথ বসু উলুবেড়িয়ায় সবডি, ও ডিস্পেন্সারীতে কার্য্য কবিবেন।

উলুবেড়িয়া সবডিভিসন ও ডিস্পেন্সারীর এঃ সঃ বাবু কুঞ্জবিহারী নন্দী অন্যতব আদেশ পর্য্যন্ত কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ ইঁসপাতালে স্থপার ডিউটী কবিত্তে আদিষ্ট হইয়াছেন।

বাঁচি বিভাগেব্য ভ্যাক্সিনেশনের ডিপুটী স্থপারিঃ এঃ সঃ বাবু প্রসন্নকুমার দে ১৮৯২ সালের, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সার্জন মেজর জে, জে, উড সাহেবের স্থানে তথাকার ভ্যাক্সিনেশনের স্থপারিঃ ও ডিপুটী স্যানিটারি কমিশনার রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৮৯২ সালের ৯ই বৈকাল হইতে ১৩ই ফেব্রুয়ারি বৈকাল পর্য্যন্ত এঃ সঃ বাবু ভগবতী কুমার চৌধুরী কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ ইঁসপাতালে ১ম সার্জনের—ওয়ার্ডে হাউস সার্জনের পদে কার্য্য করিয়াছেন।

১৮৯২ সালের ১৩ই বৈকাল হইতে ১৮ই ফেব্রুয়ারি পূর্ণিম পর্য্যন্ত এঃ সঃ বাবু বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ ইঁসপাতালে ১ম সার্জনের ওয়ার্ডে হাউস সার্জনের পদে কার্য্য করিয়াছেন।

১৮৯২ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর হইতে ১৮ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ২৪ দিন পুরী ইঁসপাতালের এঃ সঃ বাবু উপেন্দ্রনারায়ণ বার প্রভিলেজ লিভ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত ডাক্তার মহোদয়গণ কলিকাতায় করদাতাদিগের দ্বারা নির্ধারিত হইয়া অত্র নগরস্থ মিউনিসিপাল কমিশনের পদে ৩ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইউ, কে, দত্ত।

জহিরুদ্দীন আহমদ।

ভুবন মোহন সরকার।

এ, এল, সাওল।

সেথ বেচু।

বঙ্গীর গভর্ণমেন্ট শ্রীযুক্ত ডাক্তার আত্র, সি, সেন্‌গুপ্ত সাহেবকে মনোনীত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার মেকনেল এবং শ্রীযুক্ত ডাক্তার জহিরুদ্দীন আহমদ মহোদয়গণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেণ্ডিকেটব মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৮৯২ সালের মার্চ মাসে নিম্ন-

লিখিত হস্পিটাল এসিষ্টান্ট

গণের স্থানান্তরিত ও

পদস্থ হওন।

ভাগলপুরের স্থপারঃ ডিঃ হইতে ১ম শ্রেণীর হঃ এঃ অধরচন্দ্র চক্রবর্তী নড়াল সবডিভিসন ও ডিসপেন্সারীতে অফিসিয়েট ভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বরিশালের স্থপারঃ ডিঃ হইতে ৩য় শ্রেণীর হঃ এঃ মহম্মদ ইয়াসীন বরিশালের পুলিশ ইঁসপাতালে নিযুক্ত হইয়াছেন।

১ম শ্রেণীর হঃ এঃ চক্রকান্ত আচার্য্য ছুটি হইতে দিনাজপুরের সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

প্রেসিডেন্সী জেলের ডিউটি হইতে ৩য় শ্রেণীর হঃ এঃ কামাখ্যাচরণ চক্রবর্তী ক্যাষেল হাসপাতালে সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

২য় শ্রেণীর হঃ এঃ নদিয়ারচাঁদ সরকার ছুটি হইতে বীরভূমে সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

নলহাটী রেলওয়ে ষ্টেশনের অফিসিঃ ৩য় শ্রেণীর হঃ এঃ আকসুসোবতান বীরভূমে সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

সোনাপুর রেলওয়ে হাসপাতালের ১ম শ্রেণীর হঃ এঃ অধরচন্দ্র সবকাব ক্যাষেল হাসপাতালে সুপারঃ ডিঃ কবিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

আরওয়ার ডিসপেন্সারীর অফিসিঃ ৩য় শ্রেণীর হঃ এঃ মহম্মদ অহীজুদ্দীন পাটনা সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

পাবনা জেল ও পুলিশ হাসপাতালে অফিসিঃ ২য় শ্রেণীর হঃ এঃ হরিনারায়ণ চক্রবর্তী মুন্সেরের অন্তর্গত খরকপুর ডিসপেন্সারীতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

রাঁচির সুপারঃ ডিঃ হইতে ৩য় শ্রেণীর হঃ এঃ আসীজুদ্দীন মণ্ডল পাবনা জেল ও পুলিশ হাসপাতালে অফিসিয়েটিং ভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

নলহাটী রেলওয়ে ষ্টেশনের অফিসিঃ ৩য় শ্রেণীর হঃ এঃ আকসুসোবতান পাটনার সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

দক্ষিণ লুশাই পর্তুগী প্রদেশের ডিউটি

হইতে ৩ শ্রেণীর হঃ এঃ মহম্মদ আলী ঢাকার সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

ক্যাষেল হাসপাতালে সুপারঃ ডিঃ হইতে ১ম শ্রেণীর হঃ এঃ কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী দক্ষিণ লুশাই পর্তুগী প্রদেশে ডিউটি করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

দিনাজপুরের সুপারঃ ডিঃ হইতে ২য় শ্রেণীর হঃ এঃ আনন্দময় সেন বুড়ীগঞ্জ ডিস্পেনসারীতে অফিসিয়েটিং ভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

রাজাবৎ খোয়াব অফিসিয়েটিং ২য় শ্রেণীর হঃ এঃ অক্ষয়কুমার দাসগুপ্ত জলপাইগুড়ীতে সুপারঃ ডিঃ কবিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

২য় শ্রেণীর হঃ এঃ নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কাটিওয়ার হইতে এই অফিসে আসিয়া রিপোর্ট কবায় কবিদপুরে সুপারঃ ডিঃ কবিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

চট্টগ্রামের জেলের ডিউটি হইতে ১ম শ্রেণীর হঃ এঃ অধিকাচরণ বসু উক্ত স্থানে সুপারঃ ডিঃ কবিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

পূর্ণিয়ার জেল এবং পুলিশ হাসপাতালের অফিসিয়েট কবিতে আজ্ঞা প্রাপ্ত ৩য় শ্রেণীর হঃ এঃ সয়েদ একবাল হোসেন পূর্ণিয়ার সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

১ম শ্রেণীর হঃ এঃ বামপ্রসাদ দাস ছুটি হইতে খুলনার সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

হাড়ওয়া মেলাব ডিউটি হইতে ৩য় শ্রেণীর হঃ এঃ তসদ্দোক হোসেন আলিপুরে সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

চুয়াডাঙ্গা সবডিভিজন ১ম শ্রেণীর হঃ এঃ রাজকুমার সেন পাকুড় সবডিভিজন নিযুক্ত হইয়াছেন এবং পাকুড় সবডিভিজন

১ম শ্রেণীর হঃ এঃ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছন্দ-
কাব সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

দিনাজপুরের সুপারঃ ডিঃ হইতে ১ম শ্রেণীর
হঃ এঃ চন্দ্রকান্ত আচার্য্য বোয়াগঞ্জ ও নিকর্মন্ড
জেলায় ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

ফরিদপুর ডিম্পেনসারীর অফিসিয়েটিং
কম্পচারী ওয় শ্রেণীর হঃ এঃ ললিতকুমার
বহু উক্ত স্থানে সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত
হইয়াছেন ।

মালদহের সুপারঃ ডিঃ ওয় শ্রেণীর হঃ
এঃ কুঞ্জবিহাবী বন্দ্যোপাধ্যায় মুন্সেরে কলেরা
ডিউটি করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

আলিপুরের সুপারঃ ডিঃ হইতে ওয়
শ্রেণী হঃ এঃ তমদোক হোসেন দিমাগিবিতে
ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

দিমাগিরি যাঠিতে আজ্ঞা প্রাপ্ত ১ম
শ্রেণীর হঃ এঃ মুকন্দচন্দ্র নিয়োগী ক্যাথেল
হাসপাতালে সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত
হইয়াছেন ।

ছকিভুলা ফল্গুপাইন্ট হাসপাতালের
অফিসিয়েটিং কম্পচারী ১ম শ্রেণীর হঃ এঃ
বনওয়ারীলাল দাস কটকে সুপারঃ ডিঃ
করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

গভর্ণমেন্ট ডকইয়ার্ড ডিম্পেনসারীর
অফিসিয়েটিং কম্পচারী ১ম শ্রেণীর হঃ এঃ
কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্য আলিপুরে সুপারঃ ডিঃ
করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

চেতলা ডিম্পেনসারী হইতে ১ম শ্রেণীর
হঃ এঃ কন্নদাপ্রসাদ মিত্র ১৮৯২ সালের
২রা আগষ্টয়ারী রৈকাল হইতে ১৮৯২ সালের
২৩ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত আলিপুরে
সুপারঃ ডিঃ করেন তাহা মঞ্জুর করা হইল ।

ক্যাথেল হাসপাতালে সুপারঃ ডিঃ হইতে
২য় শ্রেণীর হঃ এঃ ইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
আলিপুর জেল হাসপাতালে অফিসিয়েটিং
করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং আলিপুর
জেল হাসপাতালের অফিসিয়েটিং কম্পচারী
ওয় শ্রেণীর হঃ এঃ অভুলানন্দ গুপ্ত ক্যাথেল
হাসপাতালে সুপারঃ ডিঃ করিতে নিযুক্ত হই-
য়াছেন ।

পাটনা সিটি ডিম্পেনসারীর অফিসি-
য়েটিং কম্পচারী ১ম শ্রেণীর হঃ এঃ সয়েদ
আল্ ফাক হোসেন উক্ত স্থানে সুপারঃ ডিঃ
করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

ক্যাথেল হাসপাতালের সুপারঃ ডিঃ
হইতে ওয় শ্রেণীর হঃ এঃ কাশ্যাপাচরণ চক্র-
বর্তী মালদহে কুড়ী মেগার ডিউটি করিতে
নিযুক্ত হইয়াছেন ।

বঙ্গপুর জেল হাসপাতালের অফিসি-
য়েটিং কম্পচারী ওয় শ্রেণীর হঃ এঃ আব্দুল্লা
খাঁ পূর্ণিমার পুলিশ হাসপাতালে নিযুক্ত
হইয়াছেন ।

ছন্দকাথেল ও পুলিশ হাসপাতাল হইতে
ওয় শ্রেণীর হঃ এঃ মহাবীর প্রসাদ সিঃ হঃ
এঃ কার্তিকচন্দ্র মজুমদারের অস্থপস্থিতি
কালে আপন কার্য্য ছাড়া ছন্দকার ডিঃ
করিয়াছেন ।

আলিপুরের সুপারঃ ডিঃ হইতে ১ম
শ্রেণীর হঃ এঃ কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্য আলিপুর
কলেরা ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

বর্ধমান পুলিশ হাসপাতাল হইতে ২য়
শ্রেণীর হঃ এঃ ব্রজেন্দ্রকুমার সরকার সিঃ হঃ
তারাকান্ত সেন গুপ্তের অস্থপস্থিতে আপন
কর্ম ছাড়া জেল হাসপাতাল ডিঃ করেন ।

হস্পিট্যাল এসিস্ট্যান্টগণ ।

১৮৯২ সালের মার্চ মাসের ছুটি ।

ক্রমী	নাম	কোথা হইতে	ছুটির কারণ ও ছুটি কতদিন
৬।	মনোমোহন মুখোপাধ্যায়	ছুটি	পীড়িতাবস্থায় ১০ মাসের অবসর অতিরিক্ত ছুটি
২।	রাইমোহন বায়	,,	,, ১ মাসের
২।	বজ্রবর্জিত	,,	১৮৯২ সালের ২২শে ফেব্রু- য়ারী পর্যন্ত অতিরিক্ত অবসর ছুটি ।
১।	অন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য		অতিরিক্ত ১০ দিনের প্রিভি- লেজ লিভ ।
৩।	শেখ আল্লাহদাদ	জলপাইগুড়িতে স্থানীয় ডিঃ বোর্ড অফ এডুকেশন প্রাপ্ত	পীড়িতাবস্থায় ৩ মাসের ছুটি
১।	যশোদাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	চুডামন ডিস্পেন্সারী	৬ মাসের প্রিঃ লিভ ।
৩।	কার্তিকচন্দ্র মজুমদার	ছমকা ডিস্পেন্সারী	১ মাসের ,
১।	অভয়চরণ ঘোষ	ভদ্রাব নর্ডিভিজন ও ডিস্পেন্সারী	পীড়িতাবস্থা ছুটি ৩ মাস
২।	জগবন্ধু গুপ্ত	এব মাসের প্রিঃ লিভ	বস্তন
৩।	হরলাল শাহ।	বিশাখাপুর পুলিশ হাঃ অফিসিগেট	পীড়িতাবস্থায় ৬ মাসের ছুটি
১।	শেখ কাদের বক্স	ঢাকার মেঃ স্কুলের এন- টর্মীং সিনিয়র ডিমন্স্ট্রেটর	এব মাসের প্রিঃ লিভ
১।	সুধানারায়ণ ঘোষ	ঢাকা মেঃ স্কুলের কেমি ষ্ট্রি এসিস্ট্যান্ট	,, , ,
২।	নিশিকান্ত মুখোপাধ্যায়	ঢাকা মেঃ স্কুলের এন- টর্মীং এসিস্ট্যান্ট	,, , ,
৩।	শশীকুমার বাগচী	ঢাকা মেঃ স্কুলের এন- টর্মীং জুনিয়র ডিমন্স্ট্রেটর	,, , (১৫ ৫-৯২ হইতে)
৩।	নিশিকান্ত দাস	বুড়ীগঞ্জ ডিস্পেন্সারী	পীড়িত অবস্থায় ছুটি ৩ মাস

বঙ্গভাষার চিকিৎসা-তত্ত্ব-বিষয়ক মাসিক পত্র ।

সম্পাদক—ডাক্তার মোলভি জহির-
দ্দিন আহমদ, এল, এম, এস ; এফ,
সি, ইউ ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার
সেবেলনাথ রায়, এল, এম, এস ।

কন্সচারী—শ্রীযুক্ত আব্দুল অজেন্দ খাঁ
চৌধুরী ।

তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার
বাবু গিরীশচন্দ্র বাগচী ।

১ম খণ্ড ।] কলিকাতা । মে, ১৮৯২ । [১১শ সংখ্যা ।

সূচিপত্র ।

বিষয় ।	লেখকের নাম ।	পৃষ্ঠা ।
১। ইনডোলেট অলসার ...	শ্রীযুক্ত ডাক্তার জহিরউদ্দিন আহমদ, এল, এম, এস ; এফ, সি, ইউ ।	৪৩৫
২। কয়েকটা উপসর্গ ও তাহারিণের চিকিৎসা প্রণালী ...	শ্রীযুক্ত ডাক্তার কৃষ্ণবিহারী দাস ।	৪১৮
৩। জলকোশ চিকিৎসা ...	শ্রীযুক্ত ডাক্তার গিরীশচন্দ্র বাগচী ।	৪০১
৪। সংক্রামকাকুর্দ ...	শ্রীযুক্ত ডাক্তার যোগেন্দ্র নাথ মিত্র, এম, আর, সি, পি (লণ্ডন)	৪৪৮
৫। চিকিৎসা-বিবরণ— চৈকিওটমী	শ্রীযুক্ত ডাক্তার জহিরউদ্দিন আহমদ, এল, এম, এস ; এফ, সি, ইউ ।	৪৫৩
৬। বিবিধ তত্ত্ব ...	শ্রীযুক্ত ডাক্তার গিরীশচন্দ্র বাগচী ।	৪৫৮
৭। ইংরাজী মাসিক পত্র হইতে গৃহীত ...	...	৪৬৪
৮। কলিকাতা মেডিকেল সোসাইট ...	...	৪৬৮
৯। সংবাদ ...	...	৪৭৪

মিলন যন্ত্রে

শ্রীমুনীন্দ্রমোহন বসু দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

৪নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রিট—কলিকাতা ।

১৮৯২

প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০ আনা ।

ভিষক-দৰ্পণের নিয়মাবলী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬ টাকা। ছয় মাসের জন্য ৩ টাকা। তিন মাসের জন্য ২ টাকা। প্রতি খণ্ড ৬০ আনা।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম।

প্রতি বার প্রতি লাইন ৬০ আনা হিসাবে। অধিক দিনের হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে। এক টাকার কম মূল্যের কোন বিজ্ঞাপন লওয়া যাইবে না।

শ্রীজহিরুদ্দিন আহমদ,

ভিষক-দৰ্পণ কার্যালয়,

সম্পাদক।

৪৮ নং ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

ঘড়ি

ঘড়ি!!

ঘড়ি!!

আর লায়েল এণ্ড কোম্পানি।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত; ১৩২নং রাধা বাজার, কলিকাতা।

সহকারী সম্পাদক ও লেখক মহোদয়গণ সকলেই আমাদের বিশেষরূপে জানেন ও অনেকেরই আমাদের সহিত কারবার আছে।

নিকেল সিলভার ওপেন ফেস কিলেস রেগুলেটর ঘড়ি ৮, ঐ লিভার ১৩, হাণ্ডিং ও হাফ হাণ্ডিং ১৩, কিলেস নিকেল সিলভার পাকা ঘড়ী ছোট ও বড় সাইজ ৬।০। রূপার কেলেণ্ডার ঘড়ি বার ও তারিখ আপন হইতে দেখাইবে ১৮, ঐ লিভার ২০, রূপার ডবল টাইমের ঘড়ি অর্থাৎ কলিকাতার ও মাদ্রাজ সময় এবং তারিখ আপন হইতে দেখাইবে ১৮, রূপার হাণ্ডিং ইনজিনটারণ বা এনগ্রেভ কেস হরিজেন্টাল, ইস্কেপমেন্ট ছোট ও বড় ইজ ১১, ঐ কুরতাইজার কোম্পানির ১৩, ঐ ঐ লিভার ১৫, কুরতাইজার ফেমাস সিলিভার ১৫, ঐ লিভার ১৭, এই নকল ঘড়ির গিণ্ডি হাপ হাণ্ডিং ও ওপেনফেস লইলে ২ টাকা অতিরিক্ত লাগিবে। রূপার লেডিস্ ন্টহাবিং

হাপ হাণ্ডিং ঘড়ি উত্তমরূপে এনগ্রেভ করা বা ইনজিনটারণ ফেস হরিজেন্টাল স্কেপমেন্ট ১৬, ঐ লিভার ১৮, লণ্ডন মেড রূপার পেটেন্ট লিভার হাণ্ডিং ঘড়ি ২২, বি টাইমপিস ৩, গোল টাইমপিস ২।০ হইতে ৩।০, ঐ এলারম, ৩।০ হইতে ৪।০, ঐ রিপিটার ক্লক ৫।০, ফেরেজ ক্লক ৮, ক্রেকেট বা ওয়াল ক্লক ৯, হইতে ১৩, কেনেডিয়ান গোল্ড চেইন নিকল পেঃ ৫, তার, পাতা, নাকো পেটার ৬, রূপার বোতাম ২।০। জিনিস সকল ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠান হয়।

প্রত্যেক ঘড়ির সহিত ১ ছড়া নিকেল সিলভার চেইন ১ খানি গ্রাস ও স্প্রিং এবং ৩ বৎসরের গেরাণ্ডি দিয়া থাকি।

আমাদিগের নিকট ঘড়ি মেরামত কার্য সুদক্ষ কারিগর দ্বারা হইয়া থাকে।

ঘড়ি সকল ডাকে পাঠাইলে মেরামত করিয়া পুনরায় ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়।

ভিষক-দৰ্পণ ।

চিকিৎসা-তত্ত্ব-বিষয়ক মাসিক পত্র ।

“বিশিষ্টাঃ সধা পথান নীতসঃ বিশেষয়েৎ ।”

১ম খণ্ড ।]

মে, ১৮৯২ ।

[১১শ সংখ্যা

ইন্ডোলেণ্ট অলসার । (INDOLENT ULCER)

লেখক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার জর্জ ডব্লিন আইমন্ড, এল, এন্ড এন্স, এফ, সি, ইউ ।

ইন্ডোলেণ্ট শব্দের ইংৰাজি ভাষায় অর্থ অনঙ্গ । এই শ্ৰেণীস্থ ক্ষত শীঘ্ৰ শুক না হইয়া বহু দিন পর্য্যন্ত একই অবস্থায় বৰ্দ্ধমান থাকে, তজ্জন্য উক্ত ক্ষত ইন্ডোলেণ্ট অলসার নামে অভিহিত । ইহা সচরাচর পদেব বাহা এবং গুল্মক সন্ধির কিঞ্চিৎ উপবে ও পার্শ্বে, আবার কখন কখন উক্ত সন্ধি ও জাহ্নব মধ্যবর্তী স্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে । প্রায় প্রোঢ় বয়স্ক ব্যক্তিগণ এই পীড়া দ্বাৰা আক্রান্ত হয় । উপরে উল্লেখ কৰা চইয়াছে যে, ইন্ডোলেণ্ট অলসার শীঘ্ৰ শুক হয় না, কখন কখন এই শ্ৰেণীস্থ একটী মানান্য ক্ষত ২০ বৎসর বা তদধিক কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে, তজ্জন্য উহাকে ক্রণিক অলসার (Chronic ulcer) বা পুরাতন ক্ষত মধ্যে পরিগণিত কৰা যায় । কোন

একটী ইন্ডোলেণ্ট অলসার উত্তম রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, ইন্ডিউৰেশন (Induration) অর্থাৎ কাঠিন্য ইহা ক্ষতের ভিত্ত হওনের প্রধান প্রতি-
কক । মার্জিন (Margin) অর্থাৎ কিনারা বঠিন ও উচ্চ, অভ্যন্তর অর্থাৎ ক্ষতের উপরিভাগ এবং বেস (Base) অর্থাৎ তলদেশ কঠিন । শ্বেতক কাঠিন্য সচরাচর সবকিউটেনিয়াস এরিওয়ালাব টিসু (Subcutaneous areolar tissue) অর্থাৎ ত্বকনিম্নস্থ কোষিকবিধান—উপা-
দান পর্য্যন্ত কখন বা ব্যাণ্ডিয়া ও পেশী পর্য্যন্ত এবং কোন কোন সময় অস্থাবরক ঝিলি পর্য্যন্ত ও বিস্তৃত হইতে দেখা যায় ।
বাঠিন্য কেবল যে ক্ষতের বর্তমান থাকে এমত নহে । অধিক সময় ক্ষত পার্শ্ব গঠনাবলীও কিঞ্চিদূর পর্য্যন্ত কঠিন হইয়া

যায়। কোন ক্ষত শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইলে উহা সঙ্কুচিত হইতে থাকে। ইনডোলেণ্ট অলসার ও তাহার পার্শ্ব গঠনাবলী কঠিন থাকে। বিধায় সঙ্কুচিত হইতে না পারাই উহার শুষ্ক হইবার প্রধান অন্তরায়। এই শ্রেণীস্থ ক্ষতের চতুঃপার্শ্বে সতত প্রজ্জ্বলিত বর্তমান থাকে, তজ্জ্বলি শিরা সমূহ কখন কখন ভ্যারীকোজ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ক্ষত হইতে এক প্রকার তরল সেনিয়াস (Saneus) অর্থাৎ রক্ত মিশ্রিত পুয় নিঃসৃত হইতে থাকে, বেদনা কিছুমাত্র থাকে না, এমন কি ক্ষতোপরি ঘর্ষণ করিলেও রোগী বেদনানুভব করে না।

চিকিৎসা।

ইংরাজি পুস্তক সমূহে এই শ্রেণীস্থ ক্ষতের চিকিৎসা প্রণালী সান প্রকারে বর্ণিত আছে, যথা—সোপ প্রাণ্টাব দ্বারা সজোরে ট্র্যাপ, ক্ষত ও তাহার চতুঃপার্শ্ব নাইটেট অফ সিলভার পেনসিল দ্বারা বিনষ্ট, বোরাসিক এসিড গজ্ দ্বারা ড্রেস, ক্লোরাইড অফ জিঙ্ক দ্বারা ক্ষতের কিনারা দৃষ্ট, আইওডোফর্ম দ্বারা ড্রেস, প্যাড্ এবং রবারের ব্যাণ্ডেজ দ্বারা ক্ষতের কিনারার উপর সঞ্চাপ প্রয়োগ, ক্যাছারাইডিস দ্বারা ক্ষত ও তৎপার্শ্ব কঠিন গঠনোপরি ব্লিষ্টার (Blister) অর্থাৎ ফোন্ডা উৎপাদন করণ ইত্যাদি। উপরোক্ত চিকিৎসা প্রণালী সমূহ প্রায় ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশস্থ অস্ত্র চিকিৎসকগণ দ্বারা ইনডোলেণ্ট অলসার আরোগ্যার্থে ব্যবহৃত হইতেছে, কিন্তু হুঃখের

বিষয় এই যে, আমি ঐ সকল অবলম্বনে বিশেষ কোন সুফল লাভ করিতে পারি নাই। আমি প্রায় ২২ বৎসর কাল অস্ত্র-চিকিৎসা কার্যে লিপ্ত থাকার এই শ্রেণীস্থ বহুসংখ্যক ক্ষতগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা করিয়া তাহাদিগের অনেককে যে যে উপায়ে আরোগ্য করিয়াছি ও আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

১ম। কটিক—এই শ্রেণীস্থ ঔষধ মধ্যে কটিক কিউজা অর্থাৎ কটিক পটাসের পেনসিল অতি উৎকৃষ্ট। ক্ষতের অভ্যন্তর কিনারা ও পার্শ্ব কঠিন গঠন সমূহে ইহা সংলগ্ন করিয়া কয়েক দিবস পর্যন্ত ক্রমাগত পুন্টিশ ব্যবহার করিলে কটিক দ্বারা বিনষ্ট কঠিন গঠনাবলী বিগলিত হইয়া ক্ষত স্থান পরিষ্কৃত হইয়া যাইবে। তথায় মাংসা-স্থর উৎগত হইয়া তদ্বারা ক্ষত পরিপূরিত ও পরিশেষে শুষ্ক হইবে।

২য়। একচূয়াল কটারী। (Actual cautery) অর্থাৎ লোহিতোত্তপ্ত লৌহ খণ্ড দ্বারা দগ্ধ করিয়া ক্ষতের ও পার্শ্ব গঠনাবলীর কাঠিন্য বিনষ্ট করণ। ইহা প্রয়োগ করিতে হইলে একটা আধুলী পরিমাণ চকাকার সমুষ্টি লৌহ খণ্ড ব্যবহার করাই উচিত।

৩য়। ইলেকট্রিক কারেন্ট (Electric current) অর্থাৎ বৈদ্যুতিক স্রোত—ইনডোলেণ্ট অলসার মধ্যে ক্রমাগত ১০।১৫ মিনিট কাল পর্যন্ত বৈদ্যুতিক স্রোত পরিচালিত করিলে তজ্জ্বলি কাঠিন্য বিগলিত হওয়ার ক্ষত শুষ্ক হওনের পক্ষে আশুকুল্য করে।

৪র্থ। স্কেপিং (Scraping) অর্থাৎ টাচিয়া

ফেলন—এই প্রক্রিয়া ভল্‌কম্যান (Volk-mann) সাহেবের আবিষ্কৃত শার্প স্পুন (Sharp spoon) অর্থাৎ ভীক্ষুধার যুক্ত চামচে (চিডা দেখুন) দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। প্রথমে এক



খণ্ড লিট কোন একটি পচন নিবারক জলে সিক্ত করিয়া ক্ষতের পরিঅনান অর্দ্ধ খণ্ডাকাল পর্যন্ত রাখিলে পর ঐ স্থান অপেক্ষাকৃত কোমল হইবে, পরে উপরোক্ত একটি শার্প স্পুন লইয়া কঠিন গঠন দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত ক্রমাগত উহা চাঁচিতে থাকিবে তৎপর ক্ষত পরিষ্কৃত হইলে অবস্থানুযায়ী চিকিৎসা করিবে।

৫ম। ডিসেক্শন (Dissection) অর্থাৎ কর্তন দ্বারা ক্ষত সহ কঠিন গঠন সমূহ উৎপাটন। এই অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করিতে হইলে প্রথমে রোগীকে ক্লোরফর্ম আচ্ছাদনে অচেতন করা কর্তব্য। নচেৎ অপারেশন কার্য অচাক্ষুণ্যে সম্পন্ন করা যায় না। একটি ভীক্ষু ও পরিষ্কার ক্যান-

পল (Scalpel) দ্বারা ক্ষতের চতুর্দিক পর্যন্ত কঠিন গঠনের কিঞ্চিৎ বাহিরে এক একটি ইন্সিশন (Incision) প্রদান করিবে। এই রূপে চারিটি ইন্সিশন প্রদান করা হইলে পর গতদূর পর্যন্ত কাঠিন্য বিস্তৃত হইয়াছে প্রত্যেক ইন্সিশনটী ততদূর গভীর করিয়া লইবে। এই সময়ে স্থান বিশেষে ছই একটি রক্তবহা নাড়ী কণ্ঠিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে চিকিৎসকের ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। অস্থাপচাব সম্পন্ন করিয়া উক্ত কণ্ঠিত রক্তবহা নাড়ীদিককে লিগেচাৰ দ্বারা অনায়াসে আবদ্ধ করা যাইতে পারে। ক্ষত কোন অঙ্গ শাখোপরি বর্তমান ও সুবিধা থাকিলে অস্ত্রোপচার আরম্ভ করিবার পূর্বে ক্ষত স্থানের কিঞ্চিৎ উপরে রবারের একটি স্থিতিস্থাপক রজ্জুদ্বারা বেঁধন করিয়া সমোরে বন্ধন করিয়া লওয়া উচিত। উল্লিখিত চারিটি ইন্সিশন আবশ্যক যত গভীর করা হইলে পব তন্মধ্যস্থ গঠনাবলী ক্ষত সহ ডিসেক্ট করণাস্থর দূরীভূত করিবে। তদনন্তর কণ্ঠিত স্থান মধ্যে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলে যদি কোন কঠিন গঠন বর্তমান আছে বলিয়া অনুমিত হয়, তবে তাহাও কর্তন করতঃ দূরীভূত করিবে।

অস্ত্রোপচারের পর কণ্ঠিত স্থান পচন-নিবারক প্রণালী অনুসারে ড্রেস করিলে কয়েক দিবস পর আঘাতের তল দেশ হইতে মাংসজ্বর উৎপত্ত হওতঃ ঐ স্থান পরিপূরিত হইয়া যাইবে। পরিশেষে চতুর্দিক হইতে নূতন ত্বক উৎপন্ন হইয়া ক্ষত শুষ্ক হইবে।

উপর্যুক্ত পাঁচ প্রকার চিকিৎসা মধ্যে প্রথম চারি প্রকার অত্যন্ত যত্নাদায়ক এবং অনেক সময় উহা বারবার সম্পন্ন কবিত্তে হয়। ইহাতে সচরাচর রোগী সন্মত হয় না। কিন্তু পঞ্চম প্রকার চিকিৎসা একবার উত্তমরূপে সম্পন্ন করিলে আর দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচার করিবার আবশ্যক হয় না। এই চিকিৎসা প্রণালী দ্বারা রোগী নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবে। আমি কেবল নাইং দীভিনেমেন দাবাই ইনডোলেন্ট অলসারের চিকিৎসা কবিত্তেছি।

পাঠক মহাশয়। আপনি একজন চিকিৎসা ব্যবসায়ী, অবশ্যই ইনডোলেন্ট অলসারগ্রস্ত রোগী দেখিয়াছেন ও তাহাব চিকিৎসাও কবি-

য়াছেন। আপনি নিশ্চয় স্বীকার করিবেন যে, এই শ্রেণীস্থ ক্ষত শীঘ্র শুক হয় না এবং অনেক সময় চিকিৎসকে অপদস্থ হইতে ও লজ্জা পাইতে হয়। আপনার রোগীর ক্ষত নানা প্রকার মলম ইত্যাদি দিয়া মাসাধিককাল পর্য্যন্ত আপনি চিকিৎসা কবিলেন। পরিশেষে সে বিবর্ত হইয়া হস্তান্তর হইল কিম্বা আপনি নিজেই তাহাকে ত্যাগ করিলেন। এই প্রবন্ধ পাঠ কবিবাব পর আপনি যদি ইনডোলেন্ট অলসারের চিকিৎসা সাচসের উপর নির্ভর করিয়া অপারেশন দ্বারা সম্পন্ন করেন তাহা হইলে আমি বলিতে পারি যে আপনি ঐ বোগীকে আরোগ্য কবিত্তে সক্ষম হইবেন।

কয়েকটা উপসর্গ ও তাহাদিগের চিকিৎসা প্রণালী।

লেখক—ঐযুক্ত ডাক্তার বঙ্কবিহারী দাস।

আমাদিগের শরীরে একটা ব্যাধির উপ-ভোগ কালে, আর একটা ব্যাধি আসিয়া তাহাতে যোগদান কবিলে, এবং এই নবাগত ব্যাধি প্রথম সংঘটিত ব্যাধির কাষণ হইতে লজ্জত হইলে, অথবা প্রথমোৎপন্ন ব্যাধিই ইহার কারণ হইলে, এই নবাগত ব্যাধিই উপসর্গ নামে অভিহিত হয়। এই সকল উপসর্গ বা ব্যাধি, প্রথম রোগের চিকিৎসা করিলে, কিম্বা প্রথমোৎপন্ন ব্যাধি আরোগ্য হইয়া গেলে, ইহারও নিবারিত হইয়া থাকে; যেমন জ্বর রোগে সংঘটিত বমন, শিরঃপীড়া প্রভৃতি উপসর্গ গুলি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বর থাকে, ইহারও সেই বাণ পর্য্যন্ত

লোগীকে যত্নগা প্রদান কবিত্তে থাকে, জ্বর ক্ষান্ত হইলে উহাও নিবারিত হয়, এবং উহাদিগের স্বতন্ত্র চিকিৎসা না করিয়া জরের চিকিৎসা কবিলেই যথেষ্ট উপকাব হইয়া থাকে; তবে অনেক স্থলে এই সকল ব্যাধির জ্বরসহ যত্নগা নিবারণার্থ উহাদিগেরও স্বতন্ত্র চিকিৎসা প্রয়োজন হয়। পরন্তু এই সমুদায় উপসর্গ প্রিন্সিপল অর্থাৎ মূল ব্যাধিও হইতে পারে, এবং তখন উহাদিগের যে স্বতন্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। উপসর্গ নামে অভিহিত ব্যাধি সমূহের চিকিৎসা কালে এই কথা স্মরণ থাকা অবশ্য কর্তব্য। ফলতঃ সে যাহা

হউক, একটা ক্ষুদ্রতর ব্যাধির চিকিৎসা কালে, তাহাতে সংঘটিত এক একটা উপসর্গ লইয়া, কিম্বা এই সকল উপসর্গ বধন স্বরূপেই মূল রোগ হইয়া থাকে, তখনও সময়ে সময়ে চিকিৎসককে একরূপ বিষম বিভ্রাটে পতিত হইতে হয় যে, তৎকালোচিত কর্তব্যাকর্তব্য বিস্মৃত হইয়া, তাহাকে হতাশ ও নিশ্চেষ্ট হইতে দেখা যায়। এবং অনেক স্থলে (পল্লিগ্রামে যথায় উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাব) উপযুক্ত চিকিৎসা প্রণালী ও ঔষধের অভাবেও রোগীর জীবন বিনষ্ট হইয়া থাকে। আজ আমরা ঐ সকল বিষয়েব চিকিৎসা প্রণালী ও ঔষধের বিষয় বিস্তৃত করিতে এতৎ প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। ঐ সমুদায় ব্যাধি বা উপসর্গের মধ্যে হিক্কা (হিক্কা), ভমিটিং (বমন) এবং ফ্লাটুলেন্স (উদবাগ্নান) এই তিনটাই প্রধান ও অধিক-তর ভয়াবহ - স্মরণ্য এই তিনটাই অমায়িকের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। আমরা ক্রমশঃ এই তিনটির চিকিৎসা প্রণালীর বিষয় বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১—হিক্কা।

নির্ব্যচন। কোনও কারণ বশতঃ পাকস্থলী ও মিড্রিক অর্থাৎ ডায়াফ্রামের নার্ডস ফাইবার অর্থাৎ স্নায়বিক তন্তু সমূহের উদ্দীপন হইতে উৎপন্ন, উহাদিগের আক্কেপিক বা বৈকম্পিক কলই হিক্কা নামে অভিহিত হয়; অথবা মিড্রিক ও অস্ত্রান্ত রেস্পিরেটরী মাসলস অর্থাৎ শ্বাস প্রাণাসিক পেশী সমূহের আক্কেপিক ও ক্ষণস্থায়ী সঙ্কোচন সমাধিক্ত উন্নরোদ্ধ প্রদেশের বিশেষ বিশেষ এক প্রকার অস্থায়ীভাবেই হিক্কা বলা যায়।

কারণ। আশার ও পানীয় দ্রব্য দ্রুত-ভাবে গলাধঃকরণ জন্য, পাকস্থলী বা ডিয়-ডিনমের কোন প্রকাব স্বল্প উত্তেজনা এবং উচ্চ হাস্য, ক্রন্দন প্রভৃতি কারণ বশতঃ শিশু ও অল্প বয়স্ক বালক এবং বৃদ্ধগণ এই ব্যাধিতে কষ্ট পাইতে পারে। পাকস্থলীতে কোন প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হইলেও ইহা সংঘটিতে পারে। বিষাদি কোন উগ্র পদার্থও ইহাব কাবণ হইবার সম্ভব। মিড্রিক, অন্ন, স্নাত্তাশয় কিম্বা পাকস্থলীর প্রদাহ বা তাহাতে দিবস টিউমারের অবস্থান বশতঃ উৎপন্ন হইতে পারে। যক্ষত, প্যানক্রিয়াস কিম্বা পাকস্থলীর কার্ডিয়াক অরিসিস অর্থাৎ দ্বারের প্রদাহ বশতঃ ইহা সঙ্কুত হইতে পারে। এইটুথ পেরার অব নার্ডস অর্থাৎ অষ্টম স্নায়ুগুণের উপর অর্ধাৎ তার বশতঃ ইহা উদ্ভূত হইবার সম্ভব। হিষ্টিরিয়া ব্যাধি গস্তা ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের স্নায়ু উত্তেজনা হইতেও উৎপত্তি হইতে পারে। কোন প্রবলপীড়া, টাইফস প্রভৃতি মারাত্মক জ্বর এবং কলরা, ডিসেন্ট্রী প্রভৃতি ও শোণিতস্রাব রোগের চরমাস্থায় ইহা সচরাচর সংঘটিত হয়।

লক্ষণ। হিক্কা রোগের স্বতন্ত্র লক্ষণ আর কিছুই নাই, স্মরণ্য ইহার স্বনাম প্রসিদ্ধ অবর্ণনীয় লক্ষণ বাতীত, লিপ্যক্ষর প্রকাশ যোগ্য কোন বিষয়ই নাই। সচরাচর হিক্কা দুইপ্রকার দৃষ্ট হয়, যুগ্ম ও এক একটা, এবং কখন কখন সপর্ধ্যায় বা অল্পপর্ধ্যায় স্বভাবের হিক্কা দেখা যায়।

ভাবীকল বা পরিণাম। যে পীড়ার উপসর্গরূপে ইহা বর্তমান আছে,

তাহার দ্রুত প্রত্যুত্তরে ইহার পরিণাম স্থির করা
বিষয়। ডাক্তার বুশান (Buchan) নয় সপ্তাহ
স্থায়ী একটা হিক্কা রোগগ্রস্ত রোগীকে বিবিধ
ঔষধাদি দ্বারা হিক্কা নিবারণ করিয়াছিলেন
যটে, কিন্তু অবশেষে বস্ত্র বমন হইয়া তাহার
জীবন বিনষ্ট হয়। গুরুতব পীড়ার শেষ-
বস্থায় সংঘটিত হিক্কা, অনেক স্থলেই
মৃত্যুর পরিচায়ক চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়,
ডিসেন্ট্রি রোগে সংঘটিত এই উপসর্গ সতত
দ্রুতশর সঙ্কেত বিজ্ঞাপন কবে। কলরা
ও অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধিতেও ইহা
সফল পরিচায়ক। বস্তুতঃ অতিশয় দৃষ্টি
বিবেচনার সহিত ইহার ভাবীকল প্রকাশ
করিতে হইবে, যেহেতু এই রোগে প্রকৃত
পক্ষে কোনই অন্তত লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া
যায় না, অথচ গুরুতবে রোগীর জীবনী-
শক্তিকে বিনষ্ট করিতে থাকে। কঠিন
রোগের আক্রমণ স্থলে এতদ্বারা এক হইতে
দুই সপ্তাহের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু ঘটিতে
পারে।

এই ভয়ঙ্কর উপসর্গ ব্যাধি বিশেষে
আবির্ভাব মাজেই প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা
করা উচিত। প্রথমাবস্থায় ইহার প্রতি-
তাচ্ছল্য করিয়া, অবশেষে ব্যাধির প্রাথমিক-
বস্তুতঃ জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইলে, নিরা-
করণে অসমর্থ হেতু রোগী পঞ্চম পাইতে
পারে। অতএব প্রথম হইতেই বস্ত্র ও মনো-
যোগ সহকারে ইহাকে নিবৃত্ত করা প্রয়ো-
জনীয়। বস্তুতঃ ইহাকে সামান্য বোধে
নিশ্চেষ্ট থাকা কাহারও পক্ষে প্রেরণ নহে।

চিকিৎসা। এই ব্যাধির চিকিৎসা
প্রণালী বর্ণন করিবার পূর্বে, সাধারণতঃ

এসম্বন্ধে যে সমুদায় মুষ্টিযোগ প্রচলিত
আছে, এহুসে অগ্রে আমরা তাহাদিগের
কতকগুলির বিষয় উল্লেখ করিম, পশ্চাৎ
কারণাভ্যাসী চিকিৎসা প্রণালীর বিষয়
প্রদর্শন করিব।

মুষ্টিযোগ বা সাধারণ উপায়।

(১) কাজীক এই রোগের একটা
মহত্বপূর্ণ মুষ্টিযোগ; এক তোলা পরি-
মাণে কয়েক বার সেবন করাইলেই উপ-
শান্তি হইয়া থাকে।

(২) করীর অর্থাৎ বাঁশের কোড়া
পেষণ করিয়া, নিষ্পেষিত রস ঐ পরিমাণে
সেবন করাইলেও বিশেষ উপকার প্রাপ্ত
হওয়া যায়।

(৩) ময়ূরপুচ্ছ ভগ্ন মধুপ সহিত মর্দন
করিয়া ইলেক্চুয়াবী (অবলেহ) রূপে
রোগীর জিহ্বায় লেপন করিতে হয়, ক্রমে
উহা গলাধঃকরণ করিলে দমিত হইয়া
থাকে।

(৪) পুর্বাতন কুলাস্তির শাঁস মধুর
সহিত মর্দন করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে
প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শাইয়া
থাকে।

(৫) গোলমরিচ সুচৌবিক করতঃ
দীপায়িতে দগ্ধ করিয়া, খাস পথে ধূম
গ্রহণ করিলে উপকার হইয়া থাকে।

(৬) শুক হরিদ্রা ভগ্ন করতঃ কলিকার
সাজিয়া ধূম পানের ন্যায় টানিলে গুরুত্বাৎ
বন্ধ হইয়া থাকে।

(৭) ভাজকুটের পত্র ও কপূর
পূর্বোক্ত প্রকারে ধূম গ্রহণ করিলে তৎ-
ক্ষণেই নিবারিত হইয়া থাকে।

(৮) আনাবসের পাতার রস শর্করা সহযোগে সেবন করাইলে নিবারণ হইয়া থাকে। কুমিজনিত হিকার যথেষ্ট উপকারী।

(৯) কদলীমূল পেষণ করিয়া, নিম্বেষিত রস সেবন করাইলেও নিবারণ হইয়া থাকে।

(১০) ফুস্ফুস্বাস বায়ু দ্বারা পূর্ণ করিয়া অধিকক্ষণ ঐ বায়ু অবরোধ করিয়া রাখিলে, সহজ হিক্কা অনেক স্থলে নিবারিত হইয়া থাকে, একবার মাত্র এই অমুর্ছান দ্বারা কৃতকার্য না হইলে ছই তিন বারে অবশ্যই অভিষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে।

(১১) কোন প্রকারে রোগীর ক্ষুধানয়ন করিতে পারিলেও হিক্কা নিবারিত হইয়া থাকে; এতদন্তিপ্রায়ে নস্য বা হাঁচিটি নামক এক প্রকার ওষধির ফল রোগীর নাসারন্ধ্রে প্রয়োগ করিতে হয়।

(১২) রোগীর এপিগ্যাস্ট্রিয়মের (কড়ার নিম্ন) উপর দিয়া দৃঢ়রূপে একটি কোমর-বন্ধ বন্ধন করিয়া দিলেও প্রায়ই দমিত হইয়া থাকে।

(১৩) কোন প্রকারে অনামনস্ব করিতে পারিলেও হিক্কা বন্ধ হয়। বালক দিগের প্রতি সচরাচর এতদমুর্ছান কৃত হইয়া থাকে।

(১৪) অতি শৈশবাবস্থায় যে হিক্কা হয়, তন্নিবারণার্থ এ্যাকোয়া এনিথাই অতি চমৎকার প্রতিষেধক উপার, অনেক স্থলে একবারের অধিক প্রয়োগ করিতে হয় না।

বিবেচনাপূর্বক এই সমুদায় মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিতে পারিলে, অনেক স্থলে

অবশ্যই হিতফল দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল স্থলে রোগ কোন গুরুতর কারণে উদ্ভূত হইয়া থাকে, তথায় মুষ্টি যোগের কথা কি কোন কোন ঔষধেও বিকল মনোরথ হইতে হয়। সে যাহা হউক, মুষ্টিযোগ দ্বারা যখন অনেক স্থলে সফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ও সর্বত্রই সহজে লব্ধ হইতে পারে, তখন ইচ্ছাদিগের বিষয় অবশ্য বক্তব্য; বিশেষতঃ সকল রোগেরই আদিতে পীড়িত ব্যক্তিগণকে এইরূপ একটা সহজ উপায়ের অধীন হইতে দেখা যায়, অতএব আমবাও এখানে সেই পথেরই অনুসরণ করিলাম। অতঃপর আমরা ইহার কারণানুযায়ী চিকিৎসা প্রণালীর বিষয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

যে সমুদায় পদার্থ ভক্ষণ করিলে, আত্মান উপস্থিত হইতে পারে, এমত সকল পদার্থ ভক্ষণ জনিত আত্মান ইহার কারণ বলিয়া বিবেচিত হইলে, কোন প্রকার আর্ডেট স্পিরিট অথবা অপরিবিদ্য হুয়া এক ড্রাম মাত্রায় সেবন করাইলে এবম্প্রকার হিক্কা অন্তর্হিত হইয়া থাকে। কার্বিনেটিড ঔষধ শুল্লির কোন কোনটা দ্বারা এতদবস্থায় বিস্তর উপকার দর্শাইয়া থাকে। উষ্ণ ব্রাণ্ডি, পেপারমিট অইল, কপূর, ক্রিসোজোট প্রভৃতি ঔষধশুল্লি এতদর্থে ব্যবহৃত হয়।

কোন গুরুতর পদার্থ ভক্ষণ জনিত অজীর্ণতা ইহার কারণ বলিয়া অনুমিত হইলে, বিশেষতঃ ঐ সকল পদার্থ পাকস্থলীতে বর্তমান থাকার স্থির হইলে, ইপিক্যাক আদি কোন অম্লগ্র বমন কারক ঔষধ সেবন করাইয়া পাকস্থলী হইতে ঐ সকল পদার্থ

বাহির করিয়া দিবে, পরে স্পিরিটস্ অফ্ শাল্‌টলেটাইল যিশ্ বিন্দু এবেয়া মেথ্ পিপরিটি এক আউন্স একত্র করিয়া এক বা দুই বণ্টাস্তর সেবন করাইতে থাকিবে। মধ্যে মধ্যে পনর গ্রেণ পরিমাণে বিসমথ সেবন করাইলে সত্তবে আরও অধিকতর ফল প্রাপ্ত হওয়া যাব।

যখন যকৃত পাকস্থলী প্রভৃতি যন্ত্র সমূহেব প্রাদাহিক কারণ বশতঃ ইহার উদ্ভব হইয়া থাকে, তখন ইহাকে বিপজ্জনক দোষ করিয়া, সাবধানে ও অতিশয় মনোযোগ সহকারে রোগীর চিকিৎসা কার্যে ব্রতী হইতে হইবে। এমতাবস্থায় শীতল, এবং লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর পথ্য অবশ্য প্রয়োজ্য। স্থানিক রক্ত মোক্ষণ অতীব উপযোগী, উষ্ণ জলে একথণ্ড ফ্যানেল, কখন অথবা বস্ত্র থণ্ড ভিজাইয়া তদ্বারা ফোমেন্টেশন করিবে, অথবা উষ্ণ দুগ্ধ ও জল দ্বারা পরিপূর্ণ ব্ল্যাডার (খোলে) প্রদাহিত স্থানোপরি স্থাপন করিবে। অনন্তর একথণ্ড এমপ্ল্যাষ্ট্রম্ লিটি প্রদাহিত স্থানোপরি [যকৃত আদিব প্রদাহ এতদুপারে উপশমিত না হইলে] এমত ভাবে প্রয়োগ করিবে যে, যদি যকৃত ও পাকস্থলীর প্রদাহ থাকে, তবে ঐ এমপ্ল্যাষ্ট্রম্ লিটি যকৃতের উপর হইতে এপিগ্যাস্ট্রিকুমের কিয়দূর আসিয়া পড়ে; অভিস্রব হইলে উত্তোলন করিয়া যথারীতি ড্রেস করিয়া দিবে। এমপ্ল্যাষ্ট্রম্ লিটি আদির মিতান্ত্র অভাব হইলে, মার্টার্ড প্লাষ্টার দিতে কদাচ বিস্তৃত হইবে না, পরে এক আউন্স পরিমাণে ওয়াইন হোয়ের সহিত কয়েক মিনিম (১০—২৫) স্পিরিট

অফ্ নাইটাইব্ প্রভৃতি বণ্টায় সেবন করাইতে থাকিবে। বেণেডোনা ত্যালিরিয়েনেট অফ্ জিঙ্ক প্রভৃতি ঔষধগুলি দ্বারাও বিশিষ্ট উপকার সংসাধন কবে।

যখন পাকস্থলী পিত্ত বা স্নেহের পরিপূর্ণ থাকে বশতঃ এবস্ত্রকার উপসর্গ সমানীত হয়, তখন একমাত্র বমনকারক, ও বিবেচক ঔষধ দ্বারা আমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়া থাকে। অত্র মলে পূর্ণ থাকিলেও বিবেচক ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। ঔষধ সেবন অথবা পিচকারী সাহায্যে প্রয়োগ করিবে। এমত স্থলে (যে স্থলে কোষ্ঠ বদ্ধ অস্বাভাবিক হয়) একমাত্র বিবেচক ঔষধের পিচকারী দ্বারা ই আশাতীত ফললাভ করা গিয়াছে।

যংকালে হিষ্টিরিয়া হইতে এই উপসর্গ আনৌত হয়, তখন নিম্ন লিখিত ঔষধ বিশেষ ফলোপধায়ী।

℞

টিংচর অফ্ ক্যাসাকিটি	২ ড্রাম
” ” ক্যাষ্টেব	২ ড্রাম
এমোনিয় টিং অফ্ ত্যালিরিয়ান	২ ”
একোয়া ক্যাম্ফর ..	৭ আং
একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক দুই বণ্টাস্তর এক আউন্স মাত্রায় সেব্য।	

এবস্ত্রকার হিকায়, ধাত্বশিকাদি প্রণেতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু যত্ননাথ মুখোপাধ্যায় নিম্নলিখিত ব্যবস্থা দেন।

℞

টিংচর ক্যাসাকিটিডা	৩ ড্রাম
“ ত্যালিরিয়ান কোং	৩ ”
সলফিউরিক ইথর ..	৩ ড্রাম
ডিল ওয়াটার ...	সর্বসমেত ৩ আং

একত্র মিশ্রিত করিয়া এক আউন্স মাত্রায় প্রত্যেক তিন ঘণ্টার পর সেবা। দেখা গিয়াছে চিষ্টিকিয়া জনিত হিকা বোগে এতদৌষধ ও মাহাপকার সংসাধন হবে।

হিকা যখন গুরুতর আকার ধারণ করে, কোন ঔষধই বিশিষ্টরূপ উপকার হইতে দেখা যায় না, তখন বায়ুনাশক উগ্র ঔষধ ও এন্টিস্পাজমডিক্ অর্থাৎ আক্রেপ-নিবারণ ঔষধগুলি বিশেষ সুলভপদ ও আমাদিগের প্রাধান্য অবলম্বনীয়। এই সমুদায় ঔষধের মধ্যে মস্ক ও স্পিবিট ইথর মর্কোক্ত শ্রেণীর ঔষধ পুনর বা কুড়ি গ্রেণ মাত্রায় মস্ক চূর্ণ বা বটিকাকারে সেবন করাইলে আশঙ্করূপ ফল প্রদান হবে। ডাক্তার উড্ কছেন, যখন সর্প প্রকার ঔষধ নিষ্ফল হইয়া যায়—কোনটিই আব ফলোপধায়ী বস্তু বোধ হয় না, তখন এতদ্বারা নিঃসন্দেহ প্রত্যাহার বাত করিতে পারা যায়।

হিকা নিবারণার্থ স্পিবিট ইথরও এই-রূপ, ইহার আর এক অসাধারণ শক্তি এই যে, ইহা উদরস্থ ইইবামাত্রই বেরূপ হিকাট হউক না বিজুসনয়ের জন্য অবশ্যই বন্ধ থাকিব, কিন্তু ইহার-ক্রিয়া পর্য্যবসিত হইলে পুনরায় হিকা আরম্ভ হইয়া থাকে, তখন সূতবাৎ পুনরায় প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, বস্তুতঃ এইরূপে পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিলে পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে নিবারণ হইয়া যায়। এই ঔষধের উক্ত গুণ থাকা প্রযুক্ত চর্কল ও জীবনশক্তি ক্ষণ ব্যক্তিদিগকে উপযোগীভাবে সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে। নিম্ন লিখিত ব্যবস্থামত প্রযুক্ত।

স্পিবিট ইথরিস্ . . . ১ ড্রাম

একোয়া এনিথাই . . . ৪ ড্রাম

মিশ্রিত করিয়া প্রয়োজন মত সেবন করাইবে।

ক্রমঃ।

জলকোশ-চিকিৎসা।

লেখক—ড. যুক্ত ডাক্তার গিরিশচন্দ্র বাগচি।

(পূর্বে প্রকাশিতের পর।)

এক্কে ব্যবহার্য ঔষধ সমূহের মধ্যে প্রচলিত কয়েকটির প্রয়োগ প্রণালী সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

আইওডিন।—এদেশে অপরাধর ঔষধ-পেজা টিং আইওডিন অধিক ব্যবহৃত হইয়া

আসিতেছে। এই কলিকাতাতেই সাব মাস্ট্রিন ডাক্তার মহোদয় কর্তৃক সর্বপ্রথমে এই উদ্দেশ্যে টিংচার আইওডিন ব্যবহৃত হয়, তাৎপর্য পর তাহার সুফল দৃষ্টে ইউরোপ প্রভৃতি অপরাধর দেশে ইহা প্রচলিত হইয়াছে। পবস্পর

তুলনা করিয়া দেখিলে ইহাকেই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার কবিত হইবে। প্রথমে এক ভাগ টিংচার আইওডিন, ২ ভাগ জল মিশ্রিত কবতঃ তাহার ক্রিয়াক্ষমতা টিউনিকা ভেজাইনেলিস মধ্যে পিচকাবী দেওয়া হইত। কেহ কেহ বা বিশুদ্ধ টিংচার আইওডিন ব্যবহার কবিতেন, এক্ষণে সকলোই বিশুদ্ধ টিংচার আইওডিন ব্যবহার কবিতেন-ছেন। কেননা প্রবল প্রদাহের ভয় প্রযুক্ত জল মিশ্রিত করা হইত, বিশুদ্ধাবস্থায় প্রয়োগ করিয়াও যখন প্রবল প্রদাহ হয় না, তখন জল মিশ্রিত করা নিশ্চয়াজন। অধিকন্তু জল মিশ্রিত করিলে উপযুক্ত প্রদাহ উপস্থিত সম্বন্ধ সন্দেহ, ঔষধের উগ্রতা পরিহার করা সকলেই নিশ্চয়োজন মনে কবেন।

অর্দ্ধদেব আকৃতি অন্নযাবী ২ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম পর্যন্ত টিংচার আইওডিন ব্যবহৃত হয়।

কেহ কেহ কোশ মধ্যে আইওডিন বগা কবিয়া ক্যামুল্লা বহির্গত কবিয়া লন, আবার কেহ কেহ বা ১০।১৫ মিনিট পর্যন্ত কোশ মধ্যে আইওডিন বাখিয়া কাঁহুল, দ্বাৰা উহা বহির্গত কবতঃ তৎপৰ ক্যামুলা বাহিব কবিয়া লন।

এতদ্বাৰা যে ১০।১৫ মিনিট কাল আইওডিন কোশ মধ্যে অবস্থিতি কবে, তাহাতেই উপযুক্ত পরিমাণ প্রদাহ উৎপাদন কবিতো সক্ষম হয়। তবে চিকিৎসকে ঐ সময়টুকু বড়ই অনর্থক বিবর্ত্ত বোধ কবিতো হয়। ইহাতে নিষ্ফল হওয়াব আশঙ্কাও অধিক।

আইওডিন প্রাযোগ কবাব পদমূহূর্ত্তই বোগী ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভব কবিতো থাকে,

মুদ, শুক্রবজ্জ্ব এবং বটিদেশে ভয়ানক বেদনা হয়। সন্ময়ে সন্ময়ে এই বেদনা এত অসহ্য হইয়া উঠে যে, বোগী মুচ্ছিত হইয়া থাকে। কিন্তু তদ্ব্যন্থ চিকিৎসকেব ব্যস্ত হইবার কোনও কারণ নাই, অতি অল্প সময় মধ্যে বিনা যত্নেই যে অবস্থা অপনীত হয়।

অল্পপ্রমোণেব পৰ দিবস মুক প্রদাহিত এবং জ্বৰ হইয়া রোগী ৩৪ দিবস বড়ই কষ্ট ভোগ ববে। আইওডিন প্রয়োগ দ্বারা প্রবল প্রদাহ ও পুণ্যদ্রব তত্ত্বাও নিতান্ত বিবল নহে। তৎপৰ লক্ষণানুসাবে চিকিৎসা বনিলে সম্ভবে আবোগ্য লাভ করে।

আইওডিন প্রয়োগ জন্য যন্ত্রাদি রোপ্য বা তদপেক্ষা নিরুপ্ত ধাতু দ্বাৰা নিম্মিত তত্ত্বা অমুচিত।

টিংচার আইওডিন ইঞ্জেক্ট কবিয়াব পূর্বে এবং ট্যাপ কবিয়া জল বাহিব কবিয়াব পৰ অনেকেই ইদানিস্থান অর্দ্ধ ড্রাম লাইবব বোবেন (৩২ গ্রেণ—জল ১ আং) শ্যাক মধ্যে প্রবেশ কবাইয়া থাকেন। তাহাব অন্যান ১৫ মিনিট কাল পবে টিংচার আইওডিন ইঞ্জেক্ট করেন। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন কবিলে আইওডিন ইঞ্জেকশনের বদল্যাব পরিমাণ অনেক অংশে লাঘব হয়। কখন কখন কিছু মাত্র দ্রুতগা হয় না।

কার্বলিকএসিড।—জলকোশ আবোগ্যার্থে এত দিন পর্যন্ত যত ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, আইওডিন তৎসমস্তেবই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইহাব কয়েকটা দোষ বড়ই কষ্টদায়ক, প্রাযোগকালীন বেদনা, গুরুতব প্রদাহ এবং প্রবল জ্বর সময়ে সময়ে বিপদজনক হইতে পারে। ঐ দোষ

পরিহার উদ্দেশ্যে কয়েক বৎসর যাবত কার্শলিক এসিড ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এদেশে ৫৬ বৎসর পূর্বে আনিট বালসিক এসিড মূল্যপ্রথমে ব্যবহার করি। তৎপৰ অপর অনেকই ব্যবহার করিয়াছেন। প্রয়োগকালীন অতি সামান্য বেদনা হয়। আইওডিনের তুলনায় সে কিছুটা নহে। কার্শলিক এসিডের স্থানিক অবশাদক এবং বেদনানিবারকশক্তি থাকায় এ উপকার সাধিত হয়। তৎপৰ প্রদাহ এবং জ্বর অধিকাংশ বোগীতেই অতি সামান্য মাত্র প্রকাশ পায়। বিস্তৃত প্রদাহজ্ঞ উপবিধান আইওডিনের তুলনায় বিশেষ শোষিত হয়। অধিকন্তু ফোটিক হটবার আশঙ্কাও নিতান্ত বিবল নহে। এই দুই বিষয়ে ইহা আইওডিন অপেক্ষা নিরুপ। আবার আনার পরীক্ষাধীন বয়েসের বোগীর টোকাব বিস্তৃত স্থান কৌশিক বিদান মধ্যস্থত ফোটিক হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু আইওডিন দ্বারা তদ্রূপ ফোটিক উদ্ভব হওয়া আবার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। মুকরুক্ অথবা অত্যাধিক ইপিডিডিমাস ইত্যাদি চিকিৎসিত হইলে আইওডিন প্রয়োগদ্বারা উহা শোষিত হটবার আশা করা যাইতে পারে এবং অনেক সময় কার্যতায়ও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কার্শলিক এসিড দ্বারা তদ্রূপ স্থল লাভের আশা বিবল। আইওডিন প্রয়োগ দ্বারা সহজ উপায়ে ঝিল্লি নিবারণতা উপস্থিত হওতঃ পীড়া আরোগ্য হইল অনেক রোগীর ২১৩ বৎসর পর পুনর্বার ঐ পীড়া প্রকাশ হইতে দেখা যায়, কিন্তু কার্শলিক এসিড দ্বারা তদ্রূপ ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

এই গুণ স্বত্বক্ৰে কাশ এবং এমড উৎকৃষ্ট। প্রবাহ প্রবল হইল বার্ষিক এসিড প্রয়োগে আইওডিন প্রয়োগের ন্যায় ফোটিকোড হইয়া থাকে। তবে কার্শলিক এসিডের ফোটিক আইওডিনজাত ফোটিকোপেক্ষা নহে। পদ্ধতি, জ্বর ও যাতনা অতি সামান্য হইয়া থাকে। এমন কি অনেক সময়ে প্রদাহ পূর্বে পর্যন্ত হইয়াছে কিনা রোগী তাহা সহজ পদ্ধতিতে পারে না। পূর্ণ বহিঃস্থ হওয়াব পর ক্ষুদ্র প্রদাহের তুলনায় অল্প সময় মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। আইওডিনজাত প্রদাহের প্রবণতা হেতু মাননীয় সার্জন ব্রীমুন্ড জর্জক্সন আহমদ মহাশয়ের বহুদীর্ঘকালীন একটি রোগী অস্ত্রোপচারের পর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কালকবলে পতিত হইয়াছে। অপর একটি ভক্তাবের কল্পদীর্ঘকালীন একটি রোগী প্লামোংস্‌ হওয়ার পর মৃত্যুপথে পতিত হয় এবং আবার বহুদীর্ঘকালীন বয়েসের বোগী আইওডিন প্রয়োগের পর মুকরুক্ মুক্তি হইয়াছে। প্লামোংস্‌ হওয়ার পর বোক যে মৃত্যু হওয়া হইতে পবিত্র পাইয়াছে তাহা সম্ভব হইত।

কার্শলিক এসিড শোষিত হইয়া এতদ্ব্যপায় বিবক্ষিত্য করিতে পারে কি না? এই প্রশ্নের সত্ত্বক প্রদান করার সময় এখনও সমুপস্থিত হয় নাই, কেননা কোন একটি প্রবণের বচল ব্যবহার, বহুসংখ্যক চিকিৎসক বর্জক পদীকিত না হইলে তদ্বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া অসম্ভব। একটি ঘটনায় এতৎ বিষয় ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। বিস্তৃত উপযুক্ত মীমাংসায় উপনীত হইতে

পারি নাহ। পাঠক মহাশয়নিগেব সমা-
বে'চনার জন্য এই রোগীটির সংগত বিবরণ
নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ।

মণ্ডানিশ্র—কনষ্টবল—পশ্চিম দেশীয়
যুবা । মালেরিয়া জ্বরাচ্ছ ৩৩৩৩ ইন্সটিগে
আইটে, দুই সপ্তাহকাল চিকিৎসিত হইয়া
আরোগ্যার্থে প্রকার কার্যে যান, এত ঘটনার
এক দাস পবে জগকোশ আরোগ্যার্থে পুন-
কার ইন্সটিগে আহাস । দ্বিতীয় দিবস
৪০ বিন্দু কার্মিকএসিড সমভাগ মিসি-
রিন সহ মিশ্রিত করিয়া যথানিয়মে প্রয়োগ
করা হয় । ওষধ প্রয়োগের সময়ে বোন প্রকা-
রগণা অসুস্থত্ব করে নাহি । চতুর্থ দিবসে
মুষ্ণ সামান্য প্রদাহিত হইয়া পূর্বাধার প্রাপ্ত
হয় । ষষ্ঠ দিবসে দৃষ্টিশক্তির হীনতা এবং
বাক্তিতে এককালীন দেহিতে পায় না, এমত
প্রকাশ করে, অব হয় নাহি, মুষ্ণ দৃঢ়
হইয়াছে, প্রজাব পদাধার পূর্ববর্ণ কি অপব
বোন বকম অস্বাভাবিক রূপে জানিতে
পারি গেহ না, অক্ষির স্বাভাবিক, কেবল
কনজাংটাইভার অন্ন নিবন্ধাবস্থা, অভ্যন্তর
পীড়া করা হয় নাহি ।

৮ম দিবসে সূচিবদ্ধ স্থান সামান্য ক্ষীত
দেখিয়া অস্ত্র করা হইলে এক তোলা
অনুমান গাঢ় পুষ্ণ নির্গত হইল । ২৫শ
দিবস রোগী আরোগ্য হইয়া নিজ কার্যে
প্রত্যাগমন করে । এই স্ফোটকের সহিত
টিউনিকাভেজাইনেলিস ক্লিবি বোন সংস্রব
ছিল না, কেবল মাত্র কোষিক বিধান মধ্যেই
উৎপন্ন হইয়াছিল । এই শ্রেণীস্থ স্ফোটক
আইওডিন প্রয়োগে কলচিত উদ্ভব হইতে
দেখা যায় । কেবল কার্মিকএসিড দ্বারা

কোষিক বিধান উত্তেজিত হওয়ার ইহার
উৎপত্তি ।

প্রয়োগ প্রণালী—কার্মিকএসিড
এবং মিসিরিন সমভাগে মিশ্রিত করিয়া
অবচ্ছাদ্য তাকার ৪০ হইতে ১২০
বিন্দু ব্যবহার করা কর্তব্য । এই মিশ্রিত
দ্রব গাঢ় বিধায় আইওডিনের
ন্যায় সহজে ক্লিবি সমস্ত অংশে
সংগত হইতে পারি না । তজ্জন্য অঙ্গুলী
সঞ্চালন দ্বারা ধীরে ধীরে ক্লিবি সমস্ত
অংশে চাতিত করিয়া দেওয়া কর্তব্য ।
কায়বটী রোগীকে কার্মিকএসিড সম-
ভাগে জল দ্বারা দ্রব করিয়া প্রয়োগ
করিয়াছি । যদিও তাহার ফল মন্দ হয়
নাহি, তথাচ ওৎপন্নকে বোন মতামত প্রকাশ
করা যায় না ।

সল্ফেট অফ জিঙ্ক ।—এই
ঔষধ মনো মনো ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।
পরিমিত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে
আলা, যক্ষণা, প্রদাহ, এবং অর ইত্যাদি
উপসর্গ অতি সামান্যভাবে প্রকাশ পায়,
কিন্তু অপিকাংশ বোগীবই টিউনিকা
ভেজাইনেলিস ক্লিবি জীবনিশক্তি বিনষ্ট
হইতে দেখা যায় । তজ্জন্য প্রাথমিক স্ফোট-
কোৎপন্ন হইয়া থাকে । প্রথমে সূচিবদ্ধ
স্থানে সূত্র একটা স্ফোটক ও তাহা কর্তন
করিলে তন্মধ্যে শুভ্রবর্ণ পদার্থ দেখা যায়,
মজোবে টানিলেও তাহা সহজে বহিষ্কৃত হয়
না । ক্ষতও শুষ্ক হইতে পারে না, অথচ
এই ক্ষত জন্য রোগী বিশেষ কষ্ট বোধ
করে না, পরিশেষে নালী ঘায়ের মত দেখায়,
এই নালী বা গভীররূপে কর্তন করিলে

তত্ত্ববর্ণ শক্তি ঝিল্লি বহির্গত হইতে থাকে, সময় সময় সমস্ত ঝিল্লি এক বাবেই বিচ্যুত হইয়া আইসে। ঝিল্লির সমস্ত অংশ নিকাশিত হইলে কত সহজে শুষ্ক হইয়া থাকে। এই সুদীর্ঘ যন্ত্রণা ভোগ এবং অনেক স্থলে অকৃতকার্যতা লাভ হয় বলিয়া এগন কেহই আর সহজে এই প্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করেন না। টিউনিকাভেজাইনেলিস ঝিল্লি সহজে বিঘূর্ণিত হইলে পরিণাম কল উৎকৃষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

প্রয়োগ প্রণালী—৫—১০ গ্রেণ

সলফেট অফ জিঙ্ক, ২ ড্রাম জলে দ্রব করতঃ প্রয়োগ করিবে। অথবা ১ ড্রাম ৮ আউন্স জলে দ্রব করিয়া একটি ববাবের বাগ দ্বারা ঐ দ্রব ধীরে ধীরে এক বাব প্রবেশ করাইয়া পুনর্বার বহির্গত করিবে এবং এই ভাবে ৮।১০ বাব প্রবেশ করাইয়া পৰিশেষে সমস্ত দ্রব নিকাশিত করিবে। এই ভাবে দ্রব প্রবেশ করাইতে হইলে টিউনিকাভেজাইনেলিস ঝিল্লি যাহাতে অত্যন্ত বিস্তৃত হইতে না পারে তৎবিষয়ে সাবধান হইবে, কেননা ঝিল্লি অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া তাহার কোন অংশ বিদীর্ণ হইলে তদ্ব্যথা দিয়া সলফেট

অফ জিঙ্ক সোডিক বিধান মধ্যে প্রবেশ করিলে বিলক্ষণ অসিষ্ট হইতে পারে। টিউনিকাভেজাইনেলিস জল নিশ্চিত করিয়া এইরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সুবা, জল, জলকোশত বস ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছি কিন্তু সুফল লাভ করিতে পারি নাই। বালকদিগের এবং কয়েকটি যুবকের পীড়া কেবল মাত্র বস নিকাশিত করিয়া দেওয়ায় এক কালে পীড়া আবেগ্য হইয়াছে। ১০।১২ বৎসরের মধ্যও পুনঃ প্রকাশ হয় নাই। কিন্তু এই রকম ঘটনা অতি বিরল।

মন্তব্য। এত দিন পর্যন্ত হাইড্রোসিস আবেগ্যজনক অস্ত্র-ক্রিয়া মাইনর অপারেশন মধ্যে পরিগণিত ছিল। কিন্তু ১৮৯১ খৃঃ অঃ ইনস্পেক্টর জেনারল বাচাডুব ও নং সাবকিউলার দ্বারা ইহাকে মেজর অপারেশন মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত ইহার যথার্থ বিবরণ, সিডিস হস্পিটাল এমিষ্টাণ্টগণের অবগত হওয়া বিশেষ আবশ্যক বিবেচনায়, এই চিকিৎসা বিবরণ এত বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইল।

সংক্রামক রূদ ।

উপদংশ ।

(১৭৭৮ - ১৮৮৩) (বাগেন্সনামিড, এম. আব. সি. পি., (লণ্ডন)

(পূর্ণ প্রকাশিতের পর)

দৈনিক উপদংশ বোগে ক্ষত বা অন্যান্য যে সকল স্থানিক লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাঙ্গা সংক্রামক অঙ্গুবান্দ শ্রেণীভুক্ত। যদিও তাহাদের প্রকৃতি প্রদাহের ন্যায়, তথাচ তাহাদের উৎপত্তি স্থান, বিস্তার আণুবীক্ষণিক গঠন ও পর্ববর্তী কলসমূহে এরূপ বিশেষত্ব দৃষ্ট হয় যে, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। উপদংশ বিষ শরীরে প্রবেশ বশতঃ হার্ড স্যাঙ্কা-বেব (Hard chancre) আদি ক্ষত লসিকা গ্রন্থির বিবর্ধন এবং তৎপরে চন্দ্রে পর্যায়ক্রমে যে সকল নানা প্রকার পবিবর্তন দৃষ্ট হয়, তন্নিম্ন শৈল্পিক স্কিমিতে, স্নায়ু-মণ্ডলে ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রে যে সমুদায় পরিবর্তন দৃষ্ট হয়, সে সকলই প্রদাহসম্ভূত।

উপদংশ ক্ষতের আণুবীক্ষণিক গঠন। অধিকাংশ সময়ে সাধারণতঃ প্রদাহ হইতে ইহাদিগকে পৃথক করা যায় না। উপদংশে যে পেরিওস্টাইটিস (Periostitis) উৎপন্ন হয় তাহা সাফাৎ হেতু উৎপন্ন পেরিওস্টিটাইটিস প্রদাহের সহিত পৃথক করা হুঙ্কর। উপদংশেও বাত বোগের আইরাইটিস (Intis) কেবল রোগীর পূর্ণ বৃত্তান্ত, লক্ষণ, ও ঘটনা সমূহ আলোচনা করিয়া পৃথক করা যায়। উপদংশে ফ্রাই-ব্রন-তন্তব যে বাতিন্য উৎপন্ন হয়, তাহা

প্রায়ই প্রডাক্টিভ (Productive) প্রদাহ শ্রেণীভুক্ত। আক্রান্ত যন্ত্রে অসমানভাবে গাঙ্গুলেশন তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাই ক্রমশঃ বাতিন্য প্রাপ্ত হয়। প্রদাহ প্রবল না হইলে উক্ত তত্ত্ব অপকৃত্ততা প্রাপ্ত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। গাঙ্গুলেশন-তত্ত্ব হইতে উৎ কঠিন সংযোগ তত্ত্ব (Scar-tissue) উৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন দ্বার-তত্ত্ব সঙ্কচিত হয়, তখন অধিবাংশ কোষ আক্রান্তিতে হাস বা একেবারে বিলুপ্ত হয়, শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রদাহোৎপন্ন পদার্থের বিশেষ ভারতম্য দৃষ্ট হয়। কখন কোষ ব্যবহিত পদার্থ অতি অল্প থাকে। কোষের অধিক্য দেখা যায়। কোষায় বা কোষ অল্প থাকে, কোষ ব্যবহিত পদার্থের অধিক্য হইয়া থাকে। অনেক স্থলে যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থান মুহু থাকে। এরূপ প্রদাহ উৎপন্ন পদার্থেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অসমানভাবে বিস্তার দেখিয়াই আমরা উপদংশ অবধারণ করিয়া থাকি।

যন্ত্রের আবরণও অসমানভাবে স্থল হইয়া থাকে। পেরিটোনিয়মও অধিকাংশ স্থলে আক্রান্ত হইয়া থাকে। সেই জন্য অমু্যত পরীক্ষায় আমরা উদর পঙ্করের যন্ত্র সকলের উদর প্রাচীরের স্থানে স্থানে সংযুক্ত থাকা দেখিতে পাই। যন্ত্রাবরণের

অসমান স্থূলতা উপদংশের বিশেষ লক্ষণ। কাইব্রস-তন্তু সঙ্কোচনের সহিত যেমন সমগ্র যন্ত্র সঙ্কুচিত হইয়া থাকে এবং অনেক স্থলে প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হইয়া উঠে, সেই রূপ প্রদাহোৎপন্ন পদার্থ যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অসমানভাবে বিস্তারিত হেতু যন্ত্র সকল অসমানভাবে সঙ্কুচিত হয়। এই হেতু কখন কখন গভীর খাত দ্বারা যন্ত্রকে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করিতে দেখা যায়।

উপদংশ আক্রান্ত যন্ত্রের বাহ্য

দৃশ্যঃ—দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা টেটিলসেব বাহ্য দৃশ্য বর্ণন করিব। যে টেটিলসে উপদংশ হেতু পরিবর্তন ঘটয়াছে, তাহা টিউনিকা ভেজাইনেলিস স্থানে স্থানে সংলগ্ন থাকে, অসংলগ্ন স্থানে তরল পদার্থ থাকে। টিউনিকা এলবুমিনিয়া স্থূল হয়। সংযোগ-তন্তুব স্থূল শুষ্ক সকল টেটিলসেব মধ্য স্থলে বিস্তৃত হয়। টিবিউল সকল স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য লাগবর্ণের পরিবর্তে শ্বেত, পীত আভা-যুক্ত বর্ণ ধারণ করে। মধ্যে মধ্যে স্বাভাবিক টিবিউলও দেখা যায়। গ্রন্থির কাঠিন্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। দুই একটা গমেটাও থাকিতে পারে। এক্রপ পদার্থ অস্থিতে হইলে উহা প্রায়ই অস্থিতে পরিণত হয়। পেরিসটিয়মের নিম্নে, অস্থি স্থূল হয়। হ্যাভারসিয়ান প্রণালী ও ক্যানসেলস স্থানের অস্থি স্থূল হইয়া ক্ষুদ্র গহ্বর সকল ক্ষুদ্রতর হইয়া যায়। প্রদাহোৎপন্ন কোষ সকল স্থানে কাইব্রস তন্তুর কাঠিন্য প্রাপ্ত হয় না, নবজাত কোষ সকল পটাস আও-ডাইড দ্বারা শীঘ্র হ্রাসতা প্রাপ্ত হইতে পারে। প্রদাহজাত পদার্থ সকল প্রথমে

মেদাপকৃষ্টে পরিণত হইয়া অবশেষে শোষিত হয়।

গমেটা—(Gummata, Syphilomata or syphilitic tumours)

ইহাবাহি উপদংশের প্রধান লক্ষণ। আক্রান্তিতে একটা ক্ষুদ্র শোনেণ বীজ হইতে অক্‌বোটেস নাম হইয়া থাকে। উহার চতুর্দিকে একটা দ্রব স্তর আবরণী থাকে। উহা চতুর্দিকেব তন্তুব সহিত একত্র ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে যে, সহজে উৎপাটন করা যায় না। বিকাশ—প্রথমাবস্থায় ইহার অধিক কোমল, দ্রব ও গোহিত, যেত বর্ণের আভা বিশিষ্ট এবং অধিক পরিমাণে রক্ত প্রণালী সমন্বিত, অবশেষে অগুরুত্ব হেতু ইহার অল্প অল্প মেদপূর্ণ হবিদ্রাবর্ণ দৃষ্ট হয়।

আণুবীক্ষণিক লক্ষণ—উহার মধ্য

স্থলে সঙ্কুচিত কোষ, কোষাক্ষর, মেদাণু ও কোণেটিন দৃষ্ট হয়। উহার অব্যবহিত চতুর্পার্শ্বে স্তরবৎ কোষ ব্যবহিত পদার্থের মধ্যে কতকগুলি কোষ দৃষ্ট হয়। গমেটার-পরিবর্তে প্রচুর পরিমাণে কোষ ও শোণিত প্রণালী থাকে। কোষ সকল সাধারণতঃ ক্ষুদ্র শোণিতের শ্বেত কর্ণিকার ন্যায়। বৃহত্তর কোষ সকল মাংসাক্তর কোষের ন্যায়। অক্লান্তকোষও পাওয়া যায়, কিন্তু টিউবারকলে যে পরিমাণে দেখা যায় তাহা অপেক্ষা অল্প। এই সকল কোষ আকারবিহীন, অল্প পরিমাণ কোষ ব্যবহিত পদার্থের মধ্যে থাকে। উহাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে নবজাত শোণিত প্রণালী পাওয়া যায়। এই যে গমেটার তিন অংশের বর্ণন করা গেল, তাহা উহাদের বৃদ্ধি, বিকাশ, ও ধ্বংসের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ঘটয়া

পাকে । পবিত্র অংশে প্রথম অবস্থার বিবরণের পরিচায়ক ক্রমাগত এই অংশের চিহ্ন চিহ্নিত পাবে । ইহাতে বোনের আদিম দেহা যায়, ইহার তৎপরিণাম বা মধ্য অংশকে দাউরম জোন (Fibrous zone) বলা যায় । ইহাট বিকাশের দ্বিতীয় অবস্থা, ইহাতে গ্রাউণ্ডেশন-তন্ত্র প্রায় সম্পূর্ণ রূপে প্রবৃত্ত আকার ধারণ করে । ভিন্ন ভিন্ন গমেটায় ইহার ভারতম্য দেখা যায় । কোন স্থলে সূত্রবৎ গঠন স্পষ্ট থাকে, কোথায় বা কঠিন সিকিটুসর (Centrix) ন্যায় আকার ধারণ করে, কোথায়ও বা কোষ-পূর্ণ জালবৎ গঠন প্রাপ্ত হয় । মধ্যস্থলে (Central zone) আকাববিহীন পদার্থে পবিত্র থাকে, ইহাই সর্বপ্রথম উৎপন্ন হয় এবং ইহাই অপকর্ষের পবিত্র অবস্থা । গমেটার মধ্যস্থলে শোণিত প্রণালীর পবিত্র বর্ধন বশতঃ শোণিত সক্রিয় সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হইয়া থাকে, সেই জন্যই ইহাতে অপকর্ষের লক্ষণ দৃষ্ট হয় । প্রথমাবস্থায় যখন কোন সূত্রবৎ ধ্বংস না হইয়া থাকে, তখন গমেটা শোণিত হইতে পাবে । শেষাবস্থায় গমেটার মধ্যস্থান প্রায়ই শোণিত হয় । সেই জন্য এক প্রকার সঙ্কোচন দাপ থাকে । প্রভব-বৎ পবিত্রবর্তন প্রায় হয় না, কখন কখন গমেটা বিগলিত হইয়া চতুর্দিকে পুঁথি উৎপন্ন করিয়া থাকে, এই স্ফোটক বিদীর্ণ হয় এবং তন্মধ্যে হরিদ্রাবর্ণ প্লাক দেখা দেয় । ইহা টুবাটিকিউলার রোগের পবিত্রবৎ পবিত্র-নের মূর্ত তত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ । ইহা সিকিট চর্মের ন্যায়, স্থিতিস্থাপক চতুর্দিকস্থ তত্ত্ব সহিত সংলগ্ন থাকে এবং অতি অল্প

অল্পে নিষ্ক্ষিপ্ত হয়, তৎপরে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গহ্বর থাকিয়া যায় । গহ্বরবৎ পার্শ্ব কোমল ও অসমান । জিহ্বাতে ইহা প্রায়ই দেখা যায় । ত্বকের এবং শৈথিল্যিক ঝিল্লির গমেটা প্রায়ই একরূপ প্রকৃতি ধারণ করে । উপদংশ রোগের প্রথমাবস্থায় কখন কখন চর্মের উপর যে ক্ষত হয় তাহার সহিত ইহাকে পৃথক্ করা আবশ্যিক ।

উৎপত্তিস্থান—গমেটা সচরাচর চর্ম, চাম্বব নিম্নস্থিত শৈথিল্যিক ঝিল্লি, ফেরিংস সফ্ট প্যালাটে, জিহ্বার শৈথিল্যিক ঝিল্লির নিম্নে পেশী, ফ্যাসিয়া, যন্ত্র সকলের সংযোগ তত্ত্ব বিশেষতঃ যকৃৎ, মস্তিষ্ক, অণ্ডকোষ এবং মূত্রগ্রন্থির সংযোগ তত্ত্বতে সচরাচর পাওয়া যায় । আন্তর্গত উপদংশ রোগে বায়ু কোষেও পাওয়া গিয়াছে । এই গমেটা সংযোগতঃ বিলম্বে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা উপদংশ রোগের টারসিয়ারি (Tertiary) লক্ষণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক ইহা ঐ বোগের প্রথম অবস্থাতে ঘটিতে পারে । সেকেন্ডারি ও টারসিয়ারি অবস্থা বিশেষ রূপে পৃথক্ করা কঠিন । এই দুই অবস্থায় যে সকল নৈদানিক লক্ষণ উৎপন্ন হয়, তাহা বিভিন্ন বরা হ্রস্ব । সকলই প্রদাহ সঞ্চিত, কতকগুলি সীমাবদ্ধ, অপর গুলি বিস্তৃত । এমনকি হার্ড স্যাঙ্কাবের (Hard chancre) গঠন গমেটার প্রথমাবস্থার ন্যায়, ইহাতে লুকোসাইটাস্, তত্ত্ব-উৎপাদক কোষ এবং অদ্ভুত কোষ (Giant cells), সূত্রবৎ কোষ ব্যবহৃত পদার্থের মধ্যে থাকে ।

শোণিত প্রণালীর পরিবর্তন—

মস্তিষ্কের ধমনীর এক প্রকার পরিবর্তন

উপদংশ বোগের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া স্থিতি-
কৃত হইয়াছে। ইহাতে ধমনী সকল অক্ষ-
ত্ব এবং উহাদের প্রাচীরের স্থূলতাবশতঃ
উহাদের আরতনের দ্বারা স্ফ। এই আয়-
তন হ্রাসই উহাব বিশেষ লক্ষণ, এবং দ্বারা
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী ও শিবা সকল সম্পূর্ণরূপে
বন্ধ হইয়া যায়। অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে
ধমনী-প্রাচীরের অভ্যন্তরদেশে প্রদেব
লক্ষণ দৃষ্ট হয়। কোষে সংশ্লিষ্টঃ উহাব
আবরণ অত্যন্ত স্থা হয়। এক পার্শ্বে
এণ্ডোথিলিয়াম এবং অপর পার্শ্বে মেম্ব্রেনা
ফেনেস্ট্রা থাকে বশতঃ কোষ উন্মিত সীমানা
হয়। এই কোষ সকল মাংসপেশ্য হ্রাস
নায়, উহাতে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র গোলাকার
ও মাকু আকার কোষ থাকে, এই তত্ত্ব জনশঃ
আংশিক বিকাশবশতঃ অসম্পূর্ণ হ্রাস
উক্ত পৰিণত হয়, এতদ্ব্যতীত গাঢ় আবরণ
ও ক্ষুদ্র কোষে পূর্ণ থাকে এবং উহাতে
অতিরিক্ত শোণিত প্রণালী দৃষ্ট হয়। এই
সকল কোষ ধমনীর পেশী-প্রাচীরেও
(Muscular coat দেখা যায়। শোণিত
প্রণালীর পরিধির হ্রাস, শোণিত সঞ্চাবেব
প্রতিবন্ধক এবং এণ্ডোথিলিয়ামের পরিবর্তন-
বশতঃ শোণিত প্রণালীর মধ্যে জনিয়া যায়
বা থ্রম্বোসিস (Thrombosis) হয়। এবং
তদ্বারা মস্তিষ্কের বিগলন আনয়ন করে,
ডাক্তার গ্রিনফিল্ড (Dr. Greenfield) দেখা
ইয়াছেন যে, শরীরের অন্য কোন অংশের
শোণিত প্রণালীরাও এইরূপে আক্রান্ত
হইতে পারে। এছবিজম রোগগ্রস্ত ৪০
বৎসর নান ব্যক্তিদের উপদংশ রোগের
বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

কারণতত্ত্ব।— বনিও উপদংশ
বোগ অত্যন্ত সংক্রামক, তথাচ ইহাব কারণ-
সম্বন্ধে এখনও কোন নিশ্চয় হয় নাই।
ইহাব বিষ উদ্ভিদাণু বা জীবাণুতে বর্ত-
মান তাহা ব। কঠিন। সম্ভবতঃ উহা
উদ্ভিদাণু। এই উদ্ভিদাণু শৈথিল্য-ঝিলি
অথবা ক্ষত চর্মের দ্বারা শরীরে প্রবিষ্ট হয়
এবং উহা শোণিত প্রণালী অথবা লসীকা
প্রণালীর দ্বারা শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে
সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই বিষ আদি
সত্তে (Primary sore), মিউকস ট্রাবস্কা
বিত্তীয় অবস্থাব ক্ষত (Secondary sore) চর্ম
বোগের অবস্থাব শোণিত সত্ততই বিদ্যমান
থাকে। ভ্যাক্সিন স্কেটকেব গিল্ফেব ন্যায়
পরিদ্রাব লক্ষ্ম উহা থাকে কি না বলা যায় না।
প্রাচীনিক জ্ঞান বসে যথা—লালা,
গা. নিমেন প্রভৃতিতে ইহা থাকে না।
বোম্বাইর যতের অথবা গমেটা ক্ষতের
বিদ্যমানক নহে। কিন্তু উহা অবল রাখা
আবশ্যক, পুরা বলা হইয়াছে যে, সেকেন-
ডারি ও ট্র্যাক্সিয়ারি অবস্থা অনেক সময়
প্রভেদ করা যায় না।
(করস Klatsch)। এক প্রকার দণ্ডাকার
গঠিত উদ্ভিদাণু আদি ক্ষতে বর্জন করি-
য়াছেন। তিনি লানার উপদংশের নীজ
সংক্রামিত করিয়াছিলেন, তদ্বারা উপদংশের
নান রোগ উৎপন্ন হইয়াছিল। এই
বানবের শোণিত জিগাটিনে নিক্ষেপ
করিলে উপদংশগ্রস্ত মস্তিষ্কের আদি ক্ষতে
দেয় দণ্ডাকার কটা বর্ণ উদ্ভিদাণু পাওয়া
যায়, ইহাতেও দেয় দণ্ডাকার পাওয়া যায়। মার্টিনো
ও হ্যামোনি (Martineau and Hamon)

mie) উপদংশ ক্ষতের রস দ্বারা মাংসের ক্ষতে ঐরূপ উদ্ভিদাণু উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ঐ উদ্ভিদাণু শৃঙ্খলাকারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং উহারা বলেন যে, তদ্বারা শূকরী-শাবকে উপদংশ রোগ উৎপন্ন করাষ্টয়াছিলেন। লাস্টগারটেন (Lustgarten) ১৬টি রোগী লইয়া দেখাইয়াছেন যে, উপদংশের উদ্ভিদাণু টুবাকলিও কুষ্ঠরোগের উদ্ভিদাণুর অমূরূপ। উপদংশের অণু কিঞ্চিৎ বক্র পার্শ্বদৃষ্টের ন্যায় অসমান, কিঞ্চিৎ ক্ষীত এবং উহাদের মধ্যস্থলে ক্ষুদ্রতম কোষবীজদৃষ্ট হয়।

অন্যান্য অনেক পরীক্ষক লাস্টগারটেনের উপায় দ্বারা উপদংশরোগে উদ্ভিদাণু দেখিতে সক্ষম হইয়েন নাই। আলভারেজ ও টাবেল (Alvarez and Tavel) প্রিপিউসের স্বাভাবিক ক্রমে ঐরূপ উদ্ভিদাণু বর্ণন করিয়াছেন। ইভ এবং এ, লিংগার্ড (Eve and A Lingard) বলেন যে, স্বাভাবিক ক্রমে যে উদ্ভিদাণু পাওয়া যায়, তাহা মাংস-ওয়ার দ্বারা রঞ্জিত হইলে পর নাইট্রিক বা অক্স্যালিক এসিড দ্বারা বিবর্ণ হয় না ফলতঃ উপদংশের উদ্ভিদাণু উক্ত এসিড দ্বয়ের দ্বারা বিবর্ণ হয়। ইহা বা প্রিন্ন করিয়াছেন যে, পারদ ঘটিত ঔষধ কিছুকাল ব্যবহাব করিলে উপদংশ ক্ষতের রস দ্বারা উহার কোন নূতন উদ্ভিদাণু উৎপন্ন কবা যায় না।

উপদংশের আদি ক্ষত হইতে বানরের উহার বিষ সংক্রামিত করিয়া প্রকৃত বোগ উৎপন্ন করিতে উহা বা সক্ষম হইয়েন নাই।

যকৃতে উপদংশ রোগ;—
উপদংশ রোগের লক্ষণ যকৃতে সচরাচর পাওয়া যায়। যকৃতের সংযোগ তন্ত্র পরিবর্তন ও গমেটা উৎপন্ন প্রধানতঃ দৃষ্ট হয়। উহার সহিত যকৃতের কাপসুল বা আবরক-ঝিল্লি ছুল ও দৃঢ় কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। সংযোগ তন্ত্র পরিবর্তনের মধ্যে মধ্যে গমেটা অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়, কখন কখন উহার শোষিত হইয়া যায় এবং কেবল মাত্র সংযোগ-তন্ত্র দৃঢ় সিকেকটিকম বর্তমান থাকে। এতদ্বারা যকৃতের আকৃতি বিশেষ রূপে পরিবর্তিত হয়। উহার উগরিভাগে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে খাদেব দাগ দেখা যায় এবং উহা অসমান হইয়া একরূপ সংকোচভাব ধারণ করে। বংশ পরম্পরাগত উপদংশ রোগে যকৃতে সিবোসিসের ন্যায় একরূপ সমগ্র সংযোগ-তন্ত্র পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। উহাতে গমেটা প্রায় পাওয়া যায় না। আমরা আজকাল বালক শিশুর যে মারাত্মক যকৃৎ বোগ দেখিয় থাকি, তাহার কতকগুলিতে পৈত্রিক উপদংশের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

উপদংশরোগে যকৃতে প্রায় যেদাপরুষ্ঠতা দেখা যায়। অন্যান্য যকৃৎ উপদংশরোগে নৈদানিক লক্ষণ বর্ণনা কবা বাহুল্য মাত্র। সকল যকৃৎই একরূপ সাধারণ লক্ষণ দেখা যায় যথা—(১) নূতন কোমোৎপত্তি, (২) স্বাব বা দাগ, (৩) সংযোগতন্ত্র দৃঢ়তা ও কাঠিন্য, (৪) গমেটা পৃথক বা সংশ্লিষ্ট।

(ক্রমশঃ)

চিকিৎসা-বিবরণ।

ট্রে কি ওটমী।

লেখক—ঐযুক্ত ডাক্তার জহিরউদ্দিন আহমদ
এল, এম, এম, এক, সি, ইউ।

নাম—হরিদাসী, বয়স—৮ বৎসর,
জাতি—হিন্দু। নিবাস—২৪ পলগনা, ঢাক-
বিয়া।

পূর্ব বৃত্তান্ত।—বোগিনীর মাতার
বাসনিক অবগত হওয়া গেল—প্রায় এক মাস
গত হইল, বোগিনীর সামান্য অর ও গলবেশ-
মধ্যে ক্ষত হয়, কিন্তু দরিদ্রাবস্থাবশতঃ ও
তৎকালে তাহার কোন বিশেষ কষ্ট
বা যন্ত্রণা না থাকায় উপযুক্তমত চিকিৎসা
হয় নাই। অধিকন্তু কোন প্রকার তবল বস্ত্র
গলাধঃস্থ করণ সময়ে তাহার কিয়দংশ নাসা-
রক্ত ছাড়া বহির্গত হইত।

এইরূপে ২০২৫ দিবস অতীত হইলে
পৰ ক্রমে শ্বাসরুদ্ধ উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত
কষ্ট হওয়ায় তাহার মাতা অতিশয় চিন্তাধিতা
হইয়া তদীয় প্রতিবাদীগণের পরামর্শানুসারে
গ্রামস্থ জৈনক কবিরাজকে আহ্বান করতঃ
চিকিৎসার্থে নিয়োজিত করে। কিন্তু উক্ত
চিকিৎসার ফল না পাইয়া এবং শ্বাসরুদ্ধের
অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ার বর্তমান ধূঃ অকের ২৩শে
ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রাতঃকালে কলিকাতা
ক্যাথলিক হস্পিটালে চিকিৎসার্থ আনয়ন
করায় সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ভর্তি করিয়া
লওয়া হয়।

ভর্তি হওয়ার সময়ের অবস্থা।—
বালিকা দেখিতে ষ্টা পুটা, মুখমণ্ডল চিন্তা-

দ্বিত। অত্যন্ত কষ্টেব সহিত শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন
হইতেছে, ঠগন অস্থি প্রায় ২ ইঞ্চি পরি-
মাণ বক্ষঃগহবর মধ্যে বসিয়া যাইতেছে,
পৰমুহুর্তে আবার উঠিতেছে, চক্ষুর আর-
ক্রিয় ও স্বাভাবিক অপেক্ষা বহির্গত, সমস্ত
মুখমণ্ডল ঘর্ণাক্ত এবং আরক্তিম, শ্বাস
প্রশ্বাসেব সহিত নাসাপুটদ্বয় বিধৃত ও সাঁই
সাঁই শব্দ, গলদেশ এবং মুখমণ্ডলস্থ শিরা
সমূহ শোণিত-পূর্ণ থাকায় বজ্রবৎ প্রতীক্-
মান হইতেছিল। বাক্শক্তি রহিত, চর্ম
শীতল, নাড়ী অত্যন্ত দ্রুতলা, প্রায় বিলুপ্ত।

মুখগহবর পরীক্ষায় ফসেস, এপিগাস্ট্রিস,
কোমল তালু এবং তৎচতুষ্পার্শ্বে ক্ষীত ও ক্ষত
হইয়া শ্লফে পবিত্র হইয়াছে, শ্লফেব কিয়-
দংশ দ্বারা শ্বাসনালীর উপরিভাগ মধ্যে
অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। (গ্লাটিস্) শ্বাস
প্রণালীর উক্ত অবস্থা দৃষ্টে চক্ষুণ্যৎ ট্রে কি-
ওটমী অপারেশন বলা অবধারিত হইলে বালি-
কাকে শয়ন করণের চেষ্টা করা হইল, কিন্তু
তাচাতে শ্বাসরুদ্ধ আরও বৃদ্ধি হওয়ায়
বোগিনী শয়ন করিতে পারিল না। বহু
চেষ্টার পর বোগিনীকে শয়ন করাইয়া
অট্টোম্যান করায় অন্য যেমন ক্লোরোফর্ম
নাসিকার নিকট দেওয়া হইল, অমনি তর্জিৎ
তাচার শ্বাস রুদ্ধ হইল। তখন উপস্থিত অনে-
কেট বালিকাকে মৃত্যু জানে হতাশ্বাস হইয়া
প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। বস্তৃতঃ তদ-
বস্থা দৃষ্টে মৃতদেহ স্থির অন্য কিছুই অগ্রহিত
হইতে পারে না। কেননা জীবনের প্রধান
লক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাস এবং নাড়ীর গতি, তৎ-

কালে উভয়ই বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ছদ্ম স্পন্দন তখনও অভ্যন্তরীণ ভাবে চলিতেছে, তদুপরি স্নানপ্ৰণেয় এবং কেমিক স্নান উপরি বৈদ্যাতিক স্নান চাপত ও শ্বাস প্রাশ্বাস ক্রিয়া পুনঃ স্থাপিত করার জন্য ক্রিম স্নান প্রাশ্বাস ক্রিয়া অব্যাহত করণোঃ মনে করতঃ তৎ ১৫৫৫ প্রায় হইয়া সাধারণতঃ লাভ করা গেল এবং ১০ মিনিট কাগজনিব ক্রিম স্নান প্রাশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে বোগিনী ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস প্রাশ্বাস ক্রিয়া অব্যাহত রাখিল, কিন্তু বৈদ্যাতিক স্নান এবং ক্রিম স্নান প্রাশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ করিতে শ্বাস বোধ হওয়ায় সক্ষম পুনঃস্থাপন হইয়া গেল। তদুপরি বোগিনীকে উৎসাহিত করিয়া সে পুনঃ নাসিকার সহিত নিঃশ্বাস প্রাশ্বাস প্রাশ্বাস করিতে লাগিল। কয়েক মিনিট হ্রদবস্থায় আনিয়া ১০ মিনিট পর টুপি ওঠানো ক্রিম স্নান মানসে পুনঃস্থাপন করান হইল, কিন্তু তৎক্ষণাতঃ শ্বাস বোধের লক্ষ্য সমূহ প্রকাশ হওয়ায় বালিকাকে উঠাইয়া বসান হইল, তখন আমি আব কাল বিলম্ব করা অস্বীকারিত বিবেচনা করতঃ উপবেশনাবস্থায় এবং বিনা কোম্বোফর্ম আঘাতে অঙ্গ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

অস্ত্রোপচার।—প্রথমে এক খনি দীক্ষার পবিত্র স্থান স্থাপন হইয়া প্রাচীর সমুদায় প্রদেশস্থ মধ্য বেধাব উপর ক্রাইকরেড কাটগেজের অধঃস্থ হইতে আবদ্ধবতঃ নিম্নদিকে বিস্তৃত ক্রিয়া অনুমান দেড় ইঞ্চি দীর্ঘ একটা অস্থি ইন্সি-শন প্রদান করতঃ ইক ও স্পাৰ্কেসিয়াল

সেসিবা বর্তন করা হইল। পরে উক্ত ইন্সি-শন ক্রিয়া পরিমাণে গভীর করিয়া টেনে-থাইবট্ট শৈলী সমূহ দেখা গেল; উহাদিগকে দুই অর্ধাংশ অক্ষি-কর দ্বারা উভয় পার্শ্বে টানিয়া উল্লিখিত ইন্সি-শনটি গভীর করিয়া টেনে টেকিয়া বর্তন করা হইল, এই সময় ২ টী স্তম্ভ শব্দ ধমনী বর্তিত হইয়া বহুসংখ্যক হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাদিগকে তৎক্ষণাতঃ লিগেচার দ্বারা আবদ্ধ করা হয়, টেকিয়াব সমুদায় স্থান উক্ত-করা অনাবৃত করা হইল পর বাহ্যিক স্তম্ভ এবং অভ্যন্তরীণ বর্তন করা হয়, যথা বাহ্যিক স্তম্ভ তৎকালে ছুনিবার স্তম্ভ দ্বারা উপর দিকে বাড়িয়া বিস্তৃত হইয়া বহু হইয়াছিল। টেকিয়া উপরোক্ত প্রাশ্বাস করিতে হইলে পর তৎক্ষণাতঃ মনো বাসহস্তের স্তম্ভনী প্রবেশ ও তৎ-পাশ্বে দিয়া টুপি ওঠানো টিউব স্থানানালী মনো সন্নিবেশিত বরণনস্তর অস্থি বহি-স্থিত করা হইল এবং টিউবটী যথানিয়মে খোঁচা সহিত আবদ্ধ করিয়া দেওয়া গেল।

অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করিয়া পর দেখা গেল যে, বোগিনী শ্বাস প্রাশ্বাস কাগ্য বন্ধ, নাড়ী বিলুপ্ত, সংজ্ঞাহীন, কিন্তু তাহাঙ্ক স্নানপ্ৰণেয় কার্য তখন পর্যন্তও বন্ধ হইয়া নাই। তজ্জন্য উক্ত যন্ত্রকে উত্তেজিত করিবার মানসে ১৫ বিন্দু সালফিউরিক ইথর অধঃস্থাতিকরূপে হইয়াবে ব্যবহার, ক্রমাগত ক্রিম স্নান প্রাশ্বাস-ক্রিয়া এবং বৈদ্যাতিক স্নান অব্যাহত অর্ধ ঘণ্টাকাল প্রয়োগ করা হইলে পর বালিকা ধীরে ধীরে টেকিওটমো টিউব

মধ্য দিয়া স্বাস প্রশ্বাস কার্য সম্পন্ন করিতে লাগিল ।

তাহার অন্তঃকণ্ঠ পশ্চৈ মণিবন্ধস্থ ধমনীৰ স্পন্দন পুনর্জীব্য আবৃত্ত ও শাবীরিক উদ্ভাপ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ।

বেলা ১২ টার সময় দেখা গেল যে, বোগিনী ট্রেবিওটমী টিউব মধ্য দিয়া অবাধে স্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছে। সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞালাভ করিয়াছে। নাড়ীর গতি ও শাবীরিক উদ্ভাপ স্বাভাবিক। নগ্নী পালক দ্বারা পবিত্রাব করিয়া দেওয়া হইতেছে।

অপবাক—ডটা—জর হইয়াছে। শাবীরিক উদ্ভাপ ১০০ ২ ডিঃ। নাড়ী দ্রুত, স্বাস প্রশ্বাস সূক্ষ্ম, গলদেশের কর্কট স্থানের যন্ত্রণা ব্যতীত অপর কোন প্রকার কষ্ট নাই, একবার মল-মূত্র ত্যাগ করিয়াছে।

পথ্য—দুগ্ধ ১ সের, দম্ ১ আং এবং সাণ্ড।

ঔষধ—

1½

১ টিং বেলাডোনা ১ মিনিম্

ইসর সালফ ৫ ,,

একোরা ক্যাম্ফার অর্ধ আউন্স

এক মাত্রা ; এইরূপ চারি মাত্রা। এবং

ফিভারমিক্চার অর্ধ আউন্স চারি মাত্রা।

২৪/২/৯২—প্রাতে—বোগিনী গত রাত্রিতে

মল-মূত্র ত্যাগ করে নাই। জ্বর হইয়া

ছিল, উদ্ভাপ ১০০ ২ ডিঃ। একপে জ্বর

নাই, নাড়ী—দ্রুত, টিউবের মধ্য

দিয়া অবাধে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লইতেছে।

টিউবের মুখ বন্ধ করিয়া ধরিলে অত্যন্ত

শ্বাসকষ্ট হয়, রাত্রিতে স্থানান্তর হইয়াছিল : কর্কট কতের চতুর্থাংশ ক্ষীভ ও বেদনা মুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এখন পর্যন্তও পূর্ণোৎপত্তি হয় নাই।

ঔষধ—জ্বর সময়ে ফিভারমিক্চার, বিশ্রাম সময়ে ২ গ্রেন কফি। কুইনাইন,—ক্যাষ্টর অয়েল, অ্যানিমা, ক্যাথিটার দ্বারা মূত্র বর্দ্ধিত ও ট্রেবিওটমী টিউব পবিত্রাব করণ।

পথ্য—পুষ্ট দিনের ন্যায়।

২৫ ২/৯২—প্রাতে—জ্বর এখনও আছে উদ্ভাপ

১০০ ২। সদি হইয়াছে। কাশিবার সময় বটাহুতব বরিতেছে, নাড়ী প্রবল। ছুইবার মল এবং ৪।৫ বার মূত্র ত্যাগ করিয়াছে, কত পুষ্টি হয়, স্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক।

ঔষধ—ড্রেসিং পরিবর্তন, টিউব পরিষ্কার করা এবং মুখমধ্যস্থ ক্ষতোপরি নাইটেট অফ্ সিল্ভার লোশন (২০ গ্রেন ১ আউন্স) লাগান হইল।

পথ্য—পূর্ববৎ।

২৬/২/৯২—প্রাতে—এখনও জ্বর ত্যাগ হয় নাই। উদ্ভাপ ১০১ ৬ ডিঃ। নাড়ী—দ্রুত, দ্রুত। মল মূত্র ত্যাগ করিয়াছে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক। কত মাংসাত্মক উদ্ভব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মুখমধ্যস্থ কতের অবস্থা পূর্বের ন্যায়।

ঔষধ—ড্রেসিং পরিবর্তন, টিউব পরিষ্কার করা এবং মুখ মধ্য নাইটেট অফ্ সিল্ভার লোশন সংলগ্ন করা হইল।

সেবনের জন্য —

এমোনিয়াকার্ক	...	১½ গ্রেণ
স্পিরিট ক্লোরোফর্ম		১০ মি:
টিং সিল	..	১০ মি:
ঐ চাইওসায়েরমাট	..	১০ মি:
এ'নায় সমষ্টিতে	...	অর্ধ আউন্স

প্রত্যেক অর্ধ আং, তিন ঘণ্টা পর
চারি মাত্রা ।

পথ্য—পাঁউকটী, চুন্ধ এবং রম্ ।

২৭.২।৯২—প্রাতে—অব কমিরাছে, উত্তাপ
১০০.৫ ডি:। কাশ পূর্ববৎ । বকে
বেদনাযুক্ত কবিত্তেছে, পদীকায়
বিশেষ কোন অস্বাভাবিক লক্ষণ
পাওয়া গেল না । অন্যান্য লক্ষণ
পূর্ববৎ ন্যায় ।

ঔষধ এবং পথ্য—পূর্ববৎ ।

২৮.২।৯২—প্রাতে—অব ত্যাগ হইয়াছে,
উত্তাপ স্বাভাবিক । বকের বেদনা নাই ।
কাশ কমিরাছে । গলদেশেব কঠিত
ক্ষত শুক হইতে আরম্ভ হইয়াছে ।
মুখমধ্যস্থ ক্ষতের সুফ পরিষ্কৃত
হইতেছে ।

ঔষধ—কুইনাইন মিক্চার, ড্রেসিং এবং
লোশন ।

পথ্য—পূর্ববৎ ।

২৯.২.৯২—প্রাতে—পুনরায় অব হইয়াছে ।
উত্তাপ ১০০ ডি:। অপরূপ লক্ষণ
পূর্ববৎ ।

ঔষধ—কার্বনেট অফ্ এমোনিয়া মিক্চার,
ড্রেসিং ও লোশন পূর্ববৎ ।

পথ্য—পূর্ববৎ ।

৩০.২।৯২—এ কয়েক দিবস অব হয় নাই ।

অনেক সুস্থ বোধ করিতেছে । গলায়
কঠিত ক্ষত শুক হইতেছে । মুখ-
মধ্যস্থ ক্ষতের সুফ প্রায় পরিষ্কার
হইয়া গিয়াছে । অবাধে খাস প্রখাস
গ্রহণ করিতেছে । কথা কহিতে
পারে না । কিন্তু টিউবের ছিদ্র
অঙ্গুলী দ্বারা বন্ধ করিয়া ধরিলে
স্পষ্ট কথা কহিতে পারে ।

ঔষধ—টনিক মিক্চার, ড্রেসিং লোশন ।

পথ্য—পূর্ববৎ ।

১৮।৩।৯২—গলাব কঠিত ক্ষত সম্পূর্ণরূপে
শুক হইয়াছে । তাহাতে বেদনা এবং
ক্ষীতি কিছুমাত্র নাই । মুখমধ্যস্থ
ক্ষতও প্রায় শুক হইয়াছে, কিন্তু
ক্ষতস্থান এখনও ক্ষীত রহিয়াছে ।
বালিকাব আবে কোন কষ্ট নাই ।
প্রফুল্লচিত্তে ওয়ার্ড মধ্যে বেড়াইতেছে
এবং টিউবটী নিজে অঙ্গুলী দ্বারা
বন্ধ কবতঃ অপবেব সতিত গল্প কবি
তেছে, ইহাতে তাহাব কোন কষ্ট
হইতেছে না । তজ্জন্য ছিপি দ্বারা
উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল ।

ঔষধ—কটিক লোশন ব্যতীত সমস্ত ঔষধ
বন্ধ কবা হইল ।

পথ্য চুন্ধ, পাঁউকটী ।

২।৪।৯২—টিউবের মুখ এখনও বন্ধ করা
রহিয়াছে । স্বাভাবিক পথে নিঃশ্বাস
প্রখাস গ্রহণ এবং কথাবার্তা কহি-
তেছে ; কোন কষ্টই নাই । কেবল
বাম চক্ষের কর্ণায় প্রদাহ হইয়াছে ।
অঙ্গুলীদ্বারা আনা গেল যে বালিকা
পৈতৃক উপদংশ রোগগ্রস্তা ।

ঔষধ—চক্ষে এট্রোপিয়া লোশন ড্রপ কক্ষ
এবং কুচকিতে স্ক্রু অয়েন্টমেন্ট মর্দন।

৪।৪।৯২—ভাল আছে। বাটীতে যাওয়ার
জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছে।

৬।৪।৯২—টেকিওটমী টিউব বাহির কবিয়া
গওয়া হইল।

১০।৪।৯২—কর্তিত চিত্র সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ
হইয়াছে। অদ্য বালিকা নিজ
বাটীতে প্রত্যাগমন করিল।

মন্তব্য।—উপবোক্ত বালিকার বিব-
রণ পাঠ করিয়া আমরা হইটী অত্যাৱশ্যকীয়
বিষয় শিক্ষা লাভ কবিতে পারি। ১ম—
ক্রোরফর্ম আত্মাণের সতর্কতা, ২য়—টেকিও-
টমী অপারেশন ও কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস
ক্রিয়ার অত্যাৱশ্যকতা।

১ম। হায়দারাবাদ ক্রোরফর্ম
আত্মাণ সম্বন্ধে যে কমিশন বসিয়াছিল
তাহার পরিদর্শনের বৃত্তান্ত এবং ফলাফল
আমাদিগের সহকাণী সম্পাদক শ্রীযুক্ত
ডাক্তার দেবেজনাথ রায় মহাশয় বর্তমান
খণ্ডের ভিষক-দর্পণের ১ম, ২য়, ৩য়, এবং
৪র্থ সংখ্যায় বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।
ভিষক-দর্পণের ১০৫ পৃষ্ঠা ৩য় প্যারায় তিনি
লিখিয়াছেন যে “যদ্যপি গগদেশে কিছা
বক্ষঃস্থলে কোনরূপ চাপ পড়িয়া শ্বাস কার্যের
বাধা হয়, সেক্ষণ অবস্থান ক্রোরফর্ম প্রয়োগ
করিলে রক্ত সঞ্চাপন শীঘ্র শীঘ্র পর্যায়ক্রমে
একবার বৃদ্ধি একবার হ্রাস হইয়া যায় এবং
তাহার ফলে হৃদপিণ্ডের বিষম কার্য দেখিতে
পাওয়া যায়”। বাস্তবিক ইহা সত্য।
আমাদিগের রোগিনীর গগদেশের মধ্যে
সুকিং অঙ্গার হইয়া উজ্জ্বল সুকের কির-

দংশ দ্বারা শ্বাসনালী একপে সঞ্চাপিত
হইয়াছিল যে বালিকাটী অত্যন্ত কষ্টের
সহিত শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছিল
এরূপ অবস্থায় তাহাকে ক্রোরফর্ম আত্মাণ
করান যুক্তিসঙ্গত হয় নাট। উল্লেখ করা
হইয়াছে যে বালিকাটী যেমন ক্রোরফর্মের
বাষ্প একবার নিঃশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিল
অমনি তাহার শ্বাসবোধ ও নাড়ী বিলুপ্ত
হইল। হৃদপিণ্ডের বিষম কার্য প্রযুক্তই
এই লক্ষ্য ঘটয়াছিল। ক্রিকিং অধিক
পরিমাণে ক্রোরফর্ম আত্মাণ করিলেই তাহার
হৃদপিণ্ডের কার্য বন্ধ হইয়া মৃত্যু সংঘটিত
হইত। অতএব কোন ব্যক্তিকে ক্রোর-
ফর্ম আত্মাণ করাইবার পূর্বে তাহার শ্বাস-
প্রশ্বাসক্রিয়া কিরূপে সম্পন্ন হইতেছে তাহার
বিশেষ কবিয়া পরীক্ষা করা উচিত। যদি
কোন কারণবশতঃ অল্প পরিমাণেও শ্বাস-
কৃচ্ছ বর্তমান থাকে। তাহা হইলে ক্রোরফর্ম
আত্মাণ করান কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত নহে।
হৃদপিণ্ড সবল থাকুক বা দুর্বল থাকুক শ্বাস
পথ পরিষ্কার থাকিলে ক্রোরফর্ম আত্মাণে
কোন আশঙ্কা নাই।

যতক্ষণ রোগী ক্রোরফর্ম আত্মাণ
করিতে থাকিবে চিকিৎসকের উচিত যে
তাহার শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া সূচাক্রমে সম্পন্ন
হইতেছে কি না তাহার বিশেষরূপে
মনোযোগ করিবেন।

২য়।—টেকিওটমী অন্ত্রক্রিয়া এবং
কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়ার আবশ্যকতা। টেকিও-
টমীর আবশ্যক দেখিলে উহা সম্পন্ন করিতে
কোনরূপ বিলম্ব করিবে না। রোগীকে
শয়ান, উপবেশন, দণ্ডায়মান বা খেঁচণে

হটুক বাপিরা অতি সহজর অস্ত্র প্রয়োগ করিবে।

যদি আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি নিবটে না থাকে তাহা হইলে যে কোন প্রকার ছুরিকা (সেনন কলম কাটিবার ছুরী ইত্যাদি) দ্বারা হটুক টেকিয়াতে ছিদ্রোৎপন্ন করিবে। টেকিও-টনী টিউব অভাবে অপর কোন প্রকার একটি নল কঠিত ছিদ্র মধ্যে প্রবেশ কবাইয়া দিবে। যদি কোন প্রকার নল নিবটে না থাকে তাহা হইলে নল আসা পর্যন্ত টেকিয়ার কঠিত ছিদ্রেব পার্শ্বদ্বয় একটা ড্রেসিং ফবনেকস দ্বারা পবস্পব পৃথক্ করিয়া ধরিয়া থাকিবে। দোণী উক্ত ছিদ্র মধ্য দিয়া শ্বাস গ্রহণ করতঃ আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবে।

ক্রোরোফবন আশ্রাণ কাণেই হটুক বা

টেকিওটনী সম্পন্ন করিবার বাণেই হটুক মতনা শ্বাস কক হইলে অচিরে কৃত্রিম শ্বাস-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে থাকিবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ছদ্পিণ্ডের ক্রিয়া বর্তমান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত বণনও ইহাতে নিরস্ত হইবে না।

উল্লিখিত বালিকাটির ছইবার শ্বাস বোধ হইয়া যায়, কেবল যন্ত্র সহকায়ে এবং অবিলম্বে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন কবণান্তর তাহাব প্রাণবক্ষা করা হইয়াছিল। ইতি-পূর্বে আমি কয়েকটি বোগীব শ্বাস বোধ হওয়াত ক্রমায়মে অর্ধ ঘণ্টা পর্যন্ত কৃত্রিম শ্বাস গ্রহণ কবাটয়া তাহাদিগের প্রাণ রক্ষা কবিয়াছি। অতএব যে পর্যন্ত ছদ্পিণ্ডের ক্রিয়া বর্তমান থাকে, সে পর্যন্ত ঐ কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া বন্ধ করা উচিত নহে।

—:~:~:~:—

বিবিধ তত্ত্ব ।

লেখক শ্রীযুক্ত প্রতাপ গিরীশচন্দ্র বাগছি।

লবণ-দ্রবের আশ্চর্য্য ক্রমতা ।

লবণ-দ্রব শিবা মধ্যে প্রয়োগ করিয়া সময় সময় অতি আশ্চর্য্য ক্রম পাওয়া যায়। যখন জীবনের আর কোন আশা থাকে না, কেবল “যাবৎ শ্বাস, তাবৎ আশ।”—এই প্রবাদ বাক্যের বশবর্তী হইয়া চিকিৎসা করিতে হয়, তজ্জন স্থলে এই প্রণালী প্রয়োজ্য। কেননা এই প্রথা বহু পুৰাতন, প্রায় এক শত বৎসর যাবৎ ইহা প্রচারিত হইয়াছে, এই সুদীর্ঘকালে যতদূর সমাদৃত

অথবা সর্গজন পরিচিত হওয়া প্রয়োজন কাগ্যাতার তাহার শতাংশের একাংশও হয় নাই বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। অতঃ এত-দ্বারা মধ্যে মধ্যে ছই একটী সুমুখু রোগীর জীবন রক্ষার জন্য আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

কোন পোড়া বা ঘটনাবশতঃ শরীরস্থ অধিকাংশ জলীয় রস নিঃসৃত হইয়া আসন্ন সময় উপস্থিত হইলে প্রায়স ইহা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। অতরাং বিস্মটিকা, অতিসার, অনিবার্য্য বমন, অথবা অত্যন্ত

রক্তস্রাব হওয়া অবসর হইয়া পড়িলে এই প্রণালী অবলম্বনীয় ।

লবণ দ্রব প্রস্তুত প্রণালী—বিভিন্ন জলে প্রতি আউন্সে ২.৩ গ্রেণ লবণ (ক্রোবাইড অফ্‌ সোডিয়াম) দ্রব করিয়া লইবে । অথবা—

It

লবণ এক আউন্স ।

সোডি বাই কার্ব আট স্কুপল ।

বিভিন্ন জল দশ পাইন্ট ।

একত্রে দ্রব করিয়া লইবে ।

প্রয়োগের পূর্বে এই দ্রব উত্তপ্ত করিয়া লওয়া কর্তব্য এবং বোগীব অবস্থানুসারে প্রয়োগ সময়েও দ্রবের উত্তাপ ১০০ ডিঃ হইতে ১১০ বা ১২০ F ডিঃ পর্যন্ত স্থিতিভাবে রাখা আবশ্যিক ।

ব্যবহার্য যন্ত্র—ডাক্তার বিচার্ডসন সাহেবের অটোমেটিক পিচকারী (Dr Richardson's automatic syringe) একদিকে ব্যবহার্য ।

প্রয়োজ্য স্থান—গ্রীবাভঃ একটান-ম্যাল ফুগলার বা হস্তস্থ বেসিলিক (Basilic) শিরাই উৎকৃষ্ট স্থান ।

মাত্রা—অল্প হইতে ১০ পাইন্ট ।

ডাক্তার ম্যাকিনটস মহোদয় সর্ব প্রথমে এই প্রথা অনুসারে ১৯০ জন অন্তঃ-বাহার বিস্থিতিকারোগগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া উত্তম ফল লাভ করেন ।

ডাক্তার ৬ চুর্চাসাম কর মহাশয় বিস্থ-তিকারোগের বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা প্রণালীতে মৃত্যু সংখ্যার যে হিসাব প্রদর্শন করিয়াছেন । তাহাতে স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায় যে, লাবণিক চিকিৎসাই সর্বোৎকৃষ্ট, কেননা অপরাপর প্রণালী অপেক্ষা এই প্রণালীতে মৃত্যু সংখ্যা অসামান্য কম ।

কৃষ্ণ, কেননা অপরাপর প্রণালী অপেক্ষা এই প্রণালীতে মৃত্যু সংখ্যা অসামান্য কম ।

কৃষ্ণিয়ার অধ্যাপক বাবরফ্‌ সাহেবের মতে ক্লোরোফর্ম দ্বারা বিষাক্ত হইয়া রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হইলে লবণ দ্রব একটি সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ । ইহার প্রভুতি উত্তমক উন্নয়ন হাইপোডারমিক পিচকারী ব্যবহার-পেক্ষা ইচ্ছা প্রস্তুত, কেননা লবণ দ্রবপেক্ষা তাহাদের কার্য অক্ষম স্থায়ী । মলমূত্রের বরফ, নাসিকায় এমোনিয়া প্রয়োগ করাও উচিত নহে । এই উদ্দেশ্যে লবণদ্রব ব্যবহার করিতে হইলে শতকরা ৬ অংশ ফিজিয়লজিক্যাল দ্রব (Physiological solution) শিবা মধ্যে বা দ্রব নিরে প্রয়োগ করা কর্তব্য ।

হৃদপিণ্ডের কার্য বন্ধ হওয়ার পূর্বে উন্নয়ন প্রয়োগ করিতে পারিলেই ভাল হয় ।

ডাক্তার বিচার্ডসন মহোদয় একটা বিস্থিতিকারোগগ্রস্ত র্ত্তীলোকের আসন্ন মৃত্যুর লবণদ্রব প্রয়োগ করিয়া এক ঘণ্টা উইলে স্বাক্ষর করাইয়া ছিলেন । রোগিণী নজরানে শয্যায় উপবেশন করিয়া স্বাক্ষর করেন । কিন্তু ঔষধপ্রয়োগের পূর্বে তাহার জীবনের কোন লক্ষণই ছিল না বলিলে অত্যাশ্চর্য্য হয় না । উইল স্বাক্ষর হওয়ার পর আরও কয়েকবার লবণদ্রব প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু আক্ষেপ ও অভিসার বৃদ্ধি হওয়ার রোগিণী অনতিবিলম্বে কাল-গ্রাসে পতিতা হইলেন ।

শোণিতস্রাব জন্য আসন্ন মৃত্যু হইতে লবণদ্রব প্রয়োগে অনেক লোক রক্ষা পাইয়াছে । তন্মধ্যে নটিংহাম নগরের

অসিদ্ধ ডাক্তার আণ্ডারসন মহোদয়ের একটি রোগীর বিবরণ মাত্র নিয়ে উল্লেখ করা হইল।

একটি লোকের পলিটিয়াল ধমনী হঠাতে অত্যন্ত রক্তস্রাব হওয়ায় অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়ে; মণিবন্ধে ধমনীর স্পন্দন রহিত, কণীনিকা প্রসারিত এবং স্থির, নয়ন চৈতন্য রহিত, সমস্ত শরীর শীতল ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হওয়ায় ১৮ আউন্স লবণদ্রব (প্রতি পাইন্টে ৪০ গ্রেণ) শিরা মধ্যে প্রবেশ করা ইয়া চৈতন্য সম্পাদন করা হয়। রোগী তৎক্ষণাৎ উপবেশন করিয়া চাপ্রাণনা করে। দ্বিতীয় দিবসে আহত ধমনী বন্ধন জন্য ক্ষত প্রসারিত কবা হইলে পুনর্বার রক্তস্রাব হওয়ায় উক্ত দ্রব ১২ আউন্স প্রয়োগ করা হইলে বোগী আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পায়।

ডাক্তার ষ্টারগেন মহোদয় একটি নয় মাস বয়স্ক শিশুকে এই প্রণালীতে চিকিৎসা কবিয়া আরোগ্য কবিয়াছেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রকাশ করিলাম। তাহাতেই পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন যে, আসন্ন সময়ে লবণদ্রব দ্বারা কি মহোপকার সাধিত হয়।

বালক—বয়স—নয়মাস, গত চাবিমাস যাবৎ আকস্ম উপদংশ রোগের জন্য চিকিৎসিত হইতেছিল। সময় সময় অতিসার পীড়া হইত। ১৮৯১—২৬শে অক্টোবর তারিখে ঐ বালকটি গ্রেট অরমণ্ডস্থ শিশু-চিকিৎসালয়ে চিকিৎসার্থে আনীত হয়। তৎপূর্ব দুই দিবস হইতে অতিসার এবং বমন জন্য অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

হস্পিটালে ভর্তির সময় তাহার শরীর অত্যন্ত শীতল, রক্তহীন, চর্ম কৃষ্ণিত, চক্ষু কোটরনিমগ্ন। বালকটীকে তৎক্ষণাৎ উষ্ণ বস্ত্রাবৃত ও ব্রাণ্ডী এবং মাংসের জুস সেবন করান হইল, কিন্তু আট ঘণ্টা কাল এইরূপ চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করা দূর থাকুক, বরং ক্রমে ক্রমে মন্দ লক্ষণ সমূহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হস্পিটালে অবস্থান সময়ে তাহার অতিসার কি বমন বন্ধ হয় নাই। অবশেষে নিরুপায় হইয়া বাম দিকস্থ বাহু জুগুলার শিরা উন্মুক্ত করিয়া তন্মধ্যে দুইটি মজলযুক্ত উপনুক্ত পিচকারী দ্বাৰা বাব আউন্স লবণদ্রব (৩৬ গ্রেণ লবণ) প্রয়োগ করা হইলে তৎক্ষণাৎ বালককে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইতে আবস্ত হইল। শেষে ১০৫ ডিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বালক অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠে এবং তৎসহ অপরাপর লক্ষণও পরিবর্তিত হইল। ৩৬ ঘণ্টা পর উক্ত উত্তাপ স্বাভাবিক উত্তাপে পরিণত হইয়াছিল। শেষে অতিসার জন্য গ্রে পাউডার, ডোভার্স পাউডার ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসা করিয়া অতি সহর আরোগ্য লাভ করে। লবণদ্রব প্রয়োগের পর মুহূর্তে বালক অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। অপিসন্ন প্রয়োগ করায় ঐ সকল উপদ্রব অতি সহজে উপশম প্রাপ্ত হয়।

কোন ব্যক্তির শরীর হইতে শোণিত লইয়া অপর শরীরে প্রদান করিলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি সময় সময় দুর্বলতা অনুভব করে। তদ্রূপ স্থলে লবণ দ্রব প্রয়োগ দ্বারা অতি সহজে ঐ দুর্বলতা তিরোহিত হয়।

নানাবিধ কারণবশতঃ রক্তের হীনবস্থার লবণস্রব প্রয়োগ করিলে সহজে রক্তের উৎকৃষ্টাবস্থা সম্পাদিত হয়, এবং তদাযু-
ষ্মিক অপরাপর স্নাক লাভ করা গাইতে পারে

এ প্রসূতি কি মানবী ?

ডাক্তার বাববার একটি প্রসূতির পদ-
বিবরণ লান্সেট পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া-
ছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ—

একটি কুমারী লণ্ডনস্থ কোন টপনগারস
বেল গাড়ীতে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। শকট
প্রকোষ্ঠে অপব কেচট ছিল না। তদবস্থায়
তাহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়া কেবল
মাত্র একটি হস্ত বহির্গত হয়, তখন প্রসূতি
সেই হস্ত সজোরে টানিয়া প্রসব করিতে
চেষ্টা করার হস্ত ভগ্ন হইয়া যায়। তৎপব এক
খান চুরিকা লইয়া তৎ হস্ত কর্তন করতঃ
শকট বাতায়ন দ্বার দিয়া দূরে নিক্ষেপ করে।
কিছু কাল পবে নির্দিষ্ট স্থানে শকট উপস্থিত
হইলে প্রায় অর্ধ মাইল পথ পদভ্রমণে গমন
করিয়া নিজ বাড়িতে উপস্থিত হয়। এই
ঘটনার একঘণ্টা কাল পব চিকিৎসক
উপস্থিত হইয়া ক্লোরোকবম আশ্রমে
অচৈতন্য করতঃ টার্বিং দ্বারা প্রসব
করান। সন্তানটি পূর্ণাবয়ব সম্পন্ন, দক্ষিণ
হস্তের কবুই সন্ধির ২ ইঞ্চ উপবে কর্তন
করা হইয়াছিল। যথাবিহিত চিকিৎসায়
প্রসূতি আরোগ্য লাভ করে। আইন অমু-
সারে এই স্ত্রী লোকটি হত্যাপরাধে অপরাধিনী
নহে কিম্বা সাধারণে জিজ্ঞাসা করিতে
পারে যে, এ কি মানবী ?

হিকা নিবারণের সহজ উপায়।

সময় সবধ হিকা অত্যন্ত কষ্টদায়ক

উপসর্গরূপে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসকে
বাস্তবিক কবিতা তোলে। এ ঙ্গকতর উপসর্গ
জন্য কষ্ট ভোগ না করিয়াছেন এমন চিকিৎ-
সক অতি বিরল। তজ্জনা হিকা নিবারণের
একটি সহজ উপায় নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।
পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে এই সহজ প্রক্রিয়া
দ্বারা অনেক উপকার পাইতে পারিবেন।

ফ্রেনিক মায়ুপবি সঞ্চাপ প্রদান—যে
স্থানে ষ্টেনো-ক্লাইডো-মাইটইড পেশী ঠর্ণ
এবং ক্লাভিকেল হইতে উৎপন্ন হইয়া একত্রে
সম্মিলিত হইয়াছে, তদাধায়ে অর্থাৎ
পেশীর উভয় সুণ্ডের মধ্যস্থলে অঙ্গুলী দ্বারা
ফ্রেনিক মায়ুকে সঞ্চাপ প্রদান করিলে
হিকা নিবারণ হইতে পারে, ইহার ফল অর্ধ
হইতে দুই তিন মিনিট মধ্যেই স্পষ্ট বুঝিতে
পাওয়া যায়।

এই কৌশল দ্বারা কেবল মায়বীয় হিকাট
নিবারণ হইতে পারে। নতুবা অন্যবিধ
কারণজনিত ঙ্গকম পেশীর আক্ষেপ হইয়া
হিকা উপস্থিত হইলে তদ্রূপ স্থলে বিশেষ
কার্য্যকারী হয় না। যেমন পাকস্থলিতে
নানাবিধ বস সঞ্চয় জন্য আক্ষেপ, নানাবিধ
কীট জনিত আক্ষেপ, তদ্রূপ স্থলে প্রথমে
কারণ নির্ণয় পূর্বক তৎপ্রতিবিধান করাই
কর্তব্য। নতুবা কেবল যে পুনঃ পুনঃ হিকা
দ্বারা রোগী কষ্টভোগ করে এমত নহে।
দীর্ঘ কাল এই উপসর্গ বর্ধমান থাকিলে
দিন দিন অবসন্ন হইয়া পরিশেষে রোগী
কালগ্রাসে পতিত হওয়াও অসম্ভব নহে।

ডিফথিরিয়া।

ডাক্তার চারলস ষ্মিথ উক্ত রোগ আরো-
গ্যার্থে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা প্রদান করেন :—

১৪

কার্বলিক এসিড	১ অংশ
টউক্যানিপটাস আইল	১ „
তাবপিন তৈল	৪ „

একত্রে মিশ্রিত করতঃ এক খণ্ড পবিত্র বস্তুর ভেত্রে ওদ্যে প্রক্ষেপ করতঃ তৎবাস্প দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে। এবং তৎসঙ্গে মৃদে চিৎকার ডিক্টিওলিস, বেলোডোনা ও এরামাটিক স্পিবিট অফ্ এমোনিয়া আভ্যন্তরিক সেবন করাইলে ভাল হয়, অথবা অনাবিধ ঔষধও সেবন করান সাইতে পারে।

অপব একজন অধ্যাপকের মতও প্রায় ঐ রকম, তাঁহার মতে প্রথমে তুলা দ্বারা আক্রান্ত স্থান পবিত্র করিয়া,

১৫

সাল্‌ফোডাইনিক এসিড	১০০ অংশ
কার্বলিক এসিড	... ২০ „

একত্রে মিশ্রিত করতঃ প্রতি ঘণ্টায় প্রক্ষেপ দিতে হইবে। এই প্রয়োগরূপ কার্বলিক এসিড-মিসিরিন অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট, মালিকেরাও অনায়াসে সহ করিতে পাবে, বিষাক্ত হওয়ার কথা কখন শুনা যায় নাই। ঔষধ প্রয়োগের পূর্বে, উষ্ণ জল সহ এল-কোহলিক স্যালোল ড্রব (Salol lotion) (৪০ ভাগে ১ ভাগ) মিশ্রিত করিয়া ধৌত করা প্রয়োজন।

করামীদেহস্থ ডাক্তার তেলখিল মহাশয় নিম্নলিখিত মতে ধূম গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন।

পাতলা আলকাতরা এবং তাবপিন তৈল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া অগ্নি সংযোগ

করিলে অত্যন্ত ধূম নির্গত হয়। ঐ ধূম দ্বারা গ্রহণ করিলে বায়ু পৃথক ডিক্টি-বিয়া কুপ ইত্যাদি, পেশীজাত উপবিধান সমূহ সহজে বিগলিত হইয়া বহিষ্কৃত হইতে থাকে। এই উপায় অবলম্বন করিলে অনেক সময় টেপি ওটনী অস্ত্র করার প্রয়োজন হয় না এবং যে সকল স্থলে প্রতিক্রিয়াকবলতঃ টেপি ওটনী অস্ত্র করা সম্ভব পর নহে তদ্রূপ স্থলে বিশেষ উপকার পাওয়া যাইতে পারে।

অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকেব মতে ডিক্টি-মিসিয়ার বিন (Microbe) কেবল উপ-বিধান মধ্যে অবস্থিতি করে। সুস্থ অংশ দিক বসিয়া কখনই প্রবেশ কবে না। সুতরাং যে বোন উপায় অবলম্বন পূর্বক উপবিধান সমূহ বিনষ্ট এবং বিগলিত করতঃ বহিষ্কৃত করা যায় তাহাই প্রকৃষ্ট উপায়। স্থানিক প্রদাহ নানাবিধ সহজ উপায়ও উপশমিত হইতে পারে।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব রোধার্থে
প্লগ করার সহজ উপায়।

সময়ে সময়ে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইয়া বিপদ হইতে পারে। বহু চেষ্টাতেও সহসা নিবারণ হয় না। নাসিকা-পথ প্লগ করায় অপব যে সকল উপায় আছে তৎসমস্তই কষ্টসাধ্য, আবাব তদুপায় অবলম্বন করিতে হইলে যে সমস্ত যন্ত্রের প্রয়োজন তাহাও সর্বত্র সুলভ নহে। তজ্জন্য ডাক্তার-ফিলিপ মহাশয় নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দেন :—

ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ গ্রন্থ সমচতুর্কোণ বিশিষ্ট

এক খণ্ড রেশম, অইলিশিক বা সামান্য বস্ত্র (এক খণ্ড ক্রমাল হইলেই হয়) ছত্রের ন্যায় কুঞ্চিত করিয়া তদ্ব্যমো তাপমান যন্ত্রের দ্বাৰা আধার, পেনহোলডার, প্রোব বা তদ্রূপ একটা শলাকা স্থাপন করতঃ নানিবা মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাৎ এবং অল্প নিম্ন-দিকে প্রবেশ করাইল ঐ বস্ত্র খণ্ডের মধ্য কুঞ্চিত ভাগ নেজো কেবিস নাগক পাত মধ্য উপস্থিত হইবে। তখন ঐ বস্ত্র খণ্ডের আরও কিয়দংশ উক্ত শলাকা সাহায্যে প্রবেশ করাইয়া শলাকাটা সাবধানে বহির্গত করিয়া লইবে। এই প্রক্রিয়ায় সমস্ত নাসাপথ একটি থলির দ্বারা আবৃত হইবে।

তদনন্তর ফটিকরীড়ব বা তাবপিন তৈল অথবা তদ্রূপ কোন সঙ্কোচক ত্রবে তুল্য সিদ্ধ করতঃ ঐ থলীর মুখ মধ্য দিয়া পূর্ণোক্ত শলাকার সাহায্যে থলীর শেষ পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করাইয়া সমস্ত নাসাপথ পরিপূর্ণ করিলে পশ্চাৎ নাসিকা বন্ধ দৃঢ়রূপে সঙ্কপিত হইবে। তৎপর কঠিন সূত্রদ্বারা থলীর মুখ বন্ধ করতঃ আকর্ষণ পূর্ব্বক বাহিব করা যায় এমন অংশ রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ কাঁচি দ্বারা কঠিন করিয়া ফেলিবে।

অপরায়ণ প্রণালী অপেক্ষা এই প্রণালী অত্যন্ত সহজ। রেশম বা অইলিশিক দ্বারা নাসিকার বৈদ্যিকিক্রি আঘাত প্রাপ্ত হয় না, সহজে বহির্গত করা যায়। রক্তস্রাব রোধ হইলে ঐ সূত্র ধরিয়া টানিয়া অথবা ডেসিং কনসেকন্স দ্বারা সহজে বহির্গত করা যায়। বহির্গত করার পূর্ব্ব থলির মুখবন্ধ করতঃ ডেসিং কনসেকন্স দ্বারা তুলা ক্রমে ক্রমে বহির্গত করা কর্তব্য। প্রবেশিত তুলা

ধরিয়া টান দিলে যদি পুনর্বার রক্তস্রাব হয়, তবে কার্বলিক বা কণ্ডিও লোশন দ্বারা পিচকাবী করিলে সহজ বোধ হইতে পারে, ইচ্ছাতে অক্লান্তকাণ হইলে সাক্ষাৎক ঔষধের জল দ্বারা পিচকারী করা কর্তব্য। বস্ত্র কোথাও বৈদ্যিকিক্রি সহিত আবদ্ধ থাকিলে উক্ত ক্রমে পিচকারী দ্বারা নরম করা উচিত।

উভয় নাসিকা গলবৎ পূর্ণ করিতে হইলে ব্যবহৃত বস্ত্র বা তুলা তৈলাক্ত করিয়া লইয়া প্রবেশ এবং নিষ্কাশন করান সহজ হয়। বৈদ্যিকিক্রিতে সংযুক্ত হইয়া আশঙ্ক্য থাকে না।

নিম্ন শিখিত কয়েকটা বিষয়ে এই প্রণালী অপরাপর প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

(ক) অশস্ত্র সহজ। (খ) ব্যবহার্য্য দ্রব্য সর্বত্রই সুলভ। (গ) অল্প সময় মধ্যে কাণ্ড সম্পন্ন হয়। (ঘ) নাসিকা-প্রাণিব বা কোনও তালু কোন অনিষ্ট হয় না। (ঙ) প্লগ প্রয়োগ সময়ে কাশি, বমন ইত্যাদি উপসর্গ উপস্থিত হয় না। (চ) মুখ গলবৎ মধ্যে সূত্র ইত্যাদি কোন দ্রব্যই রাখা আবশ্যিক হয় না। (ছ) অতি সহজে বহির্গত করা যায়। (জ) বৈদ্যিকিক্রি কোন ক্ষতি হয় না।

পেটাল (Petal),—স্পার্শ-হারক

এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ার পূর্ব্বই স্পর্শশক্তি বিলুপ্ত হইয়া থাকে। ডাক্তার ব্রেগার ১৫০ রোগীর দৃষ্ট উৎপাদন করার জন্য প্রয়োগ করিয়া স্কুল লাভ করিয়াছেন, ইহার কার্য্য অতি দ্রুত আরম্ভ হইয়া অল্প সময় মধ্যেই পর্য্যবসিত

হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এক কি দুই মিনিট মধ্যে কার্য্য আরম্ভ হয়; ৩০ মিনিট কাল চৈতন্য বিলুপ্ত থাকে। সপ্তম মিনিটের শেষে কার্য্য শেষ হয়। ১০ হইতে ৫০ গ্রাম ঔষধে অস্ত্রক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে। ঔষধের বাষ্প গ্রহণ করার সময় নমন ইত্যাদি অথবা তৎপব শিরঃপীড়া বিবমিষা ইত্যাদি কোন উপদর্গ উপস্থিত হয় না। স্বাণীন ক্রিয়া সমুদ্রেব বিলোপের সহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হইতে দেখা যায়। এই ঔষধ সামান্য সামান্য অস্ত্র ক্রিয়াব জন্য বিশেষ উপযোগী, কিন্তু পুন্দরিত ডাক্তার মহাশয়ের প্রকাশিত নিম্নলিখিত চূর্বটনাটী লক্ষণেই স্মরণ রাখা কর্তব্য।

একটা বালিকার দস্ত উৎপাতন করার প্রয়োজন হওয়ায় তাহাকে ৪ গ্রাম পেট্রোল প্রয়োগ করা মাত্রই অবসর হইয়া পড়ে, নাকী বিলুপ্ত, কণীনিকা বিস্তৃত, এবং শ্বাসরোধের লক্ষণ উপস্থিত হওয়ায় কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া সংস্থাপন করতঃ তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছিল, সুতরাং এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে বিশেষ সাবধান হইয়া প্রয়োগ করাটী বিধেয়।

শ্বাস যন্ত্রের পীড়ায় ডাই অক্-

সাইড অফ্ হাইড্রোজেন।

থাইসিস, ব্রঙ্কাইটিস, লেইজাইটিস,

টে কিরাইটিস, হপিংকফ শ্বাসকাশ প্রভৃতিতে এই ঔষধের বাষ্প দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে ব্রঙ্কাইটিস, শরীরের মাংশ ক্ষয় হওয়া, নিশা ঘর্ষ, ব্রঙ্কিয়াল শ্বাস, রালস্, কন্সলিডেশন প্রভৃতি ক্ষয় কাশের সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইলেও ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। শতকরা ১—১০ অংশ দ্রব বয়েক মাস ব্যবহার কবিলে কাশ, গয়ার এবং স্থানিক কন্সলিডেশন অনেক কম হইয়া থাকে। প্রথমে অল্পমাত্রায় (শতকরা ১ ভাগ) আৰম্ভ করিয়া ক্রমে মাত্রা বৃদ্ধি করা কর্তব্য। টিউবারকিউলার পীড়ায় শতকরা ৫ অংশ ব্যবহৃত হয়; ইনহেলেশন রূপে প্রয়োগ করা উচিত।

ক্যাম্ফারিক এসিড।

এই ঔষধ কক্ষকাশের নিশাঘর্ষ এবং সিষ্টাইটিস বোগে প্রয়োগ কবিলে অনেক উপকার হইয়া থাকে। ক্ষয়কাশ বোগে যখন উদরাময়, মূত্রাশয় প্রদাহে যখন দুর্গন্ধ যুক্ত ঘোলা মূত্র নির্গত হয় তখন ১০ গ্রেণ মাত্রায় বোগী সেবন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, ক্রমে মাত্রা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

ইংরাজী সাময়িক পত্র হইতে গৃহীত।

ইনফুয়েঞ্জার ফলদায়ক।

ও আন্ত চিকিৎসা।

লেখক—জন কিবার, এম. আর. সি. পি.,
এডিনবরা ইত্যাদি।

এক সময় মিঃ কিবার বলিয়াছিলেন যে, তিনি স্বভাবের সাদৃশ্যতাব অবলম্বন পূর্বক নব সংক্রামক পীড়া সমূহের চিকিৎসার একটা মত স্থির করিয়াছেন। যথা, 'অন্তরীক্ষচর সমুদয়', গ্রহনক্ষত্রগণের আকৃতি গোল দর্শন কুরিয়া আমাদের পৃথিবীর আকারও গোল নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। এই মতানুসারে তিনি বলেন, জীবাণুগণের জীবন ও তাহাদের বংশবর্দ্ধন-শক্তি প্রাথমিক ভাষাদের উপযুক্ত পুষ্টি পদার্থে বসতি উপর নির্ভর করে। ক্লিন (Klein) বলেন এক কিউবিক সেন্টিমিটার বিক্টি একটা ইনফিউবের পায়ে ৯৮ ডিগ্রী তাপে দ্রবীভূত এবং তাহাতে ব্যাসিলাই সংযোগ করিলে প্রথম ২৪ ঘণ্টায় ৮০,০০০ গুণ বংশ বর্দ্ধন হয়; দ্বিতীয় ২৪ ঘণ্টায় ৪৫০ গুণ এবং তৃতীয় ২৪ ঘণ্টায় কেবল ৫ গুণ বৃদ্ধি হয়। এতদ্বারা আমরা অবগত হইলাম যে, যত দূর কমিয়া ধার এবং পচন-ক্রিয়ায় পদার্থের আধিক্য হয়, ততই বংশবর্দ্ধনশক্তি হ্রাস হয়, এমনকি একবারে উঠিয়া যায়। জীবাণুগণের বংশবর্দ্ধন ও বৃদ্ধির কালে এক প্রকার পদার্থ নিঃসৃত বা উৎপন্ন হয়; এই পদার্থ ঐ

জীবাণুগণের বিনাশসাধক এবং যেমন এই নিঃসৃত বা উৎপন্ন পদার্থ বৃদ্ধি হইতে থাকে, তেমনি ইহাতে সেই জীবাণুগণের জীবন-শক্তি হ্রাস করিতে থাকে ও এই পদার্থ যখন বোন এক বিশেষ পরিমাণে উৎপন্ন হয় তখন ইহাতে ঐ জীবাণুগণের প্রাণনাশ করে।

ইয়েষ্ট ফাঙ্গাস (Yeast fungus) মণ্ট ইনফিউশনে সংরক্ষিত হইলে উপযুক্ত উদ্ভাপে ইহা বেশ বৃদ্ধি পায়, আর যতক্ষণ উক্ত সংযোগোৎপন্ন আলকোহল ঐ জলীয় পদার্থের শতকরা ২০ ভাগ না হইয়া উঠে; ততক্ষণ এই বর্দ্ধন ক্রিয়া চলিতে থাকে; তৎপরে এই আলকোহল উক্ত ফাঙ্গাসের বর্দ্ধন হ্রাস করে, এবং পরে মদোপধারী পচনক্রিয়াও বন্ধ হইয়া যায়। ডাক্তার ব্রাউন স্যান্ডারসন (Dr Brown Sander-son) ও প্রদর্শন করিয়াছেন যে ব্যাসিলাসের এক প্রকার ক্ষরণ সেই ব্যাসিলাসকে ধ্বংস করে। এই সকল ঘটনা রোগোৎপাদক ফাঙ্গাসও তজ্জনিত রোগ, এক সঙ্গে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অতিশয় উপকারী বলিয়া বোধ হয়।

এইরূপ ঘটনা সকল সংক্রামক ব্যাধি চিকিৎসার ব্যবহার করিতে গেলে জীবাণুগণের চতুর্পার্শ্বে এমন একটা পরিবর্তন সংঘটন করা কর্তব্য, যেমত সেই জীবাণুগণের জীবিত ও জৈবোপাধি অবস্থায় উৎপন্ন হইয়া থাকে, কেননা, তাহাদের শরীর হইতে এবং

প্ৰকার পদার্থ ক্ষরণ হয় যে সেই পদার্থ সেই জীবাণুগণের জীবন নষ্ট করে। এতদ্বা-
যদি রোগের কোন চিকিৎসা না হয়, রোগীর
জীবনশক্তি জীবাণুগণের বিবোৎপাদিকা-
শক্তি অপেক্ষা তদিক হঠাৎ বোগ দ্বতঃ
ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে পারে।

এতদ্রূপে আমরা সমস্ত জীবাণুগণের
আক্রমণাদীন, বিস্তৃত আমাদেব শরীরকে
একরূপ প্ৰকার পরিবর্তন কবিত্তে পারি যে,
সেই আক্রমক জীবাণুগণ আর আমাদিগের
শরীরের মধ্যে অবস্থিত করিতে পাবে না,
উহা তাহাদিগের পক্ষে নিত্যন্ত অসহ্য হইয়া
উঠে, আর এই অবস্থায় আমরা আমাদিগের
দৈহিক যন্ত্রাবলীর জীবনশক্তি এতদূর
পরিমাণে সংবর্দ্ধন কবিত্তে পারি যে সেই
অমৃত্যুপারিত্ত অবস্থার বিনাশনীয় হস্তের
আক্রমণ হঠাৎ বন্ধা পাঠিতে এবং আমাদি-
গের বোগীয় প্রাণ বন্ধা কবিত্তে পানি। ইদা-
নোস্থন রোগোৎপাদক জীবাণুগণ পালন ও
পর্যাপোচনা কার্যে এই অভিলষিত ও কার্য-
করী পদার্থে তত্ত্ব করা হইয়া থাকে। বোগের
প্রথমাবস্থায় রোগীর শরীরের পরিবর্তনসহ
যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, আমি ঐকপ একটা
পদার্থেব অন্বেষণ করিতে প্রস্তাব কবি—
আনি নাগশীল ও মৃত্যুৎপাদক রোগজনক
ফাঙ্গান্ (উদ্ভিদাণু) তাহার অসুকৃণ প্রীয়
প্রধান দেশেব ভূমি ও জল বায়ু হইতে
বেজ্জন্মীয়া হইবার প্রতিকূল প্রদেশেব
ভূমি ও জল বায়ুতে স্থানান্তরিত করিতে
থাক এবং উক্ত উদ্ভিদাণু এই অভিনব স্থানে
থাকিয়া আর অনিষ্ট করিতে পারিবে না
বলিয়া আমার দ্বব বিশ্বাস হয়। কার্য্যতঃ

আমি এই মত ইনকুয়েন্স চিকিৎসার
পরিণত করিরাছি এবং তাহার ফল অতি
সুখ জনক হইয়াছে। ১৮৮৯-৯০ সালের
ইনকুয়েন্স এপিডেমিক কালে আমি একটা
উক্ত বোগগ্রস্ত রোগী প্রাপ্ত হই; তাহাকে
দেখিয়া ভাবিলাম, মচবাচর প্রচলিত
চিকিৎসা ছাড়া এই রোগীৰ প্রাণরক্ষার
জন্য আরও কিছু কবিত্তে হইবে। উপরে
যে ভাব আমি প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাই-
রাছি সেইরূপ প্ৰকার একটা নিয়ম আমার
মনে উদয় হইল এবং এই সিদ্ধান্তের
উপর নির্ভব কবিয়া কার্য্য আরম্ভ
কবিয়া বোগীৰ উপস্থিত অবস্থা পরিবর্তিত
করিলাম এবং বোগ মচসা অদৃশ্য হইল।
পরে আমি শত শত বোগী আমার এই নবা-
বিস্কৃত পদ্ধতি অসুক্রমে চিকিৎসা করিয়া
এবং একরূপ সুফলে সম্বষ্ট হইয়াছি। বর্তমান
(১৮৯১) বৎসরের এপিডেমিকেও উক্ত
চিকিৎসায় অতি সুন্দর ফল লাভ করিয়াছি

আজ কাল কি ঘটনা হইতেছে, তাহা
সংক্ষিপ্তরূপে নিম্নে বিবৃত হইল; আমি
একটি রোগী দেখিতে আহৃত হইলাম;
রোগীকে দেখিলাম, মুখমণ্ডল রক্তিমাবর্ণ,
অতি তীব্র ললাট-প্রদেশীয় শিরঃপাড়া, বন্ধিত
শাবীবোস্তাপ এবং সেই সময়ই রোগী শীত
বা বম্পের কথা জানাইতেছে; বেগবতী
নাড়ী, অতি দুর্বলবস্থা (Prostration)
এবং অনির্বচনীয় কষ্ট। রোগীর জন্য ঔষধ
ব্যবস্থা করিলাম এবং পরদিন রোগীকে
দেখিতে বাইরা দেখি রোগের তীব্র লক্ষণচয়
একেবারেই অন্তহিত হইয়াছে। কোন
খাতনা নাই, নাড়ী এবং শাবীবোস্তাপ

খিক ও রোগী আরামে আছে, কিন্তু দুর্বল, এবং ২০টা রোগীর মধ্যে ১৯টা রোগীর নিকট অল্পসন্ধান দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, ঔষধের দ্বিতীয় মাত্রা সেবনেই উপশম প্রাপ্তি হইয়াছে অর্থাৎ চিকিৎসা আরম্ভের ৪ কিম্বা ৬ ঘণ্টা পরে রোগী রোগের উপশম অল্পভব করিয়াছে। প্রমাণস্বরূপ নিম্নে দুইটা রোগীর অবস্থা উল্লেখ করা হইল :—

প্রথম রোগীঃ—মিঃ টিঃ—অতিশয় পীড়িত, মূত্ৰদশা উপস্থিত বলিয়া রোগী নিজে অনুমান করিতেছে, নাড়ী ১১৭, এতদ্ব্যতীত উপযুক্ত সমুদয় লক্ষণাক্রান্ত। আমি সাহস পূর্বক বলিলাম, “আপনি আগামী কল্যা প্রায় আরোগ্য প্রাপ্ত হইবেন” পরদিন রোগীকে প্রায় নিরাময় দেখিলাম এবং তাঁহার নাড়ী ৬১ হইয়াছে পাইলাম।

দ্বিতীয় রোগী—এঃ একঃ—অনেক বিবাহিতা যুবতী, হঠাৎ পীড়াগ্রস্ত, প্রথম দর্শনকালে তিনি উন্মত্ত প্রায়, কেহ নিকটে আসিলে চিনিতে পারেন না, পরদিন তাঁহাকে সুস্থ দেখিলাম, কিন্তু দুর্বল এবং জ্বালিতে পারিলাম যে, দ্বিতীয় মাত্রা ঔষধ সেবনান্তে উপশম আরম্ভ হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিবসে রোগীণী সম্পূর্ণ সুস্থ। নিজে স্বরিক্ত পরিধান করিয়াছেন, পীড়িত শয্যা ত্যাগ করিয়াছেন এবং গৃহে নিজ কার্য করিয়া বেড়াইতেছেন।

এখনও পর্য্যন্ত আমি আমার চিকিৎসা ভাঙের কথা কিছুই বলি নাই। সামান্য উপায় দ্বারা কখন কখন অত্যধ হিতকর ফল পাওয়া যায়। যদি কেহ সার্ব টনস জরায়ব্রূনের সমর জিজ্ঞাসা করিত “নবতীর

বাতের সন্ধান্তরুই প্রতিকারক উপায় কি” ? তাহার উচিত উত্তর এই হইত যে, রোগীকে ৬ সপ্তাহ কক্ষের মধ্যে থাকিতে হইবে এবং তৎসহ বিবিধত ঔষধ সেবন করিতে হইবে। স্যালিসিলেট অব সোডা ইহা সমস্তই পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছে এবং বাতজ বেদনার দুরতিশম্য বাতনা হইতে রোগীকে অতি সত্ত্বরই মুক্তিদান করিয়া থাকে। এইরূপ ইনফুয়েঞ্জার ভয়ানক আক্রমণের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্থির করিলাম যে, ইহার সম্পূর্ণ বৈরীভাবাপন্ন কার্যকরী অবস্থা রক্তের অতিলাবণিক ভাব, এবং তদনন্তর বাইকার্বনেট অব পটাশ (Bicarbonate of Potass.) ই আমার স্মরণপথে প্রথম পতিত হইল। এই লবণে অনেক উপকার আছে।

ইহা অতি স্থায়ী লবণ নহে, সহজে শরীরের মধ্যে বিভাগ হইয়া প্রবেশ করিতে পারে এবং সহজেই শরীর হইতে বাহির হইয়া বাইতে পারে; একারণ সত্ত্বরই শরীরকে ত্যাগ করে। এজন্য পটাশ পর-জন্ হইবার সম্ভাবনা অতি কম।

উপযুক্ত পটাশ দ্বারা আমার সমুদয় কার্যোদ্ধার হওয়ার আমি অন্য কোন ঔষধের প্রতি দৃষ্টিপাত করি নাই, কিন্তু আমার উক্ত মত অল্পসারে আর আর অন্য ঔষধ দ্বারাও ঐরূপ স্মরণ ফল প্রাপ্তি হইতে পারে। ৩০ গ্রেণ মাত্রার এক চা-পিয়ালী-পূর্ণ ছদ্ম সহ সেবনার্থে দুই তিন ঘণ্টান্তর দিয়া থাকি। ইহাতে কয়েক বিদ্যুৎ টিং ক্যাপসিকাম যোগ দিয়া থাকি কিন্তু তাহা না হইলেও চলিতে পারে।

সতর্কতাবিষয়ে দুই একটা কথা ।

২।৩টা রোগীর জন্মের গতি অতি মন্দ হয়; কিন্তু ডিজিটালিস ও স্পিরিট এমন এরোম্যাট প্রয়োগে সত্ত্বর স্বাভাবিক ভাব পুনঃপ্রাপ্তি হইয়াছিল, কখন কখন তরল মল ভাগ হইয়া থাকে কিন্তু তাহা ডোভার্স পাউডার দ্বারা উপশমিত হইয়া যায়। যদি কোন আত্মপূর্বিক পীড়ার কারণে দৌর্ভাগ্য উপস্থিত থাকে, কিম্বা অন্য কোন আত্ম বদ্ধিক পীড়া বর্তমান থাকে, তাহা হইলে ঔষধের ক্রিয়া কিছু বিলম্বে প্রকাশ পায় কিন্তু

উপকারিতায় সন্দেহ নাই। যেহেতু সত্ত্বর ঔষধ ব্যবহার ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তথায় লক্ষণ সকল পুনরায় প্রকাশ পায় কিন্তু পুনরায় ঔষধ ব্যবহার করিলে ঐ সমুদয় লক্ষণ সত্ত্বর অদৃশ্য হইয়া যায়।

আমি বিশ্বাস করি যে কেহ ইনকুয়েন্ডা চিকিৎসা কবিবার সুযোগ পান, আমার এই মতে চিকিৎসা করিয়া দেখিলে সন্তোষজনক ফললাভ করিবেন কারণ এই ঔষধ সমানভাবে কার্য্য করে।

(The Lancet. Dec 19th 1891-

page 1385)

—:~::~~:—

কলিকাতা মেডিক্যাল সোসাইটী ।

গত ১২ই ডিসেম্বর তাবিখে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাঁস্পাতালে এই সভার দ্বাদশ অধিবেশন হয়। সভাপতির আসনে ডাক্তার কে.ম্যাক্‌লিউড (Dr. K. McLeod) লাহেব মহোদয় আসীন।

ডাক্তার ত্রীযুক্ত বাবু নীলরতন সরকার মহাশয় পিত্তাশ্মরীযুক্ত একটা যকৃৎক্ষোটক রোগীর বিষয় সভায় পাঠ করেন।

রোগী :—ডি, এন, জি, বয়স ৪৫ বৎসর; বসিয়া যে কার্য্য সমাধা করা যায় এমত কোন কার্য্য করতঃ জীবিকানির্ভাহ করিতেন কিন্তু কশ্মিষ্ট ও মিতাহারী ছিলেন। গত ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা প্রায় ৪টার সময় ট্রাম শকটে গমন করিতেছিলেন, হঠাৎ দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়াম ও এপিগ্যাস্ট্রি-

য়ম প্রদেশে একটা অতীব দুঃসহ্য বেদনা উপস্থিত হয়। বেদনা অবিরাম ভাবে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিল, তখন রোগীর চিকিৎসক আসিয়া রোগীকে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করিতে দেখিলেন; দেখিলেন, শয্যায় লুষ্ঠন করিতেছেন; ৫ খন শয়ন, কখন উপবেশন, কিন্তু কোন অবস্থায়ই সুখ পাইতেছেন না বরঞ্চ ইহাও বলিলেন যে, দক্ষিণ এপিগ্যাস্ট্রিয়াম ও হাইপোকণ্ড্রিয়াম প্রদেশে যেন অগ্নি জলিয়া উঠিতেছে। রোগী দুইবার বমন করেন, তাহাতে তাঁহার যন্ত্রণা কিঞ্চিৎ হ্রাস ও উপশম হয়। দেহ যেদে পরিপূর্ণ হইল এবং নাড়ী ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং ক্রমশঃ সুখকর চিত্তাকুল হইল এবং শ্বাসপ্রশ্বাস খন জন

বহিতে লাগিল। প্রস্রাব অনায়াসে করিলেন। উদরস্থান নাই।

চিকিৎসা করায় বেদনা ক্রমশঃ রাজির শেষাংশে হ্রাসভা প্রাপ্ত হইল। এক প্রকার বৃহত্তাব অবলম্বন করিল। পবদিন প্রাতে (১ই সেপ্টেম্বর তারিখে) তাঁহার শারীর-তাপ কার্ণহিট তাপমাত্রা যন্ত্র একশত তিন তাপাংশ পর্য্যন্ত উত্তিতে দেখা যায়। সেই দিন বেলা ৮।০ টার সময় তাঁহার একটা জরানক কম্পন উপস্থিত হয়, তখনও তাঁহার উপযুক্ত শারীরতাপ বর্তমান ছিল। এই কম্পনের পরে রোগীর চক্ষু এক প্রকার হরিভাবর্ণ হইয়া যায়। দক্ষিণ বাহুসুল-প্রদেশে কোন বেদনা ছিল না এবং কবম্পার্শ্ব বন্ধবর্জন অমুভূত হয় নাই। দক্ষিণ হাই-পোকণ্ডিয়াম প্রদেশে সঞ্চাপনে বোগী কষ্ট অমুভব করেন। দিবাবসান কালে রোগী কয়েকবার হরিদাত পীত তবল পদার্থ উল্লীর্ণ করেন। পবদিন প্রাতে ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে বোগীকে এক প্রকার বৃহৎ বেদনা, জঞ্জিৎ ও প্রবল জ্বর (১০৩ ডিঃ ফাঃ) ভোগ করিতে দেখা যায়। যকৃতের নবপ্রদাহ অস্বমান করিয়া এক মাত্রা ক্যালোমেল প্রয়োগ করিলে রোগীর ৫ বার মলত্যাগ হয়; তাহাতে তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ বিবেচনা করেন। মলে পিত্তাশ্রয়ী ছিল না। সেই দিন সন্ধ্যার সময় রোগীর প্রকৃত পরিমাণে ভেদ হয় এবং রাত্রি ১০ টার সময় শারীরতাপ ১০২ ডিঃ ফাঃ থাকিতেও বাড়ী লুপ্ত প্রায় হইয়া যায়।

১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে দক্ষিণ কুস্কুসের জলপ্রদেশের নব প্লুরো-নিউমোনিয়া সংঘটন

হইয়াছে অবগত হওয়া গেল। জ্বার স্পষ্ট ছোট ও বড় মরট ক্রিপটেশন, টিউবিউলার-ব্রিডিং এবং বর্জিত স্বরীয় প্রতিধ্বনি ছিল, ও দক্ষিণদিকের অংশে ও মধ্য কুস্কুস্ খণ্ডোপরি-আঘাতনে ভারিচ্ছ ও সগর্ভতা প্রকাশ হইল। রোগী কাশির সঙ্গে ২।৩ খণ্ড রট্টকলার্ড (Rewty coloured) আটাল কফ তুলিয়াছিল। ইত্যবসরে ঔদরিক লক্ষণনিচয় কিছু সময় গুপ্ত বহিল। চিকিৎসা হওয়ার কুস্কুস্ প্রদাহ ছই সপ্তাহ মধ্যে উপশমিত হইল। রোগী এতদব পর্য্যন্ত প্রতিকার প্রাপ্ত হইল যে, ২।৪ ঘণ্টাকাল উপবিষ্ট হইয়া থাকিত এবং তাঁহার সাধারণতঃ খাদ্য জীর্ণ করিতে পাবেন।

কিন্তু তথাচ প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় শারীর-তাপ বৃদ্ধি হইতে (১০১ ডিঃ কখন ১০২ ডিঃ ফাঃ), এক প্রকার মৃদু কনকন্ করা বেদনা এবং সঞ্চাপনে কঠোরত্ব দক্ষিণ হাই-পোকণ্ডিয়াম প্রদেশে অমুভূতি করিতেন; ক্ষুধা মান্দ্য এবং পরম্পরাগত ভেদ ও কোষ্ঠ-বদ্ধতা। কুস্কুসের নিয়ন্ত্রণের পশ্চাদ্ধিকে আঘাতনে সগর্ভতা এখনও পাওয়া যায়। লক্ষণনিচয় নিম্নোল্লিখিত ব্যাধিত্বয়ের কোন একটি না কোন একটি হইবে বলিয়া প্রকাশ করে।

(১) যকৃতক্ষোটক; (২) ম্যালেরিয়া-জনিত জ্বর অথবা (৩) ডারামের প্লুরা সঞ্চরণ প্রদাহ। ম্যালেরিয়া বলিয়া যে অস্বমান, তাহা ছই সপ্তাহকাল অধিক মাত্রায় কুইনাইন প্রয়োগপূর্বক দূরীভূত হইল।

১১ই অক্টোবর তারিখে রোগীর আর

একবার কম্প হয় এবং তৎপরে ১০০ ডিঃ ফাঃ পর্যন্ত তাপবৃদ্ধি হয়। আন্তরিক পূরণ-পদ্ধতি হুটরাছে বলিষ্ঠ সন্দেহ প্রবলতর হইল। এবং ১৫ই অক্টোবর দিনে পশ্চাৎ কক্ষেরখার অষ্টম পঞ্জরধর-মধ্য-প্রদেশে ডাক্তার রেমহোদর একটা পরীক্ষণ চিত্র করেন কিন্তু এতদ্বার পূর আছে বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। পর দিন প্রাতে ১৬ই অক্টোবর তারিখে, ডাক্তার বাচ'মহোদর দক্ষিণ ইন্‌ফ্রাম্যারী প্রদেশে ম্যারী রেখার উপরে একটা সর্গর্ভ স্থানে অন্য আর একটা পরীক্ষণ চিত্র করেন। এই চিত্র পথ দিয়া আস্পিরেটর নীডল (Aspirator needle) দ্বারা সার্জিক্সট আউল হরিদাভ তরল পুষ্টিগন্ধময় পুয় নিঃসারিত হয়; কিন্তু ফোটক গহ্বরস্থ সমুদয় পদার্থ নিষ্কাশিত না হইতেই উক্ত আচুণ সূচিকা বহিষ্কৃত করিয়া লওয়া হয়, তদ্বারা অস্ত্রোপচার কালে পরিণাম কষ্ট বিদূ-রিত হয়। সূচিকা বহিষ্কৃত করিয়া লওয়া হইলে পরে রোগী পাঁচ মিনিট কাল আপ-নাকে অপেক্ষাকৃত স্থূহ বিবেচনা করিলেন, কিন্তু রোগী যেমন বাম পার্শ্বে ফিরিলেন অমনি তাঁহার বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ পার্শ্বে স্নাতিশর যাতনাদায়ক বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। এই সময় রোগীর শ্বাসকৃচ্ছ উপস্থিত হয়, শ্বাস অদীর্ঘ, অগভীর, মুহুমূর্ছঃ (মিনিটে ৫৫ বার) হইতে লাগিল। পতনাবস্থার লক্ষণনিচয় উপস্থিত হইল, শারীরোত্তাপ ৯৬ ডিঃ (ফার) হইল এবং হাতে নাড়ী পাওয়া যায় না এমন ভাব হইয়া উঠিল। পর দিন রোগীর বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ পার্শ্বে উর্ধ্বে ক্লাডিকল্‌ অস্থি-

পর্যন্ত আবাতনে সর্গর্ভতাব প্রকাশিত হইল এবং উক্ত অস্থির নিম্ন প্রদেশেই কেবল শ্বাস শব্দ শ্রুত হওয়া গেল। স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, দক্ষিণ ক্লস্‌ক্লস্‌-আবরণ-কোষা-ভাঙ্গরে অনেক পরিমাণে তরল পদার্থ রহি-য়াছে এবং তজ্জন্য অস্ত্রোপচার আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করা হইল। রোগী পত-নাবস্থায় থাকা বশতঃ কর্ত্তন-অস্ত্রোপচার না করিয়া আচুণ সূচিকা-যন্ত্র সহযোগে ১৮ আউন্স তরল পুয় বাহির করিয়া লওয়া হয়। সূচিকা নিষ্কাশিত করিয়া লইলে তদগ্রভাগে হবিদাভ একবৎ ক্রিয়ং পরিমাণে কর্ত্তন পদার্থ সংযুক্ত রহিয়াছে পাওয়া গেল। এই অস্ত্রোপচার করার, অবশ্যমুখ্যায়ী রোগীকে উপযুক্ত রূপে শয্যায়, পথ্য এবং উত্তেজক ঔষধ সেবনে রোগী একটু ভাল; অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন এবং তদনুযায়ী পর-দিন কর্ত্তন অস্ত্রোপচার ও পুয়নিঃসারণ করা স্থির করা হইল। ৮ই অক্টোবর তারিখে ডাক্তার ম্যাক্‌গাউড সাহেব মহোদর রোগীকে ক্লোরোফর্ম করিয়া রোগীর শস্তম-পঞ্জরাস্থির উপস্থির পার্শ্বদিকে উক্ত পঞ্জরা-স্থির উপরে প্রায় চারি ইঞ্চি পরিমাণ ইন্সি-শন প্রদান করেন। ঐ অস্থির সূচিক ইঞ্চি পরিমাণ অংশ কর্ত্তন করিয়া বাহির করিয়া লয়েন। পুরার কোষ কর্ত্তন করিয়া, বাহির করিলে কতকটা পরিমাণে সিরাস (Serous) তরল পদার্থ বহির্গত হইল এবং অতি অল্প সময় ডাইরেটর ও অক্সিজেন দ্বারা চেষ্টা করার বহুদ্রব্যস্তরস্থ ফোটক-গহ্বর প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং এই ফোটক-গহ্বর হইতে বহুল পরিমাণে প্রবাহিত

পূর নিঃসৃত হইল; কিন্তু এই নিঃসৃত পূর সচরাচর বক্কা-ফোটকসমূহ পূরের মতন নহে। ফোটক-গন্ধের অভুলি দ্বারা পরীক্ষা করায় কতকগুলি পিত্তাশ্মরী প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সকলের মধ্য কয়েকটা অন্তর ও সম্পূর্ণাধার নিষ্কাশ করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আরও প্রায় দুই চামচ চূর্ণ পিত্তাশ্মরী বাহির করিয়া লওয়া হয়। ক্ষত পচননিবারক ঔষধ সহযোগে ড্রেস করিয়া একটা উপযুক্ত নিজামক নলিকা প্রবিষ্ট করিয়া রাখা হইল। অস্ত্রোপচারের কয়েক ঘণ্টা পরে দা বাঁধা বস্ত্রাদি (ড্রেসিংস) রক্তবসাদিতে সিক্ত হইয়া গেল এবং পরদিন প্রাতে দক্ষিণ ইনকুবাটিকিউলার প্রবেশ আঘাতনে অতি-প্রতিধ্বনিকারমান (Hyper resonant) পাওয়া যায়। রোগীর শ্বাসরুদ্ধ ও বক্কা-হুলের নিয়ম প্রবেশের আঘাতনে স্বাভাবিকতা সম্ভাব্য রহিল।

অস্ত্রোপচার হইয়া গেলে কয়েক দিন পর্যন্ত সন্ধ্যাকালীন উদ্ভাপ বর্জন হইতে দেখা যায় নাই, কিন্তু এক সপ্তাহকাল পরে আরও শ্বাসরুদ্ধ-তা বৃদ্ধি হইল। পোস্ট-টারিরার এক্সিলারী লাইনে বর্ষ ও সপ্তম পঞ্জরাস্থির মধ্যস্থিত স্থানে একটা ছিদ্র করা হয় এবং এই ছিদ্র দ্বারা প্রায় ৩ আউন্স তরল পূর সিক্তান্বিত করা হইয়াছিল। ইনকুবাটিকিউলার-কোবাত্তাস্থির পদার্থ নিষ্কাশনার্থে যে পথ পরিষ্কার করা হইয়াছিল, সেটা উক্ত কোব সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করিবার উপযুক্ত নহে, এতদ্ব্যতীত বক্কা-হুলের অবিকৃত নিরে আরও এক স্থানে কর্তন করা বিধারিত হইল।

২৭শে অক্টোবর তারিখে এই অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়; ডাঃ ম্যাক্সউড সাহেব বক্কা-হুল রোগীর বর্ষ পঞ্জরাস্থির কোণের নিকট হইতে প্রায় দুই ইঞ্চি পরিমাণ পঞ্জরাস্থি কর্তন করিয়া অস্ত্র করার প্রায় এক গাইন্ট পরিমাণ পুষ্টিগন্ধময় পূর নির্গত হয়। একটা ডবল ড্রেনেজ টিউব (Double drainage tube) প্রবিষ্ট করিয়া পচন-নিবারক জলাদি সহযোগে ক্ষত ড্রেস করা হয়।

এই দ্বিতীয় অস্ত্রোপচারান্তে রোগী ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিকতা লাভ করিতে লাগিল। কয়েকটা অগভীর শ্বাসরুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাও ক্রমশঃ শুকাইয়া আসিল। বক্কা-হুল হইতে নিজামক নলিকা দিয়া যে পূর নির্গত হইত, সততই তাহার সঙ্গে কিছু পরিমাণে পিত্ত ও মল মিশ্রিত রহিত।

রোগী এক্ষণে প্রায় প্রতিকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই রোগীর রোগনির্ণয়, চিকিৎসা ও নিদানতত্ত্বে অনেক আশ্চর্য্যতা আছে।

প্রথমতঃ রোগ নির্ণয়ঃ—

রোগ দীর্ঘকালব্যাপী এবং ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণনিচর প্রকাশক যে তদ্বারা রোগনির্ণয় বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইত।

রোগের আরম্ভে বক্কা-হুল পোষণে বসিয়া বিবেচনা হয় এবং রোগের সহসা প্রকাশ হওয়া, পিত্তবমন, শাণ্ডিল্য কষ্টদায়ক বেদনা, কম্পন, বেদনার পর জন্ডিস (Jaundice) অর্থাৎ হৃৎ ও হৃদয় হরিদ্রাবর্ণ হওয়া লক্ষণ যুক্ত হওয়া হিপ্যাটিক কলিক (Hepatic

colic) বলিয়া অস্বীকৃত হইল কিন্তু ৪৮ ঘণ্টা অতীত হইলে বেদনা ও লক্ষণগণে কষ্ট-মুহূর্ত্তির স্মৃতি ও অস্বাভাব খাকা বশতঃ সঙ্কটজনিত যকৃত-প্রদাহ বলিয়া সন্দেহ জন্মিল, হিপ্যাটিক কলিক ও নব সঙ্কটজনিত যকৃত-প্রদাহ (Acute hepatic congestion) প্রভেদ করা অতি কঠিন কার্য; সুবিখ্যাত রোগদর্শক ট্রুসো সাহেব মহোদয় স্মারী কলিক নিশ্চয়াক ও নির্ণায়ক লক্ষণ, কম্পন, এবং সুদৃঃসহ বেদনার পরই জটিল ভাব আবির্ভাব হওয়া স্থির করিয়া পরে বলেন, নব যকৃত-প্রদাহেও উক্ত লক্ষণনিচয় বর্তমান থাকিতে পারে; তবে রোগীর পরিত্যক্ত মলসহ পিত্তাশ্রী প্রাপ্ত হইলেই রোগ বাস্তবিক প্রভেদ করা হইতে পারে। এই রোগীর মলে পিত্তাশ্রী পাওয়া যায় নাই। দুইতিন দিন পর্যন্ত রোগীব যকৃত-প্রদাহ হইয়াছে বলিয়া চিকিৎসা করা হয় ও তাহাতে অতি সামান্য প্রতিকার পাওয়া যায়।

পঞ্চম দিবসে প্লুভো নিউমোনিয়া আক্রমণ করায় রোগের বাস্তবিক প্রকৃতি প্রকাশ হইল, কেননা উপযুক্ত লক্ষণনিচয় প্রকাশ হইলে নিউমোনিয়াও উপস্থিত হইতে পারে।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষে নিউমোনিয়া আগোগ্য হইলে যকৃত সঞ্চয়ী লক্ষণগুলি পুনরায় সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল কিন্তু তখাচ প্লুভো নিউমোনিয়া কি প্রধান রোগ না পীড়ার উপলব্ধি রূপে মধ্যে উপস্থিত হইল তাহার সিদ্ধান্ত সন্দেহ-গর্ভবিত্ত। এইরূপ সামান্য সন্দেহাবলী অনেক উপস্থিত হয়, এক সময় সন্দেহ হইল যে অরুণসহ

ডায়ক্লামস প্রুভো-প্রদাহ ও ম্যালেরিয়া অরুই রোগীর রোগ; কিন্তু ১১ই অক্টোবর তারিখে কতকগুলি কম্পন হওয়ার রোগ নির্ণয় পরিবর্তন হইয়া যকৃত-প্রদাহ স্থির হইল কিন্তু যকৃত-প্রদাহের বিশেষ লক্ষণাভাব ছিল। আচরণ ব্যতিক্রম ব্যতীয়া যকৃত-ভ্রাত্তরে যে পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে, তাহা প্রতিপন্ন হইল, কিন্তু কর্তনক্রমেপচার যত দিন না কব' হইরাছিল, তত দিন রোগের স্বরূপ তত্ত্ব সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় নাই।

দ্বিতীয় দিবস রোগীব বক্ষঃ ছিদ্র করায় যে বোগীর সহসা শ্বাস কষ্ট ও পতনাবস্থা উপস্থিত হয়, তাহাতে বোধ হয় যে স্ফটিকা-পথ দিয়া স্ফোটক-গহ্বরস্থ পদার্থ ফুৎফুস্ আবরণ-কোষাভ্যন্তরে নিঃসৃত প্রবিষ্ট হইয়াছে। প্রথম কর্তনক্রমেপচারে উক্ত পুণ্যেব কিয়দংশ নিঃসৃত করা হয়, আর কিয়দংশ স্ফোটক-গহ্বরে রহিয়া যায়, যদ্বারা সেকেন্ডারী এম্পাইমা (Secondary Empyema) সংঘটিত হয় ও যৎকারণবশতঃ রোগীকে কিছু দিন পরে কর্তনক্রমেপচার পুনরায় করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ চিকিৎসা :—আল্‌কোহল আভ্যন্তরিক প্রয়োগ বাস্তবিক অন্য কোন বিশেষত্ব নাই, যকৃত-স্ফোটক খাকা সত্ত্বেও সুবাব অজ্ঞান প্রয়োগও সম্বল হইয়াছে। এই রোগীর অত্র চিকিৎসারই বিশেষ বিশেষ বস আছে। যখন যকৃত পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে দেখা গেল, তখন নিম্ন লিখিত তিনটা প্রদ্র উদয় হইল:—

(১) স্ফোটক কখন কর্তন করিতে হইবে ?

(২) এই অস্ত্রোপচার কোথায় করিতে হইবে?

(৩) এই অস্ত্রোপচার কেমন করিয়া করিতে হইবে?

প্রথম প্রশ্নঃ—এই বিবেচনামীন হইল যে অস্ত্রোপচার রোগীর পক্ষে অধিক অনিষ্টকর হইবে, না পৃথক অধিক অনিষ্টকর হইবে? আশুবিপদাশঙ্কা চেষ্টা কি এষ্ট রোগীর অস্ত্রোপচার অবিলম্বে করা যাউবে? ইহা যুক্তিসংগত বলিয়া বোধ হইল যে এত পরিমাণে পুষ্টিগত পূর্ব যত্ন ও ফুস্ফুস-আবরণ মধ্যে রহিলে উপস্থিত দৈহিক দুর্বলতা হইতে রোগী কখনই স্বাস্থ্যোন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। আশু অস্ত্রোপচারই রোগীর একমাত্র উপায় রহিয়াছিল এবং সেই অস্ত্রোপচারই করা হইল।

দ্বিতীয় প্রশ্নঃ—সচরাচর যত্ন-ফোটক অস্ত্রোপচারে যে কেহ হউক না কেন, ফুস্ফুস-আবরণ কোষ বাহ্যে বাচিয়া যায় অর্থাৎ আঘাতিত না হয়, তাহার চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু এই রোগীর ফোটক ফুস্ফুস-আবরণ-কোষ বাহ্যে দীর্ঘ বিদীর্ণ করিয়া তদ্ব্যথা পুষ্টি স্থগিত হইয়াছে; তবে এইক্ষেণে কোন স্থানে কর্তন করিলে ফোটক সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই এক্ষণে বিচারাধীন। এক্ষণে যে স্থানে ছিদ্র করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই স্থানেই অস্ত্রোপচার করা হইবে।

তৃতীয় প্রশ্নঃ—এখানে কি কেবল কর্তন করা, না, তৎসহ পঞ্জরাস্থি একাংশ ছেদন করিয়া অস্ত্রোপচার করিতে হইবে, তাহারই পক্ষ করা হইতে লাগিল। পঞ্জর

রাস্থি এবং ষে ছেদন করিয়া অস্ত্রোপচার করা অধিকতর বষ্টকর এবং এখানে রোগীর অপেক্ষাকৃত বষ্টমায়ক অস্ত্রোপচার অনলম্বন করিতে কিছু সন্দেহ উৎপন্ন হয়, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ফোটক গহবর পূর্ণ নিঃসারণ করাই অতীত প্রয়োজনীয়, এবং তাহা যদি না হয়, সামান্য অস্ত্রোপচারে তাহা না হইবারই সম্ভাবনা, তাহা হইলে অস্ত্রোপচার অনর্থক হইবে। এই সকল কারণবশতঃ পঞ্জরাস্থি একাংশ ছেদন করাই আবশ্যক বলিয়া স্থির হইল, এবং এইরূপ অস্ত্রোপচার করা যে যুক্তিসঙ্গত কি না, তাহা রোগীর উক্ত সমুদ্র অবস্থারও সেই অস্ত্রোপচার করিয়া পরিণামে সুকল পাওয়ার প্রতিপন্ন হইল।

নিদানতত্ত্বঃ—নিদানতত্ত্বে এই রোগীতে কিছু আশ্চর্য্য ঘটনা আছে। সচরাচর যে যত্ন-ফোটক দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে, এই যত্ন-ফোটক তাহা নহে; যে কারণে যত্ন-ফোটক উৎপন্ন হইয়া থাকে এরোগীর সে সকল অভাব। এই ফোটক লিভার পারেন্কাইমা (Liver parenchyma) হইতে উৎপন্ন হয় নাই। এই ফোটক বরঞ্চ রিটেনশন সিস্ট (Retention cyst) এর মত বলিয়া বোধ হয় এবং ইহাতে পরিণামে পুষ্টি সঞ্চয় হইয়াছে। ফোটক সম্ভবতঃ নিম্নলিখিত উপায়ে উৎপন্ন হইয়াছে—

প্রথমে যত্ননলীর (Of the hepatic duct) কোন একটা শাখার একটা পিত্তাশয়ী আছে, এবং পিত্ত নিঃসরণের ব্যাধিত জন্মায়। এতদ্বারা সঞ্চিত পিত্তের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পিত্ততত্ত্ব ও উক্ত

নলী ক্ষীত হইল। ক্রমে আর পিত্তাশ্রয়ী সকল জন্মিল। উক্ত নলী যেন ক্রমে একটা কৃত্রিম পিত্তকোষ এবং ভ্রূষা পিত্তাশ্রয়ীও তৎচূর্ণ সঞ্চয় হইতে লাগিল। অস্ত্রোপচারকালে রোগের অবস্থা এই বলিয়া অনুগুণি পরীক্ষার সপ্রমাণিত হয়, কেননা তৎসময় ইহা মুখে মুখে ফানেল রাখিলে যেমন থাকে এইরূপ পাওয়া যায়, এবং ইহার সর্বাপেক্ষা একটা অতি স্থূর্ণ ঝিল্লিঘারা আবৃত। নিঃসৃত পুত্র দর্শন করিলে তাহা যকৃত পুত্র বলিয়া বোধ হয় না এবং অধিক পরিমাণে পিত্ত নিঃসরণ এই রোগীর রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে।

ইহা বর্ণন করা আবশ্যক হইতেছে যে, হিপ্যাটিক ডাক্টের শাখা সমূহে বড় বড় পিত্তাশ্রয়ী বর্তমান, ও তৎকর্তৃবশতঃ স্ফোট কোৎপন্ন হইয়াছে:— এই সকল নিদান ভ্রূষের আশ্রয় কাণ্ড। সচরাচর বড় বড় পিত্তাশ্রয়ী পিত্তকোষে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখনশী ট্রুসো বলেন, যকৃতে পিত্তাশ্রয়ী যাকৃৎকাকণাবৎ হইতে দেখা যায়, সেই সকল পিত্তাশ্রয়ী পিত্তকোষের বৃহদাকার বিশিষ্ট পিত্তাশ্রয়ীর সত্ত্ব বড় নহে। ডাঃ উইক্‌হাম লেগ (Dr. Wickham Legg) সাহেব বলেন, হিপ্যাটিক ডাক্ট ও তাহার শাখা সমূহে পিত্তাশ্রয়ী কদাচিত দৃষ্টিগোচর হয়। যদি এই রোগী অধিতীর নহে, তথাপি এরূপ রোগী সত্ত্ব পাওয়া যায় না। যে সকল পিত্তাশ্রয়ী এই রোগীতে পাওয়া যায়, তাহাদের আকারও কিছু আশ্চর্য্য। পিত্তাশ্রয়ী আর টেট্রাহেড্রাল (Tetrahedral) হয় কিন্তু এই রোগীতে

যে সকল শ্রেণীর পাওয়া যায়, তাহাদের আকার ভিন্ন ভিন্ন। কোন কোনটা উপ-যুক্ত আকারবিশিষ্ট এবং অন্যান্য ভুলি ডাক্টের অভ্যন্তর প্রদেশাভ্যায়ী ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

ডাঃ ম্যাক্‌লাউড মহোদয় বলিলেন, ডাক্টার সরকারের এই রোগীর রোগ অতি আশ্চর্য্য এবং স্ফোটকগত্বের পিত্তাশ্রয়ী দর্শন করিয়া তিনি নিজেও আশ্চর্য্যায়িত হইয়াছিলেন। ডাক্টার সাহেব প্রথমে উক্ত পিত্তাশ্রয়ী সকল নিক্রোসিস ফর্সেপ্স দ্বারা বহিকরণার্থে যত্ববান হন, কিন্তু পাথরীগুলো চূর্ণ হইয়া যায়। তৎপরে ঐ পাথরীগুলো চা-চামচ সহকারে কিছু পরিমাণে বাহির করিয়া অপরাংশ বড় চামচের মুষ্টি দ্বারা বহিকৃত করেন। একটা লিথোটমী ফর্সেপ্স বা ক্লিপই ইহার উপযুক্ত যন্ত্র। ডাক্টার ম্যাক্‌লাউড সাহেব এই অস্ত্রোপচার সমাধা করেন বটে কিন্তু উহার আবশ্যিকতা ডাক্টার বার্চ সাহেব মহোদয় স্থির করেন। তিনি বলিলেন, ডাক্টার রে সাহেব মহোদয়ের চিকিৎসাধীন হাঁপাতালে একটা যকৃত-স্ফোটক ও এমপাইসাইট রোগী আছে; তাহার অস্ত্রোপচারে ছইট পঞ্জরাস্থির ভিন্ন ভিন্ন উচ্ছ্বান ছেদন করা। এক এক অংশ বাহিব করিয়া লওয়া হয় যে তদ্বারা পুত্র নিঃসরণ হইবে। সে রোগী আশ্রয় আছে। উপস্থিত রোগীর দুই গহ্বরের পুত্র নিঃসরণে এক ছিন্ন অকর্ণণ্য হইয়াছিল। এই রোগী হঃসাহসী স্ত্রী চিকিৎসার উপকারিতা একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

সংবাদ ।

সিঃ সার্জেন ও এপথিকারীগণ।

কলিকাতা মেঃ কলেজের অফিসিয়েটঃ
রেসিডেন্ট ফিজিশিয়ান ও নিদানতথ্যাপা-
পক সার্জেন জে, আব, এডি সাহেব এক
মাসের প্রতিলেজ লিড (ছুট) পাইয়াছেন।

সার্জেন ক্যাপ্টেন জি, বি, ফ্রেঞ্চ সাহেব
সৈন্যবিভাগের নিজ কার্য ছাড়া সার্জেন
গেফ্‌টিন্যাট কর্ণাল ও, এফ, মলয় সাহেবের
স্থানে বারাকপুর সবডিভিজে নিযুক্ত
হইয়াছেন।

কটকের রেজিমেন্ট সার্জেন সার্জেন
ক্যাপ্টেন জে, ও, পিন্টো সাহেব নিজ কার্য
ছাড়া সার্জেন মেজর জে, এম, জোয়াব
সাহেবের অস্থগস্থিতে তথাকাব সিঃ সার্জ-
নের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বশহবেব সিঃ টেননের অস্থায়ী ডাক্তার
অনারারী সার্জেন সি, এন, ফক্স সাহেব
অস্থায়ীভাবে দক্ষিণলুশাই পার্শ্বীয় প্রদেশে
এপথিকারী ডব্লিউ হোগান সাহেবের স্থানে
নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৮৯২ সালের ১লা এপ্রেল পূর্বাঙ্কে
কলিকাতা মেঃ কলেজ হাঁস্পাতালের বিত্তীয়
ফিজিশিয়ান সার্জেন মেজর জে, এফ, পি,
ম্যাককনেল সাহেব ব্রিগেড সার্জেন রাজেন্দ্র-
চন্দ্র চন্দ্র সাহেবের স্থানে আসানকুলী ডিপোর
ইন্সপেক্টর হইয়াছেন।

নদিয়ার সিঃ সার্জেন সার্জেন মেজর
জেঃ ক্লার্ক সাহেব অন্যতর আদেশ পর্য্যন্ত

বদ্ধমানের সিঃ সার্জেনের পদে কার্য
করিবেন।

কলিকাতা ইন্ডেন হাঁস্পাতালের রেসি-
ডেন্ট সার্জেন সার্জেন এফ, জে, ডুরী সাহেব
সার্জেন জে, বি, গিবন্স সাহেবের অস্থ-
পস্থিতকালে অন্যতর আদেশ পর্য্যন্ত কলি-
কাতা কলেজ হাঁস্পাতালের রেসিডেন্ট ফিজি-
শিয়ান ও নিদানতথ্যাপকের পদে অফি-
সিয়েট করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

দাববজের অফিসিয়েটঃ সিঃ সার্জেন
সার্জেন সিঃ আর এম গ্রিগ সাহেব সার্জেন
এফ, জে, ডুরী সাহেবের অস্থগস্থিতে
কলিকাতায় ইন্ডেন হাঁস্পাতালে রেসিডেন্ট
পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৮৯২ সালের ৩০শে মার্চ বৈকালে
সার্জেন এইচ, ডব্লিউ পিলগ্রিম সাহেব
নদিয়া জেলের কার্যতঃ এঃ সার্জেন বাবু
বিহারীলাল পালকে অর্পণ করিয়াছে।

১৮৯২ সালের ২৫শে মার্চ পূর্বাঙ্কে
সার্জেন ডিঃ জিঃ ক্রফোর্ড সাহেব পূর্ণিয়া
জেলের কার্যতঃ এঃ সার্জেন বাবু খজেন্দ্র
বসুকে অর্পণ করিয়াছেন।

এঃ এপথিকারী জিঃ এসঃ ওনীল
সাহেবের অস্থগস্থিতকালে স্যাওয়েড্‌স্
এ প্রেসিডেন্সী জেল হাঁসপাতালের এঃ
এপথিকারী জেঃ ক্রাব্ সাহেব নিযুক্ত
হইয়াছেন।

এসিষ্টেন্ট সার্জনগণ।

মে: কলেজ হাঁসপাতালের সুপারনিউ মবারী এ: সার্জন বাবু ললিতমোহন লাহা এক মাসের বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ক্যাথল মে: স্কুলের মেডিসিনেব শিক্ষক এ: সার্জন বাবু বলাইচন্দ্র সেন ৩১ দিনের বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং উক্ত স্কুলেব মেটরিয়াল মেডিকাব শিক্ষক এ: সার্জন বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত নিজ কার্য চাড়া অতিরিক্তভাবে তাহার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

এ: সার্জন সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ধমান জেলের কার্যভার ১৮৯২ সালের ৩০শে মার্চ পূর্বাঙ্কে সার্জন জে: ক্রাফ সাহেবকে অর্পণ করিয়াছেন।

এ: সার্জন বাবু প্রসন্নকুমার দেব অস্থপ-
স্থিতে বা অন্যতর আদেশ পর্যন্ত এ: সার্জন জুরেন্দ্রনাথ দত্ত রাঁচি বিভাগেব ডাক্‌সি-
নেশনেব ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেন্টেব পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

এ: সার্জন কামাখ্যানাথ আচার্য্য অন্য-
তর আদেশ পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে যশহব
ডিস্পেন্সারীর কার্যভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।
এবং উক্ত ডিস্পেন্সারীর অফিসিয়েটিং
কর্মচারী এ: সার্জন বাবু কালীপ্রসন্ন
বন্দ্যোপাধ্যায় এ: সার্জন রাজমোহন
বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্থপস্থিতকালে বা অন্যতর
আদেশ পর্যন্ত বনগ্রাম সবডিভিঞ্জে নিযুক্ত
হইয়াছেন এবং বনগ্রামেব অফিসিয়েটিং এ:
সার্জন অন্যতর আদেশ পর্যন্ত কলিকাতা
মে: কলেজ হাঁসপাতালের সুপার ডি:
ক্লিনিক আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮৯১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর বৈকাল
হইতে ১৮৯২ সালের ৪ঠা জানুয়ারী বৈকাল
পর্যন্ত দ্বারবন্ধের রাজ হাঁসপাতালের অফি-
সিয়েটিং এ: সার্জন বামচন্দ্র মজুমদার
তথাকার সদর ডিস্পেন্সারীতে সুপার ডি:
করিয়াছেন।

১৮৯২ সালের ৫ই হইতে ৭ই মার্চ
পর্যন্ত এ: সার্জন বাবু অবিনাশচন্দ্র চট্টো-
পাধ্যায় চট্টগ্রাম ডিস্পেন্সারীতে সুপার ডি:
করিয়াছেন।

ট্রিগেড সার্জন কে, ম্যাকলাউড সাহেব
এ. এম, এম, ডি, এল, এল, ডি; এক, আর,
সি, এস, (এডিন,) মহোদয় ইণ্ডিয়ান
মেডিক্যাল সার্ভিস যশোহুখ্যাতি সহ সাক্ষ
করিয়া ইংলণ্ড প্রত্যাগত হইবেন বলিয়া
১৮৯২ সালের ৯ই এপ্রেল তারিখে কলিকাতা
মে: কলেজের ছাত্রবৃন্দ সান্তিশয় ডক্টি
সহকারে তাঁহাকে রক্তত্যাগেব একটা অভি-
নন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন। ডাক্তার
সাহেব উক্ত অভিনন্দন পত্রের প্রত্যন্তরে
যাহা কিছু ২৪ কথা কহিয়া স্বীয় প্রিয়
শিষ্যগণের নিকট বিদায় হইতে গেলেন,
অমনি খেদ ও দুঃখ তাহার স্বরাবরোধ
করিতে চেষ্টা পাঠল, তিনি সম্যক্রূপে
স্পষ্টভাবে বলিত না পাবায় গদগদ বচনে
সম্ভাবণ সাক্ষ করিলেন। গত ১৫ই তারিখে
তিনি ডাক্তার বে সাহেব মহোদয়কে হাঁসপা-
তালের কার্য বুঝাইয়া দিয়া ২১শে তারিখে
ভারতভূমি ত্যাগ করিয়াছেন।

হস্পিটাল এসিস্ট্যান্টগণ।

সন ১৮৯২ সালের এপ্রেল মাসে নিম্ন লিখিত হস্পিটাল এসিস্ট্যান্টগণ পদস্থ বা স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

পাবনার সুপার ডি: হইতে ৩য় শ্রেণীর হ: এ: আদীরদ্দীন মওল ৮নং মর্ডে পাটীতে ডিউটী করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

২য় শ্রেণীর হ: এ: মীর বশাবত হোসেন খেদদহ হইতে এই অফিসে রিপোর্ট করিলে ক্যাথল হাঁসপাতালে সুপার: ডি: করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

২য় শ্রেণীর হ: এ: রাইমোহন রায় ছুটি হইতে ক্যাথল হাঁসপাতালে সুপার: ডি: করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ক্যাথল হাঁসপাতালের সুপার: ডি: হইতে ৩য় শ্রেণীর হ: এ: অহলানন্দ গুপ্ত নদিয়ার কলেজা ডি: করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ক্যাথল হাঁসপাতালের সুপা: ডি: হইতে ২য় শ্রেণীর হ: এ: মীর বশারত হোসেন বনবিভাগের সীতাপাহাড় হাঁসপাতালে অফিসিয়েট করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ক্যাথল হাঁসপাতালের সুপার: ডি: ১ম শ্রেণী হ: এ: অধরচন্দ্র সাবকল চট্টগ্রামে সুপার: ডি: করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীরামপুরের কলেজা ডি: হইতে ৩য় শ্রেণীর হ: এ: শেখ মহম্মদ এব্রাহিম তথাকার সুপার: ডি: করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মালদহের সুপার: ডি: হইতে ৩য় শ্রেণীর হ: এ: কামাখ্যাচরণ চক্রবর্তী পাটনায় সুপার: ডি: করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

আলিপুর জেল হাঁসপাতালের অফিসিয়েটিং চার্জ হইতে ২য় শ্রেণীর হ: এ: ইলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উক্ত পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন।

২য় শ্রেণীর হ: এ: নীলাধর মুখোপাধ্যায় ছুটি হইতে ক্যাথল হাঁসপাতালে সুপার: ডি: করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

পাটনার সুপার: ডি: হইতে ১ম শ্রেণীর হ: এ: সয়েদ আশ্কাফ হোসেন গাইবান্ধা সবডিভিজন ও ডিসপেন্সারিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

দিনাজপুরের সুপার: ডি: হইতে ২য় শ্রেণীর হ: এ: নদিয়াবটাদ সরকার কাটিহার বেগুয়ে হাঁসপাতালে অফিসিয়েট করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীরামপুরের সুপার: ডি: হইতে ৩য় শ্রেণীর হ: এ: শেখ মহম্মদ এব্রাহিম রঙ্গপুর জেল ও পুলিশ হাঁসপাতালে অফিসিয়েট করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

পাটনায় সুপার ডি: হইতে ৩য় শ্রেণীর হ: এ: নাজর আণী চাম্পারণ বাগাহ! ডিস্পেন্সারীতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩য় শ্রেণীর হ: এ: গোরববল্লভ সরকার কর্ম করিবেন বলিয়া অবগত করার কটকে সুপার: ডি: করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

হকিতলা কলন্ পয়েন্ট হাঁসপাতাল হইতে ৩য় শ্রেণীর হ: এ: বৈদ্যনাথ গিরি সুপার: ডি: করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কটকের সুপার: ডি: হইতে ৩য় শ্রেণীর হ: এ: গোরবল্লভ সরকার হকিতলা কলন্ পয়েন্ট হাঁসপাতালে নিযুক্ত হইয়াছেন।

নড়াইল সবডিভিজন ও ডিসপেন্সারী

সারীর অফিসিয়েটিং কার্য্য হইতে অধরচক্স চক্রবর্তী উক্ত স্থানের কলেরা ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

ক্যাথেল হাস্পাতালেব সুপারঃ ডিঃ চট্টোপাধ্যায় শ্রেণীর হঃ এঃ রাইমোহন রায় যশচরে কলেরা ডিঃ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

ক্যাথেল হাস্পাতালের সুপারঃ ডিঃ হইতে ৩য় শ্রেণীর হঃ এঃ অঘোবনাথ ভট্টাচার্য্য

খাটাল সবডিভিজন ও ডিসপেন্সারীতে অফিসিয়েট করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

পাটনার সুপারঃ ডিঃ হইতে ৩য় শ্রেণীর এঃ এঃ মহাম্মদ অহিহুদীন ছাপরা ডিসপেন্সারীতে অফিসিয়েটিং ভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

ছম্কা ডিসপেন্সারী হইতে ১ম শ্রেণীর হঃ এঃ কার্তিকচক্স মজুমদার ক্যাথেল হাস্পাতালে সুপারঃ ডিঃ কবিত্তে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

সন ১৮৯১ সালেব এপ্রেল মাসেব প্রাপ্ত ছুটি ।

শ্রেনী

কোথাংকাব

ছুটির কারণ ও ছুটি কতদিন ।

১। প্রমদকুমার সেন

ছুটিতে

পীড়িত অবস্থায় ছয় মাসের অতিরিক্ত ছুটি

১। পূর্ণচক্স দাসগুপ্ত

,, ৩ মাস

ছুটিব একমাস কর্তন হয়

১। রামকুমার চক্রবর্তী

ছগলী পুলিশ হাসঃ

সন ১৮৯২ সালেব ১৯শে জানুয়ারী হইতে ৩১শে পর্য্যন্ত ছুটি কর্তন ।

১। হরিমোহন গুপ্ত

গোবিন্দপুর সবডিভি-

জন ও ডিস্পেন্সারী

সন ১৮৯১ সালের ৩রা নভেম্বর হইতে ১৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অবৈতনিক ছুটি

গত মার্চ মাসে ক্যাথেল মেডিক্যাল স্কুল হইতে পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইয়া যাঁহারা ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছেন

তঁাহাদের নাম—

১। ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায় ।

২। ক্ষীরোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ।

৩। পূর্ণচক্স দাস ।

৪। আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

৫। শ্রীমতী হরিমতি দাসী

৬। চক্সকান্ত দাস ।

৭। উত্তম দাস, খাড়া ।

৮। অবিনাশচক্স সিংহ রায় ।

৯। শ্রীমতী রাজলক্ষী দেবী ।

১০। যোগেশচক্স রায় চৌধুরী ।

১১। সূর্যকুমার রায় ।	২৫। সূর্যকান্ত বসু ।
১২। রামশঙ্ক মুখোপাধ্যায় ।	২৬। বেণীমাধব চাকী ।
১৩। রসিকলাল বসু ।	২৭। মহেন্দ্রনাথ দত্তপাট ।
১৪। কিরীটিভূষণ নিয়োগী ।	২৮। বৈকুণ্ঠনাথ বড়ুয়া ।
১৫। অমলকুমার বড়ুয়া ।	২৯। হরিদাস বসু ।
১৬। অবনীকুমার রায় ।	৩০। শরচ্চন্দ্র সান্যাল ।
১৭। মনমথনাথ রায় চৌধুরী ।	৩১। সত্যীশচন্দ্র বসু ।
১৮। চৈলাপ্র চৌধুরী ।	৩২। নীলরতন দে ।
১৯। শশিভূষণ দত্ত । (২য়)	৩৩। নবকুমার মিত্র ।
২০। সত্যীশচন্দ্র চাকী ।	৩৪। { শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ।
২১। নন্দলাল ঘোষ ।	{ রামলাল ঘোষ ।
২২। কাশীশ্বর মুখোপাধ্যায় ।	৩৬। যতীন্দ্রনাথ রায় ।
২৩। বমেশচন্দ্র চৌধুরী ।	৩৭। হেমচন্দ্র অধিকারী ।
২৪। বামাচরণ সরকার ।	৩৮। মিসেস্ পুষ্পময়ী সরকার ।



গত ৫ই এপ্রিল ক্যাথল মেডিক্যাল স্কুলে কম্পাউণ্ডারগণের
বাৎসরিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা ঐ পরী-
ক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদের নাম—

নাম ।	যেখান হইতে পরীক্ষার্থ আসিয়াছিলেন তাহার নাম—
১। মিঃ ক্রাজিস্ রস্ ।	মেঃ স্মিথ্ ট্যানিষ্ট্রীট এণ্ড কোঃ
২। মিঃ রোজ্ গ্যালপিন ।	ক্যাথল মেডিক্যাল স্কুলের কম্পাউণ্ডার ক্লাসের ছাত্রী—
৩। মিঃ এডিথ্ ডেবিড্ ।	ঐ
৪। মহেন্দ্রনাথ সেন ।	মৃজাপুর মেডিক্যাল হল
৫। মহম্মদ আলি ।	মেঃ বাথ্ গেট এণ্ড কোঃ
৬। ককিরদাস চট্টোপাধ্যায় ।	ডাঃ নীলমণি মুখোপাধ্যায় ডিঃ, কলিকাতা ।
৭। লক্ষ্মীনারায়ণ রায় গুপ্ত ।	কৈলাসনাথ মিত্রের ডিঃ, ঐ
৮। সারদাপ্রসাদ চক্রবর্তী ।	ঐ ঐ

৯।	ভিক্রাম কর।	ডাঃ কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডিঃ মেদিনীপুর
১০।	সত্যচরণ নন্দী।	মহেন্দ্রলাল বাবুর ডিঃ ঐ
১১।	নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।	ঐ ঐ
১২।	বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।	রামপুর হাট চ্যারিটেবল ডিঃ বীরকুম
১৩।	জগদল গণি	ক্যাথল মেডিকেল স্কুলের কম্পাউণ্ডারের ক্লাস
১৪।	নগেন্দ্রনাথ ঘোষ নং ১	ঐ
১৫।	নগেন্দ্রনাথ ঘোষ নং ২	ঐ
১৬।	উপেন্দ্রলাল চৌধুরী	ঐ
১৭।	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	ঐ
১৮।	আশুতোষ সান্যাল	ঐ
১৯।	অবিনাশচন্দ্র পাল	ঐ
২০।	অক্ষয়কুমার পাল	ঐ
২১।	কেশরনাথ রায়	ঐ
২২।	বিপিনবিহারী বায়	ঐ
২৩।	হারাদিন সেন	ঐ