

ঔষধের নাম—	যে প্রকৃতিব শিবঃপীড়ায় প্রয়োজ্য। মাত্রা।
বেলাডোনা—	আর্ন্তব স্রাব সময়, সন্মুখ কপালের এবং পবিশ্রমের পর শিবঃ- পীড়ায় পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ।
বাই কার্বনেট অফ সোডা—	সন্মুখ বা উর্দ্ধ কপালের শিবঃপীড়া সহ যদি কোটি বন্ধ না থাকে, তবে তিক্ত সহ অহাবের পূর্বে। দস্ত ক্ষত জহ্ন হইলে মুখ ধোঁত।
ব্রিডিং—	রক্তাধিক্য শিবঃপীড়ায়।
ব্রোমাইড—	মাইগ্রেশনে মুখে বর্ণ বিবর্ণ না হইলে অথবা আক্রমণের সমস্ত সময় উজ্জ্বল থাকিলে কফেইন সহ অধিক মাত্রায় বিশেষ উপকারী।
ব্রায়ানয়া—	পিত্তজ শিবঃপীড়ায়।
বুটাল ক্লোরাল হাইড্রেট—	চক্ষের দোষ বা পাকস্থলীর দোষ জহ্ন।
কাফেইন,	
কাফেইন সাইটেট—	স্নায়বীয় শিরঃপীড়া, হেমিক্রেনিয়া।
কাজেপুট অইল—	স্থানিক প্রয়োগ।
কাম্ফা—	আভ্যন্তরিক এবং গাঢ় দ্রব বাহ্য প্রয়োগ।
কাম্ফা লিনিমেন্ট—	স্থানিক প্রয়োগে বেদনা-নাশক।
ক্যানাবিশ তণ্ডিকা—	মাইগ্রেশন। স্নায়বীয় শিবঃপীড়া।
ক্যাপসিকাম প্লাষ্টার—	গ্রীবার পশ্চাতে।
কার্বন ডাই-সালফাইড—	বক্তাধিক্য শিবঃপীড়ায় স্থানিক প্রয়োগ।
ক্যাসকারা স্কাগরেডা—	স্নায়বীয় এবং পিত্তজ শিরঃপীড়া।
ক্লোরাল আমদ—	মাইগ্রেশন, নিউরাস্থনিক শিরঃপীড়ায়। মাত্রা ২০—৪৫ গ্রেণ
ক্লোরফরম—	স্পিরিট, স্নায়বীয় শিরঃপীড়ায়।
সিমিসিফিউগা—	স্নায়বীয়, বিউমেটিক, বিশেষতঃ আর্ন্তব স্রাব সময়ে, চক্ষের দোষ জনিত।
কোকেইন—	নিউরাস্থনিক শিরঃপীড়ায়।
কোডেইন—	মফিয়ার পরিবর্তে।
কডলিভার অইল—	দুর্বলতা এবং বক্তান্নতা জনিত শিরঃপীড়া।
কলচিকাম—	গাউট জনিত শিবঃপীড়ায়।
কোল্ডএফিউসন—	রক্তাধিক্য শিরঃপীড়ায়।
কাউন্টার ইরিটেণ্ট—	বেদনার স্থানে।
কাপিং—	রক্তাধিক্য জহ্ন গ্রীবার পশ্চাতে।

ঔষধের নাম—	যে প্রকৃতির শিরঃপীড়ার প্রয়োজ্য। মাত্রা।
ডিজিটেলিন—	রক্তাধিক্য হেমিক্রেনিয়াম ৬: গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যাহ দুইবার।
ডায়ুরেটিক—	বিষাক্ততা জনিত শিরঃপীড়ায় উপকারী।
ইফারভেসিং প্রয়োগরূপ—	যেমন এন্টিপাইরিন সহ অ্যালিসিলিক এসিড্, বা কাফেইন; সোডি ব্রোমাইড সহ কাফেটিন।
ইলেকট্রিসিটি—	মাইগ্রেনে ফ্যাব্রিডিজম অপকারী কিন্তু গ্যালভানিজম উপকারী।
আর্গট, আর্গটিন—	পীড়াব কাষণ রক্তাধিক্য হইলে।
ঔষধ—	প্রবল মাইগ্রেনে বাষ্প প্রয়োগ।
ঔষধ স্প্রে—	অপব পীড়াব বা পবিশ্রমেব পব সমুখ কপালে, স্থানিক প্রয়োগ।
উউক্যালিপটাস—	মাইগ্রেনে
এক্সালজিন—	স্নায়বীয় শিরঃপীড়ায় ২—৪ গ্রেণ। অনেক সময়ে বিপদ হয়। তজ্জন্ম সাবধানে প্রয়োগ করা আবশ্যক।
জেলুমিনম—	চক্ষের দোষ বা স্নায়বীয় অবসন্নতাজাত শিরঃপীড়ায়।
গোল্ড ক্লোবাইড, গোয়াবানা—	মাইগ্রেনে, স্নায়বীয় শিরঃপীড়ায়, অ্যালিসিলেট অফ্ সোডিয়াম সহ।
চট্ এপ্লিকেশন—	মাইগ্রেনে, বক্তারক্ততা জনিত শিরঃপীড়ায়, উষ্ণ সেক বা পুলটিস রূপে প্রাণীয়ার পশ্চাতে।
হাইড্রেটিস বা হাইড্রেটিনি—	কোষ্ঠবদ্ধতা সহ বক্তাধিক্য শিরঃপীড়ায়।
হাইড্রোব্রোমিক এসিড—	রক্তাধিক্যের জন্ত শিরঃপীড়ায়। স্নায়বীয় প্রকৃতি বিশিষ্টা জ্বীলোকদিগেব চক্ষের দোষ জন্ত শিরঃপীড়ায়।
হিপনোটিক—	নানা প্রকার শিরঃপীড়ায় উপকারী।
আইস্-ব্যাগ—	রক্তাধিক্যের জন্ত শিরঃপীড়ায় কপালে প্রয়োগ। কণের পশ্চাতে জলোকা প্রয়োগও উপকারী।
ইগনেশিয়া—	হিষ্টিরিয়ার জন্ত শিরঃপীড়ায়।
আইওডাইড—	অরগ্যানিক শিরঃপীড়ায়, উপদংশজ শিরঃপীড়ায়, মস্তকে টুটনানি থাকিলে বাতজ শিরঃপীড়ায়।
আইরিস—	নিবামা সহ সুপ্রোঅর্কিটাল শিরঃপীড়া।
আয়রণ—	বক্তারক্ততা জন্ত; স্নায়বীয় দুর্বলতার জন্ত।
লাটেকর ম্যাগ্নেসিয়াই সাইটেট্—	পিভাধিক্য জন্ত শিরঃপীড়া।

ঔষধের নাম—	যে প্রকৃতিব শিরঃপীড়ায় প্রয়োজ্য । মাত্রা ।
ম্যাগনেসিয়ম কার্বনেট—	৫—৬০ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবস্থিত জনক শিরঃপীড়ায় ।
ম্যাগনেসিয়ম সালফেট—	কোষ্ঠবদ্ধতাসহ সম্মুখ কপালে বেদনা ।
ম্যাসাজ—	মাইগ্রেণ, বক্তাধিক্য জন্ত শিরঃপীড়া, নিউবাইনিয়া ।
মেম্বল—	স্থানিক প্রয়োগ ।
মার্কুবী—	পিত্তাধিক্য জন্ত শিরঃপীড়া, উপদংশজ শিরঃপীড়ায় ১৫ গ্রেণ মাত্রায় ২ ঘণ্টা পর পব ।
মফিয়া—	মাইগ্রেণ । অপব প্রবল পীড়ায় অধস্তাচিক প্রয়োগ ।
মার্গার্ড—	ফুটপাণ্ড ক্রিয়া গ্রীবাৎ পশ্চাতে পুলটিং রূপে মাইগ্রেণে এবং বক্তাধিক্য জন্ত শিরঃপীড়ায় ।
নিকেল ব্রোমাইড—	হেমিক্রেনিয়ায় ।
নাইট্রাইট অফ্‌ এমাইল—	রক্তাঙ্গ হাজ শিরঃপীড়ায়, মুখমণ্ডল পাণ্ডটে বর্ণ হইলে বাষ্পরূপে প্রয়োগ করা হয় ।
নাইট্রোজেন মনোক্সাইড—	মাইগ্রেণ । বক্তাঙ্গতা জন্ত শিরঃপীড়ায় ।
নাইট্রোগ্লিসেরিন—	বক্তাঙ্গতা জন্ত শিরঃপীড়ায়, মাইগ্রেণ, অল্প মাত্রায় ১৫—২৫ গ্রেণ মাত্রায় আবস্ত কবিত্তে হয় । টিংচাব নক্স ভমিকা, টিংচাব জেলসিমিয়াম । ডাইলুউট্‌ ফসফরিক এসিড্‌ অথবা বিসমথ সহ প্রয়োগ করা যায় ।
নাইট্রো-হাইড্রোক্লোরিক এসিড্—	চক্ষু উপবে বেদনা এবং কোষ্ঠবদ্ধ নাই এইরূপ স্থলে । গ্রীবার পশ্চাতে বেদনা । লিথিমিক শিরঃপীড়ায় ।
নক্স ভমিকা—	স্নায়বীয় এবং পিত্তজ শিরঃপীড়ায় অল্প মাত্রায় পুনঃ পুনঃ— এক ফোঁটা মাত্রায় ৫—১০ মিনিট পর পর দশ মাত্রা পর্য্যন্ত ।
ওপিয়াম—	বক্তাধিক্য শিরঃপীড়ায় আক্রমণ সময়ে ।
অক্সিজেন—	বক্তাঙ্গতা জন্ত শিরঃপীড়ায় ।
ফেনাসিটিন—	চক্ষু দোষ জন্ত, বাতজ শিরঃপীড়ায় স্থালোল সহ, মাইগ্রেণ ৩—৮ গ্রেণ মাত্রায় ছুট ঘণ্টা পব পর উপকাব্য ।
ফেণাইল ইউরেথেন (ইউফোরিন্‌)—	হেমিক্রেনিয়ায় ৩—৬ গ্রেণ মাত্রায় ৩—৫ বাব ।
পিক্রোটক্সিন—	পর্যায়যুক্ত শিরঃপীড়ায় ।
পডফিলিন—	কোষ্ঠবদ্ধ সহ পিত্তজ শিরঃপীড়ায় ।
পটাশিয়ম সায়ানাইড্—	স্থানিক প্রয়োগ ।

ঔষধের নাম—	যে প্রকৃতব শিরঃপীড়ায় প্রযোজ্য । মাত্রা ।
ক্লিনিসিসয়েন্ট—	বেদনাব হানে এবং গ্রাবার পশ্চাতে ।
আলিসিন—	বাতজ শিরঃপীড়ায় ।
সেলিসিলেট অফ্ সোডা—	বাতজ শিরঃপীড়ায় এবং মাইগ্রেনে ও গ্রেণ মাত্রায় প্রতি ঘণ্টায় উপকারী ।
অ্যান্থ্রেনেরিয়া—	পরিপাক বিশৃঙ্খলতা জন্ত শিরঃপীড়ায় ।
সোডিয়ম ফসফেট—	মাইগ্রেনে এবং পিত্তজ শিরঃপীড়ায় মুখ বিবেচক ।
স্পাইটাল আইস-বাগ—	নিউরালগিক পীড়ায় ।
ট্রিকনিয়া বা নক্স ভমিকা—	চক্ষের দোষ জন্ত ।
সম্বল—	স্নায়বীয় শিরঃপীড়ায়
টি—	গাঢ় রূপে পান করলে কখন কখন স্নায়বীয় শিরঃপীড়া শাস্ত উপশম হয় ।
টারকিন বাথ—	রক্তাবিকাজ শিরঃপীড়ায় ।
ভেগেবিয়ান—	স্নায়বীয় এবং চিষ্টিববৈদ্য শিরঃপীড়ায়, অবসাদযুক্ত মাইগ্রেনে ।
ওয়ারমথ—	অঙ্গ শাপায় প্রয়োগ ।



Some Paralysis of the Arm & Hand.

লেখক শ্রীযুক্ত ডাক্তার তাবকনাথ বায় ।

মানবদেহের উপরিভাগস্থ (Upper extremity) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহের পক্ষাঘাত (Paralysis) বর্ণনা করিবাব পূর্বে ইহা (Lesion) জনিত যে সকল পক্ষাঘাত হয়, দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে ; যথা—

(১) Motor স্নায়ুর তন্ত সকলের উপবিস্তৃত বিভাগের (Segment) আঘাত
(২) Motor স্নায়ুর তন্ত সকলের নিম্নস্থ বৃহৎ

বিভাগের (Segment) আঘাত (Lesion) জনিত যে সকল পক্ষাঘাত দেখিতে পাওয়া যায়। Motor স্নায়ুর উপরিস্থ বহুবিশাগ্র (Segment) যাহাকে সচরাচর neuron বলে, তাহার তন্তু (fibres) সৰ্ব্ব cerebral cortex এবং তাহার মোটর কোষ (motor cells) হইতে নিগত হইয়া ববোনা বেডিএটা (corona radiata), ইন্টার্নাল ক্যাপসুল (internal capsule), ক্রস্ সেব্রাট (crus cerebri), পনস্ (pons), এবং মেডুলা ওবলংগেটা (medulla oblongata) ভিতর দিয়া, নিম্ন অংশে গমন করে। মস্তিষ্কের উভয় দিক হইতে এইরূপে মেডুলা ভিতর দিয়া নিম্নে অবতরণ করিয়া তাহার উপর আসিয়া এই motor স্নায়ু সমূহের তন্তু সকল একত্রে এক প্রত্যেককে অচলাপে আশ্রয় করিয়া তাহার মেবদণ্ডে (spinal cord) এর Anterior cornu ত আসিয়া মিশিত হয়। এইরূপে motor system এর নিকট neuron মেবদণ্ডের anterior cornu য় যে সকল বৃহৎ বৃহৎ motor cells আছে, তাহা হইতে বহির্গত হইয়া পেশী সমূহের peripheral nerves এর সহিত মিলিত হইয়াছে। অতএব আমবা এক্ষণে অতি সহজেই neuron সমূহের সচরাচর যে সকল পক্ষাঘাত হয়, তাহা উপরিস্থ কি নিম্নস্থ neuron এর পক্ষাঘাত হইয়াছে, প্রতিপন্ন করিতে পারিব। সুতরাং ইহা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে হইলে নিম্নলিখিত অবস্থা কয়েকটি সকলোই অবগত রাখিয়া উপবোক্ত বিষয়ের শীর্ষাংশ করা উচিত:—

উর্দ্ধ neuron সমূহের আঘাত (lesion) জনিত পক্ষাঘাত।	অবনমন neuron সমূহের আঘাত (lesion) জনিত পক্ষাঘাত।	
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ ক্রমশঃ অশক্তি হয়। প্রতিধাতব অবস্থাপন্ন হয়। পক্ষাঘাত বিদ্যমান পেশী সমূহের অপ্রতি- হত কার্যের উচ্চ বিকলভাবে আনিভাব হয়।	অবনমনের উচ্চ সীমায়। বর্জিত। পরিবর্তিত। কোন পরিবর্তন স্পষ্ট লক্ষিত হয় না। পেশী সমূহের খটিল ধবিয়া সঙ্কুচিত হয়। সীর্ণকাল যাপী দৃঢ়তা (late rigidity)	১। ক্ষয়বীর্য (wasting) ২। প্রতিফলন (Reflexes) ৩। দৃঢ়তা (rigidity) ৪। বৈজ্ঞানিক প্রতিধাত (electric reaction) ৫। সংকোচন (contractures)

এস্থলে আমি নিম্নস্থিত neuron সমূহের lesion জনিত যে সকল পক্ষাঘাত লক্ষিত হয় তাহাই বর্ণনা করিব।

সিবেটাস ম্যাগানাস্ (serratus magnus) পেশীর পক্ষাঘাত হইলে যে সকল ফল লক্ষিত হয় তাহাই বাখ্যা করিতেছি : -

Serratus magnus পেশীর দুইটি প্রধান ক্রিয়া আছে যথা—(১) ইহা Scapulaকে যথাস্থানে স্থিভাবে বাখে, বাহাতে অস্ত্রান্ত পেশী সকল তাহাদেব আপনাপন ক্রিয়াকলাপ নিয়মিতরূপে প্রকাশ করিতে পারে ; (২) যখন বাহু (arm) উত্তোলন করিয়া স্বন্ধের সহিত সমতলে রাখা যায়, তখন উক্ত পেশী Scapulaকে চক্রবৎ ঘূর্ণিত হইতে (rotate) বিশেষরূপে সাহায্য করে। কিন্তু যদ্যপি এই পেশীর পক্ষাঘাত হয় তাহা হইলে যখন বাহু স্বন্ধ প্রাচীরে স্থির ভাবে অবস্থিত থাকে তখন এই পেশীর ক্রিয়াব কোনরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটয়াছে কি না, তাহা অনুমান করা যায় না। তবে যেমন বাহু উত্তোলন কবে স্কাপুলার স্থির রাখিবাব ও চক্রবৎ ঘূর্ণিত করিবাব শক্তিব বৈলক্ষণ্যতা অনুমিত হয় এবং এই অস্থি ভার্টিব্রাল বর্ডার (Vertebral border) অগ্রবর্তি (project) হয়। এই অস্থির স্থায়িত্ব শক্তির বর্জিত হওয়াতে বাহুকে শরীরের সন্মুখদিকে সমতলে রাখিবাব জন্ত যৎসামান্যই বলের প্রয়োজন হয়। Scapular চক্রবৎ ঘূর্ণিত করিবাব শক্তি বর্জিত হইবার জন্ত বাহু স্বন্ধেব উপর উত্তোলন করিবাব শক্তিব ক্ষীণতা হয়, যদিচ ইহার গতি trapezius এবং অস্ত্রান্ত পেশী কর্তৃক সাধিত হইতে পারে।

আর একটি দৃষ্টান্ত এই যে যদি কোন রূপে Deltoid পেশীর পক্ষাঘাত লক্ষিত হয় তাহা হইলে নিম্নলিখিত ক্রিয়াব বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত পেশীর প্রধান ক্রিয়া যথা ইহা বাহুকে আকর্ষণ (Abduct) কবে এবং আবও ইহা বাহুকে স্বন্ধের সহিত সমতল অবস্থায় রাখিবাব জন্ত সাহায্য করে। এই পেশীর anterior এবং posterior fibres সমস্ত বাহুকে অগ্র ও পশ্চাদিকের গতিবিধিতেও সাহায্য করে। কিন্তু যখন কোন গতিকে এই পেশীর পক্ষাঘাত হয় তখন বাহু উত্তোলন করিতে বোগী অসমর্থ হয়। যদ্যপি বাহু উত্তোলনেব নিমিত্ত কোনরূপে চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে এই পেশী (deltoid) দেহের (trunk) বিপরীদিকৃষ্ট অস্ত্র সহযোগী পেশীর নতকরণ গতিশক্তির সহিত অনুগামী হয়।

Deltoid পেশীর পক্ষাঘাত হইলে আর একটি মনোবঞ্জক বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় যে যদ্যপি বাহু উত্তোলনে কোনরূপ চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে ইহা Scapular অতিবিক্ত চক্রবৎ ঘূর্ণন শক্তির (rotation) সহিত সহগামী হয়। এই Scapular rotator পেশীর উদ্যমের জন্ত উক্ত গতির প্রকাশ করিতে বিশেষ সহায়তা করে।

পূর্বেক্তরূপ গতিবিধির বৈলক্ষণ্যতা স্বন্ধের অস্থিসমূহের সন্ধিচ্যুত হইলে সচরাচর ঐরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। Deltoid পেশী circumflex স্নায়ুর দ্বারা সরবরাহ হয় এবং যখন কোন গতিকে humerus এর head স্বন্ধ সন্ধি হইতে সজোরে বিচ্যুত (dislocated) হয়, তখন উক্ত circumflex

স্নায়ু টান পড়ে (stretched) বা মোচড়াইয়া (contused) যায় এবং ইহা সচরাচর দেখা যায় যে dislocation reduced কবিবাব পরেও উক্ত সন্ধি বিচ্যুতিব জ্ঞাত তৎস্থানে কিছুমাত্র দুর্বলতা থাকিয়া যায়। যখন circumflex nerve এর সামান্য টান পড়িয়া বা মোচড়াইয়া গিয়া ক্ষণিক কোনকণ দৌষ জন্মে তাহা হইলে উপযুক্তরূপ চিকিৎসায় ইহা শীঘ্র আবেগ্য করে। কিন্তু যদ্যপি উক্ত স্নায়ু কোন গতিকে অতিবিকৃত আঘাত লাগে, যেমন যদি কোনকণে nerve root ছিন্ন হইয়া যায় বা অল্প কোনকণ কঠোর আঘাত প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে মঙ্গলদায়ক হয় না।

হাতের কজাব (wrist) extensor পেশীর পক্ষাঘাত ক্রমিক সীস বিষাক্ততা (chronic lead poisoning) হেতুই বেশীভাগ ঘটতে দেখা যায়। যদিও সীস বিষাক্ততা হইলে সচরাচর wrist এবং অঙ্গুলি সকলের extensor পেশী সমূহের পক্ষাঘাত হয় কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে supinator longus পেশীর ক্রিয়ার কোনরূপ বৈলক্ষণ্যতা ঘটে না। Wrist এবং হস্তের flexor পেশী সমূহের সচরাচর আক্রান্ত হয় না, কিন্তু হস্তের ধারণাশক্তি (grasp) বিশেষ ক্ষীণতা হয় (extensor) পেশী সমূহের পক্ষাঘাত জনিত wrist স্থায়ীভাবে রাখিবাব শক্তি বর্জিত হয়। যদ্যপি এখানে lesion peripheral nerve এই-রূপে একরূপ অনুমান করা হয় তাহা হইলে উক্ত স্নায়ুর lesion অস্বাভাবিক পেশীর যেমন

পক্ষাঘাত হয়, তেমনই supinator longus পেশীরও পক্ষাঘাত হইতে বিস্তৃত তাহা হয় না। Supinator longus পেশী musculo-spiral nerve দ্বারা পোষিত হয়। কিন্তু যদ্যপি একরূপ অনুমান করা হয় যে anterior cornua of the cord এ কোনকণ আদিম আঘাত (primary lesion) লাগিয়াছে, তাহা হইলে ইহাব নির্দেশ কবিবাব সম্বন্ধে অতিশয় সন্দেহ হয়, কাবণ nerve root হইতে যে সকল nerves নির্গত হইয়া তাহাব যে যে পেশী সকলকে পোষিত কবিতোছে স্মরণ্য তাহাদের পক্ষাঘাত হইবাব সম্ভাবনা, অতএব peripheral nerve এর কোনরূপ lesion ঘটয়াছে কিনা তাহা অনুমান করা অপেক্ষা ইহা অনুমান কবা অতিশয় সহজ। Supinator longus, fifth cervical nerve root হইতে যে nerve নির্গত হয়, তদ্বারা পোষিত হয় এবং এই fifth cervical root ই Biceps এবং Deltoid পেশীদ্বিগকেও পোষিত করে। কিন্তু wrist এর extension শক্তি, 7th cervical nerve root হইতে যে nerve নির্গত হয় তদ্বারা পোষিত হয়। স্মরণ্য দেখা যাউতেছে যে যদ্যপি nerve root এ কোনরূপ lesion ঘটে, প্রধানতঃ ঐ সকল স্নায়ুতন্তু যাহা 7th cervical nerve root ও nerve cells (স্নায়ুকোষ) হইতে নির্গত হইয়া তাহাদ্বিগকে সরবরাহ করে সেই সকল পেশীরই পক্ষাঘাত হইবে। অতএব একারণ supinator longus পেশীর পক্ষাঘাত বর্জিত হইতে পারে।

ক্রমশঃ।

পথ্য-বিধান ।

লেখক শ্রীযুক্ত ডাঃ এন কৃষ্ণবাহাদুর জ্যোতির্ভূষণ ।

(পূর্ব প্রদর্শিতঃ পৰ)

উপকারি বিবিধ উদ্ভিদেব সপত্র কোমল
শাখাগা, পত্র, কাণ্ড ও পুষ্প ব্যবহৃত হইয়া
থাকে । এই সমুদায়কে শাক নামে অভিহিত
করা যায় । সর্ষপ প্রকাব শাকই উদ্ভিদেব
হরিদংশময় । উদ্ভিদেব হরিদংশ দ্রব্য
শাকস্তলীতে পরিণত হয় না, কিন্তু হঠাৎ
হরিদংশ বাতাত অপব মে সকল উপাদান
থাকে, ভক্ষণ করিলে, তাহার শাখাদেব
কার্য্যে ব্যথিত হয় । এই সকল উপাদান
এত অল্প পরিমাণে আছে, যে, হঠাৎ শবাবেব
কোন উপকার সাধিত হয় না, এই হেতু
শাক সকল মনুষ্যেব পক্ষে তাদৃশ উপযোগী
খাদ্য নহে । আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে উল্লিখিত ২২-
যাছে, শাক সকল সর্ষপ বোণেব আকব সর্ষপ,
তদ্ব্যতীত ইহা দ্বারা দেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে
অতএব গম্ভীরগণ সর্ষপ প্রবৃত্তে শাক পবি-
বর্জন করিবেন ।

শাক সকলে শরীর পোষণোপযোগী
উপাদান না থাকিলেও, উচ্ছাদিগেব কোন
কোনটাব বিশেষ ক্রিয়া পবিলক্ষিত হয় । এই
হেতু এতলে আমবা শাকেব গুণাবলী বর্ণনে
প্রবৃত্ত হইলাম । বহুবিধ শাক ব্যবহৃত হইয়া
থাকে, তন্মধ্যে বিশেষগুণ বিশিষ্ট গুলি
বিষয় বর্ণন করিব । অপব উচ্ছাদিগেব
আকাব অবয়ব সর্বজন পরিচিত হওয়ায়
আমরা তৎসমস্ত বর্ণনে বিরত থাকিলাম ।

বেতো—কোন কোন স্থলে ইহা
বেতো নামেও পচিতি আছে । ইহাব সংস্কৃত
নাম বাস্তক বা শাকবাহ । শ্বেত ও বক্তবর্ণ
ভেদে বাস্তক শাক দ্বিবিধ । এত উভয় প্রকাব
বাস্তকত তুল্যগুণ বিশিষ্ট । বক্তসাব বোণে
বাস্তক শাক সময়ে সময়ে অতি আশ্চর্য্য দ্রব্য
প্রদান করিয়া থাকে । এমন স্থলে বক্তবর্ণ
বাস্তকই সর্ষপক কুণোদ্যাবাক পবিদুষ্ট
হয় । অশঃ ২ঃ ৩৩ বক্তসাব, যোনি হঠাৎ
বক্তসাব, হিমাচিউ বয়া, হিমাচিমোস, ও
অন্যান্য বিবিধ প্রকাব হেমবেজ বোণে, ইহা
দ্বারা বথেই দ্রব্য লক্ষ্য হইতে পারে ।

কুন্দকুমি বোণে হঠাৎ দ্বারা অনেক উপ-
কার প্রাপ্ত হইয়া যায় । এমন কি বাস্তক
দ্বারা উচ্ছাদা বিনষ্ট হইয়া যায় । দেখা
গিয়াছে ।

ভাব প্রকাশ নামক গ্রন্থে ইহাব নিম্নোক্ত
গুণেব উল্লেখ দৃষ্ট হয় ।

বাস্তকদ্বিতীয় স্বাদু
ফাবং পাকে কটুদ্বিতীয় ।
দাপনং পটিকং কচাং
লবঙ্গক বলপ্রদং
সবং পিত্তাস্ত্রা ম্লীহাস্ত্র
ক্রিমিশেষ ত্রয়াপহং ॥

অপব কেহ বেহ বলেন ইহা দ্বারা মেধা
বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

কলমী-শাক—(*Convolvulus repens*) ইহা সংস্কৃত নাম কলমী । ইহা জাতি উৎপন্ন হয় । যে সকল পুষ্টি বা বহুবল ইহাতে অসংস্কৃত অবস্থায় আছে, তাহাতে কলমী লতায় উদ্ভব হয়। পাঠে, অতি প্রাচীন যিহেও ইহা জন্ম হতে দেখা যায় । ইহা প্রাধান্য ক্রিয়া স্তন্য গ্রন্থিগোদক, অনেক প্রকার দেখা যায় যে, তাহা দ্বারা স্তন্য প্রসব ক্রিয়ায় গর, তাহা দ্বিগুণেও ত্রুণে তাহা দ্বিগুণেও হয় না, অপরা এত অল্প পরিমাণে ত্রুণ ত্রুণে যে, ইহা স্তন্যগোদক পক্ষে প্রচুর নহে, এমত স্থলে এই স্তন্য প্রসব প্রকারে কলমী শাক ভক্ষণ করা হলে, তাহা দ্বিগুণেও স্তন্য আবদ্ধক পরিমাণে ত্রুণ প্রকার হয়। থাকে ।

ভাব প্রাণগণ্যে ইহা এক প্রকার স্তন্য উল্লেখ দৃষ্ট হয় ।

কলমী পতঙ্গকায়

কলমী হৃদগুণা অথ ।

কলমী স্তন্যাদা প্রোভা

মধুবা শুক্রকারিণী ॥

পুঁই—(*Basella rubra*)—উপো-
দিকা বা উপদকী । পুঁইশাক তিন প্রকার দৃষ্ট
হয় । আমবা সচাচব বাহা দেখিতে পাঠ
তাহা দ্বিগুণেও পত্র বড়, অপব এব বিন আছে,
তাহা দ্বিগুণেও পত্র ক্ষুদ্র এবং ত্রুণ প্রকার
বনজ । অপব এক প্রকার আছে, ইহা
প্রথম প্রকারেব ন্যায়, প্রভেদেব মধ্যে ইহা
রক্তবর্ণ ।

ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণে পুষ্টির পদার্থ
ধারায় ইহা পোষক গুণ বিশিষ্ট । ইহা
অপর এক ক্রিয়া এই যে, ইহা আলস্য উৎ-

পদন ববে । প্রাচীন নিয়মতরুণে ভক্ষণ
করিলে, অনস পবাযণতা বর্জিত পাঠিয়া থাকে ।
বেহ কেহ বলেন—ইহাতে নিদ্রালুতা উপ-
হিত করে ।

ফোটিকা দতে ইহা পত্র পুষ্টিগুণে
বাহ্য প্রকারে, উহা শীঘ্রই কোমল হয়
আইসে । ভাবপ্রাণ্যে ইহা এইরূপ
স্তন্য উল্লেখ দৃষ্ট হয় ।

পোতা পত্রিকা মাতৃ

মানবাত্মা বন্য ।

পোতা শীঘ্রোন্মিতা

প্লেথ্যা বাত শিল্প ॥

আদর্শা পিচ্চিলা নিদ্রা

শুক্রা বক্তৃতাভিঃ ॥

বদনা কাচক্রুৎ পথ্যা

বহন্য তৃপ্তি কারিণী ॥

সুশুনি-শাক—(*Marsilea Quadri-*
folita) সুশুনিশাক, ইহা একপ্রকার চলজ
শাক । জয়ময় প্রদেশে এত শাক উৎপন্ন
হইয়া থাকে । ইহা প্রাধান্য ক্রিয়া নিদ্রা
কাবক । কিন্তু ইহাতে কোন মাদকতা শক্তি
নাই । অনেক স্থলে দৃষ্ট হয় ইহা দ্বারা অতি
অসংস্কৃত সুশুনি উৎপত্তি হয় । কথিত
আছে, কোন এক সাহসের স্ত্রী অনিদ্রাবোধে
বসে পাইতে থাকিলে, উপরুক্ত চিকিৎসক দ্বারা
যথার্থ মাসাবধিকার চিকিৎসা করা হইয়াও
কোন সুদল প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই । অন-
ন্তোপায় হইলে পব এই সাহসের স্ত্রীকে কপ্প
চাবা তাহাকে সুশুনিশাক শাক ভোজনের
পরিমার্শ দেন । এই পরিমার্শানুসারে এই
স্ত্রীলোক, যে দিবস ইহাতে ইহা ভক্ষণ করিতে

থাকেন, সেই দিবস হইতেই তিনি স্নিগ্রা উপভোগ করিতে থাকেন ।

স্নিগ্রা জনিত শিবঃপীড়া রোগে ইহা দ্বারা আশাতিরিক্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । অতিচিন্তাব ফলে অনেক ব্যক্তি সমস্ত রজনী স্বপ্ন দর্শন করিতে থাকেন, এবং প্রতিক্ষণে স্নিগ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়, এই সকল ব্যক্তি স্ননিষন্নক শাক ভক্ষণ করিলে, স্বপ্নদর্শন নিবারণিত হইয়া গাঢ় স্নিগ্রা উপস্থিত হয় ।

বাক্ নির্ঘণ্ট নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, স্ননিষন্ন শাক মেধা বর্ধক এবং দাহজ্ব নাশক ।

ভাব প্রকাশ গ্রন্থে ইহাব এই প্রকাব গুণের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ।

* * * *

চাঙ্গেবী সন্মুখং পত্নৈঃ
চতুর্দল মুদীবিতং ।
শাকং জলাব্রিতে দেশে
চতুঃ পত্রীতি চোচ্যতে ॥
স্ননিষন্নং হিমংগ্রাহি
মেহ নোষজয়া পহং ।
অবিদাহি লঘু স্বাহ,
কষায়ং ক্লম দীপনং ॥
বৃষ্যাক্রিচো জ্ব স্বাস
মেহকুষ্ঠ ভ্রম প্রমুং ॥

রক্তের দূষিতাবস্থা উপস্থিত হইলে, ইহা দ্বারা বিস্তর অপকাব উপস্থিত হইয়া থাকে । অতএব যে সকল স্থলে রক্তের দূষিতাবস্থা সংঘটিত হয়, তথায় ইহা ভক্ষণ করিতে বিবত থাকিবে । আয়ুর্কেন্দ শাস্ত্রে যে সকল লক্ষণ যুক্ত ব্যাধি বক্রপিত্ত নামে অভিহিত হয়, ঐরূপ স্থলেও ইহা ভক্ষণ করা নিষেধ ।

হেলেঞ্চ বা হিঞ্চে শাক—
(Enhydra Heloncha)—হিলমোচিকা ।

ইহাও এক প্রকার জলজ শাক । বেরূপ স্থলে কলসী ও স্ননিষন্নক শাক জন্মে, হিলমোচিকাও সেই প্রকার স্থলেই জন্মিয়া থাকে ।

বিবিধ চর্ম্মবোগে হিলমোচিকাব তুল্য উপাদেয় পথ্য আব নাহি । নিয়মিতক্লে ইহা ভক্ষণ করিলে, একমাত্র ইহাবই দ্বারা বোগারোগ্য সম্ভবিত্তে পারে ।

নানাপ্রকার কণ্ডু হিলমোচিকা দ্বারা প্রসমিত হইতে দেখা যায় । কোন কোন ব্যক্তি সর্ষ শরীবব্যাপী ছুট ব্রণে অশেষ কষ্ট পাইয়া থাকে, হিলমোচিকা তাহাদিগের আশ্রয় স্বরূপ ।

পিত্তজনিত কণ্ডু অথবা তাহা হইতে যে সকল চর্ম্মবোগ উৎপন্ন হয়, হিলমোচিকা ব্যবহারে অচিরেই ঐ সকল বিনষ্ট হইয়া যায় ।

অনেকে অন্নজনিত বুকজালা রোগে ইহা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন, কিন্তু আমরা এই রোগে ইহা পুনঃপুন ব্যবহার করিয়াও কোন উপকার প্রাপ্ত হই নাহি ।

কেহ কেহ শোথ বোগে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন, কিন্তু আশাহুরূপ ফললাভ করিতে পাবা যায় না ।

ভাব প্রকাশ ও রাক্তবল্লভ নামক গ্রন্থে হিলমোচিকা কুষ্ঠ রোগ প্রসমক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । শেষোক্ত গ্রন্থে ইহা প্লেম্মাপিত্ত নাশক বলিয়া পাঠান্তর দৃষ্ট হয় ।

পুলফা—(Peucedanum sowa)—
শত পুষ্পা ইহার ফল ও পুষ্প মৌরীর সহিত সর্ষ বিষয়ে সৌগাদুগ্ধ আছে । ফলগুলির

আকাব ও গন্ধ মৌবীৰ সমতুল্য । গাণকেবা ফলগুলিকে মৌবীৰ সাহিত মিশ্রিত কবিয়া বিক্রয় করে । মৌবীৰ সহিত ঈহাব যে পার্থক্য আছে, তাহা সকলেবই জানিয়া রাখা প্রয়োজন । শত পুষ্পের ফল মৌবী অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং ঈহাব অভ্যন্তরে যে গন্ধ আছে, তাহা কঠিন । মৌবীৰ অভ্যন্তরস্থ গন্ধ কঠিন নহে । মৌবী অপেক্ষাকৃত মিষ্টাস্বাদ, শত পুষ্প ততুল্য মিষ্ট নহে । মৌবীৰ গন্ধাবয়ব পবিমানে ত্রৈশ শত পুষ্পাব ফল অপেক্ষাকৃত মুহুগন্ধ বিসিষ্ট ।

শত পুষ্পার শাক জন্তাভ্য গাণকেব সাহিত মিশ্রিত কবিয়া ভক্ষিত হয় । এই মিশ্রিত ওজন অতি সুগন্ধি এবং সুস্বাদু হওয়া থাকে ।

শতপুষ্প উষেজক, আগ্নেয় ও পুষ্টিবর্ধক । ঈহাকে গন্ধ দ্রবোব শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে । যেহেতু ইহা সৰ্ব্ব বিষয়ে গন্ধ দ্রবোব ক্রিয়া বিশিষ্ট ।

আস্থান জনিত উদব বেদনা ও তজ্জনিত শূল রোগে শতপুষ্প দ্বারা সকল সময়ে অশেষ উপকাব প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

মিউকাস ডায়েবিয়া বাগে শত পুষ্পা মহোপকারক । ক্রমিক ছুই তিন দিবস ব্যবহারেই রোগারোগ্য সংঘটিত হইয়া থাকে ।

পরিপাক শক্তির দৌৰ্ব্বল্য বশতঃ অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হইলে, ইহা দ্বারা পরিপাক শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া শীঘ্রই রোগাবোগ্য হইয়া যায় ।

কেহ কেহ বলেন ইহা চক্ষু রোগের হিতকর পথ্য ।

শতপুষ্প দ্বারা এই সকল উপকার লাভ

করিতে হইলে, ইহা কদাচ মিশ্ররূপে ব্যবহাৰ করা হয় ।

* * * *

শতপুষ্পা লবুস্তীক্ষা

পিত্ত রুদ্ধীপনী কটুঃ ।

উষ্ণা জ্বানিল শ্লেষ্ম

ঔষণ শূলান্সি বোগহুঃ ॥

মিশ্রেষা তদুগ্ধা প্রোক্তা

বিশেষাদ যোনি শূলভুঃ ।

অগ্নিমান্দাহবীজুদা

বদ্ধরিট্ ক্রিমি শুক্রহুঃ ॥

কংক্ষাষা পাচনা কাস

বাম শ্লেষ্মানলান হবৎ ॥

গন্ধভাদালিয়া বা গাঁধালা—

(*Pæderia Fatida*) প্রসারিণী । ইহা বলকাবক, সারক এবং শুকপাক, বাহ্য প্রযোগে বেদনা নিবাবক ।

বোগান্তে দৌৰ্ব্বল্যে প্রসারিণী ব্যবস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু অরণ্য বাগ্য প্রয়োজন যে, ইহা শুকপাক পদার্থ ।

অর্শবোগে পথ্যার্থ প্রসারিণী ব্যবস্থিত হইলে বেদনা নিবাবক ইহা উপকার করে । এবং এতদ্বারা রক্তেব পাবমাণও হ্রাস হইয়া যায় ।

শরীরেব কোন স্থান ভগ্ন হইয়া গেলে প্রসারিণী পেষণ কবিয়া তদ্বারা বন্ধন কবিয়া দিলে, বেদনা নিবাবণ ও ভগ্নস্থান সংযোজিত হইয়া যায় ।

উদবাসয় বোগে ইহাব ব্যবস্থা উপযোগী নহে ; ইহা দ্বারা বোগ বর্দ্ধন করিতে পারে ।

রাজবল্লভ গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা

বগ ও শুক্রবর্জক । ভাব প্রকাশে নিম্নোক্ত উল্লেখ দৃষ্ট হয় ।

প্রসারিণী বাজবলা,
ভদ্রপনৌ প্রতানি।
সরনী সাবনী ভদ্রা
বলা চাপি কটন্তবা।
প্রসাবিণী শুক্রবৃষা
বল সন্ধান কুংসবা।
বোর্যোষা বাত ক্ষুং তিত্তা।
বাত ক্তে কফা পহা ॥

নটে—মাষিষ শাক বা বাষ্পক
(*Amarantus spinosus* or *Amblo-
gina polygonoides* Prickly amar-
anth) ইহাও অপব নাম ক্ষুদ্রনটে বা চাপা-
নটে এবং সংস্কৃত নাম তণ্ডুলায়ক ।

মাষিষ শাক মুহু বিবেচক ও অগ্নিবর্জক ।
শ্বেত ও রক্তবর্ণ ভেদে ইহা দ্বিবিধ । এই
উভয় প্রকার তণ্ডুলায়কই তুলাশুণ বিশিষ্ট ।

কটক বিশিষ্ট অপর একবিধ নটে আছে
তাঁহাকে কাঁটা নটে বলে । ইহা ভগ্নগাণ্ড
ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু ইহাও কয়েকটা বিশেষ
শক্তি আছে । অর্শ ও কাস বোগে ইহাও
শাক হিতকর পথ্য । ইহার মূলের বিশেষ
শক্তি এই যে উহা ভক্ষণে বক্ত্রাস্রাব বোধ হয় ।
রক্তাতিসার বোগে গ্রামবা ইহার মূল ব্যবহাব
করিয়া বহুস্থলে আশাতিবিক্ত ফল লাভ
করিয়াছি ।

জ্বীলোকদিগের রক্তোবোধ কবণার্থ এই
মূল বিশেষ উপযোগী । প্রদররোগেও কখন
কখন অতি উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

ইহার মূল শূলরোগের পক্ষেও সময়ে
সময়ে মহোপকার সাধন করে । শরী-

রেব রক্ত দূষিত হইলেও চহা ব্যবহারে স্কুল
প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

বাজনির্ঘণ্ট নামক গ্রন্থ মতে মাষিষ শাক
অশ রোগে হিতকর পথ্য । ভাব প্রকাশ
গ্রন্থে ইহার যেরূপ শুণেব উল্লেখ আছে, নিম্নে
তদ্বিবরণ প্রকাশ করা গেল ।

তণ্ডুলীয়ো মেঘনাদঃ

কৌড়েবস্তুলে বকঃ ।

ভণ্ডৌব জুগুলা বীজো

বিঘ্নশ্কারমাষিষ ॥

• তুণ্ডীয়ো বনুঃ শীতঃ

বক্ষঃ পিত্ত কফাশ্রাজং ।

স্ফটামূত্র মলোকচো ,

দীপনো বিষ হারকঃ ॥

ঘোলমৌলী—ঘোলী বা কুম্ভকালিকা ।

বনজাত ও ক্ষেত্রজাত ভেদে ঘোলীশাক দ্বিবিধ ।
এই উভয় প্রকার ঘোলীর মধ্যে বনজাত
ঘোলীও বিশেষ গুণ এই যে, ইহা অজীর্ণজর
প্রসমক । বাজবল্লভ নামক গ্রন্থেও ইহা
অজীর্ণ জর নাশক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ।

চহা এতদ্রূপলক্ষে ব্যবহাব করিতে হইলে,
নিম্নালাখিত উপায় অবলম্বন কবিতে হয় ।
বনজাত ঘোলী শাক কদলী পত্র মধ্যে রাখিয়া
বন্ধন করিবে । অনন্তর এই কদলী পত্র সহ
অগ্নিতে দক্ষ করনাস্তব, পত্র মধ্যস্থ সিদ্ধ শাক
বাহির করিয়া কিঞ্চিৎ লবণ সহযোগে ভক্ষণ
করিবে । এতদ্ব্যতীত ইহার অপর কোন
প্রকার শুণের বিষয় শ্রুত বা কোন পুস্তকেও
দৃষ্ট হয় না ।

পুণ্যে বা পম্নে—(*Procumbens
auderecta*) পুনর্ধবা । শ্বেত নীল ও রক্তবর্ণ

ভেদে পুনর্ণবা ত্রিবিধ । শ্বেতবর্ণ পুনর্ণবাকে শ্বেতপুষ্পে, বক্তবর্ণ পুনর্ণবাকে গাধ্যবর্ণে বা গাধ্যা পুষ্পমা কহে । নীলবর্ণ পুনর্ণবা সচবা-
চর দৃষ্ট হয় না ।

ত্রিবিধ পুনর্ণবাই আগ্নেয়, পিত্তনিঃসা-
রক ও মূত্রকারক । চর্হাব মূলেব কাথ
অধিক মাত্রায় সেবিত হইলে বমন কারক
ক্রিয়া প্রকাশ্য কবে ।

ইহাব মূত্রকারক ক্রিয়া থাকায়, শোধ
বোগে প্রয়োজিত হইলে, বিস্তব উপকাব
প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

পাণ্ডুবোগেও পুনর্ণবা মহোপকারক ।
শোধ সংযুক্ত পাণ্ডুবোগে পুনর্ণবা প্রয়োগ
করিলে অনেক সময়ে অতি আশ্চর্য্য ফল লব্ধ
হয় । পিত্ত নিঃসারক ও মূত্রকারক হইয়া
উপকার কবে ।

রক্ত প্রদব বোগে ও শ্বেত প্রদব বোগে
ব্যবহার কবিয়া অনেকে সফল লাভ কবিয়া-
ছেন বলিয়া প্রকাশ্য কবেন । বক্ত পুনর্ণবা
অধিক ফলোপদায়ক ।

ধমন্তকৃদ বোগে ইহার পত্রের প্রলেপ
ব্যবহার কবিলে, শীঘ্রই তাহা আবোগ্য হইয়া
যায় । এতদর্থে শ্বেত পুনর্ণবা অধিক উপযোগী ।

পুনর্ণবা মূলের কাথ উদবাসয় বোগে
ব্যবস্থা করিলে কখন কখন মহোপকার
সংসাধিত হয় ।

ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে ইহার নিম্নলিখিত গুণেব
উল্লেখ আছে ।—

পুনর্ণবা শ্বেত মূল্য

শোধয়ী দীর্ঘ পত্রিকা ।

কটুঃ কষায়ঃ ক্লেচঃ

পিত্ত কৃদীপনী পয়ঃ ॥

শোফানিল গর শ্লেষ্ম,

হবী ব্রহ্মদব প্রণুঃ ।

পুনর্ণবা পবা পুঞ্জা

বক্ত পুষ্প শিলা টিকা ॥

শোথায়ী ক্ষুদ্র বর্ষাভূ

বর্ষকেতুঃ কঠিনকঃ ।

পুনর্ণবাহরুনা তিত্তা

কটুপাকা হিমা লঘুঃ ॥

বাতলা গোহিণী শ্লেষ্ম

পিত্তরক্তা বনাশিনী ।

পাটল শাক—(Beta maritima)

—পাটল শাক : চর্হা গুরুপাক, আদিকক্ষণ
পাকস্থলীতে অপাববর্তিত অবস্থায় থাকিয়া
পরিপাক হয় । কাথিত আছে দেহেব রক্ত
দ্রবিত হইলে ইহা দ্বাৰা হিত ফল প্রাপ্ত হওয়া
যায় । ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে ইহাব নিম্নোক্ত
গুণ দৃষ্ট হয় ।—

পাটল বাতলাশীত,

শ্লেষ্মলা ভেদিনী গুরু ।

বিষ্টান্তনৌ মদম্বাস

পিপ্লবক্ত কদা পূহা ॥

পাটের শাক—(Corchorus

olitorius)—নাড়ীচ বা নাড়ীক শাক ।

চর্হা দুই প্রকাব, আশ্বাদ তিত্ত, ইহাকে নাড়ীতে
পাতা বলে ; অপব প্রকারের আশ্বাদ
সাধারণ শাকেব আশ্বাদের স্তায় মিষ্ট ।

পাটশাক গুরুপাক ও পোষক । ইহাতে
এক প্রকার পিচ্ছিল পদার্থ আছে, উহাই
ইহার পোষক উপাদানের মূল । তিত্ত পাট
শাকেবও এইমকল গুণ আছে, অধিকন্তু ইহা
ক্রিমি নাশক ও পিত্ত নিঃসারক ।

সচরাচর তিক্ত পাট শাক শুক কবিতা রাখা হয়। শুক নালতে পাতা, পিত্ত জনিত ব্যাধিতে এবং সামান্য আকারেব জ্বর বোগে ব্যবহৃত হয়। এ সকল স্থলে সাধাবণতঃ চনফিউশন আকারে প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

রাজবল্লভ নামক গ্রন্থে ইহার নিম্নলিখিত গুণেব উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

নাডাক শাকং দ্বিবিধং

ত্রিক্তং মধুং মেঘচ।

রক্তপিত্ত হবং তিক্তং

ক্রিমি কৃষ্ট বিনাশনং।

মধুং পিচ্ছিলং শীতং।

বিষ্টম্ভী কফ বাত ক্লং।

জ্বরদোষনাশনং বিশেষতঃ

তং শুক পত্রং পিত্তকফ জ্বরপহং

কলঞ্চ তস্তাপিচ

বাজন যোগকাবক

পিত্ত হারকং সুবোচনং ॥

স'জিনা শাক—(Moringa Pterygosperma) শিগ্র শাক। আশ্বৈয়, ক্রিমি নাশক। সূত্র খণ্ডবৎ ক্রিমি বোগে শিগ্র শাক মচোপকার সাধন কবে।

অফথ্যালমিকা রোগে শিগ্র পত্ররস অক্ষিপুটে প্রলেপ দিলে, চক্ষের ফুলা ও আরক্তিমতা বিদূরিত হয়।

ভাবপ্রকাশে ইহার এইরূপ উল্লেখ আছে। যথা,—

শিগ্র শাকং হিমংস্বাদ

চক্ষুষ্য বাত পিত্তহৃৎ।

বৃংহণং শুক্লকৃৎ দ্বিধং

কচাং মদং ক্রিমি প্রমুৎ ॥

শাক্কে, শাক্ফি, শান্তি শাক—

(Altarnau thera Sessilis)—শালিক

শাক। ইহাও জলজ শাক। জলময়

পাদশে তহা উদ্ভব হইয়া থাকে। ইহার

প্রধান গুণ আশ্বৈয় ও পিত্ত নিঃসারক।

কথিত আছে গৌড়া বোগে শালিক শাক

দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং অর্শ

বোগে বেদনা ও বক্তব্যাস হ্রাস হয়।

মিগ্রেশ বোগে যখন প্রাতঃকালে বেদনা

আরম্ভ হইয়া দিনমানের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বেদ-

নার হ্রাস বৃদ্ধি এবং বাত্রিকালে কিছুই থাকে

না, তখন ইহা দ্বারা কখন কখন আশ্চর্য

উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাতঃকালে

বেদনা আবর্ত্ত হইবার পূর্বে বেদনা স্থানে

শালিকবস লেপন করিয়া ঐ স্থানে রৌদ্র

লাগাইতে হয়। এইরূপ করিলে ঐ বেদনা

আরোগ্য হইয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

বিবিধ তত্ত্ব ।

সম্পাদকীয় সংগ্রহ ।

শিশুদিগের কয়েকটি বিশেষ ঔষধ ।

(Tresiliau)

শিশুর কোন পীড়া হঠলে বয়স্কের পীড়ার অল্পরূপ ঔষধ বিশেষ প্রয়োগ করা যাইবে। বয়স অল্পসাবে বিভিন্নরূপ ঔষধ ব্যবস্থা কবিতে হয়। কয়েকটি ঔষধ শিশু শরীরে বিশেষভাবে কাগা কবে এবং প্রয়োগ করিয়া সুফল পাওয়া যায়।

শিশুদিগের পক্ষে বিরচক ঔষধ বিশেষ আবশ্যক, এত ঔষধ প্রয়োগে ইতস্ততঃ করিলে অনেক সময়ে চিকিৎসায় সুফল লাভের বিয় হয়। অপব ঔষধ প্রয়োগ করিয়া সুফল হয় না।

বয়স্কদিগের চিকিৎসায় যত ঔষধ আবশ্যক হয়, শিশুদিগের চিকিৎসায় তত আবশ্যক হয় না। নির্দিষ্ট কয়েকটি ঔষধ দ্বাৰা উদ্দেশ্য সকল হয়।

এলকোহল এবং কড্‌লিভার অইল এই দুইটা ঔষধ মধো গণ্য না করিয়া পথ্য মধো গণ্য করা উচিত। নিউমোনিয়ায় এবং বোগ জীবাণু জাত অতিসার পীড়ায় বিশেষ উপকারী। পরিমাণে অতিবিক্ত হইলে অনিষ্ট হয়। তজ্জন্ত ইহার প্রয়োগ ভার শিশুর পরিচারকের উপর না দিয়া চিকিৎসকের নিজের উপর রাখা আবশ্যক। নিয়মিত দোজ প্রয়োগ করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে প্রয়োগ করা উচিত নহে।

শিশুদিগের পক্ষে এন্টিমনি একটা উপকারী ঔষধ। স্বাস্থ্যস্বেব পীড়ায় প্রয়োগ করিয়া সুফল পাওয়া যায়। বায়ুনলীর পীড়া, ফুসফুসের পীড়া—লাবাব নিউমোনিয়া, তরুণ ল্যাবিডাটিস্, ব্রঙ্কাইটিস্, ক্যাটাৰাল নিউমোনিয়াব প্রথম অবস্থায় উপকারী। শিশুগণ এন্টিমনি বেশ সহ্য করিতে পারে। এসটেট অফ এমোনিয়া এবং একোনাইট সহ মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তরুণ এক্জিমা পীড়াতেও উপকারী।

আসেনিকও শিশুদিগের পক্ষে উপকারী। শ্বাস, কাস, লিম্ফ এডিনোমা এবং কোরুয়া পীড়ায় উপকারী।

বেলাডোনা প্রয়োগ করিয়া ক্যাটারাল নিউমোনিয়াতে বেশ সুফল হয় এবং কুইনাইন, স্ট্রিকনিন, বা ব্রোমাইড সহ প্রয়োগ কবিলে স্নাববীয় শয্যামুক্তের প্রতিবিধান হইতে পারে। ছিংগ কফেও উপকারী, এপেণ্ডিসাইটিস এবং টিউবারকেল বিধীন পেরিটোনাইটিস্ পীড়ায় বাহ প্রয়োগে উপকারী।

মাকুরীও বালকদিগের পক্ষে উপকারী ঔষধ। তবে পূর্বে মাকুরীস চক বা ক্যাণামেল যত প্রয়োজিত হইত এখন তত হয় না। শিশুদিগের পরিপাক যন্ত্রের পীড়ায় প্রোপাউডার একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। কোলিক উপদংশ পীড়ায় পারদের মলম মালিস

কবিলে শীঘ্র উপকার হয়। ক্রিষ্টোফটিন এবং লেবেবিনথিন পীড়ায় বাহু এবং আভ্যন্তরিক উভয় রূপেই প্রয়োগ করা যায়।

স্থালিসিলেট প্রয়োগ করার ফলে বয়স্ক-দিগের যেরূপ অবসাদ উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা করা হয়। বালকদিগের তদ্রূপ আশঙ্কা হয় না, তবে বক্ত প্রস্তাব হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তরুণ বাত, ঠাণ্ডা, অজ্ঞের পুরাতন কাটা, প্যাঁপউলা, আটিকেরিয়া, সিষ্টাইটিস এবং গ্রীষ্মকালের অতিসার প্রভৃতি পীড়ায় উপকারী স্থালিসিলেট অফ বিসমথ উৎকৃষ্ট ঔষধ। এত ঔষধে বক্ত প্রস্তাব হওয়ার আশঙ্কা থাকে না, অতিসার এবং পেট বেদনায় উপকারী।

এন্টিপাইরিণ, ফেনাসিটিন প্রয়োগ করিলে কর্ণের বেদনা, দস্তেব বেদনা এবং ল্যাবিঞ্জিস মাসে উপকার হয়।

অহিফেন—ডোভারস্ পাউডার রূপে প্রয়োগ করিলে শূলবেদনা, এপেন্ডিসাইটিস্, ইন্টার সাসেপশন এবং অতিসারের উপশম হয়।

ক্লোরাল উপকারী। বালকদিগের নিদ্রা করণে বক্ত ইহাও উৎকৃষ্ট। আফেপ ইত্যাদি পীড়ায় প্রয়োগ করা যায়।

ম্যানা বিরচনের পক্ষে ইহাও ভাল ঔষধ।

মিসিরিণের সাপোজিটরী বা পিচকারী দিলেও মল নির্গত হয়। সাবানের সাপোজিটরী মিসিরিণে ডুবাইয়া লইয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

রিসোরসিনের ক্রিয়া।

(Clark)

ডাক্তার ক্লার্ক মহাশয় বলেন,—প্রদাহযুক্ত একজিমায যখন, জালা, চুলকানী, যন্ত্রণাদি অসহ্য হইয়া উঠে, তখন রিসোরসিন প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্য সফল হয়। এই স্থলে ইহা বেদনা নিবাবক হইয়া কার্য্য করে। প্রয়োগ মাত্র সমস্ত জালা যন্ত্রণার উপশম হওয়ায় বোগী সুস্থিৎ বোধ করে। অতি সামান্য পরিমাণ ঔষধে একরূপ বিশেষ কার্য্য কি করিয়া করে, তাহিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। Diachylon Ointment অপেক্ষা হঠাৎ অধিক উপকারী। এই উদ্দেশ্যে অপর যে সমস্ত ঔষধ আছে, তৎসমস্ত অপেক্ষা এই ঔষধে অধিক সফল হয়। রিসোরসিনের প্রধান ক্রিয়া প্রদাহ এবং উস্তেজনা নাশকে বক্ত, এরূপ হয়। ডাক্তার ক্লার্ক মহাশয় যে, কেবল দুই এক স্থলে এরূপ ফল পাইয়াছেন তাহা নহে, পবিত্র যে সকল স্থলে প্রয়োগ কাব্যাজেন সেই সকল স্থলেই এরূপ ফল হইয়াছে।

দুইকপে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

১—সলিউশন, ২—অইন্টমেন্ট।

২০ গ্রেণ রিসোরসিন এক আউন্স জলে দ্রব করিলে শতকরা চারি অংশ বিশিষ্ট দ্রব প্রস্তুত হয়। এই দ্রব প্রয়োগ করিলেই উপকার হয়। এতদপেক্ষা অধিক শক্তির দ্রব প্রয়োগ করা যাইতে পারে কিন্তু তাহার কোন আবশ্যিকতা নাই।

উক্ত দ্রবে এক খণ্ড বস্ত্র সিক্ত করিয়া সেই সিক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা পীড়িত স্থান আবৃত এবং তাহা পড়িয়া না যাইতে পারে এই

উদ্দেশ্যে বাধিয়া রাখিতে হয়। আবশ্যকানুসারে লিট বা বজ্রখণ্ড ছোট বা বড় করিতে হয়। পীড়িত স্থান পরিষ্কার করিয়া তৎপর ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক, তাহা লেখাট বাহুলা পীড়া আবোগা বা মন্দ লক্ষণ প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যাউতে পারে।

ইনি বিশেষ বিশেষ স্থান বাতীত মলম প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অক্সাইড অফ জিঙ্ক অক্টোমেন্ট এক আউন্স সহ বার গ্রেণ রিসেরসিন মিশ্রিত কাবয়া লইলেই হইতে পারে। জিঙ্ক অক্টোমেন্টেব পবিত্র কোল্ডক্রিম লটলেও হইতে পারে। এক আউন্স রিসেরসিন মলমেব সহিত ৫—১০ গ্রেণ আলিসিলিক এসিড মিশ্রিত করিয়া লইলে আবোগা ভাল ফল হয়। নিম্নলিখিত মতে মলম প্রস্তুত করা যাউতে পারে।

Re

রিসেরসিন ২০ গ্রেণ
এসিড আলিসিলিক ১০ গ্রেণ
অক্টোমেন্টজিঙ্ক অক্সাইড বেজোয়েট ১ আউন্স
মিশ্রিত করিয়া মলম।

আবশ্যকানুসারে প্রত্যাহ এক কি দুইবার প্রয়োগ করিবে।

এই মলম প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে রিসেরসিন এবং আলিসিলিক এসিড পৃথক ভাবে এলকোহল দ্বারা দ্রব করিয়া রাখিবে। তৎপর যুহ উত্তাপে জিঙ্ক অক্সাইড বেজোয়েট মলম দ্রব করিয়া লইয়া প্রথমোক্ত দ্রব দ্বয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া শীতল না হওয়া পর্যন্ত আলোড়িত করিবে। অথবা প্রথমে মলম যুহ উত্তাপে দ্রব করিয়া লইয়া তৎপর প্রথ-

মোক্ত দুইটা ঔষধ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইয়া মলম সহ মিশ্রিত করিবে এবং শীতল না হওয়া পর্যন্ত অবিরুদ্ধে ক্রমাগত আলোড়িত করিবে।

আলিসিলিক এসিড পচন নিবারণ হইয়া কার্য্য করে। কোল্ডক্রিম এবং রিসেরসিন একত্রে বেশ কার্য্য করে। জিঙ্ক অক্টোমেন্ট শুষ্ক করে জিঙ্ক অক্টোমেন্টের পবিত্র অচল অ'লভ, কিম্বা তরুণ অপব পদার্থ প্রয়োগ করা যাউতে পারে।

স্থানিক প্রয়োগ ফলে এই ঔষধে সাময়িক উপশম হয় মাত্র, তজ্জন্ম পীড়া আবোগা কবিত হইলে আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবন আবশ্যক। ইহাব ফলে প্রদাহ এবং উত্তেজনা বিনাশ হয় মাত্র। কিন্তু পীড়া আরোগ্য হয় না।

ফারাক্সল বসাইবার উপায়।

(Gallois)

গ্রীষ্মকালে অনেকের শরাবে ক্রমাগত বিষফোঁড়া হইতে থাকে। এক দল আরোগ্য হইতে না হইতেই আবার আর এক দল প্রকাশ পায়। প্রধানতঃ ঔষধাদি ব্যবহার করিয়া কোনই সফল পাওয়া যায় না। বালকদিগের শরীবে ইহা বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। প্রায় অধিকাংশ বিষফোঁড়া পাকিয়া পূর্ব নির্গত হইলে তৎপর আরোগ্য হয়। ডাক্তার গলিস মহাশয় বলেন—ঐরূপ বইল প্রকাশ মাত্র যদি তাহার উপর নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ঐ বইল না পাকিয়া বসিয়া যায়। যথা—

Re.

আইওডিন ৪ গ্রাম

এসিটোন ১০ গ্রাম

মিশ্রিত করিয়া দ্রব ।

টহার একটু লঠিয়া তুলি দ্বারা অপক বইলের উপর সংলগ্ন করিলে তাহাতে আব পুঁষ হইতে পারে না । সামান্য একটু পুঁষ হইলেও তাহা এক দিবস মধ্যে বসিয়া যায় । কচিং কখন ছুঁই বাব প্রয়োগ করিতে হয় । নতুবা একবার প্রয়োগই যথেষ্ট । এই দ্রব দাওক ক্রিয়া কবে তজ্জন্ম সাবদান হইয়া প্রয়োগ করা উচিত । এই দ্রব ক্ষতে সংলগ্ন হইলে অত্যন্ত জ্বালা করে এবং আইওডিজ্‌মেব লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে ।

এসিটোন ।

(Aciton.)

টহার অনেক নাম যথা—ডাইমিথাইল কেটোন, কেটোপ্রো পান । রাসায়নিক সংকেত $\text{CH}_3 \cdot \text{CO}_2 \cdot \text{CH}_3$. (Dimethyl Ketone)

ইহা মিথিলিক এলকোহলের অনুরূপ । এসিটিক এসিড শুষ্ক প্রণালীতে পরিষ্কৃত করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায় । এই পদার্থ তরল, পরিষ্কার, বর্ণহীন, লঘু, সমক্ষারাম । ইথরের গন্ধ এবং কপূরের অনুরূপ স্বাদযুক্ত ।

জল, এলকোহল, ইথর, ক্লোরফর্ম এবং তৈল সহ মিশ্রিত হয় । টহাতে মেদ, ধূনা এবং ক্যাফিয়ার্ডিন দ্রব হয় । বিস্তৃত অবস্থায় আপেক্ষিক গুরুত্ব ০.৭২৬৬ ক্লোরফর্ম প্রস্থত

করিতেই টহা অধিক ব্যবহৃত হয় । খাসকষ্ট নিবারণ জন্ত ১—২ ড্রাম মাত্রায় প্রয়োজিত জিত হইয়া থাকে । শ্বাসবীয় বলকারক এবং কৃমিনাশক ।

স্পাইরোন ।

নামক যে ঔষধ প্রস্তুত হয় এসিটোনই তাহার প্রধান উপাদান । এই ঔষধ এসিটোন ৫০ ভাগ, টাশিয়াম আইওডাইড ২ ভাগ, গ্লিসিরিন ২৪ ভাগ এবং অবশিষ্ট জল দ্বারা ১০০ ভাগ পূর্ণ করা হয় ।

খাসকাসের খাসকৃচ্ছতা হ্রাস করার জন্ত স্পে দ্বারা বাষ্প প্রয়োগ করা হয় ।

ক্লোরোটন ।

(Chloretone)

টহার অনেক নাম যথা, এসিটোন-ক্লোর ফর্ম, এনেসোন টতাদি । রাসায়নিক সংকেত $\text{CCl}_3 (\text{CH}_3)_2 \text{C} \cdot \text{OH} + \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$.

ক্রিয়া—নুতন ঔষধ । এখনও ক্রিয়ার বিষয় বিশেষরূপ স্থির হয় নাই । বলা হয়—নিদ্রাকারক, স্তানিক স্পর্শজ্ঞানহারক, পচন-নিবায়ক এবং বমননিবারক ।

বিগত মাসে বমননিবারক ক্রিয়ার কয়েকটি চিকিৎসা-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । প্রথমে এক মাত্রায় ১০ গ্রেণ সেবন করাইয়া, তৎপর ৫ গ্রেণ মাত্রায় তিন ঘণ্টা পর পর সেবন করাইতে হয় । বমন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এইরূপে সেবন করাইলে শীঘ্র বমন বন্ধ হয় এবং রোগী শান্তিলাভ করিয়া নিদ্রা-ভীত হয় । নিদ্রাভঙ্গের পর শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করে । তখন পৰ্য্যাপ্ত ক্রিয়া

আর বমন হয় না। সমুদ্রের মধ্যে যে বমন হয় তাহার পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

অস্ত্রোপচারের পূর্বে যে বমন হয় তাহা বন্ধ করার জন্তও ক্লোরেটিন প্রযোজ্য। করা হয়। অবসাদক চটয়া উপকার করে।

Dr Hutton মহাশয় লিভারপোল মেডিকেল চিরাবজিক্যাল জর্নাল নামক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমরা এই প্রবন্ধের স্থূল মর্ম্ম খেবাপিউটিক গেজেট হইতে সংগ্রহ করিলাম।

ডাক্তার হটন মহাশয় বলেন—হঠাৎ একটি নূতন ঔষধ। ইহাব সমস্ত ক্রিয়াব বিষয় অনেক জ্ঞাত নহেন। তজ্জন্ত যিনি যে ফলা লাভ করিয়াছেন, তাহাই প্রকাশ করা উচিত।

ইনি এক বৎসরের মধ্যে ছয় জন গর্ভবতীর বমন নিবারণ জন্ত ক্লোরেটিন প্রয়োগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে চারি জনের বমন সহজেই বন্ধ হইয়াছিল, বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই। পঞ্চম গর্ভবতীর এক্সাকুয়াগমিক গয়টার ছিল। তাহার হৃদয় পূর্বেই হৃৎবারের গর্ভ সময়ে বমন অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়াছিল। শেষে গর্ভ শ্রাব হওয়ার পর সমস্ত উপদ্রবের শান্তি হইয়াছিল। তজ্জন্ত ডাক্তার হটনের একপ বিশ্বাস ছিল না যে, এই গর্ভপূর্ণ সময় পর্য্যন্ত উপস্থিত হইবে। গর্ভের নবম মাসের মধ্য পর্য্যন্ত বমনের জন্ত কষ্ট হইয়াছিল। ক্লোরেটিন প্রয়োগ করার তাহা বন্ধ হইয়াছিল।

ষষ্ঠ গর্ভবতীর ক্লোরেটিনে কোন উপকার করে নাই। এই ঔষধে কেবল যে বমন বন্ধ হয় নাই, এমনকি নহে; পরন্তু মস্তকের উপদ্রব উপস্থিত করিয়াছিল। মাত্রা অধিক হওয়ার

একপ হইয়াছিল বিদ্যা গর্ভবতী বাতু প্রকৃতির বিশেষত্ব জন্ত এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। প্রথমে ৫ গ্রেণ মাত্রায় এবং শেষে ৩ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করা হইল। অনেকে এই ঔষধ অসহ্য বোধ করে।

তিনি প্রথমে দুই তিন মাত্রা চর্দ্ধঘণ্টা পর পর প্রয়োগ করিয়া পরে আবশ্যক অনুসারে আনক সময় পর পর প্রয়োগ করেন। অধিকাংশ স্থানে তিন মাত্রাতেই বেশ সফল হয়।

যুবতীদগেব আর্ন্তবস্ত্রাব সময়ে কাহারো কাচারো বিবামিষা এবং বমন হয়। সেইরূপ বমন নিবারণ পক্ষে ক্লোরেটিন উৎকৃষ্ট কার্য্য করে।

এক পরিবারের মধ্যে পাঁচ ভগিনী ছিল। তাহাদের তিন জন প্রতি মাসে দুই এক দিন বিবামিষা এবং বমন জন্ত শয্যাগত থাকিতে বাধ্য হইত। এককপ ভাবে ৮।১০ বৎসর অতীত হইয়াছিল। ইহাদের পঞ্চম দুইজনকে ক্লোরেটিন প্রয়োগ করা হইলে দুই মাস পর আবশ্য্য গ্রহণ করার উপস্থিত হয় না। তৃতীয় ভগিনী প্রতিবার আর্ন্তবস্ত্রাবের সময়ে ৫ গ্রেণ মাত্রায় ক্লোরেটিন সেবন করায় আর বিশেষ কষ্ট হয় না।

সমুদ্র বমন বন্ধ করার পক্ষেও ইহা বিশেষ উপযোগী। ডাক্তার হটন মহাশয় তাহা পবীক্ষা করিয়াছেন।

পাকস্থলীর বেদনায় ক্লোরেটিন প্রয়োগ করিয়া সফল পাওয়া যায়।

উক্ত ডাক্তার মহাশয় বিশ্বাস করেন—যান্ত্রিক পীড়ায় বমন নিবারণার্থ ক্লোরেটিন প্রয়োগ করিলে সফল হইতে পারে।

ক্লোরটন পাকস্থলীর উপর কার্য করিয়া বমন বন্ধ করে। ইহা সুস্বাদু, সেবন করিলে উষ্ণতা বোধ হয়। ১০—১২ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করাইলে নিত্রাকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। তবে অনেক স্থলে ১০ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিয়াও নিত্রা উপস্থিত হইতে দেখা যায় নাই। পরন্তু মস্তক ভার এবং মুখ বিষাদ হইয়াছে।

ডাইওনিন ।

(Dionin.)

ডাইওনিনের নাম ইথাইল-মফিন-হাইড্রো-ক্লোরাইড। বাসায়নিক সংকেত— $C_{18}H_{28}NO_8HCl + H_2O$.

ডাইওনিন একটি নিতাস্ত নূতন ঔষধ না হইলেও ইহার বিস্তৃত ব্যবহার নিতাস্ত নূতন। মফিন এবং কোডেইনেব পবিবর্ত্তে ইহা ব্যবহৃত হইতেছে। অবসাদক এবং বেদনা নিবারক ক্রিয়ার জন্ত ইহার অধিক ব্যবহার হইতেছে। উক্ত দুই ক্রিয়াব জন্ত ইহা মফিয়া এবং কোডিনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অথচ মফিনেব যে সমস্ত কুফল আছে ইহার তাহা কিছুই নাই অন্ততঃ পক্ষে এক্ষণে ইহার গুণ বর্ণনায় আমরা ঐক্য দেখিতে পাই।

ডাক্তার হিনসেন উক্ত মহাশয় এই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে চক্ষের বেদনা নিবারণ পক্ষে ডাইওনিন সর্বোৎকৃষ্ট। তিনি চক্ষের গভীর স্থরের প্রদাহ সম্বৃত্ত বেদনা—যেমন আইরাইটিস, সিক্লাইটিস, আইরিডোসিক্লাইটিস এবং প্রকোমা প্রভৃতি পীড়ার বেদনা নিবারণ জন্ত

কোকেইন, হলোকেইন, এবং ডাইওনিন ইহাদিগের পরম্পর তুলনা করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। পরীক্ষার জন্ত তিন প্রকার দ্রব প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কোকেইন দ্রব শত করা পাঁচ অংশ, হলোকেইন দ্রব শত করা এক অংশ এবং ডাইওনিন দ্রব শত করা পাঁচ অংশ শক্তি বিশিষ্ট। এই দ্রব সমূহ একজনের চক্ষেই একটির পর আর একটি তার পর অপব একটি এইরূপ ভাবে তিনটি দ্রবই প্রয়োগ করিয়া দেখিতেন যে, কোন দ্রবে কত পরিমাণ বেদনা নিবারণ করে এবং কতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ বেদনা নিবারিত থাকে। এই কয়েকটিব মধ্যে কোকেইনের বেদনা নিবারক শক্তি অপর দুইটি অপেক্ষা অল্প। হলোকেইনের বেদনা নিবারণ শক্তি অল্প এবং ঔষধের ক্রিয়ার স্থায়িত্ব ও অল্প। হলোকেইন এবং ডাইওনিনের মধ্যে হলোকেইনের বেদনা নিবারণ শক্তি অল্প এবং ঔষধীয় ক্রিয়ার স্থায়িত্ব অল্প। কোকেইনের বেদনা নিবারণের শক্তি এত অল্প যে, তাহা হলোকেইন বা ডাইওনিনের সহিত তুলনা হইতে পারে না। অপর দুইটি ঔষধের সহিত তুলনা করিলে কোকেইন আংশিক মতে বেদনা নিবারণ করে। ডাইওনিনের এই শক্তি হলোকেইন অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক।

কোকেইন দ্বারা বেদনা হ্রাস করিলে অল্পক্ষণ পরেই আবার সেই বেদনা প্রবল হয়, কিন্তু ডাইওনিন দ্বারা বেদনা নিবারণ করিলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর বেদনা উপস্থিত হয় না। কোকেইন কর্তৃক বেদনার আংশিক উপশম হয়, সেই উপশম অবস্থা এক ব্যক্তির অধিক স্থায়ী হয় না। হলোকেইন

ডাইওক্সিন দ্বারা বেদনা সম্পূর্ণ নিবারিত হয় এবং সেই অবস্থা ৩৪ ঘণ্টা স্থায়ী হয়।

উক্ত ডাক্তার মহাশয় ঐ সমস্ত পরীক্ষা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে সমাগত হইয়াছেন যে, চক্ষের গভীর স্তরের প্রদাহজ বেদনা নিবারণ পক্ষে ডাইওক্সিন সর্বোৎকৃষ্ট। বেদনা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয় এবং দীর্ঘকাল আর হয় না। হলোকৈটন তদপেক্ষা অল্প ক্রিয়া প্রকাশ করে। কোকেটন উক্ত উভয় ঔষধ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহাব উক্ত উভয় শক্তিতে নিতান্ত অল্প।

ডাইওক্সিন প্রয়োগের পূর্বে বোগীকে একটা বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিতে হয় নতুবা সে আশঙ্কা কবিত্তে পারে যে, তাহার চক্ষে ঔষধেব ফল মন্দ হইয়াছে। ডাইওক্সিন চক্ষে প্রয়োগ করিলে প্রথমে চক্ষু অভ্যস্ত লাল হইয়া উঠে, কজ্জলটাইভা ক্ষীত হইয়া কর্ণিয়া আবৃত্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাট, অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত রক্তবর্ণ অন্তর্হিত হইয়া যায়। অনেক স্থলে উক্ত রক্তবর্ণ হওয়া সুলক্ষণ মধ্যে গণ্য, কারণ রক্তবর্ণ অধিক গাঢ় হইলেই বুঝিতে হইবে যে, বেদনা নিবারক ক্রিয়া বিশেষ ভাবে উপস্থিত হইবে। প্রথমবার ডাইওক্সিন প্রয়োগ করিলেই এইরূপ রক্তবর্ণ উপস্থিত হয়, তৎপর আর যত বার প্রয়োগ করা হউক না কেন, আর রক্তবর্ণ হয় না। পীড়ার এবং বেদনার প্রবলতাসূচক ডাইওক্সিন ত্রয় বা মলম, ৪, ৬, বা ৮ ঘণ্টা পর পর প্রয়োগ করা উচিত।

চক্ষের বেদনা নিবারণার্থ ডাইওক্সিন প্রয়োগ করিয়া স্বল্প লাভ করতঃ অনেক

চিকিৎসক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা আরো দুই এক জনের মন্তব্য নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি।

ডাক্তার নিমি মহাশয় বলেন—কজ্জলটাইভায় ডাইওক্সিন প্রয়োগ কাবতে হইলে কাঁচের বডেব অন্তে সামান্য একটু মলম সংলগ্ন করিয়া সেই মলম সংলগ্ন স্থান ডাইওক্সিন চূর্ণ স্পর্শ করাইলে সামান্য একটু ডাইওক্সিন চূর্ণ মলম সহ সংলগ্ন হয়। তৎপর রডেব সেই স্থান কজ্জলটাইভায় সংলগ্ন করিলে ডাইওক্সিন কজ্জলটাইভায় সংলগ্ন হইলে অল্পলী দ্বারা আক্ষ পল্লব সঞ্চালিত করিলে তাহা সমস্ত কজ্জলটাইভাব পরিব্যাপ্ত হইতে পারে। এত সাবধানে আক্ষপল্লব সঞ্চালিত করিবে যেন অভ্যস্তবে আঘাত না লাগে। নিম্নলিখিত মতে মলম প্রস্তুত করিয়া তৎসহ ডাইওক্সিন প্রয়োগ কবাহ সুবিধা।

R.

কোলারগল	৩ গ্রেণ
এটোপিন	১ গ্রেণ
ভেসেলিন	১৫০ গ্রেণ

মিশ্রিত করিয়া মলম প্রস্তুত করিবে, এই মলম সহ ডাইওক্সিন প্রয়োগ করিলে অধিক ফল হয়। কিরেটাইটিস, আইরাইটিস, এবং ট্র্যাকোমেটাস্ ভাস্কিউলাস পীড়ায় উপকারী।

অনেকে বেদনা নিবারণ জন্ত কোকেটনের পরিবর্তে ডাইওক্সিন প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন।

শতকরা ০.৫—৫ শক্তি বিশিষ্ট ত্রয় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বুক জ্বালা, অঙ্গের সর্দি, মূরিসী, খাসকাস, সার্জেটিকা, ব্রুসাইটিস, শ্বস

পীড়ায় যন্ত্রের ক্ষত ইত্যাদিতে—দ্রব, চূর্ণ বা অল্পকপে অর্দ্ধ গ্রেণ মাত্রায় দুই বাব প্রয়োগ করা যায় ।

Dr. Thumen মহাশয়েব মতে ডাঠওনিনের বেদনা নিবারক শক্তি মফিয়া এ১২ বোকেইন অপেক্ষা প্রবল, অথচ কোন মন্দ ফল হয় না ।

জননেক্রিয়েব উত্তেজনা নিবারণার্থ ডাঠও-নিন্ উৎকৃষ্ট ।

অধ্বাচিক প্রণালীতে ১২-গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করা হয় ।

ডাঠওনিন্ স্রাব হ্রাস কবে না, হৃদপিণ্ডের কার্যের বিষয় কবে না । পরে কোন মন্দ লক্ষণ উপস্থিত করে না অথচ মফিয়া অপেক্ষা অধিক বেদনা নিবারক ।

সংবাদ ।

বঙ্গীয় সিভিল হস্পিটাল এসিস্ট্যান্ট
শ্রেণীর নিয়োগ, বদলী, এবং

বিদায়াদি ।

১৯০৪ : জুন ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিস্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত জ্ঞানকীনাথ দাস ক্যাথোলিক হস্পিটালেব সুঃ ডিঃ হইতে দোলেন্দা নিউক্লাটিক এসাট-লামে কয়েকদিনেব জল্প কার্য করিতে আদেশ পাইলেন । তৎপরে মাগদহের বামবালী মেলায় কার্য করিবেন ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিস্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত সৈয়দ মনিরুদ্দীন আহম্মদ আবু ডিস্-পেনসারীর সুঃ ডিঃ হইতে ভাগলপুর মেট্রাল জেল হস্পিটালের দ্বিতীয় হস্পিটাল এসিস্টা-ন্টেব কার্যে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হইলেন ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিস্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত তোসাদক রহমান বিদায় অস্ত্র বালে-খর পিলগ্রিম হস্পিটালে সুঃ ডিঃ করিতে আদেশ পাইলেন ।

প্রথম শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিস্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত মহম্মদ নসিরুদ্দীন পুকলিয়া এমিগ্রেশন অফিসারের কার্য হইতে পুকলিয়া ডিসপেন-সারীতে সুঃ ডিঃ করিতে আদেশ পাইলেন ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিস্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত গোবাজ্জহুন্দর গোশ্বামী পুকলিয়া সংক্রামক পীড়ার হস্পিটালের কার্য সহ তথাকার ইমিগ্রেশন অফিসের কার্য করিতে আদেশ পাইলেন ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিস্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত সবসীকুমার চক্রবর্তী ঢাকা মিটফোর্ড হস্পিটালের সুঃ ডিঃ হইতে দারজিলিংএর অন্তর্গত বঙ্গার রিওংএ কলেরা ডিউটী করিতে আদেশ পাইলেন ।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিস্ট্যান্ট নিযুক্ত হইয়া ঢাকা মিটফোর্ড হস্পিটালে সুঃ ডিঃ করিতে আদেশ পাইলেন ।

শ্রীযুক্ত শঙ্কর প্রসাদ কমিলা চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিস্ট্যান্ট নিযুক্ত হইয়া

কটক জেল হস্পিটালে স্ঃ ডিঃ করিতে আদেশ পাইলেন ।

প্রথম শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত আল্লাবক্স কলিকাতা পুলিশ লক আপেব কার্য্য হইতে শ্রীযুক্ত ছোটলাট সাহেবের ভ্রমণের সঙ্গে যাইতে আদেশ পাইলেন ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র পাল মুন্সেব ডিস্‌পেনসারীর স্ঃ ডিঃ হইতে কলিকাতা পুলিশ লক আপেব অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হইলেন ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত ভগবান মহাস্তী গয়াব অন্তর্গত বকি-গঞ্জ ডিস্‌পেনসারীর অস্থায়ী কার্য্য হইতে গয়া পিলাগ্রাম হস্পিটালে স্ঃ ডিঃ করিতে আদেশ পাইলেন ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত হেমসুন্দর রায় চৌধুরী মোদনৌপুরের স্ঃ ডিঃ হইতে ইবপাণা ডিস্‌পেনসারীর কার্য্য চাই হইতে ২৬শে পর্ষ্যন্ত করিয়াছিলেন ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বে মেদিনীপুরেব অন্তর্গত নারাজল ডিস্‌পেনসারীর অস্থায়ী কার্য্য হইতে মেদিনীপুর ডিস্‌পেনসারীতে স্ঃ ডিঃ করিতে আদেশ পাইলেন ।

২৫ । শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র অধিকারী ২৪ পরগণার অন্তর্গত আলীপুর পুলিশকেন্স হস্পিটালের অস্থায়ী কার্য্য হইতে ভবানীপুর হস্পিটালে স্ঃ ডিঃ করিতে আদেশ পাইলেন ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চক্রবর্তী বিহার অন্তে

ক্যাথল হস্পিটালে স্ঃ ডিঃ করিতে আদেশ পাইলেন ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সেন বাঁকীপুর হস্পিটালেব স্ঃ ডিঃ হইতে বক্সাব সেন্ট্রাল জেল হস্পিটালেব প্রথম হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্টের কার্য্যে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হইলেন ।

প্রথম শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ মিত্র কটক জেনেবাল হস্পিটালেব স্ঃ ডিঃ হইতে ময়মনসিংহের অন্তর্গত নেত্রকোণা মহকুমাব কার্য্যে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হইলেন ।

তৃতীয় শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন হালদাব মুন্সেব ডিস্‌পেনসারীর স্ঃ ডিঃ হইতে ময়মনসিংহের অন্তর্গত আমবাড়ীয়া ডিস্‌পেনসারীর কার্য্যে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হইলেন ।

তৃতীয় শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র দত্ত ঢাকা সেন্ট্রাল জেল হস্পিটালের দ্বিতীয় হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্টেব কার্য্য হইতে ক্যাথল হস্পিটালে দুই মাসেব জন্য স্ঃ ডিঃ করিতে আদেশ পাইলেন ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসু ঢাকা সেন্ট্রাল জেল হস্পিটালেই পূর্ববৎ কার্য্য করিতে আদেশ পাইলেন ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত সরসীকুমার চক্রবর্তী দারজিলিংএর অন্তর্গত সিডকে কলেয়া ডিউটী করিতে আদেশ পাইলেন ।

প্রথম শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্য গয়াব অন্তর্গত

ফতেপুর ডিস্পেনসারীর অস্থায়ী কার্য্য হইতে গয়া পিলগ্রিম্ হস্পিটালে স্ঃ ডিঃ করিতে আদেশ পাইলেন ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঢাকা মিট-ফোর্ড হস্পিটালের স্ঃ ডিঃ হইতে দারজিলিং-এব অন্তর্গত সুখিয়াপোনোতে কলেরা ডিউটি করিতে আদেশ পাইলেন ।

২০। শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী পাবনার স্ঃ ডিঃ হইতে ফরিদপুরের ফ্লোটিং ডিস্পেনসারীর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ বসু ফরিদপুরের ফ্লোটিং ডিস্পেনসারীর কার্য্য হইতে ফরিদপুর ডিস্পেনসারীতে স্ঃ ডিঃ করিতে আদেশ পাইলেন ।

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট নিযুক্ত হইয়া ক্যাম্বেল হস্পিটালে স্ঃ ডিঃ করিতে আদেশ পাইলেন ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত হর্ষনাথ সেন ময়মনসিংহের স্ঃ ডিঃ হইতে ছমকা ডিস্পেনসারীতে স্ঃ ডিঃ করিতে আদেশ পাইলেন ।

৩৫। শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত মতিলাল মুন্সেবের অন্তর্গত গোগরা জামালপুর ডিস্পেনসারীর অস্থায়ী কার্য্য হইতে মুন্সের ডিস্পেনসারীতে স্ঃ ডিঃ করিতে আদেশ পাইলেন ।

ষষ্ঠীয় শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত জানকীনাথ দাস মালদহের অন্তর্গত

রামকালী মেগার কার্য্য হইতে মালদহ ইংলিশ বাজার ডিস্পেনসারীতে স্ঃ ডিঃ করিতে আদেশ পাইলেন ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কর্ণকার মালদহের কলেরা ডিউটি হইতে মালদহ ইংলিশ বাজার ডিস্পেনসারীতে স্ঃ ডিঃ করিতে আদেশ পাইলেন ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্র মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত জঙ্গীপুরের কলেরা ডিউটি হইতে বাবভূম হস্পিটালে স্ঃ ডিঃ করিতে আদেশ পাইলেন ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ পাল মতিহাবীর স্ঃ ডিঃ হইতে ভাগলপুরে অন্তর্গত সুপুল মহকুমায় অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হইলেন ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বায় কটক জেল হস্পিটালের স্ঃ ডিঃ হইতে কটকের অন্তর্গত জাজপুর মহকুমায় কার্য্যে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলেন ।

তৃতীয় শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র দত্ত ক্যাম্বেল হস্পিটালের স্ঃ ডিঃ হইতে ভবানীপুর শজ্জনাথ পণ্ডিতের হস্পিটালের রেসিডেন্ট হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট নিযুক্ত হইলেন ।

তৃতীয় শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত মহম্মদ লোকমান খাঁ বালেশ্বর পিলগ্রিম হস্পিটালের স্ঃ ডিঃ হইতে নদীয়ার অন্তর্গত রাণাঘাট মহকুমায় কার্য্যে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলেন ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্র বহরমপুর হস্পিটালের সূঃ ডিঃ হইতে বহরমপুর জেল হস্পিটালের কার্যে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলেন ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দে মেদিনীপুর ডিস্পেনসারীর সূঃ ডিঃ হইতে ইরপালা ডিস্পেনসারীর কার্যে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলেন ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কর্মকাব মালদহের ঠংলিশ বাজার ডিস্পেনসারীর সূঃ ডিঃ হইতে ঠংলিশ বাজার ডিস্পেনসারীর কার্যে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলেন ।

প্রথম শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত মহম্মদ নসীরুদ্দীন পুরুলিয়া ডিস্পেনসারীর সূঃ ডিঃ হইতে সারণের অন্তর্গত রিভিল-গঞ্জ ডিস্পেনসারীতে নিযুক্ত হইলেন ।

৩৫। শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত সৈয়দ বসারৎ হোসেন দাবজিলিংয়েব অন্তর্গত নক্সালবাড়ী ডিস্পেনসারীর কার্যে হইতে বিদায় আছেন । বিদায় ক্রমে গয়া পিলগ্রিম হস্পিটালে সূঃ ডিঃ করিতে আদেশ পাইলেন ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায়চৌধুরী মেদিনীপুরের অন্তর্গত ইরপালা ডিস্পেনসারীর কার্যে ৮ই হইতে ২৬শে মে পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন তাহা মঞ্জুর হইয়াছে ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ঘোষ জাজপুর P. W. D. বিভাগের কার্যে হইতে কটক জেনেরাল হস্পিটালে সূঃ ডিঃ করিতে আদেশ পাইলেন ।

৩৫। শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সবকার বাজুরার অন্তর্গত অযোধ্যা ডিস্পেনসারীর কার্যে বিগত ২০শে এপ্রিল হইতে ৬ই মে পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত সরসীকুমার চক্রবর্তী ঢাকা মিটফোর্ড হস্পিটালে বিগত ২৮ মে হইতে ১৪ই জুন পর্য্যন্ত সূঃ ডিঃ করিয়াছিলেন ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত সৈয়দ নসীরুদ্দীন আহম্মদ ৩১শে মে হইতে ১৪ই জুন পর্য্যন্ত আবা ডিস্পেনসারীতে কার্যে করিয়াছিলেন ।

সিনিয়র শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ধব হাজারীবাগ পুলিশ হস্পিটালের কার্যে হইতে গিবিডী মহকুমায় এসিষ্ট্যান্ট সার্জন্স শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের হাজারীবাগ সেশনে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্ত অনুপস্থিত সময়ে কার্যে করিতে আদেশ পাইলেন ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত হরবজ্জ দাসগুপ্ত তাঁহার নিজ কার্যে হাজারীবাগ জেল রিফর্মমেটারী স্কুলের কার্যে সহ তথাকার পুলিশ হস্পিটালের কার্যে অস্থায়ীভাবে সম্পন্ন করিতে আদেশ পাইলেন ।

বিদায় ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ (১) ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেল হস্পিটালের দ্বিতীয় হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্টের কার্যে হইতে তিন মাসের বিদায় প্রাপ্ত হইলেন ।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ (২) দাবজিলিং গ্রাম-
অন্তর্গত মিডক P W. D ডিস্‌পেনসারীর
কার্য্য হইতে বিদায় আছেন। তিনি পীড়ার
জন্ম আরো তিন মাসের বিদায় পাইলেন।

প্রথম শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিস্ট্যান্ট
শ্রীযুক্ত মনোমোহন মুখোপাধ্যায় ময়মনসিংহের
অন্তর্গত নেত্রকোণা মহকুমার কার্য্য হইতে
ছই মাসের প্রাপ্য বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিস্ট্যান্ট
শ্রীযুক্ত সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় ময়মনসিংহের
অন্তর্গত আমবাড়ীয়া ডিস্‌পেনসারীর অস্থায়ী
কার্য্য হইতে পীড়ার জন্ম ছই মাসের বিদায়
পাইলেন।

প্রথম শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিস্ট্যান্ট
শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বায় বন্ধার সেন্ট্রাল জেল
হস্পিটালের প্রথম হস্পিটাল এসিস্ট্যান্টের কার্য্য
হইতে ছই মাসের প্রাপ্য বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

সিনিয়র শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসি-
ষ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষাল ২৬শে
মার্চ হইতে ১২ই জুন পর্য্যন্ত পীড়ার জন্ম
বিদায় পাইয়া ১০ই জুন হইতে পেনসন গ্রহণ
করিতে অহুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিস্ট্যান্ট
শ্রীযুক্ত সৈয়দ নুরউদ্দীন আহম্মদ পূর্ণিয়ার হুঃ
ডিঃ হইতে পীড়ার জন্ম ১৯শে এপ্রিল হইতে
১১ই মে পর্য্যন্ত বিদায় পাইয়াছিলেন।

প্রথম শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিস্ট্যান্ট
শ্রীযুক্ত জগদ্ধনু গুপ্ত ভাগলপুরের অন্তর্গত
সুপুল মহকুমার কার্য্য হইতে এক মাসের
প্রাপ্য বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

প্রথম শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিস্ট্যান্ট
শ্রীযুক্ত কালীনাথ চক্রবর্তী কটকের অন্তর্গত
জাজপুর মহকুমার কার্য্য হইতে ছই মাসের
প্রাপ্য বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিস্ট্যান্ট
শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ দত্ত নদীয়াব অন্তর্গত রাণাঘাট
মহকুমার কার্য্য হইতে পীড়ার জন্ম চারি
মাসের বিদায় পাইলেন।

২০। শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিস্ট্যান্ট
শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ নন্দী জলপাইগুড়ী পুলিশ
হস্পিটালের কার্য্য হইতে আরো ১৫ দিবসের
প্রাপ্য বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

২০। শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিস্ট্যান্ট
শ্রীযুক্ত বিষ্ণু সহায় বহুবমপুর জেল হস্পি-
টালের কার্য্য হইতে তিন মাসের প্রাপ্য বিদায়
এবং ছয় মাসের অপর বিদায় পাইলেন।

প্রথম শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিস্ট্যান্ট
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্য গয়া পিলগ্রিম
হস্পিটালের হুঃ ডিঃ হইতে প্রাপ্য বিদায় এক
মাস বাইশ দিবস এবং অবশিষ্ট ফাল্গুন
বিদায়সহ মোট এক বৎসর এক মাসের
বিদায় পাইলেন।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিস্ট্যান্ট
শ্রীযুক্ত কালীপদ গুপ্ত মেদিনীপুরের অন্তর্গত
ইরপালা ডিস্‌পেনসারীর কার্য্য হইতে পীড়ার
জন্ম ছয় মাসের বিদায় পাইলেন।

চতুর্থ শ্রেণীর সিভিল হস্পিটাল এসিস্ট্যান্ট
শ্রীযুক্ত সরসীকুমার চক্রবর্তী ১৫ দিবসের বিনা
বেতনে বিদায় পাইয়াছিলেন, তাহা রহিত
হইল।

ভিষক-দৰ্পণ ।

চিকিৎসা-তত্ত্ব-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা ।

যুক্তিযুক্তমুণ্ডাদেয়ং বচনং বালকাদ্যপ ।

অজ্ঞং তু তুণ্যং চাজ্ঞং যাদ এখা স্বয়ং বদেৎ ॥

১৪শ খণ্ড ।

জুলাই, ১৯০৪ ।

৭ম সংখ্যা ।

তিনটি চিকিৎসা বিবরণ ।

লেখক শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য L. M. S. ।

১। ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড্ এবং
এডরেগালিন একত্রে প্রয়োগ ।

ইতিপূর্বে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বোগীব দস্তমাদী
হঠতে রক্তস্রাব রোধার্থ ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড
এর ব্যবহারের বিষয় লিখিয়াছিলাম । এবাবে
ঠিক তদবস্থ একটি রোগীর নাসিকা হঠতে
রক্তস্রাবে (Epistaxis) ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড
ব্যবহার করিয়া তদনুকূপ ফল পাইয়াছি ।
কিন্তু বিজ্ঞানবিদগণের অনুকম্পায় এডরেগালিন
(adrenalin) নামক যে নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত
হইয়াছে তাহা এ প্লীডায় প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ।
এ দুইটি ঔষধ একত্রে প্রয়োগ করিলে ফল
অত্যন্ত সম্ভোষজনক ও দীর্ঘস্থায়ী হয় । শুদ্ধ
এডরেগালিন ব্যবহারে আশু ফল পাওয়া যায়
বটে কিন্তু তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না । ক্যালসিয়ম

ক্লোরাইডের সহিত ব্যবহারে দীর্ঘস্থায়ী ফল
পাওয়া যায় । আমি বক্তৃতাভাব সময় ক্যাল-
সিয়ম ক্লোরাইডের সহিত এডরেগালিনের মিশ্র
সেবন ও লবণমিশ্রিত এডরেগালিনের
লোশনে তুলা ভিজাইয়া নাসিকারন্ধ্রে প্রস্-
তিয়া থাকি । ১২ মাত্রা ঔষদেই বন্ধ রোধ হয় ।
তৎপরে ৪৫ দিন শুদ্ধ ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড
সেবন কালে দিলেই বহুদিন আর রক্ত
পড়ে না ।

২। প্লীহার স্ফোটক ।

গত পূর্বে বৎসব পর্বনা জেলায়
অধঃপাতী দুর্গাপুর গ্রামে একটি প্লীহায়
স্ফোটক রোগাক্রান্ত রোগী পাওয়া গিয়া-
ছিল । বোগীব নাম রাজচন্দ্র ঘোষ । প্রায়
দুই মাস ধাম উদবোদ্ধ প্রদেশে বিবদ্ধিত

প্লীহাব উপর ক্ষীততা ও তৎস্থানে বেদনা অনুভব করিত। আমি বোগীব পূর্বাৱস্থা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম যে, রোগী ৫৬ মাস প্লীহা বোগে কষ্ট পাঠিতেছিল। ২ মাস হইল প্লীহাব উপর স্থানিক বেদনা অনুভব কবিতো থাকে। অনেক চিকিৎসা কবাইয়া কোন ফল না পাওয়ায় জীবনে হতাশ হইয়াছিল।

আমি দেখিলাম যে, বোগী অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ। মুখে সর্বদা একটি যন্ত্রণা ব্যঞ্জক ভাব লাগিয়াই আছে। প্লীহাব উপর ক্ষীতস্থান টিপিলে অত্যন্ত বেদনা। চলিতেও বেদনা অনুভব করে। টিপিলে তবঙ্গবৎ কম্পন (Fluctuation) অনুভব কবিতো পাবা যায়। বৈকালে ১০২°F ডিগ্রি পৰিমাণ অব আসে। আহাৰে নিতান্ত অরুচি ছিল। বোগীব পীড়া সম্বন্ধে যদিও মনে মনে ধাবণা হইল বটে তথাপি কৃতনিশ্চয় হইবাব জন্ত এরও তৈলেব দাস্ত দিবা পবদিন পুনর্বার বোগীকে দেখি। তাহাতেও অঙ্গুলী চাপে তবঙ্গবৎ কম্পন অনুভব করিয়া প্লীহাতে স্ফোটকই নির্ণয় কবি। কিন্তু প্রথমতঃ অস্ত্রেব সাহায্য না লইয়া ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা কবিতো ইচ্ছা করি। কাবণ পীড়াটা প্রাচীন ধরণের ও শোষিত হইবাব উপযোগী বোধ হইয়াছিল, কাজেই নিম্ন-লিখিত ব্যবস্থাসূচায়ী ঔষধ দেওয়াতেই ৭৮ দিন পর হইতেই উপকার বোধ হইল। এক মাস মধ্যেই সম্পূর্ণ আৱোগা হইয়াছিল।

ব্যবস্থাপত্র।

Re

ক্যালসিয়ম সাল্ফাইড ২ গ্রেণ

পটাশ আইওডাইড ৫ গ্রেণ

টিং বেলাডোনা ৫ মিনিম
মিউঃ একাগিয়া ২০ মিনিম
স্পিবিট ক্লোবোফবম ১০ মিঃ
একোয়া ১ আং
মিশ্র। দিবসে এই প্রকাব ৩ দাগ সেবা।

৩। হাইড্রোকিকেলিক সস্তানের মস্তক বিদারণ পূর্বক বহিষ্করণ—

এই সহবে একটি নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোকের মন্যাহে পদদ্বয় অগ্রে বহির্গত হইয়া একটি সস্তানের গলদেশ পর্যন্ত প্রসৃত হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত মস্তক বহির্গত না হওয়ায় আমি ও শ্রীযুক্ত গোপেশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় আহুত হই। সস্তানের গলদেশ পর্যন্ত বহির্গত হইলেও প্রসৃতির পেট স্বাভাবিক পূর্ণগর্ভা স্ত্রীলোকের পেটের স্থায় ছিল, তাহা দেখিয়া এবং সস্তানের পদদ্বয় অগ্রে বহির্গত হওয়াব কাবণ অনুসন্ধান কবিয়া হাইড্রোকিকেলিক মস্তক বলিয়াই ধাবা হয়। কিন্তু বোগিনী ক্রমাগত কয়েক ঘণ্টার কষ্টে ও বক্তৃত্রাবে অত্যন্ত দুঃখলা হওয়ায় প্রথমে অস্ত্র প্রয়োগ না করিয়া যোনিগহববে হস্ত প্রবেশ করাইয়া ক্রম মস্তক বাহিব করিতে প্রয়াস পাই। বিশেষতঃ প্রদোপেব বন্দোবস্ত কম থাকায় বিশেষ অসুবিধা বোধ হইয়াছিল। ক্রমাৱয়ে মূখ ও অক্ষিগহববে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ থাকা বশতঃ ঐ ঐ স্থানের অস্থি ভগ্ন হইয়া গেলেও মস্তক কিছুমাত্র অগ্রসর হইল না। তখন সেই অসম্পূর্ণ আলোককেই ক্লোবোফবম প্রয়োগ করিয়া (Forceps) দবপেপস প্রয়োগ করি। কিন্তু মস্তক অত্যন্ত

বৃহৎ থাকায় উক্ত যন্ত্রের লক্ Lock একত্র কৰা গেল না। তখন মস্তক বিদারণ কৰি মস্তক বহির্গত কৰা হয়। মস্তক বিদারণ কৰা হইলেও যথেষ্ট (Cerebro-spinal fluid) সেরিব্রো-স্পাইন্ডাল ফ্লুইড বহির্গত হইয়া যায়। কিন্তু তাহাতেও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মস্তকেব কোমল অংশেব এত পোথ হইয়াছিল যে বাহিব কৰিতে বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল।

সস্তান বহির্গত হইলে জ্বীলোকটীব চিত্ত বিকার বশতঃ উন্মত্ততাব লক্ষিত হইয়াছিল। তজ্জন্ত সেট বাত্রে পটাশ ব্রোমাইড ও একষ্টাষ্ট আর্গট লিকুইড ও পৰৱৰ্তী ২ দিন একষ্টাষ্ট আর্গট লিকুইড ও কুইনিন সালফ্ দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতেই জ্বীলোকটি সম্পূর্ণ আৰোগ্য হইয়াছিল।

আরও একটা ভদ্র মহিলাব হাইড্রামনিয়ম (Hydramnios ছিল)। কিন্তু প্রসবে বিলম্ব হওয়ায় আহ্বিত হইয়া উক্ত পীড়া, কি যমজ সস্তান তাহা নির্ণয় কৰিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। কাৰণ, জ্বীলোকটি চিৎ হইয়া শয়ন কৰিতে বিশেষ কষ্ট অভ্যুভব কৰিতেন। তত্পৰি জবাযুৰ সংকোচনের জন্ত

জগেব কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষ অভ্যুভব কৰিতে পাবা যায় নাই। পরিশেষে অতি কষ্টেব সহিত বহুক্ষণ পরীক্ষার পর সস্তানকে জবাযু গহ্বৰে কাত ভাবে অবস্থিত অভ্যুভব কৰা যায়। সঙ্গে সঙ্গে জবাযু মুখ শক্ত অভ্যুভব হইয়াছিল। বাহা হউক সস্তানকে একটু সৰলভাবে স্থাপিত কৰিবার চেষ্টা করা হয় ও একমাত্রা ক্লোরাল ব্রোমাইড দেওয়া হয়। তাহাতেই অতান্নকাল মধ্যেই একটা মৃত সস্তান প্রসূত হয়।

মন্তবা—এই ছুটি বোগিণীব মধ্যে পূৰ্ণোহটীব আমাৰ বিবেচনায় পীড়া নির্ণয় হইবামাত্র একবারে অস্ত্র প্রয়োগ কৰিলে বোগিণীব কষ্ট ও বত্সাব কম হইত। দ্বিতীয়টিতেও বোধ হয় পানমুচী বিদারণ কাৰণেই কষ্ট কম হইত। কিন্তু জ্বীলোকদিগেব অতিবিক্ত লজ্জালীলতার জন্ত পৃথক চিকিৎসকদিগেব আভ্যন্তরিক পরীক্ষা কৰিতে না দেওয়াইতেই এত বিভ্রাট হয়। সকল প্রসূতীবই ৮ম কিম্বা ৯ম মাসে একবার উপযুক্ত দাত্রী বা ডাক্তাব দ্বারা পরীক্ষা কৰান বিশেষ আবশ্যক।

নব্য-অস্ত্রচিকিৎসা-প্রণালী ।

লেখক ক্রীযুক্ত ডাক্তাব মুগেন্দ্রলাল মিত্র, এল, এম, এম্ ।

(পূৰ্ব প্রকাশিতের পর)

CHOLECYSTOTOMY.—ডেউনে-জের জন্ত অথবা গলষ্টোন বাহিব কৰিবার জন্ত গল ব্লাডাব উন্মুক্ত করাকে কলিসিস্টোটমী বোলে। একিউট কলিসিস্টাইটিসে,

গলব্লাডারেব হাইড্রপস্ পীড়ায়, গলষ্টোনের সহিত চারি সপ্তাহ অথবা তদুর্দ্ধকাল স্থায়ী জনডিস্ থাকিলে, হিপাটিক্ কলিকের সহিত জর থাকিলে এবং উপযুপরি কলিকের

আক্রমণ হইলে এষ্ট অপারেশন করা হয় । অপারেশনের সময় রোগীকে চিং•কবিয়া শায়িত করিবে এবং তাহার পিঠের নীচে একটা বালির বালিস রাখিয়া দিবে । দক্ষিণ লিনিয়া সেমিলুনেরিসেব উ•ব এনটি লম্বা লম্বি ইন্সিশান দিয়া পেবটোনিয়াম উন্মুক্ত করিবে । গলব্লাডার ক্ষাত থাকিলে তাহার চতুর্দিক গজ দ্বারা পূর্ণ করিবে এবং প্রথমে এসপিরেট্ করিয়া পরে গলব্লাডার উন্মুক্ত করিবে । ফবসেপস্, স্কুপ অথবা ইরিগেশানের দ্বারা গলব্লাডার পূর্ণ করিবে । কোল ডাক্টের মধ্যে স্টোন আবদ্ধ থাকিলে সঞ্চাপ দ্বারা তাহাকে গলব্লাডারে আনিতে চেষ্টা করিবে । ইহাতে অকৃতকার্য হইলে গলব্লাডারের মধ্য দিয়া কোন যন্ত্র চাপাইয়া স্টোন ভাঙিতে চেষ্টা করিবে । যদি ইহাও সম্ভাব্য না হয় তাহা হইলে ইন্সিশান দিয়া ডাক্ট্ উন্মুক্ত করিবে এবং স্টোন বাহির করিয়া ইন্সিশানটি সেলাই করিয়া দিবে । এইরূপে গলব্লাডার ও ডাক্ট্ পরিষ্কৃত হইলে গলব্লাডাবেব প্রাচীর এবডোমিনাল, ওয়ালের সহিত সেলাই করিয়া তন্মধ্যে একটা টিউব চালিত করিবে । টিউবের গায়ে কোনরূপ চিহ্ন থাকিবে না এবং ৮।১০দিনের মধ্যে তাহা বাহির করিয়া লইতে হয় । কেহ কেহ স্টোন বাহির করিবার পবেই ড্রেন না করিয়া গলব্লাডার সেলাই করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন । কিন্তু ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্টোন অথবা তাহার অংশবিশেষ গলব্লাডার অথবা ডাক্ট্ মধ্যে থাকিয়া বাইতে পারে । ড্রেনেজ ব্যবহার না করিলে ডাক্ট এবং ব্লাডারেব

গীড়াব প্রাচীর হয় না । কেহ কেহ এই অপারেশনটি দুইবারে (in two stages) সমাপ্ত করেন । প্রথমদিন গলব্লাডার বাহির করিয়া প্যাভাটটাল্ পেবটোনিয়ামেব সহিত সেলাই করিয়া দেন এবং এডিশান্ হইলে ২।৩ দিন পরে গলব্লাডার কাটিয়া ফেলেন । কলিসিস্টটমী পবে যদি ফিশচুলা থাকে তাহা প্রায়ই আপনাপনি বন্ধ হয় । তবে যদি বন্ধ না হয় এবং যদি অল্প পাবমাণে মিউকাস্ বাহির হয় তাহা হইলে সে সবল স্থলে কলিসিস্টেক্টমি করিতে হইবে । যদি ফিশচুলা হইতে অল্প অল্প বাইল নির্গত হইতে থাকে এবং কামন ডাক্ট্ বন্ধ হয় নাই বুঝা যায়, তাহা হইলে গলব্লাডারেব প্রাচীর ধীরে ধীরে প্যাভাটটালেপেবটোনিয়াম হইতে পৃথক করিয়া লেখাট সূচাব দ্বারা ফিশচুলা বন্ধ করিয়া দিবে । এবং যদি বাইল নিঃসরণেব সহিত কামনডাক্ট্ স্থায়ীরূপে বন্ধ হইয়াছে জানা যায় তাহা হইলে কলিসিস্টেন্টেরোস্টমি (Cholecystenterostomy) করিতে হয় ।

CHOLECYSTENTEROSTOMY,—এষ্ট অপারেশানে গলব্লাডারের সহিত ডুওডিনামেব এনাস্টোমোসিস্ করা হয় । সিস্টিক্ অথবা কামন ডাক্ট্ স্থায়ীরূপে বন্ধ হইলে এবং এই বন্ধের কারণ অল্প উপায়ে অপনোদিত না হইলে এই অপারেশান করা হইয়া থাকে । একটা ছোট Murphy's button দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ও সহজে এনাস্টোমোসিস্ সম্পন্ন হইয়া থাকে ।

CHOLECYSTECTOMY,—

গলব্লাডার কাটিয়া ফেলার নাম কলিসিস্ট-

টেক্টিম। গলব্লাডাবেব ফ্লেক্সমোনান্ হন্-
ফ্ল্যমেশান, গ্যাংগ্রিন অথবা অল্গাবেশান
হইলে, ক্লিনিক কলিসিস্টাইটিসে যখন গল-
ব্লাডার অত্যন্ত ছোট হইয়া যায়, এম্পাইমা
হইয়া গলব্লাডাবেব কোন কোন উত্তে এই
অপারেশান করা হয়। উপবিষ্ট পেরিটো-
নিয়াম বিভক্ত করিয়া গলব্লাডাবেব লিভার
হইতে ধীবে ধীবে ডিসেক্ট করিয়া লইবে এবং
সিসটিক ডাক্ট লিগেচাৰ্ করিয়া কষ্টন
করিবে। ট্যাম্পোর অগ্রভাগে বিস্তৃত বার্ধ-
লিক এগিড লাগাইয়া পেরিটোনিয়াম দ্বারা
আবৃত্ত করিয়া বেশম দ্বারা সেলাজ করিয়া
দিবে।

CHOLEDOCHOTOMY,—হোন
বাহির কাঁবাব জঙ্ঘ কামন্ ড্যাঙ্কে ইন্সিশান
কবাব নাম কলডোক্টোমি। এই অপারে-
শানকে কখন কখন (Choledocholithomy) বলে। বোগীর পৃষ্ঠদেশে বাঁলির
বাঁলিশ দিয়া চিৎভাবে শাস্ত্রিত করিবে।
কলিসিস্টটমী হন্সিশান অপেক্ষা একটা
বড় ইন্সিশান দিয়া এন্ডোমেন উন্মুক্ত
করিবে। পাঠিলোবাস্ এংং টেম্যাক বাঁম-
দিকে, বোণান ও ওমেন্টাম্ নীচের দিকে
এবং লিভার ও বনস্ত্রাককে উপরের দিকে
তানিয়া এটিশান্ পৃথক করিবে। তৎপরে
ফোবামন্ উতন্মলোব মদো অস্ত্রাণ চালিত




Fig. 270

Fig. 270.—Showing method of holding parts while approximating a Murphy button in colecystenterostomy.

কবিয়া ডাক্তার টানিয়া তুলিতে হইবে । লম্বালম্বিভাবে ডাক্তার উপর একটি ইন্সিশান দিয়া স্টোন বাহির করিবে ও ছিদ্রের মধ্যে একটি পোষ চাণিত কবিয়া আর স্টোন আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবে । স্টোন বাহির কবিয়া ডাক্তার ছিদ্র বাহির করিবে । প্রথমে মসৃণলাব ও সিবান্কাট লইয়া

এক পোষার সুতার প্রয়োগ করিবে, তৎপরে আর এক পোষার স্কেল অথবা হল্টেডের সূচাব প্রয়োগ করিবে । হল্টেডের হামার ব্যবহার করিলে সূচাব প্রয়োগে অনেক সুবিধা হয় । এবটি ড্রেনেজ টিউব লাগাইয়া সেলাইয়ের উপর এবৎখণ্ড আয়োডোফর্ম গুজ রাখিবে, এবং তাহাব একপ্রান্ত উত্তর




Fig. 271

Fig 271.—Suture of duct over hammer

বাহিরে রাখিয়া দিবে । যদি ডাক্তার ছিদ্র সেলাই করা অসম্ভব হয় তাহা হইলে ছিদ্রের মধ্যে একটি গ্লাস টিউব চালিত কবিয়া তাহাব চাবিদিকে আয়োডোফর্ম গুজ পূর্ণ করিয়া রাখিবে ।

SPLENECTOMY,—স্প্লিনের কোন প্রকার উত্ত অথবা বাপ্চার হইলে, স্প্লিনে সিট্ হইলে, ফ্লেটিং স্প্লিনে এবং যদি স্প্লিনে হাইপার্ট্রফি হয় অথচ তাহা লিউকিমিয়া সংক্রান্ত না হয় তাহা হইলে এই

অপারেশান করিতে হয় । লিউকিমিয়া থাকিলে এই অপারেশান একেবারে নিষিদ্ধ । এই অপারেশান করিতে হইলে ইলিয়ামের এন্টিবিয়ার সুপারবিয়ার স্পাইন্ হটতে রিব পর্যন্ত একটি ইন্সিশান কবিয়া পেরিটোনিয়াম উন্মুক্ত করিবে । এডিশানগুলি দুইটি লিগেচার মধ্যে কর্তন করিবে । প্যানক্রিয়াসের সহিত স্প্লিন মিলিত থাকিলে প্যানক্রিয়াসের কিয়দংশ বাহির করিয়া লওয়া আবশ্যিক । সাস্পেন্সারি লিগামেন্ট বাহির

কবিয়া কর্তন করিবে ও স্প্লিনটী উত্তেব বাহিবে আনিয়া তাহার চাবিদিকে গজ বেটন করিবে। পেডিকেলটী টান্স ফিল্ম কবিয়া মোটা বেশম দ্বারা বন্ধন কবিয়া কর্তন কবিতে হইবে। তৎপবে প্রত্যেক ভেসেল পৃথক-ভাবে সিক দ্বারা বন্ধন কবিবে ও ড্রেনেজ না বাধিয়া উত্ত বন্ধ কবিয়া দিবে। যদি চেমা-বেজেব কোন ভয় থাকে তাহা হইলে গেডিকেলটী উত্তেব মুখে বাধিয়া পোড় কবিবে। স্প্লিন বাহিব কবিবার দুই সপ্তাহ পবে বয়স্কদিগেব শবীবে বর্তকণ্ডাল পরিবর্তন লক্ষিত হয়। কিন্তু শিশুদেব তাহা দেখা যায় না। লিম্ফ গ্র্যান সফলৈব আঘতন বৃদ্ধি, অস্থিতে বেদনা, শবীবেব হ্রসতা, চর্মলতা, পিপাসাব বৃদ্ধি, বহুমূত্র (polyuria) পেট বেদনা, উতাপ বৃদ্ধি ও নাড়িব উদ্বেজন প্রভৃতি লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। কোন প্রকার উত্ত অথবা বাপ্চাবেব জ্ঞা স্পেনেক্টমী কবিবার পব এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু স্প্লিনেব বোনকণ পোড়াব জ্ঞা এই অপাবেশান কবিলে উপ-রোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় না। স্প্লিন যে সময় পীড়িত থাকে সেই সময়ে অত্যন্ত যন্ত্র দ্বারা উহার কার্য সম্পন্ন হইতে থাকে বলিয়াই পীড়িত স্প্লিন বাহিব কবিয়া ফেলিলে ঐ সকল লক্ষণ দেখা যায় না। স্পেনেক্টমী পব এক্সট্রাক্ট অব স্প্লিন এবং বোনম্যাবে ট্যাবলয়েড ব্যবহার করিলে ঐ সকল লক্ষণ হ্রাস পায়।

ABDOMINAL HERNIA OR RUPTURE—এন্ডোমিথাল ক্যাভিটীর মধ্য হইতে কোন ভিন্‌কাম্ বাহির হইয়া

পাড়বে তাহাকে এন্ডোমিথাল হাবনিয়া কহে। কিন্তু কোন উত্তেব মধ্য দিয়া কোন যন্ত্র বাহিব হইয়া পড়িলে তাহা হাবনিয়া নামে অভিহিত হইবে না। তিনটী বিভিন্ন অংশে হাবনিয়া গঠিত হইয়া থাকে। (১) sac (২) sac contents বা জ্বাক মধ্যস্থ যন্ত্র এবং (৩) sac coverings বা জ্বাক আচ্ছাদন।

(১) Sac—পেরিটোনিয়াম দ্বারা পঙ্কত হয়, ইহা কন্‌জেনিটাল বা একোয়ার্ড হইতে পাবে। বিবর্ধন বিকৃতি (development defect) হইতে কন্‌জেনিটাল জ্বাক উৎপন্ন হয়, এবং টঙ্কটঙ্কাল ও আন্‌সেলাচক্যাল বিজনেট এই প্রকার জ্বাক লক্ষিত হয়। এন্ডোমেন মনো কোন প্রকার সঞ্চাপ বশতঃ ইন্‌টাবিক্যাল এন্ডোমিথাল বিংশেব নিকটস্থ পেরিটোনিয়াম পাট্টাচব আকারে পবিবর্তিত হইয়া একোয়ার্ডম্ জ্বাক উৎপন্ন হয়। জ্বাক তিন ভাগে বিভক্ত। ইহার প্রথম অংশকে মাউথ, দ্বিতীয় অংশকে নেক এবং তৃতীয় অংশকে বডি বলে। জ্বাক অনেক সময়ে চতুর্দিকস্থ অস্থাত টিস্তব সতিত মিলিত থাকে। সেইজ্ঞা জ্বাক মধ্যস্থ পদার্থ বিডিউসিবল্ হইলেও জ্বাক রিডিউস্ কবা যায় না। (২) ইলিয়ামেব কোন অংশ প্রায়ই জ্বাকেব মধ্য অবস্থিত থাকে, তবে সময়ে সময়ে কোলন, ষ্টম্যাক, গ্রেট ওমেন্টাম্, ব্লাডাব অথবা জ্ঞা কোন যন্ত্র জ্বাক মধ্যে প্রাষ্ট হইতে পাবে। যখন জ্বাক মধ্যে কেবল ইন্‌টেস্টাইন্ থাকে তখন তাহাকে enterocele কহে। ওমেনটাম থাকিলে cpiptocoele এবং ইন্‌টেস্টাইন ও ওমেনটাম্ উভয়ই বিদ্যমান থাকিলে entero-

epeplocele কহে, cystocele বলিলে ব্লাডারের কোন অংশ বাহ্য হইয়া আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। (৩) স্থানবিশেষে স্রাকের আবরণ সকলের প্রভেদ হইয়া থাকে। পুৰাতন হার্নিয়াতে ভিন্ন ভিন্ন স্তরগুলি একরূপ ভাবে জড়িত থাকে যে, তাহা-দিগকে পৃথক করা যায় না।

CAUSES OF HERNIA—

পুরুষেবই এই রোগ অধিক লক্ষিত হয়। উভা সকল বয়সেই হইতে পারে। এবং সময়ে সময়ে ইহা বংশানুক্রমিক হইতেও দেখা যায়। লম্বায়তন মেসেন্ট্রি ও ইহার অত্যন্ত মারণ। কঠিন পৰিশ্রম, অধিকদিনস্থায়ী কোনরূপ পীড়ায় এন্ডোমিট্রাল মাসেল সকল নিস্তেজ হইলে, গর্ভাবস্থার পৰ অথবা এন্ডোমেনে কোন প্রকার উত্ত হইলে হার্নিয়া হইতে পারে। কাসি, কোন গুরুভার ত্রা উত্তোলন চেষ্টা, প্রস্রাবের সময় অধিক বেগদান প্রভৃতি কাৰণ সকল এক্সাইটিং কক্ষপে পৰিগণিত হয়। চিকিৎসার সুবিধার জন্ত (clinically) হাবনিয়া সকলকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) রিডিউসিবল (২) ই-রিডিউসিবল (৩) ইন্কাজেরেটেড (৪) ইন্ফেমড (৫) ট্রাঙ্ক-লেটেড।

REDUCIBLE HERNIA.—

এই প্রকার হাবনিয়াতে স্রাক মধ্যস্থ যন্ত্রটি এন্ডোমেনের ভিতর পুনঃপ্রবিষ্ট কবান যাটতে পারে। এন্ডোমেনের কোন একটা ছিদ্রের নিকট একটি টিউমার সদৃশ ক্ষীতি প্রকাশ পায়। এই ক্ষীতি ক্রমশঃ বর্ধিত হয় এবং এই বর্ধন উপর হইতে নীচেব দিকে যাটতে

থাকে। এন্টারোসিল্ হইলে বেগদানে, ভাব উত্তোলনে অথবা বেশীক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিলে উহাৰ আকাৰ বর্ধিত হয় এবং শুইয়া থাকিলে তাহা কম বা একেবাবে অদৃশ্য হইয়া যায়। কাসিলে এই ক্ষীতিব মধ্যে এক প্রকার বেগ (Impulse) অনুভূত হয়। এই ক্ষীতি ইলাস্টিক অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক। এবং তাহা ভিতরে পুনঃপ্রবিষ্ট কবাটবাব চেষ্টা কবিলে অদৃশ্য হইয়া যায়। কিন্তু সেই সময় একটা গার্মিং শব্দ উথিত হয়। এপিপ্লো-সিলে ক্ষীতি অসমান, সঞ্চাপা (অথচ তত ইলাস্টিক নহে) হয়। ভাব উত্তোলন প্রভৃতি কঠিন কাণো এই ক্ষীতিব আকৃতি বর্ধিত হয় না। কাসিলে ইহাতে আত সামান্য ইম্পাল্স উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং পার্শ্বাশান করিলে dull শব্দ উথিত হয়, ও বিডক্শান কাণে বোন গার্মিং শব্দ শুনা যায় না। এন্টারো এপিপ্লোসিলে উভয় প্রকার লক্ষণই প্রকাশিত হয়। তাহাৰ এক অংশ ইলাস্টিক ও টিমপ্যানিটিক এবং অপর অংশ dull, অসমান ও ফ্লাবি হইয়া থাকে। সেইজন্ত এই প্রকার হাবনিয়াৰ প্রকৃত অবস্থা জানা যায় না। reducible হাবনিয়াৰ প্রথমাবস্থায় বোগী তলপেটে এক প্রকার বেদনা বোধ কবে, এবং সাধারণতঃ ভিন্-পেপ্টিয়া ও ক্রণিক কন্ঠিপেশানে কষ্ট পায়। ইঙ্গুইন্তাল হাবনিয়া এক্সটার্নাল রিংয়ের বাহিবে আসিবাব পূৰ্বেই রোগ নিৰূপণ কবা যাইতে পারে। এক্সটার্নাল রিংয়ে অঙ্গুলি চালাইয়া রোগীকে কাসিতে বলিলে হাবনিয়ার ইম্পাল্স পাওয়া যায়। সাধারণতঃ স্রুষ্ক-বস্থায় এক্সটার্নাল রিংয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ

অঙ্গুলির অগ্রভাগ প্রবিষ্ট হইতে পারে কিন্তু তন্মধ্যে যদি তর্জ্জনী অঙ্গুলি প্রবিষ্ট হয় তাহা হইলে বিণ্টী বড় হইয়াছে বুঝিতে হইবে এবং যদি হাবনিয়ার ইম্‌গালস্ তৎকালে অনুভূত না হয় তবুও ভবিষ্যতে হইবাব আশঙ্কা থাকে।

TREATMENT OF REDUCIBLE HERNIA *Palliative Treatment.*—কোষ্ঠবদ্ধতা দূর্য্য কবিবে,

ইচ্ছাং কোন প্রকার বেগ বা উৎকট পরিশ্রম নিবারণ করিবে এবং ট্রাস ব্যবহারের উপদেশ দিবে। অল্পবয়স্ক বোগী বহুদিন পর্য্যন্ত ট্রাস ব্যবহারে আরোগ্য হইতে পারে। অতিবিস্তৃত স্থলকায় ব্যক্তিদিগেব উপযুক্ত ট্রাস বাঁড়িয়া দেওয়া কঠিন। ইঞ্জুইন্‌জাল অপেক্ষা ফিমোব্যাল হাবনিয়া রিডিউস্ কবিয়া বাখা কঠিন। যে সকল হাবনিয়ার ইন্‌টেস্টাইন পুনঃ প্রবিষ্ট কবান হইয়াছে, অথচ ওমেন্টামেব একটা অংশ বহিরা গিয়াছে সেই সকল স্থলে ইন্‌টেস্টাইনটী রিডিউস্ কবিয়া বাখা অসম্ভব এবং ট্রাস ব্যবহারে কোন ফল হয় না, অপারেশানই যুক্তি সম্মত। ওংলিক ইঞ্জুইন্‌জাল হাবনিয়াতে এক্সটার্‌জাল বিংয়েব উপর এবং ফিমোব্যাল হাবনিয়াতে গিগ্‌ব-জাটস লিগামেন্টের সমতলে ফিমোব্যাল রিংয়েব উপর ট্রাস স্থাপিত করা উচিত। ট্রাসেব চতু মাপ লইতে হইলে হাবনিয়ার ছিজের নিম্ন অংশ হইতে একটা ফিতা মাপিতে আরম্ভ কবিয়া সেই দিকেব এন্‌টিবয়ার জুপিয়ার ইলিয়াস্ স্পাইন পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে পরে তখা হইতে ইলিয়াস্ ক্রেন্টের


১ চিহ্ন নীচে দিয়া কোমর বেটন কবিয়া অল্প দিনেব এন্‌টিয়ার জুপিবিয়াব ইলিয়াস্ স্পাইন পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া তখা হইতে পুনরায় হাবনিয়াব ছিজের উর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে। প্রথম প্রথম ট্রাস ব্যবহারে অসুবিধা ঘটিলেও পরে বেশ ব্যবহার কবা যায়। ট্রাস্‌টী সর্বদা পরিষ্কার রাখিতে হইবে এবং প্রত্যহ ট্রাস ব্যবহারেব পূর্বে কতকটা পাউডার ছড়াইয়া দিবে। ট্রাস ব্যবহারে যদি বেদনা হয় অথবা হাবনিয়া রিডিউস্ অবস্থায় না থাকে তাহা হইলে উপকার না হইয়া অপকার হইবাবই সম্ভাবনা। ট্রাসেব স্প্রিং কসা হইলে হাবনিয়ার ছিজটী বর্দ্ধিত হয় এবং বোগ বাড়িয়া যায়। বোগ সম্পূর্ণরূপে আবেগ্য হইবার পর্ব বহুদিন পর্য্যন্ত ট্রাস ব্যবহার কবা উচিত।

ব্যাডিকেল ট্রিটমেন্ট দ্বারা স্নাকের মুখ বন্ধ অথবা যে পথে হাবনিয়া নাগিয়া আইসে সেই পথ বন্ধ কবা যায়। ট্রান্সলেটেড্ হাবনিয়াতে অপারেশানেব পর, যে সকল রিডিউসেবল্ হাবনিয়াতে ট্রাস ব্যবহারে বেদনা হয়, অথবা ইন্‌টেস্টাইন সম্পূর্ণরূপে রিডিউসেবল্ অবস্থায় থাকে না, অধিকাংশ ইরিডিউসেবল্ হাবনিয়াতে এবং যে সকল হাবনিয়াতে মধ্যে মধ্যে অবস্‌টাকশান্ হয় সেই সকল স্থলে ব্যাডিকেল ট্রিটমেন্ট যুক্তিসিদ্ধ। ব্যাডিকেল ট্রিটমেন্ট নানা উপায়ে হইয়া থাকে তন্মধ্যে নিম্নহস্ত লিখিত প্রসিদ্ধ। (১ম)

MACEWEN'S OPERATION FOR INGUINAL HERNIA.—

এই অপারেশানে নিম্নলিখিত অঙ্গগুলি

প্রয়োজন হয়। ফাল্‌পল, একটা মোজা
স্থলাগ বিষ্টা, একটা ডিবেক্টর, এবং টা হার
নিয়া ডিবেক্টর, কাঁচি, হারনিয়া নিডিল,
ডিসেক্টিং ফবসেপস্, টিমস্ টেটিক্ ফবসেপস্,
এনিউবিজম্ নিডিল, ব্লাণ্ট ছক, অর্ধবক্র



Fig

Fig. 272.—A hernia-needle; B.
hinged hernia director

কয়েকটা ছুঁচ, নিডিল হোলডার এবং
কতকটা ক্রোমিসাইজড্ ক্যাটগাট্। বোণী

চিং হইয়া শুঠিয়া থাকিবে। তাঁহার উদ্দেশ
কথঞ্চিৎ ফ্লেস্ক ও এরডাক্ট অবস্থায় বালিসের
উপর রাখিয়া দিবে। হারনিয়া মধ্যস্থ ইন্-
টেস্টাইন এডোমেন মধ্যে পুনঃপ্রবিষ্ট
বরাইয়া ইঙ্কুইজাল কেনালের উপর একটা
তিন ইঞ্চ লম্বা ইন্‌সিশান দিবে। এই ইন্-
সিশানের মধ্যবিন্দু টিক এন্ড টারজাল বিংয়েব
উপর স্থাপিত হওয়া উচিত। একটা অঙ্গুলি
ইঙ্কুইজাল কেনালের মধ্যে চালিত করিয়া
ম্যাক্‌টীবে কড্ ০ চতুর্দিকস্থ অত্যাশ্চ টিস্স
হইতে পৃথক করিবে। তৎপরে অঙ্গুলী
ইন্‌সিশাল বিংয়েব মধ্যে চালাইয়া বিংয়েব
চতুর্দিকস্থ পেরিটোনিয়ামটা এডোমিনাল
প্রায় হইতে এক ইঞ্চ আন্দাজ পৃথক
করিবে। একটা ক্রমিসাইজড্ ক্যাটগাটেব




Fig 273.

Fig. 273 —Macewen's operation for radical cure of inguinal hernia ;
A, stripping of the sac ; B, purse-string suture ; C, fastening the purse-
string suture , D, passing, and E, tying, the suture for the internal ring.

মধ্যে ছুঁচ পরাইয়া এক প্রান্তে একটি গ্রিড দিবে। এবং সেই ছুঁচটী আকেব উপর দিয়া কয়েকবার একপাশে চালিত করিবে যেন ক্যাটগাটটী টানিলেট সমুদয় আকটী কুঞ্চিত হইয়া যায়। তাহার পর এই কুঞ্চিত আকটী ইন্টারভ্যাল বিয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া পেনিটোনিয়াম এন্ডোমিট্রাল ওয়ালের মধ্যে একপাশে স্থাপিত করিবে যেন বিয়ের মুণ্ডটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। তখন ক্যাটগাটটী বিয়ের ১ ইঞ্চি উপরে একটি ছিঁচ কবিতা বাহির করিবে ও যে পর্য্যন্ত না কেনাল সেলাই করা হয় সেই পর্য্যন্ত ক্যাটগাটটী একজন সহকারীকে ধরিয়া রাখিতে বলিবে। এইবার একটা ম্যাকুয়ান্ নিডিল একটা ক্যাটগাট, কন্জয়েন্টেন্ডন্ ও পুশার্টস্ লিগামেন্ট এবং ইন্টারভ্যাল রিংয়ের বহির্দেশ দিয়া চালিত



Fig.

Fig 274. —Macewen's operation for the radical cure of congenital hernia.

করিয়া তিনটি একত্রে বন্ধন করিবে। ইহাতে ইন্টারভ্যাল রিং বন্ধ হইয়া যাইবে। তখন

সহকারী বহু ক্যাটগাটটী একটাবজাল ওবলিক মাস্‌নের মধ্যে কয়েকবার চালিত করিয়া গ্রিডযুক্ত প্রান্তেব সহিত বন্ধন করিবে। তাহার পর একটাবজাল রিং ও স্কিন্টেন্সিশান যথাক্রমে সেলাই করিয়া দিবে। কন্জিনে-টাল হার্নিয়াকে আকটী মাঝামাঝি কাটিয়া নিয়াং ক্যাটগাট দ্বারা বন্ধন করিয়া টিউনিকা ভেজাইনেলিন্ প্রস্তুত করিবে। এবং আকেব উল্কাংশটি চিবিয়া কড় বাহির করিয়া লইবে ও পুরোক্ত প্রকারে অপাবেশান করিবে। ম্যাকুয়ানের অপাবেশানের পর রোগীকে ৪ সপ্তাহ পর্য্যন্ত বিছানায় শায়িত রাখিবে এবং ৮ সপ্তাহ পর্য্যন্ত বাজকর্ম করিতে দিবে না। শ্রমজীবীগণের জন্য অপাবেশানের পর কিছু দিন পর্য্যন্ত প্যাড ও স্পাইকা ব্যাণ্ডেজের বন্দোবস্ত করা উচিত, কিন্তু শিশুদিগের জন্য কিছুই করিবে না। এই অপাবেশানের পর টান্ ব্যবহার যুক্তিসিদ্ধ নহে।

BASSINI'S AND HALSTED'S OPERATION FOR INGUINAL HERNIA —

ব্যাগিনিব অপাবেশানে স্পার্মেটিক্ কড পুর্বাতন কেনাল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া একটা নুতন কেনালে স্থাপিত করা হয়। ইহাতে ম্যাকুয়ানের নিডিল ব্যতীত পুরোক্ত সমুদয় অস্ত্রগুলি আবশ্যক হয়। একটাবজাল রিং হইতে আবস্ত করিয়া ইন্টারভ্যাল বিয়ের বহির্দেশ পর্য্যন্ত একটা ইন্সিশান করিতে হয়। আক্ পৃথক করিয়া তাহার নেক্‌বন্ধন করিবে ও বন্ধনের সম্মুখে কাটিয়া ফেলিবে। কড পৃথক করিয়া সরাইয়া রাখিবে এবং তাহার পর রেফ্টাসের প্রান্তভাগ ইন্টারভ্যাল

ওবলিক এবং ট্রান্সভারসালিসেব কিনারা কডের নীচে পুপার্টস লিগামেন্টের নিম্নস্তরেব সহিত সেলাই কবিয়া দিবে। তাহার পর এক্সটার্নাল ওবলিকেব প্রাপ্ত পুপার্টস লিগামেন্টের উর্দ্ধস্তরের সহিত সেলাই কবিতে হইবে। হল্টেডেব অপাবেশানে এক্সটার্নাল ওবলিক ও ইন্টারন্যাল ওবলিকেব নিম্নপ্রাপ্ত বিভক্ত কবিতে হয়। ইহাতে ইন্টারন্যাল রিংয়ের উপরে শ্রাক উন্মুক্ত কবিয়া কাটিতে হয় এবং ল্যাপারটমৌব ন্যায় পেবটোনিষামেব কর্তিত অংশ সূচার দ্বাৰা মিলাইয়া দিতে হয়। তাহার পর কড এক্সটার্নাল ওবলিক ও



Fig 275

Fig 275 A C.—Bassini's operation for the cure of inguinal hernia.

ন্ধিনের মধ্যে রাখিয়া কডের নিম্নস্থ ষ্ট্রাক্চাব-গুলি মাটির সূচার দ্বাৰা সেলাই কবা হইয়া থাকে। হল্টেড, স্থিন ইন্সিশান সাবকিউ-টিকিউলার সূচাব দ্বাৰা বন্ধ করেন।

KOCHER'S OPERATION.--

কবাব এক্সটার্নাল ওবলিকেব এপিনিউবো-সিন্ বাহিব করিয়া ইন্টারন্যাল রিংয়ের ও বহির্দিকে ঐ এপিনিউরোসিসে ছিঙ্গ কবিয়া সেট ছিঙ্গেব মধ্য দিয়া শ্রাক বাহিব কবেন। এবং সেই স্থানে শ্রাকটী সেলাই কবিয়া দেন।

FOWLER'S OPERATION.—

পিউবিসেবম্পাইন হইতে ইন্টারন্যাল রিং পর্যন্ত পুপার্টস লিগামেন্টের সহিত সমান্তবালে একটী ইন্সিশান কবিবে। এবং ইহাব দ্বাৰা যে ফ্ল্যাপ উৎপন্ন হইবে তাহা উল্টাইয়া রাখিবে, ইহাব পব ইন্সুইজাল কেনাল উন্মুক্ত কবিয়া শ্রাক ও কড পৃথক করিবে। শ্রাক উন্মুক্ত কবিয়া তাহার মধ্যস্থ contents এন্ডোমেন মধ্যে প্রবিষ্ট কবাষ্টয়া কাটিয়া ফেলিবে ও কর্তিত প্রাপ্তটী দবসেপন্ দ্বাৰা ধবিয়া রাখিবে। ডিপ্ এপিগ্যাস্ট্রিক্ অর্টারি এবং ভেনে দুইটী লিগেচাব বন্ধন করিয়া বর্তন কবিবে। তাহার পর পেটেব মধ্যে একটী অঙ্গুলি চালিত কবিয়া কেনালের সমুদয় ফ্লোরী (transversalis fascia, subserous tissue and Peritoneum) বিভক্ত বরিবে। কডটী পেবটোনিষাল ক্যাভিটীব মধ্যে জ্ঞস্ত কবিয়া ছিঙ্গ বন্ধ কবিবে। কড ইন্সিশানেব নিম্ন প্রাপ্তে বাহিব হইয়া আসে। তাহার ইন্সুইজাল কেনাল, এপিউরোসিসেব ছিঙ্গ এবং স্থিন যথাক্রমে সেলাই করিয়া দিবে। সর্বপ্রকাব রাডিকেল ট্রিটমেন্টেই বোগীকে ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত বিছানায় রাখিকে হয়।

RADICAL CURE OF UM

BILICAL HERNIA,—হাবনিয়াব চারিদিকে স্কিনে একটি ইলিন্টি ক্যাল ইন্সি শান করিয়া আঁটীকে অত্যাচ্চ টিঙ্ক হইতে পৃথক কবিয়াব চেষ্টা কবিবে। যদি পৃথক কবা অসম্ভব হয় তাহা হইলে আঁক্ উন্মুক্ত করিয়া ইন্টেস্টাইনটী এন্ডোমেন মধ্যে প্রসিষ্ট কবা। ইবে। ওমেনটাম থাকিলে পৃথক পৃথক অংশে বন্ধন কবিয়া কাটিয়া ফেলিবে ও ষ্ট্যাম্পটী এন্ডোমেন মধ্যে ঢুকাইয়া দিবে। কখন কখন ইন্টেস্টাইনেব একটি অংশ ওমেনটামেব মধ্যে জড়িত থাকিতে পাবে তাহা গ্রবণ বাখা কর্তব্য। আন্ডোমেন্টাম্ কাটিয়া ফেলিবে ও ক্যাটপাট্ দ্বাৰা পেব্রিটোনিয়াম, সেলাইট করিয়া দিবে। চই লেয়ার ইন্টারপটেড্ সূচার দ্বাৰা মাসল ও ফেসিয়াগুলি সেলাই কবিবে এবং তাহাব পব সার্বকিউটিকিউলাব ষ্টিচ্চ দ্বাৰা স্কিন ইন্সিশান বন্ধ কবিবে।

RADICAL CURE OF

FEMORAL HERNIA.—Cheyne নেকেব উপব আঁকটীকে বন্ধন কবেন ও ষ্ট্যাম্পটী এন্ডোমিন্তাল ওয়ালের সহিত সেলাই কবিয়া দেন। তাহাব পেক্টিনিয়াম্ মাসেল হইতে একটি ফ্ল্যাপ তুলিয়া পুপার্টন্স লিগামেন্ট ও এন্ডোমিন্তাল ওয়ালের সহিত সেট ফ্ল্যাপ সেলাই কবিয়া জুবাল কেনাল বন্ধ কবেন। Bassini প্রথমত পুপার্টন্স লিগামেন্টেব সহিত সমাস্ত-বাবো একটি ইন্সিশানেব পব আঁকেব নেক্ বন্ধ কবিয়া সেট বন্ধনীব নীচে আঁকটী কাটিয়া ফেলা হয় ও ষ্ট্যাম্পটী এন্ডোমেন মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। তাহার পব কয়েকটী ডিপ্ সূচাব দ্বাৰা পুপার্টন্স লিগামেন্টকে পেক্টিনিয়াল ফাসিয়াব সহিত সংযুক্ত কবা হয়। ফাসিয়া-লাটা পিউবিক ও ইলিয়াক অংশ সূপাবফিসিয়াল সূচারেব দ্বাৰা সংযোজিত কবা হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

আইবাইটিস।

নির্ণয় এবং চিকিৎসা।

লেখক শ্রীযুক্ত ডাক্তার গিব্বাচন্ড বাগচী।

চক্ষের অনেক পীড়া সাধারণ চিকিৎসকেব চিকিৎসাধীন। যেমন বঞ্জকটাইটাইটিস, আইরাইটিস্, কিবেটাইটিস্ প্রভৃতি। আবাব চক্ষের অনেক পীড়া সাধাবণ চিকিৎসকেব আয়ত্তাধীন নহে, যেমন ক্যাটারাক্ট। সাধাবণ চিকিৎসকেব আয়ত্তাধীন পীড়া সমূহ চক্ষুর লক্ষণ অংশের বাহ্যন্তর সমূহে সীমাবদ্ধ, কিন্তু বিবেচ্য চিকিৎসকগণ বাহ্য এবং অভ্যন্তর

উভয় শ্রেণীর গঠন সমূহেব চিকিৎসা কবিয়া থাকেন। সাধারণ চিকিৎসকগণেব আয়ত্তা-ধীন পীড়া সমূহ আমবা অধিক আলোচনা কবিয়া থাকি। তজ্জন্ত আইরাইটিস সম্বন্ধে এস্থলে কয়েকটী কথা উল্লেখ করিতেছি।

আইবাইটিস পীড়া পৃথক ভাবে মূল পীড়া-রূপে প্রকাশ পাইতে পারে। আবার অল্প পীড়াব উপসর্গ রূপেও প্রকাশ পাইতে পাবে

—কঙ্কটাইভা, স্কেবাটিক, কর্ণিয়া, বেটিনা, এবং কোরটেডেব পীডাব সহিত আটরাইটিস উপস্থিত হইতে পারে। চক্ষের সমস্ত পীডাব সহিত তুলনা করিলে শতকরা ২।৪ জনেব আটরাইটিস পীড়া স্বতন্ত্র ভাবে উপস্থিত হয়। এই পীড়া দ্বীলোক অপেক্ষা পূর্ববর্তে অধিক হয়। সকল বয়সে এই পীড়া হইলেও মধ্য বয়সেব পূর্বে অধিক হইতে দেখা যায়।

শৈত্যাতি সংলগ্নে পীড়া প্রকাশ হইলেও মূল কারণ দেহে ব্যাপক ভাবে অবস্থান করে। আঘাত আদি ক্ষত ও আটরাইটিস হইতে দেখা যায়। চক্ষের বিচ্ছিন্ন ক্ষত ও এবং চিকিৎসালয়ে অস্ত্রোপচার সময়ে আটরাইটিস হওয়া সম্বন্ধে সকলেই অবগত আছেন।

সাধারণ আটরাইটিস পীড়ায় সচরাচর নিম্নলিখিত লক্ষণ সমূহ বর্তমান থাকে—
বোগী বলে যে, সে যখন আলোকেব প্রতি দৃষ্টি কবে তখন চক্ষু টুন্টন কবে এবং চক্ষু হইতে জল নির্গত হয়। চক্ষে যেন ভাল দেখিতে পায় না। চক্ষেব মধ্যে এক প্রকার যন্ত্রণা হয়। শিরঃপীড়া হয়। ক্ষুধা হয় না। জ্বর বোধ হয়। শব্দেব ভাল বোধ হয় না। এতৎসহ নাড়ীবে গতি দ্রুত এবং জিহ্বা অপরিষ্কার থাকিতে পাবে, কোষ্ঠি পরিষ্কার হয় না, প্রস্রাবেব পরিমাণ অল্প এবং অধিক বর্ণ বিশিষ্ট হইতে পারে। চক্ষে স্নায়বীয় প্রকৃতির বেদনা থাকিলেও বোগী শিরঃপীড়ায় যত কষ্ট বোধ করে, চক্ষের বেদনায় তত কষ্ট বোধ কবে না। কপালেব বেদনা গাল এবং নাসিকাব পার্শ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই বেদনা দিবা অপেক্ষা রজনীতে অধিক কষ্ট-

দায়ক হয়। বেদনা পর্যায়ক্রমে হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে—অনেক স্থলে এক নির্দিষ্ট সময়ে বেদনা উপস্থিত হয়। বোগী নিদ্রাভিভূত থাকিলে বেদনাব জ্ঞান নিদ্রাংশ হয়।

চক্ষেব মধ্যে প্রথমে কর্ণিয়ার পার্শ্ব দিয়া ত্রি মায়ায় ঈষৎ লালের আভা যুক্ত পাটল বর্ণ লক্ষিত হয়। ইহার অল্প পবেই প্রদাহেব লক্ষণ প্রকাশিত হয়—কঙ্কটাইভা ক্ষত ও লালবর্ণ ইত্যাদি স্কেবাটিক আর দেখা যায় না, আটরাইটিসেব উজ্জ্বল নষ্ট হয়, অভ্যন্তরেব অবস্থা অদৃশ্য হইয়া পড়ে। কনৌনিকা সমভাবে সঙ্কচিত না হইয়া অসমান ভাবে সঙ্কচিত হয়, আলোকে তাহা আব সঞ্চালিত হয় না। এট্রোপিণ প্রয়োগ কবিলে যদিও তাহা প্রসারিত হয় সত্য কিন্তু সমান গোল ভাবে প্রসারিত হয় না। তখন কনৌনিকার কিনারা স্পষ্ট চসমান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রদাহেব স্রাবের জন্ত লেন্সেব ক্যাপসুলেব সহিত হাইবিস দৃঢ় আবদ্ধ হওয়াব জন্তই তাহা প্রসারিত হইতে পারে না। ইহাই পোস্তি-বিয়াব সাইনিকসা। অসমান ভাবে প্রসারিত কনৌনিকা অপথ্যালমোস্কোপ দ্বারা পরীক্ষা করিলে লেন্সেব ক্যাপসুলে বর্ণযুক্ত বিন্দু বিন্দু দাগ দেখা যায়, ঐ সমস্ত দাগের স্থানে প্রদাহযুক্ত আটরাইটিস আবদ্ধ থাকে, প্রবল কনৌনিকা প্রসারক ঔষধেব ক্রিয়ার ফলে সামান্য আবদ্ধতা বিযুক্ত হইয়া যায়, কিন্তু দৃঢ় আবদ্ধাবস্থা সহজে বিযুক্ত হয় না। অল্প হটক বা অধিক হটক সৌত্রিক বিধানযুক্ত স্রাব হয়। একোয়াস অপরিষ্কার হয়। ক্রোন স্থলে কর্ণিয়ার পশ্চাতে বিন্দু বিন্দু স্রাব সঞ্চিত হয়। প্রবল প্রদাহ হইলে বিশেষতঃ প্রদাহ

যদি আঘাত ক্ষুদ্র হয় তবে সম্মুখ চেদ্যে পুণ্য-যুক্ত আব সঞ্চিত হয়। ইহাট হাইপোপিয়ন (Hypopyon) আইরাইটিস নামে উক্ত হয়।

আইরাইটিসেব সাধারণ প্রাণন লক্ষণ বেদনা, আলোক অসহ্যতা, অশ্রুস্রাব, দৃষ্টি শক্তির হ্রাস, কর্ণিয়ার পাশ্বে বর্ণ পরিবর্তন আইবিসেব বর্ণ পরিবর্তন, একোয়াসেব অপরিষ্কার, কনৌনিকার অসমভাবে সঞ্চিত। এবং দৈহিক ব্যাপক অসুস্থতা। আইবিসেব শোণিত বহাব প্রবল রক্তাদিকা এবং তজ্জ্ঞ সৌত্রিক বিধান সমন্বিত আব হওয়া ফলেই ঐ সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়। উক্ত আবট পীড়িত বৈধানিক পরিবর্তনের মূল কারণ। এবং ঐ আবেব প্রকৃতিব উপবই পীড়াব নানা প্রকাব পরিবর্তন নির্ভব কবে। সামান্য একটু আব হইলে তাহা আইবিসে আবট এবং সহজে শোষিত হইয়া যাউতে পাবে। অধিক হইলে তাহা সম্মুখ চেদ্যে আসিয়া কনৌনিকায় লিপ্ত এবং সংযোগ বিধানে পরিবর্তিত হইয়া লেন্সের ব্যাপস্থল এবং আইবিসের দৃঢ় সংযোগ সাধন করিতে পাবে। প্রবল তবণ পীড়ায় অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়।

সামান্য প্রকৃতিব পীড়া চারি কি ছয় সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য হইতে পাবে, কিন্তু উপসর্গ সমন্বিত হইলে বহুকাল চিকিৎসা না করিলে পীড়া আরোগ্য হয় না।

যে সমস্ত উপসর্গ উপস্থিত হয় তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার উপযুক্ত।

টান (Tension) বৃদ্ধি হইয়া একটা

বিশেষ উপসর্গ। সাধারণ তবণ আইরাই-টিসেব পীড়ায় টেনশন বৃদ্ধি নাও হইতে পাবে। কিন্তু কখন কখন অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। বোগীর নয়স অধিক হইলে, গাউট ধাতু প্রকৃতি হইলে, কিম্বা কোবটড এবং সিলেয়াবো বড় প্রবল প্রদাহগ্রস্ত হইলে টেনশন বৃদ্ধি হয়। এতৎসহ প্রবল বেদনা থাকে। এনোপিন প্রয়োগ ফলে এই বেদনাব উপশম না হইয়া বৎ বৃদ্ধি হয়। এই উপসর্গ যুক্ত আইরাইটিস পীড়াব নাম কেহ কেহ মোকোমেটাস আইরাইটিস বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন কিন্তু তাহা অত্যন্ত অজ্ঞায়। কারণ, এই উভয় পীড়া—আইরাইটিস এবং মোকোমা পবম্পব সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট। একেব যে চিকিৎসায় উপকার হয়, অপবেব সেই চিকিৎসায় পোগেব বৃদ্ধি হয়। তজ্জ্ঞ এই উভয় পীড়ার নাম কখন একত্র সম্মিলিত হওয়া উচিত নহে। ভুল হইলে তাহাতে বিলক্ষণ অনিষ্ট হওয়াব সম্ভাবনা। বোগ নির্ণয়ে ভ্রম হইলে মোকোমা পীড়ায় আইরাইটিসেব চিকিৎসা করিলে চক্ষু নষ্ট হওয়ারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তবে এই একটা বিশেষ সুবিধা যে কনৌনিকাব আয়তন ও আকার এবং সম্মুখ চেদ্যেব গভীরতাব প্রতি দৃষ্টি করিলে অতি সহজে আইরাইটিস এবং মোকোমা পীড়াব পার্থক্য নিরূপিত হইতে পাবে। যদি কনৌনিকা সঙ্কুচিত এবং তাহার কিনারা অসমান হয় এবং চেদ্যের স্বাভাবিক কিম্বা গভীর হয় তবে সেই পীড়া আইরাইটিস এবং অপর পক্ষে কনৌনিকা যদি প্রসারিত হয় এবং একোয়াস চেদ্যের অগভীর হয় তাহা হইলে টেনশনেব

বৃদ্ধি কখন যে গ্লোকেমা পীড়া তাহা সহজেই হিব হইতে পারে ।

আইবিস এবং সিলিয়ারী বড়ী ব সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ । ইহাদিগের সম্মিলন দ্বারা সন্মুখের uvcal tract গঠিত হয় । উক্তয়ের শোণিতবহা এক, একেব কোন কখনে প্রদাহ হইলে অপবে তাহা পবিচালিত হয় । আইবাইটিস হইলে সাইক্লাইটিস হওয়া খুব সম্ভব । আইবাইটিসেব প্রথমে প্রদাহ হইলে উভয়েব গঠন সম্মিলন জন্ম সিলিয়ারী বড়ীতে তাহা পরিব্যাপ্ত হয় । আইবাইটিস হইলে চক্ষুর আভ্যন্তরিক সঞ্চাপ বৃদ্ধিই প্রথমে সাইক্লাইটিস হওয়া জ্ঞাপন করে । এতৎ সহ দর্শনশক্তি ব হ্রাস এবং সিলিয়ারী স্থানে সঞ্চাপে অত্যধিক টনটনানী উপস্থিত হয় । অপর পক্ষে সটানতা নিযত হ্রাস হইলে বুঝিতে হইবে—ইউভিয়াল ট্যাক্টেব পশ্চাদগ্ন বিশেষরূপে আক্রান্ত হইয়াছে । ইহাব ফলে অক্ষিগোলকের পোষণ ক্রিয়া বিন্ন হওয়ায় তাহা বসিয়া যাইতে পারে ।

আইবাইটিস হইলেই, সামান্য হউক কিম্বা অধিক হউক স্রাব হয় । ইহার ফলে আইবিসের সহিত লেন্সেব ক্যাপসুল আবদ্ধ হয় । স্রব্যাং কনীনিকাব স্বাভাবিক ক্রিয়া বদ্ধ হয় । আবদ্ধাবস্থায় এত দৃঢ় এবং সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে যে, তাহার ফলে একিউয়াল চেম্বারেব পশ্চাতে এবং সন্মুখের বিভাগে তরল পদার্থ চলাচল বদ্ধ হইয়া যাইতে পারে । এইরূপ অবস্থায় কনীনিকার স্থান স্রাবে পরিপূর্ণ হয় । লেন্সের গায়ে এত অধিক স্রাব সঞ্চিত হইতে পারে যে,

তাহা ক্যাটাবাক্টেব অনুরূপ হয় । ঐ সকল অবস্থায় সাইক্লাইটিস হইয়া গোণ ভাবে গ্লোকেমাব লক্ষণ প্রকাশ পায় । একোয়াল চেম্বারেব পশ্চাতেব অংশের সঞ্চাপে আইবিস সন্মুখ-অংশে বহিরমুখ হইয়া আইসে, সন্মুখ চেম্বারেব মধ্যাংশ ব্যতীত অপব সমস্ত অংশেব গভীরতা হ্রাস হয় । এইরূপ অবস্থা হইলে আইবিসের গঠন ক্ষয় এবং বর্ণ পবিবর্তন হয়, সৌত্রিক-স্তর অত্যন্ত পাতলা হয়, শোণিত বহাব অপকর্ষতা উপস্থিত হওয়ায় অভ্যন্তরে শোণিত স্রাব হইতে পারে । পবিশেষে ক্রমে ক্রমে অক্ষি-গোলকেব পবিশেষণেব বিন্ন হওয়ায় ক্যাটা-বাক্ট হয় । সটানতা হ্রাস হয়, রেটিনা বিমুক্ত হয়, শেষে অক্ষিগোলক ক্ষয় হইতে থাকে ।

আইবিসে তিন প্রকাব প্রদাহ হইতে দেখা যায়—সিবস্ প্লাস্টিক এবং পুকেলেন্ট । স্রাবেব প্রকৃতি অনুযায়ী এই শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে । ইহা পীড়িত বৈদ্যানিক পরি-বর্তনেব ক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন অবস্থার নাম মাত্র । একটা হইতে অপবর্তী উৎপত্তি । বিভিন্নতা সামান্য মাত্র ।

সিবস প্রদাহেব সহিত সর্কজই সিলিয়ারী বড়ীর প্রদাহ বর্তমান থাকে, একোয়াল চেম্বারেব মধ্যে অপবিকাব স্রাব সঞ্চিত হয়, সটানতা বৃদ্ধি হয়, সন্মুখ চেম্বারেব গভীরতা অধিক হয় এবং প্লাস্টিক আইরাইটিসে আই-রিস লেন্সের ক্যাপসুলের সহিত যত দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ হয় ইহাতে তত আবদ্ধ হয় না । এই শ্রেণীর পীড়ার আবদ্ধপ্রবণতা অল্প জন্ম কনীনিকা অসম্পূর্ণ ভাবে প্রসারিত থাকে । প্লাস্টিক প্রকৃতির জন্ম তত অধিক হয় না ।

প্লাষ্টিক আইরাইটিস হইলে আইরিশের স্ফিত লেম্বেব ক্যাপসুল দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয় এবং কনোনিকা আবদ্ধ হয়। প্লাষ্টিক প্রকৃতির পীড়ায় আবদ্ধ প্রবলণা অত্যন্ত অধিক। আইরিশের উপর বা মিলিয়াবী বড়ীতে স্রাব সংলগ্ন হয়। বিন্দু আঘাত এবং পুণ্যবৃত্ত ক্রিবেটাইসের সহিত পুণ্যলেন্ট আইরাইটিস হইতে দেখা যায়। ক্ষতযুক্ত এণ্ডোথ্র্যাউটিস বিউমেটিক জ্বর, নিউমোনিয়া, স্নায়ুবেজা এবং এণ্ডোমিট্রাইটিস প্রভৃতি পীড়ার উপসর্গরূপেও পুণ্যলেন্ট আইরাইটিস হইয়া থাকে। এই সমস্তের কোন একটিকে এথো-লিজম বা সেক্টিক থ্রাম্বস হইলেও পুণ্যলেন্ট হওয়ায় চক্ষু নষ্ট হয়।

স্রাবের পীড়িত বৈধানিক প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণী বিভাগ অপেক্ষা পীড়ার উৎপত্তির কাবণ অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ কাবণে অনেক বিষয় সুবিধা হয়। তবে এই এক আপাত হইতে পারে যে, অনেক সময়ে তাহা স্থির করা সহজ হয় না। কিন্তু আমরা বার্ষ্য ক্ষেত্রে দেখিতে পাইয়া থাকি—এক এক প্রকৃতির পীড়ার গতি, পরিণাম এবং চিকিৎসার ফল অপর প্রকৃতির পীড়া হইতে স্বতন্ত্র। যেমন—

সিফিলিটিক আইরাইটিস—
ইইলে ইউভিল ট্রাউ অধিক আক্রান্ত হয়। ঈহাব প্রবলত্বের একটু বিশেষত্ব আছে। গৌণ উপদংশের লক্ষণ সামান্য থাকিলেও হৃদয় হৃদয় শোণিত বহা বিশেষ ভাবে আক্রান্ত হইতে পারে। আইরাইটিসের কারণ সমূহের মধ্যে সিকিলিস একটা প্রধান কাবণ মধ্যে পরিগণিত। এই কারণ জন্তই অধিক

সংখ্যক আইরাইটিস হইয়া থাকে। কিন্তু আইরাইটিস পীড়ার প্রথম অবস্থায় তাহা উপদংশ জাত কিনা, চক্ষু দেখিয়া তাহা স্থির করা অত্যন্ত কঠিন। তবে পীড়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে তখন উপদংশজ আইরাইটিসের নির্দিষ্ট লক্ষণ দৃষ্ট তাহা নিশ্চিত স্থির করা বঠিন হয় না—বিশেষ বিশেষ লক্ষণ সমূহ উপস্থিত হইলেহেতু সন্দেহ দূরীভূত হইতে পারে। আইরাইটিসের সহিত গণ্যাব মধ্যে ক্ষত এবং ত্বকে উপদংশজ কণ্ডু বর্তমান থাকিলে বোগ নির্ণয় করা সহজ হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে ঐ সমস্ত লক্ষণ বর্তমান থাকে না। উপদংশের ইতিবৃত্ত অবগত হওয়া যায় না, সেই সকল স্থলে উপদংশ পীড়ার সহিত অপব কাবণ সম্বন্ধ পীড়ার পার্থক্য নিরূপণ অত্যন্ত কঠিন। তবে যে চক্ষু চিকিৎসক উপদংশজ আইরাইটিস বোগী বিস্তর দেখিয়াছেন, তিনি চক্ষু দেখিয়াই অনুমান করিতে পারেন যে, তাহা উপদংশজ কিনা। উপদংশজ আইরাইটিসের বিশেষ লক্ষণ একোষাসেব ঘোলাটে প্রকৃতি, কর্ণিয়ার পশ্চাৎদেশে ধূসবর্ণ দাগ, ভিট্রিযসেব অস্বচ্ছতা, কর্ণিয়ার প্রান্তের প্রদাহজ অপবিস্তার লাগবর্ণের তুলনায় বেদনাব আধিক্য, বজ্রনীতে বেদনার আধিক্য, কনোনিকার কিনারার গমেটোজেনিত বিন্দু বিন্দু পদার্থ সঞ্চয়—এই নডিউল ছোট বড় হইতে পারে এবং এটোপিন দ্বারা কনোনিকা প্রসারিত না করিলে দেখা না যাইতে পারে। লেম্বেব ক্যাপসুলের সম্মুখ ভাগে আইরিস আবদ্ধ থাকে, সেই আবদ্ধতা এটোপিন দ্বারা বিযুক্ত করিয়া দিলে বিন্দু বিন্দু গমেটোস নডিউল দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা আবস্ত কবিলে এট নডিউগ সমূহ
অল্প সময় মধ্যে অন্তঃস্থ হয়, কোন বিশেষ উপ-
সর্গ না থাকিলে প্রদাহ আবেগা হয় এবং
দৃষ্টিব দোষ সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়। তবে গমা
বড় হইয়া থাকিলে আইবিস হ্রাস হইয়া যায়।
উপদংশ জন্ম আইবাইটিস হইলে তাহা উভয়
চক্ষেই হইয়া থাকে। প্রথমে একটা, তার
পর অপবটা আক্রান্ত হওয়া সাধারণ
নিয়ম। তবে উভয় চক্ষু এক সময়েও
আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে। অপব প্রকৃতিব
আইবাইটিস হইলে সাধারণতঃ এই ভাবে
আক্রান্ত হয় না। পুনঃ পুনঃ উপস্থিত
হওয়া উপদংশজ আইবাইটিসেব সাধারণ
প্রকৃতি নহে, তবে উপদংশজ আইবাইটিস
হইলে কোবইড এবং বেটিনাব প্রদাহ হওয়াব
সম্ভাবনা থাকে।

গমা পশ্চাদিকে বর্দ্ধিত হইয়া সিলিয়াবী
স্থান অধিকার করিলে পবিণাম ফল বডভাল
হয় না। প্রবল বেদনা এবং আলোক অসহ্যতা
নিয়ত যন্ত্রণা প্রদান করে। এই পীড়া
প্রবণ হইলে চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। অতি
সাবধানে পচন নিবারক এবং উপদংশ নাশক
চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিলেও পীড়া-
ক্রমেই প্রবল ভাব ধারণ কবিতো থাকে। কদি-
য়ার পার্শ্বে স্থানে স্থানে স্কেলোবোটিকে প্রদাহ
হয়, তাহার উপরের কঙ্কটাইভায় বিকৃত লাল-
বর্ণের দাগ হয়, সেই স্থলে স্ফাপদিলে অত্যন্ত
টনটন কবে। ইহাব পরে কর্ণিয়ার স্বচ্ছতা
নষ্ট হইয়া সম্মুখে বহিরুন্মুখ অবস্থায় আঠসে।
এই সময় প্রবল লক্ষণ সমূহ হ্রাস হয়, পূর্বের
প্রদাহ ফলে স্কেলোরোটিক অত্যন্ত পাতলা হয়।
পরিশেষে চক্ষু ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়।

কৌলিক উপদংশ জন্মই যে উপদংশজ
আইবাইটিস হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই।
তবে অনেক সময়ে ঐ কারণে হইতে দেখা
যায়। হচিনসানেব মতে পাঁচ ছয় মাস
বয়সেব শিশুর কৌলিক উপদংশ জন্ম আই-
বাইটিস হইতে দেখা যায় কিন্তু ইহা অতি
বিবল। উক্ত কারণে জন্ম অধিক বয়সেও
হইতে পারে। এই সময়ে আইট্রডোসাইক্লাই-
টিস এবং ইণ্টারষ্টেসিয়াল কিরেটাইটিস সহ
উপস্থিত হয়।

রিউমেটিক এবং গাউটি আই-
বাইটিস।—রিউমেটিক জ্বরের সহিত
এণ্ডোকাডাইটিস হইলে এক প্রকার প্রবল
আইবাইটিস হয়, তাহাতে অল্প সময় মধ্যে
চক্ষু নষ্ট হইতে পাবে। কিন্তু ইহা অতি
বিবল। বয়স্কদিগেব রিউমেটিজমেব চিহ্নবৃত্তি
থাকিলে আইবাইটিস হইতে পারে। পবিপাক
যন্ত্রেব বিশুদ্ধতা, গিথিয়েসিস, অক্সেলুবিয়া
প্রভৃতি কাবণ জন্ম এই প্রকৃতিব আইবাইটিস
হইতে পাবে। যাহাদেব কখন রিউমেটিজম
হয় নাই কিন্তু শৈত্য এবং অর্জিতা সহ
করিতে পাবে না তাহাদেবও এই প্রকৃতির
পীড়া হইতে পারে। বসন্তকালের আরম্ভ এবং
শবৎকালের অন্ত রিউমেটিক আইবাইটিস
আরম্ভ হওয়ায় সময়। উভয় চক্ষুই আক্রান্ত হয়,
তবে এক সময়ে দুইটা আক্রান্ত হয় না। প্রবল
বেদনা, পাটলের আভ্যন্তর লালবর্ণ, অত্যধিক
অশ্রু স্রাব এবং আলোক অসহ্যতা প্রভৃতি
বিশেষ লক্ষণ বর্তমান থাকে। অপর প্রকৃ-
তির প্রদাহের ভ্রায় প্রদাহজ স্রাব অধিক হয়
না এবং আইরিসের বিবর্ণত্ব তত অধিক হয়
না। চক্ষের কোণে এবং পাতার ধার

ফেণা সাক্ষত হয়। কনোনিকা ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া স্ফুট্যগ্রবৎ হয়। লেন্সের ক্যাপসুলের সহিত আইরিসের আবদ্ধ হওয়াব জন্মই যে এইরূপ হয় তাহা উল্লেখ করা হইল। গাউট জন্ম চক্ষের আভ্যন্তরিক সঞ্চাপ বৃদ্ধি হয়। সম্মুখ চেঁষাবে শোণিত স্রাব হইতে পারে। ইহাব বিশেষ প্রকৃতি এই যে ইহা পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হয়। একবার আবোগ্যা হইয়া আবার অল্প সময় পর পুনর্বার উপস্থিত হয়। এই জন্ম ইহাব অপব নাম রেকারেন্ট আইরাইটিস। নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ প্রকৃতির আইরাইটিস এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(ক) এক প্রকৃতির পুণাতন ভাবাপন্ন আইরাইটিস পীড়া দেখা যায়, তাহাতে চক্ষু বেদনা কিম্বা লালবর্ণ থাকে না, কিন্তু দুটি

শক্তি ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে সেইরূপ বোগীব চক্ষু পরীক্ষা করিলে লেন্সক্যাপসুলের সহিত আইরিস আবদ্ধ (পোষ্টেরিয়র সাইনে-কিয়া) দেখা যায়, আইরিসের বেটিনার অংশ প্রদাহ হওয়াব জন্ম এইরূপ সন্দেহা সম্ভব।

(খ) এক বিশেষ প্রকৃতির আইরিস প্রদাহে অল্প সময় মধ্যে চক্ষু নষ্ট হয়। কোলিক গাউট পীড়াক্রান্ত যুবা পুরুষের এই শ্রেণীর পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। ক্রমে ক্রমে সমস্ত ইউভিগলটাই আক্রান্ত হয়। ভিট্রুয়স মধ্যে ভাসমান পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। লেন্স ক্যাটালাক্টাস হয়। পরম্পরিত ভাবে ম্লোকোমা হওয়ায় দৃষ্টি শক্তিব হ্রাস হয়।

(গ) গণোবিয়ার জন্ম সন্ধি প্রদাহ হইলে গণোবিয়ার আইরাইটিস হয়। কিন্তু ইহা অতি বিরল। ক্রমশঃ।

বিবিধ তত্ত্ব।

সম্পাদকীয় সংগ্রহ।

এডরেনালিনের ক্রিয়া ও আম-
য়িক প্রয়োগ সংগ্রহ।

এডরেনালিন—ম্লোকোমা।

(Medical Press)

ম্লোকোমা পীড়ার উৎপত্তি কারণ স্থলে কথিত হয় যে, চক্ষু মধ্যস্থিত স্রাবের অবরোধ অথবা ঐ স্রাবের পরিমাণ অধিক হওয়া। বর্তমান সময়ের অনেক চিকিৎসক প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী। তবে ম্লোকোমা পীড়ার উৎপত্তির শোণিত সন্ধিত হওয়া যে

একটি কাবণ রূপে কার্য করে তাহার কোন সন্দেহ নাই। আইরিডেক্টমী এবং কনোনিকা সঙ্কোচক ঔষধ প্রয়োগই ইহার চিকিৎসা। এই ঔষধ প্রয়োগে কনোনিকা সঙ্কুচিত কবিয়া কার্য করে। এই কার্য না হইলে ঔষধে কোন উপকারই হয় না।

ডাক্তার গ্র্যাণ্ড ক্রেমেন্ট মহাশয় একটা বোগীব বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। এই বোগীর বয়স ত্রিশ বৎসর। সামান্য ম্লোকোমা পীড়া হইয়াছিল। ১—৫০০০ শক্তি বিশিষ্ট এড-

বিণালিন দ্রব অর্ধ ঘণ্টা পূর্ব পর তিন দিবস প্রয়োগ করায় তাহাব ঐ পীড়া আবেগ্য হইয়াছিল ।

পর্বীক্ষার জন্ত নিম্ন শ্রেণীব জন্তব চক্ষু মধ্যে সুপ্রারিণাল দ্রব প্রয়োগ করায় একোয়াস হিউমাবও সঞ্চিত হওয়া হ্রাস হয় স্তব্যাং তজ্জন্ত চক্ষু অবভাস্তবিক সঞ্চাপ হ্রাস হয় । ইহা দেখা হইয়াছে ।

ডাক্তাব অবন্ত মহাশয় বলেন—চুই চক্ষুব মোকোমা পীড়ায় এডরিণালিন দ্রব প্রয়োগ করায় বেদনা হ্রাস এবং কনীনিকা সঞ্চিত হইতে দেখা গিয়াছে । কিন্তু পূর্ব আঠাব ডেক্টমী করিতে হইয়াছে । স্তব্যাং এডরিণালিনেরএট শোণিতবহাব সঞ্চেচন ক্রিয়াব কার্য স্থায়ী না হইলে চক্ষু চিকিৎসকগণ ইহার আদব করিবেন কিনা, সন্দেহ । যে স্থলে আইবিডেক্টমী কবিলে পীড়া আবেগ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেস্থলে অল্প কাল স্থায়ী উপকার লাভেব আশাষ এট ঔষদ প্রয়োগ করিয়া সময় নষ্ট কবা কখন সংপবামর্শ সিদ্ধ নহে ।

ফল কথা এই—এডরিণালিনেব এই ক্রিয়া সম্বন্ধে আরো পর্বীক্ষা না হইলে কোন স্থব সিদ্ধান্ত হইতে পারে না ।

—০—

এডরিণালিন—সুস্থ এবং পীড়িত
দেহের উপর ক্রিয়া ।

(Scottish Medical and Surgical
Journal)

ডাক্তার Mamlock মহাশয় বহু পরিশ্রম
করন্তঃ এডরিণালিন সম্বন্ধে বিস্তার তথ্যাহু-

সন্ধান করিয়া একটা প্রবন্ধা থিয়াছেন । ঐ প্রবন্ধের স্থূল মর্ম্ম ঙ্গটিশ মেডিকেল এবং সার্জিকেল জর্ণালে প্রকাশিত হইয়াছে । আমবা তাহাব স্থূল মর্ম্ম এস্থলে সংগ্রহ কবলাম ।

সুস্থ দেহের উপর কার্য । এক এক শ্রেণীব জীব দেহে এক একরূপ ক্রিয়া প্রকাশ কবে । অতি অল্প মাত্রায় কুকুবেব বা শববেব শরাবে অধস্তাচক প্রণালীতে প্রয়োগ কবিলে মূত্রেব সহিত শর্কবা—মধুমূত্রেব লক্ষণ প্রকাশ পায় । প্যানক্রিয়াসের পীড়ায় এট শ্রেণীব মধুমূত্র পীড়া উপা্ত্ত হয় । কেবল মাত্র অধস্তাচক প্রণালীতে বিধা শিবা মধ্যে প্রয়োগ কবিলেই কেবল এট শ্রেণীব ডায়াবিটিশ পীড়া উপা্ত্ত হয়, নতুবা মুখপথে প্রয়োগ কবিলে কখন ডায়াবিটিশ পীড়া উপা্ত্ত হয় না । আশ্চর্যেব বিষয় এই যে, জবেব লক্ষণ প্রকাশ পাটগেট মূত্রে আব শর্কবা থাকে না । এতৎসম্বন্ধে এই একটা বিশেষ পর্বীক্ষা কবা হইয়াছে—কুকুবেব প্যানাক্রিয়াস উন্মুক্ত কবিয়া তটপবি লাটবব এডরিণালিন লেপন কবিয়া দিলে এক ঘণ্টাব মধ্যে মূত্রেব সহিত যত অধিক পরিমাণ শর্কবা নির্গত হয় । শিবা মধ্যে এডরিণালিন দ্রব প্রয়োগ করিলে তত অধিক পরিমাণে শর্কবা নির্গত হয় না । পেরিটোনিয়ম মধ্যে পিচকাবী কবিয়া প্রয়োগ কবিলেও ডায়াবিটিসের লক্ষণ প্রকাশ পায় । এডরিণালিন শোণিতবহাব সঞ্চেচন করিয়া শোণিত সঞ্চালনেব বিঘ্ন উপা্ত্ত করে । প্যানক্রিয়াসের উপর প্রয়োগ করিলে তাহার শোণিত সঞ্চালনের বিঘ্ন উপা্ত্ত হওয়ায় ডায়াবিটিসেব লক্ষণ উপা্ত্ত হয় । সুপ্রাবি

গাল গ্রন্থব অভ্যন্তরিক স্রাব শর্কবান্দনঃ-
ণেব উপব কার্য্য কবে। এডবিগালিনেব
স্রাব হ্রাস কবাব ক্রিয়ার জন্ত শর্কবান্দন অল্প
ডেশন হওয়ার বিঘ্ন হয়।

শোণিত সঞ্চালনেব উপর এডবিগালিনেব
কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান কবা
হইয়াছে। প্রান্তভাগেব আকৃষ্টন হওয়ায়
শোণিতবহাব উপব কার্য্য হয়।

প্রয়োগ কবাব প্রণালী অনুসারে এডবি
গালিনের বিভিন্নরূপে কার্য্য হয়—শিবা মনো
প্রয়োগ কবিলে নাড়ীব গতি মন্দ হয়। অব-
স্থাতিক প্রণালীতে প্রয়োগ কবিলে স্বাস
পন্থাস কার্য্য দ্রুত ভাবে হইতে থাকে।
পেবটোনিয়ম মধ্যে প্রয়োগ কবিলে অত্যন্ত
অবসাদ, বমন এবং অল্প হইতে শোণিত
স্রাব হইতে থাকে। শিবা মনো প্রয়োগ
ফলে অশ্রু, লালা, পিত্ত স্রাব অধিক হয়
এবং পাকস্থলী, মলদ্বার ও মুত্রাশয়েব
স্ফিঙ্টার পেশীব পক্ষাঘাত হয়। জ্বায়ু ও
ভেদিকিউলী সেমিনেলিস সম্বন্ধিত এবং
কনানিকা প্রসাবিত হয়। স্রাবক কোষেব
এবং মস্তক পেশী স্ফীত প্রান্ত ভাগেব
সাক্ষাৎ উত্তেজনার ফলে এই সমস্ত কার্য্য
হওয়াট সম্ভব।

মুখ পথে কোন বিষ প্রয়োগ কবার পর
যদি পেবটোনিয়ম মধ্যে এডবিগালিন দ্রব
পিচকাবী দ্বারা প্রয়োগ কবা যায় তাহা হইলে
উক্ত বিষেব ক্রিয়া প্রকাশিত হইলে বিলম্ব হয়।

জীবদেহের উপর ইহাব অপব কার্য্য সমূহ
পাঠক মহাশয়দিগেব তৃপ্তিকর হইবে না
বিবেচনা করিয়া আময়িক প্রয়োগ উল্লেখ
করিতেছি।

আময়িক প্রয়োগ। অনবস্থা প্রণা-
লী—পাকস্থলীর এবং অন্ত্রেব যে কোন স্থান
হইতে শোণিত স্রাব হইক না কেন, তাহা
বন্ধ কবাব জন্ত এডবিগালিন দ্রব (১—১০০০)
বিভিন্ন মাত্রায় প্রয়োজিত হয়। অবস্থা বিশেষে
মাত্রাব কম বেশী—ডার্মিনম মাত্রায় প্রত্যহ
চাববাব হইতে ৩০ মিনিম মাত্রায় তিন ঘণ্টা
পর পর প্রয়োগ কবা হইয়া থাকে। পবস্ত
অবস্থাতিক প্রণালীতে ১ c. cm মাত্রায় দুই
ঘণ্টা পর পর এবং মল দ্বাবে প্রয়োগ কবি-
য়াও সফল হইতে দেখা গিয়াছে।

মুখ পথে প্রয়োগ কবিয়া কখন মধু মুত্রব
লক্ষণ কিস্থা শোণিত সঞ্চাপ বৃদ্ধ হইতে দেখা
যায় নাহ।

এডবিগালিন প্রয়োগ কবিয়া পাকস্থলীব
প্রাচীরেব পৈশাশক দুর্বলতা নষ্ট হইতে দেখা
গিয়াছে। ইহা একটা বিশেষ কার্য্য। টিমে-
টেমোসমে যেরূপ কার্য্য করে, হিমপটাই-
নিগেও সেইরূপ কার্য্য কবে—শোণিত স্রাব
বোধার্গে অবস্থাতিক প্রণালীতে, ফুগুস মধ্যে
এবং ট্রেকিয়াতে প্রয়োগ কবিয়া সফল হই-
য়াছে। ট্রেকিয়াতে প্রয়োগ কবায় কোন
বিশেষ সফল হইতে দেখা যায় নাহ অর্থাৎ
ফুগুস মধ্যে প্রয়োগ কবিলে বেকপ ফল হয়
ট্রেকিয়া মধ্যে প্রয়োগ কবিলেও সেইরূপ ফল
হয়। বক্ত বমন পীড়ায় যে মাত্রায় প্রয়োগ
কবা হয় বক্তোৎকাস পীড়াতেও সেই মাত্রাব
প্রয়োগ করা হয়।

স্বাসকাস পীড়ায় এক এক সময়ে বিশেষ
সফল হয়। সাধাবণ প্রান্ত প্রণালীতে, নাসি-
কার শৈল্পিক ঝিল্লিতে দ্রব রূপে অথবা
ভেসেনিল ও ল্যানোলিন সহ মলম

রূপে প্রয়োগ করিয়া সুফল হইতে দেখা গিয়াছে ।

নাসিকা এবং স্বব যন্ত্রের পীড়ায় এডবিগালিন যথেষ্ট প্রয়োজিত হইয়াছে । নাসিকা মধ্যে নানা উদ্দেশ্যে—পীড়িত স্থানের বক্তাবোগ হ্রাস করার জন্য, সেই স্থান অসাড় করার জন্য, প্রদাহ ও ক্ষীত শ্লেষ্মিক বিধান সম্বূচিত কবিতা তৎস্থানের অবস্থা উত্তমরূপে পরিদর্শন জন্য এডবিগালিন প্রয়োগ করা হয় । ইহা কোকেনের সহিত মিশ্রিত কবিতা প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায় । কোন নির্দিষ্ট স্থানে অধিকক্ষণ এডবিগালিনের ক্রিয়া রক্ষা কবিতা ইচ্ছা করিলে এডবিগালিন দ্রব তুলী দ্বারা প্রয়োগ করা অপেক্ষায় এক ভাগ এডবিগালিন এবং ৫০০ ভাগ ভেসেলিন এবং ৫০০ ভাগ ল্যানোলিন মিশ্রিত কবিতা প্রয়োগ করিলে এইরূপ প্রয়োগের ফল অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় । এডিমিগ্লেটাইডিম পীড়ায় দ্রবের প্রলেপ উপকারী । নাসিকা হইতে দুঃসাধ্য শোণিত স্রাব হইতে থাকিলে এডবিগালিন দ্রবে তুলী মিশ্রিত কবিতা তাহা নাসিকা গহ্বর মধ্যে প্রয়োগ কবিলে সুফল হয় । এতৎসহ ২০ মিনিম মাত্রায় দুই ঘণ্টা পর পর পান করান উচিত ।

কোন কোন চিকিৎসক বলেন—এডবিগালিন দ্রব নাসিকা মধ্যে প্রয়োগ করায় ফলে ত্বকে আমবাত বহির্গত হইয়াছে, এবং কাহারো মতে পুনর্বার শোণিত স্রাব হইয়াছে ।

চক্ষু চিকিৎসকগণ চক্ষের প্রদাহ, ক্ষীণতা এবং অস্ত্রোপচারের পব শোণিত স্রাব নিবারণ জন্য এডবিগালিন প্রয়োগ

কবিতা থাকেন । অনেক চিকিৎসক কোকেন সহ এবং কেহ বা সানাইট অফ জিঙ্ক সহ প্রয়োগ করেন । চক্ষের প্রয়োগ জন্য ১—১০০০ দ্রব উগ্র বলিয়া বিবেচনা করা হয় । সাধারণতঃ ১—১০০০ বিদ্যা ১—১০০০০ শক্তি বিশিষ্ট দ্রব প্রয়োগ করা হয় । অনেক চিকিৎসকের মতে গ্লোকোমা পীড়ায় এডবিগালিন অপকারী কিন্তু কোন কোন চিকিৎসক উপকারী বলিয়া মত প্রকাশ কবিতাছেন ।

জীজননোদ্দেশ্যের পীড়ায় এডবিগালিনের উপকারিতা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পবিদৃষ্ট হয় । জন্মায় হইতে শোণিত স্রাবে আভ্যন্তরিক—মূত্র পথে এবং স্থানিক ট্যাম্পনরূপে প্রয়োগ করা হয় । কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, এইরূপে প্রয়োগ কবিতা কোন সুফল পাওয়া যায় না । অধিক স্রাব জনা কষ্টিক প্রয়োগের অসুবিধা হইলে পূর্বে এডবিগালিন প্রয়োগ কবিলে স্রাব হ্রাস হইতে পাবে । প্রোবাইটাস ভাগভায় ১—১০০০ দ্রব স্থানিক প্রয়োগে উপকারী ।

সামান্য সামান্য অস্ত্রোপচারের সময়ে এডবিগালিন প্রয়োগ কবিতা বিশেষ সুফল পাওয়া যায় । ১১০,০০০ শক্তি বিশিষ্ট দ্রবের ৮ মিনিম অধস্তাচিক প্রণালীতে প্রয়োগ করিয়া সামান্য স্ফোটক ইত্যাদি কর্তন করিলে শোণিত স্রাব হয় না । এবং সামান্য পরিমাণ স্থানিক অসাড়তা উৎপন্ন হয় । কোকেনের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে অসাড়তা অধিক উৎপন্ন হয় অথচ কোকেন দ্বারা বিষাক্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না ; কারণ এডবিগালিন

কর্তৃক স্থানিক বিধানের শোষণ সমতা নষ্ট হওয়ায় কোকেন শোধিত হইয়া যাউক্রে পাবে না। এই উপায়ে বৃহৎ স্নায়ু-শাখাও অসাড় হইতে পাবে। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োগ কবিত্তে হইলে শতকরা এক অংশ শক্তি বিশিষ্ট কোকেন দ্রবের ১৭ মিনিম এবং সহস্রকরা এক অংশ শক্তি বিশিষ্ট এডরিগালিন দ্রব (এই শক্তি বিশিষ্ট দ্রবই বাজাবে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়) ৩ মিনিম একত্রে মিশ্রিত করিয়া অস্ত্রোপচার স্থানে অধস্তাটিক প্রণালীতে প্রয়োগ কবিত্তে হয়। অধিক স্থান অসাড় কবিত্তে হইলে দ্রবের পাবমাণ অধিক লটতে হয়, তাহা লেখাই বাহ্যিক।

স্পাইন্ডাল এনেস্থেসিয়া—মেক মজ্জাব অসাড়তা উৎপাদনার্থ নিম্ন শ্রেণীর জন্তর শরীরে বিস্তর পবীক্ষা কবা হইয়াছে। সাধাবণ এডরিগালিন দ্রব ৮ ফোঁটা এবং কোকেন দেড় গ্রেণ স্পাইন্ডাল কেডাল মধ্যে প্রয়োগ কবায় কোন মন্দ লক্ষণ উপস্থিত হয় নাই। মানব দেহেও টহা পবীক্ষা কবা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রণালীতে অসাড়তা উৎপাদন করার পক্ষে অনেকে আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন।

মুত্রযন্ত্রের অস্ত্র চিকিৎসা কার্যেও এডরিগালিন প্রয়োগ কবিয়া সফল হইয়াছে। পিচকারী দ্বারায় প্রয়োগ করায় মুত্রাশয় হইতে শোণিত স্রাব রোধ হয়। এবং সামান্য অস্ত্রোপচার বিনা বেদনায় এবং বিনা রক্তপাতে সম্পন্ন হইতে পারে। রক্তাধিক্য বা আক্ষেপ বশতঃ মুত্রনালীর পথ অস্থায়ীরূপে অবরুদ্ধ হইলে যদি কয়েক ফোঁটা এডরিগা-

লিন দ্রব প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে ঐ অববোধ দূরীভূত হয়।

এডরিগালিন শোণিত সঞ্চাপ বন্ধ করে। এই ক্রিয়া অবগত হইয়া তাহারও আময়িক প্রয়োগ কবা হইতেছে। গুরুতব আঘাতে হৃদপিণ্ড অবশ হইয়া পড়িলে ১ C. Cm. (১—৫০,০০০ শাক্ত বিশিষ্ট) এডরিগালিন দ্রব পুনঃ পুনঃ শিবা মধ্যে প্রয়োগ করিয়া সফল পাওয়া যায়।

স্থানিক অসাড়তা উৎপাদনার্থ*

ইউকেন বি এবং এডরিগালিন

একত্রে প্রয়োগ।

(G. L. Chiene)

উদব গল্পের অস্ত্রোপচার সময়ে ব্যাপক চৈতন্য-হাবক ঔষধ প্রয়োগে অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে, তজ্জন্ত স্থানিক অসাড়তা উৎপাদক ঔষধ প্রয়োগ কবিয়া অস্ত্রোপচার সম্পাদন টান্ধে আলোচনা হইতেছে। তজ্জন্ত ডাক্তার চাইনৌ মহাশয় ইউকেন বি এবং এডরিগালিন একত্রে প্রয়োগ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি এই উভয় ঔষধের ব্যবহার সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সমীক্ষণ বিবরণ প্রদান কবিয়া তৎপর নিজের অভিজ্ঞতার বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। আমরা ঐ প্রবন্ধের স্থূল মর্ম্ম Scottish Medical and Surgical Journal নামক পত্রিকা হইতে সংগ্রহ করিলাম।

ইনি ১৯০৩খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে স্থানিক

অসাড়তা উৎপাদক ঔষধ প্রয়োগ কবিয়া একটি অস্ত্রোপচার সম্পাদন কবিয়াছিলেন। অস্ত্রোপচারেব পূর্বে অত্যন্ত শোণিত স্রাব হওয়ায় তাহা বন্ধ করার জন্ত এড্রিণালিন প্রয়োগ কবিয়াছিলেন এবং তাহাতেই শোণিত স্রাব বন্ধ হইয়াছিল, এই সময়েই তাঁহাব মনে হইয়াছিল যে, কোকেন কিম্বা ইউকেন বি সহ এড্রিণালিন একত্রে প্রয়োগ কবিলে সফল হইতে পারে। তৎপর প্রথমেই উপযুক্ত বোগী পাঠিয়া উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ কনিয়াছিলেন।

উক্ত ঘটনাব কতক দিবস পবেই একটি এম্পাইমাগণ্ড বোগী প্রাপ্ত হন।

বোগী একটি বালক। বয়স ১৬ বৎসর। ইহাব বক্ষস্থল হইতে দুইবার ট্যাপ কবিয়া পুয় বহির্গত করা হইয়াছিল। এবং পুনরায় পূর্বেব স্থায় বাম প্রুবার গহ্বরব পাবপূর্ণ হইয়াছিল বিবসেব কিয়দংশ কর্তন করা হিব হয় কিন্তু বোগী ক্লোরফর্ম প্রয়োগ সহ্য করার উপযুক্ত নহে, তজ্জন্ত নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

প্রত্যেক ২½ অংশ শক্তিব ইউকেন বি দ্রব ৪ ভাগ, সহস্র করা এক অংশশক্তিব এড্রিণালিন দ্রব এক ভাগ একত্র মিশ্রিত কবায় যে দ্রব প্রস্তুত হইল তাহাতে শতকরা দুই অংশ ইউকেন বি এবং পাঁচ সহস্র ভাগেব একভাগ এড্রিণালিন ক্লোরাইড ছিল।

উক্ত দ্রবেব ত্রিশ মিনিম পশু'কার দীর্ঘ রেখায় অধস্তাচিক প্রণালীতে প্রয়োগ করিয়া বার মিনিট কাল অপেক্ষা করার পর অস্ত্রোপচার আবস্ত করা হইলে রোগী কোনরূপ বেদনা বা অসুবিধা বোধ করে নাই। রিব

বর্তন করার সময়ে পেরিঅস্টিয়মে আরো কিছু উক্ত দ্রব প্রয়োগ করা হইয়াছিল। বোগী আবেগ্য লাভ কবিয়াছে। এই দ্রব প্রয়োগ কবাব ফলে অস্ত্রোপচার্য স্থান বক্তহীন হইয়াছিল এবং অস্ত্রোপচারেব সময়ে কিছু মাত্র বক্তস্রাব হয় নাই। অস্তি কর্তন সময়েও বোগী বেদনা বোধ কবে নাই। অস্ত্রোপচারেব পবেও কোনরূপ শোণিত স্রাব হয় নাই। এই অস্ত্রোপচারেব যদ্য সন্তোষ জনক হওয়ায় আরো অনেক স্থলে সামান্য সামান্য অস্ত্রোপচারে উক্ত মিশ্র দ্রব প্রয়োগ কবিয়া সন্তোষ জনক ফল লাভ কবিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্ত অনুযায়ী অনেক চিকিৎসক ব্যবহাব কবিয়া সফল লাভ কবিয়াছেন। কিন্তু এক স্থলে সফল হয় নাই—সেই স্থলে এড্রিণালিন ক্লোরাইড দ্রবেব শিশি বহু পূর্বে গোলা হইয়াছিল তজ্জন্ত ঔষধেব শক্তি নষ্ট হইয়াছিল।

ডাক্তাব ব্যবকার মহাশয় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে উন্নত প্রণালীতে শানিক অসাড়তা উৎপাদন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাব মতে যে স্থানে স্থানিক অসাড়তা-উৎপাদক ঔষধ প্রয়োগ কবিতে হইবে, সেই স্থানে অসাড়তা-উৎপাদক ঔষধ প্রয়োগেব পূর্বে যদি শোণিত সঞ্চালন বোধ করতঃ সেই স্থানের জীবনী শক্তি হ্রাস কবিয়া তৎপব অসাড়তা-উৎপাদক ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে অসাড়তা-উৎপাদক ঔষধেব কার্য্য অধিক হয়।

টুর্পিকট প্রয়োগ বা শৈত্য প্রয়োগ দ্বারা স্থানিক শোণিত সঞ্চালন কার্য্য অল্পকালের জন্ত বন্ধ করা যাইতে পারে। কোকেন বা ইউকেন বি সহ এড্রিণালিন একত্রে প্রয়োগ

করিলেও এই উদ্দেশ্যে সফল হইতে পারে। কিন্তু ট্রোপিকোকেনিন সহ এডবিগালিন মিশ্রিত কবিয়া প্রয়োগ করিলে উক্ত উদ্দেশ্যে সফল হয় না। পবস্ত পুরোক্ত প্রণালীতে স্থানিক বিধানের জীবনী শক্তি হ্রাস কবিয়া লইয়া তৎপব কোকেন হত্যাদির নিবৃত্তি মাত্রা অপেক্ষা অধিক মাত্রায় প্রয়োগ কবিলেও তাহা শোণিত হইয়া বাষ্পক বিষ ক্রিয়ায় লক্ষণ প্রকাশ করাব আশঙ্কা থাকে না। অথচ ঔষধের স্থানিক ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়। ইনি যে কেবল স্থানিক প্রয়োগ কবিয়াছেন, তাহা নহে। পবস্ত বৃহৎ মায়াকান্ড প্রয়োগ কবিয়া পরীক্ষা কবিয়া দেখিয়াছেন।

Dr. Braun মহাশয় এতৎ সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা কবিয়াছেন। হুম্মাদো দুইটি বিষয় উল্লেখের উপযুক্ত। ১ম, যে পরিমাণ ঔষধ পিচকাবী দ্বারা প্রয়োগ করা হয়। ২ম, তাহা প্রয়োগে অক্সোপচাবের পব বিরূপ শোণিত স্রাব হয়। এডবিগালিনের স্রাব প্রবল শক্তি বিশিষ্ট ঔষধ অতি সাবধানে মাত্রা নির্ণয় কবিয়া পিচকাবী প্রয়োগ কবিত্তে হয়। এক স্থলে ১—১০০০ শক্তির এডবিগালিন ক্লোবাইড ড্রবের ১০ মিনিম এবং ৫—১০০ শক্তির ২০ C Cm ইউকেনবি ড্রব একত্রে অধস্তাচিক প্রণালীতে প্রয়োগ করার ফলে বিবিধা এবং বমন হইতে দেখা গিয়াছে। অপর কয়েকস্থলে এই রূপ মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ ফলে ক্লদকম্পন হইতে দেখা গিয়াছে। ইহার মতে নিম্নলিখিত প্রণালীতে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে এই রূপ মন্দ ফল হইতে পারে না।

এসিড হাইক্লোর পিউর	০.২ ভাগ
সোড ক্লোর	০.৮ ভাগ
একাত্মা ডিষ্টিল	১০০০ ভাগ

এই ড্রবের ১০ C Cm লইয়া একটা টেষ্ট টিউবে লইয়া উত্তাপ দ্বারা উত্তপ্ত ক্ষুটিত কবিয়া লইয়া তৎসহ ১ C G পরিমাণ বিশুদ্ধ এডবিগালিন ক্লোবাইড মিশ্রিত কবিয়া পুনরায় উত্তাপ দ্বারা ক্ষুটিত কবিয়া লইয়া অল্প পরিমাণ কালকালিক এসিড সংযোগ করঃ পাটলবর্ণ বিশিষ্ট ৩—৫ C. C, ধবে এমন একটা শিশিতে রাখিয়া উত্তমরূপে মৃথ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলে দীর্ঘকালেও তাহাব ক্রিয়া নষ্ট হয় না। দ্বিতীয় প্রশ্ন বিষয়ে, অক্সোপচাবের পব শোণিত স্রাব সম্বন্ধে তাঁন বলেন—বত অল্প পরিমাণ ঔষধ প্রয়োগ করিলে শোণিত স্রাব বন্ধ হয়, তাহার অতি-বিস্তৃত ঔষধ প্রয়োগ করা কখন উচিত নহে। কারণ, অধিক পরিমাণ এডবিগালিন প্রয়োগ করিলে হৃদয় হৃদয় শোণিতবহার সহিত অপেক্ষা বৃহৎ আয়তনের শোণিতবহাও অল্পক্ষণেব স্তম্ভ সঙ্কুচিত হয়। ঔষধের ক্রিয়া শেষ হইলে অল্পক্ষণ পরে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আয়তনের শোণিত বহা সমূহ পুনরায় প্রসারিত হওয়ায় অক্সোপচাবের পরে শোণিত স্রাব হয়। সুতরাং এত অল্প পরিমাণ এডবিগালিন ড্রব প্রয়োগ করা উচিত যে, কেবল হৃদয় হৃদয় শোণিতবহা মাত্র সঙ্কুচিত হইতে পারে অথচ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আয়তনের শোণিতবহা সঙ্কুচিত না হইতে পারে। এইরূপ মাত্রায় এডবিগালিন প্রয়োগ করিলে অক্সোপচাবের সময়ে হৃদয় হৃদয় শোণিতবহা সঙ্কুচিত থাকায় তাহা হইতে শোণিত স্রাব

হয় না সত্য, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার শোণিতবহা হইতে শোণিত স্রাব হইতে থাকে, সেট সময়ে তাহা লিগেচাব দ্বারা বন্ধন করিয়া দেওয়া উচিত ।

Schleich এর মতে ঔষধ প্রয়োগ কবিত্তে হইলে নিম্নলিখিত প্রণালীতে ঔষধ প্রয়োগ কবিত্তে হয় ।

১—১০০ শক্তির ইউকেনবি কিহা কোকেন দ্রব ১০০ c cm সহ ১—১০০০ শক্তির এড-বিগালিন ক্লোরাইড দ্রব ২—৫ মিনিম মিশ্রিত করিবে । পাঁচ মিনিমের অধিক কখন লইবে না । এইরূপে মিশ্র দ্রব প্রস্তুত করিলে তাহাতে শতকরা ০০০০৭—০০০১৭ অংশ এডরিগালিন ক্লোরাইড বর্তমান থাকে । এই দ্রব প্রয়োগ করিলে স্বপ্ন স্বপ্ন শোণিত বহা সঙ্কুচিত হয় । কিন্তু অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আয়তনের ধমনী সঙ্কুচিত হয় না । স্রুতবাৎ অস্ত্রোপচারেব প্রচলিত নিয়মে তাহাদিগকে বন্ধন করিতে হয় । স্নায়ুকাণ্ডেব স্থানে প্রয়োগ কবিত্তে হইলে এতদপেক্ষা শতগুণ অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা হইয়া থাকে । ইহাব কোন স্থানে ১—১০০০ শক্তির ৫ মিনিমের অধিক প্রয়োগ করার আবশ্যক হয় না । বারবার এই প্রণালীও পরীক্ষা করিয়া উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন । তিনি নিম্নলিখিত প্রণালীতে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করেন—

বি ইউকেন চূর্ণ ৩ গ্রেণ

বিশুদ্ধ সোডিয়ম ক্লোরাইড ১২ গ্রেণ

একত্রে মিশ্রিত করিয়া পুঙ্খ উজ্জল কাগজ দ্বারা ঘূরিয়া রাখিয়া দিবে । ব্যবহারের সময়ে এই চূর্ণ ৩; আউন্স বিশুদ্ধ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফুটিত জল সহ মিশ্রিত করিয়া

শীতল হইলে তৎসহ ১—১০০০ শক্তির এড বিগাল ক্লোরাইড দ্রব ১০ c cm মিশ্রিত করিবে । এইরূপে মিশ্র প্রস্তুত হইলে পাক্ষিক জল ১০০ গ্রাম, বিশুদ্ধ ক্লোরাইড অফ সোডিয়ম ০৮ গ্রাম, বি ইউকেন ০.২ গ্রাম এবং এডবিগালিন ক্লোরাইড ০০০১ গ্রাম বর্তমান থাকে ।

তিনি এই সম্বন্ধে আবারও অনেক বিষয় এবং চিকিৎসিত বোগীবিব বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন । কি প্রণালীতে প্রয়োগ করিলে সুবিধা এবং অসুবিধা হয়, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু তৎ সমস্ত উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ সুদীর্ঘ করা গন্যাত্মক । ইহাব মতে ৩; আউন্স ইউকেন বি এবং সোডিয়ম ক্লোরাইড দ্রব সহ ১৫—১৮ মিনিম এডরিগালিন দ্রবেব (১—১০০০) অধিক মিশ্রিত করা অসুচিত । তিনি এডবিগালিন ট্যাবলেট ব্যবহার করার কথা বলেন কিন্তু Dr. Bates মহাশয়ের মতে ঐ প্রয়োগ রূপ তত বিশ্বাসের উপযুক্ত নহে । অনেকস্থলে কোন ফল পাওয়া যায় না ।

ডাক্তার চাইনী মহাশয় ঐ সমস্ত উক্তি স্বীকার করেন না । ইহাব মতে তিনি যে প্রয়োগ রূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা সময়ে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল । Foisy এর মতে এডরিগালিন প্রয়োগ কবিত্তে হইলে বোগীকে উদ্ভান ভাবে শায়িত রাখা আবশ্যক এবং অস্ত্রোপচার শেষ হইলেও কতক্ষণ তদবস্থায় রাখা আবশ্যক কিন্তু Honigmann তাহা অনাবশ্যক মনে করেন । Donitz মহাশয় ইতর অন্তর শরীরে অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন । এডরিগালিন ক্লোরাইড সহ কোকেন মিশ্রিত করিয়া ডিউবার নিয়ে প্রয়োগ করিয়া

বৃহৎ অস্ত্রোপচাৰ সম্পাদন করিয়াছেন। ইহাঁব মতে কেবল কোকেন প্রয়োগ করা অপেক্ষা তৎসহ এডবিগালিন প্রয়োগ করা নিৰাপদ। ঠনি শ্লেষ্মিক ঝিল্লীতে কোকেন প্রয়োগ করাব ফলে মন্দ লক্ষণ উপস্থিত হইতে দেখিয়াছেন। এডবিগালিন প্রয়োগ ফলে শোণিত সঞ্চাপ বৃদ্ধি এবং মূত্রে শর্করা উপস্থিত হয়।

Hartwing মহাশয় বিস্তর মন্দ লক্ষণ উপস্থিত হইতে দেখিয়াছেন। খাস প্রখাস যন্ত্রের পক্ষাঘাত জন্ত মৃত্যু হওয়ার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ডাক্তার চাইনী মহাশয় বিব-মিষা এবং বমন ব্যতীত অন্য কোন উপসর্গ উপস্থিত হইতে দেখেন নাই। ঔষধ প্রয়োগের দুই ঘণ্টা পর বমন হইয়াছিল। Braun এব মতে ঔষধ ভাল হইলে এবং উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োজিত হইলে কোন মন্দ লক্ষণ উপস্থিত হয় না।

ভাল ঔষধ এবং উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়ো-জিত হইলে কোন মন্দ লক্ষণ উপস্থিত হয় না সত্য কিন্তু সাধারণ চিকিৎসক যাহাঁবা সন্দেহা অস্ত্রোপচাৰ করেন না, তাঁহাদের পক্ষে বিশেষতঃ আমাদিগের পল্লীবাসী ডাক্তারদিগের পক্ষে তজ্জন ভাবে ঔষধ প্রস্তুত বাখা অসম্ভব। এক দিবস অস্ত্রোপচার জন্ত ঔষধ প্রস্তুত করিলেন। সেদিন যাহা আবশ্যক তাহা খরচ হইল। অনাবশ্যকীয় সমস্ত ঔষধ অবশিষ্ট রহিল। দীর্ঘকাল রাখিয়া দেওয়ার ঔষধ নষ্ট হইয়া গেল। এইরূপ কাণে পল্লীবাসী ডাক্তার কখন ভাল ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারে না সুতরাং তাঁহারা কোকেন এবং এডবিগালিন স্থানিক অবসাদক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের

এই অসুবিধা দূরীকরণ উদ্দেশ্য B. W. & Co. soloid Hemisine নাম দিয়া সুপারিগাল গ্রহিব এক প্রয়োগ রূপ প্রচার করিয়াছেন। এই সোলইড প্রয়োগ কবিলে সুপ্রারিগাল গ্রহিব রক্ত রোধক ইত্যাদি ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। অথচ বক্ষা, বহন এবং ব্যবহার কবাব কোন অসুবিধা নাই। দীর্ঘকাল থাকিলেও ক্রিয়া নষ্ট হয় না। ইউকেনবি ড্রবেব মধ্যে সোলইড ড্রব কবিয়া লইয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

উক্ত কোম্পানী ডাক্তার চাইনীৰ আদেশ ক্রমে নানা শক্তিব এবং নানা প্রকারের সোলইড প্রস্তুত কবিয়াছেন। তাহা ব্যবহার কবাও সুবিধা। এক প্রকার সোলইড প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা ১০ C. C. জলে ড্রব কারলে ১—১০০ শক্তিব ইউকেন বি এবং ১—১০০০ শক্তির ৫ মিনিম এডবিগালিন ড্রব প্রস্তুত হয়। ইহা ব্যবহারও সুবিধা জনক। ডাক্তার চাইনীৰ মতে স্থানিক অসাড়তা উৎপাদন জন্ত এই ড্রবেব পিচকারী প্রয়োগ কবিলে কোন মন্দ লক্ষণ উপস্থিত হয় না। সামান্য সামান্য অস্ত্রোপচার জন্ত এই ড্রব যথেষ্ট প্রয়োগ কবিয়াছেন। একজনের একটা বৃহৎ কার্ককল হইয়াছিল। রোগী ব্যাপক অসাড়তা উৎপাদনের অতুপযুক্ত। ঐরূপ সোলইড ড্রব করিয়া প্রয়োগ কবতঃ তাহাব কার্ককল উচ্ছেদ এবং আরোগ্য সময়ে ক্রিয়া প্রাপটিং করা হইয়াছিল। রোগী কোন যন্ত্রণা বোধ করে নাই। কিম্বা কোন মন্দ লক্ষণ উপস্থিত হয় নাই। এই সোলইড সম্বন্ধে আপনি এই যে, ইউকেনেব সহিত এডবিগালিন একত্রে মিশ্রিত থাকে,

তজ্জ্ঞ হোমিওপ্যাথ সোলিড ও রূপ ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে যে, তাহার একথণ্ড সোলিড ১—১০০০ শক্তিব ও মিনিম লাইকন এড্রিগালিনেব সমতুল্য। এই “হোমিসিন” যে কোন শক্তির কোকেন বা টউকেনবি দ্রবসহ মিশ্রিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই দ্রব প্রয়োগ জন্ম নানা প্রকারের পচকাবী প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার সৃষ্টি সমকোণে বক্র এবং ক্ষার জল বাতাত্ত ও সিদ্ধ করা যাইতে পারে। অনেকে হঠাৎ ভাল বলেন, কাবণ ক্ষার সহ সম্মিলিত হইলে এড্রিগালিন ত্রিখা বিতীর্ণ হয়।

স্থানিক অসাড়া উৎপাদন জন্ম কোকেন কিম্বা ইডকেন বি প্রয়োগ বর্তিতে হইলে এড্রিগালিন সহ প্রয়োগ কবাই স্তবধা এবং এহ উদ্দেশ্যে সোলিড হোমিসিন উৎকৃষ্ট প্রয়োগ রূপ।

বর্তমান সময়ে এড্রিগালিনেব আবেদন নানাবিধ প্রয়োগ রূপ ব্যবহৃত হইতেছে।

এড্রিগালিন—নূতন আময়িক প্রয়োগ।

(Therapeutic Gazette)

এড্রিগালিনেব আময়িক প্রয়োগেব কার্য্য ক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তৃত হইতেছে। পাঠক মহাশয় অবগত আছেন যে, প্রথমে এই ঔষধ কেবল মাত্র স্থানিক রক্ত বোধক জন্ম প্রয়োজিত হইত। শেষে আভ্যন্তরিক শোণিত স্রাব রোধ করণার্থে ইহা প্রয়োজিত হইয়াছে। ঐ সম্বন্ধে আমরা অনেক অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অভিমত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করি-
রাছি। এক্ষণে ইহার কার্য্যক্ষেত্র ক্রমেই

বিস্তৃত হইতেছে। এড্রিগালিন যে বিশেষ বহুগুণ সম্পন্ন ঔষধ তাহাব বোনাও সন্দেহ নাই। অল্প সময়ের মধ্যে যে সমস্ত নূতন ঔষধ গণিস্থিত হইয়াছে তৎ সমস্তেব মধ্যে এড্রিগালিন অধিক প্রতিপত্তিশালী কবি-
তেছে। বিগত কয়েক বৎসরেব চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ক পত্রিকাসমূহে এতৎ বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হইতেছে। ইহাব কারণ অল্পসন্ধান কবলে আমবা দেখিতে পাই যে, এড্রিগালিন একটা বিশেষ গুণ সম্পন্ন পদার্থ, বহু বধ পীড়ায় ইহাব প্রয়োগ হইতে পারে। এই ঔষধেব জীবনদেহের উপর কার্য্য এবং পীড়িত বিধানের উপর কার্য্য এক নহে। নানা প্রকার পীড়ায় ইহাব প্রয়োগে সফল হইতেছে। এহ সমস্ত কারণ জন্মই ইহা নূতন ঔষধ সমূহেব মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার কাবয়াছে।

Dr James Barr মহাশয় ব্রিটিশ মেডিকেল জর্ণালে একটা প্রবন্ধে এড্রিগালিনেব একটা নূতন আময়িক প্রয়োগেব বর্ণনা কবিয়াছেন।

সিরস বিল্লির গহ্বর মধ্যে স্রাব সঞ্চিত হইলে সেহ স্রাব বহির্গত কবিয়া গহ্বর মধ্যে যদি এড্রিগালিন দ্রব প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে পুনর্বাব আর স্রাব সঞ্চিত হইতে পারে না।

একজনের উদরে কাসিনোমা হওয়ায় পৰম্পারভাবে দক্ষিণাদগের প্লুরার গহ্বর মধ্যে স্রাব সঞ্চিত হইত। পুনঃ পুনঃ ঐ স্রাব বহির্গত করিয়া দেওয়া হইত এবং পুনঃ পুনঃ সঞ্চিত হইত। শেষে সহ্য করা এক অংশ শক্তি বিশিষ্ট লাইকর এড্রিগালিন

ক্লোরাইড দ্রব এক ড্রাম প্লুম্বাম গল্লব মধ্যে পিচকাবা দ্বারা প্রয়োগ কবাব পৰ পুন কাব আব স্রাব সঞ্চিত হয় নাই। ট্যাপ কাবয়া স্রাব বহির্গত কাবয়া দেওয়াব পৰই সেট ক্যান্ডুলা মধ্য দিয়া এডবিনালিন দ্রব প্রয়োগ কবা হইয়াছিল। ইহাব পৰ আব স্রাব সঞ্চিত হয় নাই। সুতরাং ট্যাপ কবারও আব-শ্রাবতা উপস্থিত হয় নাই। এই বোগিণীব বয়স অধিক হইয়াছিল। মূল পীড়া আবেগা হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তবে প্লুম্বিক ইন্ডিউশানেব জন্ত তাহার যে কষ্ট হইতেছিল, সে বষ্ট আব ভোগ কবিতে চগ নাই। ২৫ টি যথেষ্ট দাঁড়

যকৃতের সিরোসিস্ জন্ম এসাইটিস্ হয়। পুনঃ পুনঃ ট্যাপ করিয়া স্রাব বহির্গত কবিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু কয়েক দিনেব মধ্যে আবাব স্রাব সঞ্চিত হইয়া পুনঃ বস্থা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ভাবে বহুকাল অতীত হয়। এই অবস্থায় যদি ট্যাপ কবাব পৰে লাতকব এডবিনালিন ক্লোরাইড্ পেরিটোনিয়ম গল্লব মধ্যে প্রয়োগ কবা যায় তাহা হইলে পুনঃস্রাব স্রাব সঞ্চিত না হইতে পারে। ইহা ডাক্তার বাবেব মত কিন্তু এই স্থলে উদ্দেশ্য অনুযায়ী ফল হইবে কি না, তাহা পরীক্ষা সাপক্ষ। ইনি এক ড্রাম মাত্রায় পুরোক্ত প্রণালীতে প্রয়োগ কবিয়াছেন। এডবিনালিনেব কার্য অধিক দিবস স্থায়ী হয় না, ইহাই সন্দেহের বিষয়। ইনি যে কেবল পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে প্রয়োগ করিয়াই সফলতা লাভ করিয়াছেন, এমত নহে, পরন্তু স্রাব সংযুক্ত পেরি-কার্ভাইটিসেও সফল লাভ কবিয়াছেন।

স্নায়বীয় প্রকৃতি বিশিষ্ট জ্বপিত্ত এবং এডরিগানিন।

(Myrtle)

বিগত পোনব বৎসবেব মধ্যে যে সমস্ত বিষব জন্ত চিকিৎসকদিগেব মন অধিক আকৃষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্তেব মধ্যে জ্বপিত্তেব স্নায়বীয় পীড়া সর্ব প্রধান। এই প্রকৃতিব বোগীর জ্বপিত্ত কিস্থা নাড়ী পরীক্ষা কবিয়া কোনরূপ অস্বাভাবিকত্ব অবগত হওয়া যায় না, বোগীর অসুস্থাবস্থা সহসা উপস্থিত হয়, তাহাব বিশেষ কোন কারণ অবগত হওয়া যায় না। রোগীও যে বিশেষ কোন অসুখ বোধ কবে, তাহাও নহে। কেবল মাত্র জ্বপিত্তেব কার্গা একটু দ্রুত হইতে থাকে, জ্বপিত্তেব স্থানে ভাব বোধ হয়, নাড়ী দ্রুত, অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট এবং ক্ষণ বিলুপ্ত হয়—বয়েক বাব খুব দ্রুত চলে এবং মধ্যে মধ্যে বন্ধ হইয়া যায়, আবার একটু ধীরে চলে। শ্বাস প্রশ্বাস অপেক্ষাকৃত দ্রুত এবং অগভীর হইতে থাকে। রোগী মধ্যে মধ্যে গভীর নিশ্বাস গ্রহণ কবে। প্রথম আক্রমণ সহজে অল্প সময়ে শেষ হয়। একটু স্বস্তি অবস্থায় অবস্থান, একটু জলপান, ইহাব অধিক চিকিৎসাব আবশ্যিকতা উপস্থিত হয় না। আধাবেব অনিয়ম, অতিবিক্ত পরিশ্রম, মানসিক উত্তেজনা অথবা যকৃতের আক্রমণ বিকাব ইহাব কাবণ বলিয়া উল্লিখিত হয়। ক্রমে সময় অতীত হইতে থাকে। পীড়াও শীঘ্র শীঘ্র এবং অপেক্ষাকৃত প্রবলভাবে উপস্থিত হইতে থাকে। তখন রোগী চিকিৎসকেব চিকিৎসা-দান হয়। এইরূপ স্থলে ডিজিটেলিশ কোন ফল প্রদান করে না। পূর্ণ মাত্রায়