

হিত-বার

লাপ্যাদিক, বৈদ্যক, হোমিওপ্যাথি
হাকিমীমতে, পার্বপ্রকার
রোগ-চিকিৎসা পুস্তক ।।

শ্রীভাষিকাচরণ গুপ্ত সংগৃহীত



১৩ নং ঘোড়াবাগান স্ট্রীট হইতে

শ্রীপ্রসাদকুমার সুখোপাধ্যায় কর্তৃক
প্রকাশিত ।

দ্বিতীয় সংস্করণ

কালকাতা ।

১৪৭ নং "চিৎস চিৎপুররোড মোড়" বাজার

সূর্য প্রেস

কলিকাতা

১৯৩৬ সাল

(All rights reserved)

ms. pl. 1. ib. 1.

চিকিৎসা তত্ত্ব-বারিধি সম্বন্ধায় অভিপ্রায়।

“চিকিৎসা-তত্ত্ব-বারিধি” সম্বন্ধে প্রশসিত প্রশসিত
কবিরাজ কীর্ত্তিকর্মগণ যে সকল অভিপ্রায়-পত্র
দ্বারা কতকগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

Certified that, “Chikitsa-Tatta-Baridhi” of Babu
Kumar Mukerjee is a nice book for the study
of medical schools. It contains various informations of treat-
ment of diseases.

Calcutta. } N. C. Mukerjee. M. B.
4th August, 1888. } House Surgeon—Mayo Hospital.

I have much pleasure in stating that “Chikitsa-Tatta-Baridhi” contains many useful hints on the Allopathic
Homœopathic treatment of diseases. Considering the gigantic
nature of the work, the author deserves much praise.

Calcutta. } Nitai Chandra Halder. D. M.
The 14th Dec. 1888 } Late House Surgeon
Medl. College Hospl.

আমি “চিকিৎসা-তত্ত্ব-বারিধি” অতি সুসংলিখিত অল্পবয়স্ক হইয়াছে
প্রায়শঃ নিদ্রান ও প্রয়োগের যেরূপ পদ্ধতি, তাহাতে সকলে
সামান্যভাবে বিশেষ অবগত হইবাব একান্ত সুসজ্জ উপায় হইয়াছে
বিশেষতঃ প্রায়ঃসমস্ত বিষয়গুলি লিখিত হইয়াছে তাহাতে
অন্যোপায় কোন বিষয়ে যথা-শাস্ত্র অসংলগ্ন হয় না।

কবিরাজ কীর্ত্তিকর্মগণ ও বালক।

কবিরাজ—

কীর্ত্তিকর্মগণ কবিরাজ

কীর্ত্তিকর্মগণ বাবু গোপী

না তত্ত্ব বারিধি" খানি পাঠ কবিয়া যতদূর
 উত্তম হইয়াছে ইহাব দ্বারা অনেকেরই
 নাক্ষত্র ইতি ২৭শে ভাদ্র, সন ১২৯৫ সাল

চিকিৎসা-সম্বন্ধে যত প্রকার গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে
 "চিকিৎসা-তত্ত্ব-বারিধি" নামক পুস্তকখানি অতি উৎকৃষ্ট
 গ্রন্থ আমি অতি নিবেশপূর্বক ইহাব আদ্যোপান্ত পাঠ কবিয়া
 মানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি ইহা যে প্রকার সবল ভাষায়
 হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত বৈদ্যকসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন,
 যতি সুন্দর হোমিওপ্যাথিক ও য্যালোপ্যাথিক সম্বন্ধে রোগ-
 বিষয় অতি সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে হাকিমসম্বন্ধে যাহা
 লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া সান্ত্বিত সন্তোষলাভ করিলাম।
 এই পুস্তকখানি চিকিৎসা-সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইয়াছে
 ন, ইতি তাবিখ ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ সাল
 বেনাপুর
 মঞ্জুরাট পোষ্ট } ডাক্তার মহম্মদ এসমাইল।

শ্রী।
 আপনাব "চিকিৎসা-তত্ত্ব-বারিধি" অতি উৎকৃষ্ট সঙ্কলন হইয়াছে।
 লোপ্যাথিক চিকিৎসাব্যবহার-বিষয়ক যতদূর
 প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের কোনটিতেই এত অধিক প্রসঙ্গ
 বৈদ্যকসম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা অতীব সুন্দর।

শ্রী।
 "চিকিৎসা-তত্ত্ব-বারিধি" নামক পুস্তকখানি অতি উৎকৃষ্ট
 কবিতাময়, যতদূর
 বারিধি একটা গ্রন্থ
 "Cooperation amongst
 the ambitious and the
 and"

কিৎসক যাবই বে বিশেষ প্রয়োজ
সন্দেহ নাই।

and
শ্রীবদাচরণ বিদ্যাসাগর
বামনোপাল,

“চিকিৎসা-তত্ত্ব বাবিশি” অতি উপাদেয় গ্রন্থ
জীব অশুভ্রীতব্য বিষয়গুলি অতিশয় দক্ষ
করা হইয়াছে এত অল্পের মধ্যে বহুল বিষয়ের
আপনি দৃষ্টিগোচর হয় না; এজন্য অবশ্যই আপনি সৎকার
দাও হইবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীপু ব

শ্রীবামদাস গুপ্ত

মেডিকেল প্রাকটিস

“মহাশয়, “চিকিৎসা-তত্ত্ব বাবিশি” একত প্রস্তাবেই চিকিৎসা
বক্তাকর বিশেষ হইয়াছে চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য
ইহাতে আছে... য্যালোপ্যাথিকের পৌরনির্ঘ অতি সহজ ভাষা
প্রকৃৎসংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে আমি বলিতে পারি, যাহারি সাধুর
ভাষা বোধ আছে, সেই ইহা পড়িয়া বুঝিতে পারিবে, এজন্য চিকিৎসা
ব্যতীত গৃহীতজের বিশেষ উপকারে আসিবে।

শ্রীকেশবনাথ মনি গুপ্ত;

এল, এম, এস।

চলি

মহাশয়

আপনি অতি সহজ ভাষায় এবং সংক্ষেপে যেরূপ ইঙ্গী-চিকিৎসা
আপনার “চিকিৎসা-তত্ত্ব বাবিশি” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন
তাহা পঠিকবিয়া শ্রী হইলাম

আবহিম বক (হাকিম)

মৌনাবু

মহাশয়। আপনার “চিকিৎসা-তত্ত্ব বাবিশি” পাঠ করিয়া যাহার প
আপনি অতি সহজ ভাষায় এবং সংক্ষেপে যেরূপ ইঙ্গী-চিকিৎসা
আপনার “চিকিৎসা-তত্ত্ব বাবিশি” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন
তাহা পঠিকবিয়া শ্রী হইলাম

না তত্ত্ব বাণী
 না ভাষায় এমন চিকিৎসা পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই।
 চল চিকিৎসকেব নিকট প্রদর্শনীয় হইবে।

গত }
 ১৮৮৮। }
 অক্টোবর মাস দত্ত এম. বি.
 Latb. Offg. M. O. Officer of
 Aligpse. E. Railway.

আপনার "চিকিৎসা-তত্ত্ব-বারিধি" নামক গ্রন্থখানি যেরূপ
 লিখিত এবং বোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা প্রণালী যেরূপ
 গ্রন্থে সম্পষ্টরূপে বর্ণিত, তাহাতে বোধ হইতেছে, ইহা
 মানব বিলক্ষণ উপকার দর্শিবে। পুস্তকের মুদ্রাক্ষণ শেষ হইলে
 কয়েকখণ্ড পাঠাইয়া দিবেন।

অবিজয়মাধব বিদ্যাভিনোদ।
 পুরন্দরবাণী।

আপনার "চিকিৎসা-তত্ত্ব-বারিধি" নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া
 যি সমস্ত লাভ কবিলাম, অদ্যাবধি এরূপ সংকলন কুত্রাপি দৃষ্টি-
 কর কবি নাই। ইহা দ্বারা কি গৃহস্থ, কি চিকিৎসক, সকলেরই
 উপকার দর্শিবে। ইহা দ্বারা বিনা উপদেশে উত্তমরূপে চিকিৎসা
 প্রদেয় পারা যায়।

অতি শ্রদ্ধা সহ;

ভাকুয়টা-

সিভিল হস্পিটাল অসিস্টেন্ট।

আপনার "চিকিৎসা-তত্ত্ব-বারিধি" নামক পুস্তকখানিতে সকল প্রণালী
 ক্রমেই যথেষ্ট উপকার দর্শিবে, তাহা সকলকেই স্বীকার
 করিতে পারা যায়। ইহা কে এক পক্ষ অন্ধকারে রাখিলেও অসুবিধা
 হইবে না।

It affords me much pleasure to read over the "Chikitsa-
 va-Danda" and find it to be a most valuable and
 liberal work, and I hope it will be a great
 help to the medical profession.

upon its greatest intelligence, industry, research and
 mation. Certainly the book is nicely got up with every res
 as well as Homoeopathy and other method of medicines.

I would recommend one and all to have such a book
 family guide and professions too. The printings neatly ex
 and at the same time it is liberally cheap.

Gagan Chander Nandi. — Homoeopath.

In Charge: H. S. Sova, Charitable Dispensary
 Chandanagore, E. I. R.

স্থানভিবি বসন্তঃ সকলগুলির স্থান কুলাইল না।

শ্রীযুক্ত শ্রী প্রসাদকুমার যুগোপাধ্যায়
 মহাশয় সমীপেষু

১৩ নং জোড়াবাগান, স্ট্রীট, কলিকাতা।

মহাশয়, আমি এই "চিকিৎসা তত্ত্ব-বারিধি" নামক পুস্তকের
 সকল প্রকার স্বল্প অংশনাকে উপস্থাপন করিয়া বিক্রয় করিলাম।
 ইহাতে আমার বই আমার উত্তরাধিকারিগণের কামের কোন
 প্রকার দাবী থাকিবে না—ইতি এই বৈশাখ ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।

ভাদ্রপদ

প্রকাশক চন্দ্রকান্ত

আর্থগোষ্ঠের উন্নতি হইল অবনতির নাম যুদ্ধ ছিল।
সংসারের নিয়মই এই—কোন সমাজেব, সেই জাতিব, বা ব্যক্তি-
বিশেষের যখন পড়তা পড়ে, তখন এইরূপ ঘটয়া থাকে ; আর্থগোষ্ঠ
কেঁদেও ভীষণতীয় আর্থগোষ্ঠ পড়তার পরিচয় । সে সময় অসাধারণ
শ্রমীয়াসম্পন্ন মুচ্ছাগা ও টাঁহাদিগের মধ্যে প্রাহৃত্ত হইয়াছিলেন
আর্থগোষ্ঠ দ্বারা যখন আর্থগোষ্ঠের মধ্যে পার্থক্য হইয়া তাহার যৌ-
দমা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তৎপক্ষীর দেহাত্মক, রূপ, লাবণ্য, অপূর্ণ
অঙ্গান কল্পিত হইয়াছিল। যখন যুদ্ধ হইত তখন পুনঃ রাজা
হইত ন চন্দ্র, ইত্যভাবে আজি পর্যন্ত গাইতেছেন ধর্মস্ব-
র্গ হাতে হাতে চান্দ্রমাস জন্মে জাতিব চিরদিন এক রূপ
বিচনা পাওয়া যাবে। বাক্য কটক, সর্ব
মুগলমানদিগের
সংসারের নিয়মই এই—কোন সমাজেব, সেই জাতিব, বা ব্যক্তি-

চিকিৎসা-তত্ত্ব-বারিধি

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

জীবন, স্বাস্থ্য, পীড়া ও মৃত্যু

যখন আমরা মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করি, সেই সময় হইতে যে শক্তিদ্বারা আমাদের-সেহের বৃদ্ধি হয় এবং চক্ষুকর্ণনাসিকাদি পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা পারীক্ষিক ও মানসিক সূক্ষ্ণ বস্তু অনুভব করিয়া ইহলোকে বিচরণ করিতে থাকি, সেই শক্তিকে সচবাচর জীবন বা জীবনী শক্তি বলা গিয়া থাকে। যত দিন আমাদের এই জীবনী-শক্তি থাকে, তত দিনই পৃথিবীর সমস্ত সুখ, গীহাব পর কোন সম্বন্ধ থাকে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা যে পর্যন্ত জীবিত থাকি, সেই সময়কে আমরা জীবন ও পরমায়ু কহে। এই জীবনী-শক্তি সম্বন্ধে অনেক অনেক কথা বলিয়া থাকেন। ঈশ্বরবাদীরা বলেন যে এক মহাত্মা (ঈশ্বর) এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের জীবন-রূপে অবস্থিতি করিতেছেন; তাঁহার দ্বারা সৃষ্টিগোপে জীবদেহে অবস্থিতি করে বলিয়া জীবের জীবনী-শক্তি আছে; সেই আত্মা কোন ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ-যোগ্য নহে, কেবল অনুমান দ্বাবাই তাঁহার সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারা যায় আর নিরীশ্বরবাদীরা এই জীবনী-শক্তিকে জীবিতাবস্থার ক্রিয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, সে বিস্তারিত আর অধিক বাস্তবিকতা কবিরাব প্রয়োজন নাই।

জীবনী-শক্তি সকল দেহে সমান সময় থাকেনা, অর্থাৎ সকল মনুষ্যের আয়ু সমান নহে কেহ দীর্ঘকাল জীবিত থাকে, কেহ অল্পদিনেই ইহলোক হইতে প্রস্থান করিবে মরণের নিশ্চিত সময় নাই। যে ব্যক্তি নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি ভোগ করিতে পূর্ববর্তী, তিনিই দীর্ঘ-জীবন হইবেন এবং তাঁহার স্বাস্থ্যকেই কেহ দীর্ঘ-জীবন বলা যায়। তদন্ত যত্নকে অকালমৃত্যু বলা গিয়া থাকে।

পূর্ণজীবিত কালকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিবেন যথা—
১. প্রাথমিক মধ্য এবং বার্দ্ধক্য।

প্রথম — পঞ্চদশবর্ষ পর্যন্ত বাল্যাবস্থা। ১. বাল্যাবস্থাকে নিম্নলিখিত তিনটি অবস্থায় পৃথক করা যাইতে পারে

- (ক) প্রথম বৎসর পর্যন্ত দুগ্ধদ্বারা পোষিত হইবার অবস্থা
- (খ) দুই বৎসর পর্যন্ত দুগ্ধ এবং অন্নদ্বারা পোষিত হইবার অবস্থা।
- (গ) তৃতীয় বর্ষ হইতে মনুষ্যের জীবন অন্নগত এবং এই সময় হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্যন্ত মানবদেহে কফাধিক্য জন্মে।

দ্বিতীয় — মধ্যাবস্থা যৌবন হইতে সপ্ততি (সত্তর) বৎসর পর্যন্ত এবং উহা নিম্নলিখিত চারিটি অবস্থায় বিভক্ত।

- (ক) যৌবন হইতে বিংশতি বর্ষ পর্যন্ত বৃদ্ধি
- (খ) বিংশতি হইতে ত্রিশবৎসর পর্যন্ত যৌবন
- (গ) ত্রিশ হইতে চত্বাবিংশ পর্যন্ত সম্পূর্ণতা। এই সময় সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়

(ঘ) চত্বাবিংশ হইতে সত্তর বৎসর পর্যন্ত সময়েই নারী হানি। এই সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণে ক্ষমতা এবং বল হ্রাস হইতে থাকে এবং শরীরে ক্রিয়াধিক্য জন্মে।

তৃতীয় — সত্তর বর্ষ হইতে বার্দ্ধক্য। এই সময় হইতে ইন্দ্রিয়, বল এবং জীবনী-শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে পেশী সমুদায় শিথিল, কশ পক ও পত্নিত, দেহে অবনত প্রকৃতি, উদরাময় ও অন্যান্য পীড়ার আধাব হইতে থাকে। স্বাস্থ্যবাহ্য মানবদেহে বায়ুর আধিক্য জন্মে এবং বায়ুর আধিক্য হইতে শরীরে পুষ্টিশক্তির হ্রাস হয়।

৬ জীবন, স্বাস্থ্য, পীড়া ও মৃত্যু

সাধারণতঃ, পুরুষের পঞ্চবিংশ এবং স্ত্রীর ষোড়শ বর্ষ বয়সে শরীর এবং বলের পূর্ণতা জন্মে।

স্বাস্থ্য।—সমস্ত দেহেব ও ও হাব ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ক্রিয়া প্রকৃত অবস্থায় থাকিলে, তাহাকে স্বাস্থ্য বা সুস্থাবস্থা কহে। এই অবস্থায় মন প্রফুল্ল থাকে, কর্মক্ষেত্রে কনিষ্ঠে প্রবৃত্তি জন্মে, বৌদ্ধিমত সুখা হইবে এবং উপযুক্ত পরিমাণে শরীরের রক্তাদি নিগত হইয়া শরীর ও মনে স্বচ্ছন্দে বাসে।

অস্বাস্থ্য উপরি দিখিত নিয়মেব ব্যতিক্রম ঘটিলেই তাহাকে অস্বাস্থ্য বা বলা যায়। এই অবস্থায় শরীরে ও মনে দুখ থাকে, কর্ম করিবার ইচ্ছা থাকে না, সর্বদাই বিবর্তি বোধ হয়, সুখামান্দ্য ও শৌচ-প্রস্রাবাদি শারীরিক ক্রিয়াব ব্যতিক্রম ঘটে পীড়া অস্বাস্থ্যের নামান্তর মাত্র।

রোগের কারণ।—বোগের কারণ অবধাৎ কবা বড় সহজ ব্যাপার নহে; ইহাতে ক্ষম জ্ঞান এবং বুদ্ধদর্শিতার প্রয়োজন। তবে, সাধারণতঃ, রোগনির্ণয় কবিতে হইলে এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, বোগ উপস্থিত হইবার পূর্বে অমন কোন ঘটনা ঘটিয়াছে যে কারণ হইতে বোগোৎপত্তি হইয়াছে। এ জন্য পীড়ার সহিত পূর্বাঘটনা পুনঃপুনঃ দর্শন করিতে হয়; একপা না কবিলে পীড়া প্রকৃত কবে সহিত তাহার পূর্ববর্তী ঘটনার জন্ম হইতে পারে। মনে করি, বাত্রিকালে চাঁবি, পাচ বা ততোধিক ব্যক্তি একত্র আহাব করিয়া শয়ন কবিল; প্রাতঃকালে দেখা গেল, তাহাদের কাহার অঙ্গীর্ষ কাহার উদবাসময়, কাহার বা কার্মবোগেব উৎপত্তি হইল, আব ব কেহ কেহী বা দ্বিবা স্নান করিলা, তাহাদের শরীরে পীড়ার নামে গন্ধ নহি। ইহাতে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে যাহারা পীড়িত হইল, তাহাদের দেহে পূর্বে এমন কোন বিভিন্ন ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহাতে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন কামি বুদ্ধি হইল।

পূর্ববর্তী কারণ।—এইকপে যে সকল পূর্ববর্তী ঘটনা জন্ম করিয়া কোন পীড়ার আদি হইল, তাহাকে পূর্ববর্তী কারণ বলা হয়।

রোগোপশমিকা শক্তি ।—জীবিত দেহে একপ্রকার আন্তা-
বিক রোগোপশমিকা শক্তি আছে, উদ্ভাবা চিকিৎসা ব্যতিবেকেও
অনেক স্থলে বোগেব উপশম হয় এই শক্তি, সকল দেহে সমান রূপে
থাকে না, এজন্ত কেহ কেহ সামান্য পীড়ায় বিশেষরূপে চিকিৎসিত
হইলেও রোগী শুক্ত হইতে পারেন না, এবং কেহ কেহ বিনা চিকিৎসাতেও
অতিশয় সাহসাতিক পীড়া হইতে জীবোৎসাদ লাভ করে

অলোপ্যাথিক চিকিৎসা-শাস্ত্রে নিম্নোক্ত নয় প্রকার পূর্ববর্তী কারণ
অবধাবিত হইয়াছে, যথাঃ—

(১) পিতৃমাতৃক বা কৌলিক প্রকৃতি, (২) ধাতু বা দেহ প্রকৃতি,
(৩) দৌর্বল্যকর কারণ, (৪) পূর্ব পীড়া, (৫) বর্তমান পীড়া, (৬) বয়স,
(৭) লিঙ্গ, (৮) উদ্দীপন এবং (৯) ব্যবসায় ।

(১) কৌলিক প্রকৃতি ।—পুত্রের জন্মকালে পিতৃমাতৃক
কোন পীড়া থাকিলে পুত্রেরও সেই পীড়া জন্মবার অধিক সম্ভাবনা
থাকে । এইরূপে উৎপন্ন ব্যাধিকে বৈদ্যকশাস্ত্রে কুলজ বলা হয় । এই সকল
কুলজ ব্যাধি যে কোন সময়ে পুত্রের সংক্রামিত হইবে, তাহা স্থির বলা
যায় না । তবে, সাধারণতঃ ভড়কা, জিড়তা ও উপদংশ রোগ, কুলজ-
রূপে জন্মিলে শিশুর বাল্যাবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয় যুগী ও ক্ষয়কাশ
স্বপ্নের প্রারম্ভে, বাত ও নানা প্রকার শ্বাসিক পীড়া প্রোঢ়াবস্থায়
এবং শ্বাসিকাশ, পক্ষাঘাত প্রভৃতি পীড়া বৃদ্ধাবস্থায় সংক্রামকরূপে পুত্রের
জন্মিয়া থাকে কুলজ ব্যাধি কখন কখন পৌত্রপ্রপৌত্রাদিতেও সং-
ক্রামিত হইতে দেখা গিয়া থাকে ।

(২) ধাতু বা দেহ প্রকৃতি ।—ধাতু চারিপ্রকার যথা,—রক্ত-
প্রধান, শ্লেষ্মাপ্রধান, পিত্তপ্রধান এবং বায়ু বা শ্বাস প্রধান

যাহাদেব শরীরে পুষ্টি, পেশী সকল দৃঢ়, চক্ষু উজ্জ্বল, বর্ণ পরিষ্কার,
ত্বকু কোমল ও পাতলা, বক্তবাহিকা নাড়ী সকল স্থল, নাড়ী পূর্ণ ও বেগ-
বতী, মুখমণ্ডল প্রফুল্ল ও ক্রিষ্ট চঞ্চল, ত্রাহুদেহ ধাতু বক্তপ্রধান এবং
তজ্জন্য এই সকল ব্যক্তিবর্গের সচরাচর প্রায়ই প্রদাহ, রক্তপ্রাব প্রভৃতি
পীড়া হইয়া থাকে

যাহাদের পেশী সঙ্কল কোমল, এক মলিন, মুগ্ধমুগ্ধ নিস্তেজ ও
প্রতিভাহীন, ওষ্ঠ স্থল, রক্তবাহিকা মাড়ীমকল স্বল্প এবং বক্তের গতি
মন্দ, তাহাদের ধাতু মেঘাশ্রয় এবং তজ্জন্য তাহাদিগের মেদ বৃদ্ধি
এবং উদরীভাষ্য প্রভৃতি পীড়া জন্মে

যাহাদের দেহের পেশী সমুদায় অল্প কঠিন ও স্থল, বর্ণ কৃষ্ণ, চিত্ত
অপ্রকৃষ্ট, রক্তবাহিকা মাড়ীমকল স্থল, বক্তের নিম্নস্থ শিরাগুলি স্ফীত
দৃশ্যমান এবং মাড়ী পূর্ণ ও ককর্ষ, তাহাদের ধাতু শিথিল এবং তজ্জন্য
তাহারা অধিক পরিমাণে ফোঁসিয়া শারীরিক বা মানসিক পবিত্রমে
অক্ষম এবং তাহাদের উদরাময় ও পিত্তাধিক্য রোগ অধিক হইয়া
থাকে ।

যাহাদের মাংসপেশী ক্ষুদ্র, কোমল ও শীর্ণ এবং সম্ভাব চঞ্চল, মাড়ী
স্বল্প ও ক্রান্তগামী এবং ইন্দ্রিয়সকল অতিশয় ভীক্স অর্থাৎ অস্পষ্ট কারণেই
উত্তেজিত হয়, তাহাদের ধাতু বায়ুশ্রবল ; এজন্য তাহাদিগের অপ্রসার,
চিত্তবিভ্রম প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে ।

• এক একটা ব্যক্তিতে যে এক একটি ধাতুর সমস্ত লক্ষণ দেখিতে
পাওয়া যায়, এমন নহে ; ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর লক্ষণ সমুদায় এক একটা
ব্যক্তিতে দেখা গিয়া থাকে তাহাদিগের প্রকৃতি দুই ভিন্নটা ধাতুর
মিশ্রণ বলিয়া বুঝিতে হইবে

(৩) দৌর্বল্যের কারণ ।—দুর্বলতা প্রযুক্তই আমাদের দেশের
লোকের অধিকাংশ পীড়ার উৎপত্তি দৌর্বল্যের কারণ নানাবিধ ।
যথা,—পরিপোষণশক্তির অস্পতা, পরিপাকশক্তির হ্রাস, অজীর্ণ, উদরাময়
এবং রক্তাধিক্য প্রভৃতি পীড়া ।

ক্ষুধাশূন্যতা বায়ু ।—স্বাভাবিক পদার্থের বায়ু সহিত
মিশ্রিত হইয়া শরীরে প্রবেশ করে ; তজ্জন্য মনোমারী, মোহিত-
তার, হাম প্রভৃতি পীড়া জন্মিতে পারে ।

• শারীরিক ও মানসিক প্রেমের আধিক্য ।—শরীর এবং মন
পূর্ণপূজ্য পরিমাণে সঞ্চারিত না হইলে স্বাস্থ্যক্ষয় হয় না ; কিন্তু প্রেম
বিশেষের মাত্রা অধিক হইলে স্বাস্থ্য প্রকৃষ্ট পীড়া জন্মে

শ্রমবিমুক্ততা । — নিত্যন্ত অলস হইলে দেহের ক্রিয়া সকল স্থৈচ্য-
কল্পপোষম্পন্ন হয় না, উত্তমকণ বওসঞ্চালন না হইলে হস্তপদাদি শীতল,
দৃষ্ণ শুষ্ক, যক্ৰও নিষ্ক্রিয়, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, অৰ্শ প্রভৃতি পীড়া হয় ।

অতিবিক্ত উষ্ণতা । — অধিক পরিমাণে রৌদ্রকিরণ অথবা উত্তাপে
স্নানকালে, অগ্নি অতিবিক্ত পানীয় কবিলে, ইত্যাদি সমুদায় শিথিল,
হৃৎপিণ্ড ও ইন্দ্রিয়সকল নিস্তেজ প্রাচুর্য্য নিঃসবন, কুস্বাসেব ক্রিয়া-
বৃদ্ধি, এবং রক্তেব জলীয়ংশে ক্রাওন ও হাইড্রোজিন বাষ্পেব অপরিতা
হয়, স্নাতবাং বক্ত দূষিত ও যক্ৰও উত্তেজিত হইয়া পিত্তবৃদ্ধি, আমাশয়
ও নীউঠা ইত্যাদি পীড়া জন্মিয় থাকে

অতিরিক্ত শীতলতা । — অল্প শীতে পেশী সমস্ত সতেজ থাকে
সত্য, কিন্তু শরীরে অতিরিক্ত শীত লাগিলে ত্তকেব নিম্নস্থ কেনেব ঋষ
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিবাগুলি আকৃষ্ট হইয়া এবং তজ্জন্ত আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলিতে
রক্তাববোধ হইতে পাবে শীতপ্রধান দেশে অধিকমাত্রায় শীতের পব,
প্রায়ই মহামারী হইতে দেখা যায়

সর্বদা অপরিমিত সুরাপান । — নিয়ত অধিক মাত্রায় সুরাপান
কবিলে শরীরেব সমস্ত যন্ত্র নিবস্তব বেগে পরিচালিত হইয়া অকৰ্ণ্য
হইয়া যাইতে পাবে ; তজ্জন্ত পাকস্থলী বিকৃত হইয়া ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণ,
অৌৰ্দ্ধল্য প্রভৃতি নানা বোগ একত্রিত হইয়া জ্ঞাননষ্ট কবিতো পাবে
আজিকালি পানদোষে অনেক লোকের অকালমৃত্যু সুখটিত
হইতেছে ।

মানসিক দৌৰ্ব্বল্য । — ভয়, শোক, নৈবাশ্য প্রভৃতি মানসিক
দৌৰ্ব্বল্যে প্রধান কারণ মানসিক দৌৰ্ব্বল্য প্রযুক্ত শরীর নিস্তেজ হইয়া
নানাপ্রকার ব্যাধিপ্রসূ হয়

অধিক মাত্রায় পুনঃপুনঃ রক্ত ও ধাতুক্রিয় । — অধিক পদ-
নাগে বাবস্তাব রক্তপ্রাব হইলে শরীর দুৰ্ব্বল হইয়া যেনানী প্রকার বোগ
প্রসূ হয়, তাহাতে আরি সুন্দেহ নাই । অতিবিক্ত মাত্রায় ধাতুক্রিয় জন্ত
প্রমেহ, উদরাময়, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগ জন্মে ।

(৪) পূর্ব পীড়া । — পূর্ব পীড়িত শরীর দুৰ্ব্বল হইয়া পড়িলে,

অন্য পীড়াও প্রবল হয় অপস্রাব, মুচ্ছা প্রভৃতি পীড়া একবার হইলে পুনঃপুনঃ হইতে থাকে। চিকিৎসা দ্বারা পীড়া স্তমিত থাকিতে পারে, কিন্তু বোগেব কাবণ বিদ্যমান থাকিলে পুনর্বার সেই বোগ দেখা দেয়।

(৫) ক্রান্তমান পীড়া।—দেহে কোন পীড়া ঔত্তম্যে থাকিলেও অন্য পীড়া জন্মিবামস্তু বিন্দু।

(৬) বয়স —বয়সপ্রযুক্ত শরীরে বিশেষ বিশেষ বোগেব সন্ধান হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার পরে কিছুদিন পর্যন্ত শিশুদিগেব শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া সূচকরূপে হয় না, এই অবস্থায় শরীরেব অংশ সমুদায় শীত শীত বর্ণিত হয়, সেই সেই অংশেব ক্রিয়াও অধিক হইতে থাকে, এজন্য পান্থলী, অস্থি এবং মস্তিষ্কেব পীড়া হইতে দেখা যায়।

শিশুসন্তানগণেব দন্তোদগমেব ৭ ৮ মাস পর্যন্ত তাহাদিগের সর্বদা জ্বনীশক্তিব আতিশয়, বক্তসঞ্চালন-ক্রিয়াব আধিক্য এবং শ্বাসযন্ত্রেব অতিবিক্রম উদ্দীপনা প্রযুক্ত প্রদাহ, জ্বর ও স্ফোটিকাদি পীড়া হইয়া থাকে।

বর্ধকো সম্ভাব্যঃ শ্বাস, কাস ও উদকাময়াদি রোগ দেহ অধিকার কবে এইরূপে জীবনেব ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যাধির আবির্ভাব হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

(৭) লিঙ্গ —স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতিব দেহেও প্রকৃতি সমান নহে। এই বৈষম্য প্রযুক্ত উভয়েব দৈহিক-ক্রিয়াব অনেক ভিন্নতম লক্ষিত হয়। পুরুষেব দেহ দৃঢ় এবং বলশালী বলিয়া বক্তপ্রাব ও প্রদাহ জন্ম বোগ প্রায়ই জন্মিয়া থাকে। স্ত্রীজাতির স্পর্শমুভাবকতা-শক্তি প্রবল এবং দেহ কোমল বলিয়া অধিক পরিমাণে শ্বাসবিক্রম পীড়া হইতে দেখা যায়। আর তাহাদের সূকল বোগেই অত্রো দুর্বলতা জন্মিয়া উপস্থিত হয়।

(৮) উদ্দীপন —দেহে তেজেব আধিক্য হইলেও পীড়া জন্মে, অতিবিক্রম পুষ্তিকর জ্বর, ভ্রুক্রম, উপযুক্ত পরিভ্রম না করিলে, শরীরে স্নেহবিশিষ্ট অধিক হইয়া প্রদাহ ও জ্বরা পীড়া হইয়া থাকে। এই জন্মই পরিভ্রমেব পথ সাংসারপীড়ার পীড়ার জন্মকর।

ধারের পীড়া, বিরোচক ঔষধ সেবনের পর অজ্ঞান এবং মানসিক চিন্তার পব যন্ত্রকের পীড়া হইয়া থাকে।

(৯) ব্যবসায়।—ব্যবসায়বিশেষে শাবীরিক ও মানসিক প্রযের স্যামাধিক্য বশতঃ বিশেষ বিশেষ পীড়া জন্মিয়া থাকে। শিল্পিক ও টেকিস-জগীর লোকদিগের অধিক শাক্যবায়-প্রযুক্ত শ্রমসম্বন্ধে পীড়া, ঘটিকা যন্ত্র-নিৰ্মাতাদিগের শিরঃপীড়া এবং সূচীকৰ্মকাবদিগের সৰ্বদা কুস্ত-ভাবে বসিয়া থাকা প্রযুক্ত উদ্বার পীড়া জন্মে।

উদ্দীপক কারণ।—পূর্ববর্তী কারণে রোগের সম্ভাব হয়, কিন্তু প্রকৃতভাবে রোগ দেহমধ্যে অবস্থিতি করে, কিন্তু যে কারণে সেই সকল রোগ সুপ্রকাশ পায়, তাহাকে উদ্দীপক কারণ কহে।

উদ্দীপক কারণ দুই প্রণীতে বিভক্ত;—প্রথম, বিজ্ঞেয় কারণ, অর্থাৎ যেগুলি অনুভব করিতে পারা যায়, দ্বিতীয়, অবিজ্ঞেয় কারণ, অর্থাৎ যাহাদিগকে অনুভব করিতে পারা যায় না।

বিজ্ঞেয় কারণ নয়টি, যথা;—(১) যান্ত্রিক অপচয়, যথা—বক্ষঃস্থলে আঘাত লাগিলে ক্ষতের, গুত্রস্থলে আঘাত লাগিলে মুত্রাঘাত, কণ্ঠদেশে দৃঢ়রূপে বস্তাদি পরিধান করিলে অজীর্ণরোগের কারণ হয়; (২) রাসায়নিক অপচয়, যথা,—জীবকাদি দ্রব্য সংস্পর্শে শবীরে ক্ষত, ক্ষতের উদরাময়াদি রোগের উৎপাদন, (৩) অযোগ্য পান ও ভোজন; (৪) মানসিক চিন্তার আধিক্য, (৫) অপরিষ্কৃত জল; (৬) অধিক পরিমাণে মল মুত্র ও শুক্রাদি কষ; (৭) মলমুত্র ও শুক্রাদিপাতের অস্পৃশ্যতা; (৮) সন্তাপ ও ঝাঝুর পরিবর্তন এবং (৯) অপরিচ্ছন্নতা ও নির্মল বায়ু অভাব।

অবিজ্ঞেয় কারণ অনেকগুলি; সাধারণতঃ—ম্যালেরিয়া বিষ, দেশ-বিশেষের স্থানিক শক্তি, মারক শক্তি, বিশ্বব্যাপিনী শক্তি এবং সংজ্ঞামক বিষ প্রভৃতি।

দেহের জীবনীশক্তি নষ্ট হইলেই তাহাকে মৃত্যুবলি। মৃত্যুর কারণ সকলে তিন প্রণীতে বিভক্ত করেন। (১) মাত্তিক; যথা—উদ্বীকন, জল নিমজ্জন, অগ্নিদগ্ধ, শীতাদিক্য ও বিষাক্ততা প্রযুক্ত; (২) শৈশবাবস্থায় দৌৰ্বল্য ও বার্দ্ধক্যের আত্মবিশ্ব অসুস্থতা এবং (৩) পীড়াবশতঃ মৃত্যু।

প্রাচীন হিন্দুদিগের চিকিৎসাশাস্ত্রে নিম্নলিখিত প্রকাবে বোগেব কাবণ অবধাবিত হইয়া থাকে । বায়ু, পিত্ত, কফ, বস, বক্ত, মাংস, মেদ অম্লি, মজ্জা এবং শুক্র মনুষ্য দেহেব প্রদান উপাদান বায়ু পিত্ত ও কফ শরীরক্রিয়াব পোষক, ইহাবা বিকৃত হইলেই বোগ ও যুগ্ম কাবণ হয় । যেমন চন্দ্রাকরণে শীতলতা উপাদিত হয়, সূর্য্যকিননে অগ্নিক্রমে শুষ্ককবে, এবং বায়ু ইত্যন্ত সঞ্চালিত হইয়া সৃষ্টিব সগতা বন্ধ কবে, সেইরূপ শ্লেষ্মাবা শরীরে শীতলতা জন্মে, পিত্তাবা তাহা শুষ্ক হয় এবং শরীরে সঞ্চালিত হইয়া দৈহিক ক্রিয়া সকলকে অশুদ্ধা-
লায় বন্ধ কবে

অবিধি আহারবিহাবাদি দ্বাবা বায়ুপিত্তকফ বিকৃত হইয়া সকল বোগেব কাবণ হয় অনাহার, অতিভোজন, কুদ্রব্য ভক্ষণ, অসুমেয় আহার ইত্যাদিকে অবিধি আহার বলা যাইতে পারে, এবং অতিবিক্ত শ্রম, অল্প শ্রম, তাপ ও শৈত্যেব আধিক্য বা অল্পত, অতিবিক্ত ইন্দ্রিয়-
সেবা, ইন্দ্রিয়সেবায় একেবাবে নিবৃত্তি, অল্প নিদ্রা ও নিদ্রাধিক্য প্রভৃতি ক্রিয়াকে অবিধি বিহাবমধ্যে গণ্য কবিত্তে হইবে ।

কোন কোন বোগ কোন কোন বোগেব কাবণও হইয়া থাকে যথ, — জ্বরসস্তাপ হইতে বক্তপিত্ত জন্মে, বক্তপিত্ত হইতে জ্বর জন্মে ।

হিন্দুশাস্ত্রকাবগণ অসংখ্যক বোগেব হেতুতত্ত্ব বলিয়া শীক-
কবিয়া থাকেন এইরূপে উপায় বোগসকলকে কক্ষজ বোগ বলিয়া

* বায়ু — বা ধাতুৰ অর্থ বহন কৰ; যদ্বাবা দেহস্থ সমস্ত যন্ত্রেব ক্রিয়াম্পাদিত হয়

* পিত্ত — পিত্ত ধাতুৰ অর্থ তাপ যদ্বাবা শরীরে তাপ বক্ষণ হয় ।

কফ বা শ্লেষ্মা — শ্লিষ ধাতুৰ অর্থ সংযোগ কৰা, যদ্বাবা শরীরিক-
দীর্ঘসমূহ পৰস্পর সংযোজিত হয়

বায়ু, পিত্ত ও কফকে ত্রিদোষ নামেও অভিহিত কৰা যায় যেখানে
এদোষেব উল্লেখ আছে সেখানে ত্রয় পিত্ত ও কফক বর্ণিত হইবে ।

অভিহিত করা হয়। ঔষধাদি প্রয়োগে এই সকল রোগেব কোন প্রতিকার হয় না; তাহাদের জন্য প্রায়শ্চিত্তাদি দৈবকার্যের অর্থান কর্তব্য।

এতদ্ব্যতীত পুত্রকণাদিগের জন্মকালে পিতামাতার কোন পীড়া থাকিলে, সেই পীড়া পুত্রাদিতে সংক্রমিত হয়। এই সকল রোগকে কুলজ বোগীল্লা গিয়া থাকে। কুলজ ও কুলজ রোগসকল যে বায়ু-শিত্ত-কফ বিরূত হইয়া উৎপন্ন হয়, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু, এই সকল স্থলে ত্রিদোষবিকৃতিব কাবণ কোন দৈবস্বত্র-সম্বাদ বলিয়া অনুমান করা হয়। ফলতঃ, বোগসম্বন্ধে যদিও কিছু অবধারিত করিবার প্রত্যক্ষ উপায় নাই, তথাপি, কুলজ বোগেব প্রত্যক্ষ কারণ আছে; জন্মসময়েই কুলজ রোগের স্বত্র শিশুদেহে সংধারিত হইয়া থাকে।

আর্য্য ঋষিগণ দেহ হইতে আত্মার বিযোগে যত্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। বুদ্ধাবস্থায় স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয় বিরূত হইয়া যে যত্ন হয়, তাহাকে স্বাভাবিক যত্ন কহে। তন্নিম্ন অপবিমিত পান ও ভোজন-দোষ, বজ্রাঘাত, বিষভক্ষণ, সর্পাঘাত এবং জলনিমজ্জন প্রযুক্ত যে যত্ন, তাহাকে আকস্মিক যত্নমধ্যে গণ্য করা যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

১১ রোগ ও রোগের সাধ্যসাধ্য-নির্ণয়।

যদ্বারা এক রোগ হইতে অন্য বোগকে প্রভেদ করিতে পারা যায়, তাহাকে রোগজ্ঞান কহে। চিকিৎসাকার্য্যে ত্রতী হইবার পূর্বে রোগ নির্ণয় করা আবশ্যিক। ইহা স্বাধাই চিকিৎসকের বিদ্যা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্তা যায়। বোগনির্ণয় না করিয়া ঔষধ প্রয়োগ, কেবল, অন্ধকারে লেটাই, নিক্ষেপের স্থায় অকার্য্যকর।

বোগীব বাহ্য অবস্থা দর্শন করিয়াই অনেক রোগ নির্ণীত হইয়া থাকে ।
পীড়ার লক্ষণ জ্ঞান আর একটা প্রয়োজনীয় বিষয় যেখানে দুই তিনটা
রোগেব একরূপ লক্ষণ দেখা যায়, সেস্থলে পূর্ববর্তী কাবণ দ্বারা রোগ
উপলব্ধি করিতে হইবে । সাধাবগতঃ, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দ্বারা রোগ
নির্ণয় করিতে হয় । যথা,—নাড়ীর গতি, এজ্ঞান, মল, জিহ্বা, নিঃশ্বাস,
চর্ম্ম, চক্ষু এবং পূর্ববিবরণ ।

নাড়ী পরীক্ষার সময় নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় অবশ্য বশিষ্ঠে
হইবে যথা,—চিকিৎসকের যোগীব নিকট উপস্থিত হইবাব কিয়ৎকাল
পরে নাড়ী পরীক্ষা কর্তব্য । একটা অপেক্ষা তিন চাবিটা অঙ্গুলি দ্বারা
অঙ্গ টিপিয়া নাড়ী পরীক্ষা কবাই উচিত, কেনন, তাহা হইলে নাড়ীর
বেগ ও নাড়ীতে বক্তের পরিমাণ জানিতে পাওয়া যায় । অতি শৈশব-
বস্থায় বক্তের গতি স্থির করা যায় না ; এজন্ত, ছত্ৰুপিণ্ডের স্পর্শনের
সংখ্যা গণনা কবাই উচিত বোগী স্নায়ু প্রধান-ধাতু-বিশিষ্ট হইলে,
তাহাব সহিত কথাবার্ত্তাদ্বারা তাহাকে অশ্রমনা করিয়া তবে তাহার
নাড়ী পরীক্ষা বিধেয় ।

সুস্থাবস্থায় নাড়ীর গতি স্থূলতায় সমান এবং অঙ্গুলীর নিম্নে ধীরে
ধীরে অনুভূত হয় । সর্বল স্ত্রী এবং বাল্যাবস্থায় স্ত্রী পুরুষ উভয়েবই
নাড়ী কিঞ্চিৎ বেগবন্তী ও সূক্ষ্ম হয়, এবং স্নায়ু প্রধান ধাতু-বিশিষ্ট লোক
দিগেব কিঞ্চিৎ মন্দগতি হয় ব্রহ্ম বয়সে ধমনীব দৃঢ়তা-হেতু নাড়ী ককশ
হইয়া থাকে । গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকেব নাড়ী অতি প্রুফ্ট ও বেগবন্তী হয় ।

সুস্থ লোকের নাড়ী বয়ঃকমানুসাবে এক মিনিট সময় মধ্যে নিম্ন-
লিখিত নিয়মানুসাবে গতিবিশিষ্ট হয় বা ধুক্ ধুক্ করে ।

জন্মকালে	১৪০ বার ।
প্রথম বৎসরের সময়	১৩০ "
দুই বৎসরের সময়	১১০ "
তিন বৎসরের সময়	১০০ "
সাত বৎসরের সময়	৯০ "
চৌদ্দ বৎসরের সময়	৮০ "

জিহ্বা বৎসবেব সময়	৮০ বাব ।
পক্ষাশ বৎসবেব সময়	৭৫ ”
আশী বৎসবেব সময়	৬০ ”

নাড়ী পরীক্ষার সময় যে তিনটি অঙ্গুলী দ্বারা নাড়ী পরীক্ষা কৰিতে হয়, সেই তিনটি অঙ্গুলী অতি ধীরে ধীরে নাড়ীর উপর স্থাপন করিতে হয়, টিপি ধরিলে ধমনীতে চাপ পড়ে, সুতরাং নাড়ীর প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারা যায় না। ডাক্তারের সচরাচর নিম্নলিখিত মত নাড়ী পরীক্ষা করিয়া থাকেন :—

যখন নাড়ী পরীক্ষা কৰিতে হইবে, তৎকালে হাতটি যেন বেশ সবলভাবে থাকে, কোন প্রকার টাইট জামা কিম্বা চাপ পড়িয়া হাতের নাড়ীর গতির যেন ব্যতিক্রম না হয়। নাড়ীর উপর পরীক্ষক অঙ্গুলি স্থাপন করতঃ ঘড়ি খুলিয়া ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটার সহিত নাড়ীর গতির পরিমাণ করিবেন। পবে উপরি উক্ত দুইধরুণের সংখ্যার সহিত মিলাইলে বোগীর অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। নাড়ী পরীক্ষা সকলের দ্বারা সূচক সম্পন্ন হইতে পারে না, বিশেষ অভিজ্ঞতা না জাগিলে নাড়ী দেখিয়া প্রকৃত বোগ নির্ণয় করা সম্ভব ব্যাপার নহে, তাই ইংরাজ চিকিৎসকগণ সহজে শরীরের অবস্থা ও রোগনির্ণয়ের জন্য এক প্রকার যন্ত্র অবিকার করিয়াছেন, তাহার নাম (Clinical Thermometer) “ক্লিনিকেল থার্মোমিটার” এই যন্ত্র ব্যবহারে বিনা ক্রেশে শরীরের উত্তাপ ও নাড়ীর অবস্থা অবগত হওয়া যায় এবং ইহার ব্যবহার সকলেই কৰিতে পারেন, এমন কি স্ত্রীলোকেও এই যন্ত্র ব্যবহার কৰিতে সক্ষম হইবেন। সবিশেষ বিবরণ পরিশীটে দেখুন।

কফপ্রধান এবং পিত্তপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের অঙ্গুলি জ্বায়ুপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের নাড়ীস্পন্দনের সংখ্যা অধিক। অবস্থান, শয়ন, উপবেশন এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় পেশী সকলের আকৃষ্ট ও প্রসারণের তাৎপর্যমুসারে নাড়ীর স্পন্দন-সংখ্যারও বীনাতিবেক হইয়া থাকে। সচরাচর দণ্ডায়মানাবস্থায় ৭৯, উপবেশনাবস্থায় ৭০, এবং শয়নাবস্থায় ৬৭ বাব নাড়ীর স্পন্দন হয়।

বোগবিশেষে নাড়ীর গতি সমযামুসাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয় নাড়ী-
স্পন্দনের কাবণ এই যে, রক্তাধাবের বৃহদংশ স্বভাবতঃ সঙ্কুচিত ও
প্রসাৰিত হইয়া শবীরেব বক্তবাহিকা নাড়ীতে বক্ত সঞ্চালন করে, এই
জন্ত নাড়ীতে ক্তপ্রবাহ ও তাহার স্পন্দন অম্মিত হইয়া থাকে
নাড়ীর গতি দ্বাৰা রোগের নানা প্রকাৰ চিহ্ন জানিতে পারা যায়

সাধাবণতঃ প্রাতঃকালে নাড়ীর গতি প্রশ্ল এবং সন্ধ্যাকালে যুহু হই
নিজাকালে যুহু এবং জাগ্রতাবস্থায় প্রবল হয় পৰিত্রম করিবার সময়
নাড়ীস্পন্দনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্মাধিক্য প্রযুক্ত শান্তিদূৰ-কালে অল্প হয়

তৎমাকু, গঞ্জিকা বা মদিবা সেবনের পব এবং কৃষ্ণ ও ভীতাবস্থায়
নাড়ীর গতি প্রবল হইয়া থাকে

সহজ অবস্থা অপেক্ষা নাড়ীস্পন্দনের সংখ্যা অধিক হইলে ক্রত-
গামী এবং অল্প হইলে মন্দগামী কহা যায় ক্রতগামী নাড়ী সচবাচব
স্বাযবিক পীড়াব লক্ষণ এবং উহাদ্বাৰা দৌৰ্বল্যের সহিত উত্তেজনা বুঝা
যায়। হুইবাব আকৃষ্টনের মধ্যসময় সমান হইলে নাড়ী সম, ঐ সময়েব
মধ্যে স্পন্দন একেবাবে অম্মভূত না হইলে তাহাকে ক্ষণবিলুপ্ত নাড়ী বলা
গিয় থাকে সমনাড়ী সকল বোগেই স্পন্দন ব চিহ্ন বক্তসঞ্চালন,
স্বাসপ্রশ্বাস ও স্নায়ুগুলেব ক্রিয়াব ব্যতিক্রমজন্য নাড়ী বিযম হয়,
বিযমনাড়ী দোষাপ্রিত দুর্বলতার জন্য, স্থাপিও ও কৃষ্ণসুগের মধ্যে
রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত ও মস্তিষ্কেব প্রদাহ জন্য নাড়ী ক্ষণবিলুপ্ত হইয়া
থাকে ক্ষণবিলুপ্ত নাড়ী বোগীর পক্ষে মঙ্গলদায়িকা নহে

১। দেহ নিশ্লেজ হইলে নাড়ী স্তব্ধ অম্মভূত হয়।

২ শীতাদিক্য হইলে প্রজাবের বর্ণ পৰিকার জলেব ন্যায় হইয়া
থাকে

অধিকালে বা অল্প কেনে ক্রাবণে স্তব্ধতা উপস্থিত হইলে প্রজাব
লোহিত বর্ণ ধাবণ কবে তখন ঐ প্রজাবকে কোন পৰিকার পাঠে
বাধিলে, তাহার নীচে লালবর্ণ ও ডা ও ডা সামগ্রী দেখিতে পাওয়া
যায়।

যখন অধিক মল নিঃসরণ ক্রীয়াব সময় অথবা শবীরেব অস্বাভাবিক

অধিক হয়, তখন প্রস্রাব অস্পষ্ট হয় । কোন কোন জ্বরে এবং জলোদর রোগে এইরূপ হইয়া থাকে ।

৩ যকৃতের ক্রিয়া বিরত হইলে মূলের আভাবিক বর্ণনট হইয়া যুক্তিকা বর্ণ হয় । যকৃতবস একেবারে বন্ধ হইলে মল শুক্লবর্ণ এবং যকৃত-রস অধিক হইলে মল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে । কিন্তু জ্বর স্তম্ভবরূপে জীর্ণ না হইলে, জ্বর মল নির্গত হয় । অত্বেব ভিতর কোন রোগ জন্মিলে শোষণক নাড়ী যদি জীর্ণ জ্বরে বসকে শোষণ কবিত্তে না পাবে, তবে মল জলবৎ তবল হয় ।

অত্বেব নলী প্রদাহযুক্ত হইলে, কোন কোন সময়ে তাহা হইতে বক্ত নির্গত হয় এবং উহাতে ক্ষত হইলে কখন কখন মূলের সঙ্গে রক্ত বাহিরও হইয়া থাকে ।

৪ শরীরে জলীয়াংশ অধিক হইলে জিহ্বা শুক্লবর্ণ ধারণ করে । প্লীহাদি রোগে এইরূপ লক্ষণ দেখা যায় ।

যখন রস বিরত হয় ও পেট পরিষ্কার না থাকে এবং জিহ্বাব উপবে ক্রম সঞ্চিত হয়, তখন নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, শরীরে জ্বর আছে ।

নানা প্রকার প্রদাহ বোগে জিহ্বাব চতুষ্পাশ্বে লালবর্ণ দাগু হয় ।

৫ নানা প্রকার জ্বরে নিশ্বাস গবম হব ও ক্রত বহিতে থাকে ।

৬ স্নেহ স্রুহে কখন কখন অস্পষ্ট পবিসনে স্বেদ নির্গত হয়, কিন্তু ঐ স্বেদ নির্গমন যদি কখন অস্পষ্ট, কখন অধিক, কখন বা কখন বন্ধ হয়, তবে উহা পীড়ার লক্ষণ জানিতে হইবে । পীল-জ্বর ও ক্ষয়কারী বোগে অধিক ঘর্ম নির্গত হয়, প্লীহা ও উদবাসম বোগে কখন অত্যন্ত পরিমাণে, যাবার কখন বা ঘর্ম নিঃসরণ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় ।

চক্ষু ।—শরীরের বক্ত যখন অত্যন্ত বিরত হয়, পরিমাণে অস্পষ্ট হয়, কখন উহাতে জলীয়ংশ অধিক থাকে, তখন চক্ষুর ক্ষেত্র অতিশয় শুক্লবর্ণ ধারণ করে । প্লীহাবোগে প্রায় চক্ষুর বক্তের চিহ্ন থাকে না ।

যকৃতজ্বরে ও রক্তের সূহিত যকৃতের রস অধিক থাকিলে চক্ষের ক্ষেত্র বিজালবর্ণ হয় ।

ভাবীফল ।—চিকিৎসাশাস্ত্র শাস্ত্র পর্যন্ত সম্পূর্ণ নহে ইহার

প্রথমাবধি আজি পর্যন্ত কত নূতন তত্ত্ব কত নূতন চিকিৎসা-প্রণালী, কত নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা গণনা করা যায় না। দৈনন্দিন সহিত জীবনের যে গূঢ়তর সম্বন্ধ আছে, তাহা আজি পর্যন্ত কাছাকাছি জানা যায় নাই; যে দিন হইবে, সে দিন যত্নাবও প্রতিকাব হইতে অধিক ক্লিষ্ট থাকিবে না। একপাশে, বোগ সাধ্য কি অসাধ্য নির্ণয় করিয়া তৎপক্ষে অভিপ্রায় প্রকাশ করা কতদূর গুরুতর ব্যাপার। অতএব এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবাব পূর্বে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। যদি কোন রোগীকে চিকিৎসাব অসাধ্য বলিয়া পরিত্যাগ করি, আর যদি কোন উপায়ে সে তাহা হইতে আবোগ্য লাভ করে, তবে কতদূর লজ্জার বিষয়, এবং সহজ পীড়াতেও যত্নাব আশঙ্কা সূচনা করিয়া আশাভঙ্গজনিত বোগীএ বিশেষ অনিষ্ট সংঘটন করানও কতদূর ভয়ানক।

দর্শন এবং যুক্তি এই দুই প্রকারে বোগের ভাবীফল জানা যায়। কোন লক্ষণ উপস্থিত হইলে কিরূপ ঘটনা হয়, তাহা মনোযোগ পূর্বক দেখিলে বোগ অনেক পরিমাণে নির্ণয় কবিতে পাওয়া যায়, আর যুক্তি দ্বারা রোগের প্রকৃত লক্ষণ সকলের কাবণজ্ঞান এবং অভিজ্ঞত দ্বারা অর্থাৎ পূর্বে সেইরূপ বোগের চিকিৎসায় যেকূপ পদ্ধতিবলধনে যাদৃশ ফল লাভ হইয়াছে, সেই জ্ঞানের সাহায্যে ভাবীফল নির্ণয় হইয়া থাকে।

রোগের সাধ্যাসাধ্য জানিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বাল্য এবং বার্দ্ধক্যে উৎকট নূতন বোগ হইলে প্রায়ই মারাত্মক হয়।

শ্রীলোকেব আয়বিক পীড়া অধিক হয়, শীতলতা হাব উদগম হয় না। কিন্তু সেইরূপ পীড়া পুরুষের হইলে যেকূপ সাংঘাতিক হয়, শ্রীলোকদিগের পক্ষে সেকূপ নহে। শ্রীলোকেব সকল পীড়াতেই যদি স্বাভাবিক ঋতু হয়, তবে সূক্ষ্ম জ্ঞানিতে হইবে। প্রসবেব পরে বসন্ত, মোহিত জ্বর (Scarlet fever) ইত্যাদি পীড়া অতীব সাংঘাতিক।

যে সকল ব্যক্তিএ ধাতু বক্তপ্রধান, তাহাদের সাংঘাতিক পীড়া অধিক

হয় স্বাযুপ্রধান ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিদেব সকল পীড়াতেই অতিরিক্ত যত্নগ্রহণ হয় পিত্তপ্রধান ধাতুতে বমন ও হস্তাপদাদি তল জ্বালা কবে

যে সকল ব্যক্তি অতিবিক্ত সুবাপান, অধিক ত্রীসহবাস, অল্প আহার এবং অতিবিক্ত মানসিক ও শারীরিক শ্রম কবে, তাহাদেব পীড়া অতিশয় প্রবল হয় ৷

যে সকল বোগে ঔষধ দিলামাত্র সহজে তাহার ক্রিয়া হয়, সে সকল পীড়ার সহজে প্রতিকার হইয়া থাকে হৃদয়, বসন্ত প্রভৃতি পীড়ার পুনর্যাব অর্থাৎ একবার ভাল হইবার অব্যবহিত পবেই আবার প্রকাশ পাইলে বিশেষ কৃষ্ণসাধ্য হয় না ; কিন্তু মুচ্ছাদি বোগ পুনঃ পুনঃ হইলে বিপদেব বিলক্ষণ আশঙ্কা থাকে জ্বর এবং অন্যান্য দৌর্বল্যকর পীড়ার পুনর্যাব হইলে সঙ্ঘাতিক হয় লোহিত-জ্ববেব পব বাত ও প্রমেহাদি বোগ কৃষ্ণসাধ্য ।

রোগশরীর অর্থাৎ বহুরোগ একত্র হইলে সুখসাধ্য নহে ।

মাবক স্থানিক এবং সংক্রামক পীড়ার পূর্ববর্তী কাবণ তীব্র হইলে রোগ দুঃসাধ্য হয় । উষ্ণপ্রধান দেশেব স্থানিক পীড়া প্রবল হইলে বহু লোকের প্রাণ সংহার কবে । বায়ুসঞ্চালনবিহীন স্থানেব সংক্রামক পীড়া প্রবলভাবে আক্রমণ কবিয়া থাকে ।

স্বপ্নিও, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, মূত্রাধার প্রভৃতি স্থানেব পীড়া প্রায় সহজে উপশম হয় না

শরীরেব বহুস্থানব্যাপী পীড়া হইলেই যে সঙ্ঘাতিক হয় এমন নহে, অল্পস্থানব্যাপী হইয়া যদি বোগ অত্যন্ত প্রবল হয়, তবে তাহাতেও নানা অনিষ্ট ঘটিতে পাবে

নিম্নলিখিত উপায় দ্বাৰা সহজে রোগ নির্ণয় হইয়া থাকে যথাঃ—

প্রথম—দর্শন ; অর্থাৎ মুখস্ত্রী, জিহ্বা ইত্যাদি পরীক্ষা ।

দ্বিতীয়—স্পর্শন ; অর্থাৎ নাড়ী ও দেহের উষ্ণতা দি পরীক্ষা ।

তৃতীয়—বোগেব বিবরণ, অর্থাৎ রোগীর স্বভাব ইত্যাদি সন্দেহ প্রথ জিজ্ঞাসা

নিম্নলিখিত উপায়ে বোগ নিরূপণকৈ গিয়া থাকে

প্রথম। নিশ্বাসের শব্দ বিশেষ দ্বারা কুম্ভকুমেব অবস্থা জ্ঞান করিবে।
 দ্বিতীয় স্পর্শদ্বারা দেহের শীতোষ্ণতা এবং হৃদয়ের কোমলতা ও
 কঠিনতা দি পরীক্ষা করিবে।

তৃতীয় চর্শনদ্বারা দেহের স্থূলতা, ক্ষীণতা এবং বর্ণ পরীক্ষা করিবে।

চতুর্থ আশ্বাস দ্বারা মুত্রাদি পরীক্ষা করিবে।

পঞ্চম। শব্দ দ্বারা নিশ্বাস ও পূরীষাদি পরীক্ষা করিবে। এবং
 অবশেষে প্রস্ন দ্বারা চিকিৎসক রোগীর স্বভাব, বল, ক্ষুধা, তৃষ্ণা দি এবং
 বোনের বিবরণ অবগত হইবেন।

নাড়ী পরীক্ষা। — প্রাতঃকালে নাড়ী শীতল থাকে এবং ধীরে
 ধীরে বহিতে থাকে, মধ্যাহ্নকালে গম্ভীর এবং দ্রুতগামী হয়, সায়াহ্নে
 চঞ্চল হয় ও দ্রুত বহিতে থাকে এবং বাত্রিকালে পুনরায় শীতল ও ধীরে
 ধীরে প্রবাহিত হয়।

বায়ু-প্রধান হইলে নাড়ী সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র প্রবাহে বহে, কফ-প্রধান হইলে
 ঘূর্ণ এবং পরিপূর্ণভাবে বহন করে, পিত্তপ্রধান হইলে ত্বরিত গতি হয়।
 ত্রিগুণ ত্রিগুণ বোগে নাড়ীর গতিও ত্রিগুণ ত্রিগুণ প্রকার হইয়া থাকে। নাড়ী
 পরীক্ষা করিবাব কিঞ্চিৎ পূর্বে হইতে তৎকাল পর্যন্ত রোগীর স্নান
 হার করা, অথবা অল্প কোন প্রকার কার্যাস্তবে ব্যাপ্ত থাকে উত্তে
 নহে। উক্ত সময়ে রোগীকে জাগ্রত এবং স্বচ্ছন্দভাবে থাকিতে হইবে।

হুই হুস্তের মণিবন্ধে, হুইঃ পদতলে, গ্রীবা ও কণ্ঠাধিব উপর এবং
 নামাস্থিত হুইপার্শ্বে নাড়ী পরীক্ষা হইতে পারে। মণিবন্ধে উপবেশ
 সাধারণতঃ নাড়ী পরীক্ষা করিবাব প্রথা প্রচলিত। চিকিৎসক বৃক্ষহস্ত-
 যারা রোগীর দক্ষিণ হুস্তের কল্পই ধারণ করিয়া আপনাব দক্ষিণ হস্তদ্বারা
 নাড়ী পরীক্ষা করিবেন। অধিলোকটিগেব বাম-হুস্তের নাড়ীর গতি
 পরীক্ষা করা কর্তব্য। নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা রোগী স্থূহ কি অস্থূহ এবং সে
 সাবোগ্য লাভ করিবে কি না, চিকিৎসক তাহা অবধারণ করিবেন।

প্রাতঃকালে মলমূত্র পরিচ্ছাদনের পূর্বে রোগী যখন শ্রবজ্ঞাবে উপবে-
 শন করিবে, সেই সময়েই নাড়ী পরীক্ষার উপযুক্ত সময়।

আহারকালে অথবা আহারের অব্যাহিত পবে, স্নানের পবে, ক্ষুধি-

ভাবস্থায়, স্বর্ধ্যোত্তাপে ভ্রমণেব পাবে, ব্যাঘাতমেব পাবে, অশ্রাবোহনাশে, তৈলমাত্রা দোষে, নিদ্রিতাবস্থায় শ্রীলোকের গর্তাবস্থায়, শিশুর জন্মিবাব অব্যবহিত পাবে, ভাববহনেব পাবে, দিবানিশিতে নাড়ী নাটক কালেব জমাগথেব ন্যায় চঞ্চল হইয় উঠে, অতএব, এই সকল সময়ে নাড়ী পরীক্ষা বিহিত নহে

অরকালে নাড়ী গরম এবং জ্বত বহিতে থাকে, কিন্তু বায়ুপ্রধান হইলে বড় চঞ্চল হয়, পিত্তাধিক্য হইলে নাড়ী বেগে বহিতে থাকে এবং ভেদেব স্থায় গতি হয় কফাধিক্য হইলে নাড়ীর গতি শুল এবং মৃদু হইয়া থাকে

উদ্বাসময় বোগে নাড়ী শীতল এবং দুর্বল বোধ হয় এই পীড়া বৃদ্ধ দিনেব হইলে নাড়ী শুল এবং কখন কখন জ্বতগতিও হয়

অজীর্ণ বোগে নাড়ী শুল হয়

বিসৃটিকায দুর্বল ও নিমগ্ন প্রায় বোধ হয়

ক্রিমিবোগে জ্বত, কখন শুল এবং কখন বা মৃদু অমৃদুত হয়

বক্ত্রাববোগে নিস্তেজ, চঞ্চল এবং কখন কখন মৃদু বহিয়া থাকে

মগ্নাবোগে মৃদু এবং দুর্বল হয়

কাশাবোগে জ্বত এবং অনিয়মিতরূপে বহন করে

শ্বাসবোগে তীব্র এবং জ্বত বহে

ছুর্দিবোগে মৃদু এবং অনিয়মিত প্রবাহ হয়

মূত্র পরীক্ষা কবিনা জন্য উত্তম পৰিকল্পিত পাত্র ব্যবহার কর্তব্য এবং প্রাতঃকালেই পরীক্ষা করা উচিত; বোগীর বাতাদিক্য হইলে, প্রস্রাব ধূসর বর্ণ হইয়া থাকে, পিত্তাধিক্য হইলে লালবর্ণ হয় এবং প্রস্রাবকালে স্রাবনাশ্চল হইয়া থাকে, শ্লেষ্মাধিক্য হইলে প্রস্রাব গাঢ় এবং ক্রমযুক্ত হইবে একাধিক দোষ প্রবল হইলে বর্ণ এবং অত্যাশ্চর্য লক্ষণ মিশ্রিত হইয়া আবিভূত হয়

বোগীর বাতাদিক্য হইলে জিহ্বা শীতবর্ণ, অসমান এবং গুল-জিহ্বাব স্থায় উল্কাযুক্ত হয় • পিত্তাধিক্য হইলে জিহ্বা লাল অথবা কাল ও উল্কাযুক্ত হইয়া থাকে • কফপ্রাধান্য হইলে সাদা, সবল-পদার্থ যুক্ত এবং আর্দ্র হয় বায়ুপিত্তকর্ম বিকৃত হইলে জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে

এবং কখন কখন উর্দ্ধাশুষ্কা ও দেখায় জিহ্বা সরল, শুষ্ক, পাঁচশটে বর্ণ ও উজ্জ্বল হইলে বোগীব মৃত্যুচিহ্ন হয় জানিতে হইবে ।

গর্ভধারণ-সময়ে জননীৰ শোণিতের অবস্থা, জবাযুৰ অবস্থানকালে গর্ভাশয়েব প্রত্যেক অংশের অবস্থা, গর্ভাবস্থায় জননীৰ আঁহিবগ্রহণ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সঞ্চালনের আভ্যাস, গর্ভধারণ সময়ে শাবীবিক্রম অবস্থা, শতু-কালীন শোণিত এবং পিতাব বীৰ্য্যের অবস্থানসাবে মস্তিষ্কার বায়ু, পিত্ত এবং কফাধিক্য প্রযুক্ত গ্রন্থিওব বিভিন্নতা জন্মে । উপবোক্ত কারণে বায়ুপিত্তকফ বিকৃত হইয়া সাময়িক পীড়ার উদ্ভব হইয়া থাকে ।

বায়ু, পিত্ত ও কফ বিকৃত হইয়াই যে, সকল বোগের উৎপত্তি হয়, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে চিকিৎসকেব তাহা সাবধান পূর্বক পরীক্ষা করা কর্তব্য ।

ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন পীড়ার সঞ্চাব হইয়া থাকে গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালে বায়ু বিবোধী হইয়া পীড় জন্মে ; শবৎকালে পিত্তাধিক্য এবং হেমন্ত, শিশির ও বসন্তকালে কফাধিক্য হইয়া পীড়া জন্মে ।

বায়ুবিকৃতিতে আশী প্রকার পীড়া, পিত্তবিকৃতিতে চল্লিশ প্রকার, কফবিকৃতিতে কুড়ি এবং বায়ু-পিত্ত-কফ বিকৃত হইয়া ষোল প্রকার পীড়া জন্মিয়া থাকে ।

সর্বমুখস্থিত বিষ হইতে সেরূপ সর্পের কোন অনিষ্ট করিতে পাবে না, সেইরূপ গর্ভস্থ শিশু-শাবীবস্থ বায়ু-পিত্ত-কফ দ্বারা তাহাদেব কোন ক্ষতি হয় না । গর্ভাবস্থায় শিশু-শাবীবস্থ উক্ত ত্রিদোষ আপনাব কার্য্য করিতে নিরস্ত থাকে । কিন্তু সম্ভাবন ভূমিষ্ঠ হইলেই প্রাকৃতিক জল বায়ু ও উত্তাপ প্রভৃতির সংস্পর্শে উক্ত বায়ুপিত্তকফের ভাবান্তর প্রাপ্তি হইয়া থাকে ।

ব্যায়াম, নিবাহার, শুষ্ক-ঔষ্য-ভোজন, উচ্চস্থান হইতে পতন, কোন প্রকার আঘাতপ্রাপ্তির পর অনির্জাব কাবণ, জ্বতিরিত্ত পৰিমাণে বস্ত্রভাব হওন, মেহনিঃসরণ স্থলবা শুক্রেক্ষয় জন্ত বায়ু বিকৃত হয় । স্নানের পর তুচ্ছ জব্য জীর্ণ হইবার সময়ে এবং সন্ধ্যাকালে বায়ুৰ প্রাবল্য হইয়া

থাকে অতিশীঘ্র ভয় ক্রিয়াক্রমে হইলে অথবা শীতল বাতাস গায়ে লাগাইলে বায়ু প্রবল ও বিকৃত হয়

বায়ু বিকৃত হইলে পাকস্থলীর নিম্নভাগ ক্ষীণ, শরীর উদ্ভাষিকা, শুষ্ক এবং কক্ষ্ম বোধ হয় বোগী অণুকোষে এবং বহিঃস্থ বেদনা এবং আপনাকে 'দগ্ধদয়, কাস্ত ও দুর্বল বোধ করবে । সর্বদা কক্ষ্ম, মুচ্ছা ও আক্ষেপ উপস্থিত হয়, তাহার অস্বাভাবিক অবয়ব সঞ্চালিত হইতে থাকে এবং শরীর বিকৃত হয় এতদবস্থায় বোগী অধিক বাক্যব্যয় কবে, নিদ্রাকালে এলোমেলো স্বপ্ন দেখে, জাগ্রতবস্থায় অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কথা কহে, কর্ণে সঙ্গীতের শব্দ অসুভব হবে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড় বোধকবে, দৃষ্টি ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস হয়, তৃষ্ণা র জন্ম মুখশোষ জন্মে, শরীর লোহিত বর্ণধারণ করে এবং তিক্ত স্বাদ অনুভূত হয়

কখন কখন বোগীর পাকস্থলীতে তীব্র (শূল) বেদনা বোধ হয়, শরীরের কোন কোন অংশ কঠিন মনে কবে, চক্ষুে ঝাপসা দেখে, কর্ণে নানা প্রকার উঃম শব্দ শ্রবণ কবে, তৃষ্ণা, তন্দ্রা ও কোন কোন ইন্দ্রিয়ের অসাড়তা অনুভব কবে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হয়, কুশ্ল এবং তদবস্থায় অসম্ভব কার্য্য বিনিতে থাকা অনুভব করে ও নিদ্রাকালে চীৎকার কবিতা থাকে এবং তৃষ্ণা শুষ্ক দেখায় ।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বায়ু বিকৃত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পীড়া উৎপাদন করে । মুখস্থিত প্রাণবায়ু বিকৃত হইয়া হৃদয়, হৃদয় প্রভৃতি বোগ উৎপন্ন করে এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্যের জন্ম শরীরে উদ্ভিদ বায়ু বিকৃত হইলে শ্বাস, কাস প্রভৃতি পীড়া জন্মে । পাকস্থলীস্থিত সমান বায়ু বিকৃত হইয়া হৃদয়, তৃষ্ণা, উদ্বিগ্ন, মুচ্ছা এবং বক্ষঃ ও পার্শ্বে বেদনা উৎপন্ন করে অগ্নি-বায়ু বিকৃত হইয়া মুত্রাশয়ে, শুষ্কদেহে, শুষ্ক এবং অজীর্ণ প্রভৃতি পীড়া উৎপন্ন করে বায়ু বিকৃত হইয়া শরীর ও তদন্তর্গত সমস্ত যন্ত্রের পীড়া উৎপাদন করেন ।

অম্ল, উত্তেজক, হোণ্ড ও কটু দ্রব্য এবং ঝাঁপেব কোড় ও তদ্রূপ অজীর্ণ দ্রব্য ভক্ষণ করিলে, তৃত্ত জ্বরে ক্ষুধা শান্তি না হইলে, তৃত্তদ্রব্য পানি পান করিলে না স্নিগ্ধ পুনঃপান করিলে, পূর্বে দিনের কোন

প্রকার বিকৃত বাজন ভক্ষণ কবিলে, দধি, মদ্য ও কাঁজি পান কবিলে, উষ্ণ বায়ু সেবন কবিলে, বিশেষতঃ শবৎকালে বা মধ্যাহ্ন সময়ের খাতামে অনারত থাকিলে, অতিশয় ক্রোধের উদ্বেগ হইলে এবং অতিবিক্ত রাজি জাগরণ করিলে নৈপত্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে

পিত্তাধিক্য হইলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, অমোদ্যার ও শরীরের সর্বস্থানে ফোটক হয়। মনুষ্য সর্বদাই ক্রোধপকবশ ও উদবেগ পীড়ায়ুক্ত হয়, তঁকু প্রসারিত, শরীর উষ্ণ এবং ঘর্ষ প্রচুর হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তি মদ্য-পানীয় ভাষ চলিয়া বেড়ায়, আহাৰ করিলেও যেন তাহার ক্ষুধার শাস্তি হয় না। অথবা সময়ে সময়ে আহাৰে প্রবৃত্তি থাকে না, বুদ্ধিমান হইলেও স্মৃতিশক্তি থাকে না, স্পর্শ দেখিতে পায় না, খাদ্যদিশেষে অনিচ্ছা জন্মে এবং সেই আহারীয় দ্রব্য গ্রাহ্যই অল্প, তিক্ত বা মিষ্ট বোধ হয়। শরীরে বেদনা অনুভূত হয় ও বর্ণ মলিন হইয়া থাকে।

মিষ্ট, অজীর্ণকর দ্রব্য এবং অতিশয় শীতল দ্রব্য, যথা, — দুগ্ধ, ইক্ষু, তবল দ্রব্য, দধি, পিষ্টক, নারিকেল এবং যত ভোজনে ও দিবানিদ্ৰায় ক্ষয় বৃদ্ধি হয় শীত ও বসন্তকালে আহাৰের পরে এবং দিবসের তৃতীয় ভাগ কফাধিক্যের কাল

কফাধিক্য হইলে উদর সর্বদা পূর্ণ বোধ হয়, ভুল দ্রব্য জীর্ণ হয় না। স্মৃতবাৎ ক্ষুধা থাকে না, সর্ব শরীর মলীন, ভার, শীতল, এবং ককর্ষ বোধ হয়; তঁকু মলিন ও তৈলযুক্ত দেখায়; মুখ, চোক ও মাক দিয়া ক্রোধ নির্গত হইতে থাকে। একপ ব্যক্তি দুর্বল, সর্বদা তন্দ্রায়ুক্ত এবং অতিশয় নিদ্ৰাপ্রবৃত্ত হয়। শরীরের যে স্থানে কফ সঞ্চিত হয়, সে স্থান ক্ষীণ হয় এবং মুখে অল্প ও মধুর স্বাদ অনুভূত হইয়া থাকে

যদি এই সময়ে দুইবা ততোধিক দোষ বিকৃত হয়, তাহা হইলে তিন তিন দোষের লক্ষণ সমুদায় দৃষ্টিগোচর হইবে এবং তিন তিন প্রণীর চিহ্ন সমুদায়ের আধিক্য দ্বারা দোষবিকৃতির পরিমাণ স্থির করিতে হইবে; তদনন্তর উপযুক্তরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

কোন দোষ বিকৃত হইলে, তৎক্ষণ অত্যাগ্ন ধাতু অপেক্ষা সামান্যতঃ শীতলই অধিক পরিমাণে ভ্রান্তিবিশিষ্ট হয় এবং তৎক্ষণ নামাপেক্ষ

ঔষধের প্রয়োজন হইয়া থাকে, এজন্য, সর্ব্বাঙ্গে চিকিৎসকের বিচার করা কর্তব্য যে, বোগের প্রকৃতি কিরূপ, তাহার পর কিরূপ ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্তব্য । বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয় বিকৃত হইলে প্রথমে তাহাকে প্রকৃত অবস্থায় অনিবার্য চেষ্টা করিতে হইবে এবং রস, বক্ত, অস্থি, মাংস, গজাদি ও ধাতু অক্ষত হইলে, যাহাতে তাহাদের পূর্ণতা জন্মে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে, অথবা, তাহাদের আধিক্য হইলে যাহাতে কমিয়া উপযুক্ত পরিমাণে আইসে, তাহাই উপায় দেখিতে হইবে।

ভাবীফল নির্ণয় ।—হিন্দুদিগের সকল কাজেই ঈশ্বরের উপর নির্ভর দৈবদ্বারা সকল কাজের, সকল ঘটনার শুভাশুভ অবদান করা অভ্যাস ; এজন্য, বোগবিনির্ণয়ে ও বোগের শুভাশুভ অবদানেও যে দৈবনির্ভর থাকিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ? আমরাইগের শাস্ত্রমতে পীড়িত ব্যক্তির শুভাশুভ নির্ণয়সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়ম নির্ণয় বিতৃত আছে। পীড়ার সংবাদ লইয়া যে ব্যক্তি প্রথমে চিকিৎসকের নিকটে উপস্থিত হইবে, তাহার আকাব, ভাবভঙ্গি ও পরিচ্ছদাদি দেখিয় চিকিৎসক বোগীর মঙ্গলামঙ্গল অনুমান করিয়া লইবেন একাধিক স্ত্রী কিম্বা পুরুষ বোগের বার্তা লইয়া আসা, অথবা যে ব্যক্তি পীড়ার সংবাদ লইয়া আসে, তাহার উচ্চ বা গর্দভ আবোহোণ, যষ্টি, রজ্জু বা শানিত অস্ত্র হস্তে, লৈহিত, কুম্ব বা আত্র বস্ত্র পরিধান, ছুঃখ বা ভয়বিহ্বল হইয়া চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করা অশুভজনক । বোগের সংবাদ দিবার জুহুতিষ-কের নিকটে কোন কদাকার, বিকৃতাকার ব্যক্তিকে প্রবেশ করা অথবা ভিষকের নিকটে তৈল মর্দনান্তে গমন করা, বোগীর সম্বন্ধে অশুভবার্তা ঘোষণা করা, রোদন করা, চর্ম্মপাট্টিকা বা চর্ম্ম ছন্তে চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করা এবং চিকিৎসককে বোগের রক্তাক্ত বলিবার সময়ে শরীরেব কোন অঙ্গ নখ দ্বারা কণ্ডুয়ন করা বোগীর প্রত্যেক অন্তদায়ক লক্ষণ নহে।

উষা ও সন্ধ্যাকালে, নিশীথে, মধ্যাহ্নে অথবা সন্ধ্যাকালে চিকিৎসক নিদ্রিত অথবা তৈল মর্দনান্তে জন, উলঙ্গ অবস্থায়, কিম্বা যথীন তিনি দক্ষিণাভিমুখে অবস্থিতি করেন, অথবা আত্মীয়স্বজনের অন্ত্যস্তিক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকেন, তখন তাহাকে বোগের সংবাদ দেওয়া ভাল নহে।

ত্রিদোষ জন্ম যে বোগ, অর্থাৎ যে রোগে, বায়ুপিত্তকফ তিনই বিকৃত হয়, সে রোগ কষ্টসাধ্য, অর্থাৎ তাহাতে রোগী প্রায়ই আবেগ্যালাভ করিতে পাবে না।

বাতব্যাধি, প্রমেহ, কুষ্ঠ, অর্শ, ভগন্দর, অশ্মবী এবং উদবী এই কয়েকটি ব্যাধি হইতে বোগীকে অতি কষ্টে আবেগ্যালাভ করিতে দেখা যায়।

কোন কোণে যদি রোগীর শ্বস অবিবৃত থাকে, সুখনিদ্রা হয় এবং আহাবান্তে শবীর স্নিগ্ধ বোধ হয়, তবে তাহার আবেগ্যালাভের পক্ষে আশঙ্কা থাকেনা।

যে কোন রোগে বোগী ক্লান্ত ও দুর্বল হয় এবং তাহার শ্বাসকষ্ট, ভৃক্ষা, শবীরের শুষ্কতা, বমন এবং জ্বর থাকে, তাহ মন্দ চিহ্ন বলিতে হইবে। কোন বোগেই উপদ্রবরূপে যদি উদবাময়, মুচ্ছা, এবং কাস বোগ জন্মে, তবে সে বোগ অসাধ্য বলিয়া জানিবে। কাশুপ্রধান বোগে যদি ত্বকে অসাড়তা বোধ হয় এবং সর্বদা ফুলিয়া উঠে, আব তাহার সহিত উদবাময় বা কাম্পন, বায়ুজন্ম বেদন কিম্বা একপ অথবা কোন লক্ষণ থাকে, তবে সে ব্যাধি আবেগ্যা হইবার নহে।

পূর্ববর্তী কোন কারণ ব্যতীত যদি কোন অঙ্গের বর্ণের রূপান্তর হয়, এবং দেহে শোণিত বিকৃত বর্ণ ধারণ করে, যদি কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্র তাহার প্রকৃত অবস্থায় না থাকে, কিম্বা উহা আয়তনে স্বাভাবিক অপেক্ষা ছোট বা বড় হয়, স্বাভাবিক উষ্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যদি শীতল হয়, ক্রিয়াশীল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিষ্ক্রিয় ও আদ্র স্থান শুষ্ক বলিয়া বোধ হয়, তবে তাহাদিগকে মারাত্মক চিহ্ন বুঝিতে হইবে। বোগী হস্তপাদাদি অবয়ব সকল সঞ্চালন করিবার ক্ষমতাহীন কিম্বা তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অগোচর হ্রাস, প্রসারিত, ভারযুক্ত বা লঘু বোধ হইলে কিম্বা জ্ঞানান্ধন কর্ম্য করিতে অক্ষম হইলে বোগীর মৃত্যু নিকট জানিবে।

প্রাতঃকালে যদি ললাটে ঘর্ষ হয়, চক্ষুর পীড়া ব্যতীত সর্বদাই যদি অঙ্গ পীড়িত হয়, অথবা, আহাব ব্যতীত প্রস্রাব মূত্র নির্গত হয় বা মলমিঃস্রব না হইয়া অতিরিক্ত ভোজনে সামর্থ্য হয়, তবে সেই সকল লক্ষণ কোনরূপে সুবিধা দ্রষ্টব্য নহে। যদি বোগীর বক্ষঃস্থলে উদব-

পৃষ্ঠাদি শরীরের অর্ধাংশ স্ফীত বা অকর্মণ্য হয়, বোগী বাক্য কখনে অসমর্থ হয়, কিম্বা তাহার বাক্যশক্তি বৃদ্ধি না থাকে, কিম্বা স্ববভু হয়, তবে তাহাদিগকে অসাধ্য লক্ষণ জ্ঞান করিতে হইবে। উক্তরূপে যদি নখ, দন্ত, মুখ কিম্বা সমস্ত শরীরে পচা ফুলেব গন্ধ নির্গত হয়, কিম্বা তাহার নষ্টীকন (ছর্দি), মল, অথবা শুক্র যদি জলে ভাসে, যদি দুগ্ধিতে এত দূর একে বহু বলিয়া বোধ হয়, কিম্বা অস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, শরীরে এই কেশ তৈলব্যতীত চাকটিক্যবিশিষ্ট হয়, বোগী দুর্বল থাকে, ক্ষুধামান্দ্য হয়, দেহেব দৌর্বল্য সত্ত্বে বমন হয়, বিশেষ মতঃ যদি ছর্দিব সহিত শোণিত নির্গত হয়, হস্তপদ, ওষ্ঠ ও অন্ত্র স্ফীত হয়, কিম্বা হস্তপদ ও ক্ষুদ্র এবং নিতম্বদেশে ব্রূষাকার ধারণ কবে, কিম্বা রোগী যদি জ্বরযুক্ত কাশ রোগে দুর্বল হয়, প্রাতঃকালেব ভুক্ত জর্য যদি স্ফাঘাত্তে বমন কবে এবং আপাতক্ ক্লেণযুক্ত মূত্রে কবে, যদি শরীরে কুকুবে চিবান গোছ বেদনা এবং জ্বর ও কাশি থাকে, যদি বোগী শয্যাগত হয়, বিকৃত শব্দ কবে এবং জননেন্দ্রিয়েব অনুভব শক্তি না থাকে, তবে সে সকল বিপদজনক চিহ্ন। জ্ঞান করিবামাত্র যদি অত্রো বক্ষঃস্থল শুষ্ক হয়, বোগী যদি অধর এবং জিহ্বা দংশন কবে, আপনীর কর্ণ, কেশ টানিতে থাকে, কিম্বা যদি সে দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, বন্ধু, অথবা তাহার চিকিৎসককে শত্রু জ্ঞান কবে, তবে তাহুব সাং খাতিক লক্ষণ উপস্থিত বলিয়া স্থির করিলে যদি গ্রহণ অপ্রায় থাকেন, রোগীব জ্ঞানক্ষতে যদি বজ্র অথবা উল্কাপাত হয়, তবে তাহাদিগকেও অশুভ চিহ্ন জ্ঞানিতে হইবে।

চিকিৎসক বিহিতবিধানে রোগ পরীক্ষা করিয়া ঔষধ দিলেও তাহা সেবন করিয়া যদি রোগেব উপশমন না হয়, তবে তাহাকেও একটা অশুভ লক্ষণ ধরিতে হইবে।

প্রথম অধ্যায় ।



• ফ্যালোপ্যাথিক-সংগত জ্বর-চিকিৎসা

• জীবদেহমাত্রেরই তাপ আছে, যতক্ষণ সেই তাপ থাকে, ততক্ষণ জুস্তগণ জীবিত থাকে, তাহার অভাব হইলেই মৃত্যু • অনেক জীবদেহের এই স্বাভাবিক তাপকেই জীবনীশক্তির সহিত অভেদ কল্পনা করেন তাপের পরিমাণ করিবার জন্ত তাপমাত্রা নামে এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করা হয় • সেই তাপমাত্রা দ্বারা শরীরের তাপ পরীক্ষা করা যায় • মানবদেহে স্বাভাবিক তাপের পরিমাণ দেশ, কাল এবং প্রকৃতিবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার • দেশস্থ তাপের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীর গতি এবং শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়াবও তাবতম্য হইয়া থাকে • এক ডিগ্রী তাপবৃদ্ধির সহিত নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে ৮বার অধিক হয় • যে সকল দেশে অত্যন্ত গরম নয় এবং অত্যন্ত শীতলও নয়, সেই সকল দেশে প্রাতঃকালে ৭টা হইতে ৮টা পর্যন্ত ৯৮.৭৪ ডিগ্রী, অপরাহ্ন ৩টা হইতে ৪টা পর্যন্ত ৯৮.৫২ ডিগ্রী, অর্দ্ধ রাত্রির সময়ে ৯৭.৯২ ডিগ্রী, এবং উষ্ণ-প্রধান দেশে প্রাতে ৬টার সময় ৯৮.০৭ অপরাহ্ন ২টার সময় ৯৮.৯ এবং ১০টা ও ১১টার মধ্যে ৯৯ ডিগ্রী স্বদেহে স্বাভাবিক তাপ নির্দিষ্ট হইয়াছে • এজন্য, সাধারণতঃ স্বাভাবিক অবস্থায় দেহের তাপ ৯৮ ডিগ্রী বলা যায় • তাহাতে পাবে ৯৮ ডিগ্রী তাপে নাড়ী ৭২ বার স্পন্দিত হয়, ৯৯ ডিগ্রীতে ৮০ বার, ১০০ ডিগ্রীতে ৮৮ বার ইত্যাদি •

পরিশ্রম দ্বারা দেহের সন্তাপ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তাহার পূর্ণ শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়িলে তাপের হ্রাস হইয়া থাকে • শীতল বাতাস গায়ে লাগিলে, মানসিক চিন্তার পর, আহারের পর, সূর্য্যোদয় কবিরাম অবস্থা-

বহিষ্ঠ পাবে ত পোবু হ্রাস হয় ; আবার সুবাপানের পূর্ব ক্রিয়াকাল গড় হইলে তাপাধিক্য হইয়া থাকে শীতল স্থান হইতে উষ্ণ স্থানে গমন করিলে তাপের বৃদ্ধি হয় ।

মানবদেহের আভাবিক অবস্থায় যে ৯৮ ডিগ্রী তাপের পরিমাণ অবশ্যবিত হইয়াছে, তাহা বৃদ্ধি হইলেই তাহাকে জ্বর বলা যায় এবং জ্বরকালে ১০১ হইতে ১০৫ ডিগ্রী পর্যন্ত দেহের তাপ বৃদ্ধি হয় উচ্চতর অধিক্য হইলে ১০৬ পর্যন্ত অধিক হইতে ১০৮ বা ১০৯ ডিগ্রী পর্যন্ত হইলে বোগীর মৃত্যু নিকট বুলিতে হইবে ।

জ্বরকালে ডকের উষ্ণতা এবং নাড়ীর ক্রতগমনের সহিত পিপাসা, শিবোবেদনা, অঙ্গনিগ্রহ, প্রলাপ, চক্ষুর আরক্তিমত্ব, মলনিঃসরণের অস্পৃশ্যতা, প্রস্রাবের আরক্তিমত্ব ও অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি নানাপ্রকার লক্ষণ আবির্ভূত হয় সকল সময় সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকে না, একত্র লক্ষণের তাবতমাত্রার জ্বর-বোগকে নানাজাতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে । সেই সকল জ্বরের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ও প্রতিকারের, উপায় ক্রমঃ উল্লিখিত হইতেছে ।

ইণ্টারমিটেন্ট,—সবিচ্ছেদ বা পালাজ্বর ।—এই জ্বরের লিলাম আছে বলিয়া ইহাকে সবিলাম জ্বর কহে দৌর্বল্য, বমনেচ্ছা, অমবোধ, নানা স্থানের মাংসপেশিতে বেদনা আবৃত্ত হইয়া শীত রোধ করে ডক আকৃষ্ট, নখ, ঠিষ্ঠ ও নাসিকার অগ্রভাগ নীলবর্ণ এবং কম্প আবৃত্ত হয় ক্রমে শীত বৃদ্ধি, দাঁতকপাতি, শ্বাসকৃচ্ছ, বক্ষস্থল ভারবোধ, মস্তক বেদনা, কখন কখন বমনেচ্ছা ও দাহ হইতে থাকে নাড়ী অতিশয় বেগাবতী হয় । এই জ্বর প্রবল হইলে শরীরের তাপ ১০৫ । ১০৬ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠিয়া থাকে দুই ঘণ্টা হইতে বার ঘণ্টা কাল এই জ্বরের স্থিতি

জ্বর ঘন হইবার সময় কপাল হইতে আবিষ্ট করিয়া সমস্ত শরীরে বিস্তৃত করিয়া দিয়া, শীতলীকৃত কমিতে থাকে, নাড়ীর গতি হ্রাস ও শ্বাস প্রশ্বাস ক্ষয় হয়, ডকের উষ্ণতা কমিয়া আভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় এইরূপে জ্বর বিবাম হইবার সময়ে নাড়ী বিশৃঙ্খল হইয়া কখন কখন

রোগীর প্রাণ নষ্ট কবে জ্বরকালে যে সকল বোগীৰ জ্বর ঘোবতবন্ধে প্রকাশ না হইয়া নাড়ীকে দুর্বল কবে এবং শ্বাস ঘন ঘন বহিতে থাকে, তাহাদেব প্রায়ই একপ বিপদ উপ হুত হয়

• চিকিৎসা — সাধারণতঃ শ্বাসপরিবর্তন, বলকারক অব্যব সহিত পুষ্টিকর খাদ্য, পোট্টো ভার থাকিলে অল্প ছটাক কমটির অয়েল বা সুলফেট অফ ম্যাগনেসিয়া ১ হইতে ৪ ড্রাম জ্বরমগ্নে ব্যবস্থা •

শীতলাবস্থায় ।—চায়ের জল পান পশমী কাপড়ে গাত্র ঢাকিয়া রাখা এবং গরম জল বোতলে পুৰিয়া সর্বদা তাহার মেথ দেওয়া কর্তব্য

• গরমাবস্থায় ।—মিষ্ট পানীয় ও শীতল জলে গাত্র মুছাইয়া দেওয়া ব্যবস্থা ঘর্ম কবাইবার জন্য—লাইকর ম্যানোনিয়া ম্যাশিট্যাটিস্, নাইট্রিক ইথাব, নাইটেট অফ পটাশ ও জল (ঔষধের মাত্রা পবিনির্দিষ্ট দেখুন।)

৩ ঘণ্টা অনন্তর ১ বার সেবন কবাইবে শিবঃসীড়া থাকিলে ৪ ৫ গ্রেন মাত্রায় ৪ ৫ বাব ব্রোমাইড্ অফ পোটাসিয়াম প্রয়োগ করিলে উপকার মর্শে

গরমাবস্থায় ।—জ্বরের প্রবলতা বিবেচনা করিয়া জ্বর আসিবার ২ । ৩ ঘণ্টা পূর্বে ১২ হইতে ৩০ গ্রেন পর্যন্ত কুইনাইন এক ঘণ্টা অন্তর সেবন কবান কর্তব্য । বিবাকাল অম্প হইলে অম্প সময়েই মধ্যে উক্ত পরিমাণ কুইনাইন সেবন কর্তব্য

জ্বর ত্যাগ হইলেও সবল হওয়া পর্যন্ত প্রতি দিন ২ হইতে ৫ গ্রেন প্রয়োগ করিতে হইবে ।

সবিরাম বা পাল্য জ্বর সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—

(১) কন্টিডয়ন বা ক্রীকারিক ।—ইহাতে প্রত্যহ ২৪ ঘণ্টা মধ্যে জ্বর আইসে

(২) টার্শিয়েন বা দ্ব্যাহিক ।—ইহাতে এক দিবস অন্তর অর্থাৎ প্রতি ৪৮ ঘণ্টায় জ্বর আইসে ।

(৩) কোয়ার্টেন বা ত্র্যাহিক ।—ইহাতে দুই দিন অন্তর অর্থাৎ প্রতি ৭২ ঘণ্টায় জ্বর আইসে

সবিবাম জ্ববে যেরূপ চিকিৎসার উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাতেও সেই নিয়মে চলিতে হইবে

রেমিটেন্ট ফিয়ার বা স্বল্পবিরামজ্বর ।—এই জ্বরে অতি অল্প শীতলাবস্থা অনুভূত হয়, কিন্তু জ্ববেব সমুদায় লক্ষণ একবারে নিলুপ্ত হয় না। শিবঃস্পীড়া এবং পাকাক্ষায়েব উত্তেজনা হয় ; ঘর্গ প্রায়ই হয় না, কেমন কোন স্থলে যদিও হয়, তাহাও অতি অল্প পরিমাণে ।

জ্বর আবর্তেব পূর্বে পাকাক্ষায়ে অল্প বোধ হয়, ক্ষুধা একেবারে থাকে না, বমনেচ্ছা, শান্তিবোধ, অবসন্নতা, আলস্যবোধ হইতে থাকে । সাধারণতঃ এই জ্বর দিবা দ্বিপ্রহর ও বাত্রি বিপ্রহবেব সময় আবির্ভূত হইয়া প্রায়ই প্রাতে অথবা সন্ধ্যাকালে মগ্ন হয় । এই জ্বর কখন কখন একজ্বরেও পবিনত হইয়া থাকে । ইহাব ভোগ দুই সপ্তাহ কাল জ্বরত্যাগেব সময় প্রভূত ঘর্গ হয়, তাহাব পূর্বে অত্যন্ত লক্ষণ সমুদায় তিরোহিত হইয় বোগীকে স্বচ্ছন্দ রাখে । মগ্নেব সময় কোন কোন উপজ্ব জুটিয়া বোগীব প্রাণ বিনষ্ট কবে । আবার কোন কোন স্থলে পুষ্ণাও সবিবাম জ্ববে পবিনত হইয়া একেবারে জ্বর ত্যাগ হয় ।

লক্ষণ ।—জ্বর আক্রমণেব পূর্বে কাহাব কাহাব ক্ষয় কম্পা অনুভূত হয়, বমনেচ্ছা ও বমন, বমনান্তেও উদবেব ভার বোধ হয়, বকেব উষ্ণতা বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বা শুষ্ক হইতে থাকে, পিপাসা হয়, ক্রমে শ্বেতবর্ণ সরেব মত এক প্রকাব পদার্থ দ্বারা জিহ্বা আবৃত হয় । জ্ববেব আবর্তে নাড়ী যত্ন বহিতে থাকে বটে, কিন্তু দেহেব উত্তাপেব সঙ্গে নাড়ীর গতি অত্যধিক হইয়া থাকে । মুখ লালবর্ণ, চক্ষু সজল ও কখন কখন অগ্নিক্রিম হয়, হস্তপাদান্তেও কষ্টদেহেব বেদনা, অত্যন্ত শিবঃস্পীড়া প্রভৃতি লক্ষণ সমস্ত ৬ হইতে ১২ ঘণ্টা কাল থাকে, পবে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্গ হইয়া জ্বর মগ্ন হইয়া যায় ।

উপসর্গ ।—এই জ্বর কখন কখন উদবাস্য, শিবঃস্পীড়া, কাশি, মূর্ছা, প্রমোবেব দৌষ প্রভৃতি উপস্থিত হয় ।

চিকিৎসা ।—এই জ্ববেব মগ্নকাল অতি অল্প হেতু এই সময়

জ্বর পৃথক চিকিৎসার উল্লেখ হইল না বোগীর কোষ্ঠ পবিদ্ধাব না
হইলে, নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়

ক্যাথোমেল	৩ গ্রেন
স্ক্যাননি	৩ গ্রেন
কলসিন্দ	৩ গ্রেন

একবারে সেবন করাইবে

জ্বরভোগকালে নিম্ননিখিত ঔষধ দেওয়া কর্তব্য :—

লাইকব য্যামোনিয়া স্যাশিট্যাটিস্	১ ড্রাম
স্পিবিট ইথাব নাইটি ক	১৫ ফোঁটা
পট্ নাইট্‌য়াম্	১০ গ্রেন
কপূর্ব জল	১ আউন্স

২ ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা সেবন করাইবে

উপসর্গের চিকিৎসা।—শিবঃপীড়া থাকিলে মস্তক মুণ্ডন করিয়া
ববফমিশ্রিত জল বা শীতল জল মস্তকে দিবে যকৃতে বেদনা থাকিলে
ফোঁমেটেমন বা গবম জলে ফ্যানেল ভিজাইয়া সেক দিবে ; অতিবিক্ত
বেদনা হইলে বিষ্কাব দিবে গাজদাহ থাকিলে গবম জল ভিজাইয়া
সর্বঙ্গ মুছাইয়া দিবে বমন ও বমনেচ্ছা হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ববফম
খাইতে ও পাকাশযের উপর “ম্যাটার্ড প্লাস্টার” দিতে হইবে, অথবা
এফাব ড্রুসিং ড্রাফ্ট (কার্বনেট অফ সোডা ও টার্টারিক স্যাশিড)
সহিত ২ ৪ ফোঁটা ক্লোরফর্ম দিলে নিবৃত্তি পায় উদর আধ্র্যাম
থাকিলে, ত্যাপিগতৈলেব সহিত উদবে ফোমেট করিবার উপদেশ
দিবে। প্রলাপ ও হস্ত-পাদাদির কম্পান থাকিলে, ষাড়ে বিষ্কারু দেওয়া
কর্তব্য।

বেগী দুর্বল হইলে মাংসের কোণ, দুধ, পোট, তিস্র প্রভৃতি পুষ্টিকর
দ্রব্য পথ্য দিবে এবং স্বগনাডি (৫ হইতে ১০ গ্রেন মাত্রা), স্যামোনিয়া-
(৫ হইতে ১৫ গ্রেন মাত্রা), বার্ক (১০ হইতে ৩০ গ্রেন মাত্রা) প্রভৃতি
বলকারক ঔষধ দিবে

নিম্নোক্ত ঔষধটীও এই অবস্থায় ব্যবহার করা যায়,—

স্পিবিট ইথার ক্লোরিক	৩ ড্রাম ।
লাইকব ম্যামোনিয়া ম্যানিট টিণ	৬ ড্রাম ।
৩০ইনুম কক্সাম (ত্রাণ্ডি)	৫ আউন্স
ডিবকুসন সিক্কোনা	৫ আউন্স ।

ছয় মাত্রায় সেবন কবাইবে ।

জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি বা জ্বরমগ্নে কইনাইন প্রয়োগ কবিবে ।

সাধারণ মত যে, এই জ্বরের কোন অবস্থায় বক্তমৌক্ষণ বা মার্কণী (পাবা) প্রয়োগ নিষিদ্ধি

ইওলো ফিবার বা পীতজ্বর — এই জ্বর বড় প্রবলরূপে আক্রমণ করে এবং ইহা যাবৎ বনাই সাংঘাতিক । জীজাতি অপেক্ষা পুরুষ-জাতিতে পক্ষে অধিকতর প্রাণনাশক । ওয়েস্ট-ইণ্ডিয়ান সমুদ্র কুলবর্তী স্থানে, দক্ষিণ আমেরিকা এবং স্পেন-দেশে প্রায়ই এই পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে ইহা সম্ভবতঃ সংক্রামক

লক্ষণ ।—এই জ্বর সাধারণতঃ ক্ষুধামান্দ্য, দৌর্বল্য, শিথিলতা, মানসিক নিস্তেজতা, গা হাত ভার, কবিয়া দেখা দেয় কখন কখন বা জ্বরের আরম্ভে শীতানুভব হয় জ্বরের পূর্ণাবস্থায় জিহ্বা মৌপযুক্ত হয়, ত্বক্ কমলাশ্বেতবর্ণ ধারণ করে, নাড়ী দ্রুত গমন করে, ত্বক্ উষ্ণ ও শুষ্ক হয়, চক্ষু বক্তবর্ণ ধারণ করে, যন্ত্রণাদায়ক শিথিলবেদনা প্রায়ই কপালের এক দিকে অর্ধভূত হইয়া থাকে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পুষ্কবেদনা ; তৃষ্ণা, অনিদ্রা, অস্থিরতা, কখন কখন বক্ত বা নীলবর্ণ পদার্থ বমন হয় হয়ত প্রস্রাব একবারেই বন্ধ হইয়া যায়, প্রলাপ, হিকা, কোন দ্রব্য গলাধঃকরণে বা বাক্যকথনে ক্লেশ অনুভব হয়, কখন বা, নাসিকা, দন্ত-মাড়ি, ওহ, যোনি প্রভৃতি স্থান দিয়া রক্ত নির্গত হয় নাড়ী যাবৎপবনাই দুর্বল হয়, এগন কি, প্রতি মিনিটে ৩০ বার মাত্র অনুভব করা যায়, ক্রমে জীবনীশক্তির হ্রাস হইয়া মৃত্যু উপস্থিত হয় । কিন্তু সে সময় পর্যন্ত জ্ঞান থাকে মৃত্যুকালীন প্রায়ই আক্ষেপ (থের্মী) হয় । এই জ্বরের তেজাকাল ৩ হইতে ৯ দিন । ইহাতে রোগী প্রায়ই বাঁচেনা

চিকিৎসা ।—এই রোগে পুডোফিলান, সলফেট অফ ম্যাগনেসিয়াম

এবং সিনা, ক্যালোমেলেব সহিত কুইনাইন, সল্ফেট অফ বিবিরিয়া, টীক্ষার পাবক্রোবাইড অফ আয়রন, নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিক য়াশিড, অল্প মাত্রায় মফি'য়া, ত্যাপিগ তৈল, ক্রিয়াশোট, লাইকর পোটাসি ইত্যাদি ঔষধ* ব্যবহার্য ।

ব্লিষ্টাব, উষ্ণ জলে গা'ব ধৌত কবন, মস্তকে শীতল জল শে'ক ইত্যাদি ক্রিয়া ও কবিত্তে হইবে বোগীকে পরিকৃত বায়ুসঞ্চালিত গৃহে রাখা কর্তব্য ।

পথ্য ।—য়্যাবাকট, বার্লিব জল, ববফ জল, চা, লেমনেড, মাংসব য়স্ ইত্যাদি

য্যামোনিয়া একেবাবে নিষিদ্ধ য়শায়ে বক্ত সংস্থান হইলে স্মরণ-যটিত ঔষধ ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নহে

সাধার' একজ্বর ।—একজ্বর সাধারণতঃ এক হইতে দশ দিন থাকে য্যালেরিয়াই ইহাব প্রধান কারণ, অথবা ক্ষতপরিপর্তন, গ্রীষ্মা-ধিকা, অপরিমিত শ্রম, অপরিমিত ও কুখাদ্য ভক্ষণ, অধিক মদ্যপান, মানসিক উদ্দীপনা এবং লোমকূপ দিয়া শবীরস্থ রৌদ্র নির্গত না হওয়াই ইহাব প্রধান কারণ ।

লক্ষণ ।—অকস্মাৎ দুর্বলতা, পাকস্থলী' উত্তেজনা, শীতানুভব এবং পৃষ্ঠ ও অন্ত্র' অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেদনার সহিত জ্বর দেখা দেয়

কিয়ংকাল পবে ত্বকের উষ্ণতা, নাড়ী' ক্ষতগতি, এমন কি প্রতি মিনিটে ১০০ হইতে ১২০ বার স্পন্দন, শি'বোবেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, পিপাসা, প্রজ্বাবেব অল্পতা, জিহ্বার রৌদ্র, মুখেব মলিনতা এবং কখন কখন প্রলাপ হইতে থাকে ।

তিন চারি দিবস পবে ঞ্জুত ঘর্ম হইয়া জ্বর ত্যাগ হয়; কাহার কাহার রক্তজীব বা উদরাময় হইয়া জ্বর মগ্ন হয় সাধাবণতঃ, বাত্রিকালে বোগের লক্ষণ সমুদায় রুদ্ধি এবং প্রান্তে ক্রাস হইতে দেখা যায় ।

*প্রত্যেকে রোগে ঔষধেব মাত্রা না লিখিয় প্যারিসিফে তাহা লিখিত হইয়াছে । বোগী' অবস্থা ও প্রকৃতি অনুসারে বিবেচনা মত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে বিশেষ বিশেষ স্থলে মাত্রা লিখিত হইবে

চিকিৎসা। — যক্ষ্মে বিনেচক, যক্ষ্মে - ক্যান্টন স্যামল, বোগী
দুর্বল হইলে বলবান ঔষধ পোজা, যক্ষ্মে, —

স্পিরিট ক্লোর ফর্ম	...	২০ ফোঁটা
ভাইনগ ক্যাম	...	২ ড্রাম।
ডিকক্সন সিকোন	...	১ আউন্স

একমাএ। এইকপ শিন ঘণ্টে অন্তর তিন বাব সেনন কবাইবে।
অগ্ন্য উৎসর্গ থাকিলে তিনবাবার্থ ঔষধ দিবে সঙ্গে সঙ্গে বল-
কারক পথ্য ব্যবস্থা করিবে

ট্রাইফস ফিবার। — এই পীড়া প্রায়ই সংক্রামক এবং সাধাবণতঃ
অন্যকর্তেব সময়ে প্রাচুর্যত হয় জনতাপূর্ণ গৃহে অথবা যে গৃহে সুন্দর-
রূপে পরিষ্কৃত বায়ুসুশালনেব উপায় না থাকে, সেই গৃহে বাস কবা জন্ত
এই পীড়া জন্মে চৌদ্দ হইতে একশ দিন পর্যন্ত ইহার ভোগেব
সময়।

লক্ষণ। — প্রথমতঃ কম্পা, অত্যন্ত নিবে বেদন পৃষ্ঠ ও হস্তপদা-
দিতে বেদনা, আলস্য, শান্তি বোধ, শারীরিক ও মানসিক প্রমে অনিচ্ছা,
মুখ পাঙ্গন বর্ণ, নাড়ী দ্রুতগামী কিন্তু বলহীন, সঘন শ্বাসপতন, ক্ষুধাশূন্য,
বমনেচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া ৩ ৪ দিবস মধ্যে স্পষ্ট জ্বর
দেখা দেয়। জ্বর প্রকাশ হইলে তৎ উষ্ণ, নাড়ী অত্যন্ত বেগবতী, প্রবল
পিপাসা, শিবঃপীড়া, মুখবর্ণ চক্ষু জলপূর্ণ, মনোবিকার ইত্যাদি চিহ্ন
প্রকাশ পায়। চতুর্থ দিবসে বোগী এমন দুর্বল হয় যে, শয্যা হইতে
উঠিতে পাবে না। এই অবস্থায় ক্ষণেক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হয়, স্বপ্ন দেখে,
প্রলাপ রকে, কখন নিদ্রাভিত্ত, কখন বা জাগ্রত থাকে; জিহ্বা
শ্বেতবর্ণ, লেপযুক্ত, অথবা ক্রান্ত পিঙ্গলবর্ণ ধারণ কবে, প্রস্রাব
পরিমাণে অল্প এবং রক্তবর্ণ হইয়া মূত্রাশয়ে সঞ্চিত থাকে সপ্তম
দিবস মধ্যে গায়ে লালবর্ণ দাগ বা কণ্ডু (টুলকনাব মূত দাগ)
দেখিতে পাওয়া যায় ৬ ইহার পর বোগী জাগ্রতাবস্থায় সর্বদা অস্থির
থাকে, প্রলাপ ও উচ্চঃস্ববে অসংযত ও অপলক্ষ্য বাক্য বলিতে থাকে,
শ্বাস প্রশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত হয় নাড়ী নিত্যন্ত নিস্তেজ এবং প্রতিমিনিটে

৯০ হইতে ১২০ বার স্পন্দিত হইতে দেখা যায়। ক্রমে অচেতন হইয়া
বধির হয়, মুখ ঈষৎ ব্যাদান কবিয়া থাকে, লোক-চিনিতে পাবেন
হাত পা অঙ্গ অঙ্গ কাপিতে থাকে, শূন্যমার্গে গেল কোন বস্তুকে ধরিবার
জ্ঞান চোঁট কবে, শয়ান বস্ত্রাদি আকর্ষণ কবিতে থাকে চিকিৎসা দ্বারা
এই অবস্থায় পীড়ার উপশম হইলে নাতী মবল হয়, বোগী চৈতন্যলাভ
কবে, আহাশেন ইচ্ছা হয়, মলমূত্রাদি স্বাভাবিক হয়, নতুবা ফুস্ফুসে বক্ত
সঞ্চিত হইয়া 'সংবই প্রাণ নষ্ট' কবে। যত অঙ্গ বয়স এই পীড়া হয়,
ততই মঙ্গলেব সম্ভাবনা, অধিক বয়সে হইলে প্রায়ই সংঘাতিক হয়

চিকিৎসা। বোগীকে স্বাস্থ্যকর খাদ্য দিবে এবং পবিত্র পবিত্র
জল ও উপযুক্তরূপে বায়ুসঞ্চালিত গৃহে রাখিবে শয়ান ও পবিধেয় সর্ব-
দাই পবিত্র রাখিতে হইবে

আকস্মিক প্রতিকারযোগ্য কোন ক্রিয়া যুক্তিযুক্ত নহে, বিশেষতঃ,
বোগেব প্রাবর্ত্তে কখনই কবা যাইতে পাবে না। সম্ভব আরোগ্যেব কোন
প্রতিকার নাই কুইনাইলে কোন ফল দর্শনা, এবং অনিষ্ট কবে প্রথমে
৩০ হইতে ৬০ গ্রেন কম্পাউণ্ড রবার পাউডারx সেবন কবাইবে এবং
প্রতিদিন নিম্নোক্ত ঔষধী নিয়মিতরূপে খাইতে দিবে

ডাইলিউটেড্ হাইড্রোক্লোরিক্ অ্যাসিড ২ ড্রাম।

মেলিমা ডেপুবাটী ১ আং।

ডিককুমন্ হোর্দিয়াই ১ পাইট

তুই তিন ঘণ্টা অন্তর দিবসে ৩৪ বার সেবন কবিত্তে দিবে

ঈষৎ জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া তদ্বারা গাএ মার্জনা কবিয়া দিবে এবং
মস্তকে শীতল জল দিবে

পীথ্য।—তুষ্ক, মাংসেব ত্বল লব্ধ কুকাণ, চঃ, বাফি ইত্যাদি

*রবার পাউডারকে গ্রেনবিজ পাউডার জবুলে—রবার চূর্ণ ২ আং,
লাইট ম্যাগনেশিয়া ৩ আং, শুষ্ঠীচূর্ণ ১ আং একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত
কবিবে, মাত্রা ২০ হইতে ৬০ গ্রো

যখন ওষধীশক্তি হ্রাস ও তজ্জন্ত বৈশী হ্রাস হইতে থাকে, তখন নিম্নোক্ত পথ্য বা ঔষধ ব্যবস্থা।

হংসু অথবা কুকুটভিষ		৩ টা
জল		৪ আং।
লাভি		৪ আং।

এখানে ভিষ ভাদ্রিবা ভাহাতে জল মিত্রিত কবিয়া পাবে ভ্রাণ্ডি মিশাইবে মিত্রিত হইলে অর্ধ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে এজাবের অস্পত্তা থাকিলে মদ্য ব্যবহার কবিবার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন কবিতে হইবে।

অগ্নিরত মিষাব অথবা অনিদ্রার প্রতিকার জন্ত মুখ্য মধ্যে অস্প-
মায়ায় আফিং উপক্ৰাবক।

কিঞ্চিৎ সুস্থতার অবস্থায় নিম্নোক্ত দুইটির কোন ঔষধ ব্যবস্থা।

সল্ফিউবিক য়াসিড্ য়াবোমেটিক্ ... ৩০ বিন্দু।

সিরাপি অব্যাগাই ২ আং

টীং সিল্কোনা ... ৫ ড্রাম।

ইন্ফিউজন্ সিল্কোনা ৬ আং।

অষ্টাংশ দিবসে ২ ৩ বার খালিপেটে খাওয়াইবে অথবা—

সল্ফেটস্ ফ বুইন ইন ... ১২ গ্রেন

লাইকব ফি কুনিয়া ... ৩০ বিন্দু

সল্ফিউবিক য়াসিড্ য়াবোমেটিক্ ... ৩০ বিন্দু

ইন্ফিউজন্ কোথাসিয়া ... ৮ আং।

একত্র মিশিত করিয়া অষ্টাংশ দিবসে ৩ বার সেবন বিধি

টাইফয়েড্ ফিবার। টাইফস্ সিবাবেব গ্রায় ইছাও সংক্রামক। এই বোগ আবৃত্ত হইবার দুই এক দিন মধ্যে শীতানুভব, শিবোবেদনা, স্পিগাসা, সর্কাদে বেদনা, দৌর্বল্য, উদবাসিষ, অস্থিবতা, মুগ্ধ মলিন, স্নাত হইতে দশদিনেব মধ্যে মুখে গোল গোল লাল দাগ দেখা যায়, তাহাদেব উপর হাত দিলে অনুভব কবিলে পাবা যায়, হাতে চাপ দিলে অদৃষ্ট হয়, পুনর্বার দুটিগোচর হয়, কিন্তু ৪৮ ঘণ্টা

পাবে প্রায়ই দেখা যায় না, প্রত্যাহ মায়ায় কম হয়, নাড়ী ৭৫
মিনিটে ১২০ অপেক্ষাও কখন কখন অধিক বাব স্পন্দন কবি
থাকে জিহ্বা শুষ্ক এবং কটাবর্ণ, কিম্বা লাল ও উজ্জ্বল. দেবায়
সর্বদাই ঘন লেগেযুক্ত থাকে, ওদ্রা প্রকোপ, বধিবতা, স্ফূর্তিহীনত
কখন কখন কটক বোধ, মূল হবিতাল, যুক্তিকাব গ্রায়, বক্তপ্রাণ, ধ
ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস, বক্ষস্থলে বেদনা, শ্লেষ্মাব সহিত বক্তচিহ্ন ইত্যর্থা
লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়. কাহাব কাহাব এই সকল চিহ্ন জু
আসিবাব এত শীঘ্র ও প্রবলরূপে আক্রমণ কবে যে, হঠাৎ বোগীবে
মাদকদ্রব্য কর্তৃক উত্তেজিত বলিয়া বোধ হয় যদি এই সকল চিহ্ন
ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক, ত্বকেব শীতগতা ও পবিপাকশক্তি
জন্মে, তবেই মঙ্গল, নতুবা বোগী দিন দিন জীর্ণ ও দুর্বল হইয়া বক্তপ্রাণ
কাশ ও উদবাসযেব বুদ্ধি হইয়া কালগ্রাসে পতিত হয় এই বোগে
রোগী ৩ ৪ সপ্তাহ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে

চিকিৎসা।—কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এবং তৈল অথবা কবাক
ব্যবস্থা; সল্ফেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া, জেলেকা বা সোনাগুখীর গ্রায় উগ্র
বিবেচক কোন মতে দেওয়া যাইতে পারে না

কেহ কেহ নিম্নোক্ত ঔষধটী দেওয়া যুক্তিযুক্ত বোধ করেন,—

ছাই ড্রাজ কম ক্রিটা	৩ গ্রেন।
পলুব ক্রিটা এবোমেটীক্স কম ওপি আই	৫ গ্রেন
মোডি বাই কার্ব	১০ গ্রেন

এক এক মাত্রা চাবি ঘণ্টা অন্তর সেবন কব ইতে হইবে। উদবাসয
ও বমন নিবারণার্থে,—

খিস্মথ নাইট্রাস	১০ গ্রেন
টীং ওপিআই	৫ বিন্দু
য়্যাসিড্ হাইড্রোসিলেনিক ডাইঃ	৩ বিন্দু
চক্ মিক্সচার	১ অং

এক এক মাত্রা ৩/৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন কবান কর্তৃক অ বুদ্ধকেবল
মাত্র বমন নিবারণ জন্য মোড ও হাইড্রো সিলেনিক য ৫ বা ১০

উদরাময় নিবারণের জন্ত নিম্নলিখিত যে কোন ঔষধ দেওয়া কর্তব্য

গ্লাসাই অ্যানিটাম্	৩ গ্রেন
থ্যামেটিক স্যাণ্ডাউ	৩ বিন্দু
মফিং হাইড্রে কোঃ	১০ গ্রেন
থ্যাকোয়া সিনেমন্	১ আউন্স ।

এক এক মাত্র ৩৪ ঘণ্টা অন্তর প্রায়ে গা করিতে হইবে

থ্যামেটিক স্যাণ্ডাউ	২ ড্রাম
টীং ক্যাম্ফর কম্ ওপিও	১ আউন্স ।
থ্যাকোয়া সিনেমন্	৬ আউন্স

এক আউন্স পরিমাণে দিবসে তিনবার আহাবের পূর্বে খাওয়াইতে হইবে।

পেটে বেদনী থাকিলে গরম জলের সেক, তাপিন তৈল মাখাইয়া ফোমেন্ট, অথবা পুলটীশ দ্বারা উপকার দর্শিতে পারিবে পেটফাঁপা থাকিলে অত্যন্ত মাত্রায় আফিজের সহিত বোগের আধিক্য অনুসারে ১০ হইতে ২০ বিন্দু তাপিন তৈল সেবন করান যাইতে পারে

বক্তব্য থাকিলে উদরের উপরে বরফ জল অথবা শীতল জল দেওয়া কর্তব্য এবং নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা

থ্যামেটিক স্যাণ্ডাউ	২ গ্রেন
তাপিন তৈল	৫ বিন্দু
থ্যামেটিক অফ লেড	১ গ্রেন
আর্গট অফ বাই	১ গ্রেন

উপলব্ধ না হইলে একবারে জন্ত জানিতে হইবে সেবনকালে বোগের অবস্থা বিবেচনায় ১০ হইতে ৩০ ঘণ্টা অন্তর সেবন ব্যবস্থা

প্রলাপ থাকিলে বাত্রিকালে ১০ হইতে ১৫ গ্রেন মাত্রায় ব্রোমাইড অফ পোট্যাশ ২ ১ বার অথবা টীং বেলেটোনা সেবন করাইলে উপকার দর্শে।

শেষী দুর্বল হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ বঃ ক্রমিক-রূপে ব্যবহায়া হইতে পারে

কুইনি সল্ফ	২ গ্রো
স্যানিড সল্ফিউরিক ডাইঃ	১৫ বিন্দু
সিবপ অফ অবের্গ	২ আং
সানকোয়া ককিই	১ আং

এক এক ঘাণায় দিবসে ২।৩ বার ব্যবস্থা।

পথ্য — বোগী অত্যন্ত দুর্বল হইলে দুধ এবাকট, মাংসেব ঝোল এবং যখন নাড়ীৰ গতি প্রতি মিনিটে ১২০ বাব থাকে, তখন প্রত্যেক বাবে ৪ ড্রাম হিসাবে ত্রাণি জনেব সহিত মিশ্রিত কবিয়া দিবাৰাত্রে ১০ ১২ বাব সেবন কবিত্তে দিবে, আর যদি নাড়ীৰ গতি ২০ ব উপ হয়, তবে ত্রাণিৰ পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। কিন্তু, সাবধান হইতে হইবে যে, যেন মস্তিষ্কেব উত্তেজনা না জন্মে

উদবস্ময় সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইলেও ৫ ৭ দিন পর্যন্ত কোন গুরু-পাক দ্রব্য ভক্ষণ কবিত্তে দেওয়া উচিত নয় কোন এক ব'উস্তিঙ্ক ভক্ষণ এককালে নিষিদ্ধ কেবল মৎস্য, অম্প পবিমাণে দুধ, ডিম্ব প্রভৃতি দ্রব্য কিয়দ্দিন পর্যন্ত খাইতে দিবে

এই বোগে যে স্বল্প-বিবাস জুবেব ন্যায় কোন কোন বোগীৰ জ্বর সামান্য মগ্ন দেখা যায়, ত হাতে অন্ন মাত্রায় কুইনাইন দেওয়া গিয়া থাকে।

বৈদ্যকমতে জ্বর-চিকিৎসা।



অন্যায় আর্হাব দিহাবাদি কর্তৃক ত্রিদোষ (বায়ু-পিত্ত-কফ) আশ্রয়স্থিত আর্হাবীষ বসের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় পাবকায়িক্রিয়া বোধকবে, বিশেষতঃ অগ্নিকে স্থানান্তরিত কবিয়া স্নায়ু শবীরে বিক্ষিপ্ত

কবে ও তজ্জন্য সন্তাপ জন্মে যে বোগে একই সময়ে ক্ষুধামান্দ্য, দেহেব উগ্রতা ও সর্বদা বেদনা অনুভব হয়, তাহাব নাম জ্বর

জ্বরের সাধারণ লক্ষণ — জ্বর হইবার পূর্বে বিনা পনিএমে কষ্ট, সকল কার্যে অনিচ্ছা, শবীবের বিবর্ণতা, মুখেব নীবসতা, চক্ষুব জলপূর্ণতা, শীত, কখন বোজে থাকিতে ইচ্ছা, কখন তাহাতে অনিচ্ছা, শরীরে বেদনা, জ্বন্তন (হ ই উঠ), শবীর ভাব, বোমাঞ্চ, অকচি, অন্ধকাব দর্শন, বিমর্ষতা ইত্যাদি লক্ষণ সকল প্রায় জ্বরের পূর্বে খটিয়া থাকে।

চিকিৎসা — ধন্য ১ তোলা ও পাটোল পত্র ১ তোলা, ৩২ তে লা জলে সিদ্ধ কবিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয় সেবন কবিবে।

বাতজ্বরের লক্ষণ — গাত্রকম্প, বেগেব বিষমতা, কঠ ও ওঠেব শুষ্কতা, অনিদ্রা, হাঁচি না হওয়া, শবীবের কক্ষতা, মস্তক ও বন্ধে অত্যন্ত বেদনা, মুখেব বিষমতা, মলেব বঠিনতা, পেটে শূল বেদনাব ন্যায় বেদনা, পেটকাঁপা এবং হাইউঠ

চিকিৎসা — চিবতা, মুখা, ঝুলঞ্চ, বালা, রুহতী, কণ্টিকাবী, গোক্ষুব, শালপানি, চাকুলে, শুষ্ঠী, প্রত্যেকেব ওজন ১৬ রতি ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ কবিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া সেবন কবিবে।

পিত্তজ্বরের লক্ষণ — অতিশয় বেগ, পাতলা মল, নিদ্রাব অন্ততা, বমি, কঠ, ওষ্ঠ মুখ ও নাসিকায় ফোন্সা, ধর্ম প্রলাপ, মুখেব কুটুতা, মুচ্ছা, দাহ, পিপাসা, বিষ্ঠা, মূত্র ও চক্ষের ছবিদ্র বর্ণ এবং ভ্রম।

চিকিৎসা — পাটোল পত্র ১ তোলা ও যবেব চাউন ১ তোলা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ কবিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া সেবন কবিবে।

দাহনিবারণ জন্য — কচি নিম্বপত্রবা কচি কুলপত্র অগ্নিনীব (কাঞ্জি) সহিত মদ্বন কবিয়া যে ফেণা উঠিবে, সেই ফেণা বোগীর গাত্রে মাখাইলে দাহ নিবারণ হয়

কফজ্বরের লক্ষণ — ভিজা কাপড় রাযে দিলে যেরূপ বোধ হয়, গাত্রেব সেইরূপ অবস্থা, জ্ববেগ মান্দ্য, অলসতা, মুখেব মধুবতা, মলমূত্রেব শুষ্কতা, শবীবের শুষ্কতা, উদর পূর্ণ বোধ, শবীবের ভাব

শীত, বোম্বাঙ্ক, অতিশয় নিদ্রা, নাশাস্রাব, অতিশয় কাশ ও চক্ষুঃশূলতা

চিকিৎসা।—নিমগ্ছাল, শুষ্ঠী, গুলঞ্চ, দেবদারু, শঠি, চিবাতা, কুড়, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, বৃহতী, প্রত্যেকেব ওজন ১৬ বতি, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া সেবন করিতে হইবে

কট ফল, কুড়, কঁকড়া শৃঙ্গী, পিপ্পলী প্রত্যেক সমান ওজনে লইয়া সকলের দ্বিগুণ মধু একত্র যোগে ২ মাসা পবিমাণে সেবন বিধি

বাতপিত্ত জ্বরের লক্ষণ —পিপাসা, ইন্দ্রিয়মোহ, ভ্রম, দাহ, অনিদ্রা, শিবোরেন্দনা, কঠ ও মুখশোষ বমি, রোমাঙ্ক, অকচি, অন্ধকাব-দর্শন, সন্ধিস্থানে বেদনা, হাই উঠা

চিকিৎসা —শুষ্ঠি, গুলঞ্চ, মুখা, চিবাতা, চাকুলে, শীলপানি, কণ্ঠিকা, বৃহতী ও গোক্ষুবি প্রত্যেকেব ওজন ১৭ দ০ বতি, জল ৩২ তোলা; একত্র সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে সেবন।

বিষ ১ ভাগ (গোমুত্রে ভিজাইয়া বোজে শুষ্ক করিয়াশোধন করিবে), মরিচ ১ ভাগ, পিপ্পলী ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগাব খই ১ ভাগ, হিঙ্গুল ২ ভাগ (জম্বীব বসে মর্দনে শোধন করিয়া লইবে), তাহার পব আদার রসে সমস্ত জব্য মর্দন করিয়া মুগপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে সাধারণ কাসপান মধু ইহার নাম “মৃত্যুঞ্জয় রস”

বাতশ্লেষ্ম জ্বরের লক্ষণ।—আর্জ বস্ত্রদ্বারা শরীর আর্জবৎ বোধ, সন্ধিস্থানে বেদনা, মস্তক বেদনা, নাশাস্রাব, কাশ, ঘর্ম, শরীরে তাপাধিক্য ও নাড়ীর মধ্যম-বেগ

চিকিৎসা।—বালুকা গবম করিয়া সর্ব্বাঙ্গে সেক দিবে পিপ্পল, পিপ্পলমূল, চত্রি, চিতামূল, শুষ্ঠ, প্রত্যেকেব ওজন ৩২ বতি, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া সেবন ইহার নাম “পঞ্চকোল পাঁচন”

আম এবং বেদনা থাকিলে মৌদালুর আটা, পিপ্পলমূল, মুখা, বটুকী, হযিতকী, প্রত্যেক ২৬ বতি, জল ৩২ তোলা, একত্র সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা

খ কিতে সেবন মৌদ পূব অর্টা সিদ্ধ না কবিয়া শেষে পাঁচনের জলেব
মহিত্ত্বলিয়া শুদ্ধন কর বর্জনা ইহাব নাম “আবগুধাদি পাঁচন।”

বিপ্লুছাল, সোনাছাল, গাশ্ববী ছাল, গনিয়াবি ছাল, পাকল ছাল,
শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কটিকাবী, গোক্ষুবি প্রত্যেকে ১৬ বতি, জল
৩২ তোলা, সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিলে সেবন। ইহাতে জ্বর, অপ-
দিগাক, তন্দ্রা, গাশ্ববেদনা, শ্বাস এবং কাশ নষ্ট হয় ইহাই “দশমূল
পাঁচন।”

পাবদ ও গন্ধক সমভাগে উত্তমরূপে মর্দনান্তে কজ্জলী প্রস্তুত করিবে ;
অনন্তব, কজ্জলী, লৌহভস্ম, তাম্রভস্ম, মীমাংস, পিপুল, শুষ্ক সমভাগ
এবং বিষ্ণু অর্থাৎ অমৃত অর্দ্ধভাগ একত্র জলে মর্দন কবিয়া ২ বতি প্রমাণ
বটী কবিবে অমৃপান আদাব বস ইহাকে “নবজবেত সিংহ কহে।”

পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরের লক্ষণ — মুখ চট চটে হয় ও তিক্ততা রোধ,
নিদ্রাবৎ কান্তি, মোহ, কাশ, অকুচি, পিপাসা ও পুনঃ পুনঃ দাহ হয়

চিকিৎসা। — কটিকাবী, গুলঞ্চ, বায়ুনহাটী, শুষ্ঠী, ইন্দ্রযব, ছবা-
লতা, চিবতা, রক্তচন্দন, মুখা, পটোলপত্র, কটুকী, প্রত্যেক :৪ বতি, জল
৩২ তোলা, সিদ্ধ কবিয়া ৮ তোলা থাকিলে নামাইয়া সেবন। ইহাতে
দাহ, তৃষ্ণা, অকুচি, বমন, কাশ ও পার্শ্বশূল নষ্ট হয় ইহাব নাম
“কটিকাবীদি পাঁচন।”

পাবদ ১ ভাগ ও গন্ধক ১ ভাগ (একত্র কজ্জলী প্রস্তুত), তাম্রভস্ম ১
ভাগ, অত্রভস্ম ১ ভাগ, স্নগভস্ম ১ ভাগ, লৌহভস্ম অর্দ্ধভাগ এবং হীরক
ভস্ম লৌহ ভস্মেব অর্দ্ধেক, একত্র ভূজবাজেব বসে মর্দন কবিয়া পপটিব
ন্যায়শীল কবিবে। পরে চূর্ণ কবিয়া ক্রমে ক্রমে নিম্নলিখিত জ্বাসকলেব

* দুইটী গোববেব তাল পাকাইয়া উহাদিগকে কচি কলাপাতেব
মধ্যে পুবিয়া, অগ্নিতে ঔষধ চাপাইলে যখন জ্বর হইবে, তখন খণ্ড খণ্ড
তালপত্রের অগ্রভাগে ঔষধ তুলিয়া ঐ পাতাভোড়া গোবরের তালেব
উপর রাখিয়া অপবটি চাপিয়া দিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বটী প্রস্তুত হইবে
ইহাকে পপটি পাকি।

বসে ভাবনা দিবে (মর্দন কবিবে) যথা, —সজিন, নিমিন্দ, বচ, চিত্ত, ভৃঙ্গবাজ, কদম্ব, কটিকাবী, গুলঞ্চ, জযন্তী, বকপাঙ্গ, ব্রহ্মী, ভিওনাজ, স্তম্বকুমারী প্রত্যেকেব বসে ৩ বাব মুষাষত্রে বালুকাপূর্ণ কবিয়া তাহাতে ঔষধ রাখিয়া অল্প জ্বালে পাক কবিবে পাকান্তে শীতল হইলে ঔষধ নামাইয়া ২ বতি পিবিমাণে ধোনেব কথ ও পিণ্ডনেব সহিত সেবন বিধি এই ঔষধ সকল প্রকাব ভাবে উপকাৰী এবং অন্যান্য ইহাৰ নাম “বজ্জগিবিবস ”

অর্ঘ্যত ১ ভাগ, সোহাগা ২ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, ৩ ম ৪ ভাগ দণ্ডীনীজ ৫ ভাগ, দন্তীৰ কাণে এক গ্রহব মর্দন কবিয ২ বতি প্রমাণ বটী—অনুপান আদাব বসু পথ্য,—তক ইহাব নাম ‘ত্রিপুরটেলব বস ’

সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ —এই জ্বরে কোন সময় দাহ, কোন সময় শীত, অস্থি, সন্ধি ও মস্তক বেদন এবং চক্ষুদ্বয় ঘোনাটে বা রক্তবর্ণ ও কোঠবগত, এবং চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে, কণ্ঠস্থে সর্বদা শব্দ শ্রবণ ও বেদনা বোধ হয়, কণ্ঠদেশে যেন ধানের সোঁধা লাগিয়া আছে এরূপ বোধ হয়, তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ, ধ্বাস, অক্টি ভা, ভিহব অঙ্গাববৎ ক্রমবর্ণ, গৌ জিহ্বাব আর্ষ খস্মগে, অঙ্গ নিখিল, মুখ হইতে কফমিশ্রিত বক্ত বা পিত্তেব উদগীৰণ, ইত্যন্তঃ শিথঃসঞ্চালন পিপাসা, অনিদ্রা, হৃদয়েব বেদনা, বহুকালে অল্প অল্প ঘর্ম ও মলমূত্র হয়, শরীর বড় ক্লান্ত হয় না, নিবন্তব কঠে অব্যক্ত শব্দ, শরীরে বোলতা বাগড়ানব মত শ্বেত বা লালবর্ণ গোল গোল দাগ, বাকুন্তি বহিত, উদবেব ওকতা, এবং বহুকালে দোষেব পবিপাক হয়

এই সান্নিপাতিক জ্বর ঐযোদণ প্রকাবে বিভক্ত, যথা, সিগ্রক, তাত্তিক, চিত্তবিভ্রম, কণ্ঠজ্বজি, কণিক, জিহ্বগ, কদাহ, ভগ্ননেত্র, অগ্রক, বক্তীব, সিঁতাঙ্গ, প্রালাপ ও অভিন্যাস

সিগ্রক-সান্নিপাতিকের লক্ষণ —দশ দিবস শেখাব বেগ এবং শূলকশ, সর্বদা অস্তিশয বেদনা ও শোথ ইহাব ভোগকাল মাত্ৰ দিন

তাত্তিক-সান্নিপাতিকের লক্ষণ । —অতিশয নিদ্রাব ক্টি, জ্বব,

শ্বাস, তৃষ্ণা জিহ্বাশোথ, কণ্ঠশোথ, গুলবিদ্ববৎ সৰ্ব্ব জে বেদনা, কণ্ঠে শুভ্র শুভ্র শব্দ, অগ্নিশক্তি ব অস্পতা ও কফের অস্পতা লক্ষিত হয় ইহাব ভোগকাল দশ দিবস ।

চিহ্নবিভ্রম-সন্নিপাতেৰ লক্ষণ ।—মত্ততা, মোহ, ভ্রম, তাপ, হাস্য, গীত, অথবা বাক্যালাপ, নৃত্য, কম্প, পীড়া, বিকৃতচক্ষু দর্শন ইহাব ভোগকাল চল্লিশ দিন

কণ্ঠকুস্তি-সন্নিপাতেৰ লক্ষণ —কণ্ঠে বেদন, জ্বর, মুচ্ছা, দাহ, কম্প, বিলাপ, মোহ, তাপ, শিবোবেদনা ও প্রলাপ । এই বোগ কষ্ট-সাধ্য । ভোগকাল ত্রয়োদশ দিবস

কর্ণিক-সন্নিপাতেৰ লক্ষণ ।—জ্বর, কর্ণান্তে শোথ, শ্বাস কাস, প্রলাপ, ঋষ্মনির্গত, কণ্ঠে বেদনা, তাপ, মোহ ও ভ্রম ভোগকাল তিন মাস ।

জিহ্মগ-সন্নিপাতেব লক্ষণ —বধিবতা, তাপ, দুর্বলতা ইত্যাদি এই বোগ অতিশয় কষ্টদায়ক ভোগকাল ষোল দিন ।

রুগদাহ-সন্নিপাতেৰ লক্ষণ ।—মোহ, তাপ, প্রলাপ, কণ্ঠবেদন, ভ্রম, ভ্রমবোধ, সৰ্ব্বাঙ্গ বেদনা, পিপাসা, শবীববেব জড়তা, শ্বাস ও বমন । ইহা সৰ্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর । ভোগকাল কুড়ি দিন

ভগ্ননেত্র-সন্নিপাতেৰ লক্ষণ —শ্বাস, কোষ্ঠবগত চক্ষু, কর্ণে শোথ, অত্যাধিক জ্বর, মোহ অথবা বাক্যালাপ, কম্প, ভ্রম ও অধিক নিদ্রা এই জ্বর নিম্নতম মাবত্বক ভোগকাল আট দিবস ।

আগন্তুক-সন্নিপাতেৰ লক্ষণ —দাহ, মোহ, শিরকম্পা, হিকা, শ্বাস, গাত্রবেদনা ও মত্তাপ ইহাতে নিম্নতমই বোগীব মৃত্যু হয়

রক্তচীব-সন্নিপাতেৰ লক্ষণ —মুখনিখা অস্প পাবিমাণে রক্ত বমন, মুচ্ছা, জ্বর, মোহ, পিপাসা, ভ্রম, বমন, হিকা, দেব মল নিঃসরণ, সংজ্ঞানাশ, শবীববেদনা, অমজ্ঞান, শরীববে রক্তবর্ণ মণ্ডলাকাব চিহ্ন প্রকাশ ও শ্বাস, এই সন্নিপাতজ্বর প্রাণনাশক । ভোগকাল দশ দিন

প্রলাপক-সন্নিপাতেব লক্ষণ —মাবাত্তক প্রলাপ সন্নিপাতে অপ্রসঙ্গ বাক্যালাপ, শবীববে জড়তা, কম্পদ্বাবা পীড়ানুভব, সংজ্ঞানাশ,

অতিবিক্ত জ্বালা, পান্দনোথ, শবীরে অতিশয় বেদনা ও অতিশয় হ্রগন্ধ ।
ভোগকাল চতুর্দশ দিবস ।

সিতাগ্নি সন্নিপাতের লক্ষণ — শবীর শিথিলের ন্যায় শীতল,
দ্রব মূল, কম্পা, কর্ণে সপ্ সপ্ শব্দ এবং, হস্তেব কিঞ্চিৎ উষ্ণতা
এবং হিঁকা ও শ্বাস লক্ষিত হইবে, কিন্তু, ক্রমে ক্রমে সর্বশবীর শীতল
হইলে এই বোগে জীবন নষ্ট হয় । ভোগকাল ৭ বা ৮ দিন ।

অভিন্যাস সন্নিপাতের লক্ষণ — ব'য়ু পিত্ত ও কফ এই
তিন দোষেবই প্রাবল্য, মুখেব শুষ্কত, অনিদ্রা, বাকশক্তিব হীনত,
চেতনানাশ, অতিশয় শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও দুর্বলত । ভোগকাল
পনের দিবস ।

সান্নিপাতিক জ্বরের কৃচ্ছ্রসাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ ।—
সান্নিপাতিকজ্বরে কোষ্ঠবদ্ধ ও বায়ুপিত্তকফাদি দোষেব বিবর্তিতা ঘটিলে ও
সম্পূর্ণরূপে অগ্নিমান্দ্য হইলে এবং যে সমস্ত লক্ষণ উক্ত হইল, তাহাদের
সমুদায়গুলি প্রকাশ পাইলে অসাধ্য । আর ইহার অন্যথা ঘটিলে,
অর্থাৎ যদি অগ্নি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট না হয়, গল নিঃসরণ হয়, এবং সমুদায়
লক্ষণ প্রকাশ না পায়, তবে সেই সান্নিপাতিক জ্বর কৃচ্ছ্রসাধ্য ।

সান্নিপাতিক জ্বরের সীমা ।—এই জ্বর প্রায় সপ্তম, দশম বা
ত্রাদশ দিবসে অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া পবে উপশম হয়, অথবা প্রাণনষ্ট
কবে । অপব চতুর্দশ ও দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত বোগমুক্তির অথবাবিহীন
দিন নির্দিষ্ট আছে ।

সান্নিপাতিক-জ্বরের সাংঘাতিক উপদ্রব ।—জ্বর আরম্ভে
অথবা পরে কর্ণমূলে অত্যন্ত শোথ হইলে, সেই বোগে বোগী প্রায় মুক্তি-
লাভ কবিতে পাবে না ।

অভিন্যাস জ্বরের লক্ষণ ।—অভিন্যাস নামে আর এক প্রকার
সান্নিপাতিক জ্বর আছে । এই জ্বরে কুপিত বায়ুপিত্তকফ হৃদয়স্থ
সবাহী স্রোতসমূহে বাইয়া আমবসেব সহিত মিলিত ও অত্যন্ত বর্দ্ধিত
হয়, তদনন্তর বুদ্ধীন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, প্রভৃতি এবং মনকে
গাশ্রয় করিয়া অতি প্রবল দ্রুত উপোদ্রব কবে । এই বোগে দর্শন,

এবং, জ্ঞান ও স্পর্শন প্রভৃতি ক্ষতিব্ধ হলে পিঁ হঠেয়া থাকে এবং বোগী শয়ন কবিয়া সর্বদা পার্শ্বপরিবর্তন করে, অঙ্গ কথা বলে, অথবা কষ্ট হইতে অব্যক্ত শব্দ নির্গত করে বোগীব গায়ে সূচী বিদ্ধ হইবার আশা বেদনা, অর্থাৎ অনিচ্ছ ও মস্তক পরিচালিত হইতে থাকে । এই ক্ষেত্রে অধিকাংশ বোগীই কান গায়ে স্পর্শিত হয়, অতি অঙ্গই অঙ্গবোধ্য হইতে পারে

চিকিৎসা । সন্নিপাত জ্বরে মনোবদন শবীর জলময় হইয়া উঠে, স্নেহ, অগ্নিক্রিয়া ব্যতিবেকে কে তাহা শোষণ কবিবে ? এজন্য ক্ষেদ্র ত্রিষা কুর্ভবা যদি রোগ জন্ম ক্ষেদ্র হয়, তবে তাহা অবিধি ।

নম্য পিপ্পলীমূল, সৈন্ধব লবণ, পিপ্পলী ও মউলসার সমান ভাগে চূর্ণ কবিয়া সকলের সমান মরিচচূর্ণ একত্র মিশ্রিত কবিবে, অনন্তর ঈষৎ উষ্ণ জলেব সহিত নম্য প্রদান কবিলে বোগীব চেতনা লাভ হয় এবং ওদ্রা প্রলপ ও মস্তকেব ভাব নিবাবিত হইবে

নিষ্ঠীবন — সৈন্ধব, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ সমান ভাগে চূর্ণ কবিয়া জাদাব বসে গুলিয়া আকট মুখে পূর্ণ কবিয়া রাখিলে অতি গাঢ় শোণা উঠিয়া শবীরেব ভাব নষ্ট হয়

কারব্যাদি পাঁচন — কুম্ভজীবা, কুড়, ভেবেণ্ডামূল, বলা ডুম্বর, শুঁঠ, ওলঙ্ক, দণ্ডমূল, পাঠি, কঁকড়াশুড়ী, দুবালভা, বায়ুনহাটী, পুনর্নব, সমস্ত মিল ইয়া হুই তোলা, বত্রিশ তোলা জলে সিদ্ধ কবিয়া আট তোলা থাকিতে নামাইয় পান করিতে দিবে ইহাতে ঘোব অতি শাস জ্বব নষ্ট হয়

প্রোথ প্রলেপ — কুম্ভ কনাই কটকল, শুঁঠ কুম্ভজীবা, ইহা দুই চূর্ণ সমভাগে অগ্নিতে সেকিয়া মিজ পুনেব বস বাহিব কবিবে, সেই বসে মর্দন কবিয়া সামান্য গবম কবিয়া কর্ণমূলে প্রলেপ দিবে

ঔষধ — পাবা, গন্ধক (কজ্জলী), অম্বু, ধুতুরাবীজ, মরিচ, হবী-ভকী, অর্ণমাফিক, সমান ভাগে লইয়া দণ্ডীকাথে তিন দিন ভাবন দিবে অনন্তর এক বটি প্রমাণ বটি প্রস্তুত কবিবে ইহাতে অযোদন প্রকাব চিকিৎসা হইবে বিনষ্ট হয় ইহা নাম 'কী'

ব্রহ্মরন্ধু রস পাণা, গন্ধক, অত্র, সোহাগার খই, সৈন্ধব লবণ, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগ, অমৃত সকলেব সমষ্টিব সমান সর্বসমষ্টিব চতুর্থাংশ পরিমিত গহ্বিষ পিত্তেব সহিত মর্দন কবিয়া অশ্রদ্ধাবা বন্ধবন্ধে, ক্ষত কবিয়া ঔষধ লাগাইবে অজান অবস্থায় প্রযোজ্য মস্তকে জল দিবে ও অন্যান্য শীতল ক্রিয়া কবিবে

• মৃতসঞ্জীবনী রস ।—পান ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা কর্জলী কবিয়া, অত্র, লৌহ, তাম্র, অমৃত, হবিতাল, কড়িভস্ম, মনঃশীলা, হিঙ্গুল, স্বর্ণমাক্ষিক, চিতামূল, হাতিশুঁড়াব মূল, আতাইচ, শুঠ, পিপ্পল, মবিচ, প্রত্যেক ১ তোলা আদ, নিষিন্দা সিদ্ধি ইহাদের প্রত্যেকের রসে তিন দিন কবিয়া ভাবনা দিয়া ও মর্দন কবিয়া, মাটির লেপ দেওয়া বোত-লেব মধ্যে স্থাপন পূর্বক অঘোব মন্ত্রে পূজা কবিয়া বালুকায়ত্রে দুই প্রহর পাক কবিবে। পূর্বদিন শীতল হইলে পুনর্বার ঐ ঔষধকে আদাব রসে মর্দিত কবিয়া শুষ্ক কবিবে মাত্রা ২৩ রতি ঔষধ সেবনান্তে শীতল ক্রিয়া কবিবে অঘোব মন্ত্র যথা,—“ওঁ অঘোবভ্যশ্চ ঘো-বোভ্যো ঘোবঘোবতবেভ্যশ্চ, সর্বঃ সর্বৈভ্যো নমোহস্ত রুদ্ররূপেভ্যঃ ”

অঘোরনৃসিংহ রস তাম্র ১ ভাগ, লৌহ ৩ ভাগ, বঙ্গ ৩ ভাগ, অত্র ৪ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ, রস ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, মনঃশীলা ১ ভাগ, কৃষ্ণসর্পবিষ ৪ ভাগ, ত্রিকটু ৪ ভাগ, কুচিলা ২২ ভাগ, কাষ্ঠবিষ ৮ ভাগ এই সকল দ্রব্য মর্দন কবিয়া বোহিত মৎস্য, গহ্বিষ, ময়ূব ও শুক-বেব পিত্তে এবং চিতাব রসে এক প্রহর কবিয়া ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিবে অনন্তব সর্ষপপ্রমাণ বর্জী প্রস্তুত কবিয়া বোজে শুষ্ক কবিবে অল্পপান ডাবেব জল ত্রয়োদশ বিধ সন্নিপাত জ্বর ও বিষটিক বোগে প্রযোজ্য

• মৃতসঞ্জীবনী রস —এক বৎসরের পুরাতন শুভ ৩২ সের, কুট্টিত বাবলাব ছাল ৩০ পল, দাড়িম ছাল, বাসকছাল, মোচরস, বরাকান্তা, আত-ইচ, অশ্বগন্ধা, দেবদাড়, বেগ ছাল, সোজিনা ছাল, পাঁকল ছাল, শাল-পাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোঁফুবী, কুল, বাখাল শশাব মূল, চিতা-মূল, আলকুশী বীজ, পুনর্নবা, প্রত্যেক ১০ পল (কুট্টিত) এবং জল ২৫৬ সেব এই সকল একত্রে গুলিয়া একটা জুলায় ব দিয়া তাহাব মুখ বন্ধ

কবিবে ১৬ দিনেব পব সুবাপি ৪ সেব, ধুতুবা মূল, লবঙ্গ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণাব মূল, বক্তচন্দন, শুলফা, যমানী, মরিচ, জীবা, কৃষ্ণজীবা, শঠী, জটামাংগী, গুড়ত্বক, এরাইচ, জায়ফল, মুখা, গোটেল, শুঁঠ, মেথী, মেয়শঙ্গী, শ্বেতচন্দন প্রাতে কে ২ পল । এই সমুদায় দ্রব্য কুটীত কবিয়া জালায় দিয়া মুখবস্ত্র কবিয়া ৪ দিন বাখিবে । পূরে বকযন্ত্রে চোয়াইয়া র্মদ্য প্রস্তুত করিবে । সান্নিপাতিক জ্ববে এবং বিসৃচিকা বোগেব হিমা-
জ্বেব সময় এই যুতসঞ্জীবনী বস মুহুমুহু প্রয়োগ করিবে ।

যুগমদাসব —উপবোক্ত যুতসঞ্জীবনী ৫০ পল, মধু ২৫ পল, জল ২৫ পল, যুগনাভি ২৫ পল, মরিচ, লবঙ্গ, জায়ফল, পিপ্পলী, গুড়ত্বক, প্রত্যেকে ২ পল । এই সকল একত্র কবিয়া আৱত পাত্রে এক মাস বাখিবে । পবে তাহাদেব দ্রবাংশব ছাঁকিয়া লইবে । যথাযোগ্য মায়াব বিসৃচিকা, হিকী ও সান্নিপাতিক জ্ববে প্রয়োগ করিবে ।

আগন্তুক জ্বর ।—শত্রু, লোফু, মুষ্টি অথবা লঙড়াদি দ্বাৰা আঘাত প্রাপ্তি, মজ্জাদি চানন, কামাদি ও ভূতাদিৰ অভিসঙ্গ এবং ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ ও সিদ্ধ পুরুষদিগেব অভিহুত, এই সকল কাবে তাগন্তুক জ্বর হয় । এই জ্বর আৱন্ত হইবাব পূর্বে কোন দোষেবই প্রকোপ থাকে না । সূতবাং পূর্বরূপাদি লক্ষিত হয় না । জ্বর প্রকাশিত হইলে বাতাদির যে দোষ লক্ষিত হয়, সেই দোষেই চিকিৎসা কৰিতে হয় ।

বিষজ্বরের লক্ষণ —বিষভক্ষণ জ্ঞাত্বে জ্বর হয়, তাহাতে মুখেব লালবর্ণতা, দ্রব মল নির্গম, ভোজ্য বস্ত্রে অনভিলাষ, পিপাসা, স্থচী-বিদ্যবৎ বেদনা ও মুচ্ছা ।

ঔষধিপ্রাণজ জ্বরের লক্ষণ —উগ্র ঔষধেব গন্ধ প্রাণ জ্ঞাত্বে জ্বর হয়, তাহাতে মুচ্ছা, শিরঃপীড়া ও বমন হয় ।

কামাদি জ্বরের লক্ষণ ।—অভিসমত কামিন্যাদি দর্শনে বমনা-ভিলাষ পূর্ণ না হওয়া প্রযুক্ত যে জ্বর হয়, তাহার নাম কামজ্বর । ইহাতে চিত্তচঞ্চল্য, নিদ্রাবৎ ক্লান্তি, আলস্য ও অকর্ষি হয় । ঔষজ জ্ববে প্রলাপ, শোকজ জ্বরে প্রলাপ এবং কোণজ জ্ববে প্রলাপ ও ক্রম্প এই সকল লক্ষণ দেখা যায় ।

অভিচারাদি জ্বরের লক্ষণ, অভিষাপ ও অভিচারণজনিত জ্বরে মোহ ও পিপাসা জন্মিয়া থাকে এবং ভূতজন্তু জ্বরে উদ্ভিগ্গচিওতা, হাস্য, বোদন ও কম্পনাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

উপরোক্ত জ্বর সকলের চিকিৎসা — যতজান দ্বারা অভিষাতোৎপন্ন জ্বর উপশমিত হয়। অস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত ও এণাদিযুক্ত ব্যক্তির জ্বর, ক্ষত ও এণ চিকিৎসা দ্বারা নিবারণেব চেষ্টা করিবে ঔষধিগন্ধজন্তু ও বিষসত্ত্ব জ্বর পিত্তনাশক ও বিষহ্ন ঔষধ সেবন করাইয়া নিবারণ করিবে। অভিচারণ ও অভিণাপোৎপন্ন জ্বর হোমাদি দ্বারা এবং নির্ঘাতাদি উৎপাত ও গ্রহপীড়ার জন্তু জ্বর দান স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা প্রতিকার করা কর্তব্য। ক্রোধজন্তু জ্বরে পিত্তনাশক ক্রিয়া, বোগীর বাঞ্ছিত বিষয় প্রদান, সদ্ভাক্য কথন, আশ্বাদন ও বায়ুনাশক ক্রিয়া উপকারক। কাম, শোক ও ভয় জন্তু জ্বরে বোগীর হর্ষজনক ক্রিয়া করিলে ক্রোধজ্বর কামোদ্ভেদে এবং কামজ্বর ক্রোধোদ্ভেদে নিবারিত হয়। ভয় এবং শোকহেতু উৎপন্ন জ্বর কাম এবং ক্রোধেব আবির্ভাবে উপশমিত হইবে। ভূতবেশ জন্তু জ্বর হইলে ভূতবিদ্যার নিয়মভ্রমবে বন্ধন ও উড়ন ক্রিয়াদ্বারা প্রতিকার করিবে। মানসিক জ্বর মনের শান্তিজনক ক্রিয়া দ্বারা নিবারণ করিবে।

বিষম জ্বরের লক্ষণ। — যে ব্যক্তির জ্বর সহসা কোন ঔষধ দ্বারা নিবারণ করা হইয়াছে, এমন অবস্থাপন্ন ব্যক্তির অধিক তাহাব কিম্বা বিহাব দ্বারা দোষ সকল পুনর্বাধ কুপিত হইয়া পশ্চাৎ রক্তাদি ধাতুগত হইয়া যে জ্বর জন্মিয়া থাকে, তাহাব নাম বিষমজ্বর। এই জ্বর সতক, সততক, অশ্বেদ্যক, তৃতীয়ক ও চতুর্থক ইত্যাদি নামে অভিহিত। এতদ্ভিন্ন ইহাও দেখা যায় যে, কোন কোন ব্যক্তির আবস্তাবধিই বিষমজ্বর হইয়া থাকে।

সতক জ্বরের লক্ষণ — যে জ্বর সাত দিবস, দশ দিবস, কিম্বা দ্বাদশ দিবস ব্যাপিয়া নিয়ন্ত ভোগ করে, তাহাব নাম সতক জ্বর।

সততক জ্বর — বাত্রি ও দিবসেব মধ্যে যে জ্বর দুই বাব প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাকে সততক জ্বর বহে।

অন্তোদ্যক্ষ জ্বর —যে জ্বর অহোবাত্রেব মধ্যে একবার মাত্র প্রকাশ পায়, তাহাকে অন্তোদ্যক্ষ জ্বর বলে

তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বর ।—প্রতি তৃতীয় দিবসে অর্থাৎ এক দিন অন্তর যে জ্বর হয়, তাহাকে তৃতীয়ক জ্বর কহে, এবং প্রত্যেক চতুর্থ দিবসে যে জ্বর হয় তাহাকে চতুর্থক জ্বর বলে

চাতুর্থক বিপর্য্যয় জ্বরের লক্ষণ —অন্ত এক প্রকার বিষম জ্বর আছে, যাহার নাম চাতুর্থিক বিপর্য্যয় এই জ্বর এক দিন উদয় হইয়া ক্রমে দুই দিন ভোগ কবে, এবং পুনর্বার আবার এক দিন বিক্রাম করিয়া আবার দুই দিন ভোগ হয়

বাতবলাসক জ্বরের লক্ষণ ।—প্রত্যহ অগ্নি অগ্নি জ্বর হয় এবং শরীর কফ ও শোথযুক্ত, এবং ঐ শোথের জন্ত বোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহাতে যদি শরীরের শুষ্কতা ও অত্যন্ত শ্লেষ্মা থাকে, তবে এইরূপ জ্বরে বাতবলাসক জ্বর বলে

প্রলেপক জ্বর —যে জবে ঘর্ম্মদ্বারা অথবা গুরুতা দ্বারা শরীর লিপ্তপ্রায় হয় এবং অগ্নি অগ্নি সর্বদাই পূর্কোক্ত লেপান্তরিত হয় ও যে পর্য্যন্ত জ্বর থাকে, সেই পর্য্যন্ত শীত থাকে, তবে তাহাকে প্রলেপক জ্বর কহে।

বসগত জ্বরের লক্ষণ ।—জ্বর বসধাতুগত হইলে, শরীরের গুরুতা, বসনেচ্ছ, দুর্বলতা, বমন, অকচি এবং ক্লান্তচিত্ততাব লক্ষণ হয়।

রক্তগত জ্বরের লক্ষণ —জ্বর রক্তধাতু প্রাপ্ত হইলে মুখ হইতে কিঞ্চিৎ বক্তোদ্যাক্ষ, শরীরের দাহ, মোহ, বমন, বিক্রম, অসম্বন্ধ বাক্যকথন, অগ্নিবিশেষ, পিপাসা এই সকল লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়

মাংসগত জ্বরের লক্ষণ ।—জ্বর মাংসগত হইলে জাহ্নুর অধোদেশস্থ জঙ্ঘা মাংসে পিপি দন্তদ্বারা পীড়নলব্ধ বেদনা, পিপাসা দান্ত ও প্রজ্বাব হয়, বহির্দেশে উষ্ণতা, অন্তর্দাহ, হস্তপাদাদি চর্মান, শ্রীনি এই সমস্ত লক্ষণ জগ্নে

মেদগত জ্বরের লক্ষণ — জ্বর মেদগত হইলে অতিশয় ঘর্ম, পিপাসা, মুচ্ছা, অথবা বাক্যলাপ, বমি শবীরেব দুর্গন্ধতা, অক'চ, শানি, অসহিষ্ণুতা, এই সকল লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়

অস্থিগত জ্বরের লক্ষণ — জ্বর অস্থিগত হইলে অস্থিভঙ্গবৎ পীড়া, কুন্তন, শ্বাস, দাস্ত, বমি, শবীরেব বিক্ষেপ অর্থাৎ ছাড়া ছাড়া, এই সকল লক্ষণ দেখা যায়

মজ্জাগত জ্বরের লক্ষণ — জ্বর মজ্জাগত হইলে আকুতবশত শেব অথবা জ্ঞান, হিকা, কাশ, দাস্ত, বমি, শবীরেব নীতলতা অস্তর্দাহ, মহাশ্বাস, হৃদয়ে বেদনা, এই সকল লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়

শুক্রগত জ্বরের লক্ষণ — জ্বর শুক্রগত হইলে পুরুষাঙ্গেব শুষ্কতা, পুরুষাঙ্গেব দুর্বলতা, শুক্রক্ষরণ অথবা বক্রাদি মোক্ষণ ইত্যাদি লক্ষণ দেখা গিয়া থাকে

প্রাকৃতাদি জ্বরের লক্ষণ বর্ষা, শরৎ ও বসন্ত এই তিনকালে যথাক্রমে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মাজনিত জ্বর হইলে, অর্থাৎ বর্ষাকালে বায়ু, শরৎকালে পিত্ত এবং বসন্তকালে কফজ্বর হইলে, সেই জ্বরে প্রাকৃত জ্বর বলে। ইহাব অন্ত প্রকার হইলে, অর্থাৎ বর্ষাকালে পিত্ত জ্বর, শরৎ কালে কফজ্বর ইত্যাদি হইলে, এই জ্বর দুঃসাধ্য এবং বাতজ্বর প্রাকৃত হইলেও সুখসাধ্য নহে

বৈদ্যকে অন্যান্য দুই তিন প্রকার জ্বরেব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, — যথা — অন্তর্জ্বর, বহির্জ্বর জ্বর, পচ্যমানজ্বর, নিবাম জ্বর ইত্যাদি কিন্তু, সেগুলি সাধারণ জ্বরের সামান্য রূপান্তর বলিয়া এস্থলে উল্লিখিত হইল না, তবে আমজ্বরের রূপ এবং চিকিৎসা কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ হওয়ায় নিম্নে তাহার বিষয় সংক্ষেপে কিছু লিখিয়া উপরোক্ত জ্বরগুলির চিকিৎসা সম্বন্ধে ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইবে

আমজ্বরের লক্ষণ — মুখ হইতে লালাজ্বর, হৃদয়েব অশুদ্ধতা, অক'চ, নিদ্রাবৎ ক্রান্তি, আলস্য, ক্ষুধামান্দ্য, মুখের বিবসতা, শবীরেব শুষ্কতা, অতিবিক্ত প্রজ্ঞান, শবীরেব শুষ্কতা, অতি বেগবান জ্বর ইত্যাদি। এই অবস্থায় বোগীকে কোন ঔষধ দিবে না, কাবলংগে পর্য্যন্ত আমদোষ

থাকে, সেই সময়ের মধ্যে ঔষধ দিলে জ্বর পুনর্বার প্রবলবেগ ধারণ কবে ।

চিকিৎসা ।—হিঙ্গুলোথ পাঁচ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, এই উভয়ে কর্জলী কবিয়া পপ্পাটীবৎ পাক কবিবে (পপ্পাটীপাকেব বিষয় পূর্বে লিখিত হইয়াছে) পবে পপ্পাটীব সহিত স্বর্ণ ২ মাস, লৌহ, তাম্র ও অত্র প্রত্যেক ২ তোলা, বঙ্গ, গৌরীমাটি ও প্রবাল অর্ধতোলা, মুগা, শঙ্খ ও শুক্ল ভস্ম প্রত্যেকে ২ মাগা, এই সকল জব্য একত্রে জল দিয়া মাড়িয়া একটি বর্জলাকাব কবিবে অনন্তর তাহাকে দুইটি ঝিল্লকেব ভিতর বাখিয়া উত্তমরূপে প্রলেপ দিয়া বোত্রে শুক কবিবে শুকাইলে ২০ ২৫ খানি ঘুটেব আঙুনে পুট পাক দিবে মাত্রা ২ বতি অনুপান পিপ্পল চূর্ণ ২ বতি, মৈন্ধব ২ বতি, হিঙ্গু ২ বতি, অম্প মধু । ইহা বিষম জবেব প্রসিদ্ধ ঔষধ, বিশেষতঃ উদবামযাদি থাকিলে অত্যন্ত উপকাব হয় ইহাকে “বিষম জবাস্তক লৌহ” কহে

বৃহৎ সর্বজ্বরহর লৌহ —লৌহ ২ পল, পাবদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, ত্রিফলা, ত্রিকুট, বিড়ঙ্গ, মুখা, গজপিপ্পলী, পিপ্পলমূল, হবিজ্রা, দাক হবিজ্রা, চিতামূল প্রত্যেকের ওজন ১ তোলা ; সমুদায় জব্য আদাব রসে মর্দন কবিয়া ২ বতি প্রমাণ বর্জিকা প্রস্তুত কবিবে, অনুপান আদাব বস ইহা বিষম জবেব মহৌষধ

জ্বরমঞ্জল রস —হিঙ্গুলোথ পাঁচ, গন্ধক, মোহাগাব খই, তাম্র,

* হিঙ্গুল হাঁড়িব ভিতর পুবিয়া সর দ্বাবা (সবাব তলায় চা-খড়ি মাখাইতে হইবে) তাহাব মুখ বন্ধকরতঃ, তাহাতে উত্তমরূপে গোববমাটিব প্রলেপ দিবে প্রলেপ উত্তমরূপে শুক হইলে, অগ্নিতে চাপাইয়া জ্বাল দিতে থাকিবে ৪ প্রহর কাল জ্বাল দিয়া নামাইলে দেখিতে পাণ্ডুর যাব যে, সবাব তলায় লাগিয়া আছে, তাহা চাঁচিয়া লইলেই পাঁচ বাহিব হইল

। ঔষধের মধ্যে যেখানে পাঁচ গন্ধক থাকিবে, সেইখানেই এই উভয় জব্যকে অত্র একত্র মর্দন কবিয়া কর্জলী প্রস্তুত কবিবাব কথা বুঝিতে হইবে এ দুই জব্য যতক্ষণ একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত ও কৃষ্ণবর্ণ না হয়, ততক্ষণ মর্দন কবিতো

বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, মৈস্কব ও মবিচ প্রত্যেকে ৪ মাসা । এই সমস্ত একত্রে ধুতুবা পাণ্ডাব বসে, মেফালিকা পট্টেব বসে, দশমূলেব কাথে ও চিবতাব কাথে মধ্যাক্রমে তিনবার কবিয়া ভাবনা দিয়া ২ ওঞ্জা প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত কবিবে । অনুপান জীবকচূর্ণ ও মধু । ইহাতে নানাবিধ ষাণ্ডুস্থ জ্বর নষ্ট হয় । ইহা বিষম জ্বরে যে ব্যবস্থা

জ্বরান্তক রস — তাম্র, গন্ধক, পাবদ, সৌবায়ু যুতিক, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, হিঙ্গুল, অভ্র, বস্মাঞ্জন ও স্বর্ণ, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে চূর্ণ কবতঃ চিবাতা, দেবদারু, দশমূল, শুঠি, মুখা, কটুকী, ইন্দ্রযব, ধনে, গজ-পিপ্পলী, প্রত্যেকে উপবোক্ত তাম্রাদি সকল দ্রব্যেব সমান ওজনে, বোল গুণ জলে সিদ্ধ কবিয়া চাবি গুণ জল থাকিতে নামাইয়া ঐ কাথে মর্দন কবিবে । দ্বিওঞ্জা প্রমাণ বটী, অনুপান মধু । ইহাতে নানাবিধ বিষম জ্বর নষ্ট হয় ।

সাধারণতঃ সকল প্রকার জ্বরে যে সকল ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, সেই সকল ঔষধেব মধ্যে পবীক্ষা দ্বারা যে ওলিকে অব্যর্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সেই ওলি লিখিত হইতেছে, অপর পরিত্যক্ত হইল ।

শীতওঞ্জী ।—৬তোলা পবিমিত তাম্রে একটী খল প্রস্তুত কবিবে । অনন্তর পাবদ, খর্ব, হবিতাল, তুতে, মোহাগার খই, গন্ধক, এই ছয় দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা পরিমাণে লইয়া করলা পাত্রের রসে মর্দন করিয়া তদ্বারা পূর্বেক্ত তাম্রখলের উদবভাগ লিপ্ত কবিবে । পরে ঐ খল একটী হাড়িব মধ্যে অধোমুখে রাখিয়া তাহার উপরিভাগে অপর একটী হাড়ি ঢাকা দিয়া তাহা বাল্লুকা দ্বারা পূর্ণ করিবে ও উপরিভাগে কৃতক-ওলি ধাতু নিক্ষেপ করিবে । পরে উহা চুল্লীৰ উপর স্থাপন করিয়া জাল দিবে । উপরেব ধাতু সকল ফুটিলে চুল্লী হইতে নামাইয়া ঔষধেব সহিত ৬ তোলা মবিচচূর্ণ মিশ্রিত করিবে । উহার ২ বতি পরিমাণে পান্বেব সহিত সেবন কবিতেন্দিবে । ইহা বাতিক জ্বরেব মহৌষধ

মেঘনাদরস ।—রূপা, কাসা, তাঁবা প্রত্যেকে ১ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, তিতবাজেব মূলেব ছালের কাথে মাক্ষিয়া ছয় বাব গজপুটে

পাক করিবে মাত্রা ২ বতি অল্পপান পানিব বস ইহাতে
বিষম জ্বর পর্যন্ত নষ্ট হয়

লক্ষ্মীবিলাস রস — অত্র ৮ তোলা, পাবদ, গন্ধক, কপূর্ব, জয়ন্তী,
জাফল প্রত্যেকে ৪ তোলা, বিদ্ধকবীজ, সিদ্ধিবীজ, ভূমিকুক্ষ্মণ্ডুল,
শতমূলী, গোরক্ষ চাকুলে মূল, বেলেডা মূল, গৌক্ষুব বীজ, হিজলবীজ,
প্রত্যেকে ২ তোলা, সমস্ত একত্রে পানিব বসেব সহিত মাড়িয়া ৩ গুণ
প্রমাণ বটি প্রস্তুত করিবে অল্পপান দুগ্ধ, দধি, কাঁজি প্রভৃতি

সর্বজ্ঞ স্মরণ — পাবা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগাব
খই ২ তোলা, মুক্তা, প্রবাল, শঙ্খ, প্রত্যেকে ২ তোলা, স্বর্ণ ০ কোলা,
সমস্ত একত্রে নিগছালেব রসে মর্দনান্তে বর্তুলাকাব কবতঃ কোটায়
প্রলেপ দিয়া তাহার মাধ্য বাখিয়া গজপুটে পাক করিবে শীতল
হইলে লৌহ ১০ তোলা ও হিজল ০ আনা মিত্রিত করিয়া উত্তমরূপে
মাড়িবে মাত্রা ২ বতি অল্পপান পিপ্পলচূর্ণ ও মধু যক্ষ্মা ও সকল
প্রকার কাশবোগ ইহা সেবনে প্রশমিত হয়

শ্লেষ্মশোলেত্র রস । গন্ধক, পাবদ, অত্র, ত্রিকটু, জিরা, কৃষ্ণ-
জিবা, শঠি, কাঁকড়াশুঙ্গী, যমানি, কুড়, হিঙ্গু, সৈন্ধব, যবক্ষাব, সোহাগা,
গজপিপ্পলী, জয়ন্তী, বনযমানী, লৌহ, ছবালভা, লবঙ্গ, ধুতুরাবীজ, জয়পাল-
বীজ, কটফল ও চিতামূল প্রত্যেকে ২ তোলা, প্রস্তুতপাত্রে প্রস্তুতদ্রব্যাবা
মর্দন করিয়া বিষ্ণু, আকন্দ চিতা, দস্তী, অপাঙ্গুর্গ জীবন্তী বাসক, নিষিন্দ
গণ্ঠিযাবী, ধুতুরা, কৃষ্ণজীবা, পালিধা, পিপ্পল, কটিকাণ্ডী ও আদা ইহাদেব
মূলেব বসে ভাবনা দিয়া বোদে শুকাইয়া ১ বতি প্রমাণ বটি করিবে
অল্পপান আদাব বস বা গবমজল সেবনে শিরোবোগ ও জ্বরপ্রতিকার হয়

বসন্তমালতী রস — স্বর্ণ ১ ভাগ, মুক্তা ২ ভাগ, হিঙ্গুল ৩ ভাগ,
মবিচ ৪ ভাগ এবং কপূর্ব ৮ ভাগ প্রথমে অন্ন পরিমাণ মাখনের
সহিত মর্দন করিয়া পবে পাতিলেবুব বসে মাড়িতে মাড়িতে যতক্ষণ
মাখনেব স্নেহাংশ অদৃশ্য নুহয়, ততক্ষণ ক্ষান্ত হইবে না মাত্রা ২ বতি,
অল্পপান মধু ও পিপ্পলীচূর্ণ সেবনে জীর্ণজ্বর, বিষম জ্বর, উদবাসম,
কণ প্রভৃতি বোগশান্তি হয়

লৌহাসব ।—লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু, ত্রিকলা, যামানী, নিডঙ্গ, মুখা চিতামূল প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ পল, মধু ৮ সেব, গুড় ১২ ০ সেব ও জল ১২৮ সেব, একত্র মিশ্রিত কবিয়া যতকুণ্ডে তাহার মুখে ঢাকা দিয়া ১মাস বাখিলে ইহাতে ঔষধ সমস্ত অন্তর্কৃত মিশ্র হইয়া আসবরূপে পবিণত হয় মধো মধো কুণ্ডলী, নাজিয়া চাডিয়া দেওয়া আবশ্যক । ইহ সেবনে অগ্নিবৃদ্ধি হয়, জীর্ণ জ্বর, প্লীহ প্রভৃতি নানা বোগ শান্তি হয়

অমৃতারিষ্ট গুলঞ্চ ১২ ০ সেব, দশমূল ১২ ০ সেব, এই ২৫ সের ত্রব্য ২৫৬ সেব জলে সিদ্ধ কবিয়া ৬৪সেব থাকিতে নামাইয়া দীতল হইলে ছাঁকিয়া লইবে পাবে ঐ কাথে ৩৭ ০ সেব গুড় গুলিয়া উহাতে কৃষ্ণজীরা ২ সেব, ক্ষেতপাপড় ০ পোয়া, এবং ছাতিমছাল, ত্রিকটু, মুখা, নাগেশ্বর, কটুকী, আতইচ, ইন্দ্রযব, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল নিক্ষেপ করিয়া আবৃতপাশে একমাস বাখিলে ইহাতে উক্ত ত্রব্য সকল অন্তর্কৃত সেক ক্রিয়া দ্বারা অবিষ্ট প্রস্তুত হইবে পান করিলে সকল প্রকার জ্বর প্রশমিত হয়

আসব ও অবিষ্ট প্রস্তুতের ত্রব্য সকল উত্তমরূপ শুদ্ধ এবং উত্তমরূপ কুটিত বা চূর্ণীকৃত হওয়া আবশ্যক

জ্ববে তৈল সর্দন ব্যবস্থা এজন্য নিম্নোক্ত তৈলগুলির প্রস্তুত বিবরণ লিখিত হইতেছে

কিরাতাদি তৈল —সরিসার তৈল ৪ সেব, দধিব মাস্ত ৪ সেব, কাঁজি ৪ সেব, চিতাব কাথ ৪ সেব কল্কার্থ—মুর্খামূল, লাঙ্গা, হরিজা, দাকহবিজা, মঞ্জিষ্ঠা, বালা, কুড়, বাখালশা, রাস্মা, গজপিপ্পলী, ত্রিকটু, আকনাদি, ইন্দ্রযব, সৈন্ধব, সচল, বিট লবণ, বাসক ছাল, শ্বেত আকন্দেয় মূলের ছাল, শ্যামালতা, দেবদারু, মাখীল ফল, মিলিত সকল সমভাগে ১ সেব । তৈল মদনে নানাবিধ জ্বর নষ্ট হয় *

* তৈলবিশেষে মুর্ছনা ও পাকাদিব নিয়ম পৃথক বিধি । সকল প্রকার তৈলে একই জাতীয় তৈল ব্যবহৃত হয় না । কিরাতাদি তৈলে সরিসার তৈল লাগে, কিন্তু অন্যান্য প্রায় সকল তৈলেই তিল তৈল ব্যবহৃত হয় । এজন্য উহাদের পৃথক পৃথক পাকবিধি লিখিত হইতেছে

তিল তৈল — দৃঢ় কটাছে(কড়াতে)গন্ধ জ্বালে তৈল চাপাইবে
 ঐ তৈল হইতে প্রথমতঃ ফেণা উঠিতে থাকিবে সমস্ত ফেণা যখন
 অদৃশ্য হইবে, তখন চুল্লী হইতে নামাইয়া সামান্য শীতল হইলে পেষিত
 হবিজা জলে গুলিয়া অল্পে অল্পে তৈলে নিক্ষেপ কবিবে পাবে কুটিত
 ও জলমিশ্র মজ্জিষ্ঠা ক্রমশঃ দিবে তদনন্তর লৌধ, মুখা, নালুকা, আমলা,
 বহেড়া, হবীতকী, কেয়ার জটা, বালা এই সমুদায়েব চূর্ণ জলমিশ্র
 করিয়া কিম্বা ঐ সকল জিনিষ জলে বাটিয়া নিক্ষেপ কবিবে ঐ তৈলে
 তৈলের চতুর্গুণ জল দিয়া পাক কবিবে কিছু জল থাকিতে নামাইয়া
 কিছুদিন তদবস্থায় রাখিবে উপবোক্ত হরিদ্রা প্রভৃতি দ্রব্যকে স্মৃচ্ছনা
 কহে ইহাদেব পবিমাণেব নিয়ম লিখিত হইতেছে সাধাবণতঃ
 সকল তৈলের স্মৃচ্ছনা দ্রব্য একই প্রকাব, যেখানে স্মৃচ্ছা দ্রব্যেব বিশেষ
 কিছু উল্লেখ থাকিবেনা, সেখানে এই সমস্ত স্মৃচ্ছাদ্রব্যই ব্যবহাৰ
 কবিত্তে হইবে

তৈলেব পবিমাণ যত, মঞ্জিষ্ঠাব পবিমাণ তাহাব ষোড়শাংশ, অপ
রাপিব দ্রব্যেব প্রত্যেকের পবিমাণ মঞ্জিষ্ঠাব চতুর্থাংশ অর্থাৎ তৈলেব
পবিমাণ ১৬ সের হইলে, মঞ্জিষ্ঠাব পবিমাণ ১ সের এবং অবশিষ্ট সমস্ত
দ্রব্যের প্রত্যেকের পবিমাণ এক পোয়া। মুচ্ছ্রীক্রিয়া কর্তৃক তৈলেব
দুর্গন্ধ, যুচিয়া একবকম সুন্দর গন্ধ এবং বস্ত্রিম বর্ণ উৎপন্ন হয় তৈলেব
সহিত অন্যান্য কাথাদি পাক করিবার সময় মুচ্ছ্রী দ্রব্য সমুদায় ছাঁকিয়া
ফেলিতে হইবে

কটু অর্থাৎ সরিসার তৈল মুচ্ছা—কটু তৈলেব মুচ্ছা
দ্রব্য—আমলা, হরিদ্রা, মুখা, বেলছাল, দাড়িম ছাল, নাগেশ্বর, কুম্ভ জীবা,
অগাবক তৈল—মুচ্ছিত তিল তৈল ৪ সেব, কপিজিক ১৬ সেব, কল্কদ্রব্য—
মর্ষমূল, মর্ষ, হবিজ, দধিহবিজ, মঞ্জিষ্ঠা, বংশলক্ষ্মণাব মূল, বালা,
নাম্বুকা ও বহেড়া মুচ্ছাইবার প্রণালী পূর্ববৎ তৈল নিক্ষেপ হইলে
নামাইয়া প্রথমে হবিজ, তৎপরে মঞ্জিষ্ঠা ও তাহাব পব অন্যান্য দ্রব্য
প্রত্যেকে ২ তোলা মাত্রায় দিয়া ১৬ সেব জল দিবে ঐ জল অধিকাংশ
হবিজা জামিলে সে দিন নামাইয়া বাখিতে হইবে.

এরও তৈল মুচ্ছা — মঞ্জিষ্ঠা, মুখা, খণ্ডা, ত্রিফলা, জয়ন্তী পত্র
বালা, বনখেজুর, বটের ঝুবি, হবিদ্রা, নালুকা, শুষ্ঠী, কেয়াব মূল, দধি
ও কাঁজি পূর্ববৎ হবিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা দ্বারা মুচ্ছা কার্য করিবে চাবি
সেব তৈলে প্রত্যেক মুচ্ছা দ্রব্য ০ তোলা পরিমাণে দিতে হইবে

পাক শেষ হইবার সময় সকল তৈলেই হাতা দ্বারা ঘন ঘন নাড়িতে
হইবে তাহা না হইলে কটাহেব তলায় কাইট জমিয়া তৈল খবিয়া
যাইবে এবং তাহাতে দুর্গন্ধ ছাড়িবে তৈল মুচ্ছাইবার সময় তৈল
ঠিক হইয়াছে কি না জানিবার জন্ত তাহাতে ২ ৪ টি ধাত্র নিষ্কেপ করিবা
মাত্র যদি খই হইয়া ভাসিয়া উঠে, তবে তখনই নামাইয়া মুচ্ছা করিবে।


রুহতী, সৈন্ধব লবণ, কুড়, রাস্না, জটামাংসী, শতমূলী, এই সকল
দ্রব্য মিলিত ১ সেব, জল ১৬ সেব পাক সিদ্ধ হইলে—অর্থাৎ যখন
তৈলেব স্নিগ্ধ জল বিদ্যমান থাকিবে না, তৈলেব কাইটে বড়ি পাকান
যাইবে, অথবা তাহা আগুণে দিলে চুড় চুড় শব্দ না করিয়া জলিয়া
উঠিবে, তখনই জানিতে হইবে পাক সিদ্ধ হইয়াছে তৈল ছাঁকিয়া
লইয়া তাহাতে কপূর্ব ২ তোলা, শিলাবস ২ তোলা ও নখী ২ তোলা
মিশ্রিত করিয়া রাখিবে ইহা মর্দন করিলে সকল প্রকার পুর্বাতন জ্বর
নষ্ট হয়

লাক্ষাদি তৈল — মুচ্ছিত তিল তৈল ৪ সেব, পুরাতন কাঁজি
১৬ সেব, কল্কার্থ লাক্ষ, হুরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা মিলিত ১ সেব এই তৈল মর্দনে
জ্বর ও ওজনিও দাহ এবং শীত নিবারণ হয়

জ্বরমুক্তির পূর্বরূপ — জ্বরমুক্তির অব্যবহিত পূর্বে দাহ, ঘর্ম,
ভ্রম, পিপাসা, কম্পা, পাতলা দান্ত, সংজ্ঞানাশ, কোংপাড়িবার আঁঠু শব্দ,
মুখেব দুর্গন্ধ ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হইলে জানিতে হইবে সত্বরই
বোগীব জ্বর মুক্তি হইবে

জ্বরমুক্তির লক্ষণ — ঘর্মগুম, শবীরেব লঘুতা, সন্তকে কণ্ড,
মুখেব মধ্যে বা ওঠে ফোঁস্কা, ইঁচি, ভোজনে অশীলাস, এই সকল লক্ষণে
বোগীকে জ্বরমুক্ত বলিয়া জানিতে হইবে।

হোমিওপ্যাথিক কলাতে জ্বর চিকিৎসা ।



শীতাত্ত্ব জ্বরের পূর্বলক্ষণ ইহাতে বলবান ব্যক্তিরাও দুর্বল হইয়া পড়ে এবং অত্যন্ত উপসর্গ থাকিলে ক্রমে সাংঘাতিক হইয়াও উঠিতে পারে । এজন্য সহজাবস্থায় হঠাৎ শীতাত্ত্ব হইনেই এক মাত্রা 'ক্যাম্ফর' তৎক্ষণাৎ ব্যবহার করিবে ।

কম্পা — বোগী আপনাব দেহের উষ্ণতা যতক্ষণ অস্বাভাবিক না কবে, ততক্ষণ অর্ধ ঘণ্টা অন্তর দুই বিন্দু পবিমাণে "ক্যাম্ফর" ব্যবস্থা করিবে । যথাসম্ভব গরম জলে পাদদ্বয় কিয়ৎকাল স্থাপন করিয়া বোগীকে শয্যা লইয়া যাইবে, তাহার পবে দুই পায়ে, বোতলে গরম জল পুবিয়া তদ্বারা ফোমেন্ট করিবে । ঘর্ম না হওয়া পর্য্যন্ত অর্ধ ঘণ্টা অন্তর "গ্যাকোনাইট" সেবন করাইবে । তাহার পবে দুই ঘণ্টায় এক মাত্রা 'মার্কিউরিয়াস' প্রয়োগ করিবে ।

জলে ভিজিলে ।— অর্ধ ঘণ্টা অন্তর "ডাল্ফ্যামেবা" ব্যবহার করিবে । আবশ্যক হইলে পবে "গ্যাকোনাইট" এবং "মার্কিউরিয়াস" দিবে ।

সামান্য জ্বর ।— ইহা উষ্ণতা ও শুষ্কতা, অস্থিরতা ও নাড়ীর বেগ থাকিলে এবং শীতাত্ত্ব হইলে যে পর্য্যন্ত ন ঘর্ম হয়, সে পর্য্যন্ত অর্ধ ঘণ্টা অন্তর "গ্যাকোনাইট" সেবন করাইবে ।

ইণ্টারমিটেন্ট ফিবার ।— শীতাত্ত্বের সহিত জ্বর উপস্থিত হয়, মধ্য মধ্য ঘর্ম হইতে থাকে । এই জ্বর প্রতিদিন, কখন বা এক দিন অন্তর কখন অথবা কোন পর্য্যায় অবলম্বন করিয়া আইসে । ম্যালেরিয়া প্রবল দেশে প্রায়ই ইহা হইয়া থাকে । কম্পাব আক্রমণে শরীরের দৌর্বল্য উপস্থিত হয়, এবং তৎসহ প্রায়ই প্লীহা বর্ধিত হইতে দেখা যায় ।

চিকিৎসা — মগ্নকালে অথবা কম্পার ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা “চায়না” কিম্বা “সিকোনা” ঔষধ উপযুক্ত শীতানুভব হইবা সময় প্রতি অর্ধ ঘণ্টায় এবং অন্য সময়ে দুই ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। যাহাতে কম্পার অবস্থা নির্ণীত না হয়, সেক্ষেত্রে অনিয়মিত কম্পাঙ্কে প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর “আর্শেনিক” প্রয়োগ কব যায়।

পাকস্থলীর উত্তেজনা বা বমন থাকিলে “ইপিক্যাফুয়ানা” ব্যবহৃত কবা যায়। ভারতবর্ষীয় জ্বরে উষ্ণাবস্থা কবাইবার জন্য অর্ধ ঘণ্টান্তর “গ্যাংকোনাইট” ব্যবহার কবা উচিত অতিবিক্ত ঘর্ষ হইলে দুই বা ততোধিক মাত্রায় “ফস্ফরিক অ্যাসিড” ব্যবস্থা করিতে হইবে জ্বর আসিবার অব্যবহিত পূর্বে “চায়না” দেওয়া কর্তব্য শীতানুভব হইবার সময় গরম চা দিবে। যথামাত্রা বস্ত্র দ্বারা গাত্র আবরণ করিবে এবং শরীরে ও পায়ে গরম জল বোতলে পুঁবিয়া ফোঁদেতে করিবে। পবিত্র তৈল দ্বারা ঘর্ষ মুছাইয়া পবিত্র বস্ত্র পরিধান কবাইবে।

লঘু বলকারক এবং সহজে পরিপাকযোগ্য পথ্য ব্যবস্থা প্রথম এক বা দুই দিন মাংস ভক্ষণ নিষেধ, কিম্বা জ্বর আসিবার দুই ঘণ্টা পূর্বে কোন প্রকার খাদ্য দেওয়া উচিত নহে। জ্বর আসিবার পূর্বে ঘুচু এবং সামান্য ব্যায়াম কর্তব্য।

স্কার্লেট ফিবার বা লোহিত জ্বর।—এই জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে লোহিত বর্ণ দাগ, কিম্বা স্ফোটক দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নোক্ত প্রকারে চিকিৎসা না হইলে যাব পব নাই সংক্রামক এবং সাংঘাতিক হইয়া উঠে। মুখ ও গলা ক্ষীত হয়, জিহ্বা লোহিত বর্ণ এবং তাহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাটা দেখা যায়; কখন কখন ডক পরিষ্কার, কখন বা উষ্ণা খুস্কা এবং ঐদাহযুক্ত বোধ হয়। ডকের মুসৃণ নিবারণ জন্য দুই ঘণ্টান্তর “বেলেডোনা” দিবে এবং গলাফুল থাকিলে তাহার সহিত পর্যায়ক্রমে “মর্কিউরিয়াম” ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ডক উষ্ণা খুস্কা হইলে দুই ঘণ্টান্তর “রস” প্রয়োগ কবিবে।

ডক উষ্ণ থাকিলে দুই ঘণ্টাকাল বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত রাখিবে, গলায় কাপড় বাঁধিয় দিবে বোগীকে কেবল মাত্র তাহাব ধাত্রীব সহিত এক গৃহে রাখিবে। যব হইতে গলাবি ও অগ্ন্যাত্ত বস্ত্রাদি স্থানান্তরিত করিবে গৃহদ্বার আর্জ বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া দিবে, যে পর্য্যন্ত এক স্বাভাবিক না হয়, ততক্ষণ বোগী কোনমতে অন্য কাহাকেও দেখিতে বা তাহাব সহিত আলাপ কবিত্তে পারিবে না পথ্য,—শীতল জল, যবের জল, চা, দুগ্ধ, মুবগী ও মেষমাংসেব কাথ এবং মৎস্য সেই বাড়ীমধ্যে যে সকল শিশু বাস কবিবে, তাহাদিগকে বাত্রিকালে এবং প্রাতঃকালে “বেলেডোনা” খাইতে দিবে

টাইফস্ ফিবার।—বহু জনতাপূর্ণ স্থানে বাস, বহু শ্রম জন্ত ক্লান্তি, ক্রেশ এবং অনাহার জন্ত এই পীড়া জন্মে এই বোগ সংক্রামকরূপে দেহমধ্যে সংঘটিত হয়, সংক্রমণেব পনর দিন পর্য্যন্ত বোগী কিছুই অগ্ৰভব কবিত্তে পাবেনা, তাহাব পব শিবঃপীড়া, বমনেচ্ছা, সকল কার্যে অনিচ্ছা, অতিবিক্রম শীতানুব ও বোগী শয্যাগত হয় শিবঃপীড়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে, জিহ্বা শুষ্ক এবং কটা বর্ণ, পিপাসা বৃদ্ধি, নাড়ী বেগবতী, শরীরেব উত্তাপ অতিশয় বৃদ্ধি হয় অস্থিরতা, অনিদ্রা, ক্রম, প্রলাপ, দন্তে এক প্রকাব ক্রন্দ, ডক চট্ চটে, মুখ কালি বর্ণ, বোগী সম্প্রদা চিৎভাবে শয়ন করিয়া থাকে, শরীরেব লোহিত বর্ণ দাগ দৃষ্টিগোচর হয় এক প্রকাব বিকৃত বর্ণেব মল মূত্র বোগীব অজ্ঞাতগানে নির্গত হয় ফুস্ফুসেব পীড়া অথবা হিমাদ্ধ হইয়া বোগীব প্রাণ নষ্ট করে, কিম্বা শান্তিজনক নিদ্রা উপস্থিত হইয়া, বোগী শয্যাগত থাকিলেও, নিদ্রান্তে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে “চৌদ্দ হইতে দুইশ দিনেব মধ্যে বোগীক বিপদেব আশঙ্কা।

২ যৎকালে শীতানুব, নাড়িবে ক্রান্তগতি এবং বমনেচ্ছা বা বমন হইতে থাকে, তৎকালে, এক ঘণ্টা অন্তর “ভেবেটাম ডিবাইড” ব্যবস্থা লক্ষণ-সকল তাহাতে অন্তর্হিত না হইলে, “ত্রাইওনিয়া” এবং “রুম” পর্য্যায়ক্রমে দুই ঘণ্টান্তর সেবন করাইবে। প্রবল আক্ষেপ না থাকিলে দুই

যদিও “বেলেডোনা” ব্যবহার করিবে হিমাঙ্গ অবস্থায় এক ঘণ্টা অন্তর “আর্শেনিক” দিবে ।

গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুপ্রশস্ত হইবে তাহাতে যেন উত্তম-রূপে রাগু যাতায়াত করিতে পাবে । মুখ ও হাত সর্বদা গরম জলে স্নান করিয়া ভিজাইয়া মুছাইয়া দিবে, প্রতিদিন শয্যা এবং পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্তন করাইবে । সর্বদা সতর্কভাবে রোগীর নিকটে থাকিয়া একজন অবশ্য তাহার ওষ্ঠাধর করিবে । ঐতল জল, যবেব জল, সিদ্ধ জল, চা, এবং দুগ্ধ খাইতে দিবে । ঔষধ সেবনের মধ্যে মধ্যে পোর্ট খাইতে দেওয়া কর্তব্য । অধর ও ওষ্ঠ সর্বদা আর্জ বাধিতে হইবে, এজন্য সর্বদা কোন পার্শ্ব দ্রব্য দেওয়া বাবস্থা । বোগীকে আবোণ্ডা লাভ না করা পর্যন্ত উঠিয়া বসিতে দিবে না ।

টাইফয়েড্ ফিবার্ ।—পিত্তজন্ম জ্বর ‘মুহুভাবে’ রোগীকে আক্রমণ করে, আক্রমণকালে ইহা টাইফস্ ফিবারের ন্যায় প্রবল ও যন্ত্রণাদায়ক নহে । আবস্তকালে উদর বেদনা, উদরাময়, ক্ষুধামান্দ্য, শিবঃপীড়া, অস্থিরতা এবং সর্বাঙ্গে বেদনা হয় । তাহার পব বমন, জিহ্বাব শ্বেতবর্ণ, এবং তাহার পার্শ্বদেশে আবদ্ধতা হইতে থাকে । অতঃপর লক্ষণ সকল উত্তবোত্তর বৃদ্ধি পায় । চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই বোগী শয্যাগত হয় । পাকস্থলী উগ্র এবং ক্ষীণ হইয়া, দক্ষিণ পার্শ্বে যন্ত্রণা বোধ হয় । নিদ্রাকালেও বোগী স্থির হইতে পারে না, এবং প্রলাপ ও আক্ষেপ হইতে থাকে । এই সময়ে উদরাময় আবস্ত হয় । বোগীকে ক্ষণকালের জন্তও একাকী রাখা উচিত নহে । বাত্রিকালে শয্যার বাহিবে খাইতে দেওয়া কর্তব্য নহে । মলত্যাগের ইচ্ছা হইলেও উঠিতে দিবে না । এই অবস্থার বিরাম আছে, তৎকালে বোগী আপনাকে স্নান বোধ করে, কিন্তু পবক্ষণেই আবাব পূর্ববস্থা প্রাপ্ত হয় । এই রোগেও লালধন দাগ শবীরের প্রায় সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হয় । প্রস্তাব অল্প হয় । রোগীকে কোন প্রস্তাব করিলে অস্বস্তি উত্তর করে ; অধর ওষ্ঠ শুষ্ক, উষ্ণুষ্কা হয়, দন্তে ক্রন্দ জন্মে । বোগী অক্ষুট বাক্য উচ্চারণ করিতে থাকে, বিছানার হাতড়াইতে থাকে বা তাহা ধরিয়া টানে

এই জ্বর টাইফস ফিবার হইতেও সাংঘাতিক, ক্ষয়, প্রদাহ, বক্তবগন বা ভেদ এবং ঘর্ষ কর্তৃক বোগীব সৃষ্ট হয়

প্রথমে উদবাস্যের চিকিৎসা কবিবে, কিন্তু যদি প্রতিকার না মানিয়া প্রবল ও একজ্বর উপস্থিত কবে, তবে দুই ঘণ্টা অন্তর “র্যাপিট-সিয়া” দিবে আক্ষেপ ও উদবেব ক্ষীণতা এবং যন্ত্রণা আবদ্ধ হইলে “বেলেডোনা” এবং “মিউশিয়েটিক গ্যাশিড” তিন ঘণ্টা অন্তর পর্যায়ক্রমে ব্যবহার কবিবে এবং মধ্যমধ্যে পেটে কোমেন্টে কবিবে। সর্দি এবং বক্ষ ভাব থাকিলে, “ব্রাইওনিয়া” ও “ফস্‌ফরাস” দুই ঘণ্টা অন্তর পর্যায়ক্রমে দিবে। টাইফস ফিবারের স্তায় পথ্য দান করিবে। সর্ষদা শয্যা পরিবর্তন করিয়া দিবে, ঘবেব মেজে ধৌত করাইবে, রক্ত পবিবর্তন করিবার উপদেশ দিবে, যে পাত্রে বোগী মলত্যাগ কবিবে, তাহা পবিকার কবাইয়া তাহাতে কার্বলিক্‌ গ্যাশিড দেওয়াইবে। পাকস্থলীর অবস্থা বিবেচনা পূর্বক কোমল ও বলকারক খাদ্য দিবে

হাকিমীমতে জ্বরচিকিৎসা।

জ্বরের কারণ -- সর্দি হইলে শরীরেব লোমকুপ সকল বন্ধ হইয়া ঘর্ষ নির্গত না হওয়া প্রযুক্ত শরীরেব অবগুণ বাহিব না হওয়াতে শরীর খোলসা না থাকা প্রযুক্ত জ্ববেব উৎপত্তি হয়। সে ততি সামান্য জ্বর। শরীর অধিক গরম হইবার পবে শীতলীভূত করিলেই সর্দি হয় আর অধিক পরিষ্কম করিলে ঘাম বাহির হইলে, যদি কোন রকমে বাতাস গায়ে লাগে, তবে সর্দি হয় রীতিকালে বাহিরে শয়ন করিলে বা রাত্রে শীতল গাভসি গায়ে লুগিলে ঘাম নির্গত হওয়া বন্ধ হয় এবং

তাহাতেও সর্দি হয়। ভিজা কাপড় পরিয়া অধিকক্ষণ থাকিলে সর্দি হয়। এই প্রকার সর্দি হইতে জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

যে সময়ে ক্ষেত্রেব জল শুষ্ক হয় ও তাহাতে মবা ঘাস, গাছ-গাছড়া পচে, সেই সময়ে ঐ পচা দ্রব্য হইতে মন্দ বায়ু কিম্বা বাষ্প উদ্ভব হয়, তাহা হইতে নানা প্রকার জ্বর হয়, বিশেষতঃ পালাজ্বর অধিক হয় এজন্য জলসিক্ত স্থানে, নিম্ন স্থানে এবং বিল ও খালের নিকটে অধিক মন্দ বাষ্প জন্মে; ঐ বায়ু দ্বারা জ্বরের উৎপত্তি হয়।

জ্যোত্বেব জল হইতে মন্দ বায়ু জন্মে না। কিন্তু যে স্থানে অগ্নি ও স্থিবি জল থাকে, সেই জলে সূর্য্যকিরণ লাগিলে, তাহা পচিয়া যায় ও তাহা হইতে অনেক মন্দ বাষ্প জন্মে। ঐ বায়ু, দিবসে সূর্য্যের তেজদ্বারা অতিশয় পাতলা হইয়া উপরে উঠে, এইহেতু বড় ক্ষতিজনক হইতে পাবে না। সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে শীতলতা প্রযুক্ত ঐ বায়ু নীচে আইসে, সেই সময় শরীরের হানিজনক হয়। অন্য বায়ু হইতে এই বায়ু অতিশয় ভাবী। ঘরের কপাট বন্ধ করিলে ঘরের ভিতর দূষিত বায়ু অধিক যাইতে পাবে না। এজন্য মশাবিব ভিতবে কিম্বা ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া শয়ন করিলে ভাল হয়।

কোন কোন মন্দ দ্রব্য ভক্ষণ করিলে যদি সে দ্রব্য জীর্ণ না হয়, কিম্বা তজ্জন্য পেটের অসুখ করে, তবে তাহাতেও কখন কখন জ্বরের উৎপত্তি হইতে পারে, বিশেষতঃ শিশুদের এই প্রকার জ্বর অধিক হয়।

নিত্যজ্বর লক্ষণ।—নাড়ী এবং নিশ্বাস শীঘ্র চলে, মস্তক ব্যথা করে, চর্ম্ম শুষ্ক ও গবম হয়, কোষ্ঠ কখন হয়, কখন হয় না, প্রস্রাব লালবর্ণ হয়, জিহ্বা মলিন হয়, শরীরে সর্বদা জ্বর থাকে,—কখন কিছু কম হয়, কখন বা বেশী হয়।

চিকিৎসা।—অগ্নি ও লঘু তাপ দিবে, এই ক্ষীণ মন্দ মূত্র ত্যাগ অগ্নি হয়, কিম্বা একিবাবে বন্ধ হয়, এজন্য পেট প্রদীপ্ত করি আবশ্যক, তজ্জন্য নিম্নলিখিত ঔষধ খাওয়াইবেন।

মোমায়ুখীর পাতা	...	...	১৮ মাস
রেউচিনি	...	...	১ মাস

ছোট এলাইচ

১ মাগা ।

এই কয়েক অব্যাকে অর্দ্ধ সের গরম জলে অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবে । পবে সেই জল ছাঁকিয়া সেবন করিতে দিবে । পূর্বে উপবাস দেওয়া কর্তব্য । ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে ।

অন্য প্রকার ।

মুসকব

৩ রতি

জাঙ্গি হবিডকী

৩ রতি ।

এই অব্যাকে বাটীয়া ৩টি বটী করিবে, এবং রোগীকে উপবাস রাখিয়া দিবসে ত্রিশ বাজে খাইতে দিবে ।

অন্য প্রকার

মুসকব

৩ রতি ।

চূর্ণ পাখা

১ ০ রতি

সাবান

৩ রতি

এই তিন অব্যাকে একত্র মাড়িয়া তিনটি বটী করিয়া একবারে তিনটি-কেই খাওয়াইবে । যদি শরীরে অধিক জ্বর থাকে, তবে ভেবেওঁব তৈল অর্ধছটাক কিম্বা কালাদানা ১ মাগা খাওয়াইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে । পবে চিবাতা ১ তোলাকে অর্দ্ধসের জলেব সহিত সিদ্ধ করিয়া কিছু পবে সেই জলকে ছাঁকিয়া দুই ভাগ করিবে, তাহার একভাগ সন্ধ্যার সময়, অন্য ভাগ প্রাতঃকালে খাওয়াইবে । এই প্রকার চারি পাঁচ দিন ব্যবহার করিলে ভাল হয় । ঐ উপায় করিতে করিতে যদি জ্বর অধিক কিম্বা কঠিন হয়, তবে প্রথমতঃ উপবেব লিখিত একটা জ্বোলাপ দিবে, পবে নিম্ন লিখিত উপায় করিবে ।

কালামিল

৩ রতি ।

অর্ধমাঙ্গিক

৩ রতি ।

এই দুই অব্যাকে মিশ্রিত করিয়া পবে ভাল করিয়া দণ্ডে বেদনা হওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক ভাগ খাওয়াইবে ।

ইহাতে শবীৰ হইতে ঘৰ্ম নির্গত কলিজা এবং প্রাণ্য পবিষ্কাব হইবে

পালাজ্বৰ ।—প্রথমে মস্তকেব ছাড় সমূহ বেদনা করে, কম্প হয়, কম্প বন্ধ হইলে জ্বর হয়; পিপাসা হয়, কোষ্ঠ হয় না, আব ঐ জ্বর এক, দুই, তিন, কিম্ব চাবি দিবস অন্তর বোগীকে আক্রমণ কবে

কাৰণ ।—শবীবে মন্দ বাতাস লাগিলে, মর্দি হইলে, কিম্বা নিম্ন ও ভিজা ভূমিতে বাস করিলে এই বাধি জন্মে যে স্থানে মন্দ বাতাসেব উৎপত্তি হয়, সে স্থানে অধিক পালাজ্বৰ হইয়া থাকে, যেমন উড়িয়া ও বাঙ্গলা প্রভৃতি দেশে ভূমির নিম্নতা প্রযুক্ত পচ, লোনা ও বন্ধ জল থাকায় পালাজ্বৰ অধিক হয়। পশ্চিমদেশেব পার্বত্য স্থানে জলেব জ্বোত থাকা প্রযুক্ত সে স্থানে মন্দ বাতাসেব উৎপত্তি হইতে পাবে না, এইহেতু সেই স্থানে পালাজ্বৰ অধিক হইতে পাবে না। আৰু ঐ মন্দ বায়ু কখন কখন বিষতুল্য হয়

চিকিৎসা ।—নিম্নোক্ত ঔষধ সর্বাণ্ডে ব্যবস্থা কবিবে ।—

সোণামুখীৰ পাড়া	...	১৮ মাসা
বেউচিনি	...	১ মাসা
ছোট এলাইচ	...	১ মাসা।

এই তিন ঔষধকে একত্র মিশ্রিত কবিয়া অর্ধসেব গরম জলে অর্ধ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে, পবে সেই জলকে ছাঁকিয়া রাত্রিযোগে উপবাস করিয়া খাইবে, ইহাতে কোষ্ঠ পবিষ্কাব হইবে। পরে চিবাতা ১ তোলা অর্ধসেব গরম জলে ভিজাইয়া, সেই জল ছাঁকিয়া দিবসেব মধ্যে দুই বাব—প্রতিরাবে এক পোষা আন্দাজ খাইতে দিবে জ্বর তালগ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ ঐরূপ কবিবে ইহাতেও যদি জ্বর বন্ধ না হয়, তবে নীচের লিখিত ঔষধ খাওয়াইবে

মুসকর	...	২ মাসা।
সাণান	...	২ মাসা
সফেদ সশচল	...	২ রতি।

জলে মর্দন করিয়া ষোলটি রুটি প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ সকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে এক একটি কবিয়া তিনটি খাওয়াইবে

অন্য উপায়

প্রথমে নিম্নলিখিত জোলাপ দিয়া নাড়ী পৰিকার করিবে —

মুসকব	...	১. ১০ মাস।
পারদ চূর্ণ	...	৩ রতি

জলে মর্দন করত ৩ টি বটা প্রস্তুত করিবে বাজিকালে খালি পেটে দুইটা খাইতে দিবে। আট ঘণ্টা পরে যদি দান্ত না হয়, তবে অষ্টটা খাওয়াইবে।

অন্য উপায় ।

প্রথমে উপরি লিখিত জোলাপ দিবার পর কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ খাইতে দিবে

* গফেদ তুঁতিয়া	...	২ মাস।
লঙ্কামবিচ	..	২ মাস।
সাবান	...	২ মাস।

জলে মর্দনান্তর ২০ টি বটা প্রস্তুত করিবে, এবং আবামলাভ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর এক একটা খাওয়াইবে।

দুর্বল জ্বরলক্ষণ — শরীর দুর্বল হয়, ক্ষুধা হয় না, কোষ্ঠ পৰিকার হয় না, জ্বর হয়, শরীর অগ্নি গবম হয়, ইহাতে দুর্বল ও চঞ্চল এই দুই নাড়ী একত্র যুক্ত হইয়া চলে।

কারণ — এই জ্বরের নান প্রকার কারণ আছে; অন্য বোগ হইতে ইহার উৎপত্তি হয়, যথা;—ক্ষয়কাশ রোগে ফুসফুস পচিয়া যায়, শরীর দুর্বল হয়, তাহাতেই এই জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে জ্বরপ্লীহা রোগে, অর্থাৎ প্লীহা বড় হইবার সময় শরীর দুর্বল হয়, তাহাতেও দুর্বল-জ্বর হইতে দেখা যায়। অজীর্ণ বোগেও এই জ্বর হয় এই প্রকারের কোন কোন রোগ শরীরে উৎপন্ন হইলে, শরীর দুর্বল হওয়াতে এই বোগের উৎপত্তি হয়।

চিকিৎসা। এই জব প্রতিকারজন্ত বিশেষ কিছু কবা যাইতে পাবে না। যে বোগ হইতে এই জব হয়, তাহাব জন্ত ঔষধ দিতে হইবে। সেই বোগ আবোগ্য হইলে তাহাব সহিত উক্ত জব আবোগ্য হইবে।

যদি শরীরে অল্প কে ন ব্লীণ না থাকে, কেবল দুর্বলতা জন্ত হইয়া থাকে, তবে দুর্বলতা শুধরাইবাব জন্ত নিম্নলিখিত ঔষধ দিবে।

নাটীর বীজ চূর্ণ	১০	বতি
হীবাকস্	০	বতি
লক্ষী মবিচ	১০	বতি

এই তিন জব্বা একত্র পেষণ কবিয়া দুইটী বটী প্রস্তুত কবিবে। সকালে সন্ধ্যায় দুইটী বটী ব্যবহার কবাইবে। এই বোগেব সঙ্গে যদি অজীর্ণ দোষ থাকে, তবে নিম্নোক্ত ঔষধ দিতে হইবে।

হীবাকস	১	মাসা।
বেউচিনি	২	মাসা।
লক্ষী মবিচ	২	মাসা।

একত্র চূর্ণ কবিয়া দশভাগ কবিনে, এবং প্রত্যহ বাএ এক এক ভাগ খাওয়াইবে, পাবে অন্য উপায় কবিবে।

চিবাতাব জল এক ছটাক প্রত্যহ একবাবে এক ছটাক ওজনে খাওে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় তিন ছটাক খাওয়াইবে। যদি কোষ্ঠ পবিকান না হয়, তবে নীচেব লিখিত উপায় কবিবে।

সোণামুখীৰ পাত ৪ মাস উত্তমকণে চূর্ণ কবিয়া মাতগুড়ের সঙ্গে মিশ্রিত কবিয়া খাইতে দিবে। ইহাতে কোষ্ঠ পবিক ব হইবে। পাবে রীতি অনুসারে চিবাতাব জল খাইবে। পাবে এই উপায় কবিবে —

সেঁখ ভস্ম	৫	বতি
বেউচিনি	১০	বতি
লক্ষী মবিচ	৩	বতি
অমৃত		

জলে বাটিয়া কুড়িটি বটী প্রস্তুত করিবে, প্রাতে ও বৈকালে এক একটী বটী সেবন করাইবে তৎসহ চিবাভাব জলও খাইতে দিবে।

বাতজ্বরের বিবরণ ও লক্ষণ ।—শরীরের অস্থি সমুদায় বেদনা কবে, বড় শক্ত জ্বর হয়, তাহার সহিত অকচি থাকে কখন কখন পায়ে কিম্বা হাতে বক্ত পড়ে ও সেই সেই স্থানে বেদনা হয়

কারণ ।—সর্দি হইতে এই জ্বরের উৎপত্তি হয় এক প্রকার বাত আছে যে, তাহার সহিত অধিক জ্বর থাকে, সেরূপ হইলে ঔষধ মালিশ করিতে এবং খাইতে দিবে আর যদি হাড় বেদনা কবে এবং শরীর অগ্নি গবয় হয়, তবে কেবল মালিশ করিলেই ভাল হয়

খাইবার জন্ত নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে —

হীবারক্স	৩ বতি
আফিঙ্গ	২ বতি
গোবা	৪ মাসা
বেউচিনি	১ মাস

একত্র চূর্ণ করিয়া ছয় ভাগ করিবে। প্রত্যেক ভাগ মাত-গুড়ের সহিত মাখিয়া খাইতে দিবে এইরূপ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে তিনবার করিয়া দুই দিন খাইবে পরে নিম্নোক্ত উপায় করিবে —

গোবা	৪ মাসা
পাবদ চূর্ণ	১ মাসা
আফিঙ্গ	২ বতি
জোলেফা	৪ বতি

এই কয় জব্য একত্র চূর্ণ করিয়া ৮ ভাগ করিবে প্রত্যহ চাবিবার চাবিভাগকে মাত গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে

অন্য উপায়

উক্ত জ্বরে যদি হস্ত-কিঞ্চ পদেব কোন স্থানে সমস্ত বক্ত জমিয়া ফুলিয়া উঠে, তবে চাবি আঙ্গুল চৌড়া ও তিন চারি হাত লম্বা নেকড়া জলে ভিজাইয়া তীক্ষ্ণে বারিক্রমে, এবং তাহা উল্লদিকে বাণিয় শয়ন

কবাইবে হস্তে বজ্র জমিলে তাহাও ঐ প্রকারে ফুলিয়া শয়ন কবিবার উপদেশ দিবে

অন্য উপায় ।

সোঁরা	.	অর্ধ ছটাক ।
সবাব	..	অর্ধ ছটাক
কপূর্ব	.	অর্ধ ছটাক ।
জীল	.	৯ ছটাক ।

একত্র মিশ্রিত কবিয়া প্রত্যহ চাবি বাব খাইতে ও এক ছটাক মালিশ কবিতে দিবে. যদি অধিক বেদনা হয়, কিম্ব ফুলিয়া উঠে তবে সর্বপ কিসা লক্ষা মবিচ বাটিয়া তাহাব উপরে বসাইয়া দিবে

অন্য উপায়

সবিষাব তৈল	..	৭০ ছটাক ।
কপূর্ব	...	১ তোলা ।
দোঁবাবা মদ	.	৭০ ছটাক ।
আফিজ	..	৬ গামা ।

সবিষাব তৈল আৰ কপূর্ব এই দুই জব্যাকে উত্তমরূপে মিশ্রিত কবিবে, যেন উভয়ের বর্ণ এক হয়, এবং মদিবা ও আফিজ এই দুই জব্যাকেও ঐ প্রকারে মিশ্রিত কবিতে হইবে পরে সকলকে একত্র মিশ্রিত কবিয়া ঐ বেদনাব উপর মালিশ কবিবে

দ্বিতীয় অধ্যায় ।



য্যালোপ্যাথিকমতে উদরাময় চিকিৎসা

তদ্বজ্জৈব নৈম্বিক ঝিলিতে উত্তেজনা হইলেই উদরাময় জন্মিয়া থাকে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কাৰণ হইতে নৈম্বিক ঝিলিতে উত্তেজন হইয়া থাকে, যথা,—অব্যবহার্য্য এবং অপবিকৃত দ্রব্য ভক্ষণ, অপৰিমিত ভোজন, আহারেব পৰ অতিভোজন, আভাবিক খাদ্যের একবাবে পৰিবর্তন, অতিবিক্ত লবণ ও তৈল উদবস্ত কৰণ ও কোন কোন পীড়াও এই রোগেব কাৰণ হয়

উদরাময় নানাবিধ, যথা,—ইবিটেটিভ বা উত্তেজক, কঞ্জেষ্টভ বা রক্তসঞ্চাবক, গ্রীষ্মকালীন উদরাময়, পুৰাতন উদরাময়, পার্শ্বতীয় উদরাময় এবং সিম্প্যাথেটিক বা আন্তঃসজ্জিক উদরাময় ।

উত্তেজক উদরাময় তাবাব সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ; সাধারণ,—অজীৰ্ণতা জন্ম, পিত্তাধিক্য জন্ম এবং ক্রিম জন্ম ।

সাধারণ উদরাময়ে আহারেব দুই তিন ঘণ্টা পবে উদবে শূলবৎ বেদনা, উদব অম্প স্ফীত এবং মলত্যাগে ইচ্ছা জন্মে । মলেব সহিত কটা বর্ণ তবল পদার্থ মিশ্রিত থাকে মলত্যাগেব পবেই উদবেবেদনাব শান্তি হয় । চারি পাঁচ বাব এইরূপে মলত্যাগের পর মল সাদা হইয়া আইসে এবং তাহাতে মিউকস্ (সর্দিব ঞ্চায় তবল চট্চটে সামগ্রী) দেখিতে পাওয়া যায় বমনেচ্ছা, জিহবা প্লেপ্সুক্ত এবং কখন কখন বমন হইয়া থাকে

চিকিৎসা ।—এই বোগ কখন কখন বিনা চিকিৎসাতেও প্রসমিত হয় । কিন্তু যদি বিস্ফটিকা বোগ নিকটবর্তী স্থানে প্রাহুর্ভূত হইয়া থাকে, বা উদবে শূলবৎ বেদনা অন্তত্বত হয়, তবে নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে

পল্‌ব্‌ বিয়াই কমঃ	১ ড্রাম
মোডি বাই কার্ব	২০ গ্রেন।
টী. ওপিঘাই	১৫ বিন্দু
পিপারমেন্টের জল	১ আউন্স

ইহাতেও আবোগ্য না হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ দুইটির একটি প্রয়োগ
করা কর্তব্য, যথা —

কাইনো	১০ গ্রেন
খড়ি	৫ গ্রেন।
মোডি	৩ গ্রেন
একমাত্রা এইরূপে এক এক পুবিয়া প্রত্যহ ২ ৩ বাব	
আফিজ	১১ গ্রেন
ক্যালোমেল	৫ গ্রেন
ইপিক্যাক্	৩ গ্রেন।

একমাত্রা এইরূপে ৩ ঘণ্টা অন্তর দিবসে ৩ বাব খাইতে দিবে ;
অধিক বিবেচন হইলে যামেনিয়া, ইথাব, ত্রাণ্ডি খাওয়াইবে

পিত্তপ্রধান উদরাময় —যক্‌তে পিত্তজন্ম প্রদাহ জন্মে, কখন
কখন পিত্তমিশ্রিত তবল মল নির্গত এবং মলদ্বাবে প্রদাহ ও উদবে বেদনা
হইতে থাকে

চিকিৎসা। —ইহাতে হঠাৎ দস্ত বন্ধ করা উচিত নহে কিয়ৎ-
কাল দান্ত হইবার পৰ্য্যন্ত উদবের ভাব অপেক্ষাকৃত কম বোধ হইবে,
তখন নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে

মোডি	১০ গ্রেন
টী. ওপিঘাই	১০ বিন্দু।
পিপারমেন্টজল	১ আউন্স

এক এক মাত্রায় তিন বাব খাইতে দিবে

প্রদাহিক উদরাময় —অত্যন্ত শীতলতা, ঘর্ষাবোধ ও গ্যালেরিয়া
হেতু এই বোগ জন্মে

চিকিৎসা। —প্রথমাবস্থায় মলের সহিত মিউকাস্‌ দেখিতে পাওয়া

যায এককালে অধিক মল নির্গত হয়, এবং দিবাৱাজিতে ১০ ১২ বাব ভেদ হইয়া থাকে নাড়ী ক্ষীণ ও ক্রতগামী, উদর নিপীড়নে বেদনামুভব, কখন উদর ক্ষীণ, কখন তাহাতে বেদনা, জিহ্বা আবদ্ধ হয়, এবং পীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে ত্রু শুষ্ক ও কক্ষম হয় শৈশবাবস্থায় এই পীড়ায় শিশুর শরীর দুর্বল হইলে ৩৪ দিন মধ্যে মৃত্যু হয়

চিকিৎসা উদরে তৈল মাখাইয়া ফোমেন্ট কবিবে, উষ্ণ জলে স্নান করাইবে, সরিষার পলস্তারা দ্বারা উদরের বেদনা বন্ধেব চেষ্টা কবিবে এবং নিম্নের লিখিত ঔষধ খাইতে দিবে

পল্লব ইপিক্যাক্ কম্পাউণ্ড	..	..	৫ গ্রেন
হাইড্রার্জ কমক্রিটা	..	..	৫ গ্রেন
সোডা	...	..	৪ গ্রেন
অথবা সোডার পরিবর্তে বিস্মথ	..	..	৫ গ্রেন

এক এক মাত্রায়, দিবসে তিন চাবি ব ব দিবে

বিরেচন আবশ্যক হইলে এবণ্ড তৈল ১ আউন্স এবং টীং ওপিয়াই ১০ ফোঁটা ব্যবস্থা কবিবে। কিয়দিনের পুৰাতন বোগ হইলে নীচেব ঔষধটি বিশেষ ফলপ্রদ বিবেচনা হয়

কাইনো	..	...	১০ গ্রেন
খদিব	...	...	৫ গ্রেন
সোডা	..	..	৩ গ্রেন
অহিফেন	..	..	১ গ্রেন

এক এক মাত্রায়, প্রত্যহ ৩ ৪ বাব ক্রিমি থাকিলে সেণ্টোনাইন ব্যবস্থা

পুরাতন উদরাময় — ইহাকে প্লেভীতিসাব কহে। কোনকোন দৌৰ্বল্যকর পীড়া, বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া বশতঃ এই বোগ জন্মে

লক্ষণ — প্রথমে দিৱাজিব মধ্যে ৩ ৪ বাব ভেদ হয় ক্রমে উহা জলবৎ ও অপরিমিত অনেক হইতে থাকে জিহ্বা পবিত্রিত, উজ্জ্বল, কখন কখন বেদনামুক্ত হয়, এমন কি তজ্জন্ত পানীয় জব্য গ্রহণ কৰিতে বন্ধ বোধ হয় শৈশবাবস্থায় স্নোগীর স্বভাব বড় চঞ্চল হইয়া উঠে, নাড়ী

অতি সূক্ষ্ম, সূত্রবৎ ও দ্রুতগামী, সর্বদা গাএ শুষ্ক, কক্ষ্ম, কখন কখন কোমল ও ঘর্মযুক্ত হয় কখন কখন ক্ষুধাবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়, এবং বোগী কুপথ্যে ইচ্ছা কবে; শরীর ক্রমে শীর্ণ, দুর্বল, চক্ষু ও মুখ বক্তহীন, সর্বশরীরে শোথ এবং জিহ্বা ও মুখবিবর শুক্লবর্ণ ও লেপযুক্ত হয়, তজ্জন্ত অচেতন ও আক্ষেপেবৃসহিত প্রাণত্যাগ কবে

চিকিৎসা —এই বোগে সচবাচব ঔষধে ততটা উপকাব দর্শনা, যতটা উপকাব সাধাব স্বাস্থ্যেব অতি দৃষ্টি বাধিলে দর্শে, তজ্জন্ত পথ্যাপথ্যেব বিশেষ স্বেন্দোবস্ত এবং যাহাতে বোগীর পাবিপাকশক্তি বৃদ্ধি হয়, আহাবে কচি হয়, সেক্ষপ কবিত্তে হয়, আব নিম্নলিখিত ঔষধ দিতে হয়

নাইট্রো মিউবিযেটিক য্যানিড	...	১৫ বিন্দু
টীং ওপিয়াই	...	১০ বিন্দু
দাকচিনিব জল	...	১ আউন্স

একমাএষ প্রত্যহ ৩ ৪ বাব দিবে

য্যালোপ্যাথিক পদ্ধতি স্থানে নিম্নোক্ত ঔষধ বিমেষ মল প্রাপ্ত হয়

সল্ফেট অফ কুনাইন	...	৫ গ্রা
টীং ওপিয়াই	...	১০ বিন্দু
জল	...	১ আউন্স

এক মাত্রা এইকপে দিবসে ২ বাব দিবে

পার্বর্তীয় উদরাময় —যকৃত্তেব জিয়া বিকৃত হইয়া প্রায়ই এই পীড়া জন্মে

লক্ষণ —প্রথমাবস্থায় শুল্ক স্থিতিকাবর্ণেব মল নির্গত হয়। শেষাবস্থায় উঁহাব সহিত অনেক অজীর্ণ পদার্থ মিশ্রিত থাকে সচবাচব প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাব পূর্বে অধিক মল নির্গত হয় এই মলেব বিশেষ এক প্রকার দুর্গন্ধ আছে, ঔষধাদি সেবন করাইলেও ক্রমে শরীর দুর্বল এবং বক্তহীন হইয়া পড়ে, এবং পীড়া অধিককাল স্থায়ী হইলে বোগীর মৃত্যু উপস্থিত হয়। বর্ধাব শেষভাগে এই পীড়া প্রায়ই হইয়া থাকে

চিকিৎসা বাজিতে ডোবার্স পাউডার এবং ব্রুপিগ সেবন কবা-
ইয় পবদিবস ক্যাফেইন অয়েল ১ আউন্স এবং টীং ওপিযাই ১০ ফোঁটা
ব্যবহার দ্বারা উত্তমরূপে কোষ্ঠ প বিঘ ব হইলে এই ঔষধ দিবে

চক	...	৩ গ্রেন
ডোবার্স পাউডার	.	৫ গ্রেন
মর্ফিয়া	...	৫ গ্রেন

এক মাত্রা, এইরূপে দিবসে ৩ বাব সেবন করাইবে পীড়া কঠিন
বোধ হইলে নিম্নোক্ত কোন ঔষধ ব্যবহাবে সুফল প্রত্যাশা কবা যায়

সিস্মথ	.	৫ গ্রেন
সোডা	..	৫ গ্রেন
মর্ফিয়া	..	৫ গ্রেন

এক মাত্রা, বোগেব অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োগ করিবে

অফিজ	.	৫ গ্রেন
ক্যালিক য্যাসিড	..	২ গ্রেন
ট্যানিক য্যাসিড	..	২ গ্রেন
কাইনো	.	১০ গ্রেন

এক মাত্রা প্রত্যহ তিন চাবি বাব খাইতে দিবে

কেবলমাত্র ১ গ্রেন মাত্রায় ট্যানিক য্যাসিড দিবাবাজির মধ্যে ৩ ৪
বাব ব্যবহার ববিয়া বিলক্ষণ উপকার পাওয়া যায়

আনুসঙ্গিক উদরাময় এই বোগ প্রায়ই অল্প বোগেব সঙ্গে
উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ যেরূপে উদরাময়ের চিকিৎসা হইয়া থাকে,
প্রধান বোগেব ঔষধেব সহিত উদরাময়-নিধারক ঔষধ প্রয়োগেই ইহাব
প্রতিকার হইয়া থাকে

পথ্য দুধমাগু, ঘ্যাবোকট, বিলেব মৎস্যেব ঝোল, অল্প মাত্রায়
ত্রাণ্ডি, শীতল জল ইত্যাদি

আমার্শিয় ইহাতে আয়বিক দুর্বলতা এবং স্কুলাজের শৈথিল্য
ঝিল্লীতে প্রদাহ জন্ম মলদ্বার দিয়া সর্দিব আয় পদার্থ এবং তাহাব সহিত
রক্তমিশ্রিত অত্যল্প মল নির্গত হয়

লক্ষণ । — প্রথমে ঈষৎ কম্প হইয়া ক্রমে গাত্র উষ্ণ, ক্ষুধামান্দ্য, বমনোদ্বগ ও পবে উদবে চর্ক্বনবৎ বেদনা, এবং ক্ষণে ক্ষণে মল নিঃসরণেব বেগ হইতে থাকে প্রত্যেক বাবেই সর্দিব ন্যায় অস্প অস্প মল নির্গত হয় এবং তাহাতে সামান্য পবিমাণে বক্ত মিশ্রিত থাকে জিহ্বা শুক্লবর্ণ ও আর্দ্র, অস্প পিপাসা এবং আহাবে অনিচ্ছা জন্মে বোগী কোন প্রকার অস্থিতাচার না কবিলে বিনা চিকিৎসায় এই পীড়া হইে সপ্তাহ মধ্যে আপনা হইতেই ভাল হয়, এবং উপযুক্তরূপে চিকিৎসা হইলে ২ ৩ দিবস মধ্যে ভাল হইতে পাবে

প্রবল (ACUTE) আমাশয় — ইহাতে প্রথমতঃ ঈষৎ কম্প, পবে গাত্র অস্প ঊষ্ণ, নাড়ী দ্রুতগামী হয়, শ্বাসযন্ত্রেব দৌর্বল্যলক্ষণ সমুদায় প্রকাশ পায় সামান্য আমাশয় অপেক্ষা ইহাতে উদবেব বেদনা এবং ক্ষণে ক্ষণে যোবতব বেগেব সহিত মলত্যাগেব ইচ্ছা অধিক হয় প্রথমতঃ বিবেচনেব সহিত সামান্য মল মিশ্রিত থাকে, পবে উছা পবিমাণে অত্যস্প এবং মিউকস্ ও বক্তসংযুক্ত দেখা যায় এই বোগে সময়ে সময়ে প্রজ্বাবেব অত্যন্ত অস্পতা হেতু ক্যাথিটার (শলা) দ্বাৰা প্রজ্বাব কবাইতে হয় অতিশয় কষ্টদায়ক বেগেব আধিক্য হেতু বোগী শয্যা হইতে উঠিতে চাহে না উদবেব স্থানে স্থানে বেদনা ও আধুমান হয় । ক্রমশঃ শবীর নিস্তেজ হইয়া আইসে উত্তরোত্তর রোগ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে মল ধৌতমাংসজলেব ন্যায় ও পূর্ববৎ মিউকস্ ও বক্তযুক্ত হয় শবীবে জ্বতাব, নাড়ী দ্রুতগামী, স্তম্ভ, উদর ক্ষীত, জিহ্বাব মধ্যস্থল ক্লদযুক্ত এবং উদব পার্শ্ব শুক্ল, রক্ত বা কটা বর্ণ দেখায়, বোগী নিতান্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, শবীবে দুর্গন্ধ ছাড়ে, ক্রমে প্রলাপাদি লক্ষণ আবির্ভূত হইয়া মৃত্যু উপস্থিতি হয়

আমাশয়রোগেবও প্রকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, যথা ;— সাধারণ, — প্রবল (উপবে যে হইে প্রকাবেব ক্রিম উল্লিখিত হইল), তদ্বা তীত ম্যালেরিয়াজনিত, ম্যালিগ্যান্ট বা সাংঘাতিক, স্কর্বিউটিক ও পুৰাতন আমাশয়

ম্যালেরিয়াজনিত আমাশয়ে বোগেব সাধাবণ লক্ষণ সকলের সহিত ম্যালেরিয়া জ্বর ভোগ হইয়া থাকে ।

ম্যালিগ্ৰাণ্ট বা সাংঘাতিক আমাশয়ে টায়ফয়েড জ্বরের অধিকাংশ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় । প্রথমাবস্থাতেই বোগী নিতান্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, গাত্র শুষ্ক ও উষ্ণ, উদরে বেদনা ও ভারবোধ, শ্ববভঙ্গ, পাক-শায়েব উত্তেজনা নাড়ী ক্ষুণ্ণগামী, মুখে সচবাচর পবিমাণে অল্প সাত্ত্বিশয দুর্গন্ধযুক্ত, প্রভাবকালে জাল বোধ হয় । ক্রমে শবীব ও তাহাতে নির্যাসবৎ ঘর্ম ব হঠাৎ অধিক পবিমাণে বক্তপ্রাব হইয়া মূত্ৰ উপস্থিত হয় ।

স্কর্বিউটিক আমাশয়ে শবীব শীর্ণ, বক্তবিহীন, হস্তপাদাদি ও কটিদেশে বেদনা, দলুমাড়ী স্পঞ্জবৎ, উহাতে চাপ দিলে বক্ত বাহির হয়, কখন কখন হস্তপাদাদিতে বক্তবর্ণ উজ্জ্বল চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় ।

চিকিৎসা ।—সামান্য পীড়ায় উদবে মল সঞ্চিত থাকিলে এবও তৈলেব সহিত তীং ওপিধাই বা ক্লোরোফর্ম অথবা পাল্‌ব বাই দ্বারা কোষ্ঠ পবিষ্কার কবাইবে । কোষ্ঠ পবিষ্কার হইলে কেহ কেহ গবম জলে স্নান ব্যবস্থা কবেন । ইহাব পব ১৫ ২০ গ্রেণ ইপিক্যাকুয় না সেবন কবাইবে এবং আবশ্যক হইলে ৫।৭ ঘণ্টা পবে পুনর্কব সেবন কবান যাইতে পাবে । উক্ত ঔষধ সেবনেব পূর্বে যদি কিছু আহাব কব না যায় এবং ঔষধ সেবনান্তে যদি স্ত্রিবভাবে বোগী শয়ন কবিয়া থাকিতে পাবে, তবে সম্ভব রোগেব উপশম হয় ।

বোগীকে নিভৃত স্থানে রাখিয়া বমন নিবাবণার্থে বোগেব ন্যূনাধিক্য অনুসারে প্রথমে ২০ বিন্দু বা ভতোমিক্স, এমন কি অর্ধ ড্রাম তীং ওপিধাই বা ২০ বিন্দু ক্লোরোফর্ম কবাইয়া উহাব অর্ধ বা এক ঘণ্টা পরে ১০ গ্রেণ হইতে অর্ধ ড্রাম পবিমাণে ইপিক্যাকুয়ানা সেবন কবাইবে । ইহাতে মল স্রাববিরুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং কখন কখন প্রভূত ঘর্ম হইয়া বোগীকে নিদ্রিত হইতে দেখা যায় । প্রথম দিবসে এইরূপ ব্যবহার কবিয়া পক্ষাৎ ৪ ৫ দিবস পর্যন্ত অল্প মাত্রায় ইপিক্যাকু সেবন কবান কর্তব্য ।

বমনোদ্বেক হইলে পাকশায়েব উপব সবিষাব পলস্তাব দেওয়া

উচিৎ এবং তৃক্ষা নিবাবণার্থ ববফ ও ববফজন সেবন কবান সর্বতো-
ভাবে বিধেয় উদবেব বেদনা নিবাবণ জন্ত ত্যাপিণ তৈলেব বা
ক্লোবোফবমেব লিনিমেন্ট প্রয়োগ এবং ফোমেণ্টেসন্ কবা যাইতে
পাবে ।

ম্যালেরিয়াজনিত অামাশয় ইপিক্যাকুয়ানার সহিত অথবা মধ্যে
মধ্যে পৃথক কুইনাইন সেবন না কবাইলে বিশেষ ফললাভ কবিতে পবা
যায় না কেহ কেহ এইরূপ অামাশয়ে ১০ হইতে ২০ গ্রোন মাত্রায়
কুইনাইন প্রয়োগ কবিবাব উপদেশ দেন শরীর দুর্বল হইলে এ
অবস্থায় মঙ্গু বাদি সজীব মংসেব বোল এবং পোর্ট ওয়াইন পথ্যরূপে
দেওয়া যাইতে পাবে

ডাক্তার ওয়েরিং, য্যাশিটেট্ অফ লেড্ ১০ গ্রোন, ডাইলিউট য্যাশে
টিক ম্যাগ্নিড ১০ বিস্ক, মর্ফিয়া সিকি গ্রোন এবং জল ১২ আউন্স মিশ্রিত
কবিয়া পিচকাবী দিবাব উপদেশ দিয়া থাকেন

পুরাতন অামাশয়ের চিকিৎসা ।—অামাশয় পুরাতন হইলে
সহজে আবোগ্য লাভ করা বোগীব পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে স্থান-
পরিবর্তনে বিশেষ উপকার দর্শে

অম্পমাত্রায় ইপিক্যাকুয়ানা সেবন কবাইলে বিশেষ উপকার পা ওয়
যাইতে পারে ; অথচ নিম্নোক্ত ঔষধ পদান কবিলে ইহাও অশাধ্য
যায়ী সফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়া থাকে

য্যাশিটেট্ অফ লেড্ ... ২ গ্রোন

অফিঙ্গ ... আবশ্যক মত ।

এক মাত্রায় । এইরূপ ২৩ বাব, অথবা, —

সল্ফেট অফ কপার ... ১ গ্রোন ।

অফিঙ্গ ... ২ গ্রোন ।

একটি বটী এইরূপে দিবসে ৪ ৫ বাব সেবন করিতে দিবে ।

নাইট্রেট অফ সিল্ভার তিন ভাগেব এক ভাগ মাত্রায় বিশেষ উপ-
কারী, ইহার সহিত ২ ৩ গ্রোন মাত্রায় একট্রাক্ট কুবচী বিশেষ ফলদায়ক ।

শরীর জীর্ণ, দুর্বল এবং বোগীব ক্ষুধামান্দ হইলে ১৫ হইতে ২০ বিস্ক

পর্যাপ্ত লাইকাব ফেবি পাব নাইটেট্টিম্ ব্যবহারে যথেষ্ট উপকাব পাওয়া যায়

গাণালিক য়াশিড	...	...	২ গ্রেণ
কাইনো	...	...	১০ গ্রেণ
ফদির	...	...	১০ গ্রেণ
লগ্ উড্	...	...	৫ গ্রেণ ।
আহিফেন	...	...	২ গ্রেণ ।

এক এক মাত্রায় দিবসে ৩ ৪ বাব সেবন কবাইবে

কুড়চিব কাথের সহিত অল্প মাত্রায় ইপিকাকুয়ানা সেবনে উপকাব দর্শে

ডিককুমন্ সিঙ্কোনা	...	...	১ আং ।
সল্ফেট অফ জিঙ্ক	...	...	২ গ্রেণ
আফিজ	...	...	২ গ্রেণ ।

এক এক মাত্রায় দিবসে ৪ বাব সেবন কবাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় ।

ইপিকাক না পাইলে আকন্দ রসের মূল ২০ হইতে ৪০ গ্রেণ পর্যাপ্ত ব্যবহারে প্রত্যক্ষ ফললাভ হয়

কুড়চিব কাথ	৪০ গ্রেণ ।
জাঘভল চূর্ণ	১২ গ্রেণ

এক এক মাত্রায় দিবসে ২ ৩ বাব সেবন করিলে যে কোন প্রকার আমাশয় হউক আবোগ্য হইবে ।

নিম্নলিখিত ঔষধ কয়েকটি পুখাতন উদরাময় ও আমাশয় বোগে বিশেষ উপকারী ।

টীং কাইনো	...	...	৯ ড্রাম ।
ভাইমফ্ ইপিকাক	...	...	৩ ড্রাম ।
ডিককুমন্ হিমেটকুমাইন্	...	...	১০ ২ আং

এক আউন্স পরিমাণে দিবসে ৩ বাব সেবন করিতে দিবে

টীং ক্যাটিকিউ	২ ড্রাম

স্পিরিট ক্লোবোফর্ম	..	৩ ড্রাম
লিকুই এক্সট্রাক্ট অফ বেল	...	৬ ড্রাম
ইন্ফিউজন্ মেটিকো	...	৩ আং
এক আউন্স মাত্রায় দিবসে ৩ বাব		
টীং বিয়াই	..	৬ ড্রাম
ইন্ফিউজন্ ব্যাটার্ন	..	১২ আং।
এক আউন্স পরিমাণে ৬ ঘণ্টাস্তর প্রয়োগ করিবে।		
কম্পাউন্ড কাইনো চূর্ণ	..	১০ গ্রোন
কম্পাউন্ড চক চূর্ণ	..	১৫ গ্রোন
সিরাপ অফ জিঞ্জার	..	আবশ্যক মত
এক মাত্রা দিবসে একপ মাত্রায় ৩ ৪ বাব সেবন করান যাইতে পাবে		

পেরিটোনাইটিস্ বা উদর প্রাচীরের পীড়া — উদরগতব ও উদরস্থ ভিসিরার আববক শিব বিল্লীর প্রদাহ। এই বিল্লীতে প্রবল, পুৰাতন, অথবা টিউবার্কুল জন্ম প্রদাহ জন্মিতে পাবে।

লক্ষণ।—বেদনাই ইহার প্রধান লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। এই বেদনা প্রথমে এক স্থানে আবদ্ধ হইয়া পরে সমস্ত উদরে বিস্তৃত হয়, এবং উদর নিপীড়নে, শ্বাসগ্রহণে, উপবেশনে কাশিতে এবং হাসিতে ইহার বৃদ্ধি হয়। পরিশেষে মল মূত্র ত্যাগ করিতে, এমন কি উদর বস্ত্র দ্বারা আবৃত রাখিতে কষ্টবোধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই জ্বর হয়। উদর প্রসারিত, উষ্ণ ও আধুনায়ুক্ত, কোষ্ঠবদ্ধ, বমনোদ্বেগ ও বমন, ত্বক অত্যন্ত উষ্ণ ও কক্ষি, নাড়ী দ্রুতগামী ও দুর্বল, শ্বাস প্রশ্বাস ঘন, জিহ্বা রৌদ্রযুক্ত, কখন কখন হিকা, মুখমণ্ডল ক্ষুণ্ণিত্বিহীন ও উৎকট যন্ত্রণাদির্ব লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। কিয়দবস পরে উদরাধ্যান থাকে না, কিন্তু মধ্য মধ্য সিবম সঞ্চিত হওয়াতে উহা অল্প ক্ষীণ হয় এবং পীড়ার উপশম না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। উদর অত্যন্ত বিস্তৃত হয়, নাড়ী প্রতি মিনিটে ১৪০ বা ততোধিক বাব স্পন্দিত হয়, মুখমণ্ডল বিবর্ণ, দেহ শীতল, ঘর্ষণ ও নিত্যন্ত নিশ্বেদ হইয়া

শীড়া প্রকাশিত হইবার ৮.১০ দিবসেব পবেই বোগী পাণত্যাগ কবে ।

চিকিৎসা ।—বোগীকে অতিশয় সুস্থিভাবে ঐষদ্রুপ পবিদ্ধাব পরিচ্ছন্ন গৃহে বাধিবে দুগ্ধ, জল, যাবোকট ইত্যাদি লঘু আহাব, এবং অধিক মাত্রায় জলীয় এবং স্নিগ্ধ দ্রব্য খাইতে দিবে বেদনা যতক্ষণ নিবারিত না হয়, ৩৩ক্ষণ ৩৪ ঘণ্টা অন্তর অহিফেন সেবন কবাইবে, অথবা গবম ড্রপের সহিত অহিফেন অথবা বেলোডোনার একফ্রাক্ট মাখাইয়া ফোমেন্টেশন কবিবে রোগী উদবেব উপর কিছু ভাব বহনে সমর্থ হইলে, মশিনাব পুলটিশ ব্যবহার কবিবে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে পিচকাবী দ্বারা কোষ্ঠ পবিদ্ধাব কবাইবে, কোন প্রকাব ক্লিবেচক ঔষধ নিষিদ্ধ ডাক্তার ট্যানার নিম্নোক্ত প্রকাবে অহিফেন ব্যবহারের উপদেশ দিয়া থাকেন

একফ্রাক্ট যাকোনাইট . . . ৮ গ্রেণ ।

একফ্রাক্ট অপিয়ম ৮ গ্রেণ

একফ্রাক্ট হায়েসায়েমস্ ১৬ গ্রেণ

আটটি বটী প্রস্তুত কাব্য প্রতি ৪ চাবি, ছয় বা আট ঘণ্টা অন্তর সেবন কবাইবে

একফ্রাক্ট ওপিয়াই ৩ গ্রেণ

একফ্রাক্ট কনিয়াই ৩ গ্রেণ

একটি বটী প্রস্তুত কবিবে এবং ৩৪ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে

দৌর্বল্যেব লক্ষণাদি প্রকাশিত হইলেই উত্তেজক ঔষধ, বিশেষতঃ ত্রাণ্ডি, বিফটী, অসিদ্ধ ডিগ, সব, দুগ্ধ ইত্যাদি পথ্য দিতে হইবে, ঔষধের মধ্যে য্যামোনিয়া ও কুইনাইন সর্কোব্রক্ট

পুরাতন বা টিউবার্কিউলার পেলিটোনাইটিস্ ।—কোন অবল শীড়া কর্তৃক এই শীড়াব উদ্ভব হইয়া থাকে

লক্ষণ —লক্ষণ সকল সর্বদা সুস্পষ্ট নহে বেদনা সামান্য, কখন কখন উর্হা শূলবেদনারু ছায়ও হইতে পারে, জ্বরেব সহিত উদবাগমও হইতে দেখা যায় চিকিৎসা দ্বারা আশু প্রতিকার দর্শে বটে, কিন্তু কিয়দিবস পরেই বক্ষঃস্থলক্ষীত ও বেদনামুক্ত, কঠিন উদবাগম ও

বমনোদ্বেষ্টে পৰ বোগী নিতান্ত শীর্ণ ও দুৰ্বল হইয়া পড়ে ক্রমে পেরিটোনিয়মেব মধ্যে সিবম সঞ্চিত হইয়া প্রকৃত "উদববোগ" উপস্থিত হয়। তখন চিকিৎসার অসাধ্য হইয়া উঠে।

চিকিৎসা — দুগ্ধ, সব, ডিম্ব প্রভৃতি লঘু অথচ পুষ্টিকর খাদ্য, এবং নিম্নোক্ত প্রকার মালিশ প্রয়োগ কবিবে

আইওডিন্ লিনিমেন্ট ... ১ ভাগ।

স্পিবিট ... ৪ ভাগ।

একত্র উৎসকপে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ কবিবে।

প্রয়োজনানুসারে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য

সোডিয়াম্ফাইট ... ৮০ গ্রেণ

ইন্ফিউজন্ চিবাটা ... ৭ ১/২ আং

ছয় মাত্র। দিবসে তিনবার খাইতে দিবে

সিবপ ফেবি আইওডাইড ... ৪ ড্রাম।

মিউসিলেগো ট্র্যাগাক্যান্থি ... ১ আং।

ওলিয়াই মবহা ... ৪ ১/২ আং।

এক এক মাত্রায় বড় এক চামচ পরিমাণে, এইরূপে দিবসে ২৩ বার প্রয়োগ কবিবে

টীং কুইনি কম্পোজিট ... ১ আং।

সিবপ ফেবি আইওডাইড ... ২ ১/২ ড্রাম।

ইন্ফিউজন্ কলম্বা ... ৭ ১/২ আং।

ছয় মাত্র। দিবসে তিনবার প্রয়োগ কবিবে

য্যাসাইটিস্ বা উদরী।—পেরিটোনিয়মেব গহ্বর মধ্যে সিবম সঞ্চিত হৈতু উদরের ক্ষীণতা ও প্রসার হয়, তাহাকেই উদববোগ বলে

লক্ষণ — বোগীর আঁকাব দেখিলেই বোগ চিনিতে পারা যায়। দেহেব উর্দ্ধভাগ শীর্ণ হয়, শরীর আকৃতি, মুখমণ্ডল উদ্বিগ্ন ও এবং উদর ক্ষীণ ও বড় হয়। পীড়ার বর্দ্ধিত অবস্থায় উদরস্থ সিবমেব জিপীডন হৈতু প্লীহা, পাকায় ও যকৃত উর্দ্ধগামী হওয়ায় শ্বাসকষ্ট

হইতে থাকে বক্ষঃস্থলেব নিয়ে মব্ মব্ শব্দ হয় সার্বদিক শোথ এই বোগেব সহচর বলিয়া জানিতে হইবে মূত্র প্রায়ই অল্প পরিমাণে হয় পীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে শরীর শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়ে, ক্ষুধামান্দ্য, বাত্রিকালে অনিদ্রা, মানসিক নিস্তেজকতা ইত্যাদি লক্ষণ আবির্ভূত হয় ইহা সাধাবণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত

মূত্রপিণ্ডের পীড়া জন্য উদর।—পীড়ার প্রথমাবস্থাতে শোথ, এবং সেই শোথ সর্বাঙ্গে, মুখমণ্ডলে প্রকাশিত হয়। এই বোগেব সহিত প্লুবা ও স্বেদেব মধ্যে সিবম সঞ্চিত হইয়া থাকে প্রস্রাব পরিমাণে অল্প ও ঘোলা মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও রক্তহীন হয়। জিহ্বা কটাবর্ণ, নিশ্বাস দুর্গন্ধয, অস্থিৰতা, অচেতনতা, আক্ষেপ, প্রলাপ ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়

বক্ষঃগহ্বরের পীড়া জন্য উদর।—প্রথমে পদে শোথ আবৃত্ত হইয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। উদবে জল সঞ্চয়েব পূর্বে শ্বাসকষ্ট হয়। ওষ্ঠ, মুখমণ্ডল ও হস্ত-পদাদিব অগ্রভাগ নীলবর্ণ ধারণ করে ফুস্ফুস বা গলনালীর নিপীড়নেব চিহ্ন, সার্বদিক শোথ শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পায় উদর ও বক্ষঃপ্রাচীরেব শিবা সকল বক্র ও প্রসারিত হয়।

যকৃত বা পোর্টাল শিরার পীড়া জন্য উদর।—প্রথমেই উদবে শিবা সঞ্চিত হইতে আবৃত্ত হয়, মুখমণ্ডল, বাহু অথবা দেহেব উর্দ্ধদেশে শোথ দেখিতে পাওয়া যায় না উদর যত স্ফীত হইতে থাকে, ততই শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি পায়, উদবপ্রাচীরেব শিবা সকল স্ফীত, বক্র ও প্রসারিত হয় এবং অর্শ, পাকশয় বা অন্ত্রেব প্রদাহ, পাকশয় অথবা অন্ত্র হইতে বক্ত্রাব, যকৃতেব বিস্তৃতি, হ্রাস ও বেদনা এবং জন্ডিস, আধুন, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি যকৃৎপিণ্ডেব অন্যান্য লক্ষণ দেখা যায় উদবস্থ সিবম-পরিষ্কৃত, ঈষৎ পীত বর্ণ, যাল্‌বিউমেন্‌যুক্ত, কিন্তু উহাতে ইউবিয়া রক্ত বা প্রদাহিক পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না।

চিকিৎসা —সিরাম আচুসিত করিবার জন্ত, বিরেচক ও মূত্রকাষক ঔষধ প্রয়োগ করা কৰ্ত্তব্য, কিন্তু মূত্রপিণ্ডেব পীড়াবশতঃ উদব-

বোগ হইলে, মূত্রকাবক ঔষধ না দিয় কেবল বিবেচক ব্যবস্থা করিলেই চলিবে মূত্রকাবক ঔষধ এ অবস্থায় নিষিদ্ধ নিম্নলিখিত বিবেচক ঔষধগুলি বিবেচনামুত প্রয়োগ করিবেন

ওলিয়াই ক্রোউনিস্

১ বিন্দু

ওলিয়াই ক্যাবিওফিলি •

১ বিন্দু

মিকাপ্যানিস

বটী প্রাপ্ততেন উপযুক্ত

একটী বটী পশ্চত করিবেন আকস্মিক হইলে আব একটী বটীও

দেওয়া যাইতে পারে

পিলিউলা ক্যান্সোজিয়া কম্পোজিট

৫ গ্রেন

পিলিউলা হাইড্রার্জবাই

৫ গ্রেন

জলে গর্দন করিয়া দুইটী বটী প্রাপ্ত করিবেন এবং গোচর ৩ মধ্যায় সেবন করিতে দিবেন

মূত্রকাবক ঔষধের মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ব্যবস্থা কর যাইতে পারে

লাইকবিন পটনি

১ ড্রাম

স্পিবিটাস্ ইথারিস্ নাটটোসি

৫ ড্রাম

টীং ক্রোশী

২ ড্রাম

ইন্ফিউজন্ ডিজিট্যালিস্

১ ড্রাম

সিবপ

৫ ড্রাম

জল

১ ড্রাম

ছয় মাত্রা । দিবসে তিনবার সেবন করাইবে

দৌর্বল্য থাকিলে নিম্নোক্ত ঔষধগুলি ব্যবহার করিতে পারা য়

ফেবি টার্টাবেটি

৬০ গ্রেন

স্পিবিটাস্ যামোনি য়ারোম্যাটিস্

২ ড্রাম

ইন্ফিউজি কোয়ানিয়া

১ ড্রাম

ছয় মাত্রা । দিবসে তিনবার খাইতে দিবেন

ফেবিথেট্ যামোনিয়া সাইট্রাটীস্

৬০ গ্রেন

স্পিবিটাস্ যামোনিয়া য়ারোম্যাটিস্

৪ ড্রাম

পটাসিয়াম হাইকার্বনেট ... ১২০ গ্ৰাম।

ইন্ফিউজন্ কলম্বা .. ৭৫ আং।

চুখা খাদ্য এক চাখচ সেখন জ্বলের সহিত দিবসে দুইবার সেখন
করাইবে

আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া নগরের মিঃ পাবিশ, ফস্ফেট অফ
আমব, লাইম, সোড এবং পটাসিয়াম এক প্রকার 'সি' প্রস্তুত করিয়া
ছেন যাদের সমস্ত ঔষধবিক্ষেত্রে নিকট পাওয়া যায়। উহা
সাধারণত 'কেমিকেল ফুড' নামে পরিচিত এই ঔষধ সেবনে
বিশেষ উপকার দর্শে

বৈদ্যকমতে উদরাময় চিকিৎসা।



গুরুপাক জ্বর্য ভোজ্য, অপরিমিত ভোজন অতি শ্লেক্কব জ্বর্য
ভোজন, অত্যক্ষ জ্বর্য ভোজন, অতি শূল জ্বর্য অর্থাৎ লড্ডুক পিষ্টকাদি
জ্বর্য ভোজন, শিবমিশ্রিত জ্বর্য ভক্ষণ, পূর্বদিনেব ভুক্ত জ্বর্য পরিপাক
না হইতে হইতে পুনরায় ভোজন, কোন দিন অধিক, কোন দিন অল্প
আহার ও অসময়ে আহার, এই সকল কারণে এবং স্নেহ, বমন এবং
বিরেচনাদির অভিযোগ ও অথবা কোন বিষ ভক্ষণ, ভয়, শোক, ধন ও
শত্ৰুনাশাদি জন্য পবিত্রাপ, দূষিত জলপান, অতিশয় মদ্য পান, স্বস্তাব
এবং ঋতুবিপবীত অর্থাৎ যে ঋতুতে যে জ্বর্য 'ভক্ষণ' নিষেধ, সেই জ্বর্য
ভক্ষণ, জলজীড়া, মলমূত্রাদির বেগধারণ করা ও ক্রিমিদোষ জন্য অতিসার
বোগ জন্মিয়া থাকে

সাধারণ অতিসারের লক্ষণ — অতিশয় বুদ্ধিপ্রাপ্ত শাবীরস্থ
জলীয় ধাতু অগ্নিবল হ্রাস করিলে, ঐ ধাতু বায়ু কর্তৃক অধোদেশে নীত

হইলে বিষ্ঠার সহিত মিশ্রিত হইয়া অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয় বলিয়া ইহাৰ নাম অতিসার ।

উক্ত অতিসার বোগ কাবণভেদে ছয় প্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষজ, ক্রীদোষজ, শোকজ ও অপকাম বসজ

বাতজ অতিসারের লক্ষণ — বায়ুপ্রকোপ জন্ম অতিসার জন্মিলে শরীরের বর্ণ লোহিত মিশ্রিত ক্রমবর্ণ হয়, ফোঁসু, কক্ষ্ম অপক মল বাবস্থার অল্প মাত্রায় নির্গত হয় এবং মলদ্বাবে বেদনা বোধ হয়

চিকিৎসা — হরিতকি ও পিপ্পল বাটিয়া ঈষৎ উষ্ণ কবিয়া সেবন করাইবে

ধন্থা, শুঁঠ, মুখা, বেলশুঁঠা, সকলে মিলিত ২ তোলা অর্ধসের জলে সিদ্ধ কবিয়া অর্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া মধু অর্ধ তোলা সহিত খাইতে দিবে ইহাৰ নাম “ধাতু পঞ্চক পাঁচন”

পিত্তজ অতিসারের লক্ষণ — পিত্তজন্ম অতিসাবে মল পীত বর্ণ, অথবা লোহিত বর্ণ হইয়া থাকে, মলদ্বাবে জ্বালা বোধ হয়, বোগী পিপাসা ও মূর্ছাদ্বারা আক্রান্ত হয় ।

চিকিৎসা — “ধাতু পঞ্চক পাঁচন” শুষ্ঠী বাদ দিয়া অবশিষ্ট চারিটি দ্রব্য পূর্ববৎ সিদ্ধ কবিয়া খাওয়াইবে

বালা ১ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা, ক্ষেতপাপড়া ১ তোলা, মুখা ১ তোলা, অর্ধসের জলে সিদ্ধ কবিয়া অর্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিতে দিবে

যষ্টিমধু জল অথবা ছাগজ্বল গুহ্মদ্বাবে সেচন কবিবে, জ্বারা তাহাৰ জ্বালা নিরুত্তি পাইবে

কঞ্চটাদি পাঁচন । — কাঁচড়াপত্র, দাড়িমপত্র, জামপত্র, পানিকুল পত্র, বালা, মুখা ও শুঁঠ মিলিত ২ তোলা, অর্ধসের জলে সিদ্ধ কবিয়া অর্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন কবিতে দিবে ।

কফজ অতিসারের লক্ষণ । — কফজন্ম অতিসাবে মল শুক্রবর্ণ, গাঢ়, কক্ষ্মযুক্ত, আমযুক্ত এবং সীতল হয়, ও রোগীর শরীর বোম্বাখিজ হয় ।

চিকিৎসা ইন্দ্রযব, দাড়িমফলব ইক্ষু ধাতকী পুষ্প বেল-শুঠা, বালা, লোধ, বক্তচন্দন আকনাদি মিলিত ২ তোলা, অর্ধসেব জলে সিদ্ধ করিয়া অর্ধ পোষা থাকিতে নামাইয়া অর্ধ তোলা মধু ত হাতে মিশ্রিত কবতঃ পান করিতে দিবে ইহা নাম “কুটজাদি পান”

জায়ফল, লবঙ্গ, জীবা সোহাগাব খই, সমভাগে চূর্ণকবতঃ মধু ও টনির সহিত কবতঃ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে

জাতীয় ফল রস। পাবদ, অন্ন বসসিদ্ধন, গন্ধক, জায়ফল, ইন্দ্রযব ধুতুরাবীজ, সোহাগাব খই, ত্রিকটু মুখ ইবিওকী, আশ্বকেশী, বেলশুঠা, শালবীজ, দাড়িমফলেব ছাল, জীবা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সিদ্ধপত্র বসে মর্দন কবতঃ ১ বতি প্রমাণ বটী করিবে অল্পপান ধন্য ও শুঠিব কাথ

ত্রিদোষজন্য ততিসারের লক্ষণ — বায়ু পিত্ত কফ ত্রিদোষ কুপিত হইয়া এই অতিসারের উৎপত্তি হয় মল বায়ুপিত্তকফজ অতি সারের সমান লক্ষণযুক্ত, বিশেষতঃ শূকরের বস, কিম্বা মাংসদোহ জলের আশে দেখায় চিকিৎসকগণ ত্রিদোষজন্য অতিসারকে অসাধ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন

চিকিৎসা — এক বতি অহিফেন এর ছোট ক ছাগীদুগ্ধে গুলিয়া ক্রমে ক্রমে সেবন করাইবে

কুটজাফল — কুড়চিব বাটা ছাণ ২০ সেব, ৬৪ সেব জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ সেব থাকিতে নামাইবে এ কাথ ছ কিয়া আবার অগ্নিতে চাপাইয়া যখন আটাবৎ হইয়া আসিবে, তখন নিম্নলিখিত দ্রব্য গুলি গুড়া করিয়া ত হাব সহিত মিশ্রিত করিয়া নাড়িতে নাড়িতে নামাইবে

মোচবস, আকনাদি, ববাক্রান্তী, আতাইচ, মুগা, বেলশুঠা, ধাতুকী পুষ্প, প্রত্যেকেব গুড়া ৮ তোলা অল্পপান গরম জল

নারায়ণ চূর্ণ — গুণ্ডাক, বিদ্ধড়ক বীজ, ইন্দ্রযব, বেলশুঠা, অতাইচ, ভুজবাজ, শুঠ সিদ্ধপত্র চূর্ণ, প্রত্যেকেব গাজা সমান সকলের সমান কুড়চি ছাল চূর্ণ এই সকল একত্র করিয়া গুড় ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে

আমজ অতিসারেব লক্ষণ ।—অন্ন অজীর্ণ বশতঃ কুপিত বায়ু পিত্ত কফ বিপথগামীহইয়া কোষ্ঠ এবং বসাদি ধাতু সমূহকে দূষিত কবিয়া পুনঃপুনঃ যে নানা বর্ণের মল নিঃসারিত কবে, তাহাকে আমজ অতিসার কহে । ইহাতে বোগী পেটে অত্যন্ত বেদনা বোধ কবে

চিকিৎসা । ইন্দ্রযব, দাড়িমফলেব ওক, মুখা, ধাতকী পুষ্প, বেলশুঠ, বাল, লেখ, বক্তন্দন, তাকনাদি, মিলিত ২০তেলা, জল অর্দ্ধ সেন, সিদ্ধ কবিয়া অর্দ্ধপোয়া খাবিতে মধু অর্দ্ধ তোলা তাহার সহিত মিশ্রিত কবিয়া খাইতে দিবে । ইহার নাম “কুটজাদি পঞ্চনাম”

অহিফেনাসব । মউল ফুলেব মদ ১২ ০ সেব অহিফেন ৪ পল, মুখা, জাবফল, ইন্দ্রযব, এলাইচ ৩তোকে ১ পল, এই সকল ত্রয়া আৱৃত পাত্রে একমাস বাখিতে হইবে, পবে ছাঁকিয়া লইবে । মাত্রা অর্দ্ধ মাস।

কুটজারিষ্ট ।—কুড়চিমূলেব ছাল ১২ ০ সেব জাফা ৬ ০ সেব, মউলফুল ১৬ পল, গাড়াবীৰ ছাল ১০ পল, পাকার্থ জল ১৫৬ সেব, শেষ ৬৪ সেব । এই কাথে ধাতকী পুষ্প ২০ পল এবং গুড় ১২ ০ সের মিশ্রিত কবিয়া এক মাস আৱৃত পাত্রে বাখিবে । তাহার পবে ছাঁকিয়া লইয়া এক মাস পবিমানে বোগীকে খাইতে দিবে । ইহাতে জ্বরযুক্ত উদরাময়েবও উপকার দর্শিবে

জ্বরাতিসার ।—যদি পৈতিক জ্ববে পিত্তজন্ম অতিসার অথবা অতিসার বোগে জ্বর উপস্থিত হয়, তবে দোষ দৃশ্যেব সাগ্যভাব হেতু এই মিলিত ঔষধকে জ্বরাতিসার বনে

কেবল মাত্র জ্বর ও কেবলমাত্র অতিসাবে যে যে ঔষধ ব্যবহৃত হয়, জ্বরাতিসাবে উক্ত দুই বোগেব ঔষধ মিলিত কবিয়া প্রয়োগ কবা অনায়াস, কাবণ, জ্বরন্ম ঔষধ প্রায়ই ভেদক এবং অতিসাবেব ঔষধ ধারক, সুতরাং কেবল জ্বরন্ম ঔষধে অতিসার বৃদ্ধি এবং কেবল অতিসারন্ম ঔষধে জ্বরেব বৃদ্ধি হইবাব সম্ভাবনা; তজ্জন্ম জ্বরাতিসাবে পৃথক ঔষধ লিখিত হইতেছে

চিকিৎসা । উপবাস এবং পাচক ঔষধ ব্যবস্থা কবিতে হইবে, এবং নিম্নোক্ত ঔষধ সমুদায় সেবন করাইবে

হ্রীবেবাদি পাঁচন — বালা, আতইচ, মুখা, বেলশুঁঠা ও ধন্বা মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া সেবন করাইবে

উষীরাদি পাঁচন ।— বেনাব মূল, মুখা, ধন্বা, শুঁঠ, ববাক্রান্তা, ধাইফুল লোধ, বেলশুঁঠা, সকলের ওজনসমষ্টি ২ তোলা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে

বৃহৎ পঞ্চমূলাদি পাঁচন ।— বিষ্ণু, সোনা গাজাবী, পাকুল, গম্বীরাবী শুঁঠ পানিফলপত্র, কাঁচড়া, মুখা, জামপত্র দাড়িমপত্র, বেলেশুঁঠা, মূল, বালা, গুলঞ্চ, আকনাদি, বেলশুঁঠা, ববাক্রান্তা, কুড়চীছাল ইন্দ্রযব, ধন্বা, ধাতকী পুষ্প, সকলের মিশ্রিত ওজন ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে এই কাথে আতইচচূর্ণ ২ গামা, জীরা চূর্ণ ২ গামা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন বিধি

বৃহৎ কটজাবলেহ — কুড়চীমূলের ছাল ১২ ০ সেব, ৬৪ সেব জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সেব থাকিতে নামাইবে এই কাথ ছাঁকিয়া তাহাতে চিনি ১২ ০ সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে, ঘন হইয়া আসিলে নাম টখা নিম্নলিখিত অব্য চূর্ণ করিয়া তাহাতে দিয়া নাড়িবে

প্রক্ষেপ অব্য যথা,— আকনাদি মূল, ববাক্রান্তা, বেলশুঁঠা, ধাইফুল, মুখা, দাড়িমফলের ত্বক, আতইচ, লোধ, মোচবস, শ্বেত ধুনা, বসোত, ধন্বা, বেনাব মূল, বালা, এই চৌদ্দটি জিনিস প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মীতল হইলে মধু দুই পল তাহাতে মিশ্রিত করিবে মাত্রা ১ তোলা, অম্লপান ছাগদুগ্ধ বা তণ্ডুল জল

গগনসুন্দর রস ।— সোহাগাব এই, হিজল, গন্ধক, অত্র, সমান ভাগে ক্ষিকইয়ের বসে তিন দিন ভাবনা দিয়া ২ বতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে অম্লপান ২ বতি শ্বেত ধুনা চূর্ণ ও মধু পথ্য ছাগদুগ্ধ

কনকপ্রভাবটী — ধূতুরা বীজ, মরিচ, গোয়ালিয়া মতা, শিপুল,

মোহাগাব খট, অমৃত ও গন্ধক সমভাগে লইয়া সিদ্ধি বসে মর্দন করিবে। এক বাঁও প্রমাণ বটী। অল্পপান মধু পথা—তিতিব পক্ষী ব মাংস ইত্যাদি।

অতিসারের উপদ্রব, শোথ ও উদবে শূলসং বেদনা, জ্বর, পিপাসা, শ্বাস, অরুচি, বমি, মুচ্ছা এবং হিকা এই সকল উপদ্রব বড় সাংঘাতিক, রুদ্ধাবস্থায় এই সকল উপদ্রবেব সহিত উদরাময় হইলে বোগী বক্ষা পায় না।

অতিসারের অসংখ্য লক্ষণ।—যে বোগী ব পাক জ্বরের তুল্য বর্ণ, কৃষ্ণ লোহিত বর্ণ, অশ্রু, ঘ্রত, তৈল, বসা, মজ্জা, ওড়, পিপ্পলী, মবি চেব সহিত পিষ্ঠ অস্থিশূন্য পক মাংস, দধি, দুগ্ধ মাংসধৌত জলেব বর্ণ, নীল বর্ণ, অরু বর্ণ, মর্দিত অঞ্জনপিণ্ডেব ত্রায় ঈষৎ কৃষ্ণ কক্ষ্ম, স্নিগ্ধ ও নানা বর্ণ, ময়ূব পুঞ্জিব তুল্য বর্ণ, ঘন, শবগন্ধযুক্ত, মস্তকের মধ্যগত স্নেহতুল্য আতায়ুক্ত উত্তম গন্ধ কিম্বা দুর্গন্ধযুক্ত মল অধিক পবিমাণে নির্গত হয়, তৃষ্ণা, দাহ, অন্ধকার দর্শন, শ্বাস, হিকা এবং পার্শ্বে ও অস্থিতে বেদনা, ইন্দ্রিয়মোহ, সকল চেষ্ঠাতে অনিচ্ছা, এবং যাহাব মল-দ্রাবের বলি পাকিয়াছে ও প্রলাপ বকিবে, এবং অযথা বাক্যলাপ করিবে, তাহাব আশা পবিত্যাগ করিতে হইবে যে ব্যক্তি মলদ্বার সম্বন্ধে অক্ষম, মল মাংসকষযুক্ত, উদব অতিশয় আধুনায়ুক্ত পক মলদ্রাব বিশিষ্ট, গাএ শীতল, একপা রোগীকেও পবিত্যাগ করিতে হইবে।

প্রবাহিকা —এই বোগে অহিত ভোজন ও মলত্যাগেব সময় অতিশয় ক্রুদ্ধনে অতি কুপিত বায়ু সঞ্চিত কক্ষকে অঙ্গ মলেব সহিত নিঃসরণ কবে। বৈদ্যগণ এই রোগকে প্রবাহিকা শব্দে নির্দেশ করিয়া থাকেন, সম্ভব লোক ইহাকে ভ্রামাশয় বলে বাতাদিভেদে প্রবাহিকা চারিপ্রকার, যথা—বায়ুজন্ম, পিত্তজন্ম, কফজন্ম এবং রক্তজন্ম।

যাহাব বায়ু কুপিত হইয়া প্রবাহিকা জন্মে, মলত্যাগেব সময় তাহাব পেটে বেদনা হয়।

যাহার পিত্ত কুপিত হইয়া হয়, মল নির্গতমুগ্ধে তাহাব মলদ্বার জ্বলা কবে।

যাহার কফ কুপিত হইয়া পবাহিকা জন্মে, কফেব সহিত তাহার মল নিঃসৃত হয়

বক্ত বৃপিত হইয়া এই বোগ জন্মিলে মলেন্দ সহিত বক্ত নির্গত হয়

চিকিৎসা ।—কচি বেলের শাখা, ডুড, তিল তৈল, পিপ্পল ও শুষ্ঠী সমভাগে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে

পিপ্পল কিম্বা মরিচ ১ পল ছ গছকেব সহিত বাটিয়া সেবন করাইলে প্রবাহিকা থাকে না

বেলশুষ্ঠা ২ মাসা, নিম্বু য় তিল ২ মাসা, শিলাষ পেষণ করিয়া অষ্ট-দধিবস ২ মাসা ও তিলতৈল ২ মাসাব সহিত সেবন করাইবে

অন্ত্যাস্ত ঔষধ অতিস বেব ত্রায ।

অতিসার নিবৃত্তির লক্ষণ ।—যে অতিসার বোগাক্রান্ত ব্যক্তির মল ব্যতীত মূত্র সম্যকরূপে নির্গত হয়, এবং যথোপযুক্তরূপে বায়ু নিঃসরণ হয়, তাহার ক্ষুধা ও কোষ্ঠেব লয়ুতা হইলে, তিনি বোগমুক্ত হইয়াছেন বলিয়া জানিতে হইবে

গ্রহণী রোগ —যাহার অতিসার বোগেব শান্তি হইয়াছে, অথচ অগ্নিবল (ক্ষুধা) সম্যক প্রকাশ পায় নাই, অথবা যাহার কেবল অগ্নিমান্দ্য হইয়াছে, এই উভয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তির অহিতকর আহারদোষে অধিকতর অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হইয়া গ্রহণী নামক নাড়ীকে দুর্গিত করে ।

গ্রহণীর সামান্য লক্ষণ ।—অতিশয় বর্ধিত বায়ু পিত্ত কফ এবং মিলিত ত্রিদোষ (বায়ু পিত্ত ও কফ) গ্রহণী নাড়ীকে অত্যন্ত দুর্গিত করে বলিয়া গ্রহণী রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে এই রোগেব বহুল পবিমাণে পক্ব বা অপক্ব ভুক্ত অথবা মলদ্বার দিয়া পুনঃপুনঃ নিঃসৃত হয় এই মল দুর্গন্ধযুক্ত, পাতলা বা গাঢ় হয় এবং কোষ্ঠ না হওয়াব সময় পেটে বেদনা হইয়া থাকে, এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তির নাম গ্রহণী রোগ

গ্রহণী রোগের পূর্বরূপ —গ্রহণী রোগ জন্মিব তদ্যাবধি

পূৰ্বে পিপাসা, আলস্য, বিদগ্ধ, অজীর্ণ, শবীবের দৌৰ্বল্য ও কক্ষমতা হয়, এবং ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইলেও তাহাতে অনেক বিলম্ব হইয়া থাকে ।

বায়ুজন্য গ্রহণীর নিদান ও পূৰ্বরূপ নিরূপণ ।—যে ব্যক্তি কটু, তিক্ত, কষায়, অতিশয় কক্ষম এবং সংযোগবিকৃত দ্রব্য অহাব কবে, অল্প ভোজন অথবা উপবাস অতিশয় মলমূত্রাদির বেগ ধাবণ ও অতিশয় মৈথুনাশ্রিত, তাহাব কুপিত বায়ু বেষ্ঠাশ্লিকে দূষিত করিয়া গ্রহণী বোগ উৎপন্ন কবে । এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ভুক্তান্ন অতি কষ্টেব সহিত পরিপাক পায় অথবা অন্নপাক হয় । আহাবীয় দ্রব্যেব জীর্ণাবস্থায় উদবাধান হইয়া থাকে, শবীবের কৰ্কশতা, কঠ ও মুখশোথ, তন্নাভিলাষ, পিপাসা, দৃষ্টিশক্তির হানি বা অন্ধকাব, দৰ্শন, ও কর্ণে নানা প্রকাব শব্দ শ্রবণ এবং নিবন্তব পার্শ্ব, উৰ্দ্ধ, বক্ষ ও গ্রীবায বেদনা বোধ হয় । উৰ্দ্ধ এবং অধোদিকে দ্রব মলের গতি হইতে থাকা অস্বাভাবিক হয়, তদ্বারা একপা শব্দ হয় যেন, এক কলসীব জল অপৰ কলসীতে ঢালিতেছে ; তন্তিন্ন হৃদয়ে বেদনা, শবীরের কক্ষতা ও দৌৰ্বল্য, মুখেব বিবসতা, মলদ্বাবে কৰ্ত্তনবৎ পীড়া, সকল বসবিশিষ্ট, অর্থাৎ কটু, তিক্ত, মিষ্টাদি বস্তু ভক্ষণে অভিলাষ ও মনের অবসন্নতা জন্মে । এই অবস্থায় বাত, গুল্ম, হৃদ্রোগ ও প্লীহা জন্মিতে পাবে । বহুকালে কখন দ্রব, কখন শুষ্ক, শব্দ এবং ফেণাযুক্ত, অল্প পরিমাণে পুনঃপুনঃ তবল দাব হয় । এই বোগী পরিণামে শ্বাস ও কাশ দ্বাবা আক্রান্ত হইয়া থাকে

চিকিৎসা ।—মুখা, সৈন্ধব লবণ, শুষ্ঠা, ধাইফুল, লোধ, ইন্দ্রযব বেল শুষ্ঠা, মোচবস, আকনাদী, বালা, আম্রকেশী, আতইচ, ববাক্রান্ত্র । এই সকল সমুভাগে চূর্ণ করিয়া মধু ও তুলসীজলেব সহিত সেব্য ইহার নাম “সুপ্প গন্ধাধব চূর্ণ” ।

পানীয় ভক্ত বটী ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুখা, তৈউড়ী, চিতামূল, প্রত্যেকে ২ তোলা, পাবদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, লৌহ, অজ, বিড়ঙ্গ, প্রত্যেকে ৪ তোলা । এই সকল দ্রব্য ত্রিফলার স্বাথে মণ্ডিয়া ৬ বতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত কবিবে । প্রত্যহ প্রাতে একটী কবিয়া বটী মেনন কবাইবে ; অন্নপান কাঁজি

গ্রাহণী গজেত্র বটী ।—পাবন, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খচূর্ণ, মেহাগা, হিহ, হিং, শঠী, তালিশা পত্র, মুখ, ধন্তা, সৈন্ধব লবণ, ধাইফুল, আতাইচ, শুঁচ ঝুল, হবিতকী, ভেলা, তেজপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, শুড়ঙ্গ, এলাইচ, বালা, বেলশুঁচ, মেথী, এই সকল ঔষধ সমভাগে সিদ্ধিপত্রের বসে মর্দন করিয়া ২ বতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে, অল্পপান ছ গী দুগ্ধ

পিত্তজ গ্রাহণী ব নিদান ও পূর্বরূপ ।—কষ্ট জ্বর, অজীর্ণ-কব জ্বর, বিদাহী অন্ন জ্বর, অপামার্গক ও ক্ষাব জল সাধিত ব্যঞ্জনাদি, শ্ববক্ষাদি সেবনজন্তু কুপিত পিত্ত, উষ্ণ জলের ঝাষ কোষ্ঠাগ্নিকে বৃদ্ধি করে এইরূপ গ্রাহণীবোগাক্রান্ত ব্যক্তি পীত আত্মাযুক্ত হয় নীলাভা ও পীতাত্মাযুক্ত অজীর্ণ প্রস্তু ব্যক্তি এর মল ত্যাগ করে ; তাহার দুর্গন্ধ যুক্ত অন্ন উদ্গার হয় এবং ঐ ব্যক্তির হৃদয় ও মলধ বেদাহ হয় ও অকচি, পিপাসা দ্ব রা পীড়িত হয়

চিকিৎসা ।—শুঁচ, আতাইচ, মুখা, ধাইফুল, বসোত, কুডচিমুলেব ছাল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বেলশুঁচ, কটুকী, এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধু ও তণ্ডুলজালব সহিত সেবন করিতে হইবে । পবিমান ০ আনা । ইহাকে “নাগবাদ্য চূর্ণ” কহে ।

গ্রাহণী শার্দূল চূর্ণ ।—পাবা, গন্ধক, লৌহ, অত্র, হিঙ্গু, পঞ্চ-লবণ, হবিজা, দাক হবিজা, কুড়, বচ, মুখা, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতা মূল, যমানী, বন যমানী, গজ পিঙ্গলী, শ্ববক্ষাব, মাচিকাব, মোহাগা, ঝুল, ইছাদেব প্রত্যেকেব চূর্ণ ১ কর্ষ, সকল চূর্ণসমষ্টির সমান সিদ্ধি চূর্ণ ; একত্র মর্দিত করিবে মাত্রা ২ মাশা অল্পপান তণ্ডুলোদক প্রাতে সেবনীয়

কঞ্চটাবলেহ ।—বাচড়াদাম ২ সের, তালমূলী ১ সের, ১৬ সেব জলে সিদ্ধ করিয়া ৪ সেব থাকিতে নাগাইয়া ছাঁকিয়া লইবে ঐ ক্রান্তে চিনি ১ সেব-দিয়া প্রাক করিয়া স্নিকি অবশিষ্ট থাকিতে তাহাতে বরা-ক্রান্তা, ধাইফুল, অ কনদি, বেলশুঁচা, পিঁপুল, সিদ্ধিপত্র, আতাইচ, শ্ববক্ষাব, সচললবণ, রসোত, মোচবস ইছাদেব প্রত্যেকেব চূর্ণ ২ তোলা করিয়া দিবো প্রাক শেষ হইলে মধু ১০ পৌষি তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে রোগ,

বোগীব বল এবং সময় বিবেচনায় ইহার মাত্রা অবধারিত কবিবে
অমুপান বাসী জল

বৃহৎ লবঙ্গাদ্য চূর্ণ — লবঙ্গ, আতাইচ, মুখা পিপ্পল, মবিচ, সৈন্ধব, হবুস, ধনিয়া, কটফল, কুড়, জয়ত্রী, জায়ফল, কৃষ্ণ জীবা, মচল লবণ, বসোত, ধাইফুল, মোতবস, জাকনাদি, তেজপত্র, তালিশপত্র, নাগেশ্বর, চিতামূল, বিটলবণ, তিত্ত উ, বেলশুঠা, গুড়ক, এলাইচ, পিপ্পলমূল, বনযমানী, যমানী, ববাক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শুঠ, দাড়িমফলের ছাল, যবক্ষাব, নিমছাল, শ্বেত ধূন, গাচিকা, মমুজফল, মোছাগাব খই, বালা, কুড়চিমুলের ছাল, জামছাল, আমছাল, কটকী, অত্র, লৌহ, গন্ধক, পাবা, প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ অমুপান মধু, তুলোলদক মাত্রা ১০ আনা

কফজ গ্রহণী নিদান ও পূর্বরূপ — ওকপাক দ্রব্য ও স্নিগ্ধ, দ্রব্য, অথবা শীতল পিচ্ছিল মধুবাতি দ্রব্য ভোজন, অতি ভোজন, আহার-
বান্তে দিবানিদ্রা, এই সকল বাবণে কুপিত কফ কোষ্ঠাগ্নিকে নষ্ট করে, এজন্ত ভুক্ত দ্রব্য তৎ কষ্টে পাক হয় এবং বিবক্ষি, বহি, তরুচি, মুখেব গিগুতা, মধুবতা, কাশ ও মুখ হইতে কিঞ্চিৎ দোষেব উদগীবণ, নাসাজাব, উদব বিবন্ধ ও গুরু বেধ হয়, হৃৎ বা মধুব উদগাব হইতে থাকে, শবীরেব অবসন্নতা ও শ্রীমৎসর্গে অনিচ্ছ হয় • অপকৃ এবং স্লেষ্মাসংশ্লিষ্ট পাতলা দান্ত হয়। এই বোগী অলস এবং দুর্বল হইলেও ক্রেশ হয় না, কফাক্রম গ্রহণীতে এই সকল লক্ষ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চিকিৎসা — পঞ্চ ০ বৃণ প্রত্যেকে ১ ০ তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ২ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পাবদ ০ ডোলা, সিদ্ধিপত্র ৯ ০ তোলা, উত্তমরূপে চূর্ণ ও মিশ্রিত কবিয়া প্রথম দিন এক মাসা হইতে সেবন আৰম্ভ কবিয়ৈ প্রতিদিন ১ মাসা কবিয়া মাত্রা বাড়াইয়া অর্দ্ধতোলা পর্যন্ত উঠিবে।
অমুপান জল।

জাতিফলাদ্য চূর্ণ — জায়ফল, বিড়ল, চিতামূল, তগবপাত্রক (অঙাবে সিউলীছোপ), তালিশপত্র, বক্তচন্দন, শুঠ, লবঙ্গ, কৃষ্ণজীবা কপূর্ব, হবিতকী, জাম্বা, মবিচ, পিপ্পল, বংশলোচন, গুড়ক, তেজপত্র,

এলাইচ, নাগেশ্বর, প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা, সিদ্ধিচূর্ণ ৭ পল, ৮নি সমুদায় চূর্ণের সমান সমুদায় উত্তমরূপে একত্র মর্দন কবিয়া লইবে মাত্রা ২ মাগা অল্পপান বসী জল

কামেশ্বর মোদক ।—আমলকী, সৈন্ধব, কুড়, কটফল, পিণ্ডুল, শুঠ, যমানী, বনযমানী, যষ্টিমধু, বচ, নগেশ্বর, তালিশপত্র, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, যবিচ, হবিতকী, বহেড়া, প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, সকলের সমান ঈষৎ ভর্জিত বীজসহিত সিদ্ধিচূর্ণ, সর্ব সমষ্টিব দ্বিগুণ চিনি প্রথমে পাকযোগ্য জল দিয়া চিনি পাক কবিবে, গাঢ় হইলে আমলকী চূর্ণ প্রভৃতি পূর্বেকৃত দ্রব্য প্রক্ষেপ দিবে, পাক সম্পূর্ণ হইলে কিঞ্চিৎ যত ও মধু দিষ্ট ০ তোলা প্রমাণ মোদক বাধিবে পবে ভাজা তিলচূর্ণ ও কপূর্ব দ্বাবা অধিবাসিত কবিবে অল্পপান জল বা গবম ব্রহ্ম ।

পীযুষবল্লী রস ।—পারদ, গন্ধক, অত্র, বোপা, লৌহ, মোহাগ, রসায়ন, স্বর্ণমাক্ষিক, লবঙ্গ, বক্তচন্দন, মুখা, আকনাদি, জীবা, ধন্থা, বরাকান্তা, আতইচ, লোধ, কুড়চিছাল, ইন্ড্রযব, গুড়ত্বক, শুঠ, জায়ফল, নিমছাল, ধুতুবাবীজ, দাড়িমছাল, ধাইফুল, কুড়, প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা ; এই সকল দ্রব্য একত্র কবিয়া কেশুবিয়া বসে ভাবনা দিয়া এবং ছাগলহুকের সহিত পেষণ কবিয়া চনকবৎ বটী প্রস্তুত কবিবে বেলপোড়া ও গুড়ের সহিত সেবনীয় ।

ত্রিদোষজনিত গ্রহণীর লক্ষণ ।—বাতজ, পিত্তজ ও কফজ কারণ সমস্ত বা আংশিক একত্র সংঘটিত হইলে যে গ্রহণী বোগ জন্মে, তাহাই ত্রিদোষজন্য গ্রহণী বলিয়া জানিতে হইবে ।

চিকিৎসা বেলশুঠা, মোচরস, আকনাদি, ধাইফুল, ধনিয়া, বরাকান্তা, শুঠ, মুখা, আতইচ, অহিফেণ, লোধ, কচি দাড়িম ফলের ছাল, কুড়চি ছাল, প্রাণা, গন্ধক, প্রত্যেক সমভাগ, একত্র মর্দন কবিবে, মাত্রা ১০ মাগা, অল্পপান তক্র বা আতপতগুলোদক

বৃহন্নায়িক চূর্ণ ।—চিতামূল, ত্রিফলা, ত্রিকুট, বিড়ঙ্গ, হবিয়া, দারু হরিদ্রা, তেলিব মটী যমানী ভিচ্ পঞ্চালবন এল এচ কড মথ

অত্র, গন্ধক, যবক্ষার, সাচিক্ষার, মোহাগা, বনযমানী, পাবদ, গজপিপ্পলী, প্রত্যেকের চূর্ণ সমান, তাহাদেব সকলেব সমষ্টিব সমান সিদ্ধি চূর্ণ সকল একত্রে উত্তমরূপে মর্দন করিবে অল্পান কাঞ্জিক ও দধি; মাত্রা ১০ আনা। পথ্য মাংসেব ঝোল ইত্যাদি

মদনমোদক ।—হুন্ধে • সিদ্ধ করিয়া তদনন্তর যতে ভর্জিত করা সিদ্ধিবীজচূর্ণ ২১ তোলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, যথা, সৈন্ধব লবণ, শঠী, তালিশ পত্র, তেজপত্র, কটফল, মাগেশ্বর, বনযমানী, যমানী, যষ্টিমধু, মেথী, জীরা, কৃষ্ণজীবা, প্রত্যেকেব চূর্ণ ১ তোলা, চিনি ৮৪ তোলা, পাকযোগ্য জল দিয়া এই সকলকে একত্র পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ চূর্ণ কিঞ্চিৎ দিয়া এবং অল্প কপূর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কিছু যত ও মধুব সহিত সেবন করিবে

সংগ্রহ গ্রহণীর লক্ষণ ।—যে গ্রহণী রোগে অলস, দুর্বল ও অবসন্ন হয়, পেটে ও কটিদেশে বেদনা এবং পেটে গুড় গুড় শব্দ হয়, আব শ্লিষ্ণ ও পিচ্ছিল পাতলা বা গাঢ় দান্ত হয়, সেই দান্ত যদি এক মাস, পনব দিন, বাব দিন, দশ দিন অন্তর কিম্বা প্রতিদিনই হয়, তবে তাহাকে সংগ্রহ গ্রহণী বোগ বলে। এই রোগ আম ও বায়ু কর্তৃক জন্মে, পরন্তু দিবসে এই বোগেব বৃদ্ধি এবং রাত্রিতে শান্তি হয়। এই রোগ অতি দুর্বোধ্য ও দুশ্চিকিৎস, স্মরণ্য অধিক কাল স্থায়ী হয়।

মার্কণ্ডেয় চূর্ণ ।—পাবা, গন্ধক, হিজল, মোহাগার থই, ত্রিকটু, জায়ফল, লবঙ্গ, তেজপত্র, এলাইচ, চিতামূল, মুখা, গজ পিপ্পলী, শুঁঠ, বালা, অত্র, ধাইফুল, আতাইচ, সজিনাবীজ, মোচবস, আফিঙ্গ, প্রত্যেকে ১ পল, উত্তমরূপে চূর্ণিত ও মর্দিত করিয়া লইবে। চিনিব সহিত ১ মাস পবিমানে সেবন

পানীয়ভক্ত বটিকা ।—অত্র, মণ্ডুব, বিড়ঙ্গ, প্রত্যেকে ১ পল, চণ্ডি, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কেশুরিয়া মূল, দস্তীমূল, মুখা, পিপ্পল, চিতামূল, খেটকোল, মান, ওল, শুক্রহৃদীব মূল, ভেটুড়ীমূল, ছড়ছড়ে মূল, পুনর্নবামূল, প্রত্যেক ২ তোলা, বস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য আদ্য রসে মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে কুলআঁটীব

শ্রায় বটী অল্পপান—দধিব মাগ, ডাবেব জল, মুখাব বস ইত্যাদি ।
জলধৌত অন্ন, দধি প্রভৃতি পথ্য পাঁচফলা, বেল, গুড়, কাঁচড়া, নাবি
কেলদ্রুগ ও সকল প্রকার ডাইল নিষিদ্ধ

বৃহজ্জীরকাদি মোদক —জীব, রক্তজীব, কুড়, শুঁঠ, পিঁপুল,
মরিচ, ত্রিফলা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, লবঙ্গ, বংশলচন, লবঙ্গ,
শৈলজ, বক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কাকোলী, শিব কাকোলী, জয়ন্তী,
জায়ফল, যষ্টিমধু, মজ্জবী, জটামাংস, মুখা, সচল লবণ, শাঠী, ধাতা,
দেবতাড়, মুবামাংসী, জাফা, নখী, শুণ্ঠ, পদ্মকাক্ষ, মেথী, দেবদারু,
বালা, নালুকা, সৈন্ধব লবণ, গজ পিঙ্গলী, কপূর, ত্রিগজ, কুম্ভবথোষ্ঠী,
ইহাদেবপ্রত্যেকেব ১ ভাগ ; লৌহ অত্র ও বজ্র প্রত্যেকেব ২ ভাগ
সমুদায় চূর্ণেব সমান ভাজা জীবাব গুড়। সর্বসমষ্টিব দ্বিগুণ চিনি ।
পূৰ্ব্ববৎ মোদক পাক কবিয়া নামাইবাব পব জীতন হইলে ধ্বত ও মধু
দিয়া গুলি পাকাইবে প্রাতে এক একটী গুলি দুগ্ধ ও চিনিব সহিত
খাইতে দিবে পরিমাণ ০ তোলা

লালগুড়। —বসাসিন্দুব ২ ভবি, হিঙ্গুল ১ ভবি, আমলামা গন্ধক
০ ভবি, এই সকল অব্যাকে একত্রে চূর্ণ কবতঃ প্রতিদিন নিম্নলিখিত
অব্যগুলিব এক একটী বসে ভাবনা দিবে, যথ, —আমলক্য শাকের
রস, ঘৃতকুমারীবাঁ আটা, ক্ষেতপাণড়া, বটেব রুরিব বস, বুড়ি গুয়াপানেব
বস, কচি জামপাতাব বস পরিমাণ ২ ধান হইতে আবস্ত কবিয়া
২ রতি পর্যন্ত বাড়িবে । অল্পপান ছাগল দুগ্ধ । পথ্য ঘৃত—সৈন্ধবেব
পাক, দিবাভাগে অন্ন, বাজে কটী, মাংস ইত্যাদি পথ্য

গ্রহণী ব সহিত অব থাকিলে “নৃপ বল্লভ” বড় উপকাৰী

নৃপ বল্লভ —পাবুদ, গন্ধক, লৌহ, তত্র সীসা, চিতামূল, মুখ,
সোহাগাব খই, জায়ফল, হিঙ্গু, গুড়ত্বক, এলাইচ, চিতামূল, বজ্র, তেজ-
পত্র, কুম্ভজীবা, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, মরিচ, তাম্রভস্ম, প্রত্যেকে ১ তোলা,
স্বর্ণ ১০ তোলা, একত্র মাড়িয়া আদার বসে ও আমলাব বসে ভাবনা
দিবে । চনকপ্রমাণ বটী । প্রাতঃকালে জলেব সহিত অথবা ছাগীদুগ্ধেব
সহিত সেবন কৰাইবে

গ্রহণী বোগে শোথ (ফুলা) থাকিলে নিম্নোক্ত ঔষধগুলি ব্যবস্থা

রসপঞ্চাঙ্গী ।—পপ্পটীক্রিয়াব প্রথমে পারদেব মলদোষ, বহ্নিদোষ ও বিষদোষ নিবারণ কবিতে হয় তাহার প্রণালী এই,—৮ তোলা পাবদ লইয়া স্বতকুমারীর রসে মর্দন কবিতে হয় ইহাতে মলদোষ দূষীকৃত হয় এইরূপে ত্রিফলা চণেব সহিত মর্দনে বহ্নিদোষ, এবং চিত্রা পত্রব বসেব সহিত মর্দনে বিষদোষ নষ্ট হয় পবে যথাক্রমে জয়ন্তীপত্র, এবং পত্র, আর্দ্রক ও কাকমাটিবসে মগ্ন কবিয়া ক্রমাগত মর্দন কবিতে থাকিবে যখন মাড়িতে মাড়িতে ঐ সকল রস শুকাইয়া যাইবে, তখন ঐ পাবা পপ্পটীক্রিয়াব ব্যবহার্য্য হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে তাহার পব উহাব সহিত গন্ধক মিশ্রিত কবিতে হয় যে গন্ধক শুকপুষ্পেব ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, নবনীতেব ন্যায় দীপ্তিশালী, চিকণ, কঠিন ও স্নিগ্ধ, তাহাই শ্রেষ্ঠ । সাধাবণতঃ আমলাস। গন্ধকই ইহার জন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে ঐকপ গন্ধক ৮ তোলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তণ্ডুলাকাব কবিয়া ভৃঙ্গুরাজবসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ও বোজে শুষ্ক কবিয়া ধুলীবৎ চূর্ণ কবিতে হইবে পবে ঐ গন্ধক লৌহপাত্রে স্থাপন করিয়া ধূমবহিত কুলকাঠের অঙ্গাবে গলাইয়া ভৃঙ্গুরাজবসে নিক্ষেপ কবিবে নিক্ষেপ মাত্র গন্ধক কঠিন হইয়া যাইবে ঐ গন্ধক রৌদ্রে শুষ্ক ও উত্তমরূপে চূর্ণিত কবিয়া কেতকী পুষ্পেব বন্ধন কবিবে শোধিত পাবদ ও শোধিত গন্ধকেব পবিমাণ সমান হওয়া আবশ্যক উল্লিখিত প্রক্রিয়ার পব পাবদ ও গন্ধক উত্তমরূপে মর্দন কবিতে কবিতে যখন যোব কৃষ্ণবর্ণ ধারণ কবিবে এবং উহাতে পাবদকণা দৃষ্টিগোচর হইবে না, তখন জানিতে হইবে কর্জ্বণী উত্তমরূপ হইয়াছে তাহার পব যথাবিধি পপ্পটীপাক কবিবে সবিস্তার বিবরণ পূর্বে লিখিত হইয়াছে, স্মৃতবাং পুনরুক্তি আবশ্যক ।

পরিমাণ ।—প্রথম দিন ২ রতি হইতে আবস্ত কবিয়া প্রত্যহ ১ বতি কবিয়া বাড়িবে, এইরূপে ১০ বতি পর্যন্ত বাড়িলে আর বাড়াইবাব প্রয়োজন নাই একুশ দিন পর্যন্ত ঔষধ সেবন কর্তব্য অন্তপান ২ বতি জীবক ও ১ বতি মধু

পপ্প'টী ব্যবহারকালে বায়ু ও রৌদ্রসেবন, ক্রোধ, অধিক চিন্তা, আহারকালের ব্যতিক্রম, ব্যায়াম, পবিত্রম, স্নান, অধিক বাক্যব্যয়, এই সকল কাজ পবিত্যাগ করিতে হইবে। ঘৃত, মৈদ্বব, জীবা ও ধাতাব বাটনা দ্বাৰা প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি, শালী তণ্ডুলেব অন্ন, কাল বেগুন, নিমুখী শাক, মুগ, পটোল, সুপারী, আদা, পক্ষীমংস, কুয়ং মংস, জলেব সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ, ইত্যাদি সুপথ্য।

এহনী, অর্শ, জ্বর, পাণ্ডু, কামলা, অতিশয, গুল্ম, জলোদব, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি বোগ ইহাতে নিবাসিত হয়।

সকল প্রকার পপ্প'টী সেবনের নিয়ম এই যে, বোগীকে কিঞ্চিৎ চিনি বা মিছবীর সহিত দুগ্ধ ও অন্ন আহার কবিত্তে দেওয়া কৰ্ত্তব্য। লবণ-জল ও অপর দ্রব্য আহার কবিত্তে দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ। অমল্য তৃমণ্য হইলে দুগ্ধ ও ডাবের জল দিতে হইবে।

লৌহ পপ্প'টী।—পাবদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, একত্র কবিয়া তাহাব সহিত ২ তোলা লৌহ মিশ্রিত করিবে। অনেকক্ষণ মর্দন কবিলে যখন উত্তমরূপে মিশ্রিত হইবে, সে সময় অগ্নিতে চাপাইয়া পূর্ক্ববৎ পপ্প'টী পাক কবিবে। পাক হইলে চূর্ণ করিয়া লইবে। পরিমাণ ১ রতি হইতে আবস্ত কবিয়া পূর্ক্ববৎ ১০ রতি পর্যন্ত মাত্রা বাড়াইবে। দুই সপ্তাহ মধ্যে বোগ উপশমিত হইবে। অন্নপান শীতল জল অথবা জীরা ও ধাতাব কাথ। ইহাও পূর্ক্বোক্ত রোগসকলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পপ্পায়ুত পপ্প'টী।—গন্ধক ৮ তোলা, পাবদ ৪ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অত্র ১ তোলা, তাম্র অর্দ্ধ তোলা, একত্রে লৌহপাত্রে মর্দন করিবে। পবে লৌহপাত্রে অগ্নিতে চাপাইয়া পূর্ক্ববৎ পপ্প'টী প্রস্তুত কবিবে। মাত্রা ২ রতি হইতে আবস্ত কবিয়া পূর্ক্ববৎ ১০ রতি পর্যন্ত। অন্নপান ঘৃত ও মধু। ভক্ষণকালে ঔষধ লৌহপাত্রে মর্দন কবা কৰ্ত্তব্য। অত্যাশ্রয় নিয়ম পূর্ক্ববৎ।

স্বর্ণ পপ্প'টী।—পাবদ ৮ তোলা ও স্বর্ণভস্ম ১ তোলা একত্র মর্দন কবিয়া মিশ্রিত করিবে। পবে উহাব সহিত গন্ধক ৮ তোলা লৌহপাত্রে

ঘর্দন কবিয়া কর্জলী প্রস্তুত কবিবে পাবে যথাবিধি পাক কবিয়া
পপ্পটী প্রস্তুত কবিতে হইবে যাএ ১ বতি হইতে পূর্ববৎ বুদ্ধি কবা
আবশ্যক, অল্পপান যত মধু উপবোক্ত সকল বোগ নাশীত যক্ষমা
বোগেও ইহাব ব্যবহার হইয়া থাকে

গ্রহণী বোগে ঘর্দন জুনা নানা প্রকার তৈল ব্যবহৃত হয় প্রধানতঃ
হইটীব উল্লেখ হইতেছে

বিল্ব তৈল — তিল তৈল ৪ সেব মুচ্ছা যথাবিধি ;—পূর্ব
তাছাব বিষয় উল্লেখ কবা গিয়াছে কাথার্থ বেলশুঠ ৬০ সেব, দশমূল
মিলি ৩৬০ সেব, জল ৬৪ সেব, শেষ ১৬ সেব ; আদাব বস ৪ সেব, কাঁজি
৪ সেব, ছঞ্চ ৪ সেব কল্কার্থ,—ধাইফুল, বেলশুঠা কুড়, শঠী, বাঙ্গা,
পুনর্গবা, ত্রিকটু, পিপ্পলমূল, চিতামূল, গজ পিপ্পলী, দেবদারু, বচ, মোচবস,
কটুকী, তেজপত্র, বনযমানী, জীবক, ঋষভক মেদ, মহামেদ, কাকোলী,
ক্ষিরকাকোলী, ঋদ্ধি, বুদ্ধি, ইহাদেব প্রত্যেকে ৪ তোলা ।

গ্রহণীমিহির তৈল — তিল তৈল ৪ সেব মুচ্ছা জব্য
কল্কার্থ—ধন্য, ধাইফুল লেধ, ববক্রান্ত, অতইচ, হবিতকী, বেগুন মূল,
মুখা, বালা, মোচবস, বসোত, বেলশুঠা, নীলোৎপল, তেজপত্র, নাগেশ্বর,
পদ্মকেশব, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, স্বামালতা, পদ্মকাষ্ঠ, কটুকী, তগব পাছকা,
জটামাংগী, দারুচিনি, কেশুবিয়া, পুনর্গবা, আমছাল, জামছাল, কদমছাল,
কুড়চিছাল, যমানী, জিরা, প্রত্যেকে ২ তোলা, কাথার্থ কুড়চিছাল ১২০
সেব, জল ৬৪ সেব, শেষ ১৬ সেব, অথবা তক্র ১৬ সেব, অথবা দোষা-
হুসাবে অত্র কোন গ্রহণীনাশক জব্যেব কাথ ১৬ সেব এই সমুদায়
কাথ ও তক্র দ্বাৰা তৈল পাক কবিতে হয় না বোগেব প্রকৃতি অনু-
সারে শুদ্ধ তক্র অথবা যে কোন একটা জব্যেব কাথেব সহিত পাক
কবিবে

হোমিওপ্যাথিকমতে উদরাময় চিকিৎসা ।

উদরাময়েব কারণ — শীতলতা, উষ্ণতা, অপক, অজীর্ণকথ
কিঞ্চা ফেণযুক্ত দ্রব্য ভক্ষণ, দুৰ্গন্ধ অথবা কদর্য জল পান, অথবা
শবৎকালে যেরূপ সংক্রামক বোগেব আবির্ভাব হয়, সেইরূপ বিষ সংক্রা-
মন ইত্যাদি কারণে উদরাময় জন্মে

লক্ষণ ।—উদবেব বেদনাব সহিত ক্ষণেক্ষণে অপক মলনিঃসৰণ,
কখন কখন বেদনা নাও থাকিতে পাবে। শীড়া প্রবল হইয়া দৌৰ্বল্য
প্রভৃতি নানা উপসর্গ উপস্থিত কবিয়া প্রাণনষ্ট কবে,—বিশেষতঃ শিশু-
দিগেব পক্ষে বড়ই মারাত্মক

চিকিৎসা ।—আফিডেব দ্বাৰা বেদনা বন্ধ কৰা অথবা সংকোচক
ঔষধ দিয়া দাস্ত বন্ধ কৰিতে চেষ্টা কৰা নিতান্ত অজ্ঞানেব কাৰ্য্য । কীট-
লতা জন্ত বোগ হইলে প্রতিবাব দাস্ত হইবাব পবে “মার্কিউবিয়াস”
দিবে কদর্য ভোজন জন্ত হইলে “আর্শেনিক,” পিত্ত জন্ত হইলে
এবং উদবেব বেদনা থাকিলে “ক্যামোমিলা,” অত্যধিক মাত্রায় এবং
বেগসম্বন্ধে অসমর্থতা জন্ত হইলে “মার্কিউবিয়াস,” দৌৰ্বল্য, বিমর্ষতা
থাকিলে “আর্শেনিক,” পালস্থলীৰ কামড়ানি অথবা অগ্নিনিগ্রহ থাকিলে
“ভেবেট্রাম আল্বাম,” অন্নবস অথবা “ফেণযুক্ত দাস্ত হইলে “বিউম”
এবং পিত্তযুক্ত হইলে “মার্কিউবিয়াসেব”পবে “আইবিস” প্রয়োগ কৰিবো
বাক্রিতে এবং = প্রতিকালে যেমন দাস্ত হইবে “সল্ফার” দিতে
থাকিবে

পথ্য ।—চীল ভিজান জল, দুগ্ধ, মেঘাংসেব কাথ, ইত্যাদি

আমোশয় —সৰ্বদাই অল্পা পৰিমাণে অত্যন্ত যত্নপূৰ্ণ সহিত দাস্ত
হয়, কখন কখন তাহার সহিত বক্ত মিশ্রিত থাকে প্রাতি ঘটায় “ইপি
ক্যাকুয়ান্হা” তিনবাব সেবন কৰিতে দিবে তাহার পৰ “মার্কিউবাস্-

কাবোসিভাস্” প্রতি ঘণ্টায় তিনবার দিবে বোগী যত আবোগা লাভ কবিত্তে থাকিবে, ঔষধ ভক্ষণেব কাল তত বিলম্ব কবিবে বক্ত বন্ধ হইবার পৰ বোগী দুৰ্বল হইলে “আর্শেনিক” দিবে

পথ্য ।—পূর্বে যেকণ ব্যবস্থা কবা হইয়াছে। অধিকন্তু পেটে এক খণ্ড ফ্লানেল বাঁধিয়া রাখিতে হইবে

হাকিমীমতে উদরাগ্নয় চিকিৎসা ।

এই বোগে অজীর্ণ মল কখন অধিক কখন বা অল্প পরিমাণে নির্গত হয় দান্ত হইবার সময়ে মলদ্রাব কন্ কন্ কবে, পেটে বেদনা হয় ।

কারণ । কোন প্রকার মন্দ আহাব নীচেব অস্ত্রে সঞ্চিত হইলে, অস্ত্রের প্রদাহ উপস্থিত হওয়ায় বক্ত নিঃসৃত হয়

উপায় ।—এই বোগ জন্মিলে পেট পবিত্রাব কবাইবে । অল্প আহাব দিবে এবং ভাতের ফেণ খাইতে দিবে

ঔষধ ।—বেউচিনি ২ মাসাকে কিঞ্চিৎ মাত গুড় মাখিয়া খাওয়াইবে, তাহার ছয় ঘণ্টা পরে অর্ধ ছটাক বেড়ীব তৈল দিয়া কোষ্ঠ পবিত্রাব কবাইবে বক্ত বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ কিম্বা একদিবস অন্তর নিম্নোক্ত উপায় কবিবে

ফুল খড়ি	..	..	২ মাসা ।
পাৰা	..	..	১ মাসা
আফিম	..	..	০ রতি

গ্রাহণী ।—মলের সহিত আম পড়ে কোষ্ঠ হইবার সময় মলদ্রাব কন্ কন্ কবে, এক মাস, দুই মাস অথবা আধুনিক অধিক দিন পর্যন্ত এই পীড়া থাকে ইহাতে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা

পাৰাচূৰ্ণ	...	...	৩ মাস

আফিম

...

৮ বতি

একত্র মিশ্রিত কবিয়া আট ভাগ কবিবে সন্ধ্যার সময় এক ভাগ খাওয়াইবে এবং পবদিন প্রাতঃকালে বেউচিনি ও মাসাজে চূর্ণ কবিয়া মাওড়ডেব সহিত খাইতে দিবে, প্রত্যহ আবোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ কবিতে হইবে

অন্য প্রকার

আফিম

.

৪ বতি।

হিঙ্গু

৪ বতি

একত্র মিশাইয়া ৮টি বটি কবিবে প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রতিদিন দুইটি খাইতে দিবে

অন্য প্রকার

আফিম

...

৫ বতি

খদিব

...

৪ বতি।

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত কবিয়া ২০ টি বটিকা প্রস্তুত কবিয়া প্রত্যহ (প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে) এক একটি খাওয়াইবে এ বটি খাওয়াইবার পূর্বে দিবস প্রাতঃকালে ভেবেণ্ডাব তৈল অর্ধ ছটাক কিম্বা রেউচিনি ১ মাসা খাওয়াইবে। আবোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ করাইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

র্যালোপ্যাথিকে ওলাউঠা বা বিসূচীকা চিকিৎসা।

এই পীড়া যাব পব নাই সাংঘাতিক, প্রাথমিক সংক্রামকরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। প্রকৃত ওলাউঠায় জলবৎ ভেদ ও বমুন হইয়া ২৪ ঘণ্টা মধ্যেই বোগীর প্রাণ নষ্ট কবে। অর্থাৎ বোগী কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য বোধ

স্যালোপ্যাথিকে ওলাউঠা বা বিস্ফটিকা চিকিৎসা ১০১

করিবাব পব নানা প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হয়, এবং তাহাতেই তাহার জীবন নষ্ট হইয়া থাকে

অতি পূর্বকালে ভাবতবর্ষে এবং ইউরোপখণ্ডের কোণ কোণ স্থানে এই পীড়ার প্রাদুর্ভাব ছিল, কিন্তু আজি কালি ইহাদ্বারা যেকণ মৃত্যু-সংখ্যার বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্বে একপ ছিল না। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে এদেশে ইহার প্রাবল্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তদবধি বঙ্গদেশে এবং ভাবতবর্ষের অন্যান্য স্থানে এই বোগ কর্তৃক অনেক লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে। আজি কালি ইহা পৃথিবীব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে।

চিকিৎসা শাস্ত্র পাবদর্শী পণ্ডিতগণ নিম্নোক্ত কাবণগুলিকে ওলাউঠার উৎপাদক বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন

অন্যান্য বহুব্যাপক পীড়ার ন্যায় অপবিষ্মৃত ও দুর্গন্ধময় স্থানে বাস, কদর্য অশ্মাশ্রুকব দ্রব্যাদি ভক্ষণ, অতিবিক্ত শাবীরিক পাবিত্র্য, পূর্ব পীড়া জন্ম শাবীরিক দৌর্বল্য, ইত্যাদি এই পীড়ার পূর্ববর্তী কারণ মধ্যে পবিগণিত

এক প্রকার অন্তঃসিক্ত, বাষ্পীয় অথবা বায়ু কর্তৃক বাহিত বিষ যে ইহার উদ্দীপক কাবণ, তাহা এক প্রকার অসংশয়িতরূপে অনুধাবিত হইয়াছে। কিন্তু সেই বিষ যে বায়বীয়, পার্থিব বা মৃত্যুশাবীর হইতে উদ্ভূত কি না, তাহা এ পর্যন্ত অবধাবিত হয় নাই, তবে বিস্ফটিকার প্রাদুর্ভাবকাল এবং সাধাবণতঃ যে যে কাবণে উৎপত্তি হইতে দেখা যায়, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে, তদ্বারা ইহার প্রকৃত কাবণ অনেক অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে

শীত, গ্রীষ্ম-বর্ষাদি সকল ঋতুতেই আমাদের বঙ্গদেশে এই পীড়া প্রাদুর্ভূত হইতে দেখা যায়, এজন্য ইহাকে কোন ঋতুবিশেষের আনুসঙ্গিক বলা যাইতে পারে না; তবে সাধারণতঃ বাদ্রি শেষে বা প্রভাতকালে এই রোগের আক্রমণ হইয়া থাকে, এজন্য জনৈক মনে করেন যে, এই সময়ে শাবীরিক সন্তাপের দ্বারা ইওয়া প্রযুক্ত ওলাউঠার বিষ ঘনীভূত হইয়া ভূমির নিকটবর্তী হয়, তাহাতেই পীড়া জন্মে

অত্যন্ত গরমেব পুর হঠাৎ শীতলতা অথবা অত্যন্ত শীতলতার

পব হঠাৎ অভ্যস্ত গবম হইলে এই পীড়া জন্মে, তাহাব কারণ, মাথা-বলতঃ টেজ, বৈশাখ ও ভাঙ্গমাসে ইহাব একোপ দৃষ্টিগোচর হয়

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যে ইংলণ্ডে মহামারী উপস্থিত হয়, সে সময়ে বায়ু ঘন, শুষ্কিত এবং অজোনশূন্য ও তাহাতে ইলেক্ট্রি মিটীব পবিমান অভ্যপ্প মাত্র হইয়াছিল, এবং মড়ক থামিলেই বায়ু বহিতে আবন্ত হয় ইহাতে বোধ হয় যে, স্তম্ভাপ ও অর্ধতার সহযোগে গাফুয়াডেহ হইতে যে সকল দূষিত পদার্থ বহির্গত হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, তদুদ্ভূত বাষ্পীয় বিয় অন্ত্র সঞ্চালিত হইতে না পাইয়া শুষ্কিত বায়ু কর্তৃক সেই স্থানে থাকিয়া নিশ্বাসদ্রাব দিয়া মানবশরীরে প্রবেশ করে

জলবায়ুর সহিত ইহাব যে কতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা এ পর্য্যন্ত অবধাবিত হয় নাই, তবে দেখা যায় যে, অন্যান্য দেশ অপেক্ষা আমাদের ভাবতবর্ষে ইহা অনেকবার বহুব্যাপকরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল ।

ভূমির প্রকৃতিবিণেষে যে পীড়া জন্মে, তাহাব কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই । কেহ কেহ বলেন, বালুকাময় স্থান অপেক্ষা কঠিন কর্দমবিশিষ্ট স্থানে ইহাব প্রকোপ অধিক । ডাক্তার লরিমাব বলেন, তিনি পবীক্ষা কবিয়া দেখিয়াছেন যে, কৃষ্ণবর্ণ কঠিন মৃত্তিকাময় স্থানে ওলাউচা অধিক হইয়া থাকে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে দেশীয় আগ্নেয়গিরির নিকটবর্তী স্থান সকলে এই বোগ প্রায় হয় নাই ।

অতিরিক্ত পরিশ্রম, অনারুত স্থানে বাস ও শয়ন, অনাহারজনিত কষ্ট, অনিদ্রা ইত্যাদি ওলাউচাব প্রকৃত কাবণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে সুক্কাযাত্রী সৈন্যদিগের মধ্যে যে ইহার প্রাধান্য দৃষ্টিগোচর হয়, ঐ সকল অহিতাচরণই তাহাব প্রধান কাবণ

লক্ষণ ,—বহুব্রূপক ওলাউচাব লক্ষণাদিকে চারিভাগে বিভক্ত করা গিয়া থাকে ;—

- ১ (Stage of invasion) আক্রমণাবস্থা ।
- ২ (Stage of development) বর্ধমানাবস্থা ।
- ৩ (Stage of collapse) পতনাবস্থা ।
- ৪ (Stage of reaction) প্রতিক্রিয়াবস্থা

আক্রমণাবস্থা।—দেহেব অবসন্নতা, উদর ভাববোধ, মানসিক উদ্বেগ, মুখমণ্ডল মলিন ও বক্তহীন, শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন, কর্ণে ঝন্-ঝন্ শব্দ, শারীরিক দুর্বলতা, ইত্যাদি পূর্বলক্ষণেব মধ্যে গণ্য। বোগ আক্রমণের সময় ভেদ ও বমন আবন্ত হইয়া পীড়া প্রকাশ পায়, অনেক স্থলে দুই এক দিবস পূর্বে উদ্বাময়েব লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, দিবা বাত্রিৰ মধ্যে ৫ ৭ বাব বিবর্ণ জলবৎ অল্প মল সংযুক্ত বিবেচন হয় এবং বোগীৰ উদবে চৰ্চ্চবৎ বেদনা থাকে, কখন কখন ভেদেব সহিত শব্দীবেব দুর্বলতা উপস্থিত হইয়া থাকে। ওলাউঠা যে সময়ে দেশমধ্যে হইতে থাকে, তখন এরূপ উদ্বাময় হইলে উহা নিবাবণেব জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হয়।

চিকিৎসা।—এই অবস্থায় কেহ কেহ পূর্ণ মাত্রায় ২ গ্রেন পবি-মাণে অহিফেন সেবনের উপদেশ দেন। কেহবা বাটিকারূপে অফিঙ্গ সেবন না কবাইয়া ৩০ বিন্দু টীং ওপিয়াই দিয়া থাকেন। আবার কাহার কাহার মত যে, অহিফেনেব সহিত ৩৪ গ্রেন ক্যালোমেল প্রয়োগ উপযুক্ত।

বর্দ্ধমানাবস্থা।—সচবাচব বাত্রিশেষেই এই পীড়া আক্রমণ কবে। প্রথমে ভেদ, পরে বমন। আরম্ভকালে ভেদেব সহিত মল থাকে, পরে অধিক মাত্রায় জলবৎ পদার্থ মলদ্বার দিয়া বাহিৰ হয়। ক্রমশঃ বোগী দুর্বল হয়, উত্থানশক্তি থাকে না, উদবে চৰ্চ্চবৎ বেদনা হইতে থাকে। এই পীড়ার ভেদকে কেহ কেহ ফেণবৎ বর্ণনা কবেন। ইহা অতি তরল, দীর্ঘ ঘোব বা অস্বচ্ছ, কিয়ৎকাল স্থিৰভাবে বাধিলে তাহার নিম্নে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অন্নখণ্ডের আয় জমিয়া থাকে। কখন কখন ভেদের বর্ণ জলমিশ্রিত, দুগ্ধবৎ হয়।

সাধাবণতঃ দুই তিন বাব ভেদেব পরই বমন আবন্ত হয়। তাহার সহিত আত্মবীয়্রব্যাদির ক্ষুদ্রাংশ মিশ্রিত না থাকিলে প্রায়ই অপবি-ক্ষৃত জলের আয় হইয়া থাকে। ভেদেব আশ্রয় বমন শীঘ্র শীঘ্র হয় না। ঔষধাদি সেবন কবিলেই বৃদ্ধি হয়। ফেণবৎ ভেদ হইতে আবন্ত হইলেই বোগী নিতান্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, হস্তপদাদিব অঙ্গুলিতে, উকদেশে,

কখন কখন উদবে আক্ষেপ হইতে আবস্ত হয় । মুখমণ্ডল আকৃষ্ট (চোপমান), বওহীন, সীমাবদ্ধ গায় বর্ণবিহীন, ন ডী দুর্বল ও ক্ষুদ্র হইতে থাকে ত্বকেব সম্ভাপ কমিয়া অ ইমে নাড়ী প্রায় অনুভব কবিতে প বা যায় ন । নাড়ীৰ গতি এককপ পীকে ন, মধো মধো নিস্তেজ, মধো মবল হইয়া ত্রমে পীডা বৃদ্ধি হইয়া বোগী পৰ্ণনাবস্থায় উপনীত হয়

চিকিৎসা — বোগেব প্রথমাবস্থায় অহিফেণ সেবনেব পৰ জলেব সহিত অল্প পৰিমাণে ত্রাণি সেবন কবান কর্তব্য তাহাব পর নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা ।

গ্যাসিটেট্ অফ লেড	...	...	৩০ গ্রেন ।
ডাইঃ গ্যাসেটিক গ্যাসিড্	...	...	১৫ বিন্ড ।
কপূবের জল	..	...	৬ আউন্স ।

ছয় মাত্রা—এক ঘণ্টান্তর সেবন কবাইবে কেহ কেহ অহিফেণ ও গ্যাসিটেট অফ লেডেব সহিত বটীকা ও গুত কবিয়া খাইতে দেন

গ্যাসিটেট অফ লেড	...	...	২০ গ্রেন
অহিফেণ	..	...	১ গ্রেন ।

একএ জল দিয়া গাড়িয়া ১২টী বটীকা প্রস্তুত কবতঃ একঘণ্টা অন্তর কেহ কেহ সেবন কবাইতে উপদেশ দেন কিন্তু বটীকা অপেক্ষা জল-মিশ্রিত ঔষধে নীত্র ফল দর্শে যদি পুনঃ পুনঃ বমি হইয়া পাকাশয়ে ঔষধ না থাকে, তবে নাভিস্থলেব কিছু উপবে মর্ষপোর পালস্তাবা দিয়া ঔষধ সেবন কবাইতে হইবে কেহ কেহ বমন নিবারণার্থ জলেব সহিত ১ গ্রেন মর্ফিয়া মিশ্রিতকবতঃ ত্বকেব নিম্নে পিচকাবী দিয় থাকেন এই বোগে বমন নিবারণ জন্য কোনমতে হাইড্রেগসিয়েনিক্ গ্যাসিড্ প্রয়োগ কবা যুক্তিযুক্ত নহে ।

এ অবস্থায় ঔষধ ঔষধ ব্যবহাৰ কবা যাইতে পাবে না । নিতান্ত প্রয়োজন হইলে নীতল জল বা ববফমিশ্রিত জলেব সহিত কিয়ৎপৰি মাণে ত্রাণি দেওয়া যাইতে পারে অনেক বলেন, ত্রাণি অপেক্ষা ম্যাগ্নেশিয় পাকাশয়ে সহজে সহ্য হয় আক্ষেপ নিবারণ র্থ গোপা লিনি-

য়্যালোপ্যাথিকে ওলাউঠা বা বিসৃটিকা চিকিৎসা। ১০৫

মেটেব সহিত সম পরিমাণে ক্রোবোফবগ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

অনেকেই ওলাউঠার সমস্ত লক্ষণ অবিভূত হইলে ১৫ হইতে ২০ গ্রেন ক্যালোমেল ব্যবহার করিবার আদেশ দেন তাঁহারা বলেন, দাঁতের সহিত যতক্ষণ না পিণ্ডের অংশ দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ যতক্ষণ নীলাভ দান্ত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেবন কবান কর্তব্য।

পতনাবস্থা।—পূর্বের দুই অবস্থা অপেক্ষা ইহা নিতান্ত সঙ্কটজনক অনেকের অনেক স্থলে বোগাবস্তের ১০ নিমিট পবে এই অবস্থা উপস্থিত হইতে দেখা গিয়াছে। এ অবস্থায় শারীরিক ক্রিয়াসকল একপাশে শুক হইয়া পড়ে যে, রোগীকে যত বলিয়া ভয় জন্মে। শয্যা হইতে উঠিবার শক্তি থাকে না, মধ্যে মধ্যে অস্থির হইয়া গাত্রের বস্ত্র দূবে ফেলিয়া দেয় কেবল শীতল বায়ু সেবন ও জলপান করিতে চায়, কখন কখন উৎকট অস্বপ্নের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উচ্চৈঃস্ববে চীৎকার করে ও শয্যা হইতে উঠিতে চাহে, এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্টজন্য মনে কবে, যেন প্রাণ বাহির হইল অনন্তরূপে অত্যাশ্রয় পরিমাণে ভেদ হইতে থাকে, মুখমণ্ডল আকুঞ্চিত ও বঙহীন, চক্ষু কোটবিনিহিত, উহাব নিম্নেব পাঁতা অধঃপতিত থাকায় যুবৎ বোধ হয়, কপালে অশ্রু অশ্রু ঘর্ষ হয়, কখন কখন বা সর্ব দেহই প্রভূত ঘর্ষ হইতে থাকে; সর্বাঙ্গ শীতল, পিপাসা, গাএদাহ, দীর্ঘকাল জলে থাকিলে হাত পা যে রূপ চোপমান হয়, সেইরূপ হইয়া থাকে, কখন কখন নিকটবর্তী ব্যক্তিদেব প্রাতি উদাসীনভাবে কথা বলে, কিন্তু যত্নাকাল পর্য্যন্ত জ্ঞান লোপ হয় না। এ অবস্থায় প্রায় ভেদ বমন থাকে না। শরীরের তাপ ৯০ হইতে ৯৬ ডিগ্রী হয়। নাড়ীর গতি অন্তর্ভব হয় না; কখন কখন বা অতি ক্ষয়ভারে বেধ হয়। এ অবস্থাতেও বেগী রক্ষা পায়। ক্রিয়াশীল পর্য্যন্ত নাড়ী লুপ্ত থাকিয়াও অবার তাহা অন্তর্ভব করিতে পাবা গিয়াছে, এবং বোগী ক্ষুদ্র হইয়াছে।

* কঠিন সর্বাঙ্গ অড়াই আং, কপূর্ব ১৫ আং, বোজ্জমেবী আয়েল ৩ ড্রাম, শোধিত স্রব ১৮ আং, পবিত্র জল ২০ আং।

চিকিৎসা ।—এ অবস্থায় যাহাতে দান্ত বন্ধ হয়, এরূপ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে । কেহ কেহ বলেন, উত্তেজক ঔষধেও কোন কাজ দর্শে না । তাঁহা বা কেবল এক বা অর্ধ ঘণ্টা অন্তর যা গ্যামোনিয়া বা সল্ফিউরিক ইথাব ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু যদি সল্ফিউরিক ইথাবে উপকার না দর্শে, তবে তাহা অধিক পরিমাণে দেওয়া উচিত নহে । সুলীতল জল বা বরফ সেবন করান কর্তব্য । যাহা বা উত্তেজক ঔষধ ব্যবহার করেন, তাঁহাদের কেহ বা

লাইকর গ্যামোনিয়া	...	৫ হইতে ১০ বিন্দু ব মধ্যে ।
স্পিরিট সল্ফিউরিক ইথাব	..	৩০ বিন্দু ।
জল	...	৩২ ড্রাম

এক এক মাত্রায় সেবন করিতে দেন । কেহ বা—

স্পিরিট সল্ফিউরিক ইথাব	..	৩০ বিন্দু
ক্লোবোফরম	..	৫—১০ বিন্দু
জল	.	৩২ ড্রাম

এক এক মাত্রা এক বা অর্ধ ঘণ্টান্তর সেবন করান কর্তব্য ।

সঙ্কোচক ঔষধের মধ্যে গ্যাসিটেট অফ লেড ব্যবহার করিলে তাহা বা সহিত কার্বনেট অফ গ্যামোনিয়া বা গ্যাবোমেটিক স্পিরিট অফ গ্যামোনিয়া ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নহে । এতদ্ব্যতীত মিলিত হইলে, বিষাক্ত হইয়া বিপবীত ফল দেয় । প্রসিদ্ধ, ওলাউচা রোগের নিমোক্ত বটী ব্যবহার করা যাইতে পারে । যথা ;—

কপূর্ব	...	১ গ্রোন
হিঙ্গু	...	১ গ্রোন
পিপুলি চূর্ণ	...	১ গ্রোন

জল দিয়া মাড়িয়া এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে এবং তাহা ১ বা ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে । এই সকল ঔষধের সহিত ১০ ঘণ্টার মধ্যে ক্রমান্বয়ে ২৩ আউন্স ত্রাণ্ডি ব্যবহার করা যাইতে পারে । যদি নাড়ী সৰল থাকে, তবে ত্রাণ্ডি দিবার আবশ্যক থাকে না ।

প্রতিক্রিয়া অবস্থার আরম্ভ ।—কোল্যাম্প অবস্থার পবে এই

য্যালোপ্যাথিকে ওলাউঠা বা বিমূচীকা চিকিৎসা ১০৭

অবস্থা আবৃত্ত হইয়া ২৩ দিবসেব মধ্যে বোগী আবোগ্য লাভকরে এই অবস্থা উত্তীর্ণ হইলে প্রায়ই প্রথমে পিত্ত নিঃসৃত হইয়া মলের বর্ণ পবিবর্তিত কবে এবং ১০ ১২ ঘণ্টা পবে প্রত্যাভ্রয় প্রতিক্রিয়া অবস্থা উত্তীর্ণ হইলেই যে বোগী সম্পূর্ণ নিবাপদ হইবে, এমন মনে কবা উচিত নহে। যদি কোল্যাম্প অবস্থা ১০ ঘণ্টাব অধিক না থাকে, তবে এই অবস্থায় অন্য কোন উপসর্গ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু ১৮ বা ২০ ঘণ্টা অবস্থিতি করিলে, সচবাচর অধিক উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। পূর্ব পূর্ব কালে এ অবস্থায় রোগী ব মৃত্যু হইত না, কিন্তু আজি কালি ইহাতে অনেকেব মৃত্যু দেখা যায়।

স্বাভাবিক সন্তাপ অপেক্ষা পতনাবস্থায় দেহের সন্তাপ ৭ হইতে ১৫ ডিগ্রী পর্যন্ত হ্রাস হইতে পারে। পতনাবস্থাব লক্ষণাদি স্পষ্ট প্রকাশ হইতে আশঙ্ক হইলেই, অতি শীঘ্র শীঘ্র সন্তাপেব হ্রাস হইতে থাকে। সবল যুবা অপেক্ষা বৃদ্ধ, কণ ও অত্যাচাবী ব্যক্তিদিগেব ইচ্ছাৎ এইরূপ ঘটিতে পারে। এ অবস্থায় সর্বাপেক্ষা অধিক সন্তাপ ৯৬ এবং সর্বাপেক্ষা অল্প ৮২ ডিগ্রি হয়।

চিকিৎসা — এই অবস্থায় মল মূত্রাদি পবিবর্তন হইলে অল্প পবিমাণে দ্রব দ্রব্য ও শীতল জল ভিন্ন অন্য ঔষধ আবশ্যক কবে না। রক্তেব লবণভাগ মলেব সহিত বহির্গত হওয়া প্রযুক্ত পানীয় জলেব সহিত ২ সোডা দিবে। এ অবস্থায় বমন হইতে আবৃত্ত হইলে ২ অর্ক বা ২ সিকি গ্রেন মর্ফিয়া সেবনে কখন কখন বিশেষ উপকার দর্শে, অথবা পেটে বেলেস্তাবা দিয়া ফোঁসকা করিবে এবং সেই ফোঁসকা কাটিয়া তাহাতে অর্ক গ্রেন মর্ফিয়া ছড়াইয়া দিবে। যে পর্যন্ত পাকায়ের উত্তেজন নিবাবণ না হয়, সে পর্যন্ত হৃদয়েব সহিত চুণেব জল, ত্রাণ্ডি এবং ত্রথ ব্যবহার করিবে। আব ঔষধেব মধ্যে এফাব-ভেসিং ড্রাফ্ট, সোডা এবং হাইড্রোপীশিয়েনিকু য়াসিড ব্যবহার কবা ঘাইতে পারে। উদবাময় নিবাবণ জন্য সোডা, খড়ি, অহিফেন এবং কখন কখন গ্যালিক য়াসিড ব্যবহার করা যায়। উদবেব বেদনা নিবাবণ জন্তু তাঁর্পিণ তৈলেব সহিত ফোমেন্টেশন করিবে। হিকা

নিবারণ জন্ত গ্রীবাদেশেব ব মেকদেওব উপর সর্ষপ পলস্তা বা, ক্লোবো-ফবম ব মর্ফিয়া এবং কখন কখন অল্প মাত্রায় বেলেডোনা, হাইড্রো-শিয়েনিক্‌ য়াসিড ও স্থগনাভি ব্যবহার কর্তব্য । অথ নিবারণার্থ মোড় ও পটুশ দিবে । নিদ্রাব অভাব হইলে অফিফেন এবং ক্লোবোফবম কবা যাইতে পাবে ।

উত্তমরূপে প্রতিক্রিয়া না হইলে অনেক স্থলে নিম্নলিখিত উপসর্গ খটিতে পাবে

(ক) পীড়ার রিল্যাপ্স বা পুনরাক্রমণ — ইহাতে পুনরায় ভেদ, বমন ও নিশ্বেজতার লক্ষণাদি প্রকাশ হইয়া ২।৩ দিবসের মধ্যেই বোগীর মৃত্যু হয়

(খ) অসম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়া ।—ইহাতে কোল্যাম্পের লক্ষণাদি ক্রমে আদৃষ্ট হইয়া শীতলী গবল হয় বটে, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, শবীর শীতল থাকে, মধ্যে মধ্যে ভেদ ও বমন হয়, ক্ষুধামান্দ্য, আহাবে অমিচ্ছা, দুর্বলতা, প্রস্রাবেব অস্পতা, এবং ক্রমে অচেতন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়

চিকিৎসা — বমন নিবারণের নিমিত্ত তাপিগিটেলের সহিত ফোমেণ্টেশন এবং সর্ষপ পলস্তা বা ব্যবহার কবা যাইতে পাবে ভেদ নিবারণার্থ,—

গ্যালিক য়াসিড	..	...	১৫ গ্রাম
ডাইঃ সল্‌ফিউরিক য়াসিড	..		১০ বিন্দু
টিং ওপিয়াই	...	...	১০ বিন্দু ।
পিপারমেণ্টেব জল	...	...	১২ আউন্স ।

এক এক মাত্রায় ৪ ৫ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিবে

সাধারণ জ্বর — ইহাতে বেগী সর্বদা অন্যমন হইয়া জড়ভাবে অবস্থিতি কবে, গাত্র অল্প উষ্ণ, জিহ্বা শুষ্ক ও লেপযুক্ত, মল-মূত্রাদি স্বাভাবিক অবস্থায় নায়ে বহির্গত হইয়া থাকে । চারি পাঁচ দিবস এই অবস্থায় থাকিয়া বোগী সহজে আবেগ্য লাভ করিতে পারে, অথবা সবিবাম বা অসম্পূর্ণ বিবাম জব হইয়া বোগীর উপশম হয়, কিন্তু টাইফয়েড জ্বর হইলে বোগী প্রায় বাঁচে না

এবং জবে ঔষধ সেবন করান আবশ্যক হয় না। মৃত্তক উষ্ণ হইলে কেশ মুণ্ডন করিয়া তাহাতে শীতল জল দিবে। শরীর শীতল হইয়া পড়িলে উষ্ণকায়ক ঔষধ এবং পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

বৈদ্যকমতে বিমূচীকা চিকিৎসা।

যে রোগে প্রকৃপিত বায়ু মূচীবেদনবৎ বেদনা উৎপাদন করে, তাহাকে আয়ুর্বেদবিশারদ আচার্য্যগণ বিমূচী রোগ বলিয়া থাকেন।

পরিমিত ভোজনকারী আয়ুর্বেদজ্ঞ ব্যক্তি এই রোগে কখন পীড়িত হইবেন না। ভক্ষণানভিজ্ঞ, অজ্ঞেয়প্রিয়, লোভী ব্যক্তিরাই এই রোগে পীড়িত হইয়া থাকে।

বিমূচী রোগের লক্ষণ।—এই রোগে মূর্ছা, অতিসার, বমি, ভূষণ, পেটে শূলবৎ বেদন, জ্বর, শরীরে মে'চড়'ন বা চর্কণবৎ বেদন, জু'স্তা অর্থাৎ ছাই, শরীরের জ্বালা, বিবর্ণতা, কম্প, হৃদয়ে বেদনা, এবং শিবঃশূল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

অসাধ্য লক্ষণ।—যাহার দন্ত ওষ্ঠ, নখ শ্ব'মবর্ণ, জ্ঞানের অ'পত্তা, ৫ বমি, কোষ্ঠবগত চক্ষু, স্বরভঙ্গ, এবং শরীরের স্কন্ধি ও শিথিলতা হয়, তাহার মৃত্যু অবশ্যজ্ঞানী।

সাধ্য লক্ষণ।—যাহার ধূমাত্রাদিবর্জিত উদগার, কার্য্যাদিতে উৎসাহ, উপযুক্তরূপে মল মুত্রাদি বেরা ও নিঃসর্জন, শরীরের লঘুতা, ক্ষুধা ও পিপাসা হয়, তাহার পীড়া সুখসাধ্য বলিয়া জানিতে হইবে।

চিকিৎসা।—আপাঙ্গেব মূল জলে বাটিয়া সেবন করাইলে বিমূচীকা রোগ দূর হয়।

কুষ্ঠ সৈন্ধবযোঃ কল্কঃ চুত্নৈতল সমন্বিতং

বিমূচ্যাং মর্দনং কোমঃ খল্লীশূল নিবাবনং

* স্যামোপাখিক্বে এই লক্ষণেব বিপরীত কথা লিখিত হইয়াছে

চুণা অভাবে কাঞ্জিক ও তিল তৈলেব সহিত কুড় এবং মৈন্ধব
বাটিয়া, অল্প উষ্ণ কবিয়া মর্দন কবিলে খাইলধবা ও বোদনা নষ্ট হয়

বোয়াং কবজ্ঞা ফলং হবিজ্ঞাং,
মূলং সমাবাপ্য চ মাতুলুজা,
ছায়া বিশুষ্কা গুড়িকাঃ কৃতান্তা,
হস্ত্যাবিস্মচীং নযনাঞ্জনেন

একটু ডহব কবজ্ঞাব ফল, হবিজ্ঞা ও বনমাতুলুজ মূল জলে বাটিয়া
ছায়ায় শুকাইয়া গুড়িকা প্রস্তুত কবিবে ইহাব অঞ্নে বিস্মচীকা বোগ
নষ্ট হয় ।

ত্বকপত্র রাশ্না গুরু শিঞ কুষ্ঠে,
বল্লপ্রাপিষ্ঠেঃ সর্বাশতা হৈবঃ,
উদ্বর্তনং খল্লি বিস্মচীকান্নং,
তৈলং বিপকঞ্চ তদর্থকাবি

গুড়ত্বক, তেজপত্র, বাশ্না, অগুরু, সজিনাছাল, কুড়, বচ ও গুলফা
সমুদায় জ্বা কাঞ্জিকে পেয়ণ করিয়া অথবা কাঞ্জিকের সহিত তৈলে
পাক কবিয়া তদ্বাবা মর্দন কবিলে বিস্মচীকা খাইল ধরা নিবাবণ হয় ।

অহিফেনাসবণ—মউল ফুলেব মদ্য ১২ ০ সেব, অহিফেন ৪ পল,
মুখা, জাফল, ইন্দ্রযব, এলাইচ, প্রত্যেকে এক পল, এই সমুদায় জ্বা
আবৃত পাত্রে এক মাস ব থিয়া ছাঁকিয়া লইবে মাত্র অর্ধ মাগা ।

হোমিওপ্যাথিকে বিস্মচীকা চিকিৎসা ।

এই পীড়া যে অতিশয় মাবত্বক, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।
ইহাব আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ কবা দুঃসাধ্য । এজন্য পীড়া
হইবার আবেগেই বিশেষ চেষ্টা কবিত্তে হইবে—যাহাতে রুদ্ধি হইতে না

পাণ্ডা বিস্মৃচীকা চিকিৎসা জন্ত হোমিওপ্যাথিকপদ্ধতি অতিশয় ফলোপধায়ক । অনেক গবেষণা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, এই চিকিৎসা অনেক দুঃসাধ্য বিস্মৃচীকা প্রতিকার হইয়াছে

আয়ত্নাবস্থায় । যখন দুই এক বার জলবৎ বা দীর্ঘ গাঢ় দাং হয়, তখন “ক্যাম্ফর” ব্যবহার করা কর্তব্য । যখন চাউলধৌত জলে স্নান দাস্ত হইবে, তখন ক্যাম্ফর দিবাব সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে বুঝিবে ।

মুখ ত্রিহীন, শবের স্নায় শুষ্ক, দীর্ঘ লাল এবং আঠায়ুক্ত জিহ্বা অতিশয় তৃষ্ণা, প্রচুর বমন, বমনের পব দুর্বলতা, উদবে কঠিন বা দংশন বৎ বেদনা, খিলখিল থাকিলে (৩য় ডাইঃ) “ভেবেট্রাম্ য়াল্‌বাম” এর বিন্দু এক কাঁচা জলের সহিত ১৫ মিনিট অন্তর সেবন করাইবে ।

এই ঔষধ ছয়বার সেবন করাইলে যদি উপকার না দর্শে, অথবা যদি অতিশয় বমন, শূল এবং উদবাময়ের সঙ্গে চক্ষুশূর্ণন, অতিশয় অস্থিরতা এবং শরীরের শীতলতা অনুভূত হয়, তবে “কুপ্রাম” ব্যবহার করিতে হইবে ।

অতিশয় উদ্বিগ্ন, অত্যন্ত অস্থিরতা, জিহ্বা ও কণ্ঠশোষ, উদবে অতিশয় জ্বালায়ুক্ত বেদনা, জলবৎ, দীর্ঘ সরুজ ও কালবর্ণ পদার্থ বমন, কোষ্ঠে ক্রিয়া পান বা ভোজনের পব তাহার আধিক্য, এপাশ ওপাশ করা প্রস্রাবহীনতা, নাড়ী বিলুপ্ত, হৃৎপিণ্ডের অতিবিক্রম স্পন্দন, ইত্যাদি লক্ষণ দেখিলে এক বিন্দু “ক্যাম্ফর” এক কাঁচা জলের সহিত ২১ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিবে

হীমাঙ্গ হইলে পুনরায় “ক্যাম্ফর” দিলে উপকার দর্শে ।

শরীর উষ্ণ হওয়া স্বত্বে যদি প্রস্রাব না হয় এবং প্রস্রাবের ঘন ঘন বেগ হইতে থাকে, তবে “ক্যাম্ফারিশ” (৩য় ডাইঃ) এক বিন্দু এক কাঁচা জলের সহিত ২১ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে

শীতলাবস্থায় চক্ষু বজবর্ণ, কখন কখন শয্যা হইতে স্নানার্থ উঠা, মস্তকে রক্তাধিক্যবশতঃ শিরঃপীড়া, নিশ্বাসবোধ ও বিকাবের অন্যান্য লক্ষণ থাকিলে “বেলেডোনা” (৩য় ডাইঃ) এক বিন্দু এক কাঁচা জলের সহিত ঐক্য ঘণ্টান্তর দিবে

কখন কখন পেটে বেদনা থাকা প্রযুক্ত প্রতিক্রিয়া / ন হইলে
কিন্তু অসম্পূর্ণরূপে প্রতিক্রিয়া হইলে, অথবা নাসিকাগ্র ও মলদ্বার চুল-
চুল কবিত্তে থাকিলে “সিনা” ব্যবহার কবিত্তে হইবে

চাউলধৌত জলেব চায় ভেদ না হইয়া যদি বক্তবর্ণ ভেদ হয় ও
তৎসঙ্গে আম্ থাকে, তবে “মাকুবিয়াম্ কবোঃ” (৩০ ডাইঃ) এক বিন্দু
এক কাঁচা জলেব সহিত মিশ্রিত কবিয়া ১৫ মিনিট অগ্ৰব খাইতে দিবে

যদি ঐকপ বক্তবর্ণ দান্তেব সহিত আম্ না থাকে, তবে “ইপিক্যা-
কুয়ানা” ঐকপে ব্যবহার কবিবে

অজীর্ণকব দ্রব্য ভোজন, বাত্রি জাগরণ বা মদ্যপান জন্ত বোগ জন্মিলে,
অথবা অম্প অম্প পিত্তযুক্ত দান্তেব সঙ্গে গড় গড় শব্দ ও বেদনা বর্তমান
থাকিলে, কিন্ত ঘন ঘন মলত্যাগের ইচ্ছা অথচ অত্যন্ত মলত্যাগ হইতে
থাকিলে এবং জিহ্বাব অতিশয় অপবিষ্কাবতায় “নিক্সামিকা” দিতে
হইবে

মল অতিশয় পবিবর্তনশীল হইলে, তৎসহ বেদনা থাকিলে, প্রাতে
বোগের, বৃদ্ধি, মল অতিশয় ক্ষয়কাবী, এবং বাব বাব বোগেব পুনরাক্রম
হইলে “লুফাব” (৩য় ডাই) এক বিন্দু এক কাঁচা জলেব সহিত দিবসেব
মধ্যে ২ ১ বাব খাইতে দিবে

• যদি ঘর্ষ না হয়, তবে কদলদ্রাবা শরীর আক্লত বাধিতে হইবে
বেদনা থাকিলে গবম জল বোতলে পুবিয়া তদ্রাবা ফোমেন্ট করিবে, অম্প
মাত্রায় শীতল জল পান কবিত্তে দিবে এবং ৬ ঘু পথ্য ব্যবস্থা কবিবে।
কোন মতে খোসায়ুক্ত বোন ফল না দেওয়া হয়

প্রতিষেধক —কোন স্থানে ওলাউচা বোগ বহুব্যাপকরূপে প্রাচু-
র্ভূত হইলে, সেই স্থানেব লোকদিগকে এক ফোঁটা পরিমাণে “ক্যাম্ফব”
এক কাঁচা জলে মিশ্রিত কবিয়া খাইতে দিবে এই সময়ে নিম্নলিখিত
নিয়মগুলি পালন কবিবে, যথা ;—পবিষ্কাব বায়ুমঞ্চালনোপযোগী শুষ্ক

* প্রতিক্রিয়ার বিষয় যমলোপ্যাণিক মতে বিশ্লেষণ চিকিৎসায়
বিশেষ বলা হইয়াছে।

গৃহে বাস করিবে, যবের কাছে কোন প্রকাব পচা জিনিষ থাকিতে দিবে না, শরীরে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাইবে না, আর্জ বস্ত্র বা ভিজ জুতা পরিধান করিবে না, শরীর স্বেচ্ছন্দে থাকিতে পাবে একপ কাপড় গায়ে রাখিবে পাছে রোগ হয়, এমন ভয়কে মনে স্থান দিবে না, যদি স্বভঃ প্রকৃপ ভয় হয়, নিবারণ করিতে না পাব, তবে সে স্থান পরিত্যাগ করিবে।

শিশুচিকিৎসা।—শিশুদিগেব এই বেগ হইলে অত্র প্রকাব উপায় অবলম্বন করিতে হইবে

শরীর উষ্ণ, দ্রুতগামী নাড়ী, অনিদ্রা, হবিজ্ঞাত মল, জলবৎ অথবা আঠাবৎ শ্লেষ্মা, মলত্যাগেব সময় অথবা পূর্বে উদবে বেদনা ও কোঁৎপাড়া ইত্যাদি দেখিলে “র্যাকোনাইট” দিবে

অতিশয় মন্দ অবস্থায় মল ঈষৎ পীত বা সবুজ বর্ণ হইলে, মলত্যাগের পূর্বে উদবে চিম্‌টীকাটাৰ ন্যায় বেদনা থাকিলে, অথবা জমাট হুগ্ধ বমন হইলে “এথুসাসিন্” প্রয়োগ করিবে

জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত, মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক এবং উজ্জ্বল, তৃষ্ণাহীনতা, আঠাবৎ শ্লেষ্মা অথচ জমাট, দধিবমন, মল জলবৎ ও অত্যধিক নির্গত হইলে “র্যাণ্টিগন ক্রুড” দিতে হইবে

মুখ মৃতব্যক্তিব ন্যায় মলিন, চর্ম শুষ্ক এবং সঙ্কোচিত, মল ঘন ও ঘোব, অথবা ঘোব জলবৎ, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, মলত্যাগেব পূর্বে যাতনা ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে “আর্শেনিক” প্রয়োগ করিবে

জিহ্বা শুষ্ক এবং উজ্জ্বল, ক্ষুধা-তৃষ্ণা বহিত, মল ঈষৎ সবুজ, আঠাবৎ শ্লেষ্মা, মলত্যাগেব সময় পেটকমড়ানি বা কোঁৎপাড়া থাকিলে “এপিস্-মেল্” দিবে।

মুখমণ্ডল আবর্তিত, মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক, জিহ্বাবর্ণ সাদা লেপযুক্ত এবং উহাব পার্শ্বদেশ লাল, মল তবল ও সবুজ, মল শ্লেষ্মায়ুক্ত বা বক্ত-মিশ্রিত শ্লেষ্মায়ুক্ত হইলে “বেলেডোনা” ব্যবস্থা করিবে

ভেদ ও ধমন উভয়ই থাকিলে যদি বমন অধিক হয়, যাঁহা আহাৰ বা পান কটের সমস্তই উঠিয়া যায়, উদব স্ফীত, চক্ষুব চাবিদিকে নীল বেখা দৃষ্টিগোচর হয় তবে “রিসমথ” দিল উপকাব দর্শ

অতিশয় ফিকা, অথবা সাদা মুখমণ্ডল, মল বর্ণহীন, অনিচ্ছা স্বস্ত্রে মলত্যাগ ও তাহাতে দুর্গন্ধ থাকিলে “কার্বভেজিটেবলিস্” দিবে

মুখমণ্ডল লাল এবং গবম, শূল বেদনাব সহিত সবুজ জববৎ মলত্যাগ, তাহাব সহিত ডিমের ন্যায় সাদা বা পীত স্লেষ্মা মিশ্রিত থাকিলে “ক্যামোমিলা” দেওয়া কর্তব্য

উদবেব নিম্ন ভাগ ক্ষীণ, অঙ্গীর্ণ, জলবৎ পীত মল নিঃসরণ হইলে “চায়না” দিবে

নাসিকা চুলকানি থুথু নিষ্ক্ষেপ কবা, ভাতেব মণ্ডেব ন্যায় সাদা মলত্যাগ, নিদ্রাকালে দন্ত ঘর্ষণ ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে “মিনা” দিতে হইবে

শুদ্ধ দুগ্ধবৎ ওষ্ঠ পীত ও জলবৎ বমন, ঘোব সবুজ অথবা সবুজ আভা-যুক্ত মল থাকিলে “ক্রোটন” প্রয়োগ করিবে।

শরীর শুষ্ক ও উত্তপ্ত, জলতৃষ্ণা, মল পীত আভাযুক্ত, সবুজ জলবৎ বা ঈষৎ সাদা হইলে, মলত্যাগেব পূর্বে বা পবে যন্ত্রণা থাকিলে “ডাল-কাগাবা” দিবে

মুখ ফিকা, চক্ষু নীলবেথাবৈষ্টিত, পীত আভাযুক্ত, জিহবা সাদা লেপ-যুক্ত, সাদা বমনোদগে ও বমন, ঘাসেব ন্যায় সবুজ মল থাকিলে “ইপি-কাক্” দেওয়া উপযুক্ত

শুদ্ধ ওষ্ঠ, মুখবিববের কোণে ক্ষত, জিহবা মেন পালকে আচ্ছাদিত, মল গন্ধকের ন্যায় পীত, কখনকখন আঠাবৎ বা অস্প লাল হইলে “মাকু-রিয়াম” দেওয়া যায়।

ঘন পীতভ, সাদা লেপযুক্ত জিহবা, মাড়ী ক্ষীণ, মুখে দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত, মল অস্পগন্ধবিশিষ্ট ও বমন স্লেষ্মাযুক্ত হইলে “নক্সমিকা” দিবে।

চক্ষু কোঠবপ্রবিষ্ট, ফিকা নীল রেখাঈবা বৈষ্টিত, মল সাদা ও জলবৎ, এবং চক্ষুটুকুবা ন্যায় চাপ্ চাপ্ হইলে “ফস্ফরাস্” দেওয়া যুক্তিযুক্ত।

জিহবা আঠাবৎ স্লেষ্মা ঈবা আকৃষ্ট, তৃষ্ণা না থাকা, মল সত্তত পবি-বর্তনশীল, ছইবাব দ স্তেব মলে পাম্পাব সাদৃশ্য না থাকা, ব্যক্তিভে

রুদ্ধি, মলত্যাগেব পূর্বে উদরের গভীর * দ হওয়া ও তৎকালে শীতাম্ভব থাকিলে “পলুসেটিলা” দিবে ।

তরল আঠাৎ ফেণায়ুক্ত মল, অথবা তাহাতে বক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা থাকিলে, উদরের বেদনা ও ফাঁপা ইত্যাদি লক্ষণ বিদ্যমান “সিলিশিয়া” ব্যবহার করা কর্তব্য ।

শিশু দিনে নিদ্রিত বাএ জাগ্রত থাকিলে, এক মল পবিত্রনশীল, হাত পা ও তালুদেশ অতিশয় গরম হইলে “সলফার” দিতে হইবে ।

শীতল পানীয় দ্রব্যে একান্ত ইচ্ছা, শীত শীত অবসন্নতা, নিশ্বাসেব অববোধ, অতিশয় দৌর্বল্য, মল পীত জলবৎ এবং অতিশয় প্রচুব হইলে “থুজা” ব্যবহার করিবে

কপালে শীতল ঘর্ষ, ওষ্ঠ শুষ্ক এবং কাল রংবিশিষ্ট, অত্যপ্প তরল দ্রব্যপানে বমন রুদ্ধি, মল সবুজ জলবৎ, মলত্যাগ সময়ে কপালে ঘর্ষ হইতে থাকিলে “ভেবেট্রাম্” দিতে হইবে

হাকিমীমতে ওলাউঠা চিকিৎসা ।

লক্ষণ ।—প্রথমে ভেদ পরে বমি হয়, তাহাব পর জলেব আঁয় পুনঃ পুনঃ ভেদ ও বমন হয় । পিপাসা থাকে, দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে শরীর দুর্বল হয়, হাত পা খেঁচিয়া ধবে, চক্ষু বসিয়া যায়, এবং নাড়ী পাওয়া যায় না ।

কারণ —এই রোগের প্রকৃত কারণ কি তাহা এ পর্যন্ত অবগতিরিত হয় নাই, তবে বোধ হয় যে, বড় গ্রীষ্ম, মন্দ বাতাস ও অত্যন্ত বৌদ্রেব সময় এই রোগ অধিক হয় । কিন্তু শেষউঠিয়া ঈষৎ বিহ্বল রূপ হইলে এবং বাতাস জোবে বহিলে, পীড়ার প্রাহুর্ভাব সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হয় । শবীরের দৌর্বল্য, বৌদ্রে পবিত্রম করা, অনাহারে পথ

চলা, গায়ে মন্দ বাতাস লাগান, কাঁচা ফল অথবা পাস্তাভাত খাওয়া, যে সময়ে শরীর গরম থাকে, সেই সময়ে অত্যধিক আগানী কিম্বা জল পান করা, সেঁৎসেঁতে ভূমিতে বা বহুজনাকীর্ণ স্থানে অথবা দুর্গন্ধযুক্ত জায়গায় বাস করিলে প্রায়ই এই বোগ জন্মে

যাহাতে রোগ না হইতে পারে তাহার উপায় — ঘরের চতুর্দিক কিম্বা সমস্ত গ্রাম বা নগর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে, পাঁচা ময়লা বা দুর্গন্ধ জল নিকটে থাকিতে না পায়, উচ্চ ও শুষ্ক ঘরে বাস করিবে, ঘরে খিড়কি ও সদর কজু কজু ভাবে রাখিবে, যেন সর্বদা বাতাস যাতায়াত করিতে পাবে। যখন দেশমধ্যে উলাউঠা হইবে, তখন অধিক পরিশ্রম করিবে না, বৌজে বেড়াইবে না, কোন প্রকারে শরীরকে দুর্বল করিবে না, উত্তম জব্যাদি আহাঁর করিবে, সময়ানুসারে যাহা সহ্য হইবে, তাহাই আহাঁর করিবে অস্তঃকরণের মধ্যে ভয় করিবে না, পরমেশ্বরে সর্বদা নির্ভর রাখিবে, এবং তাঁহার ভবসা করিবে এই ব্যামোহের আধিক্যকালে যদি পাতলা দান্ত বা বগি হয়, তবে গরম ভাতের ফেণ কিম্বা জলের সহিত পুদিনা পাতা বাটিয়া সবৎ করিয়া খাওয়াইলে, তাহা বন্ধ হইবে। কপূর্ব ও হিঙ্গের আত্মা লইলেও উপকার দর্শে।

উলাউঠাওধান দেশে বাড়ীর মধ্যে এমন কি সকল গৃহে কপূর্ব ও হিঙ্গু নেকড়ায় বাঁধিয়া ঘরের খে স্থান দিয়া সকলে গতিবিধি কবে, সেই স্থানে ঝুলাইয়া রাখিবে

ঔষধ ব্যবস্থা ।—রোগেব প্রথমাবস্থাতেই চিকিৎসা করা বিধেয়, এজন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

সুবাঁব	...	২ ছটাক।
গোলমরিচের তৈল	...	১ তোলা
আফিঙ্গ	...	২ মাসা।

একত্র মিশাইয়া ১ তোলা ওজনে খাইতে দিবে। তাহাতে বন্ধ না হইলে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর পুনর্বার খাওয়াইবে।

যদি ইহাতেও বোগ স্থিতি পায়, তবে নীচের লিখিত ঔষধ দিবে।

আফিজ ... ২ মাস

হিজ্জ ... ২ মাস

গোলমবিচ ... ২ মাস

একএ পোষণ ও জল দিয়া মাড়িয়া ১৬টি বটিকা প্রস্তুত কবিয়া একটী খাওয়াইবে, যদি বন্ধ না হয়, ২ ঘণ্টা অন্তর ৩ ৪টি খাওয়াইবে ।

অন্য উপায় ।

পাচাচূর্ণ ... ৪ মাস

আফিজ ... ৪ মাস

ছই দ্রব্য জলে বাটিয়া আটটি বটী প্রস্তুত করিবে এবং ছই ঘণ্টা অন্তর ৩ ৪টি খাওয়াইবে অধিক জল খাইতে দিবে না । হাতে পায়ে সর্বদা গবম তৈল মাখাইবে

ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে বমন নিবারণ জন্য সরিষা চূর্ণ গবম জলে মিশ্রিত কবিয়া নেকড়ায় লাগাইয়া পেটের উপর বসাইয়া দিবে ; খুব জ্বালা করিতে থাকিলে তুলিয়া ফেলিবে হাত পা খেঁচিতে আরম্ভ করিলে গবম জলে কাপড় ভিজাইয়া তাহাতে বাঁধিয়া দিবে আব ইট অথবা গবম পাথর সহানুসাবে তাহাতে বসাইবে, অথবা বালি গরম করিয়া কাপড়ে বান্ধিয়া বোণীর শবীবের স্থানে স্থানে সহস্রত স্বেদ দিবে,

অন্য উপায় ।

পাচাচূর্ণ ... ৪ মাস

আফিজ ... ১ মাস

কপূর ... ৪ মাস

জলে বাটিয়া আটটি বটী প্রস্তুত করিবে, এক একটী বটী ২ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে

গাজদাহ থাকিলে হবিজা চূর্ণ ও শুঠচূর্ণ মাখাইবে

অন্য উপায় ।

আফিজ ... ২ মাস ।

হবিজাচূর্ণ		২ মাস
পাবাচূর্ণ		২ মাস ।

জলে বাটিয়া তিনটি বটা প্রায় ৩ কবিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

গ্যাস্ট্রোপ্যাথিকে পাঁককৃচ্ছ্র ও অজীর্ণরোগ চিকিৎসা ।

ক্ষুধামান্দ্য, অধিকক্ষণ পবে ভুক্ত জব্যের পবিপাক, পাঁকশযে যাতনা বোধ ও সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধ, এই সকল থাকিলে অজীর্ণ বোগ বলিয়া নির্বাচন করা গিয়া থাকে ।

লক্ষণ —পাঁকশযেব এইরূপ ক্রিয়াবিকাৰে লক্ষণাদিব স্বভাব ও ভ্রূহতা সর্বত্র সমান নহে । ইহাতে কাহার সমাজ, কাহার ব বেশী অসুখ দেখা যায় । এই রোগে ক্ষুধামান্দ্য, উদবে বেদনা, ভারবোধ ও ক্ষীণতা, আধুনা বা অস্ত্রমধ্যে অধিক পবিমাণে বাস্পসঞ্চয়, বমনোদ্বেগ ও বমন, কোষ্ঠবদ্ধ ও উদ্বাময়, জিহ্বা খরস্পর্শ ও লেপযুক্ত, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, কটি ও হস্ত-পদাদিতে বেদনা, মুখে জলোদ্যম ও শিবঃপীড়া হইয়া থাকে ।

এ চিকিৎসা —এই বোগে ঔষধ অপেক্ষা পথ্যের সন্নিয়ম নিতান্ত আবশ্যিক । নিয়মিত বিশ্রাম, সাভিশয় চিণ্ডার্ত্যাগ, স্নান পরিবর্তন, খুজ্জলে স্নান, খোট্টারোহণ, ভ্রমণ, তামাকু, গাজা, জ্বা, প্রভৃতি দক জব্য পবিত্যাগ করা কর্তব্য । এই উপায় অবলম্বন দ্বারা পীড়া এককালে স্থস্থ হইতে দেখা গিয়াছে । কখন কখন ১২ হইতে ২৪ ঘণ্টা অনাহার আবশ্যক হয় । তৎপরে দুধেব সহিত চুণের জল, সাণ্ড-দানা, প্রভৃতি লঘু আহার করিতে দিবে । ইহাতে ছান, অপক ফল, বিয়ার, পোর্ট ওয়াইন, বা অধিক গ্যাস্কেউলযুক্ত মদ্য একবারে

গ্যাস্ট্রোপ্যাথিকে পাককৃচ্ছ ও অজীর্ণরোগ চিকিৎসা । ১১৯

নিষিদ্ধ । নিতান্ত আবশ্যক হইলে অধিক জলের সহিত অল্প সেবি ব্রাণ্ডি সেবন করা যাইতে পারে । যদি শাখ্যেব অব্যবহাতে পীড়ার উপশম না হয়, তবে পেপ্সিন ওয়াইন ১ ড্রাম, পেপ্সিনা পোসাই গ্লিসিবিনেব সহিত বটিকারূপে ২ ৫ গ্রো পরিমাণে ব্যবহার করিবে । কখন কখন এই ঔষধেব সহিত হাইড্রোক্লোরিক ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয় । কেবলমাত্র পেপ্সিন দ্বারা পাককৃচ্ছ দূর না হইলে তাহাব সহিত ১ গ্রো মর্ফিয়া দেওয়া যাইতে পারে । কোন কারণে পাকশযেব তেজের হানি হইলে উহার সহিত ১ গ্রো স্ট্রুক্‌নিয়া সংযোগ করিবে ।

নাইট্রোমিউবিষেটিক গ্যাসিড ক্লোরাইড, ইপিক্যাক, আর্জক প্রভৃতি ঔষধ দ্বারাও পাকবসের বৃদ্ধি হইয়া থাকে । বেদনা ও বমন নিবারণার্থ বরফ, মর্ফিয়া ও স্ফাবায়লসংযুক্ত কার্বনিক গ্যাসিড ব্যবস্থা করিবে, ও অগ্নিনিবারণ জন্য কেবল স্ফাবাক্ত ঔষধ সেবন করান ব্যবস্থা । কিন্তু অধিক দিন স্ফাবাক্ত দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নহে । * পাকশযেব উত্তেজনা নিবারণ করিতে হইলে জেন্‌শন, কোয়াসিয়া, কলম্বা, বার্ক, প্রভৃতি দ্বারা বিশেষ উপকার লাভ হইতে পারে । কুইনাইন অসহ্য হইলে গ্যালিশিন ব্যবহার করিবে । বিবেচক ঔষধ আবশ্যক হইলে ক্লোরাইড বটিকা, * টেরাফ্রিকম, সোনা মুখী, ইপিক্যাক ইত্যাদি যুগ্ম বিবেচক ঔষধ দিবে । বোগেব উপশম হইতে আবস্ত হইলে পুনরাক্রমণ নিবারণ জন্য লৌহযুক্ত ঔষধ ও লৌহেব সহিত পেপ্সিনেব ব্যবস্থা করিবে । এ অবস্থায় কুইনাইন, ইপিক্যাক ও জেন্‌শনের বটিকা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে ।

পাকশয বেদনা ।—এই রোগ অজীর্ণরোগেব রূপান্তর্য্যাদে কেহ কেহ ইহাকে একটি পৃথক রোগ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন

লক্ষণ ।—পাকশযের অস্বাভাবিক উদ্দীপনেব সহিত উহার

* ক্লোরাইড ৩ আউন্স, সেকট্রাইন এ্যালোজি চূর্ণ ২১ আং, মার্শচূর্ণ দেড় আং, কঠিন সাবান দেড় আং, পিপারমেন্ট তৈল দেড় ড্রাম, ওড় ৪ আং । মাত্রা ৫ হইতে ১০ গ্রো

ক্রিয়াব অতিশয় বৈলক্ষণ্য অথবা স্পর্শালুভাবকতাব অতিশয়া, বেদনা, বমন, পবিবর্তিত সিক্রিশন, সচবাচর ক্ষুধাব বৈলক্ষণ্য ও পবিপাকশক্তিব হ্রাস, উষ্ণতা, কখন কখন শীতলতা অলুভব, উদবে বেধন বা চর্বণবৎ বেদনা, স্থপিত্তেব ক্রিয়ার ব্যতিক্রম, সার্বাঙ্গিক আক্ষেপী; জীলোকের বজোনিঃসরণকালে বেদনা প্রকাশ পায়, বেদনাব স্থায়িত্বকালের নিশ্চয়তা থাকেনা, সচবাচর বাস্প নির্গত, অথবা অন্ন বা ক্ষাবাক্ত জব জব্য উদগীর্ণ হইয়া বেদনাব শান্তি হয়, অনেকস্থলে আহার কবিলে বেদনার উপশম হইয়া থাকে, কখন কখন বেদনা ব্যতিবেকেও বমন হইতে দেখা যায়, কখন কখন বমনেব মধ্যে মধ্যে স্বেদাবস্থার জায় আহাবীয় জব্য পরিপাক হয়, কখন বা অনববত বমন হইতে থাকে, আহাব কুরিলেই উঠিয়া যায় হিষ্টিরিয়াজনিত বমনকেও এই শ্রেণীভুক্ত বলা যাইতে পারে।

চিকিৎসা।—বলকব ও উষ্ণ ঔষধ এবং উপযুক্ত পুখ্যদ্রাব্য পাকাশয়ের স্থায়িক পীড়াসকলের চিকিৎসা করিবে প্রথমে বেদনা নিবাবণেব জন্ত ৫ গ্রেন কার্বোনেট অফ পোটাস অর্থাৎ সোডা দ্রাব্য বিশেষ উপকাব দর্শিতে পাবে। পাইবোসিস্ থাকিলে টীং নক্সভমিকা উপযুক্ত বিসমথ ও হাইড্রোসিয়েনিক স্যাশিড দ্রাব্য বেদনা ও বমনেব উপশম হয় চিত্তোদ্বেগ, নিশ্বেজকতা ও হিষ্টিরিয়া থাকিলে অহিফেন মর্হোয়ধ অহিফেন, বিসমথ, কাইনো প্রভৃতিদ্বারা পাইরোসিসের চিকিৎসা করিবে। বেদনা ও আধুমান নিবাবণ জন্ত স্যাবোমেটিক স্পিরিট অফ স্যামোনিয়া বিশেষ উপকাবী।

গ্যাম্‌টাইটিস্ বা পাকাশয়ের প্রদাহ।—উত্তেজক বিষদ্বারা পাকাশয়ের প্রদাহ হইলে, উদবে প্রবল দাহনবৎ বেদনা এবং টিপিলে প্রবেদনাব আধিক্য বোধ হয়। সর্বদা অতিশয় ক্লেশকব বমনোদ্বেগ হইতে থাকে বমন, নাড়ী ও শ্বাস প্রশ্বাস জত, অতিশয় তৃষ্ণা, কিন্তু জলপান মাত্র বমন, দৌর্বল্য, মুচ্ছা, নাড়ী অতিশয় দুর্বল, সর্বদা পাশাশ বর্ণ, হস্তপদাদিশীতল ও মুখমণ্ডল উদ্বেগযুক্ত, কোষ্ঠরুদ্ধ, মুত্র অল্প ও রক্তবর্ণ, পবে অস্থিবতা এবং হিকাও হইতে পারে ক্রমশঃ এই দৌর্বল্য বৃদ্ধি হওয়ায় মৃত্যু উপস্থিত হয়।

য্যালোপ্যাথিকে পাককুচ্ছ ও অজীর্ণরোগ চিকিৎসা ১২১

চিকিৎসা।—পাকশযে কোন প্রকার বিষ বা উত্তেজক পদার্থ থাকিলে ঈষৎ গরম জলেব সহিত সল্ফেট অফ জিঙ্ক, সর্ষপ চূর্ণ অথবা ইপিক্যাকুয়ানা প্রভৃতি বমনকর ঔষধ প্রয়োগ করিবে। আবশ্যক হইলে ঈষৎক-পুষ্ণ উছা তুলিয়া বাহিব করিবে। প্রথমাবস্থায়—এবও তৈল, সল্ফেট বা কার্বনেট অফ ম্যাগনেসিয়া প্রভৃতি বিবেচক ঔষধে বিশেষ ফল দর্শে। কোন স্থলে পিচকাবিও ব্যবহার করা যায়। পুনঃ পুনঃ বিবেচক ঔষধ ব্যবহারে হানি হইতে পারে।

অগ্ননাশক ও অরসাদক ঔষধ দ্বারা প্রধান প্রধান লক্ষণের প্রতিকার হয়। নিম্নলিখিত ঔষধ বিশেষ ফলদায়ক।

বিসমথ	...	৫ গ্রেন।
হাইড্রোসিয়ার্নিক য়াশিড	...	২ বিন্দু।
অহিফেন	...	২ গ্রেন।
জল	...	১ আঁ।

এক এক মাত্রায় বরফ ও একাভেমিং ডাফটরূপে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিবে।

কার্বনেট অফ ম্যাগনেসিয়া	...	৫ গ্রেন।
সোডা	...	৫ গ্রেন।
ডাইঃ হাইড্রোসিয়ার্নিক য়াশিড	...	২ বিন্দু।
টীঃ কার্ডেমম্	...	১৫ বিন্দু।
জল	...	১ আঁ।

এক এক মাত্রায় ২।৩ ঘণ্টা অন্তর দিবে	...	...
অহিফেন	...	২ গ্রেন।
গঁদের জল	...	১ আঁ।
ডাইঃ হাইড্রোসিয়ার্নিক য়াশিড	...	৩ বিন্দু।

এক এক মাত্রায় ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেকন করিতে দিবে।

পীড়া কঠিন হইলে নাভিস্থলের দুই অঙ্গুল উপরে জলোকা বসাইবে। নিত্যন্ত আবশ্যক হইলে তবে উক্ত ক্রিয়া করিবে, নতুবা কোন মতে জোঁক বসাইবে না। উপবোক্ত স্থানে সর্বদা পোল্টিস্ দিবে।

পথ্য — হৃৎকেন্দ্র সহিত যারোকট, পিপাসাকালে অল্প নীতল জল, ববফের টুকরা, মোড়া-ওয়াটা বেব সহিত অল্প মাত্রায় ত্রাণ্ডি বা স্যাম্পোন দেওয়া যাইতে পারে ।

পুরাতন গাষ্ট্রাইটিস্ । — অতিবিক্ত আহার বা স্নায়ুপান জন্ত এই ব্যাধি জন্মে । দীর্ঘকাল অনশন জন্মও এই পীড়া হইয়া থাকে ।

লক্ষণ ক্ষুধামান্দ্য, আহারেব পর বমন ও বেদনা, পবিপাক-ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য, পাকশযেব আক্ষেপ, জলবৎ অন্ন পদার্থ উদগীরণ, অস্ত্রেব অস্পষ্ট ক্রিয়া, জিহ্বাব ধবস্পর্শতা ও লেপযুক্ততা ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় ।

চিকিৎসা — পাককৃষ্ণ ও অজীর্ণ বোগেব ঞ্চায় ইহার চিকিৎসা করিবে লঘু আহার ও নীতল জল পান দ্বাৰা এই বোগ শান্তি হইতে পারে ।

গ্যাস্ট্রিক ক্যাটার । — ইহাকে সাধারণতঃ পিত্তাক্রমণ বা বিলি-যাস্ ক্যাটাক কহে ।

লক্ষণ । — জিহ্বা ধবস্পর্শ ও লেপযুক্ত, পেট ভার, পিত্ত বমন, বিব্রম, মস্তক ঘূর্ণন, শিবঃপীড়া ইত্যাদি সামান্য অজীর্ণেব লক্ষণ ইহারও লক্ষণ বলা যায় ।

চিকিৎসা । — ব্যতিকালে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা

কলসিহ্ন ২ গ্রোণ

ম্যালোজ বটীকা ৫ গ্রোণ ।

একত্রে জলেব সহিত একবার সেবন

প্রাতঃকালে মিড্‌লিস্ পাউডার † এবং তাহার পরে স্নান জল ও লঘু আহার দ্বাৰা চিকিৎসা করিবে ।

এই রোগে পাকশযেব শৈথিল্যিক বিলীর বক্রবহা নাড়ীতে বক্তাতি-সাব ও অধিক পরিমাণে নির্ঘাসবৎ মিউকাস্ নিঃসৃত হইয়া থাকে । ইহাব

ম্যালোজ বটীকা । — সঁকট্রা ম্যালোজ চূর্ণ ১ আং, হিঙ্গু ১ আং, সাঁবান চূর্ণ ১ আং, গোলাব ধওল আং । মাত্রা ৫—১০ গ্রোণ

† অব-চিকিৎসায় লিখিত হইয়াছে

ম্যালোপ্যাথকে পাককুচু ও অজীর্ণরোগ চিকিৎসা । ১২৩

প্রতিবার জল অর্ধ ড্রাম হইতে ১ ড্রাম সলফাইড অফ সোডা, বিসমথ, কাইনো ও লুগউড এবং লৌহঘটিত ঔষধ ব্যবহার কবা উচিত

কোষ্ঠবদ্ধ শিখাবণার্থ ডাক্তার ট্যানার ও এণে মাত্রায় ক্যালোমেল ব্যবহারে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পাইলোরসের দৃঢ়তা।—পুৰাতন প্রদাহ, পাকশযস্থ ক্ষতের আবেগের পব আকুঞ্চন, অথবা সতত নির্জল স্রাব সেবনে উত্তেজন হেতু এই পীড়া ঘটিতে পারে।

লক্ষণ।—দুর্বলতা, শরীর শীর্ণ, মুখে জলোদীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধ হয়। যদিও প্রথমে ক্ষুধাবশতঃ আহাবে শিলক্ষণ ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু পূর্ণাহারে উদবে অত্যন্ত বেদনা হওয়ায় রোগী উত্তমরূপে আহাব কবিত্তে পারে না। আহাবের প্রায় ৩৪ ঘণ্টা পবে বমন হয় উদীর্ণ পদার্থে অজীর্ণ খাদ্য জব্য এবং জল থাকে। ক্রমে হস্ত-পাদাদি শ্ফীত, স্রাব কক্ষম, নিদ্রাব অভাব, উদরাময়, এবং পবে অনাহাববশতঃই মৃত্যু হয়

চিকিৎসা।—ইক্ষু, মব, অসিদ্ধ বা অস্পষ্ট ডিম্ব, মেবী, বা অন্য কোন মদিরার সহিত অসিদ্ধ ডিম্ব বা মাংসের ঝোল ইত্যাদি আহাব দিবে ঔষধ—কডলিভার অয়েল।

পাকশয়ের প্রসার।—পাকশয়ের অধোঅস্ত্রের পীড়াবশতঃই উহার এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ইহাতে আহবীয় জব্যাদি তদ্বজ্রে পতিত না হওয়াতে উহা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে, এবং কখন কখন উহা এত বড় হয় যে, উহা দ্বাবা স্তম্ভ উদবগধব পরিপূর্ণ হওয়াতে উদর একটা বৃহৎ টিউমারে পূর্ণ বোধ হয়।

লক্ষণ।—সচবাচব ইহাতে অত্যধিক পরিমাণে বমন হইয়া থাকে। উদীর্ণ পদার্থ অগ্রাণ্ড ও উহা অনায়ামে গাতিয়া উঠে, কখন কখন উহার আকার সুরামণ্ডলের স্থায় হয়। এই উদীর্ণ পদার্থ পরীক্ষা করিলে ইহাতে সচরাচর বহুসংখ্যক উত্তীর্ণ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়

চিকিৎসা।—সলফাইড অফ সোডা সলফাইড অফ পটাশ

ব্যবহার করা কর্তব্য। সচবাচব পটীশ অপেক্ষা ৩০ ৪০ ট্রোন মাত্রায় সোডা উপকারক বলিয়া বিবেচনা হয়। 'ডাঃ চেম্বারস' ৫ হইতে ২০ ট্রোন মাত্রায় হাইপো সল্ফাইড অথবা সোডা ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন। পাউকটী না দিয়া ইহাতে দেশীয় কটী পথ্য দিবে। অন্যান্য পথ্য বিবেচনামত দেওয়া কর্তব্য।

পাকানায়ের ক্ষত ।—এই পীড়া সহজ নহে। এই ক্ষত সামান্য, পুৰাতন ও ছিদ্রকর হইতে পারে। এই পীড়ার লক্ষণাদি এক প্রকার নহে। এই জন্য অনেক অনেক প্রকারে ইহাকে ব্যাখ্যা কবিয়া থাকেন।

লক্ষণ ।—পৃষ্ঠদেশে ও নিম্ন পৃষ্ঠকেশুককার উপরে বেদনা, নাড়ীর উপরে, বেদনা, ইহাই প্রধান লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই বেদনা অপেক্ষাকৃত মুহূর্ত্ত ও বমনকর। আহাবেব পৰ ইহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কখন কখন এই বেদনার সহিত নাড়ীর স্পন্দনাদিক্য দেখা যায়। রক্তোনিঃসরণের সময় কোম কোম স্রীলোকেব এই বেদনার অধিক্য দেখা গিয়া থাকে। বোগী ক্রমে শীর্ণ হইয়া পড়ে। কখন অস্বাভাবিক পদার্থ উদ্গীৰণ, বমনোদ্বেগ ও বমন হইয়া থাকে; অন্য বিষয়ে আশ্চর্য্যের বড় ব্যতিক্রম ঘটে না। স্রীলোকেব যৌবনাবস্থায় ক্ষত হইতে অধিক বক্তব্য হইলে রক্তাভাব হইয়া থাকে। এপিগাস্ট্রিক প্রদেশ হইতে আবৃত্ত কবিয়া ক্রমে সমস্ত উদবে প্রবল বেদনা, উদর স্ফীত ও আধ্বানযুক্ত, যাহাতে উদরস্থ পেশী সমুদায় নিবিষ্ট থাকে বোগী, এরূপ ভাবে থাকিতে চাহে, ক্রমে মুখমণ্ডল উদ্বেগযুক্ত ও রোগী নিন্তেজ হয়। পাকানায় ছিদ্রযুক্ত হইলে পূর্ণ আহারেব পৰ উপরোক্ত লক্ষণ সকল আবির্ভূত হয়। আহাবেব পবেই বমন, জ্বর, ইত্যাদি ক্রমশঃ দৃষ্টি-শোভন হয়। কিয়ৎকাল পরে বেদনান লক্ষণ যাত্র থাকে না এবং বোগী পতনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সচবাচব ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে প্রাণত্যাগ করে।

চিকিৎসা ।—অত্যন্ত যত্নাদায়ক বেদনা থাকিলে ফোমেটেটান, সর্ষপ পলস্তারা, তাপিগি তৈলেন্ন স্টুপ ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে। বিবেচনামুসারে কেবল আফিড এবং উহার সহিত কখন কখন হাইও-সায়িমস বা গাঁজা ব্যবহার করা যাইতে পারে। বমন বা রক্তাব

য়্যালোপ্যাথিকে পাককুচ্ছ ও ভীজীর্ণরোগ চিকিৎসা । ১২৫

নিবারণ করিতে এপিগ্যাস্ট্রিক প্রদেশে ববফ ব্যবহার কবিবে, বিসমথও ইহাব উত্তম ঔষধ ।

বিসমথ ... ১০ গ্রেণ ।

কম্পাউণ্ড কাইনো পাউডার* ... ৫ গ্রেণ ।

এক এক মাত্রায়, দিনসে তিনবার সেবন কবাইলে বিশেষ উপকার দর্শে ।

অধিক আধ্বান ও বমনোদ্বেগ থাকিলে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার কবাইবে ।

বাইকারনেট অফ পটাশ ... ১০ গ্রেণ ।

আইওডাইড অফ পটাসিয়ম ... ২ গ্রেণ ।

এক এক মাত্রায় ২ ও ঘণ্টা অন্তর সেবন কবান কর্তব্য

কেবল মাত্র বমন নিবারণার্থ হাইড্রোসিয়েনিক স্যাশিড ব্যবহৃত হয় ।

বেদনা ও বমনোদ্বেগ প্রবল না হইলে লৌহঘটিত ঔষধ ও তাহাব সহিত কুইনাইন ব্যবহার কবা যায় । এই অবস্থায় বিবেচনের আবশ্যক হইলে অল্প মাত্রায় এরও তৈল দেওয়া যায় ।

পথ্য ।—প্রথমতঃ যবের মণ্ড, স্যাবোক্রট, হুঞ্চ ইত্যাদি লঘু পথ্য দিবে । উষ্ণ হুঞ্চের সহিত উহার চতুর্থাংশ চূণের জল উপকারী । হুঞ্চের সহিত সূজী, অল্প সিদ্ধ তিল, শ্বেত মৎস্য ইত্যাদি দেওয়া যাইতে পারে । পীড়ার প্রবলাবস্থায় চা, কফি, চিনি, বিয়ার ও অন্যান্য মদ্য নিষিদ্ধ । কিন্তু উষ্ণ পথ্যের আবশ্যক হইলে অল্প পরিমাণে জলমিশ্রিত ত্রাফি দেওয়া যায় । পীড়া উৎপন্ন আরম্ভ হইলেও কিছুদিন পর্য্যন্ত পথ্যদম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্তব্য ।

পাকশয়েব ক্যান্সার —পাকশয়ে কঠিন, কোমল বা গদবৎ

* কম্পাউণ্ড কাইনো পাউডার।—কাইনোচূর্ণ ৩৫ আং, অহিফেন চূর্ণ, সিকি আং, দারুচিনিচূর্ণ ১ আং ২০ গ্রেণ এইরূপ কাইনো পাউডারে ১ গ্রেণ আফিঙ্গ আছে মাত্রা ৫ হইতে ২০ গ্রেণ

ক্যান্সার দেখিতে পাওয়া যায় সচরাচর ইহা স্ফীণিতভাবে প্রকাশ পায়, অতি অল্পে অল্পে ইহা বৃদ্ধি হয়, এবং প্রথমাবস্থায় লক্ষণাদি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না।

লক্ষণ ।—প্রথমে জীর্ণের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় পাকশ-য়ের উদ্ভাস্ত বা উহা নিকটে পীড়া জন্মিলে আহারের সময় অতিশয় কষ্ট হয় ; কিন্তু উহা অধোন্তের নিকটে হইলে আহারের ২-৩ ঘণ্টা পরে যন্ত্রণার আধিক্য হয় পাকশের ক্ষুদ্র বক্রাংশে পীড়া জন্মিলে অনেক স্থানে অতি সামান্য যাতনা হইয়া থাকে ।

এপিগ্যাস্ট্রিক প্রদেশে দাহনবৎ, শরৎধনবৎ বা চর্কণবৎ বেদনা হয়, আহারের পরে ঐ স্থান নিপীড়ন করিলে বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে । উদগত্বের আকৃতি, অতীব দুর্গন্ধময় বাতের উদ্ভাবন, সর্বদা বমনোদ্গেগ ও বমন হয়, বমনের সহিত অজীর্ণ জব্যাদি ও হৃৎহৃৎ মিউকাস, পরে বস্তুরূপে অবস্থ কখন বা কৃষ্ণবর্ণসংযুক্ত বস্তুর স্রাব পাওয়া যায় । কোষ্ঠবদ্ধ, দেহ ক্রমশঃ শীর্ণ ও দুর্বল হয় ; কখন কখন এপিগ্যাস্ট্রিক প্রদেশে টিউমার বোধ হইয়া থাকে উহা এক্ষণে অবস্থিত হয় যে, রক্তবহা নাড়ীর আবেগ আইসে না এই সকল লক্ষণাদি সহিত ক্যান্সারের নির্দিষ্ট দৈহিক লক্ষণাদি বর্তমান থাকে ।

চিকিৎসা ।—চিকিৎসাদাব্য এককালে এই রোগ দূর করা অসম্ভব ততঃ সাধ্যাত্ত নহে ; ক্রমশঃ পীড়া বৃদ্ধি হইয়া শীঘ্রই দেহ নিস্তেজ ও পরে মৃত্যু হয় ; কিন্তু যাহাতে ক্লেশ নিবারণ হয়, এমন চেষ্টা করা আবশ্যিক । বেদনার প্রতিকার জন্য অহিফেন ভক্ষণ বা পিচকাবী দ্বারা ব্যবহার করা যাইতে পারে । সর্বদা বমন হইলে পুষ্টিকর জব্য পদার্থের পিচকাবী দ্বারা শরীর পোষণ করিতে চেষ্টা করিবে । কিন্তু পাকশে আহারীয় জব্য সহ হইলে, দুগ্ধ ডিম প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে । কখন কখন কডলিন্ডাব অয়েল সহজে জীর্ণ হইতে দেখা যায় উদগীর্ণ পদার্থ অতীব দুর্গন্ধময় হইলে কিয়ৎ পরিমাণে অম্ল বা অম্লার বিস্কট ব্যবহার উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা । এপিগ্যাস্ট্রিক প্রদেশে বেলেডোনা বা বস্ত্রদাব্য ঐক টী ও পিয়াই ব্যবহার করিলে ক্লেশের অনেক লাঘব হইয়া থাকে

বৈদ্যকে অজীর্ণাদি উদরসম্বন্ধীয় পীড়ার চিকিৎসা । ১২১

ইহাব জন্ত ত্রৈকৈব নিম্নে সর্ফিয়াব পিচকারী ব্যবহার করিলেও উপকাৰ হয়, অথবা বেলেস্তাৰা দ্বাৰা উপবৃত্তক উত্তোলন করিয়া ক্ষতে সর্ফিয়া ছড়াইয়া দিতে পারা যায়।

বৈদ্যকে অজীর্ণাদি উদরসম্বন্ধীয় পীড়ার চিকিৎসা ।

সাধারণতঃ মল্লয্যেব শ্লেষ্মাধিক্য হইতে মন্দাগ্নি, পিত্তাধিক্য হইতে তীক্ষ্ণাগ্নি, বাতাধিক্য হইতে বিষমাগ্নি, এবং কফ পিত্ত বায়ুব সান্ধ্য হইতে সামান্যি জন্মে। জঠবাগ্নি এই চারি ভাগে বিভক্ত।

অগ্নির ত্রিংশা ।—বিষমাগ্নি বাতজ বোগসকল, তীক্ষ্ণাগ্নি পিত্তজ বোগ সমুদায় এবং মন্দাগ্নি কফজ বোগ সমুহ উৎপন্ন করে।

অগ্নিসমুদায়ের লক্ষণ ।—যে অগ্নিদ্বাৰা মল্লয্যেব যথোচিত আহারীয় দ্রব্য সম্যকরূপে পরিপাক হয়, সেই অগ্নির নাম সামান্যি। যদ্বাৰা লোকের আহারীয় দ্রব্য অল্প মাত্রায় ভোজন করিলেও সম্যক পরিপাক হয় না, সেই অগ্নিব নাম মন্দাগ্নি। যে অগ্নি দ্বাৰা মল্লয্যেব ভুক্ত বস্তু কোন দিন সম্যকরূপে পরিপাক হয়, কোন দিন বা পরিপাক হয় না, তাহার নাম বিষমাগ্নি। যে অগ্নিদ্বাৰা উচিত মাত্রা এবং অতি-বিক্ত মাত্রা অনায়াসে সম্যকরূপে পরিপাক হয়, তাহার নাম তীক্ষ্ণাগ্নি। এই চারি প্রকার অগ্নিমধ্যে সামান্যিই শ্রেষ্ঠ। এইমতে কোন কোন গ্রন্থকার ভক্ষ্মাগ্নি পাঠ করিয়া থাকেন যথা;—যে সমস্ত ব্যক্তি কটু, অম্ল ও কক্ষ্ম অন্ন ভোজন করে, তাহাদের কফ, অতিশয় ক্ষীণ এবং বায়ু অতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অতএব বাতালিঙ্গিত অগ্নি অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মল্লয্যেব শরীর নিরন্তর শোষণ করে, এবং ভুক্ত বস্তু অল্পকালমধ্যে ভক্ষ্ম করিয়া ফেনে বলিয়া ইহাব নাম ভক্ষ্মাগ্নি। ঐ ভক্ষ্মাগ্নিতে পিপাসা, কাশ,

মনোমোহ, জন্ম, দাহ চুম্বনবৎ, বেদনা, শুষ্ক-মল, মোহ, শ্রম এবং
স্বপ্ন জন্মে ।

অজীর্ণের লক্ষণ ।—কফ হইতে আমাজীর্ণ, পিত্ত হইতে বিদগ্ধা-
জীর্ণ, বায়ু হইতে বিষ্টকাজীর্ণ, মল্লয্যেব এই তিন প্রকার অজীর্ণ হইয়া
থাকে । কোন কোন গ্রন্থকার অনাবশ্যক হইতে চতুর্থ প্রকার অজীর্ণ
বলিয়া থাকেন ।, অর্থাৎ কোন কোন গ্রন্থকার অধ্যানাদি ব্যতীবেকে
অহোরাত্রে যে ভোজ্য বস্তু পরিপাক হয়, তাহাকে পঞ্চমাজীর্ণ বলিয়া
নির্দেশ করিয়া থাকেন । অপর কোন কোন গ্রন্থকার আধানাদি ব্যতি-
বেকে যে অহোরাত্রে ভোজ্য বস্তু পরিপাক হয়, তাহাকে ষষ্ঠাজীর্ণ
বলিয়া নির্দেশ করেন ।

অজীর্ণ-রোগের নিদান ।—অতিবিক্ত জল পান, বিষমাশন
অর্থাৎ কোন দিন অধিক, কোন দিন অল্প আহার, মল-মূত্রাদির বেগ
সম্বরণ, স্বপ্নবিপর্যয় অর্থাৎ দিবা নিদ্রা, বাত্ৰিজাগরণ, যথোচিত কালে
উপযুক্ত সামান্য বস্তু অল্প পরিমাণে ভোজন, এই সমস্ত কারণে মল্লয্যেব
ভুক্ত অন্ন সম্যকরূপে পরিপাক হয় না । অন্যান্য গ্রন্থকার অল্প প্রকার
কাবণও নির্দেশ করেন । যথা,—ঈর্ষা, পবনস্পত্তিতে দ্বেষ, ভয়, ক্রোধ,
কোভ, শোক, পথভ্রম এবং প্রদোষ অর্থাৎ যে বস্তু দর্শন করিলে মনের
প্রীতি হয় না, এরূপ দ্রব্য ভক্ষণ, এই সমস্ত কারণে মল্লয্যেব ভুক্ত বস্তু
পরিপাক হয় না ।

তত্ত্বান্তরোক্ত সামান্য অজীর্ণের লক্ষণ ।—শরীরের শানি,
শুকতা, বিবর্ণতা, জ্বর, উদরাধ্বান, সময়ে সময়ে দাহ, কখন কখন বা
দাহ বন্ধ, এই সমস্ত লক্ষণ হইলে তাহাকে সামান্য অজীর্ণ কহে ।

অমাজীর্ণাদির লক্ষণ ।—অমাজীর্ণে শরীরে শুষ্কতা, বিবর্ণতা
অর্থাৎ বমনোদ্বগ, কপোল ও অক্ষিপুটে শোথ এবং আহারাত্মক মল-
রাদি উদ্ভাব হয় ।

বিষ্টকাজীর্ণে রোগীর শূলবৎ বেদনা, আধান, নানা প্রকার বাত জ্বর
বেদনা, ভোদন ভেদনাদি অর্থাৎ মল ও বায়ু নিঃসরণাদি বন্ধ, উদরের
শুকতা, ইন্দির মোহ ও অঙ্গবেদনা, এই সমস্ত লক্ষণ দেখা গিয়া থাকে ।

বৈদ্যকে অজীর্ণাদি উদরসম্বন্ধীয় পীড়ার চিকিৎসা । ১২৯

বিদগ্ধাজীর্ণে ভ্রম, পিপাসা, মুচ্ছা, পিত্তজন্ম নামাশ্রকাবে বেদনা
ধূম ও অম্লোদগার ঘর্ম্ম এবং দাহ এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়

রস শেযাজীর্ণে অন্নবিদ্রব, হৃদযেব জডতা ও ভাববোধ এই সকল
লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়

অজীর্ণের গের উপক্রম — অজীর্ণরোগাক্রান্ত ব্যক্তির মুচ্ছা,
প্রলোপ, বমন, লালস্রাব, দুর্বলতা ও ভ্রম এই সমস্ত উপক্রম জন্মে,
অজীর্ণ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে মরণ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে

অতিভোজনের ফল — যে সকল ব্যক্তি লোভপবতন্ত্র হইয়া
পাশুর স্থায় অপরিমিত ভোজন করে, তাহাদিগকে সকল রোগেব কাব-
ভূত অজীর্ণ রোগ আক্রমণ করে

চিকিৎসা ।—সৈন্ধব লবণ, হরিতকী, পিঁপুল ও চিতামূল চূর্ণ ও
হিঙ্গু সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে অতিশয়
অগ্নিবৃদ্ধি হয়, ইহাব নাম “সৈন্ধবাদি চূর্ণ”

হিঙ্গুচক চূর্ণ ।—একটু, জমানী, সৈন্ধব, জীবা, কৃষ্ণজীবা ও
হিঙ্গু প্রত্যেক সমভাগে মিশ্রিত করিয়া যুতেব সহিত মিশ্রিত করিয়া
ভোজনেব প্রথম প্রাসে ভক্ষণ করিতে হয়

ভাস্কর লবণ ।—পিঁপুল, পিঁপুলীমূল, ধাত্রা, কৃষ্ণজীবা, সৈন্ধব
লবণ, বিটলবণ, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, প্রত্যেকে ২ পল, সচল
লবণ ৫ পল, মবিচ, জীবা, শুঁচ, প্রত্যেকে ১ পল, গুডত্বক ৪ তোলা,
এলাইচ ৪ তোলা করকচ লবণ ৮ পল, অম্লবেতস ২ পল, এই সকল চূর্ণ
একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে • তক্র ও কাঙ্জিকের সহিত সেবা ইহাতে
বাত-শ্লেষ্ম, বাত-গুল্ম, বাতশূল, প্লীহা ও পাণ্ডুরোগাদি নষ্ট হয়

হরিতকী ও পিঁপুল, ধাত্রুয়াদকে সিদ্ধ করিয়া সৈন্ধব লবণের
সহিত সেবন করিলে ধূম উদগার ও অজীর্ণদোষ নষ্ট হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক
করে

বাতাজীর্ণে স্কুমার মোদক — পিঁপুল, পিঁপুলীমূল, শুঁচ,
মবিচ, হরিতকী, আমলকী, চিতামূল, ভ্রম, গুলঞ্চ, কটুকী, ইহাদেব
প্রত্যেকে চূর্ণ ১ কর্ষ, দস্তী চূর্ণ ৩ কর্ষ, তেউড়ী চূর্ণ ২ পল, চিনি ৩ পল;

মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে ইহা সেবনে বাতাজীর্ণ, ষ্টিষ্ঠ, উদাবর্ত ও আমাছ বোগ নষ্ট হয় ।

- * বাতাজীর্ণে হরিতকী প্রয়োগ — হরিতকী ১২ ০ সেব, ভক্রে সিক্ত করিয়া যত্রপূর্বক বীজ সকল নির্মুক্ত করিবে পাবে পিপুল, পিপুল, পুন্ড, চিত্রা, চিতামূল, শুষ্ঠ মরিচ, পঞ্চ লবণ, যমানী, যবক্ষার, মাচীক্ষার মোহাগা হিঙ্গু লবণ প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, পুষ্কোক্ত হরিতকী সকলকে মধো পূর্ণ করিয়া, পঞ্চাৎ এই হরিতকীসকল আর্গকলেব রসে এবৎ লেবুব বসে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিবে এইকপ হরিতকী এক একটী সেবন করিবে ইহাতে সকল প্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, বিষ্ণ চৌকা ওষ্ম ও শূলাদি নানা বোগ উপশমিত হয় ।

বিষ্টভে শার্দূল কার্কি ।—পিপুল, শুষ্ঠ, দেবদাক, চিতামূল, চিত্রা, বেলশুষ্ঠ, বন যামানী হরিতকী, যমানী, ধন্যা, মরিচ, জীবা, হিঙ্গু, ইহ দেব চূর্ণ সমভাগ, চূর্ণ সমষ্টিব অষ্টাং কাঞ্জিক, কাঞ্জিকের চতুঃ পাতল, একজ পাক করিয়া জল সমস্ত নিঃশেষ হইলে নামাইয়া ষ্ণেত সর্ষপ-তেলে সন্তলন করিবে

ইহাতে শ্বাস, কাস, অতিসার, পাণ্ডু, কামলা, আমদোষ, ওষ্ম, বেদনা-যুক্ত বাত, শূল, অর্শ ও শোথ নষ্ট হয় ।

অগ্নিতুণ্ডী বটী —পাষদ, অমৃত, গন্ধক, বনযমানী, ত্রিফলা; মাচীক্ষার, যবক্ষার, চিত্র মূল, মৈত্রবলবণ, জীব সচল লবণ, বিড়ঙ্গ, কবকচ, মোহাগাব খই, প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব সমান বিষদোড়ী, সমস্ত একত্রে গেঁড়ালেবুব বসে গর্দন করিয়া মরিচের আকাবে এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে সেবনে অগ্নিমান্দ্য বোগ নষ্ট হয় ।

লবঙ্গাদি বটী —লবঙ্গ, শুষ্ঠ, মরিচ, মোহাগাব খই, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে চিত্রিত করিয়া আর্গক ও চিত্রমূলের কথো ভাবনা দিবে বটী ১১ বর্তি প্রমাণ । ইহা সেবনে প্রভূত মাংসাদি জীর্ণ হয়

অগ্নিকুমা রস ।—পূবা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, মোহাগাব খই ১ তোলা, অমৃত ৩ তোলা, কড়ি ভস্ম ৩ তোলা, শঙ্খ ভস্ম ৩ তোলা,

বৈদ্যকে অজীর্ণাদি উদরসংশ্লীষ্য পীড়ার চিকিৎসা। ১৩১

মবিচ ৮ তোলা, একত্র কবিরী পাকা গোঁড়ালেবুর বসে মর্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে।

অগ্নিকুমার সেবন কবিলে, বিস্ফটিকা, অজীর্ণ ও গ্রহণী প্রভৃতি বোগ নষ্ট হয়।

মহুশাস্ত্র বটী — পিপ্পলমূল, চিতামূল, দস্তীমূল, পারদ, গন্ধক পিপ্পল, যবক্ষার, মাচিষ্কাব, মোহাণা, পঞ্চলবণ, মবিচ, শুঁঠ, অমৃত বন-যমানি, গুণ্ডাক, হিঙ্গু, তৈতুলছাল ভস্ম ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, শঙ্খ ভস্ম ২ তোলা, এই সকল অন্নবর্গেব বসে ভাবনা দিয়া কুলখাটী ব ছায় বটিকা প্রস্তুত করিবে অন্ন মাড়িষের বস, লেবুর বস, তক্র, উষ্ণ জল ইত্যাদি অন্নপান।

ইহা সেবনে অতিশয় অগ্নি বৃদ্ধি হয় এবং অর্শ, গ্রহণী, ক্রিমি, পাণ্ডু, কামলা প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় পথ্য, — শশক ও এনাদি (হবিং) মাংসের ঝোল

বিশ্বদীপকান্ন। — অন্ন ১ পল, চণ্ডি ১ পাল, একত্র কবিরী চিতা, নিষিন্দা, ধুতুরা, বিজু, ইহাদের পত্রের রস ও আদার রস ১ পল, এবং পিপ্পলমূল, মহুশী, কদম্ব, আকন্দমূল, ইহাদের প্রত্যেকের কাথ ১ পালেব সহিত মর্দন করিয়া ২ তোলা মোহাণাব খই মিশ্রিত কবিরী ১ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

বীরভণ্ডাভ্রক। — সহস্র পুষ্পিত অন্ন ২ তোলা, ১০ দিন চিতাব রসে ভাবনা দিয়া আদার রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অন্নপান পান ও আদার কুচি। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, শ্বাণ, কাশ, শূল ও বিস্ফটিকা নষ্ট হয়।

প্লুতফারিস্ট। — মুখ্য ২৫ সেব, ২৫৬ সেব জলে সিদ্ধ কবিরী ৩৪ সেব থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে তাহস্বত শুদ্ধ ৩৭০ সেব, ধাইফুল ১৬ পল, যমানি, শুঁঠ, মরিচ, লবঙ্গ, মেথী, চিতামূল, জীবা প্রত্যেকের চূর্ণ ২ পল মিশ্রিত কবিরী এক মাস আরুত পাণ্ড্রে রাখিবে। পরে জবাংশ ছাঁকিয়া লইয়া অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, বিস্ফটিকা ও গ্রহণী বোগে এক কাঁচা পরিমাণে সেবন করাইবে।

জারেল্লিক রোগি — বায়ু, শিথ, কফ, পৌক, প্রয়, অতিশয় শোথ,

ক্রোধ, এবং অপ্রিয় জ্বর ভোজন, স্ফুটিত বর্ণ দর্শন ও হৃৎকম্প গ্রহণ এই সমস্ত কাৰণে মস্তিষ্ক অকচিৎ বেগী হয়।

বাতজনিত অরুচির লক্ষণ ।—বাতজ অকচিৎ হইলে বোগীৰ দন্ত পৰিস্ফুট অর্থাৎ জ্বর ভোজন করিলে যেমন দন্ত ছুঁয়, তদ্রূপ, ও মুখ কষায় হয়।

পিত্তজ অরুচির লক্ষণ ।—পিত্তজ অকচিৎ হইলে বোগীৰ মুখ কটু, অম্ল, উষ্ণ, বিবস ও হৃৎকম্প হয়।

কফজন্য অরুচির লক্ষণ । কফজ অবস্থাকে বোগীৰ মুখে বালবৎ, মধুবৎ, পিচ্ছিলতা, গুরুতা, শীতলতা ও গলদেশ কফাক্রান্ত, এবং কোন বস্তু ভক্ষণ করিতে পারা যায় না বলিয়া বোধ হয়, যেন কফ গমনীয় ছিদ্র বন্ধ করিয়া বহিয়াছে।

শোকান্ন জন্ম অরুচির লক্ষণ । শোক, ভয়, অতি লোভ, ও ক্রোধ এবং অপ্রিয় গন্ধ অকচিৎ হইলে বোগীৰ মুখ স্ফাভাবিক থাকে, অর্থাৎ কোন বৈলক্ষণ্য হয় না, কেবলু আহাবে কচিৎ থাকে না। ত্রিদোষজ অকচিতে বোগীৰ মুখ বাতাদিজন্মিত তিক্ত, অম্ল, অরুণ প্রভৃতি সমস্ত রসযুক্ত হয়।

অন্য লক্ষণ ।—বাতজনিত অকচিতে শূলবিন্দু বেদনাব জ্বর বক্ষঃস্থলে বেদনা হয়। পিত্তজন্য অকচিতে শরীরে বেদনা, জ্বালা ও ভূয়া হয়। কফজ অকচিতে কফ প্রাবল্য হয়। ত্রিদোষ জন্ম অকচিতে নানা প্রকার বেদনা, যত্নেব ব্যাকুলতা, মোহ, শরীরে গুরুতা এবং শোক ও ভয়াদিজন্মিত আগন্তুক অকচির সকল লক্ষণ ঘটে হয়।

চিকিৎসা ।—কড়, মচলু লবণ, জীব, চিনি, মরিচ, বিটেলবল, আমলা, এলাইচ, প্রাকার, বেণারমূল, গিপুল, বক্তচন্দন, উৎপল, লোধকাঠ, চণ্ডি, হবিতকী ব্যবহার, কাচি ডালিহমব রস, জীবা, চিনি, এই কয় প্রকার যোগে (চূর্ণ) মধু ও তৈলেব সহিত গুলিয়া মুখে দাবন করিলে বাতিক, পৈত্তিক ও মান্নিগ্নাতিক অকচিৎ নিবারণ হয়।

গুড়ক, মুগা, এলাইচ, মচলু চূর্ণ, মুগা, আমলা ও গুড়ক চূর্ণ, গুড়ক, দাক্ষরিঙ্গা ও বমনী চূর্ণ গিপুল ও চণ্ডি চূর্ণ

বৈদ্যকে অজীর্ণাদি উদরসম্বন্ধীয় পীড়ার চিকিৎসা। ১৩৩

তেঁতুল ও যমানী চূর্ণ, এই পাচ প্রকার যোগ জিহ্বায় ঘর্ষণ কবিয়ে
মুখ বিশুদ্ধ ও সকল প্রকার অকচি নির্বারণ হয়।

যমানী যাড়ব।—যামনী, তেঁতুল, শুঁঠ, অন্নবেতস দাড়িম্ব, অন্ন
ফুল, এই সকলেব প্রত্যেকের ২ তোলা, ধনু, সচল লবণ, জীবা, গুড়ত্বক,
প্রত্যেকে এক তোলা, পিপুল ১০০ টা, মবিচ ২০০ টা, চিনি ৪ পল
এই সমুদায় একত্র মর্দন কবিয়া লইবে। এই চূর্ণ মুখে ধারণ করিয়া
ক্রমে ক্রমে গলাধঃকরণ কবা কর্তব্য ইহাতে জিহ্বা শুদ্ধি, অন্ন কচি
ও কাশাদি বোগ নষ্ট হয়।

কলহংস —সজিনাবীজ ১৮ ট, পিপুল ২০ টা, আদা ১ পল,
গুড় ১ পল, কাজি ৮ সেব, বিটলবণ ১ পল, এই সমুদায় দণ্ড দ্বারা
উত্তমবপে মর্দন কবিয়া তাহার সহিত চাতুর্জাত চূর্ণ (গুড়ত্বক, তেজপত্র,
এলাইচ, নাগেশ্বর) ১ পল মিশ্রিত করিবে এই ঔষধ সেবনে কঠোর স্বর
অতি উৎকৃষ্ট হয়, এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

রসালি —অন্নদধি ৮ সেব, চিনি ২ সেব, ঘৃত ১ পল, মধু ১ পল,
মবিচচূর্ণ ৪ তোলা, শুঁঠচূর্ণ ৪ তোলা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, নাগেশ্বর, এলাইচ,
প্রত্যেক ১ তোলা কোন সুন্দরী বমনী কোমল হস্তে সমুদায় একত্র
প্রমর্দিত ও কপূর্বাদি দ্বারা সুবাসিত করিয়া ভাণ্ডে স্থাপন কবিয়েন
ইহার নাম “রসালি” ইহা শুষ্টিকর, রুচ্য, বদ্বাদ, শ্লিষ্ণ ও কচিকর

রসকেশরী।—পাবন ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, লবঙ্গ ৫ তোলা,
অন্ন ২ মাসা, এই সমস্ত দস্তীয কাথে মর্দন কবিয়া মাসকলাই প্রমাণ
এক একটা বটী প্রস্তুত কবিয়ে। শুঁঠ বা গুড়ের সহিত সেবন করিলে
সকল প্রকার অকচি, আমবাত, বিহঁচিকা, অগ্নিমান্দ্য ও ভুক্তদেষ বোগ
প্রশমিত হয়।

অন্নপিত্ত রোগের কারণ।—বিকল্প অর্থাৎ সংযোগ, দেশ,
কাল ও মাত্রাদির বিপরীত দূষিত অন্ন ও বিদগ্ধপাক দ্রব্য ভোজনে এবং
পিত্তপ্রকোপী পানীয় অর্থাৎ তক্র সুরা প্রভৃতি ও অন্ন অর্থাৎ আশুধান্ন,
মাসকলাই প্রভৃতি ভোজনে পিত্ত দূষিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অন্নপিত্ত
রোগ উৎপাদন করে।

অন্নপিত্তের আকার — ভুক্ত বস্তুব অপাক, বিনা পবিশমে
অমবোধ, বমনোদ্বোগ, তিক্ত ও অম্লোদাব, শরীরেব শুষ্কতা, কঠ ও বুক
জ্বালা, অকচি, যে বোগে এই সকল লক্ষণ থাকে, তাহাকে অন্নপিও বলে

অধোগ অন্নপিত্তের লক্ষণ — উর্দ্ধাধোগতিভেদে অন্নপিত্ত দুই
প্রকার, তন্মধ্যে অধোগামী অন্নপিত্তের বিষয় বলা যাইতেছে অধোগ
অন্নপিত্তে পিত্তা নরীব জ্বালা, মূর্ছ, ওম, মোহ তথাৎ বিপবিত
জ্ঞান, নানা বর্ণ মল নির্গমন, বমনোদ্বোগ, শরীরে কোষ্ঠ অর্থাৎ শ্রাব বা
বক্তবর্ণ দাগ, অগ্নিমান্দ্য, রোমহর্ষ অর্থাৎ বোমাঞ্চ, ধর্ম ও শবীর পীত-
বর্ণ হইয়া থাকে *

* চিকিৎসা — ত্রিকটু, ত্রিফলা, কুমাজীবা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলা-
ইচ, নাগেশ্বর, মুখা, জয়জী, জায়ফল, ধত্বা, লবঙ্গ, শতমূলী, মাল্লুকী, ময়না
ফল, যমানী, বনজমানী, ধাইফুল, শতমূলী, তামমূলী, লৌধ, গজপিপ্পলী,
পিয়ালবীজ, গুলঞ্চ, কপূর্ব চন্দন, বক্তচন্দন, প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, শুষ্ঠী
চূর্ণ ৪ সেব, যত ১ সেব, দুগ্ধ ৮ মের, চিনি ৫ সেব । দুগ্ধ ও উপযুক্ত জলেব
সহিত চিনি একত্র পাক করিয়া যখন পাক শেষ হইয়া আসিবে, তাহাব
কিঞ্চিৎ পূর্বে দ্বত দিয় তাহাব পর মসলাব গুঁড়া দিয়া নাড়িতে নাড়িতে
নামাইবে অল্পপান দুগ্ধ বা জল পরিমাণ ৪ মাসা বা অর্ধ তোলা
ইহাব নাম “মৌভাগ্যশুষ্ঠী ”

উর্দ্ধগ অন্নপিত্তের লক্ষণ — উর্দ্ধগ অন্নপিত্তে বমন হয এবং
বমিত বস্তু মীল, পীত, হরিত অর্থাৎ স্ফুজ, কৃষ্ণ, ঈষৎ বক্তবর্ণ অথবা
সম্পূর্ণ রক্তবর্ণ, অন্নবসযুক্ত, মাংসসুদৌত জল সদৃশ পিচ্ছিল ও নির্মল
হয । লেখার বর্ষি হইয়া কটু অর্থাৎ কাল, অন্ন, তিক্ত, লবণ প্রভৃতি
বস্তু জীর্ণ না হইলে বমিতে ঐ সমস্ত বস্তু পতিত হয় ; তিত্ত অন্নবস-
যুক্ত বস্তু ভোজন না করিলেও কখন কখন ঐ সকল রসযুক্ত বমি হয়,
উদাবেও তিক্ত, অম্ল, কটু প্রভৃতি গন্ধ লক্ষিত হইয়া থাকে গম্বা,
বক্সুল, পার্শ্বদ্বয় ও হস্ত-পাদাদি জ্বালা, মাথাব্যথা, অকচি এবং পিত্ত-
শ্লেষ্মজ্বর হয় ও গাত্রে কণ্ডু অর্থাৎ চুলকণা, শীড়কী অর্থাৎ ফস্কুড়ী ও

বৈদ্যকে 'অজীর্ণ'দি উদরমন্ডীয় পীড়ার চিকিৎসা । ১৩৫

চিকিৎসা ।—ত্রিকটু, ত্রিফল, মুখা, বিটলবর্ণ, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, তেজপত্র, প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, লবঙ্গ চূর্ণ ১১ তোলা, তেউড়ীমূল ৪৪ তোলা, চিনি ৩৬ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে ইহা সেবন করিলে অগ্নিও, মলমূত্রবোধ ও অধিমান্দ্য প্রভৃতি অনেক বোগেব উপশম হয় ইহাব নাম "অবিপাকিক চূর্ণ"।

বৃহৎ পিণ্ডলী খণ্ড ।—পিণ্ডলী চূর্ণ ৩ সেব, ঘৃত ১ সের, চিনি ২ সের, শতমূলীর রস ১ সেব, আমলকীর রস ২ সেব, ছঞ্চ ৮ সের, এই সমুদায় যথাবিধি পাক করিবে প্রক্ষেপার্থ—গুড়ক, তেজপত্র, এলাইচ, হবিডকী, কুম্ভজীবা, ধনিয়া, মুখা, বংশলোচন, আমলকী, প্রত্যেকে ২ তোলা ; জীবা, কুড়, গুঁঠ, নাগেশ্বর, প্রত্যেক ১ তোলা পাকসমাপ্তিব পব নীতল হইলে জায়ফল চূর্ণ, মবিচ চূর্ণ ও মধু, প্রত্যেক ৩ পল পবি-মাণে মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে অগ্নিপিত্ত, হস্তাস, অকচি ও বমি প্রভৃতির উপকার করিয়া অগ্নিবৃদ্ধি করে।

শতাবরী ঘৃত ।—ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ শতমূলী ১ সের, জল ৪ সেব, ছঞ্চ ১৬ সেব, যদু অগ্নিতে পাক করিবে এই ঘৃত সেবন করিলে অগ্নিপিত্ত, বাতপিত্তোৎপন্ন নানা রোগ, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, মুচ্ছা, শ্বাস ও সন্তাপ নিবারণ হয়।

অগ্নিপিত্তের দাধ্য লক্ষণ ।—অপাখ্যাকাবী ব্যক্তির অগ্নিপিত্ত কোণে অল্প দিনেব হইলে বহুদৈ অর্থাৎ সূচিকিৎসাপ্রভাবে প্রশমিত হইয়া থাকে।

অগ্নিপিত্তের যাপ্য লক্ষণ ।—অগ্নিপিত্ত বোগ উৎপন্ন যাজে সূচিকিৎসা না হইলে বোগেব শান্তি না হইয়া বহু বৃদ্ধি পাইতেই থাকে; এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে বিশেষ যত্ন করিলেও ক্রমশঃ মূলীভূত কারণ নিঃশেষিত হয় না বলিয়া বোগেব প্রতিকার হয় না, কেবল কিছু কম পড়িয়া থাকে। পবন্ত অগ্নিপিত্ত বোগ বেগী দিনেব হইলেও সূচিকিৎসার শুণে কোন কোন ব্যক্তির উহা প্রশমিত হইতে দেখা যায়।

দোষভেদে অগ্নিপিত্তের লক্ষণ ।—অগ্নিপিত্তবিষয়ে চিকিৎসকে প্রতি উপদেশ,—চিকিৎসক দোষের অর্থাৎ বায়ু ও কফের লক্ষণ ধা?

বায়ুযুক্ত, কফযুক্ত ও বাতকফযুক্ত অগ্নিপিত্তের বমন ও বিবেচন লক্ষণে .
অভিসার ও ছর্দি অর্থাৎ বমন বোগ বলিয়া চিকিৎসকেব ত্রাণ্ডি জ্ঞানিতে
পাবে

বাতযুক্ত অগ্নিপিত্তের লক্ষণ ।—বায়ুযুক্ত অগ্নিপিত্তে শরীর কম্পন,
প্রলাপ ভাষাৎ ভুল কথা বলা, মুচ্ছা অর্থাৎ শরীর ঝিনুঝিনি, শরীরেব
তরলরত, অন্ধকব দর্শন, শরীর বেদনা, জ্বাতি, মোহ অর্থাৎ নিপনীত
জ্ঞান ও বোধ, হর্ষ এই সমস্ত লক্ষণ হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—লৌহ, তাম্র, অত্র, প্রত্যেক ১ পল, পাৰা ২ তোলা,
গন্ধক ৪ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, মনছাল ২ তোলা, শিলাজতু
৩ তোলা, গুগ্‌গুল ২ তোলা, বিড়ঙ্গ, ভেলা, চিতামূল, শ্বেত আকন্দের
মূল, হস্তিকর্ণ ঈলাশের মূলের ছাল, তালমূল, পুনর্বা, মুখা, গুলঞ্চ,
গোবক্ষ চাকুলে, চাকুলে বাজ, মুণ্ডিবী, ভীমবাজ, কেশুবিয়া, শতমূলী,
ধিকড়ক, ত্রিফলা, ত্রিকটু, প্রত্যেক ৪ মাসা । এই সমস্ত দ্রব্য গধু ও
হুতেব সহিত মাড়িয়া হুতভাণ্ডে বাশিবে মাত্রা ৩ মাসা হইতে আরম্ভ
কবিবে । ইহা সেবন করিলে অগ্নিপিত্ত ও শূলদি নানা বোগ নষ্ট হয় ।

অগ্নিপিত্তাত্তক লৌহ ।—বসাসিদ্ধব, তাম্র, লৌহ, প্রত্যেক ১
ভাগ, হবিতকী চূর্ণ ৩ ভাগ । এই সমস্ত মর্দন করিয়া ১ মাসা প্রমাণ
বটীকা করিবে অল্পপান মধু । ইহা সেবন করিলে অগ্নিপিত্ত রোগ
প্রশমিত হয়

কফযুক্ত অগ্নিপিত্তের লক্ষণ ।—কফযুক্ত অগ্নিপিত্তে মুখ হইতে
কফপ্রাব, বমন, শরীরেব গুরুতা, জড়তা ও অবসন্নতা, শীত, অগ্নিমান্দ্য,
শৈথিল্য বা মুখেব লিপ্ততা, দুর্বলতা, শরীরে কণ্ডু এই ১২ নিদ্রা হইয়া থাকে

চিকিৎসা ।—বাসকছাল, গুলঞ্চ, কেশুরিয়া, ক্ষেতপাপড়া, নিম-
ছাল, ভুজবাজ, মুখা, শ্বেত পুনর্বা, বৃহতী, বেড়েলা, শতমূলী, ইহাদের
প্রত্যেকেব ১ পল পবিমিত রসে মর্দিত করিয়া সহস্র পুটীত অত্র শত-
মূলীর রসে ১২ বার ভাবনা দিয়া ৪ রতি পবিমাণ বটীকা প্রস্তুত কবিবে ।
ইহা সেবন করিলে অগ্নিপিত্ত ও শূল প্রভৃতি নানা বোগ প্রশমিত হয়
ইহাব নাম "ভাস্করায়ুতাজ" ।

বৈদ্যকে অজীর্ণাদি উদরমন্ডলীয় পীড়ার চিকিৎসা । ১৩৭

বাত-কফযুক্ত অগ্নিপিত্তের লক্ষণ — বায়ু ও কফযুক্ত অগ্নি-
পিত্তে পূর্বোক্ত বায়ুযুক্ত অগ্নিপিত্তের শবীর কম্পান ও মুচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ
এবং কফযুক্ত অগ্নিপিত্তের কফস্রাব ও বমন প্রভৃতি লক্ষণ হইয়া থাকে ।

লীলানরম — পাণা, গন্ধক, লৌহ এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে
লইয়া আমলকী ও বহেডাব বসে তিন দিন মর্দন করতঃ ২ বতি প্রমাণ
বটী প্রস্তুত করবে অন্নপান—দুগ্ধ, কুমড়াব জল ও আমলকীর বস,
অথবা চিনিব সহিত সেবনীয় ইহা সেবন করিলে অগ্নিপিত্ত, শূল, বমি
ও ক্ষুধাহীনতা (বুক জ্বালা) প্রভৃতি নিবারণ হইয়া থাকে

শ্লেষ্মযুক্ত অগ্নিপিত্তের লক্ষণ ।—শ্লেষ্মপিত্তে তিক্ত, অম্ল, কটু
অর্থাৎ ঝাল উদ্ভাবক, বুক, পেট ও গলাজ্বালা, অম, মুচ্ছা, অকচি, বমি,
অলসতা, মস্তক বেদনা, মুখ হইতে কফস্রাব ও মুখের যথুবতা হয় ।

চিকিৎসা ।—শুঠ ৮ পল, পিঁপুল ৮ পল, সুপারি চূর্ণ ৮ পল,
মুত ৪ সেব, দুগ্ধ ৪ সেব ; এই সমুদায় যথানিয়মে পাক করিবে প্রক্ষেপ-
পার্থ লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুড়, যমানী, কৃষ্ণজীরা, বচ, বওচন্দন, যষ্টিমধু,
রাশ্মা, দেবদারু, ত্রিফলা, তেজপত্র, এলাইচ, গুড়হরক, লৌহ, সৈন্ধব,
হবুস, শঠি, মদনফল, কটফল, জটামাংসী, অজ বঙ্গ, রূপা, তালীশপত্র,
পদ্মকাক্ষ, মুর্ঝা, ববাক্রান্তা, বংশলোচন, পিঁপুলমূল, গুলফা, শতমূলী,
শীত ঝাটীমূল, জায়ফল, জয়ত্রী, কঁাকলা, মুখা, পিঁপুল, কম্পূর্ব, বিড়ঙ্গ,
বনযমানী, বেলোড়া, গুলঞ্চ, আপাঙ্গবীজ, গোক্ষুব বীজ, চন্দন, দেবতাড়,
লৌহ, কাঁশা, প্রত্যেক ২ তোলা, অর্ণভস্ম ১ তোলা, ইহা সেবন করিলে
অগ্নিপিত্ত, মুচ্ছা, দাহ ও বমন প্রভৃতি নিবারণ হয় ।

শূল রোগ ।—শূল রোগ আট প্রকার, যথা ;—বায়ুজনিত, পিত্ত-
জনিত, কফজনিত, বাতপিত্তজনিত, বাতশ্লেষ্মজনিত, পিত্তশ্লেষ্মজনিত,
ত্রিদোষজনিত এবং আমজনিত এই সমস্ত শূলেই বায়ু আধিক্য
থাকে ।

বাতজনিত শূলের কারণ ও লক্ষণ ।—বায়ুয়োগ, হস্তী ও
অশ্বাদিতে আরোহণ, অতিশয় স্ত্রী-সংসর্গ, রাত্রিজাগরণ, অমিক পবি-
মাণে শীতল জল পান, কলাই, মুগা, অবহর ও কোবদূষ ভক্ষণে, অজীর্ণে

ভোজন, অভিযান, অগ্নিবিত দাত্তেব অন্ন ভক্ষণে, অতিবিত্ত কমায জনা, বিকল্প জব্য অর্থাৎ দুগ্ধে মৎসে মিত্ত নবৎ সংযোগবিকল্প, শুক মাংস ও শুক শাক ভক্ষণে, মল, মুত্র, শুক্র ও বায়ু বোগ বোধ কবিনো, শোক, উপবাস, উচ্চহাসী ও উচ্চ ভাষণ, এই সকল কাৰণে বয়ু দূষিত হইয়া হৃদয়, পিণ্ড, পৃষ্ঠ ও মেরুদণ্ডের নীচে এবং বস্তিস্থানে অর্থাৎ মূত্রাশয়ে বেদন জন্মায় এই বেদনা আহান জীর্ণে, মধ্যাকালে, বর্ষাকালে, মেঘোদয়ে এবং শীতল জব্যে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়

মুষ্টিযোগ —নাব পক্ষীর মাংস ও গুল্ম কলায একত্রে উভয়েব কথ প্রস্তুত কবিয়া তাহাব সহিত কিঞ্চিৎ ঘৃত, মৈন্ধব লবণ, ত্রিকটু, ছিং, মচল লবণ ও দাড়িম্ব ফলেব বস মিত্ত কবিয়া সেবন কবিলে শীত বাতশূল নিবৃত্তি হয়।

বেড়েলা, পুনর্গবা, এবওমূল, বৃহতী, কটেকারী, গোক্ষুর, মিলিত ২ তোলা পাকার্থ জল অর্ধ সেব, শেষ ৮০ পোরা প্রক্ষেপ ছিঙ্গ ২ রতি, মৈন্ধব লবণ ২ মাগা ইহ পান কবিলে বাতশূলজন্য বেদনাব নিবৃত্তি হয়

যমানী, ছিং মৈন্ধব লবণ, যবক্ষাব, মচল লবণ, হরিতকী, এই সকলেব চূর্ণ স্ববামণ্ডেব সহিত সেবন কবিলে বাতশূল নিবারণ হয়

নারিকেলান্নত ।—শিলাপিষ্ট বজ্রনিষীড়িত মূপক ন নিকেল শস্ত্র ২ মের, মস্তলন থ ১৩ ৪ মের, পাকার্থ কোমল নারিকেল জল ৩২ মের, গাবা দুগ্ধ ৩২ মের, আমলকীব বস ৪ মের, চিনি ১২ ০ মের, শুঁচ চূর্ণ ২ মের, এই সমুদয় একত্র পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, গুড়ধক, তেজপত্র, এল ইচ, নাগেশ্বব প্রত্যেক ১ পল, আমলকী, জীব, কুমজীব, ধনিয়া, গোটেল, বংশলোচন, মুগা প্রত্যেক ৬ তোলা। শীতল হইলে মধু ০ মের মিশাইয়া লইবে মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্যন্ত অল্পপান দুগ্ধ সুগেব মুগ ও ভুড়ি এই ঔষধ সেবন কবিলে নানা প্রকার শূল ও অগ্নি পিত্তাদি বোগ নষ্ট হইয়া বল বীৰ্য্য বৃদ্ধি হয়

হরিতকী থণ্ড ।—ত্রিফলা মুগা, গুড়ধক, তেজপত্র, এল ইচ, নাগেশ্বব, যমানী, ত্রিকটু, ধনিয়া, মৌবী, শুলফ, লুবঙ্গ, প্রত্যেক ২ তোলা,

বৈদ্যকে অজীর্ণাদি উদরসম্বন্ধীয় পীড়ার চিকিৎসা । ১৩৯

তেউড়ী ও সোণামুখী প্রত্যেক ২ পল, হবিতকী চূর্ণ ৮ পল, চিনি ৩২ পল, যথাবিধি পাক করিবে মাত্রা ৭ তোলা অন্ত্রপান উষ্ণ দুগ্ধ ইহা সেবন করিলে অগ্নিপিত্ত, শূল ও অর্শ প্রভৃতি অনেক পীড়ার শাস্তি হয় ।

পিত্তজনিত শূলের লক্ষণ —কাব দ্রব্য, তীক্ষ্ণবীৰ্য্য ও উষ্ণ বীৰ্য্য দ্রব্য, বিদগ্ধ পাক দ্রব্য, তৈল, শিষ, মর্ষপ, কল্ক, কুলথ কলায়ের যুস, ঝালদ্রব্য, অন্নদ্রব্য, সুবানির্মিত দ্রব্য ভোজন, এবং ক্রোধ, অগ্নি-সন্তাপ, পবিত্রম, সূর্য্যকিবণ, অতিশয় স্ত্রী-সংসর্গ, এই সকল কাবনে ও দোষবলে হিতকাবী দ্রব্যেব বিদগ্ধ পাক হইলে, পিত্ত দূষিত হইয়া অতি শীত্র নাভিপ্রদেশে বেদনা জন্মায় । ইহাতে পিপাসা, জ্বালা, কর্তনবৎ বেদনা, ঘর্ম্ম, মুচ্ছা, প্রভৃতি হইয়া থাকে, এবং মধ্যাহ্ন সময়ে, অন্ধীবাতে, ভুক্ত দ্রব্যেব বিদগ্ধ পাক সময়ে, শবৎকালে এবং শীতকালে বেদনা বৃদ্ধি হয় । সুস্বাদু শীতল দ্রব্য ভোজনে এবং হিমে বেদনা শাস্তি হয় ।

চিকিৎসা —দুগ্ধ, জল বা ইক্ষুবসেব সহিত এবং পটোলপত্র ও নিমছালের অর্ধসিদ্ধ কাথেব সহিত মদনফল সেবন করাইয়া বমন করাইবে পৈতিক শূলে শীতল জলে অবগাহন, বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চার যুক্ত পুলিনদেশে অবস্থান ও জলপূর্ণ কাৎসপাত্র উদবে স্পর্শ কব উপকারী

আমলকী বা ভূমিকুস্মাণ্ডেব রস, বালা ডুম্বু ও দ্রাক্ষাব কাথেব সহিত চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে পিত্তশূল নিবারণ হয় ।

শর্করা লৌহ ।—শতমূলীব রস ৪ সেব, গোমূত্র ৪ সেব, ছাগদুগ্ধ ৪ সেব, আমলকী রস ৪ সেব, মণ্ডুব ৮ পল, চিনি ১৬ পল, ঘৃত ৪ পল । এই মফল একত্র পাক করিবে পাক সম্পন্ন, ঘনীভূত ও শীতল হইলে বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, যমানী, গজপিপ্পলী, জীর্ণ, কৃষ্ণজীবা, মুখা, লৌহ, অভ্র প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিয়া লইবে এই ঔষধ আহাবেব পূর্বে অগ্নিবল বিবেচনা করিয় সেবন করাইবে । ইহ তে সকল প্রকার শূল—বিশেষতঃ পিত্তশূল নিবারিত হয়

খণ্ডামলখী — কুশ্মাণ্ড শস্য ৪ ৫০ পল, সন্তলনার্থ যুত ২ সেব, চিনি ৫০ পল, আমলকীর রস ৪ সেব কুশ্মাণ্ডরস ৪ সেব । প্রক্ষেপার্থ পিপ্পল, জীরা শুঁঠ প্রত্যেকেব চূর্ণ ২ পল, মরিচচূর্ণ ১ পল, তালিষ পত্র, যক্ষা, গুড়ুড়ক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, মুখা প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা

পাকের নিয়ম — প্রথমে কুশ্মাণ্ড যুতে ভাজিয়া লইবে । আমলকীর বস, কুশ্মাণ্ডেব বস ও চিনি মিশ্রিত কবিয়া ছাকিয়া লইবে । এই রসে কুশ্মাণ্ডাদিয়া যথাবিধি পাক করিবে । শীতল হইলে মধু ১ সেব মিশ্রিত কবিয়া লইবে । ইহা সেবন কবিলে পরিণাম শূল, বক্তপিত্ত, অগ্নিপিত্ত, প্রভৃতি অনেক রোগ আবোধ্য হয় ।

কফজন্য শূলের লক্ষণ — জলাভূমিজাত কক্ষপ প্রভৃতিব মাংস, জলজাত শস্যক প্রভৃতিব মাংস, তক্র কার্কিকা দুগ্ধজনিত দ্রব্য, ছাগাদিব মাংস, ইক্ষু, পিষ্টক প্রভৃতি কফজনক দ্রব্য ভোজনে লেখা রুজি পাইয়া আশাশযেব বেদনা উৎপাদন কবে ও বমনোদ্বগ, কাশ, দুর্বলতা, অকচি, লালাত্মাব, আশাশযেব শুক্লতা, মল্লক ভাব হইয়া থাকে ভোজন করিলে সর্বদাই বেদনা অধিক হয়, এবং সূর্য্যোদয়ে, শিশিরকালে ও বসন্তকালে বেদনা অধিক হইয়া থাকে

চিকিৎসা ।—বিষমূল, এবণ্ডমূল, চিতামূল, শুঁঠ, এই সকলের কাথে ছিঙ্গু ও সৈন্ধবসংযুক্ত কবিয়া সেবন কবিলে কফশূল নিবৃত্তি পায় ।

সৈন্ধব, সচল, বিট পিপ্পল পিপ্পলমূল, চত্রি, চিতামূল, শুঁঠ, ছিঙ্গু এই সমুদায়েব চূর্ণ সমভাগে গবয় জলের সহিত সেবন কবিলে উপকার দর্শে ।

খালীলোহ ।—আমলকীচূর্ণ ৮ পল, লৌহচূর্ণ ৪ পল, যষ্টিমধু চূর্ণ ২ পল, এই সমুদায় একত্র করিয়া গুলঞ্চের কাথে ভাবনা দিবে । (ভাবনার্থ—গুলঞ্চ ১৬ পল, পাকৈব জল ১১২ পল, শেষ ১৪ পল) এই কাথে ৭ দিন ভাবনা দিবে । পাবে প্রথমে বৌদ্ধে শুষ্ক ও গুনস্বার মর্দন করিয়া নূতন যুৎপাতে রাখিবে । যুত ও মধুব সহিত আহাবেব পূর্বে, মধ্যে ও অন্তে ৬ মাসা মাত্রায় সেবন কবাইবে

* কুশ্মাণ্ডশস্যকে উত্তমরূপে বজ্রদ্বারা নিপীড়ন কবতঃ সিলে বাটিয়া লটাত্ত চটাব

বৈদ্যকে অজীর্ণাদি উদরগম্যকীয় পীড়ার চিকিৎসা । ১৪১

ত্রিদোষজনিত শূলের লক্ষণ ।—পূর্কোক্ত বায়ু, পিত্ত এবং কফ-জন্য শূলের যে সমস্ত লক্ষণ জন্মিয়া থাকে, ইহাতেও সেই সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় এই ত্রিদোষজন্য শূল বড় কষ্টজনক এবং অসাধ্য .

চিকিৎসা ।—শুদ্ধ মণ্ডুব ৯ পল, গোমূত্র ১৮ পল, গুড় ৯ পল, পাকযোগ্য জল দিয়া পাক করিবে । প্রক্ষেপার্থ—বিড়ঙ্গ, চিতামূল, ত্রিফল, ত্রিকটু প্রত্যেকে ১ পল । যুহু অগ্নিতে অল্পে অল্পে পাক করিয়া পিণ্ডীভূত হইলে নিক্ত ভাণ্ডে রাখিবে মাত্রা ১ তোলা, ভোজনের পূর্বে, মধ্যে ও অন্তে সেবনীয়

চতুঃসমলৌহ ।—অত্র, গন্ধক, পাৰা, লৌহ, প্রত্যেকে ১ পল । এই সকল দ্রব্য ১২ পল যুত ও ১২ পল ছক্ষে একত্র পাক করিয়া পশ্চাত্তি থিত দ্রব্যের স্বক্ষ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে, যথা ;—বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, চিতামূল, ত্রিকটু, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল যথাবিধি পাক করিয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিবে মাত্রা ১ মাসা হইতে আবৃত্ত করিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিবে । অল্পপান দুগ্ধ ও নারিকেল জল ।

পথ্য ।—শালি তণ্ডুলেব অন্ন, মুগেব ঝোল ও মাংস প্রভৃতি

আমজন্য শূলের লক্ষণ ।—বমনোদ্বেগ, উদরে, গুড়গুড়া শব্দ, বমন, শবীবেব গুরুতা, সিক্ত বস্ত্রে আবৃত গাত্রেব ন্যায় শবীরেব আচ্ছাদা, মলমূত্র বোধ, কফপ্রাব ও কফজনিত শূলেব সমস্ত লক্ষণ আবির্ভূত হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—শুষ্ঠচূর্ণ ১০ সেব, চিনি ২ সেব, যুত ১ সেব, দুগ্ধ ৮ সেব, যথাবিধানে পাক করিবে প্রক্ষেপার্থ—আমলকী, ধন্থা, মুখা, জীরা, পিপ্পল, বংশলোচন, গুড়গন্ধক, তেজপত্র, এলাইচ, কৃষ্ণজীবা, হরিতকী, প্রত্যেকে ১০ তোলা, মবিচ, নাগেশ্বর প্রত্যেকে ৬ মাসা শীতল হইলে মধু তিন পল মিশ্রিত করিবে অন্নপিত্ত শূল, হৃদ্রোগ, বমন ও আমবাত প্রভৃতি বোগে যথাযোগ্য মাত্রায় ব্যবহার করিবে ইহার নাম “শুষ্ঠীথণ্ড ।”

নারিকেল খণ্ড ।—সুপক নারিকেল শস্য শিঙায় পোষণ ও বস্ত্র-

দ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার ৪ পল অর্ধপোষ দ্বিতে দ্বয় ২ ভাগিয়া লইবে, পরে ৪সেব নানিকেল জলে ০ সেব চিনি গুলিয়া ঢাকিয়া লইবে, এই জলে নানিকেল শাস্ত্র দিয়া পাক করিবে পাক মিষ্ট হইলে নামাইয়া ধুয়া, পিপুল, মুখা, বংশলোচন, জীবা, কৃষ্ণজীবা, প্রত্যেকে ০ তোলা, গুড়ধক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, প্রত্যেকে ১ চূর্ণ ১ মাসা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবনে অগ্নিপিত্ত, অকচি, ক্ষয়বেগ, বস্তৃপিত্ত, শূল ও বমন নিবৃত্ত হয় ।

দ্বিদোষজন্য শূলের লক্ষণ । বাতশ্লেষজন্য শূলে হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা জন্মে। পিণ্ডশ্লেষজন্য শূলে পেট, হৃদয় ও নাভিতে বেদনা হয় বাতপিণ্ডজন্য শূলে পেটে জ্বালা ও জ্বর হইয়া থাকে

বাতশ্লেষ শূলে ।—যষ্টিমধু, ত্রিফলা প্রত্যেকে ১ ভাগ, লৌহচূর্ণ ৪ ভাগ, এই সমুদায় উপযুক্ত পবিমাণে ঘৃত ও মধু সহিত মর্দন করিয়া লইবে অম্লপান গব্যাস্ত্র মাজা নত মটবেব ন্যায় ইহার নাম “সত্তায়ুত লৌহ ”

বাতপিত্ত শূলে ।—আমলকীখণ্ড, পূর্বে লিখিত হইয়াছে ।

পিত্তশ্লেষ শূলে —অপারিতুর্ণ ২ সেব, লক্ষ ১৬ সেব, চিনি ১২ ০ সেব । এই সমুদায় একত্র পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে গুড়ধক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, ত্রিকটু, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, জটামাংগী, তালিশপত্র, পদ্মাবীজ, নীলগুঁড়ী বংশলোচন, পানিফল, জীবা, ভূমিকুসুম, গোক্ষুব, শতমূলী, মালতীফল, আমলকী, প্রত্যেকে ২ তোলা, কপূর ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া, যথাবিধি পাক সম্পাদনাতে স্নিগ্ধ ভাবে স্থাপন করিবে প্রত্যহ পাতে অর্দ্ধ তোলা পবিমাণে সেবন করিতে হইবে অম্লপান জগ ইহার নাম “অপারিতুর্ণ ”

শূলরোগের সাধ্য, অসাধ্য ও কঠিনসাধ্য লক্ষণ, —এক দোষজন্য শূল সাধ্য, দ্বিদোষজন্য শূল কঠিনসাধ্য, এবং যে শূল ত্রিদোষ-জনিত ও উপদ্রবযুক্ত হইয়া বেগীকে ক্রোধ প্রদান করে, সেই শূলরোগ অসাধ্য অর্থাৎ চিকিৎসা দ্বারা তাহার শান্তি হয় না

পরিণাম শূলের কারণ, উৎপত্তি ও লক্ষণ ।—পূর্বোক্ত

বৈদ্যকে অজীর্ণাদি উদবসম্বন্ধীয় পীড়ার চিকিৎসা ১৪৩

কাবণে বায়ু দূষিত হইয়া কফ ও পিত্তাশয়ে প্রবেশ করিলে কফ ও পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া বেদন জন্মায় যে বোগে ভুক্তজব্য পাক পাইবার সময় উদরে বেদনা হয়, তাহাকে পবিণাম শূল বলে

বাতজন্য পরিণাম শূলের লক্ষণ —এই বোগে উদবাধান, পেটে গুড়-গুড় শব্দ, মলমূত্র বোধ ও কম্পন হয়, স্নিগ্ধ ও উষ্ণজব্যে বেদনার লাঘব হয়

পিত্তজন্য পরিণাম শূলের লক্ষণ —পিপাসা, জ্বাল, মনেব অবসন্নতা ও ঘর্ষ হয় এবং কটু (খাল), অম্ল ও লবণ সেবনে বেদনা বৃদ্ধি হইয়া থাকে শীতল জব্যে বেদনার নিবৃত্তি হয়

কফজন্য পবিণাম শূলের লক্ষণ বমন কিম্বা বমনোদ্বেগ, মোহ ও অঙ্গ বেদনা, কটু ও তিত্ত জব্যে বেদনার লাঘব হইয়া থাকে, অপিত্ত উক্তবিধ জব্য সেবনে লাঘব হইলেও সেই বেদনা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইয়া থাকে

মিলিত দোষ জন্য পরিণাম শূলের লক্ষণ —বায়ুপিত্তজাত পবিণাম শূলে পূর্বেবক্ত বায়ু ও পিত্তজনিত পবিণাম শূলের লক্ষণ সকল আবির্ভূত হয় এইরূপ বাতশ্লেষ্মজন্য শূলে বায়ু ও কফের লক্ষণ, পিত্তশ্লেষ্মাজনিত শূলে পিত্ত ও কফের লক্ষণ, এবং ত্রিদোষজনিত পবিণাম শূলে বায়ু পিত্ত ও কফ জন্ত শূলের লক্ষণ সমুদায় প্রকাশ পায়।

কৃশ, দুর্বল বা বলহীন ব্যক্তির সান্নিপাতিক (ত্রিদোষজনিত) শূল জন্মিলে অসাধ্য হয়

চিকিৎসা। —উপবোক্ত বোগ সমূহে কোন্ কোন্ প্রকার জব্যে কোন্ কোন্ দোষ জন্ত বোগেব শাস্য হয় লিখিত হইয়াছে, এজন্ত দোষবিশেষে ঔষধ পৃথক লিখিত না হইয়া একত্র সাধাবণ ঔষধ লিখিত হইতেছে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বিবেচনা দ্বারা ঔষধনির্বাচন করিবেন

শমুকাদি গুড়িকা —শমুক ভস্ম ১ তোলা, ত্রিকটু ১ তোলা, পঞ্চ লবণ মিলিত ১ তোলা, এই সমুদায় কণ্টীশাকের বসে মর্দন করিয়া ১ মাসা প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে এক একটী বটী প্রাতে অথবা আহারের পূর্বে উষ্ণ জলেব সহিত সেবন করিতে দিবে।

শঙ্খারস গুড়িকা ।—তেঁতুলছাল ভস্ম ৫ পল, পঞ্চলবণ প্রত্যেকে ১ পল, শাণ্ডভস্ম ১২ পল, জাম্বীব লেবুব বস ৮ সেব অম্পো অম্পো পাক কবিয়া পশ্চাৎ হিং, শুঁঠ, পিপ্পল, মবিচ, ইহাদেব প্রত্যেকেব চূর্ণ ১ পল, পাবা, গন্ধক, অমৃত ৪ তোলা এই সমস্ত মিশ্রিত কবিয়া জাম্বীব বসে মাড়িয়া তিন দিন বোজে শুষ্ক কবিয়া কুলআঁটীব ন্যায বটী প্রস্তুত কবিবে এক একটী বটী উষ্ণ জলেব সহিত সেবন কবিবে

বৈশ্বানর লৌহ —তেঁতুল ছাল ভস্ম, আপাঙ্গ ভস্ম, শাম্বুকেব শুঁঠী ভস্ম, সৈন্ধব লবণ, প্রত্যেকে ০ পোয়া, লৌহ ১ সেব এই সমুদায় একত্র পেষণ কবিয়া লইবে বেদনা উপস্থিত হইলে ১ মাসা পবিমাণে ঔষধ সেবন কবাইবে অল্পপান গরম জল

হোমিওপ্যাথিকে অজীর্ণ ও অন্যান্য উদরসম্বন্ধীয় রোগের চিকিৎসা ।

অজীর্ণ বা ইণ্ডিজেশচন ।—ওরুপাক জব্য অধিক পবিমাণে ভক্ষণ, ভক্ষ্যজব্য উত্তমরূপে চর্বন না কবিয়া খাওয়া, অতিবিক্ত মদ্য বা জলপান, আহারেব অব্যবহিত বা অধিক পবে পুনবায আহার কবা, পাবদ কিম্বা অতিবিক্ত বেচক জব্য ভক্ষণ, আহারেব অব্যবহিত পবে শারীরিক বা মানসিক পবিত্রম, ইত্যাদি কাবনে অজীর্ণ বোগ জন্মে

লক্ষণ ।—বমন, ক্ষুধামান্দ্য, পেটফাঁপানরুক জ্বালা, আহারেব পব পাকস্থলীতে বেদনা, উদাবব ভার, অম্লথবোধ, ক্ষীণতা, ক্রমে অনাশক্তি, মলাযুক্ত জিহ্বা, অরুচি, কখন কোষ্ঠ বদ্ধ, কখন বা দাশু, শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন, বমন কর্ণে শব্দ বোধ, চক্ষুব সম্মুখে দাগ, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনাধিক্য, মুখে অনবরত জল উঠা ইত্যাদি ।

চিকিৎসা ।—নিয়মিত সময়েও উপযুক্ত পবিমাণে আহারেব

হোমিওপ্যাথিকে উদরসম্বন্ধীয় রোগ চিকিৎসা। ১৪৫

ব্যবস্থা করা বিধেয়। অতিবিক্ত আহার বা পুনঃপুনঃ আহার, আহারান্তে অতিরিক্ত তবল দ্রব্য পান, অলসতা, ইত্যাদি নিষেধ। সকল প্রকার অজীর্ণ বোগে, বিশেষতঃ সর্দি লাগিয়া, মদ্যপান বা অতিরিক্ত ভোজন জন্ত, মুখ তিত্ত কিম্বা অন্য প্রকার বিষাদযুক্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ আহারেব পব বমন, মস্তক ঘূর্ণন, অন্ন উঠা, বুকজালা বা মুখে জল উঠ ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে, “নক্সভমিকা” তিনটি ক্ষুদ্র বটীকা বা এক বিন্দু আরক প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

গা বমি বমি, পেট বেদনা, মুখে অন্ন বা তিত্ত জল উঠা, বমন, কোষ্ঠ-বদ্ধ, পেটফাঁপা ও অস্থখ থাকিলে “সল্ফার” তিনটি ক্ষুদ্র বটীকা বা ১ বিন্দু আরক প্রতি এক বা দুই ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে।

ক্লেশযুক্ত, সবুজ বা হবিজ্রা বর্ণ দাস্ত হইলে, গলাশয় বিস্তৃত হইয়া পড়িলে, পেটেব আক্ষেপ (খঁচুনি) বা বেদনা বোধ থাকিলে, অন্ন দাস্ত বা বমন হইলে, “কলোসিন্থ” বিশেষ উপকারী। মাত্রা পূর্ববৎ জানিতে হইবে।

কোষ্ঠবদ্ধ বা কন্ঠিপেশান।—শাবীরিক প্ৰশ্রম না করিলে এবং পিত্তের অস্পতা বশতঃ এই রোগ উপপন্ন হয়।

চিকিৎসা —অতি কঠিন তবল খাদ্যদ্রব্য কিম্বা খাদ্যেব অস্পতা-হেতু কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, মস্তক ঘূর্ণন বা শিবঃপীড়া থাকিলে, “নক্সভমিকা” তিনটি ক্ষুদ্র বটীকা বা এক বিন্দু আরক শাস্তি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতে ও রাত্রে সেবন করাইবে।

শাবীরিক প্রমেব অভাবে কোষ্ঠবদ্ধ বা কঠিন মল, শিবোঘূর্ণন ও শিবঃপীড়া, শুষ্ক বক্তিম মুখমণ্ডল ও উদর ভাবী বোধ হইলে, “ওপিয়ম” “নক্সভমিকার” স্থায় ব্যবহার করিবে।

পুৰাতন বোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, মল শক্ত ও তন্দ্রারোগেব উপক্রম থাকিলে “সল্ফার” পূর্বোক্তরূপে প্রয়োগ করিবে।

কোষ্ঠ পবিক্তাব রাখিবার জন্ত প্রতিদিন উপযুক্ত শাবীরিক ভ্রম, অন্ন আহার ও সুপক ফল ভোজন কর্তব্য। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ঈষৎ গরম জলে পিচকারী দেওয়া আবশ্যক।

পেটফাঁপা বা ফ্যাটুলেন্সী —যাহাদেব পবিপাককার্য স্থ-
সম্পন্ন হয় না, তাহাবা পবিমিত ও অপবিপাক ফলমুলাদি আহাব কবিলে
এই বোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে

লক্ষণ —এই বোগেব লক্ষণ এত স্পষ্ট যে, তাহাব বর্ণনার প্রয়ো-
জন কবে না। স্বপ্নিওব স্পন্দনাদিক্য, শ্বাস প্রশ্বাসেব অস্পতা, মস্তক-
ঘূর্ণন প্রভৃতি উহাব আনুমানিক লক্ষণ

চিকিৎসা। —উপযুক্তকরণে নবীচালন, এবং পীডাব কাবণ
সাধ্যাঙ্গুসাথে পবিত্যাগ কবিত্তে হইবে, ওজ্ঞান নিম্নলিখিত ঔষধগুলি
বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে

অতিবিক্ত পানজন্ম পাকস্থলী দুঢ় এবং ক্ষীণ হইলে আবেগ্য না
হওয়া পর্যন্ত “নক্সভমিকা” তিনটি স্কুড্র বটি বা একটা বড় বটি, অথবা
এক বিম্ব আবক এক কাঁচা জলে মিশাইয়া ২ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে।

তৈলাক্ত, মাংস অথবা অন্য কোন প্রকাব গুরুতব খাদ্য ভক্ষণে পেট-
ফাঁপিলে “পল্‌মেটীলা” বা “চায়না” প্রয়োগ কবিলে এই দুই ঔষধ
এই বোগে বিশেষ কার্যকর

উদগার (নসিয়া) এবং বমন (ভমিটিং) —এই রোগে উদবস্থ
ভুক্ত পদার্থ বাহিব করিয়া দিবাব ইচ্ছা হয় এবং পাকস্থলীব উত্তেজন
সহকারে বমন হইয়া যায়

চিকিৎসা —বিভিন্ন এবং বিপরীত কাবণ হইতে যে বোগেব
প্রকাশ পায়, তাহাব চিকিৎসায় বিশেষ পাবদর্শিতা ও বিবেচনার আব-
শ্যক হয়।

গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের অথবা মদ্যপানাদিগেব ক্রিমি অথবা অতি-
রিক্ত আহাব জন্ম বমন হইলে এবং বমন করা স্রব্য সমুদায় পুত্র বা
তিল্ত, পীত বা সবুজ স্রব্য বা অস্ববিশিষ্ট হইলে “নক্সভমিকা” পূর্বেকৃত
প্রকাবে তিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করা কর্তব্য

অতিবিক্ত কিম্বা তৈলাক্ত স্রব্য আহাবে পাকস্থলী উত্তেজিত হইয়া
বমন, পাকস্থলীব দুর্বলতা প্রযুক্ত আহাবেব পব উদগার ও বমন হইলে
“পল্‌মেটীলা” উপরোক্ত প্রকাবে দিবে

হোমিওপ্যাথিকে উদরসম্বন্ধীয় রোগ চিকিৎসা । ১৪৭

পাকস্থলীর প্রদাহ বা ইন্ফ্যামেশন্ অফ্ দি বাউয়েল্‌স্ ।—এই বোগে জ্বরানুভব, পাকস্থলীর বেদনা, অত্যন্ত অস্বথবোধ, উদ্যাব, নাড়ীর দ্রুতগতি, রোগী শয্যাগত থাকে, মুখজীতে যজ্ঞগানুভবে চিল্ল, সামান্য স্পর্শমাত্র অত্যন্ত যাতনানুভব হইয়া থাকে ; কখন কখন এমন হয় যে, কোন মতে সহ্য হয় না । যজ্ঞগা বৃদ্ধি হইবাব আশঙ্কায় নিশ্বাস ফেলিতে ইচ্ছা হয় না অত্যন্ত ক্ষীণত, কোন প্রকার ভাষাত অথবা মদিবা পান জন্ম হইলে বোগ কঠিন ভাব ধারণ কবে ; সম্ভব প্রতিকার না হইলে প্রাণনাশের কাবণ হয়

চিকিৎসা । পাকস্থলীর উপর ফোমেন্ট করিবে যতক্ষণ জ্বর বন্ধ না হয়, এক ঘণ্টা অন্তর “গ্যাকোনাইট” এবং “মাকুরিয়াস্” প্রয়োগ করিবে তাহাব পব “বেলেডোনা” এবং “মাকুরিয়াস্” দিবে ।

পাকস্থলীর আক্ষেপ । এই পীড়া অকস্মাৎ আবিভূত হইয়া পাকস্থলী কামড়াইতে ও দাক্ষণ যজ্ঞগা দিতে থাকে

চিকিৎসা । গরম জল বোতলে পুবিয়া অথবা গরম জলে ফ্যানেন ভিজাইয়া পোটে খেদ দিবে । পিপাবমেন্ট, শুঁচ কিস্বা গরম জল খাইতে দিবে না—কেবল পর্যায়ক্রমে “নক্সভমিকা” এবং “ককুলশ্” প্রত্যেক ৫ মিনিট অন্তর সেবন করাইবে ।

অগ্নাপিত্ত ।—ইহাতে বর্ণহীন দ্রব অগ্ন পদার্থ বমন হইয়া থাকে

চিকিৎসা ।—“কার্বোভেজিটেবিলিস্” ১৫ মিনিট অন্তর প্রয়োগ করিবে রাত্রি এবং প্রাতঃকালে “আর্শেনিক” দিবে কোন মতে চা খাইতে দিবে না

অগ্নরোগ বা গ্যাসিডিটি ।—এক প্রকার অপ্রীতিকর ও কষ্টজনিত তাপ বা খব অগ্নবস কঠিনালী পর্যন্ত উঠিতে থাকে, কখন কখন তাহাব সহিত উদ্যাব উঠে, লাল্যাবং তবল পদার্থ বমন হইলে বোগী কিছু স্বাস্থ্যলাভ কবে

• চিকিৎসা ।—প্রতি পাঁচ বা দশ মিনিট অন্তর “কার্বোভেজিটেবিলিস্” এবং তাহাব পবে দিবসে তিন বার “নক্সভমিকা” সেবন করিতে দিবে। কার্বনেট অফ সোডা ইহাতে নিতান্ত অনপকাবী জানিবে ।

হাকিমীমতে অজীর্ণাদি পীড়ার চিকিৎসা ।

মন্দাগ্নির বিবরণ —এই বোলে ভুক্ত জব্যাদি জীর্ণ হয় না, পোট্টে কিঞ্চিৎ বেদনা বোধ হয় ; কখন বা বায়ুব সঙ্গে অন্ন ঢেঁকু উঠে এবং শবীর শুষ্ক হয়

ঔষধ ।

বেউচিনি ... ২ মাসা

মুসব্বর ... ২ মাসা ।

এই দুই জব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ১২টী বটী প্রস্তুত করিবে প্রথম দিন সন্ধ্যার সময় দুইটি, দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় এই প্রকারে সেবন করাইবে ।

অন্য প্রকার ।

জাঙ্গ হরিতকী ... ১ বতি ।

কাল লবণ ... ৫ বতি

শীতল জল ... ১ ছটাক

একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে খেওয়াইবে ।

অন্য প্রকার ।

যদি মন্দাগ্নিব সহিত জ্বর থাকে, তবে নয়ে ঐ প্রকারে ঔষধ দিবে

পাখা ... ২ ০ বতি

গন্ধক ... ২ ০ বতি

বেউচিনি ... ১০ বতি ।

লক্ষা মরিচ ... ৩ মাসা ।

এই কয়েক জব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ১৫টী বটীক প্রস্তুত করিবে । প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় এক একটী বটী জলের সহিত সেবন করা ইবে । কোন কোন সময়ে অজীর্ণহেতু অন্ন উদগার উঠে, তৎক্ষণাৎ প্রত্যহ কিছু কিছু ঘাটী কিম্বা চূণের জল খাইতে দিবে

বেউচিনি	..	..		৬ মাস।
হিবাকশ	..	..		২ মাস।
কাল লবণ	...	.	...	২ মাস।

একত্র মিশ্রিত কবিয়া ২০ টী বটীকা প্রস্তুত কবিবে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাব সময় এক একটী জলের সহিত সেবন কবাইবে যত দিন আরোগ্য না হয়, তত দিন এইরূপ কবিতে হইবে

শূলরোগ চিকিৎসা ।—নিশ্বাস ফেলিবার সময় বেদনা হইয়া বক্ষঃস্থলের নীচে শূলবুল্ল যাতনা হয়, নাড়ী শীঘ্র চলে, নিশ্বাস শীঘ্র বহে, শীত কবে, অঙ্গ জ্বর হয়, আব পাঁজরের নীচে বেদনা হয়, বোঁগী নিশ্বাস ফেলিতে অশক্ত হয় এই রোগ কখন কখন এক পার্শ্বে এবং কখন কখন দুই পার্শ্বে হয় শেষোক্ত প্রকারে হইলে পীড়া কঠিন জানিতে হইবে ।

কারণ ।—ফুস্ফুসের উপবে ও বক্ষঃস্থলের নীচে যে পরদা আছে, সেই পরদায় দাহবশতঃ দুই রক্ত সঞ্চিত হইলে এই বোঁগেব উৎপত্তি হয়

প্রতিকার । এই বোঁগ নিবারণের উপায় শীঘ্র করিতে হয়, কাবণ শীঘ্র আবম না হইলে বক্ষঃস্থলের ভিতবে এক প্রকাব রক্তময় জল বাহির হইয়া ফুস্ফুসকে চাপিয়া ধবে, তাহাতে নিশ্বাস চলিতে পাবে না । আর যে সময়ে ঐ প্রকাব হইবে, সেই সময় ঢাবি ছটাক হইতে আট ছটাক পর্য্যন্ত, শবীবের বল বিবেচনায়, বক্তমোক্ষণ কবিবে ইহাতে শূল শীঘ্র বন্ধ হইবে । পশ্চাৎ নিম্নোক্ত উপায় করিবে

সোবা .	...	.. .	...	৫ মাস।
পাণ্ডাচূর্ণ	...	..	...	২ রতি
কপূর্ব	...	..	..	৪ রতি

এই কষেক অব্যক্কে চূর্ণ কবিয়া ত্রাট ভাগ করিবে + এক একটী ভাগকে মাতাওড়ের সহিত মিশ্রিত কবিয়া • দিবসেব মধ্যে ৮ বার সেবন কবাইবে

পঞ্চম অধ্যায় ।

গ্যালোপ্যাথিকে শূল ও অন্যান্য আঞ্জিক রোগ চিকিৎসা ।

গ্যাণ্টার্যাল্জিয়া বা অন্ত্রবেদনা —অন্ত্রেব বেদনা ও ইহাব সহিত সচবাচব কোষ্ঠবদ্ধ ও অন্ত্রে বাম্প সঞ্চিত হইয়া থাকে অনেক স্থলে হঠাৎ বেদনা প্রকাশ পায় উহাব স্বভাব তীব্র ও অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক, কখন কখন সামান্যরূপে আক্রমণ কবিয়া ক্রমে প্রবল হইতে থাকে ।

কারণ ।—বাত, বক্তাপ্পতা প্রভৃতি পীড়াপ্রবণ ব্যক্তিদিকেব অপবিশুদ্ধ বত্ত ভিসিবার মধ্যে সংকালিত হইয়া এইরূপ বেদনাব উৎপত্তি কবে অতিবিক্ত শ্বায়ুস্থত্রে বক্তের নিপীড়ন হেতু, মস্তিষ্ক ও কশোককা মজ্জাব আঞ্জিক পীড়ায় প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়া দ্বারা অন্ত্রবেদনা হইবাব সম্ভাবনা উদবস্থ ঘন ভিসিবার,—বিশেষতঃ যকৃৎ ও প্লীহাব প্রাথমিক পীড়ায় অন্ত্রমধ্যে উত্তেজন চালিত হইয়া অনেক স্থলে উহাতে শ্বায়বিক বেদনা হয় আহারীয় জব্যাদি উত্তমরূপে পবিপাক না হইয়া অন্ত্রমধ্যে চালিত হইবাব সময় অন্ত্র উত্তেজিত কৰিয়া বিযম তাক্ষেপিক বেদনা জন্মাইতে পারে । অন্ত্রমধ্যে গ্যাস্ সঞ্চিত হইয়াও এই প্রকাব বেদনা হয়, ও ঐ গ্যাস্ স্থানান্তরে গবম করাতে মধ্যে মধ্যে বেদনারও স্থানপবিবর্তন ঘটে । দূষিত সিক্রিসন, উত্তেজক পদার্থ, অম্মাক্ত ফল, অম্মাক্ত বা উত্তেজক মদিবা, উত্তেজক মদলা ইত্যাদিও অন্ত্রবেদনাব কাব ।

লক্ষণ ।—এই বেদনা সচবাচব হঠাৎ প্রকাশ পায় ইহাব স্বভাব তীব্র শববেধনবৎ বা মোঁচড়ান বেদনাব ন্যায় অনেক স্থলেই উহা নাতিব নিকটে প্রথম অল্পভূক্ত হয় ও তৎপবে স্থান পবিবর্তন করে উদগ্ৰ চাপিলে উপশম বোধ হয়, চুৰুহ বেদনাব সময়ে বমন বা বমনোদগে হইতে পারে । যন্ত্রণা অধিক হইলে হস্তপদাদি শীতল, দেহ ঘৰ্ম্মাক্ত, নাড়ী দুৰ্বল ও ত্বক পাম্পান বর্ণ হইয়া থাকে । আদ্যায়ন জন্ত পীড়ায়

য়্যালোপ্যাথিকে শূল ও আন্ত্রিক রোগ চিকিৎসা । ১৫১

অত্র স্থানে স্থানে প্রণাবিত হয় ও স্পর্শ দ্বারা পৰীক্ষা করিয়া দেখিলে
অন্ত্রের স্থানে স্থানে আকুঞ্চন ও প্রসারণহেতু গ্রন্থির ন্যায় ক্ষীণ বোধ
হয় বায়ু নির্গত হইলে বোগী সূক্ষ্ণ বোধ করে, এবং কখন কখন বেদনা
এককালে নিবারিত হয়

বেদনা সম্প্রবিবাম বা সরিবিবাম হইতে পাবে কখন কখন যেমন
হঠাৎ প্রকাশ পায়, তেমনি হঠাৎ তাহার উপশম হয় এই বেদনাব
সহিত প্রদাহ বর্তমান থাকিতে কখন কখন উদবপ্রদেশ উষ্ণ, বেদনা
স্থায়ী ও রক্তসঞ্চালনক্রিয়া প্রবল হইয়া থাকে হিষ্টিরিয়া-পীড়াপ্রবণ
স্ত্রীলোকের এই বোগেব সহিত প্রায় জরায়ুর ক্রিয়াব ব্যতিক্রম হয় এবং
পৃষ্ঠবংশে ঈষৎ বেদনা বর্তমান থাকে। কখন কখন এই বেদনার
সহিত জরায়ুর ক্ষত ও রক্তাধিক্য দেখা যায়

চিকিৎসা।—অহিফেণ, হাইওসায়েমশ্, কৌবোডাইন, ক্লোবিক
ইথাব, কোনায়ম, কপূর্ব, য়ামোনিয়া প্রভৃতি অবসাদক ও আক্ষেপ-
নিবাহক ঔষধ দ্বারা উপকার হইবার সম্ভাবনা এই ঔষধেব সহিত
ফোমেণ্টেশন, তাপিন তৈলেব ফুপ, উত্তেজক লিনিমেন্ট দ্বারা মালিশ
ইত্যাদি ব্যবস্থা করিলে আশু প্রতিকার হইবার সম্ভাবনা কখন কখন
পৃষ্ঠবংশেব উপব বেলোডোনা প্রভৃতি অবসাদক ঔষধ মালিশ করিলেও
উপকার দর্শে। বেদনাব উপশম হইলেই এবং তৈল, স্নান প্রভৃতি
বিরেচক ঔষধ ব্যবহার দ্বারা অত্র পবিষ্কার কবাইবে

য়্যাণ্টারাইটিস্ বা অন্ত্রপ্রদাহ।—অন্ত্রের প্রদাহকে য্যাণ্টা-
রাইটিস্ সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এই বোগে সচবাচব সমুদায় শূলান্ত্রে
প্রদাহ হইয়াছে, কোন নির্দিষ্ট লক্ষণ দ্বারা তাহাও নিশ্চয় করিতে পারা
যায় না। শিশুর দন্তোদগমকালে এই পীড়ার প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া
যায়। তাহাদের শৈল্পিক ঝিল্লীতেই হইয়া থাকে

লক্ষণ।—ঈষৎ কম্প, ত্বকেব উষ্ণতা, পিপাসা, নুড়ীর ক্ষত-
গামীত্ব প্রভৃতি ইহাব পূর্বলক্ষণ তদনন্তর বোগী উদবেব উৎকট পীড়ায়
অস্থির হয়। এই বেদনা নাভীর চতুঃপার্শ্বে অধিক, এবং অনেক স্থলে
ইহাব সহিত অতীব যন্ত্রণাদায়ক বমনোদ্বেষ্ট ও বমন বর্তমান থাকে

এ অবস্থায় বোগী উত্তানভাবে *যন কবিয়া উদবত্রাচীবস্থ পেলী সমুদায় শিথিলাবস্থায় বাখিবার জন্ত জাহ্নুদেশ উত্তোলন কবিয়া থাকে এই অবস্থাব কিছুক্ষণ পাবেই অত্যন্ত অস্থিভত, প্রথব জ্বর, মুখমণ্ডলেব উদ্বেগ, গাভিশয কোষ্ঠবদ্ধ, এবং পীড়া অতি দুকহ হইলে প্রলাপ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় অল্প চাপিলেই য়ে অঙ্গপ্রদাহেব বেদনা বৃদ্ধি হয়, ইহা স্মরণ বাখিলেই তদ্বাবা শূল বেদনা হইতে ইহাকে প্রভেদ করিতে পাওয়া যায়। চাপিলে শূল বেদনাব উপশম হইয়া থাকে। উদগীর্ণ পদার্থ সচবাচব অতিশয দুর্গন্ধময় হয়, এবং কখন কখন উহাব সহিত মল মিশ্রিত থাকিতে পাবে। নাড়ী প্রথমে পূর্ণ ও কঠিন হয়, কিন্তু ক্রমে তারেব ন্যায সূক্ষ্ম এবং কখন কখন তাহা অনুভব কবিতে পারা যায় ন

শৈশবাবস্থায় ৬ ৮ মাসেব মধ্যে শিশুদেব এই পীড়া দেখিতে পাওয়া যায় কখন কখন ইহাকে সম্প্রবিবাম জব বলিয়া উল্লেখ করা হয়; কিন্তু যাহাবা ইহাকে টাইফয়েড জব বলিয়া গণনা করেন, তাঁহাবাই ইহাব প্রকৃতি নিদান বুঝিয়াছেন বলিতে হইবে। প্রথমাবস্থায় শিশুব ডক উত্তপ্ত এবং শিশু অত্যন্ত অস্থিভ ও তৃষার্ত্ত হয়; জিহ্বা শুষ্ক অথবা কটাবর্ণ লেপদ্রাবা আবৃত হইয়া থাকে; মধ্যে মধ্যে চীৎকার কবিয়া ক্রন্দন করে, নিদ্রাব অভাব, বমন, বাম্পমঞ্চযহেতু উদর বিস্তৃতি, উহাব নিপীড়নে বেদন, অস্ত্রেব ক্রিয়াব বৈলক্ষণ্য, অনেকস্থলে উদবাময়, এং সবেগে হবিষর্গ দুর্গন্ধময় মল-ত্যাগ হয়। বাত্রিকালে এই সকল লক্ষণ ও জ্বের অনেক উপশম দেখা যায়। প্রথব উদবাময়ের সহিত এই সকল লক্ষণেব তুলনা করা যাইতে পাবে; কিন্তু শীঘ্রই অত্যন্ত জ্বর, পিপাসা, বমন, জিহ্বাশোয, জলবৎ দান্ত, অকম্পাৎ নিস্তেজতা, কখন কখন অচৈতন্য ও দেহ পাঙ্গাশবর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ আবিভূত হয়।

চিকিৎসা।—এক পীড়াব অহিফেনই উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিতে হইবে উদবে সর্বদা পল্টিং ও ফোমেণ্টেশন্ ব্যবহারেও বিশেষ উপকার দর্শে। ইহাতে উদ্বেগশূন্য হইয়া অস্থিভভাবে থাকা আবশ্যক।

ঘ্যালোপ্যাথিক শূল ও আঙ্গিক বোগ চিকিৎসা । ১৫৩

অন্ত্রে মল সঞ্চিত থাকিলেও বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা নহে । প্রদাহেব শান্তি হইলে মৃদু বিরেচক ঔষধ অর্থাৎ এবণ্ড তৈল ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, পরে বিবেচনামুসারে বার্কের কাথ বা অন্য কোন বলকাক ঔষধ দিবে । বোগী নিশ্চয় হইয়া পড়িলে উষ্ণকর ঔষধ দিতে হইবে ।

শৈশবাবস্থাতেও ঐরূপ চিকিৎসা কবিবে কিন্তু এই অবস্থায় অধিকেন সাবধানে ব্যবহার কবিতে হইবে । উষ্ণ জলে স্নান, ফোম-টেশন ও মলিনার পুল্টিশ্ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে । ইহাতে কখন কখন ক্রোবেট অফ পুর্শ বিশেষ ফলদায়ক হয় সঙ্কোচক ঔষধ আবশ্যক হইলে কাইনো, লগ্‌উড প্রভৃতি ব্যবহার করা যায় । গোঁহুঁক অপেক্ষা ছাগীহুঁক বিশেষ উপকারী, কিন্তু ছাগীকে যদি কেবল মাত্র ঘাস খাওয়াইয়া রাখা যায়, তবে আরও ভাল হয় ।

সিকমের প্রদাহ ।—সিকম অন্ত্রের অংশবিশেষ । ‘অন্ত্রের অন্য কোন অংশে পীড়া না হইয়া কেবল এই অংশেই আক্রমণ হয় । ইহাব মধ্যে কঠিন মল, ফলাদির বীজ, খোসা, পিও বা অঙ্গুলিলা বা ক্রিমি ইত্যাদি সঞ্চিত হইয়া দুকহ শূলবেদনা বা ঐ স্থানের প্রদাহ উপস্থিত হয় ।

লক্ষণ —প্রায় সচরাচর অম্প বা অধিক পরিমাণে দৌহিক লক্ষণাদি, অম্প ভ্রুর, বমনোদগে ও প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় । সিকমেব উপর চাপিলে বেদনার বৃদ্ধি হয় । প্রদাহিত স্থান শিথিলাবস্থায় রাখিবাব জন্য বোগী দেহ বক্র ও জাঁহু উত্তোলন করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে । পীড় ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইলে সিকমেব পেবিটো-নিয়ম আক্রান্ত হয় ; কখন কখন নিকটবর্তী য়াবিওলাব টিশুতে প্রদাহ ও পুঁজ সঞ্চিত হয় । ঐযুক্ত অবস্থা ঘটিলে যদি অল্পমধ্যে পুঁজ পতিত হয়, তবে বোগী বক্রা পাইতে পারে ; কিন্তু পেবিটোবিয়মের গহবরে পতিত হইলে, অভিশয় কাতন বা পব বোগীব স্বত্ব হয় ।

চিকিৎসা ।—সিকমেব সকল পীড়াতেই বিশেষ মনোযোগের সহিত চিকিৎসা কবিতে হয় । অনেক স্থলে বিবেচক ঔষধে অনিষ্ট হইতে দেখা যায় । ইহাব চিকিৎসা অনেকাংশে অন্ত্র প্রদাহেব ন্যায় । মাদক দ্রব্য

সংযোগে ফোমেন্টেসন ও অহিফেন সেবন দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতে পাবে। যাহাতে বেদনা নিবারণ হয়, এমন পরিমাণে ৫ ও ৬ দিন পর্যন্ত অহিফেন সেবন করাইতে হইবে। কঠিনদেশ পর্যন্ত অধিকক্ষণ গরম জলে ডুবাইয়া রাখিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পাবে। লেমনেড্, সোডাওয়াটার, এফাবেভেমিং ড্রাফ্ট্ দ্বারা বমনোদ্বেগ নিবারণিত হয়। কোষ্ঠ পবিদ্ধাব করাইবার আবশ্যক হইলে এরও তৈলেন্ পিচকাবী দিবে। পুষ্টিজোৎপত্তির লক্ষণ থাকিলে দুগ্ধ, ময়, অর্কসিদ্ধ ডিম্ব, মাংসেব ঝোল, বার্ক, ত্রাণ্ডি, পোট্ প্রভৃতি বলকারক জব্য ব্যবস্থা।

• কলিক বা শূলবেদনা।—কোষ্ঠ বদ্ধ, কখন কখন আশ্মান, এবং সচরাচর বমন বা বমনোদ্বেগেব সহিত অল্পে উৎকর্ষ চর্কণবৎ বেদনা, নিপীড়নে এই বেদন্যাব শান্তি হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—উদবে কঠিন মোচড়ানবৎ বেদনা, বমন ও উদনপ্রাচীরের আকুঞ্চন হয়, এবং কখন কখন উদয়াময়েব লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। অপক্ক ফল, মূল ও দূষিত মৎস্যাদি ভক্ষণে ও এই পীড়া জন্মিতে পাবে। শৈশবাবস্থায় দুগ্ধেব দোষে, দন্তোদ্যমেব পূর্বে ঘন পদার্থ আহবেও অল্পেব অগ্নাধিক্য প্রযুক্ত এই পীড়া প্রকাশ পাইতে দেখা যায়।

অল্পেব দূষিত সিক্রিসন বা অল্প মধো অধিক পরিমাণে পিত্ত পতন দ্বারা কখন কখন শূল বেদনা হইতে দেখা যায়। ইহাকে সচরাচর বিলিয়াস্ কলিক বা পিত্তজন্ম শূল কহে। দুগ্ধ চর্কণবৎ বেদনা, পিত্তমিশ্রিত পদার্থ বমন, কোষ্ঠবদ্ধ বা অম্প মল ত্যাগ, কখন কখন হিক্কা, উদবে টান বোধ ও অস্থিরতা ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়।

অল্পেব আভাবিক সংস্থানেব পবিবর্তন অথবা সম্পূর্ণরূপে অজীব-বোধ হেতু অনেক স্থলে শূল বেদনার উদ্ভব হয়।

চিকিৎসা।—কাবণাচ্ছসাবে এই পীড়ার চিকিৎসা করিবে। সামান্য শূলবেদনায় রোগীৰ ক্ষেপ নিবারণার্থ ক্লোবোফরম, মর্ফিয়া, ব্যালিট্রিয়ান প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। ইহার সহিত উষ্ণ জলের ফোমেন্ট বা উত্তেজক লিনিমেন্ট ব্যবহারে উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। কখন কখন ২ গ্রোন জীকুনিয়া ব্যবহারে বেদন্যাব আশু উপকার

স্যাংলোপ্যাথিকে শূল ও অক্লান্তিক রোগ চিকিৎসা । ১৫৫

দর্শিয়াছে সাংগাশ শূল বেদনায় অনেকে নিম্নোক্ত ঔষধ দিয়া থাকেন ।

টীং ব্যালিবিয়ান কম্পাউণ্ড : ২ ড্রাম ।

স্পিবিট ক্লোরোফর্ম ১৫ বিন্দু ।

ফর্কিয়া হাইড্রোক্লোরিক ১ গ্রেন ।

স্যাংকোয়া স্যানাইসাই ১ আং ।

এক এক মাত্রা প্রয়োজ্য ।

প্রয়োজনানুসারে ইহার সহিত মোড কার্বনেট অফ ম্যাগ্নেশিয়া সংযোগ করা যাইতে পারে বেদনা থাকিতে বিবেচক ঔষধে প্রায় কোষ্ঠ পবিদ্ধার হয় না, অতএব বিবেচনানুসারে এতৎ তৈলে বা হিঙ্গুর পিচকারী ব্যবহার করা যাইতে পারে স্নায়বিক ও হিষ্টিরিয়া ব্যাধি-যুক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ব্যালিরিয়ান ও বিন্দু ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । আধুনিকজনিত শূল বেদনা হইলে ইথাব, ম্যাগ্নিশিয়া ও ইয়াইয়েমায়েরম ব্যবস্থা করা যাইতে পারে উদবে অজীর্ণ ত্রব্য সঞ্চিত থাকিলে, বমন-কারক ঔষধ আবশ্যক হয় অল্পে অল্পাধিক্য হইলে ক্ষারাক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে যে কাবণবশতঃই হউক, বোগী বেদনায় অস্থির হইয়া পড়িলে, ক্লোরোফর্মের আত্মাণ দ্বারা উহাকে স্থির করিবে

তাম্রশূল — তাম্রদ্বারা বিষাক্ত হইলে এই প্রকার শূল বেদনা হইতে পারে সচরাচর হঠাৎ বেদনার আক্রমণ ও নিপীড়নে উহা বৃদ্ধি হয় । কখন বা কোষ্ঠবদ্ধ, কখন বা উদরাময় ; কিন্তু সচরাচর প্রায় বমনোদ্বগ ও বমন হইয়া থাকে, দৈহ বিবর্ণ, মুখমণ্ডল মলিন, চক্ষু কোটর-স্থিত, ঐচ্ছিক নীলবর্ণ, এবং দন্তমাড়ী চতুর্দিকে লাল রেখা দৃষ্ট হয় । বিবেচনানুসারে বিবেচক ঔষধ দ্বারা দেহ হইতে তাম্র দূর করিতে চেষ্টা করা কর্তব্য উহা জলে স্নান, তাম্র হইতে লোহা, বেদনার স্থানে সর্ষপের পলস্তুরা ও ইথাব বা অহিফেন সেবন করাইলে বেদনার উপশম হইতে পারে ।

সীমক শূল ।—ইহাতে সাংগাশ শূলের লক্ষণের সহিত নাতির চতুষ্পার্শ্বে মোচড়ানর ছায় বেদনা, উদবের ত্রকে পৃষ্ঠবংশের দিকে টান

ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা বোধ হয় মীমক দ্বারা বিযাক্ত হইলে এই পীড়া হইবার সম্ভাবনা মন্তমাড়ী বধ বে মীমবর্ণ বেথা যে মীমক বিমেষ নির্দিষ্ট লক্ষণ, তাহা সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়

চিকিৎসা — কোষ্ঠ পবিষ্কার বাঁখা আবশ্যক প্রথমে বিবেচনা যত ক্যালোমেল ও জোলেফা সেবন করাইয়া পাবে মলফেট্ অফ ম্যাগ্নেসিয়া ব্যবস্থা করিলে অনেকস্থলে আশাশ্রয়ী ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় একবার কোষ্ঠ পবিষ্কার হইলে প্রত্যাহ কিয়ৎ পবিমানে মলফেট্ অফ ম্যাগ্নেসিয়া ও মলফিউবিক ম্যাগ্নিড ব্যবস্থা করিলে অহিফেন দ্বাৰা কখন কখন বেদনার অনেক উপকার হয়, কিন্তু আশু প্রতিকারের জন্ত ইহাতে ইলোষ্ট্রি সিটি সর্বোৎকৃষ্ট বোগী উহার তেজ সহ করিতে না পারিলে ক্লোবোফবস্ আণ্ডে উহাকে অচেতন করিয়া ইলোষ্ট্রি সিটি ব্যবহার কবিত্তে পারা যায় ছন্দহ বেদনার উপায় হইলে, মধ্যে মধ্যে উষ্ণ গন্ধকাভিষেক ও আক্ৰিওডাইড অফ পোটাসিয়াম ব্যবহার কবিলে ক্রমে ক্রমে পীড়া লাভি হইবার সম্ভাবনা

কোষ্ঠবদ্ধ বা কনেষ্ট্রিপেশন — কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে ক্ষুধাশান্দ্য, অজীর্ণতা, জিহ্বা মাণিষ্ঠ ও উহার পার্শ্ব খাজ, অস্থান, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, দ্রক বিবর্ণ, অক্ষিপুটেব নিম্নে কাল চিহ্ন, নিশ্বাসমত ইত্যাদি লক্ষণ আবিভূত হয়

চিকিৎসা। — স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধ দূরীকরণার্থ বিবেচক ঔষধ ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নহে কোন ঔষধ দ্বাৰাই হঠাৎ ইহার প্রতিকারের আশা করা যায় না। বিবেচনায়সাবে যাহা বিবেচক ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এবণ্ড তৈল, জলপাইয়েব তৈল, কলার্ব, ম্যাগ্নেসিয়া, সিবপ্সেনা, মলফেট্ অফ সোডা, অল্প মাত্রায় ম্যাগ্নেচ, সুখপিত্ত, টেরাক্সিকম্, গ্লিষ্টারিন, পডোফিলিন, ইপিফ্যাক ইত্যাদি যুগ্ম বিবেচক ঔষধ ব্যবহার কবিলে কখন কখন কিছু দিনের জন্ত তার বটীকাকণে ব্যবহার কবিলে উপকার দর্শে।

শূলোক্তেব বলবর্ধন জন্ত বলকারক ঔষধ ব্যবহার করিলে প্রায় মান্থায় উহা কোন যুগ্ম বিবেচক ঔষধের সহিত মিশ্রিত

• য়্যালোপ্যাথিকে শূল ও আন্ত্রিক রোগ চিকিৎসা। ১৫৭ •

দিন পরে বিবেচক ব্যতীত ব্যবহার করিবে। এই সকল বলকারক ঔষধেব মধ্যে কুইনাইন, সল্ফেট অফ জিঙ্ক, নাইট্রো মডিফাইড য়াসিড, নিক্সভগিকা, পেপাসিন ও কডলিবার অয়েল মর্কোয়াক্ট বলিতে হইবে। সায়বিক পীড়ায় বেলেডোনার সহিত ক্যালিরিয়েনেট অফ জিঙ্ক ব্যবহারে উপকার দর্শে।

ইণ্টেস্টাইন্যাল অবস্ট্রাকশন্ বা অস্ত্রাববোধ।—যে কারণ-বশতঃই হউক, অস্ত্রাববোধ হইলে অনেক স্থানে দুরূহ শূল বেদন সহিত কোষ্ঠবদ্ধ, অস্ত্রের পেরিফ্রল্টিক গতির অধিক্য, অস্ত্রে অভিবিক্ত বাষ্প সঞ্চয়, হেতু আধুন্য ও গড় গড় শব্দ, বমনোদগ ও বমন এবং অবশেষে বমনের সহিত বিষ্ঠা নির্গত হয়। অস্ত্রাববোধের স্থান এবং নৈদানিক অবস্থানসাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীস্থ পীড়া সকল অস্পষ্ট অস্পষ্ট ও ক্রমে ক্রমে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ পীড়া সকল হঠাৎ প্রকাশ হইয়া পড়ে। ক্রমে ক্রমে পীড়া প্রকাশ হইলে, কিছুদিন হইতে কোষ্ঠবদ্ধ, মধ্যে মধ্যে উদবাময়, শূল বেদন বা তীব্র বেদনা, মধ্যে মধ্যে বমনোদগ ও বমন, এবং পাকযন্ত্রেব ক্রিয়ার অন্তরূপ পরিবর্তন অথবা সম্পূর্ণ কিন্তু অস্থায়ী অস্ত্রাববোধের লক্ষণ এবং যান্ত্রিক অববোধের ভৌতিক চিহ্ন সকল প্রকাশ পায়। এইরূপ ঘটনা হইলে ক্রমে ক্রমে য়াস্ট্রিনিয়া দ্বারা বোগীর মৃত্যু হইতে পারে, অথবা সম্পূর্ণ অস্ত্রাববোধের লক্ষণ সকল হঠাৎ প্রকাশ হইয়া থাকে। অস্ত্রাববোধের সহিত প্রায় প্রথমে চর্কণবৎ বেদনা, কখন বেদনা অতি দুরূহ ও আকস্মিকরূপে আবির্ভূত হয়। অনেক স্থলে নাভির নিকট হইতে আরম্ভ হয়। সম্পূর্ণরূপে কোষ্ঠ যে সর্বত্রই দেখা যায় এমন নহে, কারণ তদন্ত আক্রান্ত হইলে ও সম্পূর্ণরূপে অববোধ জন্মিলে, উদ্রাব মধ্যস্থ তবল জ্বর বাহির হইতে পারে। কখন কখন বত ও মিউকসও বাহির হইয়া থাকে।

সর্ব প্রকার অস্ত্রাববোধই যে অত্যন্ত অনিষ্টকর, তাহা উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। অত্যাধিক প্রকার অপেক্ষ ষ্ট্রাঙ্কলেশন্ ও ইণ্টেস্টিনাল স্পাসমস্ দ্বারা ই বোগীর শীঘ্র মৃত্যু হইয়া থাকে। পরাক্রম পীড়ায় হঠাৎ

অজ্ঞাববোধ হইতে পারে। কোন পদার্থ সঞ্চিত হইয়া এই ঘটনা হইলে, চিকিৎসা দ্র বা উহা দূর করিতে পারিলে বোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে।

চিকিৎসা —পুষ্টিজনক পীড়ায় পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। সহজে জীর্ণ হয় একপাত্র বা ভক্ষণ করিতে দিবে। যাহাতে প্রতিদিন দান্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবে। কোন মতে অতি বিবেচক ভ্রম দিবে না। অন্ন বা খিবে বিবেচক প্রাণে গ অপেক্ষা পিচকারী দ্বারা বিশেষ ফল হয়। পূর্ণ মাত্রায় অহিফেন, সেবন ইহার মহৌষধ জানিতে হইবে। ইহার পরিবর্তে কাহার মতে ইহার সঙ্গে কৈব নিম্নে মর্ফিয়াস পিচকারী বিশেষ উপকার দেয়। অনেক বৈজ্ঞানিকের মতঃ-
‘ষধ জ্ঞান করুন।’ ইটস্ সম্প্রদানে কেহ কেহ তামাকপাতা ইন্-ফিউজনে পিচকারী দিয়া থাকেন, কিন্তু এই প্রকার ক্রিয়া সহজে কবিবাব আবশ্যক নাই। শুষ্ক সস্তাপ, ফোমেণ্টেশন, পুন্ড্রিগ, তাপিন তৈলেব লেপ ইত্যাদি বাহ্য ক্রিয়া দ্বারাও উপকার দর্শে, অনেক স্থানে অজ্ঞাববোধে অস্ত্র ব্যবহৃতও হইয়া থাকে।

মিলিনা বা অজ্ঞ হইতে বক্তৃত্তাব —যে কাবণ বসন্ত হউক, ওষধ দিয়া বক্তৃত্তাব হইলে তাহাকে মিলিনা বলে। মিলিনা শব্দেব অর্থ কৃষ্ণবর্ণ, এই রোগে সচরাচর কৃষ্ণবর্ণ বক্ত নিঃসৃত হয় বলিয়া ইহাকে এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

যে সকল কারণে পাকায় হইতে বক্তৃত্তাব হয়, সেই সকল কারণেই অজ্ঞ হইতে বক্তৃত্তাব হইয়া থাকে।

চিকিৎসা। —পাকায় হইতে বক্তৃত্তাব প্রতিবন্ধক জন্ম যে সকল ঔষধ ব্যবহার হয়, ইহাতেও সেই সকল ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ডায়ারী বা ক্রিমিরোগ —মুখ্যজাতির পাকনলীৰ মধ্যে মাত প্রকার ক্রিমিকেবাল করিতে দেখা যায়। ইহাদেব মধ্যে চারি প্রকার ক্রিমি পাকনলী আছে। একজন্ম তাহাদিগকে বিলেলমিছা বা শুল্ফগর্ড, এবং অপর তিন প্রকারেব দেহে ঐরূপ নলী না থাকায়, তাহা-

য়্যালোপ্যাথিকে শূণ ও আন্ত্রিক রোগ চিকিৎসা ১৫৯

দিগকে ফিবেলমিস্ট্রা বা ঘন ক্রিমি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহাদেব বহুল বর্ণনার প্রয়োজন নাই, কেবল যে ওলি সাধারণতঃ মল্লম্যদেহেব অর্পকার কবে, সেই ওলিব প্রতিকাবেব বিষয় লিখিত হইতেছে।

টেপ্‌ওয়ারম্ ও রাউণ্ড-ওয়ারমের লক্ষণ — নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্টিগোচর হয়, যথা, — নাড়িব নিকটে বেদনা, বমনোদ্বেষ্ট, বমন ও মুচ্ছ, ক্ষুধামন্দা, কখন বা ক্ষুধাব অধিক্য, কুপথ্যে অভিলাস, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, কোষ্ঠবদ্ধ, কখন উদবাময়, মুখদিয়া লাল নিগম, ওহদেশে ও নাসিকা চুলকান, নিদ্রাকালে দন্তষর্ষণ, হুনিদ্রাব আঁতাব, নিদ্রাকালে চর্মকিয়া উঠা, মস্তক ঘূর্ণন, চক্ষের পিউপিল (তারাব ভিতবেব স্বচ্ছাংশ) শীর আক্ষেপ, এবল কন্ডল্‌সন্ ও তৎপবে যত্ন আসিয়া উপস্থিত হয়।

রাউণ্ড ওয়ারমের চিকিৎসা। — বিরেচক ঔষধ কম্পাউণ্ড স্ক্যামিনী চূর্ণ প্রযোগ করা কর্তব্য। ইহাব সহিত কয়েক গ্রৈণ ক্যালো-মেল্‌ মিশ্রিত করিবে। সেটোনাইন্‌ ক্রিমিব মহৌষধ সেটোনাইন্‌ বিবেচক নহে, এজন্য শিশুদিগকেও দেওয়া যাইতে পারে। উহাব মাত্রা ১ হইতে ৪ গ্রৈণ। রাজিতে এই ঔষধ সেবন করিয়া প্রাতে কোন বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা কর্তব্য, কিম্বা উহা স্ক্যামিনী পাউডারেব সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, এবও তৈলের সহিত সেটোনাইন্‌ও বিশেষ ফল দর্শে। দুই হইতে চাবি. গ্রৈণ সেটোনাইন্‌ ১ আউন্স এবও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া যতক্ষণ ক্রিমি নির্গত না হয়, ততক্ষণ প্রতি ঘণ্টায় ১ ড্রাম পবিমাণে সেবন করাইবে।

ক্ষুদ্র সূত্রক্রিমি, — চাবি. আউন্স চূর্ণেব জল বা ইন্‌ফিউজন্‌ কোয়ানিয়ার পিচকারী দ্বাৰা বিশেষ উপকার হয়।

বৃহৎ সূত্রাকার ক্রিমি। — উপবোক্তকপে ইহা চিকিৎসা করিবে, কিন্তু ইহাতে পিচকাবী ব্যবহার হয় না।

টেপওয়ারমের চিকিৎসা। — মেলফার্ণেব লিকুইড্‌ এক্‌ক্টাউই ইহাব মহৌষধ দিনে বোগীকে কেবল দুই পান করাইয়া সম্ভাব :

সময়ে পূর্ণ মাত্রায় এবং তৈল সেবন কবাইবে কোষ্ঠ পবিষ্টাবু হইলে
পৰ দিনম বোগীন্দ্র বয়ঃক্রমাসারে ১০ বন্দ্র হইতে ১ ড্রাম পরিমাণে
মেলফোর্গেব লিনকুইড এক্ট্রাক্ট সেবন কবাইবে . . . শর্করা, গদেব জল
ও দুগ্ধ কিম্বা ডিম্বেব শেঁতাংশ ও দাকচিনিব জল প্রভৃতিব সহিত মিশ্রিত
কবিয়া ব্যবহার কবিলে সুবিধা হয় . . .

অর্ক অউল পাবিত্ত তাপিঃ তৈল সেবন কবাইয়া তাহাব ২। ৩
খণ্টা পবে ১ আউন্স এবং তৈল সেবন কবাইলে এই ত্রিমি নষ্ট হয়,
কিন্তু তাপিঃ তৈল ব্যবহারে মস্তিষ্ক ও মুত্রপিণ্ডেব উত্তেজনা হেতু অনিষ্ট
হইবার সম্ভাবন, কিন্তু উহাব পবে এবং তৈল ব্যবহারে কোন হানি
হয় না . . . এক পোয়া জলে অর্ক হইতে ১ আউন্স পরিমাণে কম্বু ভিজা-
ইয়া ঐ জল পান কবিত্তে দিলে বিশেষ উপকারেব সম্ভাবনা ১০০ হইতে
২০০ গ্রেণ মাত্রায় কামেলা অত্যাৎকৃষ্ট ঔষধ বলিষ গণ্য . . .

অঙ্গ হইতে ক্রিমি একবাব বহির্গত হইলে পুনবায় উহা হইবার
সম্ভাবনা, তন্নিবারণার্থে বলকাবক ঔষধ, বিশেষতঃ লৌহযটিত ঔষধ,
কডুলিভার অয়েল এবং নাইট্রিক বা সল্ফিউরিক অ্যাসিডেব সহিত
কোয়াশিয়া ইন্সিউজন্ ব্যবহারে বিলক্ষণ উপকার দর্শে ।

বৈদ্যকে: গুল্মাদি রোগ চিকিৎসা ।

• গুল্মরোগের কারণ, উৎপত্তি ও স্থাননির্ণয় —অবিধি পূর্বক
আহাব ও পরিশ্রমে বায়ু, পিত্ত, কফ . . . তত্ত্ব দূষিত হইয় আয়ামায়ে
প্রবেশ কবিয়া হৃদয়, নাভি, মুত্রাশয় ও ছই পার্শ্বে গ্রন্থিব অর্থাৎ গাইটের
স্থায় গুল্ম জন্ময় . . .

গুল্মের লক্ষণ —হৃদয় ও মুত্রাশয়ের মধ্যস্থানে গতিশীল অথবা
স্থির গোলাকাব যে গ্রন্থি অর্থাৎ গাইট জন্মে, এবং যাহা কখন স্বাভা-
বিক, কখন ছোট হইয়া থাকে, তাহাকে গুল্ম বুলে . . .

গুল্মের প্রকারভেদ ।—গুল্ম পাঁচ প্রকার, যথা,—বায়ুজনিত, পিত্তজনিত, কফজনিত, ত্রিদোষজনিত রক্তজনিত বক্তজনিত গুল্ম-রোগ কেবল স্রীলোকেবই হইয়া থাকে

গুল্মের পূর্বলক্ষণ । গুল্মবোগ জন্মিবাব পূর্বে কোষ্ঠবদ্ধ, অকচি, অস্ত্র অর্থাৎ পেটে নানাপ্রকার শব্দ, আটোপ অর্থাৎ বেদনার সহিত পেটে শুষ্কতা, আধ্বান, অগ্নিমান্দ্য এবং পুনঃপুনঃ উদ্যাব হইয়া থাকে ।

গুল্মের সাধারণ লক্ষণ —অকচি, মল ও মুত্ররোধ, কখন অতি কষ্টে মল ও মুত্রত্যাগ, বায়ু আধিক্য, পেটে নানাপ্রকার শব্দ ও উর্দ্ধবাত অর্থাৎ হিষ্টা, শ্বাস এই সকল লক্ষণ সর্ব প্রকার গুল্মেই হইয়া থাকে ।

বাতজনিত গুল্মের কারণ ও লক্ষণ ।—অসময়ে অধিক বা কম মাত্রায় কক্ষ দ্রব্য পান ও ভোজনে, অবিধিপূর্বক ব্যায়ামে, মল ও মুত্রের বেগবোধে, শোক ও কোন প্রকার আঘাতে, অতিশয় বিবেচনে এবং উপবাসে বায়ু ক্রুপিত হইয়া গুল্মবোগ জন্মায় এই গুল্ম কখন নাভিতে কখনও পার্শ্বে চলিয়া বেড়ায়, কখন পবিমানে ছোট, কখন বড় হইয়া থাকে এবং সকল সময়ে বেদনা থাকে না বিস্তৃত বায়ু ও কোষ্ঠ-বদ্ধ, কঠ ও মুখশোষ, শীততজ্বর অর্থাৎ কফজ্বর, হৃদয়, পার্শ্ব, শ্লক্ক, যন্তুক ও পেটে বেদনা হইয়া থাকে । রোগী শবীর বক্তবর্ণ অথবা শ্যামবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ ও পীত মিশ্রিত বর্ণ হয় এবং কক্ষ, কষায়, তিক্ত ও ঝাল দ্রব্য সহ্য হয় ন । আহার পবিপাক পাইলে বোগের বৃদ্ধি পায় এবং ভোজন কবিলে কম পড়ে

চিকিৎসা ।—হিঙ্গু, ত্রিকটু, আকনাদি, হরুষ, কুরিতকী, শাঠি, বনযমানী, ক্ষেত্র যমানী, তেঁতুল ছাল ভস্ম, অম্ল বেতু, তম্ব দাড়িম, কুড়, ধনিয়া, জীবা, চিতামূল, বচ, যবক্ষাব, সাচিক্ষাব, মৈন্ধব, সচস লবণ, চই, এই সমুদয় সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া মদ্য বা উষ্ণ জলের সহিত সেবন কবিলে বাতশৈথিল্য গুল্ম ও অনাহ প্রভৃতি বক্ত বোগ নিবারিত হয় । গুড়িকা প্রস্তুত কবিলে হইলে ঐ চূর্ণ সকল ছোলঙ্গ লেবুর বসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া প্রস্তুত করিতে হয় ।

হিঙ্গু, কুড়, ক্ষুদ্র ধনিয়া, হবিতকী, তেউড়ী মূল, বিটলব, মৈন্ধব, যবক্ষাব, শুঠ, এই সমুদয় চূর্ণ হুতে ভাজিয়া যবেব কাথেব সহিত পান কবিলে গুল্ম ও তজ্জনিত উপদ্রব সমস্ত নিরাকৃত হয় ইহার নাম 'হিঙ্গুদি চূর্ণ' ।

কাঙ্ক্ষায়ন গুড়িকা —শাঠি, কুড়, দস্তীমূল, চিতামূল, অড়ব, শুঠ, বচ, তেউড়ীমূল, প্রত্যেক ১ পল, হিঙ্গু ৩ পল, যবক্ষাব ২ পল, অন্নবেতম ২ পল, যমানী, জীবা, মবিচ, ধনিয়া, প্রত্যেক অর্ধ পল । এই সমুদয় চূর্ণ একত্র কবিয়া টাবা লেবুব বসে মাড়িয়া ৪ মাসা পরিমাণে গুড়িকা-প্রস্তুত কবিবে ইহার এক, দুই বা তিন গুড়িকা একেবাবে সেবনীয় । অল্পপান অথোষ জল, কাঁজি, মদ্য, মাংসমুস, ঘৃত ও দুগ্ধ প্রভৃতি । গোমূত্রেব সহিত সেবনে কফজ, দুগ্ধেব সহিত পৈতৃতিক এবং মদ-মাংসের সহিত সেবনে বাতিক গুল্ম নষ্ট হয় ।

পিণ্ডজনিত গুল্মের কারণ —কটু অর্থাৎ ঝাল, অম্ল অর্থাৎ টক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও বিদগ্ধপাক দ্রব্য ভোজন, অতি ক্রোধ, অত্যন্ত মদ্য-সেবন, অত্যধিক রৌদ্রসেবা এবং অজীর্ণজনিত অপকবস ও দুগ্ধবসদ্বাৰা পিণ্ড কুপিত হইয়া পিণ্ডজনিত গুল্ম উৎপাদন কবে । এই গুল্মে জ্বর, পিপাসা, মুখ ও সমস্ত শবীর রক্তবর্ণ, তাহাবীয় বস্ত্র পবিপাক হওয়াব সময় অতিশয় বেদনা, ঘর্ষ ও জ্বালা হয় এবং স্পর্শ করিলে অত্যন্ত বেদনা বোধ হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—চিনি ১৬ পল । পাকার্থ মিলিত ত্রিফলা ২ সের, জল ১৬ সেব, শেষ ৩ সেব ; গোঁড়া লেবুব রস ১৬ পল, যথাবিধানে পাক কবিবে । ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুণা, বিড়ঙ্গ, জীবা, ব্রহ্মজীরা, যমানী, বনযমানী, চিবাতা, তেউড়ী, দস্তীমূল, নিম্বুল, মৈন্ধব, অজ, প্রত্যেক ২ তোলা, লৌহ ২ পল, ঘৃত ৪ পল ; এই সমুদয় প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন কবিয়া লইবে । এই ঔষধ সেবন করিলে গুল্মাদি বিবিধ রোগ নষ্ট হয় । ইহার নাম "বসাধনামৃত লৌহ" ।

কফজনিত গুল্মের লক্ষণ ।—ইহাতে স্তিমিততা অর্থাৎ জল-মিণ্ড বস্ত্রে আবৃত গাত্রের স্থায় আর্দ্রতা, ক্ষীণতা, বিনম্রতা, কাশী,

অকচি, শবীবের ভারবোধ, অগ্নি বেদনা, শীতবোধ, গুল্ম কঠিন ও উন্নত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা — ভ্রাম, পাবদ, অত্র, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, যবক্ষার, প্রত্যেক সমানভাগ চিতাব বসে ১ দিন মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা কবিবে। অল্পপান পানের বস ইহা সেৱন করিলে বাতগুল্ম উপশমিত হয়। ইহার নাম “শিখী বাড়বে” বস।

ত্রিদোষজনিত গুল্মের লক্ষণ — ত্রিদোষজনিত গুল্মে অত্যন্ত বেদনা ও জ্বালা হয়, এবং উহা প্রস্তুততুল্য কঠিন ও উন্নত, শীত বিদগ্ধ পাক, মন ব্যাকুল, মন্দাগ্নি, শবীব ক্লান্ত, বিবর্ণ ও দুর্বল হয়।

চিকিৎসা :- ঋথ পোটলী বন্ধ হবিতকী ২৫ টা দস্তীমূল ২৫ পল, চিতামূল ২৫ পল। পুবা৩ন গুড় গুলিয়া ছাঁকিয়া লইয়া উহাব সহিত পুর্কো৩ হরিতকী ২৫ টা দিয়া পাক কবিবে। আসন্ন পাকৈ তেউড়ী চূর্ণ ৪ পল, তিল তৈল ৪ পল, পিপ্পল চূর্ণ ৪ তোলা, শুঁঠ চূর্ণ ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া নামাইবে, শীতল হইলে মধু ৪ পল, গুড়তক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, প্রত্যেক ২ তোলা মিশ্রিত কবিয়া লইবে। সেবনেব মাত্রা ২ তোলা ও একটী হরিতকী। ইহাতে বিবেচন হইয়া গুল্ম, প্লীহা, শোথ প্রভৃতি অনেক বোগ নষ্ট হয়। ইহার নাম “দস্তী হবিতকী।”

গুল্মকালনেল রস ।—পাবদ, গন্ধক, হরিতাল, ভ্রাম, সোহাগা, যবক্ষার প্রত্যেক ২ তোলা, মুখা, পিপ্পল, শুঁঠ, মবিচ, গজপিপ্পলী, হবিতকী, বচ, কুড়, প্রত্যেক ১ তোলা। এই সমুদায় একত্র মাড়িয়া ক্ষেত-পাপড়া, মুখা, শুঁঠ, আপাঙ্গ, আকুনাদি ইহাদেব কাথে ভাবনা দিয়া শুকাইয়া পুনর্বার চূর্ণ কবিয়া লইবে। মাত্রা ৪ রতি, অল্পপান হবিতকী বজল। ইহাতে সকল প্রকার গুল্ম বিনষ্ট হয়।

রক্তজনিত গুল্মের কারণ ।—যে স্ত্রী অগ্নি দিন মাত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে, অথবা অপক গর্ভ ত্যাগ কবিয়াছে সেই প্রসূতিব এবং ঋতুকালে অহিতজনক দ্রব্য ভোজনশীল স্ত্রীলোকদিগেব, কুপিত বায়ু বক্ত অবলম্বন কবিয়া গুল্মবোগ জন্মায়। এই গুল্মে জ্বালা, বেদনা, পিত্তজনিত

ওলোর লক্ষণ ও গর্ভেব লক্ষণ সকল একাংশ পায় পবন্ত গর্ভস্থ শিশু অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত স্পন্দিত হয়, বিকৃত ওলো বেদনায়ুক্ত পিণ্ডবৎ পদার্থ বিলম্বে সঞ্চালিত হয়, গর্ভেব সহিত এইমাত্র প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে দশমাস অতীত হইলে বক্তৃজনিত ওলো চিকিৎসা করা কর্তব্য ।

মুষ্টিযোগ —শুষ্কা, নাট্যকবজের ছাল, দেবদারু, বাগুনহাটী, পিঁপুল, এই সমুদয় বাটিয়া তিলেব কাথেব সহিত সেবন করিলে রক্ত-ওলো প্রশমিত হয়

ভেলাব কল্ক ও কষায় দ্বারা যথাবিধি মৃতপাক করিয়া চিনিব সহিত সেবন করিলে বক্তৃওলো এবং মধুব সহিত পান করিলে কফওলো নষ্ট হয় ।

পাঞ্চানন রস —পারদ, তুঁতিয়া, গন্ধক, জয়পাল, পিঁপুল, সৌদাল-ফলের মজ্জা, এই সমুদয় মিজের আটায় ভাবনা দিয়া ১ বতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে অল্পপান আমলকীব রস বা তৈতুল পত্রের রস । পথ্য—দধি ও অন্ন ; ইহাতে বক্তৃওলো নিবার্য হয় ।

ওলোর অসাধ্য লক্ষণ —ওলো ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উদর ব্যাণ্ড হয় এবং বস, রক্ত, মাংস প্রভৃতি ধাতু আশ্রয় করিয়া শিরাসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া কচ্ছপের পৃষ্ঠদেশের ছায়া উন্নত হইলে বোগী দুর্বলতা, অকুচি, বিবগিয়া, কাশ, বমি, মনের অবসন্নতা, জ্বর, পিপাসা, তন্দ্রা ও গর্দ্যারা আক্রান্ত হইয়া থাকে এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত ওলো অসাধ্য, অর্থাৎ চিকিৎসা দ্বারা প্রশমিত হয় না জ্বর, শ্বাস, বমি, অতিসার এবং হৃদয়, নাস্তি ও হস্ত-পদে শোথ অথবা শ্বাস, বেদনা, পিপাসা, অকুচি, হঠাৎ এম্বিরূপ ওলোর লয় ও দুর্বলতা দ্বাবা আক্রান্ত ওলোরোগী স্বত্বমুখে পতিত হয়

উদররোগের কারণ ।—অত্যন্ত দোষজনক বিকৃত জবা অর্থাৎ সংযোগ দেশকালমাত্রাদির বিপরীত জবা ভোজনে ও অগ্নিমান্দ্যে বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া উদরবোগ জন্মায় । সমস্ত বোগই মন্দাগ্নি হইতে উৎপন্ন হইবে তাহাতে আব কথা কি

উদরবোগের উৎপত্তি —হৃদিপ্রাণ্ড বিকৃত বায়ু পিণ্ড ও কফ,

ধর্গবহ ও জলবহ প্রণালী সমূহ বোধ করিয়া এবং প্রাণ, অপান বায়ু ও অগ্নি দূষিত করিয়া উদরবোগ জন্মে

উদররোগের সাধারণ লক্ষণ । আধুনান অর্থাৎ পেটফাঁপা, চলিতে অক্ষমতা, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, অঙ্গের অবসন্নতা, বায়ু ও মূত্রবোধ, জ্বালা, তন্দ্রা, এই সমস্ত লক্ষণ সকল প্রকার উদরবোগেই ঘটিয়া থাকে

উদররোগের প্রকারভেদ ।—উদর রোগ আট প্রকার, যথা,—
বাতজনিত, পিত্তজনিত, কফজনিত, ত্রিদোষজনিত, প্লীহোদর, বক্কোদর, ক্ষতোদর, উদকোদর

বায়ুজনিত উদররোগের লক্ষণ —বাতোদবে হস্ত, পদ, নাভি ও পেটে শোথ, কুক্ষি, পার্শ্ব, উদর ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা, সন্ধিস্থলে ভঙ্গবৎ বেদনা, শুষ্ক কাশি, হস্তপাদাদি বেদনা, শরীরেব নিয়মেশ ভাব, মলেব কুঠিনতা, চর্ম্ম নখ প্রভৃতির শ্যামবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণপীত মিশ্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ, বিনা কাবণে উদরাগ্নয়েব বৃদ্ধি ও হ্রাস, উদবে শূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, সূক্ষ্ম ও কৃষ্ণবর্ণ শিরাসমূহে ব্যাণ্ড হয়, পেটে আঘাত করিলে আহত স্থানে বায়ুপূর্ণ চর্ম্মপুটকেব অর্থাৎ তিস্তির স্থায় শব্দ হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন বায়ু, বেদনা জন্মাইয়া শব্দ পূর্ব্বক সমস্ত উদবে চলিয়া বেড়ায়

চিকিৎসা —করকট, সচল, মৈন্ধব, যবক্ষাব, যমানী, বনযমানী, পিঁপুল, চিতামূল, শুঁঠ, ছিং, বিটলবর্ণ, প্রত্যেক সমস্তাগ চূর্ণ হুতে মাড়িয়া আহাবেব প্রথম প্রাসেব সহিত ভোজন করিলে বাতোদর গুল্ম ও অজীর্ণ প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয় ।

সিজের আটায় তণ্ডুল ভিজাইয়া বাখিয়া তদ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে ৭ দিবসের মধ্যে উদররোগ নষ্ট হয়

মহিষেব মূত্র ও দুগ্ধ পাশি করিয়া অল্প আহার পবিত্যাগ করিলে সপ্তাহ মধ্যে উদররোগেব শান্তি হয় ইহার নাম “সায়ুজ্জাদ্য চূর্ণ ।”

পিত্তজনিত উদররোগের লক্ষণ ।—পিত্তজন্মিত উদররোগে জ্বর, মুচ্ছা, জ্বালা, পিপাসা, মুখেব তিক্ততা, জ্বর, অতীসার, চর্ম্ম ও নখ প্রভৃতি পীতবর্ণ, উদর হবিজাবর্ণ এবং পীত ও তাম্র বর্ণ শিবা সমূহে ব্যাণ্ড হয়, বোম্বী ধর্ম্মযুক্ত হইয়া জ্বালাতে কাতব হইতে থাকে, ইহা ভিন্ন

উদ্যানে ঘূম নির্গমন, পোট শীঘ্র পাকিয়া উঠে ও স্পর্শে কোমল বেগ হয় এবং উহাতে বেদনা থাকে

চিকিৎসা — স্বতঃ ৪ সেব বাল্যার্থ অ কন্দেবু অ ট ২ পল, মিঞ্জো আট ৬ পল, হবিতকী, কামলা গুড়ি, শ্যামালত, মোহাল ফলেবু মল্ল, শ্বেত অপবাজিতাব মূল, নীলমুগ, ভেটুর্ডী, দস্তীমূল, চোরকাচকি, চিতামূল, প্রত্যেক ১ পল, পাকার্থ জল ১৬ সেব । ই হতেব যত বিন্দু সেবন কবাইবে, তত বাব বিবেচন হইবে । ইহাতে সকল প্রকার উদবী ও অন্ত্র অনেক বোগ নষ্ট হয় । ইহাব নাম “বিন্দু স্বত ।”

কফজনিত উদররোগের লক্ষণ ।—কফজনিত উদবোগে শরীরের দুর্বলতা ও গুরুতা, শোথ, স্পর্শ জ্ঞান-হীনতা, নিদ্রা, বিবমিষা, অকচি, শ্বাস, কাশ, চর্ম্ম নখ প্রভৃতি শ্বেতবর্ণ, উদর শুষ্কিত ও অত্যন্ত স্ফীত, শ্লিষ্ণ শিবা সমুদ্রে ব্যাপ্ত, কঠিন, স্পর্শে শীতল, গুরু ও স্থির হয় এবং উদর অধিক বিলম্বে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে

চিকিৎসা ।—শুঁচি, মবিচ, পাণা, গন্ধক, মোহাগা, প্রত্যেক ১ তোলা, জয়পাল ৩ তোলা, এই সমুদয় একত্র জলে পেষণ করিয়া ২ বতি প্রমাণ বটিকা করিবে, অল্পপান চিনিব জল । ইহাব নাম “ইচ্ছাভেদী রস ”

ত্রিদোষজনিত উদররোগের কারণ ও লক্ষণ ।—অসাদী স্রী প্রদত্ত নখ, লোম, মল, মূত্র, আর্দ্রযুক্ত অন্ন ও পানীয় স্রবা, শত্রু-প্রদত্ত বিষ ভোজনে, দুগ্ধিত জল ও দুধাবিষ সেবনে বক্ত, বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া উদররোগ জন্মায় । এই রোগ শীতল ব যুগ মেঘাচ্ছন্ন দিনে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, জ্বালা, শরীরের পাণ্ডুবর্ণতা, ক্লান্ততা ও পিপাসা জন্মে । অধিকন্তু বোগী পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে । এই ত্রিদোষ-জনিত বোগকে কেহ কেহ দুষ্যোদব বলিয়া থাকেন ।

চিকিৎসা—পূর্ব্বলিখিত “ইচ্ছাভেদী রস ”

নারাচরস ।—পাণা, মোহাগা, মবিচ, প্রত্যেক ১ তোলা, গন্ধক, পিঁপুল, শুঁচি, প্রত্যেক ২ তোলা, নিম্বু য জয়পাল ৯ তোলা । এই সমুদয় জলে মাড়িয়া ২ বতি প্রমাণ বটিকা করিবে । অল্পপান তত্ত্ব লোদক ।

প্লীহোদবের কারণ ও লক্ষণ —বিদগ্ধপাকী ও ক্লেদজনক দ্রব্য ভক্ষণে, অত্যন্ত দুষিত বস্তুর, কফ ও প্লীহা বৃদ্ধি কবিয়া যে উদরবোগ জন্মায়, তাহাকে প্লীহোদব কহে । এই উদরবোগ বামপার্শ্বে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বোঁগী দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হয়, এবং পিত্তজনিত মন্দাগ্নি ও কফজনিত মন্দ জ্বাক্রান্ত হয় । দক্ষিণ পার্শ্বে বৃদ্ধি পাইয়া উদরবোগ জন্মিলে তাহাকে “যকৃদাল্লুদব বলে ”

চিকিৎসা —হরিতকী, মবিচ, পিপুল, মোহাগা প্রত্যেক সম-ভাগ, সর্বসমান জয়পাল । সিজেব আটায় মাড়িয়া ২ বতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত কবিবে

সেবনের নিয়ম ।—একটী হরিতকী তুলোদকে বাটিয়া তাহার সহ ৩ একবাবে ২ টী বটিকা সেব্য । যাবৎ উষ্ণজলাদি পান কবা যায়, তাবৎ বিবেচন হইতে থাকে, শীতল জল পান করিলে স্বাস্থ্যলাভ হয় ইহাব নাম ‘অভয়া বটী ’

বন্ধোদরের কারণ ও লক্ষণ ।—ভক্ষ্য দ্রব্য বা পিচ্ছিল দ্রব্য, অর্থাৎ শাক শালুক প্রভৃতি অথবা ক্ষুদ্র পাষণ খণ্ড দ্বারা অন্ত্রপথ বদ্ধ হইলে সন্মার্জনীর আঘাতে প্রক্ষিপ্ত তৃণসমূহ যেমন ক্রমে ক্রমে জমা হয়, সেই প্রকার যথাযোগ্য দোষে মল অগ্রে জমা হইলে যে উদর-বোগ জন্মায়, এবং যাহাতে ক্ষদ্র ও নাভির মধ্যস্থান অর্থাৎ অগ্নিপাক-স্থান উন্নত, কোষ্ঠবদ্ধ, অথবা অতি কষ্টে অল্প অল্প মল নির্গত হয়, তাহাকে বন্ধোদব বা বদ্ধগুদোদব বলে ।

চিকিৎসা — ‘ইচ্ছাভেদী বস ’

ভেদিনী বটী ।—গোক্ষুব, সিজেব আটা, পিপুল, এই সমুদয় একত্র মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত কবিবে ।

ক্ষতোদরের কারণ ও লক্ষণ ।—ভক্ষ্য বস্তু সহিত কটেকাদি ভক্ষণ করিলে এবং ঐ কটেকাদি দ্বারা অন্ত্র ক্ষত হইলে, অথবা ইঁচি, অতিশয় ভোজন প্রভৃতি কারণে অন্ত্র বিদীর্ণ হইয়া ক্ষত হইলে যে উদরবোগ জন্মে ও নাভির নিম্ন প্রদেশ ক্ষীণ হয় এবং ক্ষত স্থান হইতে গলিত শব্দ মলধাব দিয়া পুনঃ পুনঃ নির্গত হয় ও উহাতে

নানা প্রকার বেদন হইয়া থাকে, তাহ কে ক্ষতৌদব বা পরিণত বৌদব বলে

চিকিৎসা। “সামুজাদ্য চূর্ণ” *

উদকৌদবের লক্ষণ।—জলৌদবে পেট অত্যন্ত স্ফীত, শ্লিথ ও জলপূর্ণ, এবং নাস্তি উপবেশ দিকে উঠিয়া গোলাকার হয়, সমস্ত পেটে বেদন ও শব্দ হইয়া থাকে ; যেমন জলপূর্ণ চৰ্ম্মপুটকেব অর্থাৎ ভিস্তিব কোন স্থান চাপিলে অন্য স্থান স্ফীত ও আঘাত কবিলে সম্যাস্থিত জল কম্পিত হইয়া উঠে, সেইরূপ পেটেব কোন স্থান চাপিলে অন্যস্থান স্ফীত ও আঘাত কবিলে জল কম্পিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—পাবদ ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, মনছাল, হবিজা, জয়পাল বীজ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, চিতামূল, প্রত্যেক ১ তোলা এই সমুদয় জব্য দস্তী, গিজ ও ভৃঙ্গরাজের বসে ভাবন দিয়া বটিকা প্রস্তুত কবিবে বয়স ও বল বিবেচনা করিয়া ২ বতি হইতে ৪ বতি মাত্রা ব্যবস্থা কবিবে ঔষধ সেবন কবিয়া বিবেচন হইলে তক্রসংযুক্ত শীতল পথ্য ব্যবস্থা কবিবে ইহাব নাম “জলৌদরাবি বস ”

উদররোগের কৃচ্ছ্র সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ।—প্রায় উদব-বোগ উৎপন্ন মাজেই বহু যত্নে প্রশমিত হয়, তন্মধ্যে বলাবান ব্যক্তিব অজাতাম্বু উদববোগ অল্প দিনের হইলেও বহু যত্নে প্রশমিত হয় বকৌদব, সমস্ত জাতৌদক উদব ও পরিণতৌদব বোগ পঞ্চদশ দিবসের অধিক হইলে প্রায়ই বোগীকে বিনাশ কবে।

ক্রিমিনির্গম।—সাধারণতঃ বাহ ও অভ্যন্তরভেদে ক্রিমি দুই প্রকার বাহ ক্রিমি ময়লা হইতে, এবং অভ্যন্তর ক্রিমি কফ, শোণিত ও বিষ্ঠা হইতে জন্মগ্রহণ কবে ; স্তব্ধতা উহাবা উৎপত্তিভেদে চতুর্বিধ এবং নামভেদে বিংশতি প্রকার বাহ ক্রিমি আকৃতিতে তিলসদৃশ অর্থাৎ তিলের ন্যায় ; উহাবা কেশ ও বস্ত্রাঞ্জিত, বহুপাদ এবং সূক্ষ্ম হয় ; উহাদিগেব নাম যুবী ও লিখ্যা। ইহাবা কোটি, দীড়কা, কণ্ডু, এবং গণ্ড বোগাদি জন্মায়

* পূর্বে লিখিত হইয়াছে।

ক্রিমি রোগের কারণ —যে ব্যক্তি অজীর্ণ অর্থাৎ ছুপ্পাচ্য বা অপাক জ্বা ভোজন, মদত গধুবান্ন ভোজী, জ্বা তব্যপায়ী, পিষ্টক ও গুড় উপভোজী এবং ব্যাযামবর্জিত, দিবানিত্রা ও বিকৃত ভোজনকাৰী অর্থাৎ একত্র গীবমৎস্যভোজী ব্যক্তির ক্রিমিবোগ জন্মে

ক্রিমিবিশেষে নিদানবিশেষ —মাচ, পিষ্টক, অন্ন, লবণ, গুড় এবং শাক ভক্ষণকাৰী পুৰীষজ ক্রিমি, মাংস, মৎস্য, গুড়, ক্ষীর, দধি ও অন্নভোজী কফজ, এবং সংযোগাদি-বিকৃত, অজীর্ণকাৰী ও শাকাদি ভোজনকাৰী ব্যক্তির বক্তজ ক্রিমি বোগ জন্মায় ।

অভ্যন্তর ক্রিমির লক্ষণ —যে ব্যক্তির উদরে ক্রিমি জন্মে, তাহার জ্বর, শবীবের বিবর্ণতা, উদরে গুলবৎ বেদন, হ্রস্বোণ, অঙ্গের অবসন্নতা, ভ্রম, অকচি, অতিসার এই সমস্ত লক্ষণ হয়

কফজ ক্রিমির লক্ষণ —আমায়িক কফ হইতে জাত ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শবীবের সকল স্থানে গমন করে; ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি বিস্তৃত ও সূর্যমণ্ডলের স্থায় গৌলাকাৰ বা চন্দ্রদলের স্থায় চেপ্টা ও দীর্ঘকাৰ, কতকগুলি কিঞ্চিদক অর্থাৎ কেঁচু ব ভূম্য, কতকগুলি বা দ্বাষ্টাক্রুরের স্থায় দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম ইহাদের মধ্যে কোনগুলি শ্বেতাভায়ুক্ত, কোনগুলি তাম্রাভায়ুক্ত নামভেদে তাহারা সাত প্রকাৰ

ক্রিমির নাম ও উপদ্রব —অজ্ঞান, উদবান্ধ, হৃদযাদ, মহা-গুদ, চাক, দর্ভকুম্ভ, স্নগন্ধ, এই সাত প্রকাৰ ক্রিমি হইতে মল্লস্যের স্থল্যম অর্থাৎ উপস্থিত বমনের ন্যায় বোধ যুক্ত হইতে লালাত্রাব, অপাক, অকচি, মুচ্ছা, ছর্দি, জ্বর, আনাহ অর্থাৎ মল মুখ বোধ, দেহের বৃশতা, ইচ্চি এবং নাসাত্রাব হয়

বক্তজ ক্রিমির লক্ষণ ।—বক্তবাহী শিবাস্থ বক্ত হইতে যে সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্রিমি জন্মে, তাহারা পাদবহিত, গৌল ও তাম্রবর্ণ, তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন গুলি এত সূক্ষ্ম যে, কেহ যত্নেব সাহায্য ব্যতীত দেখা যায় না । উহারা নামভেদে ছয় প্রকাৰ, যথা,—কেশাদ, রোম, বিম্বংশ, বোম দ্বীপ, উডুম্বর, সৌবস ও মাতৃ এই সমস্ত ক্রিমি কুষ্ঠ বোগ উৎপাদন করে

পূরীষজ ক্রিমিব লক্ষণ ।—পকাশযেতে অধোবিমর্শশীল যে সমস্ত ক্রিমি জন্মে, তাহাণা অভ্যন্ত প্রবৃত্ত হইয়া যে সময়ে আশাশযোন্মুখ হয়, সেই কালে বোগীর উদ্বাহ ও নিশ্বাসে বিষ্টান গন্ধ পাওয়া যায় ক্রিমিব আকৃতি কোনগুলি পৃথু অর্থাৎ বিস্তৃত, কোনগুলি গোলা, কোনগুলি সূক্ষ্ম ও কোনগুলি বা সূল ; কোনগুলি শ্যাম, কোনগুলি পীত, কোনগুলি শুভ্র, কোনগুলি কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট ইহ বা নামভেদে পাঁচ প্রকার, যথা,—ককেকক, মকেকক, সৌমুবাদ, সমুদ্রাখ্য, লেলিছ ইহাণা বিংখগামী হইলে পাতলা দান্ত, শূল, উদবেব শুক্লতা, শরীরেব কৃশতা ও পাণ্ডুতা, বোমহর্ষ, মন্দাগ্নি ও মলদ্বাবে কণ্ড জন্মায় ।

কতিপয় ক্ষুদ্রপ্রায়োগ । প্রথমে কিঞ্চিৎ গুড় খাইয়া পবে বাসিজলেব সহিত খোবাসানী যমানী খাইলে কোষ্ঠস্থ ক্রিমি সকল নির্গত হইয়া যায়

মধুব সহিত পালিতা পত্রের, কেউ পত্রের অথবা সাধাবী রস সেবন কবিলে ক্রিমি নষ্ট হয় ।

মধুব সহিত বিড়ঙ্গ চূর্ণ সেবন কবিলে ক্রিমি নষ্ট হয়

মুখা, ইন্দ্রবকানি, ত্রিফলা, সজিনাছাল, দেবদারু, ইহাদের কাথে পিপুল ১ মাসা ও বিড়ঙ্গ ১ মাসা বাটিয়া মিশ্রিত কবিয়া খাইলে ক্রিমি ও ক্রিমিজন্ত বোগ নষ্ট হয় ।

পলাশবীজেব রস মধুব সহিত সেবন কবিলে কিছা উহার বীজ যোলের সহিত বাটিয়া খাইলে ক্রিমি নষ্ট হয়

খেজুরপাতার কাথ বাসি কবিয়া মধুর সহিত খাইলে সমুদয় ক্রিমি নষ্ট হয়

কাঁচা সুপারি ২ মাসা বাটিয়া ২ তোলা লেবুর রসেব সহিত খাইলে অথবা খেজুরপাতার রস ৪ তোলা ও লেবুর রস ৪ তোলা মিশ্রিত কবিয়া পান কবিলে ক্রিমি নষ্ট হয়

তিৎ-লাউবীজ চূর্ণ ২ তোলা ও তক্র ১ পল একত্র পেষণ কবিয়া সেবন কবিলে ক্রিমি নষ্ট হয়

মধুব সহিত নাবিকেলজল পান কবিলে ক্রিমি নষ্ট হয় ।

খোরাসানী যমানী সৈন্ধব লবণের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে
অজীর্ণ, আমবাত ও ক্রিমিজন্ম বোগ নিবাবিত হয়

পলাশবীজ, ইন্দ্রযুব, বিড়ঙ্গ, নিমছাল ও চিবাতা চূর্ণ গুড়ের সহিত
তিন দিন সেবন করিলে, অথবা পলাশবীজ, যমানী একত্রিত করিয়া
সেবন করিলে সমুদায় ক্রিমি নিঃসারিত হইয়া যায়

কীটগ্রী রস —পারদ, ইন্দ্রযব, বনযমানী, পলাশবীজ, গন্ধক, এই
সকল সমভাবে লইয়া ঘোষালতাব রসে এক দিন মাড়িয়া ১ বতি প্রমাণ
বটীকা প্রস্তুত করিবে অল্পপান চিনিসংযুক্ত বমহৃদ বস

কীটমর্দ রস । পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩
তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, বিষদোড়ি শাক ৫ তোলা, বামুনহাটী ৬ তোলা,
একত্র মাড়িয়া লইবে মাত্রা ৪ মাস অল্পপান মধু ও মুখাব কাথ

ত্রিফলাদ্য স্নাত —হরিতকী ১৬ পল, বরুড়া ১৬ পল, আমলা
১৬ পল, বিড়ঙ্গ ১৬ পল, পিপ্পল মূল, চই, চিতামূল, গুঠ, মিলত ১৬ পল,
জগ ৬৪ সেব, শেষ ১৬ সেব, স্নাত ৪ সেব, কল্কার্থ সৈন্ধব লবণ ২ সেব,
প্রক্ষেপ চিনি ১ সের

হরিদ্রাখণ্ড ।—পালিতার বস ৪ সেব, চিনি ১ সেব, স্নাত ১ সেব,
হরিদ্রা চূর্ণ ১ সেব, এই সমুদয় একত্র পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে চিতামূল
ত্রিফলা, মুখা, বিড়ঙ্গ, কৃষ্ণজীবা, যমানী, সৈন্ধবলবণ, নিসিন্দাফল,
আকনাদি, বিড়ঙ্গ, শ্যামালতা, অনন্তমূল, বাসকমূল, পলাশবীজ, ত্রিকটু,
তেউড়ী, দন্তীমূল, বেণুক, নিমছাল, সোমবাজী, ইহাদের প্রত্যেকের
চূর্ণ ৪ তোলা করিয়া নিক্ষেপ করিবে মাত্রা ১ তোলা, অল্পপান শীতল
জল

বিড়ঙ্গ তৈল ।—কটু তৈল ৪ সেব, কল্কার্থ—বিড়ঙ্গ, গন্ধক, মনঃ-
শিলা, মিলিত ১ সের, একত্র পান করিবে

• ছর্দি অর্থাৎ বমি রোগের সুপ্রাপ্তি ও নিবৃত্তি ।—দূষিত
বায়ু, পিত্ত ও কফ এবং বিকৃত বস্তু দর্শনে ও অপ্রিয় বস্তু ভোজনে ছর্দি
অর্থাৎ বমি বোগ জন্মায় ।

বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষ ও বিকৃত দ্রব্যাদি দর্শনজনিত এবং

অনিষ্ট গন্ধদ্রব্য ভোজনহেতু মনুষ্যে পিচ প্রকৃতি ছদ্ম অর্থাৎ বমন
বেগ উৎপন্ন হয় অতি স্নিগ্ধ আশ্রয় দ্রব্য, অতিশয় শুষ্ক, অকালে
অধিক পরিমাণে ভোজন, অহিতকর দ্রব্য ভোজন, অম, ভয়, উদ্বেগ,
অজীর্ণ, ত্রিমিদোষ, গর্ভোৎপীড়ন, দ্রুত ভোজন, এই সমস্ত কারণে
দূষিত বায়ুপিণ্ডবৎ বলপূর্বক বোগীব-মুখ আচ্ছাদন করিয়া তাহাকে
বেদনা দ্বারা সীতল করে বসিবার ঠাই নাই ছদ্ম

ছদ্মর পূর্বরূপ — বমনোদ্বেগ, উদ্রা ববোধ, মুখ হইতে লবণাণ্ড
জলস্রাব, অগ্নি এবং পানীয় দ্রব্যে অকচি এই সকল লক্ষণ বমিবোগেব
পূর্বে জন্মিয়া থাকে

স্বাতজ ছদ্মর লক্ষণ — বায়ুজনিত বমিতে বৃক্ষস্থলে এবং পার্শ্ব
দেশে বেদনা, মুখশোষ, মস্তক ও নাভিদেশে বেদনা, কাশ এবং অশ্রাব
অঙ্গ বেদনা, শ্বতর্দ, এবং উদ্রাণ ও শব্দ হয় এবং উষ্ম, ভূষ্ম, জ্বর,
কষায় বসন্ত ও ফেন যুক্ত অ-পা পরিমাণে বমি হইয়া থাকে

পিত্তজ ছদ্মর লক্ষণ — পিত্তজ ছদ্মতে বোগীব মুচ্ছ, পিপাসা,
মুখশোষ, মস্তক, তালু অথবা চক্ষুতে স্ফাপ, গলা জ্বালা, লোমহর্ষ,
কফজনিত ছদ্মতে এই সমুদয় লক্ষণ হয় এবং স্নিগ্ধ, ঘন, মধু-বসন্ত
অতিশয় শুভবর্ণ বমি হয়

কফজ ছদ্মর লক্ষণ — বোগীব তন্দ্রা, মুখেব মধুরতা, মুখ
হইতে কফস্রাব নিঃস্র, অকচি, শব্দেব শুকত ও লোমহর্ষ, কফজনিত
ছদ্মতে এই সমস্ত লক্ষণ হয় এবং স্নিগ্ধ, ঘন, মধু-বসন্ত অতিশয় শুভ-
বর্ণ বমি হয়

ত্রিদোষজ ছদ্মর লক্ষণ — ত্রিদোষজ ছদ্মতে বোগীব নিবস্তব
প্রবল বেদনা, অপাক অকচি, দাহ, পিপাসা, শ্বাস, মোহ, এই সকল
লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং অগ্নিসংযুক্ত, নীল কিশা বস্তবর্ণ, ঘন এবং উষ্ম বমি
হয়

কিঁমিজ ছদ্মর লক্ষণ — কিঁমিজ ছদ্মতে বমনোদ্বেগ অধিক
পরিমাণে পকাশ পায়, বিশেষতঃ কিঁমিজনিত উদ্রাণেব শ্রায় চিহ্ন
এবং হইয়া থাকে ।

ছদ্দির অসাধ্য লক্ষণ ।—যে ক্ষীণ ব্যক্তির অতিশয় বেগবন্ত উপদ্রব থাকে, বতপূজযুক্ত এবং চন্দ্রিকাসদৃশ অর্থাৎ মধুবপুষ্কস্থিত গোলাকার অংশের, বর্ণের ন্যায় বগি হয়, তাহাব সেই ছদ্দি অসাধ্য, কিন্তু নিকপদ্রব হইলে সাধ্য, স্নাত্বাং চিকিৎসনীয় ।

চিকিৎসা . কতিপয় স্কুদ্রপ্রয়োগ, —শেতচন্দন ২ তোলা ও আমলকীর বস ২ তোলা একত্র কবিতা কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন কবিলে বগি নিবারণ হয় ।

ক্ষেতপাপড়া ২ তোলা অর্দ্ধ সেব জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাগাইয়া মধু ৪মাসা প্রক্ষেপ দিয়া পান কবিলে বগি নিবারণ হয়

মধুব সহিত হুরিতকী চূর্ণ ভক্ষণ কবিলে বিবেচন হইয়া বগি নিবারণ হয়

ভাজা মুগ ১ পল, জল ২ সেব, শেষ ২ পল, খই চূর্ণ ২ পল, কিঞ্চিৎ মধু ও চিনি মিশ্রিত কবিতা এই জল পান কবিলে বগি, অতিসার, তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর নিবারণ হয়

খই চূর্ণ, কয়েতবেলের শস্ত, মধু, পিপুল ও মবিচ । মধু, হুরিতকী, ত্রিকটু, ধনিয়া ও জীবা । হুরিতকী, গুলঞ্চ, মবিচ, মধু ও পিপুল চূর্ণ, এই তিন প্রকার অবলেহ সেবনে সকল প্রকার বগি ও অকচি নিবারণ কবে

এলাদি চূর্ণ ।—এলাইচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুলআটীষ শস্ত, খই, প্রিয়ঙ্গু, মুখা, বক্তচন্দন, পিপুল প্রত্যেকেব চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত কবিতা চিনি ও মধুব সহিত অবলেহ কবিলে নিবারণ হয় ।

অশ্বথৈব শুষ্ক ছাল পোড়াইয়া কোণ পাত্রস্থ জলে ফেলিয়া নিবাইবে, পবে ঐ জল ছাকিয়া পান কবিলে লীষ বগি নিবারণ হয়

রসেন্দ্র ।—জীবা, ধনিয়া, পিপুল, মধু, ত্রিকটু ও বসমিন্দ্র সমভাগে লইয়া মাড়িয়া সেবন কবিলে বগি শান্তি হয়

উদ্যবর্ত বোগ —বায়ুনিঃসরণ মল, মুত্র, জুতা অর্থাৎ হাই, উকাব, শুক্র, ক্ষুধা, পিপাসা, দীর্ঘশ্বাস ও নিদ্রা এই সকল বোগ করিলে উদ্যবর্ত বোগ উৎপন্ন হয়

বায়ুরোধ জন্য উদাবর্তের লক্ষণ । —বায়ুরোধ করিলে পেটে কবিলে বায়ু বদ্ধ, মল ও মূত্রবোধ, আধুন অর্থাৎ পেটফাঁপা, শবীরেব দুর্বলতা ও বেদন, এবং উদবে অল্প প্রকার বায়ুজ্বাতিও বোগ অর্থাৎ শ্বচীরেবধনবৎ বেদনা জন্মিয়া থাকে ।

মলরোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ —মলরোধ করিলে পেটে ওড় ওড়া নানা প্রকার বেদনা, মলবোধ, উদ্বাত্ত অর্থাৎ শ্বাস, হিকা প্রভৃতি এবং মুখ দিয়া মল নির্গত হয় ।

মূত্ররোধজন্য উদাবর্তের লক্ষণ —মূত্র বোধ করিলে মূত্রাশয়ে ও লিঙ্গনাগে বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ, মস্তক বেদনা, বিনাম অর্থাৎ শবীর নত এবং কুঁচকীতে বন্ধনবৎ যাতনা হইয়া থাকে ।

জ্বস্তারোধ জন্য উদাবর্তের লক্ষণ —জ্বস্তা অর্থাৎ ছাই বোধ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া মল্যাস্তত্ত, গলনালী বোধ, শিরবোগ, এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখবোগাদি উৎপন্ন হয় ।

অশ্রুরোধ জন্য উদাবর্তের লক্ষণ —আনন্দ অথবা শোক জন্ত নেত্রজল বোধ করিলে মস্তক ভাব হয়, এবং নেত্রবেগ ও পীনস অর্থাৎ সর্দি জন্মিয়া থাকে ।

হাঁচিরোধজন্য উদাবর্তের লক্ষণ । —হাঁচি রোধ করিলে মস্তকেব অর্কদেশ অথবা সমস্ত বেদনা, মল্যাস্তত্ত ও বাতবোগবিশেষ এবং ইন্দ্রিয়শক্তিও দুর্বলতা ঘটে ।

উদার রোধ জন্য উদাবর্তের লক্ষণ । —উদার রোধ করিলে বায়ুদ্বারা কষ্ট ও মুখ পরিপূর্ণ, অব্যক্ত ভাষণ, নিশ্বাস বোধ, শ্বচীরেবধনবৎ বেদনা, হিকা প্রভৃতি হইতে দেখা যায় ।

বমনরোধজন্য উদাবর্তের লক্ষণ —বমি রোধ করিলে চুলকানি, অকটি, শোথ, পাণ্ডুবোধ, জ্বর, গুষ্ঠবোগ, এবং গ ও বিবগিয়া প্রভৃতি বোগ জন্মে ।

শুক্রেবগরোধজন্য উদাবর্তের লক্ষণ । —শুক্রেবগ বোধ করিলে মূত্রাশয়, মলদ্বার ও অণ্ডকোষে শোথ ও বেদন, মূত্রবোধ, শুক্রাশবীর ও শুক্রজ্ঞান হয় । এতদ্ভিন্ন শুক্রজন্ত ন না প্রকার ব্যাধি জন্মে ।

ক্ষুধারোধ জন্য উদাবর্তের লক্ষণ —ক্ষুধাবোধ কবিলে তন্দ্রা, অঙ্গবেদনা, অকচি, বিনা পবিত্রমে এমনজ্ঞান ও দর্শনশক্তির হ্রাস হইয়া থাকে।

তৃষ্ণাবোধ জন্য উদাবর্তের লক্ষণ।—তৃষ্ণা বোধ কবিলে কণ্ঠ ও মুখশোষ, শ্রবণশক্তিব হ্রাস ও হৃদয়ে বেদনা হয়

দীর্ঘশ্বাস রোধজন্য উদাবর্তের লক্ষণ।—পরিগ্রাস্ত ব্যক্তি নিশ্বাস বোধ কবিলে হ্রোঃগ, মোহ, গুল্ম বোগ জন্মে।

নিদ্রারোধ জন্য উদাবর্তের লক্ষণ।—নিদ্রা রোধ করিলে জ্বন্তন, শবীব বেদনা, চক্ষু ও মস্তকেব জড়তা ও তন্দ্রা জন্মিয়া থাকে

বায়ুজন্য উদাবর্তের লক্ষণ।—বক্ষ অর্থাৎ স্নেহশূন্য, কষায়, কটু অর্থাৎ ঝাল ও তিক্ত দ্রব্য ভক্ষণে কুপিত বায়ুকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া অচিবাৎ উদাবর্ত রোগ জন্মে অপরবায়ু, মল, মূত্র, বক্ত, কফ ও মেদবহ স্রোত সকল বদ্ধ করিয়া মল শোষণ কবে এবং হৃদয়ে ও মূত্রাশয়ে বেদনা, ক্লান্তি ও বিবমিয়া উপস্থিত কবে, এবং বোগী অতি কষ্টে বায়ু ও মলমূত্র পবিত্র্যাগ করিয়া থাকে এতদ্ভিন্ন শ্বাস, কাশ, নাসিকা হইতে কফস্রাব, দাহ, পিপাসা, মোহ, জ্বর, হিক্কা, শিববোগ, চিও-চাঞ্চল্য, শ্রবণশক্তিব হ্রাস ও অন্ত্র নানা প্রকার বাত বোগ জন্মে

আনাহ রোগ যে বোগ একে একে সঞ্চিত, অপর রস, অথবা মল বায়ু কর্তৃক বদ্ধ হইয়া যথানিয়মে অর্থাৎ দাস্ত ও প্রস্রাবরূপে নির্গত না হয়, তাহাকে আনাহ বোগ বলে

আম ও মল জন্য আনাহের লক্ষণ।—অপর বস জন্ম আনাহে নাসাস্রাব, তৃষ্ণা, মস্তক বেদনা, আমাশয়ে বেদনা ও গুরুতা, হৃদয়েব জড়তা ও উদ্যাব হয় পাকশায়ে মল জন্য আনাহ কটী ও পৃষ্ঠদেশের জড়তা, মলমূত্র বোধ, মুচ্ছা, পাকশায়ে বেদনা ও বমিতে মল নির্গত, শোথ ও পূর্বেও অলসকেব লক্ষণ সমুদয় দৃষ্ট হয়।

উদাবর্তের চিকিৎসা —বায়ুজন্য উদাবর্তে স্নেহ, যথা,— তৈল ঘৃতাদিব স্নেদ, প্রদাহানন্তর নিরুহক্রিয়া কর্তব্য, মল নিবোধ জন্ম উদাবর্তে আনাহাক্রিয়া বিধেয়

নারাচ চূর্ণ।— চিনি ১ পল, তেউড়ি ১ পল, পিঁপুল চূর্ণ ২ তে লা, মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ভোজনের পূর্বে ২ তে ল আনলেহু অর্থাৎ ২ ব টিয়া খাইলে উদাবর্ত্ত বোগ নাশিত হয়।

নারাচ রস - পারা, গন্ধক, মবিচ, পাতোক এক ভাগ, মে হাগ পিঁপুল, শুঁচি প্রত্যেকে ২ ভাগ, সর্বসমান নিস্তু ম জ্বলান, এই সমুদয়কে মিজেব অর্থাৎ তিন দিবস মর্দন করিয়া ন বকেলের মধ্যভাগে স্থাপন করতঃ এবং অগ্নিতে প ক করবে। পবে তাহ'ব ভিত্তব হইতে ঔষধ উদ্ধার করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ নাভিদেহে প্রলেপ দিলে বা ইহাব গন্ধ আত্মাণ করিলে বিবেচন হয়।

কলা বাহুল্য যে, নারিকেলটীতে মৃত্তিকাব প্রলেপ দিয়া শুষ্ক হইলে তবে আগুনে পোড়াইবে।

আনাহের চিকিৎসা।—তেউড়ী, হবিচকী ও নাম মিজেব মূল চূর্ণ, উষ্ণ জলে গুলিয়া পান করিলে মলমূত্রাদি নির্গত হইব আনাহ বোগ নিবৃতি পায়।

ক্লোম রোগ —প্লীহ ও ক্ষুদ্রাজের মধ্যভাগে ক্লোম যন্ত্র আছে ইহাব অপন নাম তিল বা তিলক ইহাতে এক প্রকার বোগ জন্মে। তাহাতে পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য হয়। অপবিমিত ভোজন, দ্রব ও অগ্নিবিশিষ্ট ওষধি জব্য ভোজন এবং অভিষত দি ক ববে এই যন্ত্রেব বিবিধ পীড়া হইয়া থাকে। কখন ইহাব বৃদ্ধি ও কোমলতা, ইহ ত্রে রক্তসঞ্চয় ও বিদ্রুপি এবং অন্যান্য বহু প্রকার পীড়া জন্মে। উপনোক্ত কাৰণে এই যন্ত্র বিকৃত প্রাপ্ত হইলে অগ্নিমান্দ্য, বমনেব বেগ, বমন, দেহেব ক্লান্ততা ও পাণ্ডুতা, অবসন্নতা, শ্রম, উর্দ্ধোদবে অভ্যন্ত বেদনা, কাঠিন্য ও উষ্ণতা, শূল, আধ্মান ও মুখদিয়া জালিয়া ব, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে বিদ্রুপি হইলে অভ্যন্ত পিপাসা হয়। ক্লোম যন্ত্রে কখন কখন অশবীণ্য শিলা উপর হইতে দেখা যায়, ইহা অতি কষ্টদায়ক ও দুশ্চিকিৎসা।

চিকিৎসা।—অগ্নিদীপ্তকারক এবং বাতানলে মকু অন্ন, পান, ঔষধ সমস্ত ক্লোমপীড়ার হিতকর।

হবিডকী, আমলা, দেবদারু, ধনু, শুঠ, আক্ষা ও অনন্ত মূল, ইহা-
দেব কাণ পান করিলে ক্রোম বোগেব ধ্বংস হয়

পুৱেন্দ্ৰোজ বটী —সহজ পুটিও অভ,হিঙ্গুলোথ পাবা, কেশুবি-
য়াব বসে শোধিত গন্ধক,হীবক, প্রবাল,মুক্তা, স্বর্ণ, বৌপা, স্বর্ণমাক্ষিক ও
কাণ্ড লৌহ এই সযুদাথ সমভাগে চিতাব বসে মাড়িয়া ২বতি প্রমাণ বটী
প্রস্তুত করিবে অল্পপান জল

ক্রোমযন্ত্রে যখন যেরূপ ব্যাধি হইবে,চিকিৎসক তাহা বিশেষ পরীক্ষা
দ্বাৰা দোষ ও বোগীর বলায়ুসাবে চিকিৎসা করিবেন ক্রোমবোগে অল্পপ্র
অন্ন, পান মেঘনীয়, এবং সমস্ত উগ্র দ্রব্যাদি পবিতর্জনীয়

অন্তরোগ ।— কষ্টান্ত পীড়ায় অর্থাৎ অন্ত্রাববোধে উদবে সূচী-
বেধনবৎ বেদনা, অত্যন্ত মলবোধ, আধুমান, উদরের পেশী সকলেব
আক্ষেপ, নাভিদেশে আকর্ষণ বোধ, পূর্বীষমংযুক্ত বমন, বলক্ষয় হিকা,
উদরে ঘোরতর বেদনা, ক্ষুধানর্শি এবং অতিশয় অশুশ্চিহ্নতা, এই সকল
লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে

অন্তের কোন অংশ অন্যাংশেব ভিতব প্রবেশ, অন্ত্রের ব্যাহতি ও
স্থানভ্রংশ, দুইট প্রণাদির উৎপত্তি, এবং ক্ষতাদি নিবাবণেব পর সন্ধোচ
ইত্যাদি কাবণে এই ভয়ানক ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহা প্রায়ই
সাংঘাতিক হইতে দেখা যায় ।

চিকিৎসা —অন্ত্রাববোধে বিবেচনামত বিরেচন ও বস্তিকর্ম
প্রযোজ্য ইহাতে উদবে ক্ষেদপ্রদান করিলে উপকার দর্শে

মজল সুবা ও অহিক্ষেপ ব্যবহাবে আধুক্ষন, আক্ষেপ ও বেদনার
শান্তি হয় । অহিক্ষেপ প্রতি দেড় বা দুই গ্রহব অন্তর অর্ধ বতি মাত্রায়
প্রযোজ্য ।

ধূতুর পত্র ও টেঁড়িফল কঁজিব সহিত পেষণ ও উষ্ণ করিয়া উদরে
প্রলেপ দিলে বিশেষ আবাগ লাভ হয়

শস্ত্রদ্বাৰা উদব ক্ষেদন করিয়া অন্ত্রাববোধনিবারণ করিবাব চেষ্টা
করা প্রায়ই বিপজ্জনক শস্ত্রক্রিয়া দৈবাৎ কাহার মঙ্গলেব নিমিত্ত
হইতে দেখা যায়

এই পীড়ায় জ্বর পান হিতকর নহে । অতএব বোগীকে ঘন মাংসবৎ এবং বিবেচনামত অল্প পথ্য দিবে ।

হোমিওপ্যাথিকে শূলাদি রোগ চিকিৎসা ।

অগ্নিপিত্ত ।—অত্যন্ত গুরুপাক জ্বর যথা,—হংসমাংস, আইস্-ক্রিম, শশা, সুবা ইত্যাদি ভক্ষণে পীড়াদায়ক অজীর্ণ বোগ জন্মে

চিকিৎসা ।—আহারবেব পবিমান এবং উপযুক্ততাবিশয়ে স বধান লইতে হইবে এবং অতিবিক্ত শ্রম, অনাহারে দীর্ঘ পথ গমন ইত্যাদি পবিহার করা কৰ্তব্য

মুখেব আবক্ততা, বক্ষস্থলেব স্পন্দনাধিক্য এবং শিরঃপীড়া নিবারণ জন্য “বেলেডোনা” দিবে

বিবেচনাশক্তি ব হ্রাস, চক্ষু এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেদনা, দৌৰ্বল্য, কম্পন, ইত্যাদিব জন্য “সিমিসিফিউগা” প্রয়োগ কবিবে

স্নায়বিক বেদনা শূলবেধনবৎ তীব্র হইলে “ইয়োশিয়া” ব্যবস্থা করা যায়

কোন নির্দিষ্ট সময়ে যদি বেদনাব আক্রমণ হয়, তবে “আর্শেনিক” দ্বারা উপকার দর্শে ।

পিত্তজন্য পীড়া হইলে “ক্যান্টোমিলা” বিশেষরূপে প্রয়োগ করা যায়

যদি ক্রমাগত অতিবিক্ত পবিমাণে বমন হইতে থাকে, এমন কি, চা কিস্বা জল স্পর্ষ্যস্ত গোটে না থাকে, তবে “ভেরেট্রাম্ ভিবাইড্” দিতে হইবে

উপবোক্ত সমস্ত ঔষধগুলি প্রথম ১৫ মিনিট বা অর্ধ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহার পরে এক ঘণ্টা অন্তর দিবে ।

অপ্প পবিমানেন লঘু পথ্য ব্যবস্থা কৰা গিয়া থাকে

শূল বা বেলিএক্ —অকস্মাৎ পাকস্থলীতে বেদনা, সেই বেদনা বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠে, কিয়ৎক্ষণ নিরুত থাকিয়া আবার আক্রমণ করে, তাহাতে বোগী অস্থির হইয়া দাকণ যন্ত্রণায় দ্বিগুণতর অস্থির হইয়া আত্মবর কবিত্তে থাকে। সচবাচব এই বেদনা নাভি-স্থলের নিকটে অনুভূত হয়। অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্যের বাষ্প হইতে সম্প্রসারণ ও পাকস্থলীর আক্ষেপ হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। অজীর্ণ-কব খাদ্য ভক্ষণে, অত্যন্ত শৈত্যাধিক্য, বিশেষতঃ আর্দ্র পদে অবস্থান হেতু, কিম্বা বালকদিগের ক্রিমি এবং স্ত্রীলোকদিগের ঋতুজন্ত উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা। —পীড়া অধিক হইলে বোগীকে শয্যায শয়ন করাইয়া ফোমেন্ট কবিবে। প্রতি পাঁচ বা দশ মিনিট অন্তর “কলোসিন্থ” প্রয়োগ কবিবে। ইহাতে শাম্য না হইলে সেইরূপ “নক্সভমিকা” দিবে। ক্রিমি জন্ত হইলে প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর “সিনা” ব্যবস্থা কবিবে। স্ত্রীলোকে ঋতুকালে এই পীড়া হইলে “ক্যামোমিলা” প্রয়োগ উপযুক্ত। পীড়া যতই কেন যন্ত্রণাদায়ক হউক না, পাকস্থলীর উপরে চাপিয়া ধরিলেই বেদনার উপশম বোধ হইবে; কিন্তু পাকস্থলীর প্রদাহ বোগে তাহার উপর সামান্য চাপও সহ্য হয় না।

লেড্ কলিক্। —ছাপাখানার কম্পোজিটার, চিত্রকর বা অন্য কোন ব্যক্তি যে শুভ্র সীসক লইয়া সর্বদা কাজ কর্তব্য করে, কোন প্রকারে তাহাদেব দেহ মধ্যে ঐ সীসক বা তাহার কদর্যা বাষ্প প্রবিষ্ট হইলে, উদবে শূলবৎ বেদনা হইয়া থাকে, তাহাকেই লেড্ কলিক্ বলে। নুতন সীসকরচিত নল কিম্বা প্লাস্তে জল রাখিলে, ও সেই জল পানে এই পীড়া হইতে পারে।

চিকিৎসা। —প্রতিদিন তিন ঘণ্টা অন্তর “ওপিয়ম” অথবা “মল্ফিউ-বিক্ য়াসিড” প্রয়োগ করিবে। যাহারা সীসক ব্যবহার করে, তাহাদেব সাবধান হওয়া উচিত, যেন উহা কোনমতে নখাগ্রভাগ স্পর্শ কবিত্তে না পারে, অর্থাৎ নখেব এমন স্থল যদ্বারা সহজে কোন দ্রব্য দেহাভ্য-

ভবে প্রবেশ কবিতো পাবে যদি অসাবধানতা পূৰ্ণক স্পর্শ কবে,
কবে তৎক্ষণাৎ পবিধান কবিয়া ফেলিতে হইবে

ক্রিমি উদবে অস্থখ বা বেদনা, কখন উদর শক্ত ও স্নীত,
কখন অতিবিক্ত দাস্ত, কখন বা একবারে বম্ব কোম্পাড়াই শ্বাস মল এবং
রক্ত পড়ে, প্রজ্বলিত কফ, জিহ্বা অপবিদ্ধার, দুগ্ধিত নিশ্বাস, কখন ক্ষুধা-
মাক্ষ, কখন বা তাহাব আধিক্য, নামিক ও মন্দ বৈ চুলকানি, নিদ্রা
তাবস্থায় দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, চক্ষু কোঠবগত, মুখ বিবর্ণ, শবীবের চর্ম শুষ্ক,
শবীব ক্ষীণ ও সহজে ভয়োদ্বেগ হয়

চিকিৎসা — পূর্ববর্তী কাবণগুলি বিদ্যমান থাকিলে “সল্ফার”
দুইটি ক্ষুদ্র বটী বা একটি বড় বটী অথবা এক ফোঁট আঁবক প্রতি বাত্র
এবং প্রাতে শূণ্য উদবে সেবন কবাইবে

গোল বা ফিতার্ব ঞায় ক্রিমি হইয়া মলাশয়ে শূল বেদনা হইলে,
বোগী চমকিয়া উঠিলে এবং পোট কাপা থাকিলে “সল্ফাবেব” ঞায়
“সিনা” ব্যবহার কবিরে

অস্থবতা, নিদ্রাকালে চমকিয়া উঠ, মুখে বেদনা, হবিৎ ও শুভ্র
মলজাব থাকিলে “ইগেসিয়া” দিবে যাঁদি সমস্ত সল্ফাবেব ঞায়

হাকিমীমতে উদরাদি পীড়ার চিকিৎসা ।

উদর রোগের বিবরণ — এই রোগে উদর, হস্ত এবং পদ
শুলিয়া উঠে, কখন কখন জ্বর হয়, পিপাসা থাকে, শবীব শুষ্ক হয়, আঁব
এঁ ফুলা টিপিলে বসিয়া যায়, চাবি পাঁচ মিনটেব পরে পুনব য সম্মান
হয়

কারণ — শবীবের দুর্বলতা ও কখন কখন দোষকাল জ্বর ভোগ
কবিলে এই পীড়া জগে

য়্যালোপ্যাথিকে প্লীহা ও যকৃৎ চিকিৎসা । ১৮১

উপায় ।

সোবা	...	...	১ মাস।
চিনি	...	...	১ মাস।

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত কবিয়া কিঞ্চিৎ মাতৃগুড়ের সহিত ঐ ওজনে দিবসে দুইবার খাওয়াইবে এই প্রকার অফাই পর্য্যন্ত খাওয়াইলে অধিক প্রস্রাব হইয়া পীড়া আবোধ্য হয়

অন্য প্রকার ।

শুঠ	..	..	১ তোলা।
মরিচ		..	১ তোলা।
পাৰা	.	...	১ তোলা।
গন্ধক	...		১ তোলা
জয়পাল	...	..	৩ তোলা

সমুদায় জলে বাটিয়া ২ বতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এক একটী বটী প্রতিদিন প্রাতে চিনির সববতের সহিত ভক্ষণ কবিত্তে দিবে

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

য়্যালোপ্যাথিকে প্লীহা ও যকৃৎ চিকিৎসা ।

প্লীহা উদ্ভবেব একটী যন্ত্রবিশেষ । উহা দীর্ঘাকার, কোমল, স্থিতিস্থাপক, ঘোর ধূস্রবর্ণ, উহাব গুচ্ছসদৃশ সচরাচর ৬ আউন্স, দৈর্ঘ্য ৫ ইঞ্চ ও প্রস্থ ৩ ইঞ্চের কিঞ্চিৎ অধিক । প্লীহাদ্রব্য জীবদেহেব বক্তকণিকা-সকল নির্মাণেব সাহায্য হইয়া থাকে , প্লীহা, যকৃৎ হইলে যে যে পীড়া হইয়া থাকে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে •

প্লীহার রক্তাধিক্য ।—হঠাৎ প্লীহাব মধ্যে রক্তাধিক্য হইলে প্রবল বেদনা উপস্থিত হইতে পারে । কিন্তু যখন সবিবাম বা অস্পষ্টবিবাম অবস্থায়

সহিত ক্রমে ক্রমে এই অবস্থা ঘটে, তখন প্রায় বেদনা অনুভব কৰিতে
পারা যায় না কিন্তু প্ৰীহা স্থান ভাবি ক্ষীণ বোধ হয়, এবং উহা টিপিলে
বেদনা বোধ হয় কোন অবস্থার সহিত এই পীড়া না হইলে কেবল
ইহাব জন্ম অন্য প্রকার জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায় না ইহা দীর্ঘকাল
স্থায়ী হইলে পৰিপাক ও পৰিপোষণ যত্নেব ক্রিয়াব বৈলক্ষণ্য হইতে
থাকে ও ক্রমে শবীর শীর্ণ, দুৰ্বল, বক্তবিহীন, মল কৃষ্ণবর্ণ, মূত্র বিবর্ণ,
এবং 'জিহ্বা' লেপযুক্ত ও 'মিউ' হইতে পাবে ইহা হইতে বোঝে যে কি
পৰিবর্তন হয় তাহা বলিতে পারা যায় না।

চিকিৎসা।—রুবার প্রভৃতি যত্ন বিবেচক ঔষধ, নোহাটিল
ঔষধের সহিত কুইনাইন ব্যবহার করিলে উপকার দর্শিত পাবে। কম্পা-
জ্বর বা যকৃতের কোন পীড়ার সহিত এই অবস্থা ঘটিলে নাইট্রোমিউ-
বিয়েটিক্ য়াশিড, বার্ক, ও মধ্যে মধ্যে উষ্ণ জল স্থান ব্যবস্থা কবিবে।

দীর্ঘকাল অবভোগ কবিলে প্ৰীহা বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য নিম্নলিখিত ঔষধ
গুলি ব্যবস্থা কবিবে

টীং আইওডিন্	.	.	..	২ আং
টীং ফেবি মিউবিয়েটীস্	...	.	...	২ আং
জল	...	...	..	১ আং

এই মিশ্র ঔষ্যেব ১০ হইতে ১৫ ফেঁ ট ১ আউন্স জলের সহিত
দিবসে ৩ বা ৪ খাইতে দিবে

কন্ফেস্‌সন্‌ রোজ	...	..	উপযুক্ত পৰিমাণে
আইওডাইড অফ্‌ লেড	...	...	২ গ্রেন

এক একটী বটী প্রস্তুত করিয়া দিবসে ২ ও ৪টী সেবন কবিত্তে
দিবে

ব্রেগ্‌ইড্‌ জফ্‌ প্ৰদ্যম্‌	...	...	৫ গ্রেন।
ফেবিসাইটেট অফ্‌ কুইনাইন্‌	.	..	৪ গ্রেন।

এক এক মাত্রায় দিবসে দুইবার ব্যবহার করা যাইতে পারে

কুইনি সল্‌ফ্‌	.	...	১ গ্রেন
ফেবি সল্‌ফ্‌	.	...	২ গ্রেন।

ম্যালেরিয়াবিধি পীহ ও যকৃৎ চিকিৎসা । ১৮৩

পলুব বিয়াই	...	...	...	১ গ্রেন।
পলুব জিঞ্জাব	..	..	...	১ গ্রেন
এক পুরিয়া। এইরূপ পুরিয়া দিবসে ৩ বার খাওয়াইবে।				
কুইনি সল্ফ	.	..	..	১ গ্রেন
ফেরি সল্ফ		..	...	১ গ্রেন
ম্যাগ্নেসিঃ সল্ফ	...		...	১ ড্রাম।
ম্যাগ্নিড সলঃ ডাইঃ	..	..	...	৮ বিন্দু।
টীং জিঞ্জাব	.	.	...	১ ড্রাম
জল	.		..	১ আং।

একমাত্র। এইরূপে দিবসে ৩ বার দিবে।

কুইনি সল্ফ	...	..	..	৩ গ্রেন।
ফেরি সল্ফ	...	.	...	২ গ্রেন
ম্যাগ্নিড নাইট্রোমিউবিষেটিক ডাইঃ			.	১০ ফোঁটা।
ইন্ফিউজন্ কোয়াসিয়া		...		১ আং।

এক এক মাত্রা—দিবসে ২।৩ বার।

ফেবি আইওডাইড	..	...	..	৪ গ্রেন।
ইন্ফিউজন্ কলম্বা	...	.	..	১ আং

এক এক মাত্রায় দিবসে ২।৩ বার।

পীহার প্রদাহ।—নাতিশীতোষ্ণ দেশে ও ম্যালেরিয়াবিহীন দেশে প্রায়ই এই পীড়া দৃষ্ট হয় না। অনেকে ম্যালেরিয়াকেই ইহার প্রকৃত কারণ অনুমান করিয়া থাকেন।

লক্ষণ।—পীহাস্থানে বেদনা, ক্ষীতি, অজীর্ণ, উদবায়, দৌর্বল্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।—ইহাতে প্রদাহের চিকিৎসা করিবে, কিন্তু কোনমতে রক্তমোক্ষণ বা পারদ সেবন যুক্তিযুক্ত নহে। পুরাতন প্রদাহে বিবেচক ঔষধের সহিত লৌহঘটিত ঔষধ ও কুইনাইন ব্যবহারে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। পীহাবিরুদ্ধ বোণে যে সকল ঔষধের উল্লেখ করা গিয়াছে, ইহাতেও সেগুলি প্রয়োগ করিবে।

প্লীহাবোগে বাহ্যক্রিয়ায় জন্ম নিম্নলিখিত মলম প্রায়ে গ কবিবে,
যথা, লিনিমেন্টে পটানি আইওডাইড

কঠিন মাঝামাঝি	.	.	.	১১ আং
পটানি আইওডিন্	..	..	...	১১ আং।
লিনিমেন্ট	.	.	.	১ আং।
লেমন্ অয়েল্	..	..	..	১ ড্রাম।
পবিত্র তৈল	..	..	..	১৩ আং।

১১ আং আইডিন্ বাবহাব কবা যায়, কিন্তু হাইড্রজ আইওডি সল্যন্
সল্যন্সক্

যক্৭।—মল্ল্যাদেহে যক্৭তই প্রধান যক্৭ ইহা হইতে পিওবস
নিঃসৃত হইয়া পাবপাকক্রিয়া এবং বক্তেব পোষণক্রিয়া সম্পন্ন কবে
যক্৭তের অল্পপ্রস্থ বাসী প্রায় ১২ইঞ্চ এবং অত্র-পল্টাং ব্যাস প্রায় ৭ইঞ্চ
প্রোচাবস্থ লোকেব যক্৭ স্বভাবতঃ ১হইতে ২সেব পর্যন্ত হইয়া থাকে
নানা কারণে যক্৭তের ক্রিয়া বিকৃত হয়, আয়তন বৃদ্ধি হয়, এবং তাহাদেব
প্রতিকার না হইলে উহা এককালে অকর্মণ্য হইয়া মল্ল্যেব জীবন নষ্ট
কবে।

যক্৭ বেদনা।—পূর্বে এই বোগকে পৃথকরূপে নির্বাচন করা
হইত না, কিন্তু আজিকালি অনেকে কেবলমাত্র যক্৭যক্৭ বেদনা হইলে
তাহাকে পৃথক বোগমধ্যে গণ্য কবিয়া থাকেন এইরূপ বেদনাকালে
এক প্রকার মানসিক নিস্তেজতা জন্মে কখন কখন তীব্র বেদনা ও
বমন হইতে দেখা যায়

চিকিৎসা।—ম্যালেরিয়াবশতঃ এই পীড়া হইলে কুইনাইন্ দ্বারা
উপকার হইবার সম্ভাবনা হাইড্রোক্লোরেট অফ স্যামোনিয়াই ইহাব
মহোষম বলিষ্ঠ হইবে। চারি ঘণ্টা অন্তর অর্ধ ড্রাম পরিমাণে সেবন
করাইলে নিশ্চয়ই বেদনা ভাল হয়

যক্৭তের রক্তাধিক্য —স্বাভাবিক অবস্থাতেও নানা কারণে
যক্৭তমধ্যে রক্তেব পরিমাণের তাবতম্য হইয়া থাকে, এবং কিয়ৎ পরি-
মাণে উহাব আয়তনেবও পবিনর্ভন হইতে পারে সচরাচর পরিপাক

সূচীপত্র ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
জীবন, স্বাস্থ্য, পীড়া ও মৃত্যু	১
বোগ ও রোগের সাধ্যসাধ্য নির্ণয়	১১
জ্বরচিকিৎসা	১২
উদরাময় চিকিৎসা	৬১
ওলাউঠা বা বিষচিকা চিকিৎসা	১০১
পাক্কুচ্ছু ও অজীর্ণ বোগ চিকিৎসা	১১২
শূল ও অন্যান্য আন্ত্রিক বোগ চিকিৎসা	১৫৭
শ্লেহা ও যকৃৎ চিকিৎসা	১৮৭
পাণ্ডুবোগ চিকিৎসা	২০৭
হিমাবেজ বা বক্তপিত্ত চিকিৎসা	২১১
কাসাদি রোগেব চিকিৎসা	২২৭
হৃৎপিণ্ডেব পীড়াব চিকিৎসা	২৭১
মূত্রযন্ত্র ও মূত্রাশয়েব পীড়াব চিকিৎসা	২৮৬
শিফ্টিস্ বা উপদংশ চিকিৎসা	৩৩১
ধাজন্তু চিকিৎসা	৩৪৭
অণ্ডকোষ বৃদ্ধিব চিকিৎসা	৩৫২
অর্শবোগ চিকিৎসা	৩৫৭
অলম্বুদ্বিব চিকিৎসা	৩৭০
কঠাগাত রোগেব চিকিৎসা	৩৭৩
গলগণ্ড চিকিৎসা	৩৮৫
জিহ্বা ও মুখরোগ চিকিৎসা	৩৯১
দন্তদোষ চিকিৎসা	৪১৭

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
সামান্য রোগ চিকিৎসা	৪২২
শুক্রবোগ চিকিৎসা	৪৩০
কর্ণবোগ চিকিৎসা	৪৩৬
শিবার্পীড়া চিকিৎসা	৪৪৩
সন্ন্যাসাদি মস্তিষ্কীয় বোগ চিকিৎসা	৪৬১
ইন্দ্ৰিয় বোগেব চিকিৎসা	৪৮০
পিত্ত-পক্ষাঘাতাদি রোগ চিকিৎসা	৪৯৪
শুষ্ক বা শোথের চিকিৎসা	৫৩২
কৃষ্ঠাদি চর্মরোগ চিকিৎসা	৫৪১
সমস্তাদি সংক্রামক বোগ চিকিৎসা	৫৬০
জীবাণু চিকিৎসা	৫৭৫
শিশুচিকিৎসা	৬০৬
বিষ চিকিৎসা	৬

পারিশিষ্ট ।

গিড়ওয়াইফারী বা ধাত্রীবিদ্যা ।—

[illegible]

ଶୋଧନବିଧି	...	୩
ହୋମିଓପାଥୀକ ଔଷଧେନ ଶୁଣ ଓ ପରିମା	...	୩
ଔଷଧେନ ମିଶ୍ରଣ	...	୩

ଚିତ୍ରର ମୂର୍ତ୍ତି ।

ଚିତ୍ରର ନାମ ।

ନାମ	ପୃଷ୍ଠା
୧ । ସ୍ପିରିଟୁଆଲି ଯନ୍ତ୍ର	୬୩
୨ । ଆନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଯନ୍ତ୍ର	୬୩
୩ । ଜରାୟୁକ୍ଷୁଦ୍ରମେବ ଚିତ୍ର	୬୩
୪ । ଗର୍ଭସ୍ଥ ମିଶ୍ରଣ ଚିତ୍ର	୬୩
୫ । ମରୁତ୍ୟଦ୍ଵାରାଲେବ୍ ଚିତ୍ର	୬୩

বিষয় ।

পৃষ্ঠা ।

* রীরতত্ত্ব ।—

সাধাবৎ বিয়য় .	...	৬৬৩
বক্ত	.	৬৭০
য়ালোপ্যাথিকে ঔষধের ওজন	..	৬৭৩
মেটেরিয়া মেডিকা বা দ্রব্যগুণ —		
য় ফিঞ্জেন্ট বা সঙ্কোচক	...	৬৭৪
আর্টিরিয়েল সিডেটিভ বা ধামনিক অবসাদক .	...	৬৭৮
নার্বস্ সিডেটিভ বা স্নায়বীয় অবসাদক	..	৬৮০
টিমুলেন্ট বা উত্তেজক	..	৬৮৩
টনিক বা বলকাবক	...	৬৯১
পরিবর্তক বা অল্টারেটিংস্	..	৬৯৯
বিরেচক বা কেথর্টিক্স	..	৭০৫
মনকাবক বা এন্টর্টিক্স	...	৭১০
কারক বা ডাউরেটিভ	...	৭১১
নিঃসারক বা এক্সপেক্টোরেন্টস্	..	৭১৪
ইর/র ডিসাগ্রেগেটস্	..	৭১৬
শক বা এন্ডেমিটিকস্	...	৭১৮
ক বা এক্সারিটিভ	.	৭১৯
নিঃসারক বা সায়েলোগস্	.	৭১৯
গণ্য বা এনোমেটিভ	...	৭২০
নিঃসারক বা কোলেগস্	.	৭২৫
রক্তোনিঃসারক বা এমিনাগস্	..	৭২৫
ক্ষাব	...	৭২৬
সাধাবৎ জাডিয়া বিষয় .	...	৭২৭
আগ্রে বৈদ্যাক্ত পবিজায়া	.	৭৩০
জ্ঞান শক	.	৭৩৩

লক্ষণ, ঔষধপযোগী প্রভৃতি সমস্ত বিষয় লিখিত হইয়াছে। এখানে
 য্যালোপ্যাথিক, তৎপবে বৈদ্যক, তৎপবে হোমিওপ্যাথিক ও তৎপ
 ছাকিমীমতে রোগচিকিৎসা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে আর্য
 দেশের চিকিৎসকদিগের যদি বিম্বমানও উপকর দর্শে, তবে সন্ম সার্থক
 জ্ঞানুকবিবন।

ভাদ্রামোড়া ।
 এই বৈশাখ, ১২৯৫ সাল । } ক্রীতদ্বৈত চরণ ও পু।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

এখনও ভাবি নাই যে, “চিকিৎসা-তত্ত্ব-বারিধি” এত অল্প দিনে
 জনসমাজে এতদূর অদূত হইবে। প্রথম সংস্করণ পুস্তক প্রকাশিত
 হওয়ার ছয় মাস মধ্যে সমস্ত পুস্তকগুলি নিঃশেষিত হওয়ার, এবারে দ্বিতীয়
 উৎসাহেব সহিত সংশোধিত ও পবিত্রিত আকারে “চিকিৎসা-
 বারিধি” দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ কবিলাম। দিন দিন “চিকিৎসা-
 বারিধি” যেরূপ আদার বাড়িতেছে, তাহাতে নিশ্চয় হইবে, যে,
 অল্প দিনেই দ্বিতীয় সংস্করণও নিঃশেষিত হইবে। আমরা কনি,
 বণের নিকট এবারেও পূর্ববাবের মত উৎসাহ পাইব। ইতি ১লা
 ১২৯৫ সাল

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

“চিকিৎসা-তত্ত্ব-বারিধি” প্রথম দুই সংস্করণ অপেক্ষা অনেক গুণি-
 ক্রিত ও পবিত্রিত হইয়া, আরও বৃহদাকারে তৃতীয়বার প্রকাশিত
 হইল। এই সংস্করণে কতকগুলি নূতন বিষয় ৫০ পৃষ্ঠকে সংযোজিত
 করা হইয়াছে, ও কতকগুলি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। বিদেশীয় যত্ন
 প্রম স্বীকার কবিয়া তৃতীয় সংস্করণ “চিকিৎসা-তত্ত্ব-বারিধিকে” মনোনি-
 বৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। সাধ বণের উৎসাহ পাটকেই প্রম ও
 যত্ন সার্থক হয়।

১৩ নং জোড়বাগানস্ট্রীট, কলিকতা । ক্রীতদ্বৈত চরণ ও পু।
 ১৩ নং জোড়বাগানস্ট্রীট, কলিকতা । ১৩ নং জোড়বাগানস্ট্রীট, কলিকতা ।

দুই একটি আবশ্যকীয় কথা ।

পুস্তকের শেষভাগে পরিশিষ্ট সংযোজিত
হইল । পাঠকগণ অত্রো পরিশিষ্টটী মনোযোগ
পূর্বক পাঠ করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবেন ।

যে সমুদায় স্যালাপ্যাথিক ঔষধের নাম
বহু, সেইগুলি পরিশিষ্টে দুই লাইনে লিখা হই-
য়াছে, এবং একটি ঔষধ হইতে আর একটি
ঔষধকে পৃথক রাখিবার জন্য প্রত্যেক ঔষধের
নামের নিম্নে একটু অধিক ফাঁক রাখা হইয়াছে,
পাঠকগণ উহা সতর্কতার সহিত পাঠ করিবেন ।

কালে ও অধিক পরিমাণে আহরীয় দ্রব্য গ্রহণ করিলে এবং উহা সহিত অধিক মেধ, শর্করা বা স্যালুকোহল অর্থাৎ সুখা থাকিলে এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে ।

লক্ষণ ।—বোগী সচরাচর যক্ষ্মপ্রদেশে টান ও বেদনা অনুভব করে এবং টিপিলে ঐ বেদনা কিছু অধিক হয় । কখন কখন ঐ বেদনা স্বল্পে বিস্তৃত হইয়া থাকে । এই বক্তাদিক্য হইবাব ২।১ দিন পাবে জন্ডিস্ বা কামলা উপস্থিত হয় । বমনোদগ, ক্ষুদামান্দ্য, শ্লিষ্মপিণ্ড, জিহ্বা লেপযুক্ত, আধ্বান, অজীর্ণের অন্যান্য লক্ষণ, কখন কখন উদবাগয়ও হইয়া থাকে । বক্তসঞ্চালনের যান্ত্রিক অববোধজন্য যক্ষ্মে বক্তাদিক্য হইলে উদবাগয় না হইয়া ববৎ কোষ্ঠবদ্ধ, ক্ষুদামান্দ্য, জিহ্বা লেপযুক্ত, তিক্তাসাদ, দৌর্বল্য, অজীর্ণতা, ও উদবরোগও হইতে পারে । প্রস্রাব প্রায়ই পরিমাণে অল্প, ঘোরবর্ণ ও পিত্তযুক্ত হয় ।

চিকিৎসা ।—বোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই বোগে বক্তমোক্ষণ করা যায় । নিত্য বক্তমোক্ষণ আবশ্যক বা অযোগ্য লইলে যক্ষ্মে উপর সর্ষপ পলস্ত বা বা পুন্টিস্ ব্যবহার করিবে । কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে সল্ফেট্ অফ সোডা, নাইট্রেট্ অফ ম্যাগনেসিয়া, বাই টার্টেট অফ পটাস্, সিড্‌লিস্ পাউডার * ইত্যাদি লবঙ্গসম্বন্ধীয় বিবেচক দ্বারা অত্র পরিষ্কার করিলে উৎকর্ষেব সম্ভাবনা । উদবাগয় থাকিলে হঠাৎ উহা বন্ধ করা উচিত নহে । কখন কখন ক্যালোমেগ্ বা পডোফিলিন্ দ্বারা উপবোক্ত বিবেচক ঔষধের ক্রিয়া বর্জিত কথা যাইতে পারে ।

উষ্ণ জলে স্নান উপকারজনক হইতে পারে । উত্তেজক জন্ম দোষ মতে আহাব করা উচিত নহে । অল্প ভুক্ত ও শর্করা পথ্য দিবে, কোন স্যালুকোহল, মদিরা, মশল, মেদ ও গুরুপাক দ্রব্য খাইতে দিবে না ।

উদবে উত্তেজক আহরীয় দ্রব্য থাকিলে বমনকরক ঔষধ আবশ্যক

* সিড্‌লিস্ পাউডার ।—সোডা ২০ গ্রাম, টার্টারিক স্যা-
লিড ৩০ গ্রাম, সোডি পটাসি টার্ট ৪০ গ্রাম

হইতে পাবে । বমনকালে যকৃৎ নিপীড়িত হওয়াতে উহা হইতে বক্ত বহির্গত হইয়া উপকাব দর্শিতে পাবে ।

পাকাশযেব উত্তেজনা থাকিতে কার্বনেট অফ সোডা বা পটাশ, ও উদ্ভিজ্জ অম্ল ব্যবহার কবিবে । দিবসে আহারের পূর্বে ২০।৪ বার এই ঔষধ সেবন কবিলে উপকাব দর্শিতে পারে ।

পীড়ার হ্রাস লক্ষণ সমুদায় অন্তর্হিত ও দৌর্বল্য এবং অজীর্ণের লক্ষণ থাকিলে ট্যাবাক্সিকম্, জেনিশন, নাইট্রিক বা নাইট্রোমিউরিয়েটিক গ্র্যাশিড, এবং বোগী ম্যালেরিয়া প্রধান-স্থানবাসী হইলে অম্পমাত্রায় কুইনাইন ও লৌহঘটিত ঔষধে উপকাব হয় ।

হাইড্রোক্লোরিক গ্র্যাশিড	...	...	...	২ আং ।
নাইট্রিক গ্র্যাশিড	..	...	...	১ আং ।
জল	...	...	...	৪ সের

এই মিশ্র দ্রব্যেব সস্তাপ ৯৬ বা ৯৮ ডিগ্রী থাকিতে থাকিতে তাহাতে পাদদ্বয় ডুবাইয়া রাখিবে এবং স্পঞ্জ দ্বারা উক ও বাহুর অভ্যন্তর প্রদেশে, উদবে ও যকৃতেব উপর মার্জনা করিবে । প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় অর্ধ ঘণ্টাকাল এইরূপ ক্রিয়া কবিলে উপকাব দর্শে

যকৃৎপ্রদাহ ।—যকৃতেব প্রদাহ নানা প্রকাব এবং উহার ফলও বহুবিধ । প্রদাহেব স্থানও সর্বত্র সমান নহে । প্রদাহেব এই প্রকাব ভেদহেতু নানা জনে নানা প্রকারে এই পীড়ার বর্ণনা করেন এস্থলে নিম্নলিখিত প্রদাহিক পীড়ার বিষয় বর্ণনা কবা যইবে । যথা,—

১। পেরিহিপাটাইটিস্ বা যকৃৎদ্বেষ্ট প্রদাহ ।

২ ডিফিউজড্ প্যায়েন্ কাইমেটস্ প্রদাহ বা যকৃৎ পদার্থের বিস্তৃত প্রবল প্রদাহ ।

৩। যকৃৎ পদার্থের পরিমিত প্রদাহ বা স্ফোটক ।

৪। সিষ্টমিস্ বা পুৰাতন প্রদাহ ।

যকৃৎদ্বেষ্ট প্রদাহ ।—কখন কখন যকৃতেব প্রদাহ না হইয়া কেবল উহার আবরণ সৌত্রিক ঝিল্লী ও গ্লিসনাখ্য কোষে প্রদাহ হইয়া থাকে ।

লক্ষণ ।—যকৃৎ চাপিলে, নড়িলে, বা দীর্ঘকাল গ্রহণ করিলে অম্প

বেদনা বোধ হয়, কিন্তু যকৃৎতের আয়তনের পরিবর্তন হয় না । জড়িস্ বা জবেব লক্ষণ অল্প বা এককালেই থাকে না ।

চিকিৎসা ।—প্রদাহেব সাধারণ চিকিৎসা দ্বারা ইহার উপকার হইতে পারে ।

যকৃৎ পদার্থের বিস্তৃত প্রবাল প্রদাহ ।—এইরূপ প্রদাহদ্বা বা যকৃৎতের ম্যাকিউট ম্যাট্রিফি হয় । উক্ত পীড়ার সহিত ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসা নবিস্তারে লিখিত হইবে, আপাততঃ ইহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইল ।

লক্ষণ ।—প্রচণ্ড মানসিক উদ্বেগ জন্মে, এবং গর্ভাবস্থা, টাইফস্ জ্বর, পাইমিয়া, স্কারলেট জ্বর, ম্যালেরিয়া জন্ম জ্বরে যকৃৎতের এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে । হৃকহ পীড়ার সময়ে প্রস্রাব কটাবর্ণ ও গন্ধযুক্ত হয় ।

যকৃৎতের স্ফোটক ।—যকৃৎস্ফোটক দুই জাতীয়;—১ম উষ্ম-দেশীয়, ২য় পাইমিয়াজনিত ।

উষ্মদেশীয় স্ফোটকরে লক্ষণ ।—পীড়ার প্রথমাবস্থায় যকৃৎতের রক্তধিক্যের লক্ষণাদি প্রকাশ পায় । কপের সহিত জ্বর, জ্বরের স্বপ্ন বিবাম, ও উহার সহিত যকৃৎপ্রদেশের অসুখ, ভার ও বেদনা বোধ হইয়া থাকে । কখন কখন দক্ষিণ স্ফোটক বেদনা বোধ হইয়া থাকে । শ্বাস-প্রশ্বাসকালে পর্শুকামুহেব গতির অস্পত্তা, দেহের পঙ্কণতা দৃষ্টিগোচর হয় ।

স্ফোটকে পূঁজ উৎপন্ন হইলে শরীর গীর্ণ ও হেট্টিক জ্বর হয়, কিন্তু পাইমিয়া জন্ম স্ফোটকেব জ্বরেব.ন্যায় ইহাতে অধিক কম্প বা বাজিতে অধিক ঘর্ষ হয় না । অনেক স্থলে জিহ্বা লালবর্ণ ও ম্যাপাথযুক্ত উদরাময়, প্রস্রাব ঘোব বর্ণ, কখন বা শুষ্ক কাশি হইতে পারে ।

অনেক স্থলে স্ফোটক বিদীর্ণ হইবার সময়ে হেট্টিক জ্বর বা উদরাময় দ্বারা অথবা ক্রমে শরীর নিস্তেজ হয় ও .বোগী প্রাণত্যাগ করে ।

বন্ধ ও উদরপ্রাচীরে যকৃৎস্ফোটক বিদীর্ণ হইবার পূর্বে ক্রমে ক্রমে ঐ স্থানে অল্প .টিউমার প্রকাশ পায়, পরে উহা কোমল ও লালবর্ণ হইয়া ফাটিয়া যায় ।

অল্পমধ্যে স্ফোটক বিদীর্ণ হইলে পূর্বে কোন বিশেষ লক্ষণাদি প্রকাশ পায় না ; কিন্তু উহা প্রকাশ্যে বিদীর্ণ হইলে নিপীড়নের লক্ষণ প্রকাশিত হয়, এবং পবে ক্রমসংযুক্ত ক্রোদি উদ্ভীর্ণ হয়

এই রোগে অতি অল্প লোকেই অব্যাহতি লাভ করে যাহারা অতি কষ্টে আবোগ্য লাভ করে, বহু দিবস গাও না হইলে তাহারা স্বেদাবস্থা প্রাপ্ত হয় না কখন কখন এক বৎসর অতিবাহিত হইতে দেখা যায় ।

চিকিৎসা ।—যকৃতে পুঁজ সংস্থান হইবার সম্ভাবনা জানিতে পাবিলেই অতি সাবধানে তাহার প্রদাহ নিবারণের উপায় করিতে হইবে

কেহ কেহ তজ্জন্ম যকৃতেব উপর জৌক বসাইবার যুক্তি দেন । যকৃতেব উপর ফোমেন্টেশন্ ও পুল্টিস্ প্রয়োগ বিশেষ উপকারজনক প্রদাহ প্রবল না হইলে বেলেস্তা বা দ্বা বা বিশেষ ফললাভ হয় ।

কোষ্ঠবদ্ধ থাকুক বা না থাকুক, পীড়াব প্রথমাবস্থায়, বিশেষতঃ জ্বরের লক্ষণাদি থাকিলে লবণাক্ত বিবেচক, কিয়ৎ পরিমাণে ক্যালোমেল বা সুপিল, * য়াল্‌কালিশ এবং ঘর্ষ ও মুত্রকাবক ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে । পীড়াব এই অবস্থায় জিহ্বা ঈষৎ পীতবর্ণ ও লেপযুক্ত, মল পরিমাণে অল্প ও পিত্তবিহীন, যকৃৎ বিবৃদ্ধ ও বেদনায়ুক্ত ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে, এক মাত্রায় ১০ গ্রেন ক্যালোমেল দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইবে

স্ফোটক জাগিলে নাইট্রিক, সল্‌ফিউরিক বা নাইট্রোমিউবিয়টিক স্যাসিড ও কুইনাইন, বার্ক বা বলকাবক ঔষধ দ্বা বা বল রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে হইবে । বেদনা, নিদ্রাব অভাব, ও কাশি নিবারণার্থ অহিফেন মর্হোষধ বলিয়া গণ্য । এ অবস্থায় বিবেচক আবশ্যক হইলে, ক্যালোমেল কোন মতে ব্যবহার করা কর্তব্য নহে । রক্তসঞ্চালনক্রিয় দুর্বল হইলে কিয়ৎ পরিমাণে পোট বা ত্রাডি দেওয়া যাইতে পারে । যকৃতে একাধিক

* সুপিল ।—সব ক্লোরাইড্ অফ মার্করী ও সল্‌ফিউরেটেড্ মার্করী প্রত্যেক ১ আং, গৌয়াকম্ বেজিন চূর্ণ ২ আং, ক্যাফেরঅয়েল ১ আউন্স বা অবশ্যকমত

স্ফোটক হইলে ছিদ্র করিয়া রোগীর প্রাণরক্ষার চেষ্টা করা যথা এ অবস্থায় বোগী প্রায় বক্ষা পায় ন

পাইমিয়াজনিত স্ফোটক —পাইমিয়াব জন্ম স্ফোটক সচ-
র চর আয়তনে ক্ষুদ্র কিন্তু সংখ্যায় এবের অধিক

লক্ষণ ।—সচবাচব যকৃৎ কিঞ্চিৎ বিবৃদ্ধি হয়, কিন্তু কখন কখন উহা
নাভিদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে দেখা গিয়াছে। স্পর্শনে অস্বাভাবিক বোধ
প্রায় সতত বর্তমান থাকে অনেক সময় স্ফোটক হইতে প্রদাহ পবি-
চালিত হইয়া যকৃদাববণ আক্রমণ কবা প্রযুক্ত বেদনাব বৃদ্ধি হয়, এবং
কাশীবাব বা দীর্ঘশ্বাস প্রহণের সময় উহাব অধিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে
অনেক স্থলে জড়িস্ দেখিতে পাওয়া যায় হেক্টিক জ্বর, ঝকেন
সন্তাপাধিক্য, দেহের দুর্বলতা ও শীর্ণতা, বমন, উদবাময়, টায়-
ফয়েড্ অবস্থা ইত্যাদি লক্ষণ অনেক স্থলে বর্তমান থাকে কম্পা ও
নিজ্রাব সময়ে প্রভূত ঘর্ষ নির্দিষ্ট লক্ষণেব মধ্যে গণ্য। অনেক স্থলে
জ্বরের ছায সাময়িক কম্প হয়।

চিকিৎসা ।—ইহাতে কোন বিশেষ ঔষধদ্বাবা রোগীর প্রাণরক্ষা
করা আপাততঃ সম্ভব বোধ হয় না যাহাতে ক্রেশ নিবারণ হয়,
এমন উপায় করিবে; স্থানিক বেদনার আধিক্য হইলে ফোমেণ্টেশন্স,
পুল্টিস্ ও সর্ষপ পলত্রা ব্যবহার কবিতে হইবে;—পোলাই ২০ ৩০ গ্রাম
পরিমাণে ৩৪ ঘণ্টা অন্তর সল্ফাইট অফ পটাশ বা সোডা ব্যবহার
কবা যাইতে পাবে। কুইনাইন ও নাইট্রিক ব সল্ফিউরিক য়াশিড-
দ্বাবা রোগী সবল, জিহ্বাব আর্দ্রত ও ঘর্ষ অল্প হইতে পাবে। যত্রণা-
নিবারণার্থ অহিফে বা মফিয়া নিতান্ত আবশ্যিক

উদবাময় ও বমন থাকিলে সাবধানে তাহাদের চিকিৎসা কবা কর্তব্য,
কিন্তু ইচ্ছা উদবাময় বন্ধ কবা উচিত নহে।

এ অবস্থায় পুষ্টিকব পথ্য আবশ্যিক, কিন্তু পুরিপাকশক্তির তাব-
তম্যানুসারে উহার পরিমাণ ও গুণের বিষয় অবধারিত কবিবে
সচবাচব দুগ্ধ, বিফটি ও অসিদ্ধ ডিম্ব ব্যবস্থা করা যাইতে পারে যদিবা
আবশ্যক হইলে মধ্যে মধ্যে অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

যকৃতের ক্রেনিক্‌ য্যাট্রফি বা সিরোমিস্।—য্যাকিউট য্যাট্রফি-
ফির সহিত এই বোগেব কোন সংশ্রব নাই

লক্ষণ ।—অজ্ঞাতসাবে এবং ধীবে ধীবে ইহা বৃদ্ধি হইতে পাবে ।
পেটফাঁপা, কখন কখন কোষ্ঠবদ্ধ, কখন বা উদবাময, মল পীশুটে
বর্ণ, শুষ্ক মলিন ত্বক্, শবীরেব দৌৰ্ব্বল্য এবং শীর্ণতা, দেহ ক্রমাগত ক্ষয়
হইতে থাকে, এবং তাহাতেই মৃত্যু উপস্থিত হয় ।

চিকিৎসা ।—লবু ও পুষ্টিকর খাদ্য, গুরুপাক দ্রব্য, চিনি, মদিরা,
কফি, প্রভৃতি একেবাবে নিষিদ্ধ গবম কাপড় সৰ্বদা ব্যবহার করা-
ইবে । শারীরিক শ্রম একেবাবে পরিত্যজ্য নিম্নলিখিত ঔষধগুলি
প্রয়োগ করিবে ।

কুইনি সল্ফ্	...	...	৮ গ্রেন
পলভ্ ইপিক্যাক্	...	...	২৪ গ্রেন
পলভ্ ইপিক্যাক্ কমঃ ওপিয়াই	...	...	৩০ গ্রেন
গ্লিসেরিন	...	...	উপযুক্ত পরিমাণে ।

ষোলটি বটী প্রস্তুত করিবে তিন চারি ঘণ্টা অন্তর দুইটি কবিয়া
সেবন করাইবে ।

কুইনি সল্ফ্	...	...	১২ গ্রেন ।
পলভ্ ইপিক্যাক্	...	...	১২—২৪গ্রেন ।
একফ্রাক্ট জেননি	...	...	২৪ গ্রেন

বারটি বটী প্রস্তুত কবিয়া প্রতিদিন এক একটা খাইতে দিবে

কুইনি সল্ফ্	...	...	২৪ গ্রেন
পলভ্ বিয়াই	...	...	৩৬ গ্রেন ।
গ্লিসেরিন	...	...	উপযুক্ত পরিমাণে ।

বারটি বটী প্রস্তুত করিবে । প্রাতে এবং রাত্রে এক একটা
খাওয়াইবে

সল্ফিউরিক য্যাশিড্ য্যারোমেটিক্	...	...	১৫ ড্রাম ।
সিরপ অবাঙ্গাই	...	...	৫ আং ।
টীং সিল্কোনা	...	...	৫৫ ড্রাম ।

য়্যালোপ্যাথিক্ প্লাহা ও যকৃৎ চিকিৎসা। ১৯১

জল

...

...

৭৫ আং

ছয় ভাগ কবিয়া খালি পেটে দিবসে ২। ৩ বার সেবন কবাইবে

সিফিলিটিক্, হিপাটাইটিস্ বা উপদংশিক যকৃৎ প্রদাহ।—উপদংশের তৃতীয়াবস্থায় অত্যন্ত লক্ষণের সহিত কখন কখন যকৃৎের প্রদাহ হইয়া থাকে এই পীড়া তিন প্রকারে প্রকাশিত হয় (১) অন্তর্ভব যকৃৎপ্রদাহ; (২) গঁদবৎ যকৃৎপ্রদাহ,—ইহাতে যকৃৎের উপরে সিকেটিয়ের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, নিম্নস্থানে গোলাকার, শুষ্ক ও পাণ্ডুবর্ণ গুটিকাভূন্য গঁদেব ন্যায় এক প্রকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়; (৩) য্যামিলয়েড অপকৃষ্টতা

লক্ষণ।—যকৃৎপ্রদেশে বেদনাই ইহার মুখ্য লক্ষণ বলিয়া জামিতে হইবে। এই বেদনা সচবাচর অতীব, কখন বা তীব্র, কখন অল্প পাণ্ডুতাও ইহার লক্ষণমধ্যে গণ্য করা যায় উপদংশের লক্ষণাদির সহিত এই সকল লক্ষণ আবির্ভূত হইলে এই পীড়া সন্দেহ করিতে হয়।

চিকিৎসা।—নিম্নলিখিত ঔষধগুলি বিবেচন পূর্বক ব্যবহার কবিবে

পটাশ আইওডাইড	...	...	...	৩০ গ্রেণ
গ্লিসেরিন	...	...	...	১ আং
টিং য্যাকোনাইট	...	...	...	২০ বিন্দু।
ভাইনম্ ইপিক্যাক্	...	...	...	১১ ড্রাম।
টেরাঙ্গিকম্	...	...	...	৫১ ড্রাম।
ডিক্ট সারসা	...	...	...	৭৫ আং।

ছয় ভাগ করিয়া প্রতিদিন ৩ বার সেবন করিতে দিবে।

পথ্য।—পুষ্টিকর খাদ্য, শারীরিক ও মানসিক শ্রম একেবারে বর্জনীয়; পলীগ্রামেব বায়ু সেবন ইত্যাদি বিধেয়।

য়্যাকিউট্ ইউলে য্যাট্রিফি বা যকৃৎের প্রবল পীতবর্ণ হ্রাস।—ইহাতে সার্বাত্ন পাণ্ডুরোগের সহিত জ্বর, প্রলাপ, দেহের কোন কোন স্থান হইতে রক্তস্রাব, অচৈতন্য ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। যকৃৎের আয়তন স্বাভাবিক অবস্থার অর্ধেক বা তৃতীয়াংশ হইতে পাবে,

উহাব কোষের ধ্বংস হইয়া বাসায়নিক পবিবর্তনের দ্বারা এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং উহা মূত্রেব সহিত অবস্থিতি কবে

লক্ষণ ।—অনেক স্থলে প্রকাশ্য ও অল্পেব ক্যাটাৰ, লেপযুক্ত জিহ্বা, বমনোদগ, ক্ষুধামান্দ্য, মধ্য মধ্য বমন, উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি পূৰ্বলক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু সৰ্বত্র সকল লক্ষণ দেখা যায় না কখন বা তরোণেব স্থায় গাএব স্থানে স্থানে বেদনা হইতে দেখা যায় এই সকল লক্ষণ প্রকাশ হইবার ৩ ৪ দিবস বা ৩ ৪ সপ্তাহ পাবে পীড়ার নির্দিষ্ট লক্ষণ সমুদায় প্রকাশ পাইয়া থাকে জড়িসূকে সতত বর্তমান লক্ষণ বলিতে হইবে । যকৃৎ হ্রাস হইতে আৰম্ভ হইয়া ৮ । ১০ দিবসের মধ্যে অর্ধেক বা তৃতীয়াংশ অদৃশ্য হয় সেই ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ হইতে একপ্রকার দানাময় ও তৈলবৎ পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে যকৃৎের উপর বেদনা হয়, ঐ বেদনা চাপিলে বৃদ্ধি হয়, মধ্য মধ্য বমন, উদগীর্ণ পদার্থেব সহিত মিউকস্, পিত্ত, কখন রক্ত থাকায় পীতজ্বরেব স্থায় রূক্ষবর্ণও হইতে পাবে, কখন কোষ্ঠবদ্ধ, কখন বা উদরাময় হয়, এবং মলের সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে সচরাচর প্লীহা বিবৃদ্ধ হয় । প্রবল জ্বরের লক্ষণাদি বর্তমান থাকে না প্রকাশ্য ও অল্প হইতে প্রায় রক্ত-আব হইতে দেখা যায়, কখন কখন জ্বায়ু ও নাসাবদ্ধ হইতে রক্ত বাহিব হয় ।

প্রবল লক্ষণাদি প্রকাশ হইবার সপ্তাহ মধ্যেই বোগীব মৃত্যু হয় ; কখন কখন ১৮ বা ২৪ ঘণ্টাব মধ্যেও হইতে দেখা গিয়াছে ।

চিকিৎসা ।—কোন বিশেষ ঔষধ দ্বারা এই বোগের প্রতিকার কবিতে পারা যায় না মস্তিষ্কের লক্ষণাদি প্রকাশ পাইলে বোগীব মৃত্যু নিশ্চিত অবধারিত করিতে হইবে । কিন্তু কেহ বলেন, এ অবস্থাতেও রোগী বক্ষা পাইয়াছে । এ অবস্থায় যে সকল ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিকার হইতে পারে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল

১ বিরেচক ঔষধ ও মস্তকে বেলেন্স দ্বারা প্রতিকার হইবার সম্ভাবনা ।

সল্ফেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া ১ ড্রাম

য্যালোপ্যাথিক প্লীহা ও যকৃত চিকিৎসা । ১৯৩

কার্বনেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া ১৫ গ্রাণ ।

য্যারোমেটিক্ স্পিরিট অফ য্যামোনিয়া ১ ড্রাম ।

দিবসে তিন বার সেবন কবাইতে হইবে

২। শক্তির লক্ষণাদি উপস্থিত হইলে উষ্ণ জলে স্নান, উষ্ণ বাষ্পাভিষেক (ভাবনা), বিবেচক, মূত্রকারক ঔষধ, এবং কলচিকম্ ব্যবহার দ্বারা বক্ত হইতে ইউরিয়া ও ইউরিক য্যাশিড বহির্গত করিতে চেষ্টা করিবে ।

৩। পাকায় ও অন্ত্র কোন স্থান হইতে অতিবিক্ত রক্তস্রাব হইলে সঙ্কোচক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে

গ্যালিক্ য্যাশিড্ ২০ গ্রাণ ।

সল্ফিউরিক্ য্যাশিড্ য্যারোমেটিক্ ২০ বিন্দু ।

টীং সিল্কোনা ২ ড্রাম

পরিষ্কৃত জল ২ আং

এক মাত্রা হইবে ।

য্যারোমেটিক্ সল্ফিউরিক্ য্যাশিড্ ২১ ড্রাম ।

সিবপ অফ বোজ ৫২ ড্রাম ।

পরিষ্কৃত জল ৭ আং

মাত্রা মাত্রা হইবে

৪ রোগীকে ভরসা দিবে, স্থান পরিবর্তন কবাইবে আবশ্যক হইলে অবসাদক ঔষধ দিয়া নিজা কবাইবে অন্ত্র ও পাকায়ের ক্রিয়ায় প্রতি দৃষ্টি, জেন্শাম্ বা অন্ত্র কোন ভিক্ত উদ্ভিদের সহিত নাটটোমিউ-রিয়েটিক্ য্যাশিড্ সেবন ইত্যাদি উপায়দ্বারা রোগীকে ভয়ানক রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ কবিবার চেষ্টা করিবে ।

হাইডেটীভ্ টিউমার ।—যকৃতের উপরিভাগ মসৃণ হয় নানা কারণে তাহার উপর থলীর স্থায় কুস্মুড়ীৰ আকারে টিউমার হইয়া থাকে । উহা চতুঃপার্শ্ব টিঙ্ক (তন্তুবৎ পদার্থ) ঘনীভূত হইয়া নির্মিত হয় । উহার অভ্যন্তর প্রদেশ আভি পাতলা কোষের ঝিল্লির স্থায় ঝিল্লীদ্বারা আবৃত, এবং মসৃণ, স্বচ্ছ, বর্ণহীন ও লবণাক্ত জব পদার্থে পরিপূর্ণ । এই

জন পদার্থের মধ্যে অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র কোষ ভাসিতে দেখা যায় । উহা দেব আয়তন, অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে পাকীডিম্ববৎ বৃহৎ হইতে পাবে যকৃতের টিউমার হই প্রকার । হাইডেটিভ টিউমার ও ক্যান্সারই সর্বপ্রধান ।

লক্ষণ ।—সচরাচর যকৃতमध्ये ক্রমে ক্রমে ও অপেক্ষে অপেক্ষে এইরূপ টিউমার জন্মে, এবং যকৃতপ্রদেশে ভাববোধ ব্যতীত অন্য কোনরূপ অসুখ হয় না । সচরাচর যকৃত বড় হয়, কিন্তু সকল দিকে সমানরূপে না বাড়িয়া উঠে, নিম্নে, পার্শ্বে বর্দ্ধিত হয় । টিউমার বৃদ্ধি হইলে যকৃতেব ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য ঘটিবার সম্ভাবনা

* চিকিৎসা —পূর্বে ইহার চিকিৎসাজ্ঞান নানা প্রকার ঔষধ ব্যবহার হইত, কিন্তু এক্ষণে আইওডাইড অফ পটাসিয়াম, ক্যালোমেণ ও লাবণিক ঔষধ দ্বারা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

যকৃতের ক্যান্সার ।—যকৃতে সর্বপ্রকার ক্যান্সারই জন্মিতে পাবে, কিন্তু কঠিন অপেক্ষা কোমল ক্যান্সারই অধিক দেখিতে পাওয়া যায় । কোমল ক্যান্সার গোলাকার, দৃঢ় বসানখণ্ডবৎ বোধ হয়, এবং কঠিন ক্যান্সার উপস্থিতি স্থায় দৃঢ় হইতে পাবে ।

লক্ষণ ।—দেহ শীর্ণ, বলহীন, যকৃতেব স্থানে সর্বদা বেদনা ও অসুখ বোধ হয়, পাকযন্ত্রের ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য, অতিশয় উত্তেজন, ও মানসিক নিস্তেজকতা হইতে পাবে । উদররোগ অপেক্ষা ইহাতে জড়িম্ অধিক দৃষ্টিগোচর হয় । কোন কোন স্থানে এই দুইটাই ঘটিতে পারে । কঠিন ক্যান্সার অপেক্ষা কোমল ক্যান্সার অপেক্ষা স্থায়ী হয় । ইহার সহিত পিণ্ডশিলা থাকিলে কখন কখন যজ্ঞণাব বৃদ্ধি হইয়া থাকে । ছয় মাসেব অধিক প্রায় বোগী জীবিত থাকে না, কখন কখন এই বোগে দুই বৎসরও বাঁচিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে

চিকিৎসা —ব্যাধি দূর করা চিকিৎসকের অসাধ্য । অক্লিষ্টকণ; রেলেডোনা, কোনাযম ঐভূতি অবসাদক ঔষধাদি দ্বারা বেদনাব উপশম ও ক্রেশ নিরাকরণ কবিত্তে চেষ্টা করিবে । বলকারক ঔষধাদি দ্বারা পাক-যন্ত্রেব তেজ বৃদ্ধি ও গুণিকর পথ্য দ্বারা শরীর পোষণ করিবে ।

বৈদ্যকে প্লীহা ও যকৃৎ চিকিৎসা



বৈদ্যকে প্লীহা ও যকৃৎ রোগেব পৃথক লক্ষণাদি বিস্তৃত নাই, তবে বিজ্রম্বি নামে এক পকার শীড়ার উল্লেখ আছে, তাহাতে শব্দবোব মেকোন স্থান বা যন্ত্রের বিরুদ্ধি বা বিজ্রম্বি হয় অবস্থাবিশেষে বিজ্রম্বি, বাহ্য এবং অভ্যন্তরস্থ কুপিত বায়ু পিত্ত কফ পৃথক পৃথক রূপে অথবা একত্র হইয়া শব্দবোব অভ্যন্তরে মলম্বাব, মুত্রাশয়, মুখে, নাভি, পেট, কুঁচকি, অগ্রমাস, প্লীহা, যকৃৎ, হৃদয় ও ক্রোম নামক স্থানে বল্লীক অর্থাৎ উইটিপিব ভাষ্য উন্নত এবং গুল্মেব সদৃশ সংহিত বিজ্রম্বি প্রাচ্যায়। ইহাদিগের লক্ষণ বাহ্য বিজ্রম্বিব সমান, কিন্তু স্থানবিশেষে বিশেষ লক্ষণ,— অর্থাৎ প্লীহাতে হইলে নিখামেব অববোধ, যকৃতে জন্মিলে শ্বাস ও হিকা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় প্লীহা ও যকৃতে বিজ্রম্বি হইলে যেকপে তাহাব প্রতিকার কবিত্তে হয়, নিম্নে তাহা লিখিত হইতেছে।

চিত্রকাদি লৌহ চিতামূল, শুঁঠ বাবসমূল, গুলঞ্চ, শালপানি, তালজটাভক্ষ, আপাদমূল ভক্ষ পুবাভন মাং, প্রত্যেক ৬ তোলা, ভৌহ, অত্র, পিপ্পল, তাত্র, যাক্ষাব, পঞ্চলবণ, প্রত্যেক ২ তোলা, গোমুত্র ১৬ সেব মুহু অগ্নিতে পাক করিবে, শীতল হইলে মধু ২ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে।

গুড়পিপ্পলী।—বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, কুড়, তিৎ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিকাব, মোহাণা, সমুদ্রকেন, চিতামূল, গজপিপ্পলী, কুটজীরা, তালজটাভক্ষ, কুমড়াউঁটাভক্ষ, আপাদভক্ষ, তেঁতুলছালভক্ষ, প্রত্যেক সমভাগ, এই সমুদায় চূর্ণেব সমান পিপ্পল চূর্ণ পিপ্পলচূর্ণের সহিত সমুদয় চূর্ণের দ্বিগুণ পুবাভন গুড়, সমুদয় একত্র মাত্রিয়া লইবে। মাত্রা ০ তোলা, জলপান উষ্ণ জল। ইহা বালকদিগেব পক্ষে বিশেষ উপকারী।

অভয়া লবণ ।—পালিধা ছাল, পলাশ ছাল, আকন্দ, গিজের ছাল, অপাঙ্গ, চিতামূল, বকগছাল, গনিয়াবি ছাল, শ্বেতপুনর্গবা, গোক্ষুর, বৃহতী কটেকারী, নাট্য, হাফবমানী, কুড়চিছাল, ঘোষালতা, গাধা, পুনর্গবা, এই সমুদয় কুটিয়া এক ছাঁড়িব মধ্যে রাখিয়া তিল কাঠেব জ্বাল দিবে । স্থালীস্থ জব্য সকল ভস্ম হইলে, সেই ভস্ম ২ সেব লইয়া ৬৪ সের জল দিয়া পাক করিবে । ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে পাবে এই ক্ষারজল পুনর্গবা পাকে চড়াইয়া তাহাতে সৈন্ধবলবণ ২ সের দিয়া পাক করিবে ঘনীভূত হইলে নামাইয়া কৃষ্ণজীবা, ত্রিকটু, হিং, বমানী, কুড়, শঠি, প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা পবিমাণে নিক্ষেপ করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে ; মাত্রা ২ তোলা, অনুপান উষ্ণ জল ।

প্লীহারি রস ।—পাবদ, গন্ধক, মোহাণা, বিষ, ত্রিকটু, ত্রিফলা প্রত্যেক ১ তোলা, জয়পাল ৫ তোলা এই সমুদায় পলাশ বৃক্ষের রসে ১ প্রহর মর্দন করিয়া ১ বতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে । অনুপান আদার রস ।

অর্কলবণ আকন্দ পত্র ও সৈন্ধবলবণ, অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া দধিব মাতেব সহিত সেই ক্ষার সেবন করিলে প্লীহা নষ্ট হয়

প্লীহাস্তক রস ।—তামা, রূপা, অত্র, লৌহ, মুক্তা, হিঙ্গুল, বমাঞ্জন, পারা, গন্ধক, গুগ্গূল, ত্রিকটু, বাস্মা, জয়পাল বীজ, ত্রিফলা, কটকি, দন্তিমূল, ঘোষামূল, সৈন্ধব, তেউড়ী, যবক্ষার, এই সমস্ত জব্য এবও তৈলে মর্দন করিয়া ১ বতি সমান বটিকা করিবে প্লীহারোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী

লোকনাথ রস ।—পারা, গন্ধক, অত্র, প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ, তাম্র, কড়ি-ভস্ম, প্রত্যেকে ৩ তোলা, পানের রসে একত্র মর্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে পবিমাণ ২ বতি, অনুপান যক্ষু ও পিপ্পলের গুড়া ও হরিতকী, কিঙ্ক পুরাতন গুড় ও জীবাবি গুড়া ইহা সেবনে যক্ষু, গুল্ম ও প্লীহাদি রোগ নষ্ট হয় ।

রোহিতক লৌহ ।—রোহিতক ছাল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ-

(বিড়ঙ্গ, মুখা, চিতামূল), প্রত্যেকে সমভাগ, সর্ব সমান লৌহ, একত্র মর্দন করিয়া লইবে । মাত্রা ২ রতি, অন্নপান মধু ।

যকৃৎ ।—যকৃৎবোগেরও বিশেষ কোন ঔষধ নিদানকার লিখেন নাই, এক্ষণে এস্থলে তাহা বিবৃত হইল না, তবে বিক্রমি বোগ মধ্যে যাহা উল্লিখিত আছে, তাহা গ্লীহা চিকিৎসায় লিখিত হইয়াছে । তবে উহাব চিকিৎসা নিয়ে প্রদত্ত হইল

যকৃদরি লৌহ ।—লৌহ চূর্ণ ৪ তোলা, অজ ৪ তোলা, তাম্র ২ তোলা, পাতিলেবুর মূলের ছাল ৮ তোলা, অস্ত্রমূমে ভষ্মীভূত কুম্ভার চর্ম ৮ তোলা, এই সমুদয় একত্র জলে মর্দন করিয়া ৪ রতি পরিমিত বটিকা করিবে ।

মহাদ্রাবক ।—বাসক, চিতামূল, আপাঙ্গ, তেঁতুল ছাল, কুমড়ার ডাঁটা, মিজমূল, তালজটা, পুনর্নবা, বেত স্বক্ষ, এই সমুদয়ের ভষ্ম পাতিলেবুর বসে মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে । পরে ঐ ক্ষার দ্রব্য প্রচণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিবে । এই ক্ষার ২ পল, গোবা ২ পল, ফটুকিরী ১ পল, নিশাদল ১ পল, সৈন্ধব ৪ তোলা, মোহাণা ২ তোলা, হিরাকস ১ তোলা, মুদ্রাশঙ্খ ১ তোলা, সৈকো ২ তোলা, সমুদ্রফেন ১ তোলা, এই সমুদয় একত্র চূর্ণ করিয়া বকযন্ত্রে চুয়াইয়া আরক লইবে । ইহার ২ ৩ বিড় ৮ । ১০ গুণ জলে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে ।

রোহিতক চূর্ণ ।—রোহিতক ছাল, যবক্ষার, চিবিতা, কটকী, মুখা, নিশাদল, আতইচ ও শুঠ একত্র মিশ্রিত করিবে । মাত্রা —১ মাসা, অন্নপান শীতল জল ।

শঙ্খদ্রাবক ।—আকন্দ ছাল, মিজমূল তেঁতুল ছাল, তিল কাষ্ঠ, সোঁদাল ছাল, চিতা, আপাঙ্গ, এই সমুদয়ের সমান সমান ভষ্ম লইয়া জলে ওলিয়া ছাঁকিয়া লইবে । ঐ ক্ষারজল যতক্ষণ লবণরস প্রাপ্ত নাহয়, ততক্ষণ যত্নে অগ্নিতে পাক করিবে । পরে ঐ লবণ ৪ তোলা, যবক্ষার, সচিক্ষাব, মোহাণা, সমুদ্রফেন, গোঁদন্ত, হরিতাল, হীরা কস, মোরা, প্রত্যেক ৪ তোলা, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ৮ তোলা । এই সমুদয় একত্র করিয়া টাঁবা লেবুর রসের সহিত কাচকুপীর মধ্যে মগ্ধা রাখিয়া

দিবে । পরে শঙ্খচূর্ণ ৮ তোলা উহাব সহিত মিশ্রিত করিয়া বাকণী
যন্ত্রে চুয়াইয়া লইবে ।

সর্বেশ্বর লৌহ ।—পাৰা ১ পল, গন্ধক ১ পল, অত্র ২ পল, তাম্র
৩ পল, স্বর্ণমাক্ষিক ৪ তোলা, জয়পাল, চিতামূল, পুরাতন মাল, ওল,
ষেটকোল, পিপ্পলমূল, ত্রিফলা, তেউড়ী, আপাঙ্গ, ডানুকুনি শাক, বিছাটী-
মূল, হ'বধ, ন'গদন, ছড়ছড়, প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা । এই সমুদয়
আদার রসে মাড়িয়া পরে লৌহ চূর্ণ ৩ পল মিশ্রিত করিয়া মাড়িয়া
লইবে । ইহাব মাত্রা ১ মাস, অনুপান দীতল জল ।

মহা যুত্মজয় লৌহ —পাৰা, গন্ধক, অত্র, প্রত্যেক ৪ মাসা,
লৌহ ১ তোলা, তাম্র ২ তোলা, যবক্ষাব, মাচিকাব, টেম্বাব, রিট, কড়ি-
ভস্ম, শঙ্খভস্ম, চিত্তামূল, মনছাল, হবিতাল, হিঙ্গু, কটকী, রোহীতক-
ছান, তেউড়ী, তেঁতুল ছাল ভস্ম, অন্নবেতস, হবিজা, দাকহবিজা, প্রিষঙ্গু,
ইন্দ্রযব, হবিওকী, বনযমানী, তুঁতিয়া, শরপুঞ্জ, বসাগুন প্রত্যেক ৪ মাসা
এই সমুদায় একত্র মর্দন করিয়া আদা ও গুলঞ্চের রসে ভাবনা দিবে ।
অনন্তর ২ পল মধুর সহিত মাড়িয়া ৬ বতি, প্রমাণ বটা
প্রস্তুত করিবে । দোষ বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিতে
হইবে । এই ঔষধ প্রাতঃকালে সেবনীয় । ইহা দ্বাব প্লীহা ও গুল্মাদি
রোগ নষ্ট হয়

হোমিওপ্যাথিকে পীড়া ও যকৃৎ চিকিৎসা।

পীড়া মনুষ্যদেহস্থ যন্ত্রবিশেষ পাঁকস্থলীর স্বহৃৎ প্রান্তে অবস্থিত যন্ত্রবৎ পদার্থে মিশ্রিত পাকক্রিয়ায় অস্থূল্যার্থে ইহাতে বক্ত সঞ্চিত থাকে। কম্পজব মন্দজব দীর্ঘকাল ভোগ হইলে, এই যন্ত্র বড় হয় ঘা ইহাতে টিউবার্জিস্। এই বোগে অকচি, অগ্নিমান্দ্য, মুখে জল উঠা, বিকৃত শ্বাস ইত্যাদি লক্ষণ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় “সল্ফার,” “ক্যালকেকবিয়া” ও “ব্যাবিটা” ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগে বোগ শান্তি হয়।

যকৃৎ ।—এই যন্ত্র যে কেবল মাত্র মানবদেহের স্বহৃৎম যন্ত্র, এমন নহে। ইহাইহাতে পিত্তবস। উদ্ভূত হইয়া পদার্থ ও বক্তসঞ্চালন-ক্রিয়ায় সহায়তা করে এবং অন্যান্য দূষিত পদার্থ ইহাতে শাবীবিক ক্রিয়াকে নিম্নুক্ত বাখে। এই যন্ত্রেব ক্রিয় সহজেই বিকৃত হইয়া নানা প্রকার পীড়া উৎপাদন করে।

কারণ ।—উপযুক্ত আহার গ্রহণে অনাবধানতা, অমিত্তভোজন, শৈত্যসেবন প্রভৃতি এই রোগের প্রধার কারণ।

লক্ষণ ।—সুখামান্দ্য, সাধাবণ অস্থস্থতা, অল্প কিশা অধিক মাত্রায় শিরঃপীড়া, স্কন্ধদেশে বেদনা, অস্থস্থ রোম, প্রদাহ এবং কোষ্ঠবদ্ধ, যকৃৎ তেব ক্রিয়া বিকৃত হয় এবং তাহা হইতে উপযুক্ত পরিমাণে পিত্তবস উদ্ভূত হয় না।

চিকিৎসা ।—দিনেব মধ্যে ৩ বার “লুকাসমিকা” প্রয়োগ করিবে। তাহাতে ফল না পাইলে “মার্কুরিয়স্” প্রভে এবং রতিকালে ব্যবস্থা করিবে, এবং তৎপশ্চাৎ “পডোফিলাম্” উক্ত প্রকারে প্রভে এবং সাত্তিকালে ব্যবস্থাব কবিতে হইবে।

পথ্য ।—লক্ষ ও পুষ্টিকর জন্ম। চা, কফি, সুর্যাদি পান্য একবারে নিষিদ্ধ।

হাকিমীমতে প্লীহা ও যকৃৎ চিকিৎসা।

প্লীহা।—সৰ্বদা কিশ্বা সময়ে সময়ে জ্বর হয়। জিহ্বা শুক্লবর্ণ, কখন বা হবিজ্জা বর্ণ হয়। প্লীহা ফুলিয়া উঠে। বামদিকের পাঁজরের নীচে টিপিলে প্লীহা অনুভব করা যায়। হস্ত দ্বারা টিপিবার সময় গোল-কাব ও কঠিন বোধ হয়। চিকিৎসা না হইলে ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে।

চিকিৎসা।—বোগী অপেক্ষাকৃত শূলকায় হইলে উপরে শিং বসাইয়া চারি কিশ্বা পাঁচ ছটাক আন্দাজ বক্ত বাহিব করিবে, অথবা ১০।১৫টা জোঁক তাহার উপর বসাইয়া দিবে। রোগী দুর্বল হইলে বক্তমোক্ষণ করা যাইতে পারে না। নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার করিতে দিবে।

হিবাকস্	...	...	...	৩ মাস।
মুসব্বর	...	...	...	৬ মাস।

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া জল দিয়া ২৫ টী বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক একটা সেবন করিতে দিবে।

দান্ত পৰিকাব থাকে এই রোগেব শূলকঃ বলিতে হইবে, কিন্তু সেই দান্ত ঔষধ দ্বারা না হইলে, বোগেব এমন ধর্ম নয় যে, তদ্বারা দান্ত পৰিকাব বার্থিবে। উপবোক্ত ঔষধ সেবনে দান্ত না হইলে, এরও তৈল অর্দ্ধ ছটাক গবম জলেব সহিত সেবন করাইবে।

অন্য প্রকার।

জাঙ্গি-হবিজ্জকী	...	...	...	২০ রতি
কাল লবণ	...	...	...	১০ রতি।

এই দুই দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত ও চূর্ণ করিয়া প্রাতঃকালে খাইবে এবং সন্ধ্যাব সময় চিরাতার জল ১ ছটাক খাইবে। আধাম না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন এইরূপ করিবে।

অন্য উপায় ।

হিবাঁকম	...	..	২ মাস ।
মুসকব	• ...	...	২ মাস
বস্মন*	...	...	২ মাস ।

এই কয়েক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘোলটি বটা কা প্রস্তুত করিবে । প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইটি কবিয়া ৪ টি প্রতিদিন খাওয়াইবে, আর ৫ দিন অন্তর ভেবেণ্ডাব তৈল অর্দ্ধ ছটাক খাওয়াইবে

অন্য প্রকার ।

বস্মনেব কোষ	..	৮ গাণ্ডা ।
লবঙ্গ	...	২ তোলা ।
সবাবু	...	১ মেব ।
মুসকব	...	১০ ছটাক

এই কয়েক দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ১৫ দিন বোজে রাখিবে, পবে প্রত্যহ একবারে ১ কাঁচা ওজনে প্রাতে ও সন্ধ্যায় খাওয়াইবে । প্লীহাব সহিত দান্ত হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী

অন্য প্রকার ।

বস্মনেব কোষ	...	৮ গাণ্ডা ।
মুসকব	..	১০ ছটাক
সিধকী	..	১ মেব

এই দ্রব্যগুলিকে একত্র মিলিত করিয়া ২৫ দিন পর্যন্ত বোতলে রাখিবে; পবে প্রত্যহ একবারে ১ কাঁচা ওজনে প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুই বার খাইতে দিবে ।

অন্য প্রকার ।

লৌহ চূর্ণ	..	২০ গ ম
সরিষার তৈল	..	৩০ তোলা
সবাব	...	১ তোলা

এই সকল দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া আহাবের পত্র ১ কাঁচা ওজনে সেবন করাইবে

যকৃৎ চিকিৎসা ।—বাসক, চিতামূল, আপাঙ্গ, কুমড়াব ডাঁটা, সিজমূল, তালজটা, পুনর্নবা, বেত রক্ষ, এই সমুদয় ভক্ষ্য সমভাগে লেবুর রসের সহিত মাড়িয়া বহুদূর ও হিঙ্গু সমভাগে তাহাতে মিশ্রিত করিয়া বড় গটবেব মত বটি প্রস্তুত করিবে সেই বটি প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক একটী সেবন করিতে দিবে ।

অন্য উপায় ।

আফিঙ্গ	...	...	১০ আনা
হিঙ্গুল	..	..	০ তোলা

প্রথম দিন আমূল শাকের বসে, দ্বিতীয় দিন গোঁড়ালেবুর বসে, তৃতীয় দিন ছড়ছড়ের বসে মর্দন করিয়া চনা কলাইয়ের খায় এক একটি বাটিকা প্রস্তুত করিবে উদবাস্যযুক্ত যকৃতে এক একটী বটি প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে ।

সপ্তম অধ্যায় ।

র্যালোপ্যাথিকে পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা ।

পাণ্ডুরোগকে একটি স্বাধীন পীড়া বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। নানা বোনের উপসর্গরূপে ইহাকে মনুষ্যদেহে আবির্ভূত হইতে দেখা যায়

লক্ষণ ।—দেহের সর্বত্রই পীতবর্ণ হইতে পাবে ; মস্তিষ্ক, জাহ্নি ও গর্ভস্থ সন্তানের এই বর্ণ হইয়া থাকে সামান্য পিত্তপ্রণালীর অবরোধজন্য এই পীড়া হইলে, যকৃৎ সর্ষাপেক্ষা গাঢ় বর্ণ হয়, কিন্তু অন্য কাবণে ইহা হয় না সাধারণতঃ পিত্তপ্রণালীর অবরোধ ব্যতীত

যাহাদের পীড়া হয়, তাহাদের বর্ণ অতি গাঢ় হয় না। এই রোগে দেহস্থ সকল প্রকার ক্লেদই পীতবর্ণ হয় রক্তের সহিত পিত্তাশ্ম থাকিলে মুখে তিত্তাস্বাদ বোধ হইতে পাবে পিত্তাভাবে অজ্ঞাধ্যান, কোষ্ঠবদ্ধ ও মলের স্বভাব পরিবর্তন, মল কৰ্দমবৎ ও শ্বেতবর্ণ হয়, শরীর নীর্ণ ও দুর্বল হইয়া থাকে। কখন কখন গাত্র-যন্ত্রণাদায়ক কণ্ডু দেখা যায়, অক্ষিপুটের ত্রকে, হস্তচর্মে বা অঙ্গুলীর গ্রন্থি ও দন্তমাড়ীতে একপ্রকার অগ্নি পুষ্ক, তসচ্ছ, শ্বেতবর্ণ চিহ্ন দেখা গিয়া থাকে। দেহের সমস্ত প সচবাচর পরিবর্তিত হয় না। নাড়ী কখন কখন এত মুহু গতি হয় যে, প্রত্যেক মিনিটে ৪০ ৫০ বা ২০ বাব স্পন্দিত হইয়া থাকে। পাণ্ডুরোগ অধিককাল স্থায়ী হইলে নৈমিত্তিক ঝিলী হইতে রক্তস্রাব হয়। কখন কখন পাকাশয় ও অন্ত্র হইতেও অধিক রক্তস্রাব অসম্ভব নহে। এরূপ অধিক শোণিতস্রাবহেতু রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয় উপযুক্ত পরিপোষণাভাবে দেহ বলহীন, চিত্তোদ্বেষণ ও স্বভাব ক্রম হইতে পারে। বোগী কোন কোন স্থলে সমস্ত বস্তুকেই পীতবর্ণ দেখে। প্রবল প্রলাপ, জড়তা, অচৈতন্য, আক্ষেপ, বেশী কম্প, সঙ্কোচক পেশীর শিথিলতা, শুষ্ক ও কটাবর্ণ জিহ্বা, টাইফয়েড অবস্থার বাবতীয় লক্ষণ প্রকটিত হয়

পীড়ার কারণ প্রকৃতরূপে নিশ্চয় না কবিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে অনেকস্থলে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, কাবণ, যকৃতের ক্রিয়া শুদ্ধ হইলে যে সকল ঔষধদ্বারা উপকার হয়, পিত্তপ্রণালীর অববোধে সেই সকল ঔষধ ব্যবহার করিলে পিত্ত বৃদ্ধি হইয়া বিশেষ অনিষ্ট ঘটে। পীড়া পিত্তাববোধ জন্ম, কি পিত্তাববোধ ব্যতীত নিশ্চয় করিতে হইলে নিম্নোক্ত প্রকারে পরীক্ষা করিতে হইবে

একটি শিশিতে ২ ড্রাম মুক্ত গ্রহণ কবিয়া তাহাতে অর্দ্ধ ড্রাম জল-শুষ্ক মল্ফিউরিক-স্যাঙ্গিড দিবে অনন্তর একটি মটর বলাইয়েন মত মিছরিব দানা তাহাতে দিবার পূর দুইটি তবল স্রব্যের মিলনস্থানে যদি বেগুনে বা লালবর্ণ রেখা পাত হয়, তবে পিত্তাববোধ জন্ম পাণ্ডুরোগ জানিতে হইবে; আর তাহা না হইয়া যদি মিছরীর কটাবর্ণ রেখা পাত হয়, তবে পিত্তাববোধ ব্যতীত পাণ্ডু বৃদ্ধিতে হইবে।

চিকিৎসা — পিত্তাবরোধ জন্ত পাণ্ডুতে নিম্নোক্ত ঔষধগুলি
প্রয়োগ কবিবে ।

সল্ফেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া	...	...	১২ আং ।
কার্বনেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া	...	..	১২০ গ্রেণ ।
ম্যাগ্নেসিয়া মেম্ব পিপারবেট	...	..	৭২ আং ।
কলচিকম ওয়াইন	...	...	২ ড্রাম

ছয়মাত্রা প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক এক মাত্রা সেবন করাইবে

টীং সিলি	...	...	১২ ড্রাম ।
টীং ক্যাম্ফর কমঃ ওপিও	.	...	৪ ড্রাম ।
লুইকব ম্যাগ্নেসিয়া ম্যাগ্নিট্যাটিশ্	...	..	৪ ড্রাম ।
ডিকক্ট স্কোপারি	...	...	৭২ আং ।

ছয় মাত্রা দিবসে তিনবার সেবন কবিতে দিবে ।

পল্ড সিলি	...	...	৬ গ্রেণ ।
পল্ড ডিজিট্যালিস্	...	...	৮ গ্রেণ ।
পল্ড হাইড্র জি'বাই	...	...	৩০ গ্রেণ

বাবলী বটী হইবে প্রাতে এবং রাতে সেবনীয়

পিত্তাবরোধ ব্যতীত পাণ্ডুবোগে নিম্নোক্ত ঔষধগুলি ব্যবস্থা করিবে ।

ডাইঃ নাইট্রিক ম্যাগ্নিড	..	..	১২ ড্রাম ।
স্পিরিট ইথাব নাইট্রেটসি	...	...	১২ ড্রাম ।
সাসিঃ ট্যারাক্সিকম্		...	১২ আং
টীং সেনা	..	.	৪ আং
ইন্ ফিউজন্ জেন্শন্ কম্পঃ	...	..	৭২ আং ।

ছয়মাত্রা এক এক মাত্রা দিবসে ২ ৮৩ বার ,

ডাইঃ নাইট্রিক ম্যাগ্নিড	..	...	২ ড্রাম ।
সাসিঃ ট্যারাক্সিকম্	...	...	৫২ ড্রাম .
কিকক্ট এ	...	...	৭২ আং ।

ছয় মাত্রা দিবসে তিনবার সেবনীয় ।

স্পিরিট ম্যাগ্নেসিয়া ম্যাগ্নিট্যাটিক	..	..	৫২ ড্রাম ।

বৈদ্যকে পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা ।

২০৫

ভাইনম্ কল্‌চিসাই	...	...	১১ ড্রাম ।
টীং অর্যান্সাই	...	...	১১ আং ।
অর্দ্ধ বোতল সোডাওয়াটারেব সহিত একটী চা-চামচেব এক চামচ ঔষধ দিবসে তিনবার			
হাইড্রো ক্লোরিক য়ামোনিয়া ..	..	..	২০ গ্রেণ ।
একক্টাষ্ট ট্যারাক্সিকন্	...	.	১৫ গ্রেণ ।
টীং জেন্‌শান্ কম্পোজিটা	...	...	১১ ড্রাম ।
ইন্‌ফিউজন্ সেনা	...	...	১১ আং ।
এক মাত্রা । দিবসে ২ ৩ বার সেবন বিধি			

• বৈদ্যকে পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা ।



অতিশয় শাবীবিক পরিশ্রম এবং অন্ন, লবণ, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ মদ্য ও
যুতিক ভক্ষণ ও অতিশয় দিবানিত্রা, এই সকল কারণে বায়ু, পিত্ত, কফ,
কুপিত হইয়া চর্মকে পাণ্ডু বর্ণ করিয়া থাকে ।

পূর্বরূপ — পাণ্ডুবোগ জন্মিবাব পূর্বে গহ্বর্যেব চর্মেব কিকিৎ
বদীর্ণতা, মুখ দিয়া জলউঠা, দেহের অবসন্নতা, শ্বৎস্ভক্ষণেচ্ছ, অগ্নি-
গোলকে শোথ, বিষ্ঠা ও মূত্র পীতবর্ণ, অপাক, এই সমস্ত লক্ষণ হয়

প্রকারভেদ ।—বাত, পিত্ত, কফ সান্নিপাত ও শ্বৎস্ভক্ষণ ইত্যাদি
কাবণভেদে পাঁচ প্রকার পাণ্ডুবোগ জন্মে

বাতজ পাণ্ডুর লক্ষণ* ।—যে ব্যক্তিব বাতজ পাণ্ডুবোগ জন্মে,
তাহাব চর্ম, মূত্র ও ~~বাত~~ কৃষ্ণ ও অকণ বর্ণ হয়, এবং সূচীবোধনবৎ
*পীড়া, কম্প, আনাহ অর্থাৎ কুক্ষিতে বন্ধনবৎ পীড়া ও ভ্রম, এই সমস্ত
লক্ষণ হয় .

চিকিৎসা ।—বায়ুজন্ম পাণ্ডুবোগে স্নিগ্ধ ত্রিষা কবিত্তে হইবে
গুড়ের সহিত হরিতকী নিত্য ভক্ষণ করাইবে

নারায়ণ লৌহ ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুখা, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ সর্বসমান, অর্থাৎ ৫ তোলা । এই সমুদায় দ্রব্য ডাঙে মর্দন করিয়া বটীকা প্রস্তুত করিবে । মাত্রা ১ বতি, হইতে ৩ আবস্ত কবিষ ৯ বতি পর্য্যন্ত । অন্নপান মধু ও ঘৃত ।

পিত্তজ পাণ্ডুর লক্ষণ ।—বিষ্ঠা, মূত্র এবং নেত্রাদির পীতবর্ণ ও দাহ, পিপাসা, জ্বর, পাতলা দান্ত, এবং শরীরের পীতবর্ণ আভা হয় ।

চিকিৎসা ।—ত্রিফলা, গুড়চি, দাকহরিজা, অথবা নিমছালের রস মধুর সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন কবিত্তে দিবে ।

ত্রিকএয়াদ্য লৌহ ।—মণ্ডুর ১ পল, চিনি ১ পল, কান্ত লৌহ শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরিতকী, আমলা, বহেড়া, চিতামূল, মুখা, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা । এই সকল দ্রব্য লৌহখলে গব্য ঘৃত ১ পল ও মধু ১ পলের সহিত লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দন করিয়া সাত দিবস রৌদ্রে শুষ্কিশিথি রাখিবে, প্রত্যহ উত্তমরূপে মর্দন করিবে । ইহার মাত্রা ১ মাস । ভোজনকালে প্রথম গ্রাসেব সহিত ও মধ্যে একবার, এবং শেষ গ্রাসেব সহিত একবার সেবনীয় ।

আহারের সহিত সেবনে বিশেষ কষ্ট বা অপ্রসুতি হইলে কুলেখাড়া রস বা ছন্ধাদি অন্নপানের সহিত ব্যবহার করা যায় ।

কফজ পাণ্ডুর লক্ষণ ।—কফ প্রেসক, শোথ, নিদ্রাবৎ ক্লান্তি, আলস এবং শরীরের অতিশয় গুরুতা ও চর্ম, মূত্র, নয়নাদি শুক্লতা প্রাপ্ত হয় ।

পুনর্গবা মণ্ডুর ।—শোধিত মণ্ডুর ৫ পল, পকার্থ গোমূত্র ৫ সেব আসন্নপাকে পুনর্গবা, তেউড়ীমূল, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, কুড়, ত্রিফলা, হরিজা, দাকহবিজা, দন্তীমূল, চণ্ডি, ইন্দ্রযব কটকী, পিপুলমূল, মুখা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ কবিয়া আলেড়ন করিয়া নামাইবে । মাত্রা ৮ মাস পর্য্যন্ত । ইহা সেবনে পাণ্ডু, শোথ প্রভৃতি অনেক রোগ বিনষ্ট হয় ।

ত্রিদোষজ পাণ্ডুর লক্ষণ । জ্বর, অকচি, ক্লান্তি, অর্থাৎ যেমন হইল এইরূপ বোধ, বমি, পিপাসা, ক্লান্তি, ক্ষীণ এবং হৃৎপ্রত্যাহ হয় । চিকিৎসক এই পীড়া কষ্টসাধ্য বলিয়া জানিবেন ।

বজ্রবটমণ্ডুর ।—গোমূত্রে শোধিত মণ্ডুব ৫ পল, পকার্থ গোমূত্র ৫ সেব ; পাকশেষ হইলে পুনর্নবা, তেউড়ীমূল, শুঠ, পিঁপুল, মবিচ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, কুড়, ত্রিফলা, হবিজা, দাকহরিজা, দণ্ডীমূল, চণ্ডি, ইন্দ্রযব, কটকী, পিঁপুলমূল, মুখা, ইহাদেব প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা পবিমাণে প্রক্ষেপ কবিয়া আলোড়ন কবিবে । নামাইয়া শীতল কবতঃ পরিকৃত পাণ্ডে বন্ধা কবিবে । মাত্রা ৪ মাসা পর্যন্ত ইহা সেবনে পাণ্ডু, শোথ প্রভৃতি বোগ বিনষ্ট হয় ।

মৃত্তিকাজ পাণ্ডুরোগের লক্ষণ —মৃত্তিকাভোজনশীল বাতাদির অগ্ন্যম মল কুপিত হয় * তাহাব মধ্যে বিশেষ এই যে, কষায় মৃত্তিকা ভোজন কবিলে বায়ু, উষব মৃত্তিকা ভক্ষণ হেতু পিত্ত, ও মধুব মৃত্তিকা ভক্ষণ হেতু কফ কুপিত হয় ; এবং ঐ ভুক্ত মৃত্তিকারসাদি ধাতুকেও কুপিত কবে । মৃত্তিকাব কক্ষমত্ব হেতু ভুক্ত বস্ত্র মাত্রেই কক্ষম হয় ঐ মৃত্তিকা পরিপাক না হইয়া উদব পুৰণ করে, অনন্তর স্রোত সমুদায়কেও বোধ করিয়া চক্ষু, কণ, নাসিকাদি ইন্দ্রিয় সমূহেব বল বিনাশপূৰ্বক তেজ, বীৰ্য ও ওজঃ বিনষ্ট করতঃ বল, বর্ণ, অগ্নিবিনাশক পাণ্ডুবোগ উৎপাদন করিয়া থাকে ।

চিকিৎসা —চিনিব সহিত তেউড়ীমূল চূর্ণ ও গোবক্ষচাকুলে, অথবা গুড়ের সহিত শুঠি সেবন করিলে পাণ্ডুবোগ নষ্ট হয় ।

বহেড়া কাঠের অগ্নিতে মণ্ডুব দক্ষ করিয়া ক্রমশঃ ৮ বার গোমূত্রে নিক্ষেপ কবতঃ চূর্ণ করিয়া মণ্ডুব সহিত সেবন করিলে কুষ্ঠকামলা পর্যন্ত নষ্ট হয় ।

পঞ্চামৃত লৌহ মণ্ডুর ।—লৌহ, তাম্র, গন্ধক, অজ, পাবা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুখা, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চিবণতা, দেবদারু, হবিজা, দাকহরিজা, কুড়, যমানী, জীবা, কৃষ্ণজীবা, শাঠি, ধন্থা, চণ্ডি ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, চূর্ণসমষ্টিব অর্ধেক শোধিত মণ্ডুব, (বৃদ্ধ বৈদ্যাগণেব মতে চূর্ণেব সমান, মণ্ডুব), মণ্ডুব চূর্ণেব ৪ গুণ গোমূত্র, ৮ গুণ পুনর্নবাব কাথ । গোমূত্র, পুনর্নবাব কাথ ও মণ্ডুব চূর্ণ একত্র পাক কবিয়া পাক শেষ হইলে লৌহাদি চূর্ণ সমস্ত প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত কবিয়া

নামাইবে । শীতল হইলে মধু ১ পল মিশ্রিত করিবে । গাএা বিবেচনা-
মতে দিবে । অনুপান কুলেখাড়ার বস । ইহাতে গ্রহণী, পাণ্ডু, কামলা
ও শোথ প্রভৃতি বোগ নষ্ট কবে ।

জ্বরস্বত্রে পাণ্ডুরোগে পঞ্চানন বটী ।—পাবা, গন্ধক, তাম্র,
অত্র, গুগ্গলু, ইহাদের প্রত্যেকের সমানভাগ, সর্বসমান জয়পাল-বীজ ;
একত্র হুতে মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবন
করিলে পাণ্ডু বোগ ও শোথ নষ্ট হয় । অনুপান ঘলঘসীর বস ।

ক্রিমিকোষ্ঠতার লক্ষণ ।—যে পাণ্ডুবোগী কোষ্ঠদেশে ক্রিমি
জন্মে, তাহার অক্ষিপুট, গণ্ড, জ্র, পদ, নাভি এবং লিঙ্গে শোথ হয়, এবং
ঐ রোগী বক্ত ও কফের গহিত অভ্যন্ত মলত্যাগ করে ।

অসাধ্য লক্ষণ ।—বহুকালোৎপন্ন পাণ্ডুবোগে যদি সমুদয় ধাতু
কক্ষ হয়, তবে সেই রোগ অসাধ্য, এবং কালান্তিরেকবশতঃ য়ে শোথ-
যুক্ত বোগী পীতবর্ণ দর্শন কবে, তাহারও রোগ অসাধ্য ।

যে পাণ্ডুবোগী কফের সহিত হবিৎবর্ণাক্ত অঙ্গ অথচ বক্ত মল
বিরেচন হয়, তাহার রোগ অসাধ্য ।

যে পাণ্ডুবোগী রক্তচিত্ত, শুক্রবর্ণদ্রব লিপ্ত নবীর এবং বমি, মুচ্ছা
ও পিপাসা দ্বাবা পীড়িত, ও বক্তক্ষয়হেতু যাহাব পাণ্ডু শ্বেতত্ব প্রাপ্ত
হইয়াছে, সেই রোগী কালগ্রাসে পতিত হয় । যে বোগী নখ, দন্ত ও চক্ষু
পাণ্ডুবর্ণ দর্শন কবে, সেই ব্যক্তিও কালকবলে পতিত হয় ।

যে পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ব্যক্তির হস্ত-পদাদিতে শোথ হয়, মধ্যশবীরে
শোথ না থাকে, এবং যাহার মধ্যশবীরে শোথ হয়, হস্ত পদাদিতে না
থাকে, এবং মলদ্বাবে মেঢ়ে ও মুক্কে শোথ হয় ও বোগী মোহযুক্ত এবং
সংজ্ঞাহীন অর্থাৎ স্তম্ভপ্রায়, ও অতিশয় জ্বর প্রভৃতি দ্বাবা পীড়িত
হয়, যশস্বী বৈদ্য তাহাকে ত্যাগ করিবেন ।

পাণ্ডুরোগাবস্থায় কমলার লক্ষণ ।—যে পাণ্ডুবোগী অতি-
রিক্ত পিত্তবর্জক দ্রব্য ব্যাহার কবে, তাহার পিত্ত, বক্ত ও মাংস দূষিত
হইয়া কামলারূপে পরিণত হয় । যাহাব চক্ষু অতিশয় হবিজ্ঞা বর্ণ, এবং
চর্ম, নখ ও নেত্রাদি হবিজ্ঞাবর্ণ হয়, এবং বিষ্ঠা, মুত্র, নত পীতবর্ণ হয়,

এ বোগী ভেদেব বর্ণবিশিষ্ট, ইন্দ্রিয়শক্তি বহিত ও দাহ, অণাক দুর্বলতা, গাত্রাবসাদতা ও অকচি দ্বাবা পীড়িত হয় ; এই সমস্ত লক্ষণযুক্ত, এবং কোষ্ঠ, হস্তপদাদি আর্দ্রিত বহুপিত্ত যে বোগ, তাহার নাম কামলা ।

চিকিৎসা ।—কামলা বোগীকে প্রথমে স্নেহ জ্বা পান কবাইয়া বিবেচক ঔষধ দিবে, পবে প্রশমন ঔষধ ব্যবস্থা কবিরে

নারায়ণ লৌহ —ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুখা, চিতামূল প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ সর্বসমান, অর্থাৎ ৫ তোলা, জলে মর্দন কবিয়া বটী প্রস্তুত করিবে পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি বোগে মধু ও ঘূতেব সহিত সেবনীয় । এক বতি হইতে আরম্ভ কবিয়া ৯ বতি পর্যন্ত যাত্রা ব্যবস্থা কবিবে

কুস্তকামলার লক্ষণ ।—এ কামলা কালান্তবে কঠোরতা প্রাপ্ত হইলে তাহার নাম কুস্তকামল এই বোগ কষ্টসাধ্য বলিয়া অভিহিত

চিকিৎসা ।—বজ্রবটমণ্ডু বাদি ঔষধ ব্যবস্থা

কামলার অসাধ্য লক্ষণ ।—কামলা বোগে অতিশয় শোথযুক্ত বাতিব বিষ্ঠা ও মূত্র যদি কৃষ্ণ এবং পীতবর্ণ হয়, ও মুখ, চোখ, বমি, বিষ্ঠা ও মূত্র ঈষৎ বক্তবর্ণ হয়, এবং এ বোগী যদি মোহযুক্ত হয়, তবে তাহার সেই বোগ অসাধ্য

যে বোগী দাহ, অকচি, তৃষ্ণা, অনাহ, তন্দ্রা ও মোহযুক্ত হয় এবং নষ্টঅগ্নি ও নষ্টমংজ্ঞ হয়, সেই রোগী কালক্রমে পতিত হয়

কুস্তকামলার অসাধ্য লক্ষণ ।—যে কুস্তকামলাযুক্ত বোগী বমি, অকচি, বমনোদ্বেগ, জ্বর ও ক্লান্ততা ও শ্বাস-কানাদি দ্বাবা পীড়িত, ও যাহার তবল দান্ত হয়, সেই বোগী মৃত্যুগুণে পতিত হয় ।

পাণ্ডুরোগে হলীমকের লক্ষণ —যদি পাণ্ডু বোগী হ্রিৎ অর্থাৎ সবুজ, শ্বেত বা পীতবর্ণ হয়, এবং বল ও উৎসাহক্ষয়, তন্দ্রা, মন্দাগ্নি, মন্দজ্বর, মৈথুনে অনিচ্ছা, দাহ, অকচি ও ভ্রম এই সমস্ত লক্ষণ যুক্ত হয়, তবে তাহার সেই বাতপিত্তজ পাণ্ডুবোগ হলীমক বলিয়া অভিহিত হয় ।

চিকিৎসা ।—পাণ্ডুরোগেব ঞায়

পুনর্গবা তৈল ।—তিল তৈল ৪ সের, কাথার্থ—পুনর্গবা ১০০ পল.

জল ৬৪ সেব, শেষ ১৬ সেব । কল্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাকড়া শৃঙ্গী, ধন্যা, কটফল, শঠী, প্রিয়ঙ্গু, দেবদারু, বেগুন, কুড়, পুনর্নবা মূল, যমানী, কৃষ্ণজীবা, এলাইচ, গুড়গন্ধ, পদ্মকাষ্ঠ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, প্রত্যেকে ২ তোলা । এই তৈল মর্দনে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার উপশম হয় ।

হোমিওপ্যাথিকে পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা ।

যকৃৎ বিকৃতি জন্ম এই রোগ জন্মিয়া থাকে । এই বোগে বোগী পীতবর্ণ হয়, কখন কখন কটাবর্ণ হইয়া থাকে । মূত্র গাঢ় কমলালেবুর খোসাব ন্যায় বর্ণ হয়, এবং দান্ত কদমেব ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইতে দেখা যায় । দিবসের মধ্যে তিনবার “নক্সভমিকা” প্রয়োগ করিতে হইবে, এবং “মার্কুবিয়াম” বাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে খাওয়াইবে ; তাহার পব বাত্রে এবং প্রাতে “পডোফিলাম্” দেওয়া উচিত । বালকের পীড়ায় “নক্সভমিকাব” পরিবর্তে ‘ক্যামোমিলা’ প্রয়োজ্য ।

হাকিমীমতে পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা ।

এই বোগে হলুদবর্ণ হয়, ক্ষুধা হয় না, আহার জীর্ণ হয় ন, কখন কখন মুখ কিস্বা উদর গুলিয়া উঠে, আব মলের বর্ণ প্রাক মাটির মত অথবা শুক্ল বর্ণ হয় ও দক্ষিণপার্শ্বে পাঁজরের নীচে টিপিলে বেদনা বোধ হয় এবং প্রস্রাব লালবর্ণ হয় ।

য়্যালোপ্যাথিকে হিমারেজ বা রক্তপিত্ত চিকিৎসা । ২১১

কারণ — পিত্তকোষেব বস বহু হওয়া প্রযুক্ত এই ব্যাধি জন্মে ।

চিকিৎসা জনবৎ আহার অর্থাৎ মাগু কিম্বা য়াবাকট, ফেন
অথবা পালো খাইতে দিবে যদি মোট মল্ল্য হয়, তবে ঐ বেদনাব
উপবে জেঁক বসাইয়া দিবে, এবং পোট পবিদ্ধ ব কবিবাব জন্ত নীচেব
লিখিত জোলাপ দিবে

মোনামুখীৰ পাতা । ... ৬ মাস ।

জাজি হরিতকী ... ৩ মাস ।

এই দুই দ্রব্যকে অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্যন্ত অর্দ্ধ দেব গবম জলে ভিজাইয়া
রাখিবে পবে জলকে ছাঁকিয়া বানিকালে শয়নেব পূর্বে খাইতে
দিবে ইহাতে কোষ্ঠ পবিদ্ধাব হইবে দুই দিবস অন্তর এইরূপে
পাচ সাতবাব খাওয়াইবে ।

অষ্টম অধ্যায় ।

য়্যালোপ্যাথিকে হিমারেজ বা রক্তপিত্ত চিকিৎসা ।

হৃৎপিণ্ড, ধমনী, শিবা এবং দেহেব সর্বস্থানে কৈশিক নাড়ী হইতে
রক্তস্রাব হইতে পারে, কিন্তু সচবাচর কৈশিক ঝিল্লী হইতেই অধিক
রক্তস্রাব হইতে দেখা যায়

সচবাচর বক্তপ্রধান ধাতু ও পিত্তপ্রধান ধাতু এবং উদ্ধতম্ভাব
ব্যক্তিদিগেব রক্তস্রাব হইতে দেখা যায় কোন প্রকাশ্য কারণ না
থাকিলেও, ব্যক্তি বা বংশবিশেষেব ব্যক্তিদিগেব সচবাচর রক্তস্রাব হইয়া
থাকে তন্মিত্ত অকস্মাৎ সন্তাপ বৃদ্ধি, কোন কারণবশতঃ বায়ুব শুষ্কতা
ও ওরলতা, অধিক মদ্যপান, সাতিশয় মানসিক উদ্বেগ, অপবিমিত ভ্রম,
জতবেগে উচ্চ স্থানে গমন, উষ্ণ গৃহে বাস, কোন কারণবশতঃ বক্ত

সঞ্চালনেব অববোধ, প্রচুব আহারেব অভাব, অভির্শয় হস্তগৈথুন, ইত্যাদি কাবনে এই পীড়া সমুদ্ভূত হয়

লক্ষণ ।—বক্ত্রাভেব স্থান, পরিমাণ, এবং বোগীৰ অবস্থাবিশেষে নানা প্রকাৰ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে যদি দেহে রক্তাধিক্য হয়, তবে বক্ত্রাভেব পৰ বোগী আপনাকে স্তম্ভবোধ কবিত্তে পাবে এবং বক্ত্রা-প্পতা হইলে তাহার বিপবীত ফল হয় নাড়ী ক্ষুদ্র, মুখমণ্ডল পাঙ্গাশ বৰ্ণ, শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন, হস্ত পদাদি শীতল, উপবেশন করিলে বা দণ্ডায়মান হইলে মস্তক ঘূর্ণন, দৃষ্টিৰ অববোধ, ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হইতে পাবে। কখন কখন আত্মবোধ শূন্য ও ক্রমে নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া বোগী প্রাণত্যাগ কবে

চিকিৎসা কেহ কেহ বিবেচনা কবেন, যাহাদেব মধ্যে মধ্যে রক্ত্রাভ হইয়া থাকে, তাহাদেব একবাবে বক্ত্র বন্ধ কবা অচাৰ্য। বাস্তবিক যদি সেই সঞ্চিত রক্তাধিক্যপ্রযুক্ত য়াপোপ্লোয়ী বা অত্র কোন মস্তিষ্কেব পীড়া হইবাব আশঙ্কা থাকে, তবে তাহাতে উপকাৰ না দর্শিয়া অপকাৰ ঘটতে পাবে তন্নিম্ন স্থানে প্রায়ই বক্ত্রাভ বন্ধ কবা আবশ্যক হয়। এক্ষণ হইলে বোগীকে স্থিতিরভাবে শীতল গৃহে বাখা কর্তব্য সঙ্কোচক ঔষধ প্রয়োগ কবা বিশেষ উপকারপ্রদ স্থানিক ব্যবহার ও পান জল বরফ ব্যবহার কবিলে

গ্যালিক য়্যানিড	..	...	১০ গ্রেণ
সল্ফিউবিক য়্যানিড য়্যারোমেটিক			১০ বিন্দু।
টীং সিনেমন্	.	• ..	১ ড্রাম
জল	...	...	১ আং।

এক এক মাত্রা বিবেচনা মত ব্যবহার করিলে

লৌহঘটিত ঔষধেব মধ্যে টীং ফেবিমিউবিযেটিকম্ সর্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে আভ্যন্তরিক রক্ত্রাভে কেহ কেহ ইপিক্যাকুয়ানহা বিশেষ উপকারী বলিয়া গণ্য কবিয়া থাকেন

রক্ত্রাভ নানা প্রকাৰ। বক্ত্রবহা নাড়ীৰ প্রাচীৰ ছিন্ন হইয়া বা কর্ত্তন করিবাব পৰ রক্ত্রাভ হইলে তাহাকে ট্র্যামাটিক বা আভিঘাতিক বক্ত্রাভ

স্যাংলোপ্যাথিকে হিমাৱেজ বা রক্তপিত্ত চিকিৎসা । ২১৩

কহে কোন দৈহিক কাবণবশতঃ এই ঘটনা হইলে উহাকে স্পাণ্ট-নিয়াস্ বা স্বয়ংজাত বক্ত্রাব বলে কঙ্কেশন্ বা প্রদাহেব পৰ রক্ত্রাব হইলে তাহাকে স্যাংক্টিও এবং শবীর দুৰ্বল হইয়া বা বক্ত্র স্বপ্পতা প্রযুক্ত হইলে তাহাকে প্যাথিভ্ কহে

সচরাচর নিম্নলিখিত স্থান সকল হইতে বক্ত্র্রাব হইয়া থাকে, এজন্য স্যাংলোপ্যাথিকে ইহাঙ্গিণেব ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে। যথা ;—

- ১। হিমাটিডোসিস্ বা ত্বক্ হইতে বক্ত্র্রাব।
- ২। এপিফ্যাক্সিস্ বা নাসা হইতে রক্ত্র্রাব
- ৩। অটরেজিয়া বা কর্ণ হইতে বক্ত্র্রাব
- ৪। ফ্যাটোবোজিয়া বা মুখগহ্বর অথবা গলা হইতে বক্ত্র্রাব।
- ৫। হিম্পাটিসিস্ বা ফুস্ফুস্ হইতে বক্ত্র্রাব।
- ৬। হিমেটিমিসিস্ বা পাকায় হইতে রক্ত্র্রাব
- ৭। হিম্যাটিউরিয়া বা মূত্রপিণ্ড হইতে বক্ত্র্রাব

ত্বক্ হইতে রক্ত্র্রাব —কখন কখন দেহের সকল স্থানস্থ উপ-ত্বকের নিম্নে বক্ত্র বা বক্ত্রমিশ্রিত পদার্থ সঞ্চিত হইতে দেখা যায় দেহেব অথবা বক্ত্রসঞ্চালন মণ্ডলীৰ কোন বিশেষ অবস্থা স্যাংলোকেৰ রক্ত্রোরোধ, অত্যন্ত শারীরিক বা মানসিক পাবিশ্রম, অকস্মাৎ ভয় ইত্যাদি কাবণবশতঃ ত্বক্ হইতে রক্ত্র বহির্গত হইয়া থাকে

চিকিৎসা —কাবণ নিশ্চয় কবিয়া চিকিৎসা করা কৰ্ত্তব্য। যদি কোন স্বাভাবিক রক্ত্র্রাব বন্ধ হইয়া এই ঘটনা হয়, তবে ইচ্ছা উহা নিবারণ করা বিহিত নহে যদি ভয় বা চিন্তাহেতু বক্ত্র্রাব হয়, তাহা হইলে আক্ষেপনিবারক, অবসাদক এবং বলকাবক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

নাসা হইতে রক্ত্র্রাব।—দেহেব অন্যান্য স্থান অপেক্ষা নাসাব অন্তরাবরণ শৈথিল্য হইতে রক্ত্র্রাব অধিক হয় ; কিন্তু ইহা প্রায় হানিজনক হয় না জ্বরের পূর্বে অথবা জ্বৰকালে যে অনেকেব “নাসা” হইয়া থাকে, তাহা এইরূপ বক্ত্রাধিক্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

লক্ষণ।—প্রায়ই মস্তক ঘূর্ণন, নিদ্রাবল্য, অস্থিৰতা, চক্ষু রক্ত্রবর্ণ,

কর্ণে শব্দ, টেম্পোবাল্ ধমনীৰ স্পন্দন, গ্রীবাদেশেব শিবা সকল পূর্ণ, নাসারজ্জ শুষ্ক এবং উষ্ণ ইত্যাদি লক্ষণের পর রক্তস্রাব হইতে দেখা যায় কখন কখন এক বা দুই বস্ত্র দিয়া রক্ত বর্হির্গত হয় কখন কখন উহাৰ পরিমাণ অত্যুপ্প হইয়া থাকে কখন কখন এত অধিক হয় যে, বোগী দুর্বল হইয়া পড়ে কখন কখন এই রক্তস্রাব নিৰ্ব্বিচ্ছেদ, সবিবাম বা অস্পবিবাম হইতে পাবে

চিকিৎসা —প্রথমে রক্তস্রাব নিবারণ করা কর্তব্য কি না, তাহা নিশ্চয় করা কর্তব্য । বোগীৰ পূৰ্ব্বরক্তান্ত অবহিত হইয়া এই বিষয় স্থির করিবে রক্তস্রাব অধিক হইলে টীং ফেবিপারক্লোরাইড, টীং ফেবিগিউবিযেটিস্ এবং ফট্ কিরিব জল ও ম্যাটিকোর জল দ্বারা পিচকাবী দেওয়া যাইতে পাবে ;—অথবা টীং ফেবিগিউবিযেটিমে লিণ্ট ভিজাইয়া তদ্বাৰা নাসাবন্ধ বন্ধ কবিলে উপকাৰ দর্শে বিবেচক ঔষধ প্রয়োগেৰ পর যকৃতের ত্রিয়ার্ধবির জন্ত নাইট্রিক গ্যাশিড ও ট্যারাক্সিকম্ ব্যবস্থা কবিবে ।

কর্ণ হইতে রক্তস্রাব ।—নিম্নোক্ত কারণে কর্ণ হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে, যথা, (১) কবোতীৰ মূলান্থি ভগ্ন হইয়া, (২) কোন প্রকাৰ আঘাত দ্বাৰা কৰ্ণনলীমধ্যস্থ ত্বক্ ছিন্ন হইয়া, (৩) কৰ্ণনলী মধ্যে স্ফোটক হইয়া, (৪) টেম্পোবাল্ অস্থির প্রান্তবাংশের কেবিক বা নিক্রোমিস্ এবং মেম্ব্রেনা টিম্পোনাইব ধ্বংস হইয়া, ক্যাণটিও নলীৰ মধ্যস্থ অস্থিকণা দ্বাৰা ইণ্টাবনাল্ ক্যাণটিও ধমনীতে ছিদ্র হইয়া, (৫) উচ্চ পৰ্ব্বতারোহণ, জোৰে হাঁচি বা বমন, শ্বাস কাশ ইত্যাদি কারণে, (৬) অৰ্শ, পুরাতন ক্ষত বা জী-জাতির বজোবন্ধ হইয়া কর্ণ হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে

চিকিৎসা —উপবি উক্ত কাৰণ সকল অনুসন্ধান করিয়া চিকিৎসা কবিবে ।

মুখগহ্বর হইতে রক্তস্রাব । যদি শীতল জল এবং সঙ্কোচক ঔষধ দ্বারা রক্তস্রাব নিবাবিত না হয়, তবে উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার কবিবে ঔষধেৰ বিষয় পূৰ্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; অর্থাৎ সাধারণ রক্তস্রাবেৰ ঔষধ দিবে ।

র্যালোপ্যাথিকে হিমা রেজ বা রক্তপিত্ত চিকিৎসা । ২১৫

ফুস্ফুস্ হইতে রক্তস্রাব —স্বচী ব্যবসায়ী, মসিজীবী প্রভৃতি ব্যক্তিদিগেব সর্বদা মস্তক অবনত করিয়া বাখা প্রযুক্ত পৃষ্ঠবংশ বক্র হইয়া কখন কখন ফুস্ফুস্ হইতে রক্তস্রাব হয় ।

লক্ষণ —রক্তস্রাব হইবার পূর্বে বক্ষঃস্থলে বেদনা, ভাববেধ, বক্ষাস্থি নিম্নে বা স্তঙ্কদ্বয়েব মধ্যে দাহানুভব, আলস্য, মুখমণ্ডল অরুচ, মুখে লবণাস্বাদ, অম্প কালি, ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় কখন কখন এই সকল লক্ষণ প্রকাশ না পাইয়া কেবলমাত্র নাড়ী ক্ষুদ্র হয়

চিকিৎসা —শীতল জল পান, তাহাব পবে ১০ গ্রেণ মাত্রায় গ্যালিক্ র্যাসিড ২৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে রোগী দুর্বল হইয়া পড়িলে ৫ বা ১০ গ্রেণ পরিমাণে ব্যাগেনিও সল্ফেট অফ আয়রন ব্যবস্থা করিবে কেহ কেহ বলেন, এককালে কিয়ৎ পরিমাণে লবণ প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল দর্শে কেহ কেহ আর্গট অফ রাই, ইণ্ডিক্যা-কুয়ান্হা, তাপিগ তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন এই সকল ঔষধেব সহিত শীতল জল ও বরফ দেওয়া উচিত এইরূপ রক্তস্রাব কখন কখন কোন কোন বোগের উপসর্গরূপে অবিভূত হয়, তজ্জন্য প্রধান বোগের চিকিৎসা যুক্তিযুক্ত

রক্তবমন ।—এই বোগে পাকায় এবং ফুস্ফুস্ হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে পাকায় হইতে রক্তস্রাব হইলে মাত্রায় অধিক, কখন কখন আহারীয় পদার্থের সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে, এবং পাকায়ের সহিত মিশ্রিত থাকাতে দেখিতে রক্তবর্ণ হয় ; কিন্তু ফুস্ফুস্ হইতে রক্তস্রাব হইলে অপেক্ষাকৃত অম্প এবং ফণায়ুক্ত হয়

চিকিৎসা —বোগীকে অতি স্থিতিভাবে শয়নাবস্থায় রাখিয়া কিয়ৎকালের জন্ত আহার করিতে নিষেধ করিবে । শীতল জল, বরফ এবং ঔষধেব মধ্যে গ্যালিক্ র্যাসিড সর্বোৎকৃষ্ট । কিন্তু কেহ কেহ তাপিগ তৈলকেও উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন নাড়ির উপরে শীতল জল প্রদান করিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পাবে যদি বোগী দুর্বল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বিফটী, পোর্ট ওয়াইন, অথবা ব্রাণ্ডি পিচকাই দিবে পীড়া পূর্বতন এবং রক্তস্রাব অম্প হইলে, বার্ক এবং র্যাসিড

সুব্যবস্থা। কখন কখন এ অবস্থায় লৌহঘটিত ঔষধ এবং কুইনাইনে বিশেষ উপকার দর্শে।

মূত্রোৎপাদন যন্ত্র হইতে রক্তস্রাব।—প্রস্রাবের সহিত শো-
নিত মিশ্রিত থাকিলে তাহাকে হিমাটিউরিয়া বলে। ঐ রক্ত-মূত্রপিণ্ড,
ইউরিটাব বা মূত্রপ্রণালী ইউরিথ্রা বা মূত্রমার্গ বা প্রফেট গ্রন্থি হইতে
বাহিব হইতে পারে। রক্তদোষজন্য প্রস্রাবের পীড়া হইলে, উহা
প্রথমাবস্থায় মূত্রের সহিত বক্ত থাকিতে পারে। মূত্রপিণ্ডে প্রবল প্রদাহ,
মূত্রপিণ্ডে বা মূত্রাশয়ে পাথরী, কটীতে আঘাত, এবং তাপিণ তৈল বা
ক্যান্সারাইডিস্ ব্যবহার, ইত্যাদি কাৰণে এই বোগ জন্মে। কখন কখন
বান্তজ্বর, নিমোনিয়া, বসন্ত, পাপুয়া, হাম, টাইফস্ জ্বর ইত্যাদি পীড়ার
সহিত এই বোগকে উপসর্গরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্রাবের সহিত
রক্তে রক্ত মিশ্রিত হইয়া লালবর্ণ হওয়ায় কখন কখন উহাকে হিমাটিউ-
রিয়া বলিয়া ভ্রম হয়, এজন্য স্ত্রীলোকেই এই পীড়া হইলে ইহা অল্প
সন্দান লওয়া কর্তব্য।

চিকিৎসা।—কাৰণ অনুসন্ধান করিয়া চিকিৎসা করা কর্তব্য।
ক্যান্সার বা পাথরী জন্ম এই পীড়া জন্মিলে সন্মোচক ঔষধ দিবে,
যথা :—টীং ফেবিপাবক্লোবাইড, গ্যালিক য়্যাশিড, এবং সল্ফিউবিক
য়্যাশিডই শ্রেষ্ঠ। তাপিণ তৈল কোনমতে ব্যবহার করা না হয়। তাহা
হইলে মূত্রকৃচ্ছ জন্মিয়া বহু কষ্ট দিবার সম্ভাবনা। অন্য কোন পীড়া
জন্ম এইরূপ রক্তস্রাব ঘটিলে, অথো সেই বোগেই চিকিৎসা করা বিশেষ
মূত্রাশয় হইতে রক্তস্রাব হইলে, ফটকিরি বা ট্যানিক য়্যাশিডের পিচ-
কারী দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

গ্যালিক য়্যাশিড	...	...	১২ গ্রেণ
পল্ড ইপিক্যাক্ কন্ ওপিযাই	...	...	৫ গ্রেণ
এক এক মাত্রায় ৮ বা ১০ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবে।			
সল্ফিউবিক য়্যাশিড য়্যাবোমেটিক	...	...	১২ ড্রাম
টীং ক্যান্সার কন্ ওপিযাই	...	...	২ আং।
য়্যাকোয়া সিনেমন্	...	...	৭২ আং

ছয় মাত্রা । আহাৰের পূৰ্বে এক এক মাত্রা দিবসে তিনবার
সেবনীয়

বৈদ্যকে রক্তপিত্ত চিকিৎসা ।



রক্তপিত্তের নিদান পূৰ্বক সংপ্রাপ্তি ।—অতিরিক্ত বৌদ্ধসেবা,
ব্যায়াম অর্থাৎ অনয়াশমাধ্য কার্য কৰা, শোক, পথপ্রাপ্তি, জ্বাতাভ্রুতী-
সংসর্গ, তীক্ষ্ণবীৰ্য্য জ্বা, উষ্ণ ক্ষাব অর্থাৎ বৰক্ষাবাদি, লবণ, অন্ন ও কটু-
জ্বা সেবন দ্বাৰা কুপিত পিত্ত স্বীয় গুণে বিদগ্ধ বস্তুর সহিত উৰ্দ্ধ এবং
অধোগামী হয় । উৰ্দ্ধে নাসিকা, চক্ষু, কণ ও মুখদ্বাৰা, এবং অধোদেশে
মেটু, যোনি ও মলদ্বার দিয়া নিঃসৃত হয় এবং অতিশয় কুপিত হইলে
সমস্ত বোমরূপ দ্বারাও রক্তপিত্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে ।

রক্তপিত্তের পূৰ্বরূপ ।—গাএর অবমনতা, শীতলেচ্ছা, কঠ ধূমা-
য়ন অর্থাৎ কঠ হইতে ধূম নির্গমেব ছায় পীড়া, বগন এবং নিশ্বাসে
লৌহেব গন্ধ, রক্তপিত্ত হইবার পূৰ্বে এই সমস্ত লক্ষণ হয় ।

রক্তপিত্তের কফাদিভেদে লক্ষণ ।—কফাদিক্য রক্তপিত্ত
হইলে ঘন, ঈষৎ পাণ্ডু, ঈষৎ স্নিগ্ধ ও পিচ্ছিল রক্ত্রাব হয় পিত্তাদিক্য
রক্তপিত্ত হইলে স্থানবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ পীত মিশ্র বর্ণ অথবা অক্লবর্ণ,
ফেনেব সহিত তবল অথচ কক্ষা বস্ত্র্রাব হয় । পিত্তাদিক্য হইলে কষা-
যাত্ত অর্থাৎ বট পটোলাদিকৃত কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, গোমূত্রগদূশ আভা-
যুক্ত, চিকণ, কৃষ্ণবর্ণ বা সৌবীরাঙ্কণ বর্ণ রক্ত্রাব হয় শ্বাতপিত্তাদি
কারণদ্বয়ের সংসর্গে দ্বন্দ্বজ এবং বাতাদি কারণত্রয়েব সংসর্গে সান্নিপা-
তিক রক্তপিত্ত জানিবে ।

দোষভেদে মার্গভেদ ।—কফসংসৃষ্ট রক্তপিত্ত উৰ্দ্ধগ হয় অর্থাৎ
মুখ, নাসিকা, চক্ষু প্রভৃতি দ্বাৰা রক্ত্রাব হয় । বাতানুগ হইলে অধোগ

অর্থাৎ মলদ্রাব ও শিশ্ন প্রভৃতি দ্বারা রক্তজাব হয় । কফ ও বাতিক
অধ, অভয়ায় বন্ধ হইলে উর্দ্ধ এবং অধ উভয় পথ দ্বারা রক্তজাব হয়

বক্তপিত্তের সাধ্যাসাধ্য নিরূপণ ।—উর্দ্ধপথগামী বক্তপিত্ত
অর্থাৎ কফজ, অধগামী অর্থাৎ বাতজ, যাপ্য ও উভয়পথাবলম্বী অর্থাৎ
কফবাতজ অসাধ্য

সাধ্যত্ব হেতু নিরূপণ —বলবান ব্যক্তির একপথগামী, অস্পবেগ-
কারী, অস্পকাল জাত, নিকপদ্রব বক্তপিত্ত হেমন্ত ও শিশ্নিকালে সাধ্য

এক দোষানুগ বক্তপিত্ত হইলে সাধ্য, দ্বিদোষজ যাপ্য, মন্দাগ্নিযুক্ত
ব্যক্তি বত্রিদোষজ রক্তপিত্ত অসাধ্য, অত্র ব্যাধি দ্বারা ক্ষীণদেহ ব্যক্তির
অতি বেগবান বক্তপিত্ত অসাধ্য, বার্ককা ও অকচ্যাদি পীড়িত এবং অনা-
ভাবে অর্থাৎ যে আহাব না করে, তাহাব রক্তপিত্ত অসাধ্য ।

উপসর্গ ।—শরীরের দুর্বলতা, শ্বাস, কাশ, জ্বর, বমি, মূদ্র অর্থাৎ
সুপাবি ধুস্তুব ভক্ষণ জন্ত উন্নততা, দেহের পাণ্ডুতা, দাহ, শূচ্ছা, রক্ত
বস্তুর বিদগ্ধতা, সর্বদা অধীবতা, হৃদয়ে অসদৃশী বেদনা অর্থাৎ ঐ বেদনাব
অত্র কোন বেদনাব সহিত তুলনা করা যায় না ; পিপসা, মলভেদ, শিবো-
ভিতাপ, অতি দুর্গন্ধময় গুণ্ডুজাব, আহারে অকচি, অপাক ও শরীরের
বিকৃতি এই সমস্ত বক্তপিত্তের উপসর্গ ।

প্রত্যাখ্যেয়তা নিরূপণ । বাহার রক্তপিত্ত মাংসদ্বীত জলের
স্থায়, কথিত জলের স্থায়, কন্দগমিত্রিত জলতুল্য, মেদ, পুষ্ট কিশ্বা বস্ত-
সদৃশ, অথবা যকৃতপিত্তের স্থায়, পক জামফলের স্থায় আভাযুক্ত, কৃষ্ণ
কিশ্বা নীলবর্ণ, অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত, পূর্বে যে সমস্ত বিকার উক্ত হইয়াছে
তদযুক্ত এবং ইন্দ্রিয় তুল্য দীপ্তিযুক্ত, তাহার সেই বক্তপিত্ত বৈদ্যের বর্জ
নীম্ব অর্থাৎ বৈদ্যগণ উক্ত বোগীকে ত্যাগ করিবেন

অপর অসাধ্য লক্ষণ । যে রক্তপিত্ত দ্বারা উপহত ব্যক্তি সমুদ্র
দৃশ্য, বস্ত্র একং আকাশ বক্তবর্ণ দর্শন করে, তাহার সেই বক্তপিত্ত অসাধ্য ;
যে রক্তপিত্ত দ্বিত ব্যক্তি বক্ত বমি করে এবং তাহার চক্ষু অতিশয়
লোহিত বর্ণ হয়, যে উদগাবে পর্যন্ত ও বক্তবর্ণ দর্শন করে, সেই ব্যক্তি
কালক্রমে পতিত হয়

কফজ রক্তপিত্তের চিকিৎসা — শতমূলী গুলঞ্চ, বাসকছ ল, মুণ্ডুবী, বেনেড়া, তালমূলী, খদির কাষ্ঠ, ত্রিফলা, বায়ুনহাটি, কুড়, প্রত্যেক ৫ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সেব, শেষ ৮ সেব মনঃশিলা সংযোগে জাবিত কান্তনেহ বা স্বর্ণমাক্ষিক ১২ পল, চিনি ১৬ পল, ঘৃত ১৬ পল এই সমুদয় দ্রব্য উক্ত কাথেব সহিত পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে শিলাজহু, গুড়ত্বক, কঁকড়াশুঙ্গী, বিড়ঙ্গ, পিপ্পল, শুঠ, জায়ফল, প্রত্যেক ১ পল, এবং ত্রিফলা, ধন্যা, তেজপত্র, মবিচ, নাগেশ্বর, প্রত্যেক ৪ তোলা পরিমাণে নিষ্ক্ষেপ করিয়া শীতল হইলে মধু ২ সেব মিশ্রিত করিবে ইহাব অম্লপান গব্য দুগ্ধ ও গাংসবন প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য . ইহাব নাম “ঋকাদ্য লৌহ ।”

রক্তপিত্তান্তক লৌহ ।—আমলা ১ তোলা, পিপ্পল ১ তোলা, চিনি ১ তোলা একত্র মাড়িয়া লইবে ।

বাতজ রক্তপিত্তের চিকিৎসা — শতমূলী, চিনি, ধনে, নাগেশ্বর, রক্তচন্দন, ত্রিকটু, ত্রিফল, বিড়ঙ্গ, মুখা, চিতামূল, কৃষ্ণতিল, ইহাদেব এক এক ভাগ ; সমুদয়ের সমান লৌহ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া লইবে । মাত্রা ১ গামা । অম্লপান মধু ইহার নাম “শতমূল্যাদি লৌহ ।”

দুর্বাদ্য ঘৃত ।—দাউদখানি চাউল ৪ সের ১৩ সের জলে সংমর্দন করিয়া ছাঁকিয়া জল লইবে ঐ জল ১৬ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, ছাগঘৃত ৪ সের ; কল্কার্থ—দুর্বামূল, খদির কেশব, মঞ্জিষ্ঠা, এলবালুকা, চিনি, শ্বেতচন্দন, বেনার মূল, মুখা, রক্তচন্দন, পদ্মক ঠ, প্রত্যেক ২ তোলা ।

রক্তবমনে এই ঘৃত পান, নাসিকা হইতে রক্তজাবে ইহার নশ্বপ্রহণ, চক্ষু হইতে রক্তজাবে চক্ষুতে পূরণ, কর্ণ হইতে রক্তজাবে কর্ণে পূরণ, মৈত্র ও গুহ দ্বাব দিয়া রক্তজাবে ইহাব পিচকারি, এবং বোম্বকুপী দিয়া বক্ত-ক্ষরণ হইলে গাত্রের মর্দন ব্যবস্থেয় ।

পিত্তজন্য রক্তপিত্তের চিকিৎসা ।—তৃণবীজাদিবিহিত বত্র নিষ্পীড়িত, রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শোষিত পুরাতন কুম্ভাণ্ড শস্য ১০০ পল ৪ সেব ঘৃতে ভাজিয়া মধু বর্ণ হইলে তাহাতে কুম্ভাণ্ডজল ১৬ সের, চিনি

১২।০ সেব গুলিয়া দিয়া পাক করিবে । পাক সিদ্ধ হইলে পাশ্চাত্তিথিত
 অথবা সকলেব চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নীতল
 হইলে ২ সের মধু মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে । প্রক্ষেপ্য অথবা
 যথা,—পিঁপুল, গুঁঠ, জীবা, প্রত্যেক ২ পল ; গুড়ক, এলাইচ, তেজ-
 পত্র, মরিচ, ধনে, প্রত্যেকের ৪ তোলা চূর্ণ মাত্রা এক তোলা হইতে দুই
 তোলা পর্য্যন্ত । অগ্নি ও বল দুষ্টি করিয়া মাত্রা ব্যবস্থা করিবে । ছাগহৃৎ-
 দির সহিত সেবনে বিশেষ উপকার হয় । ইহার নাম “কুশাণ্ড খণ্ড ”

এলাদি গুড়িকা ।—এলাইচ ১ তোলা, তেজপত্র ১ তোলা; গুড়-
 ক ১ তোলা, পিঁপুল ৪ তোলা ; চিনি, ষষ্ঠিমাধু, পিণ্ড খর্জুর প্রাক্ক।
 প্রত্যেক ১ পল । এই সমুদয় চূর্ণ মধুব সহিত মিলিত করিয়া ২ তোলা
 প্রমাণ গুড়িকা করিবে । দোষের কলাবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ব্যবস্থা
 করিবে ।

দাড়িম ফুলের রস ও দুর্জাব রস একত্র মিশ্রিত করিয়া আন্তর জল
 অথবা হবিতকীর জলের সহিত নস্য লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব
 নিবারণ হয় ।

আমলা যুতে ভাজিয়া কঙ্জিকের সহিত পেষণ করিয়া সস্তকে প্রক্ষেপ
 দিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারণ হয় ।

লিঙ্গ দিয়া অধিক রক্তস্রাব হইলে উত্তর বস্তি ক্রিয়া কর্তব্য ; অথবা
 পঞ্চভূর্ণ ২ তোলা, ছাগহৃৎ ১ পল, জল ১ সের, একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাব-
 শেষ থাকিতে নামাইয়া তাহা পান করিতে দিবে । কুশ, কাশ, শব, দর্ভ,
 ও কাজলি আঁকেব মূল এই পঞ্চ ভূর্ণ

হোমিওপ্যাথিকে রক্তপিত্ত চিকিৎসা।



বক্তের দৃষ্ট সাধাবণতঃ ত্রাসজনক। দেখিলেই স্বভাবতঃ মনে একটা ভয়েব উদ্বেক হয় বিশেষতঃ সেই রক্ত মুখ দিয়া উঠিলে আবুও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া থাকে এজন্য একশ ঘটনা ঘটিলে অগ্রে নিশ্চয় করা উচিত যে, কোথা হইতে, কিরূপে, সেই বক্ত নির্গত হয় এইরূপে বক্তোদ্গমের দুইটা স্থান আছে, পাকস্থলী এবং ফুস্ফুস সাধাবণতঃ বমনের সহিত বক্ত উদ্গীর্ণ হয় পাকস্থলী হইতে রক্ত উঠিবার সময় বমনোদ্বেষ্ট বড়ই প্রবল হইয়া থাকে, এবং উহা কফিব্রূয় বর্ণ হইলেও জানিতে হইবে যে, তাহাতে পাকস্থলের রসেব ক্রিয়াধিক্য আছে ফুস্ফুস হইতে রক্ত উদ্গীর্ণিত হইলে উহা প্রবল সর্দির সহিত মিশ্রিত, ফেণায়ুক্ত এবং লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—বোগী স্থিতিস্থাপন অবস্থিতি করিবে, শীতল অথবা ভোজন করিবে। অধিক বক্তপ্রাব হইলে ববফ চুমিতে দিবে এবং পর্যায়ক্রমে “হেমামিলিশ্” এবং “ইপিক্যাকুয়ানহা” এক অথবা অর্ধ-খণ্টা অন্তর সেবন কবিত্তে দিবে তাহার পরে প্রতিদিন তিনবার “ফস্ফরিক ম্যাগ্নিড” প্রয়োগ করিবে

নাস। হইতে রক্তপ্রাব।—মুখদিয়া যেমন রক্তপ্রাব হইতে দেখা যায়, তদ্রূপ নাসিকা দিয়াও রক্ত ঘাহিব হইতে দেখা গিয়া থাকে

চিকিৎসা।—সামান্যতঃ শীতল জলে স্নান কবিলেই আরোপ্য লাভ হয় আঘাতজন্য বক্তপ্রাব হইলে বড়ই ভয়ানক হইয়া থাকে। এরূপ ঘটনা হইলে, একটা চাপাত্রে পূর্ণ শীতল জলে, এমন কি তাহাতে ববফ পর্যন্ত ঢেওয়া কর্তব্য, ত্রিস ফোঁটা “হেমামিলিশ্” মিশ্রিত কবিয়া উত্তমরূপে পিচকারী দিবে। ফট্ফিরি চূর্ণেব নাস গ্রহণ করিলেও

অনেকস্থলে বক্তৃপাত বন্ধ হয় “হেমামিলিশ” উপকার দা দর্শিলে
“ভার্গিকা” প্রয়োগ কবিতে হইবে ।

প্রায় সকল প্রকার বক্তৃপাত হইবে “হেমামিলিশ” প্রয়োগ ঔষধ ; অতএব
অর্শ, স্ফোটক, পৃষ্ঠত্রণ প্রভৃতি রোগে বক্তৃপাত নিবারণ জন্ত ব্যবহৃত
হইয়া থাকে ।

হাকিমীমতে রক্তপিত্ত চিকিৎসা ।

এই রোগে অজ্ঞাত বা অর্ন্ত কোন প্রকারে শরীরে আঘাত না
লাগিয়াও কোন না কোন কারণে কোন যন্ত্র কাটিয়া, ছিঁড়িয়া বা অন্য
কোন প্রকারে বিকৃত হইয়া রক্তপিত্ত হইয়া থাকে সেই বক্ত মুখ,
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, লোমকূপ ও গুহদ্বার দিয়া নির্গত হয়

চিকিৎসা দেশীয় কুস্মাণ্ড এই বোগেব মহৌষধ ব্যঞ্জন
সহিত মোবদা কবিয়া অথবা ঔষধেব সহিত যে কোন প্রকারে ব্যবহার
করা কর্তব্য অন্য ঔষধ সেবন করাইলেও পথ্যেব সহিত কুস্মাণ্ড
খাইবাব ব্যবস্থা করিবে ।

মুখ দিয়া রক্তপিত্ত হইতে থাকিলে কাশ্মিনীফুলের পাতার রস
১ তোলা অর্দ্ধ তোলা চিনিব সহিত সেবন কবাইলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ
হইবে নাসিকা দিয়া রক্তপিত্ত হইলে উহার নাম লইতে দিবে ।

অন্যান্য রক্তস্রাবে,—

মাজুফল চূর্ণ	...	...	...	০ আনা ।
দাওচিনি চূর্ণ	...	...	...	১০ আনা
গন্ধক চূর্ণ	...	...	...	১০ আনা ।

একত্র মিশ্রিত কবিয়া এক একটা বটী প্রস্তুত কবিবে এবং দিবসে
২৩ বাব সেবন কবাইবে ।

নবম অধ্যায় ।

য়্যালোপ্যাথিকে কাশাদি রোগের চিকিৎসা ।

কাশ — ব্রুকাই বায়ুনলীৰ শৈথিল্যক বিল্লীতে প্রদাহ জন্ত এই ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে ইহা প্রবল (য্যাকিউট) বা পুৰাতন (ক্রনিক) রূপে উপস্থিত হয় ইহাতে ফুস্ফুসের উভয় অংশ বা তাহার একাংশ বিকৃত হয় সাধাবণতঃ উপরেব অংশই আক্রান্ত

• হইয়া থাকে

লক্ষণ — সামান্য শৈত্যাত্মক, ক্রমে ক্রমে উষ্ণতা, (পৰিমাণ ৯৯.৫ হইতে ১০২.৫ ডিগ্রী), দৌৰ্বল্য, হস্ত-পাদাদিব বেদনা, সম্মুখস্থ কপালগহ্বরে অসুখ বোধ, হাঁচি, নাসারন্ধ্র হইতে ক্লেদ নিঃসরণ, গলাব ভিত্তৰ বেদনা, শ্বসন ইত্যাদি লক্ষণের সহিত কঠে শুভ্রশুভ্রানি বোধ, শুষ্ক কাশি, বক্ষস্থির পার্শ্বাদিকে অসুখ ও টান বোধ, এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা অসম্ভব হইয়া থাকে সময়ে সময়ে কাশির বৃদ্ধি হয়, শয়নাবস্থায় এবং প্রাতে শয্যা ত্যাগেব পবেই আধিক্য হয় । তাহার ক্রিয়াকাল পবেই পাতলা লবণাসাদয়ু ও ফেণা ও কখন কখন বচিষ্ক-বিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গত হয় কিছুদিন পরে শ্লেষ্মাব পৰিমাণ বৃদ্ধি হইয়া লালার গায় অর্ধ সন্ধ্যা, ঈষৎ হ্রিষ্ণাবর্ণ, পবে ধূসব ও হ্রিষ্ণাবর্ণ অস্বচ্ছ ও আটাব গায় চট্চটে হইয়া উঠে

পীড়া উৎকট হইলে বা রোগী দুৰ্বল হইয়া পড়িলে গয়েবের সহিত পুঁজ মিশ্রিত থাকে, কখন কখন তাহার লালাত্ব ঘূচিয়া সম্পূর্ণরূপে অস্বচ্ছ ও পুরু হয় শ্বাস-প্রশ্বাস এবং নাড়ী ক্ষত, কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস হইতে নাড়ী অধিকতর ক্ষত বহিতে থাকে কখন কখন শ্বাসকৃচ্ছ ও শ্লেষ্মা নির্গমেব শ্বাস দেখা যায় । বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণাদয়ক টান ও ভাব বোধ, শ্বাসকৃচ্ছ ও অতিশয় অস্থিরতা জন্মে দেহ সম্মুখে

*
বক্র কবিতা বোগী শয্যায বসিয়া থাকে মুখমণ্ডল উদ্বিগ্নযুক্ত ও আবণ্ড, নাড়ী দ্রুতগামী, ত্বক কখন উষ্ণ কখন শীতল, শিরা বিস্তৃত, ওষ্ঠ, গণ্ড, দেহ ও অঙ্গুলীৰ অগ্রভাগ নীলবর্ণ দেখায়। তাহাতে জানা যায় যে, রক্তসঞ্চালনক্রিয়াব ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে চিকিৎসা দ্বারা উপশম হইলে উপবোক্ত লক্ষণ অন্তর্হিত হয়, কিন্তু ক্রমে বৃদ্ধি হইলে নিশ্চেষ্টত, শ্বাসকষ্টের আধিক্য, নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত, বিষম, ক্ষণবিলুপ্ত, ত্বক শীতল, শরীর ও চট্‌চটে হয়, কিন্তু কাস ও শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রমোপশম, শ্বাসপকিত্যাগে অক্ষমতা, পরে মধ্যে মধ্যে প্রলাপ, কখন কখন অঙ্গ আক্ষেপ ইত্যাদি লক্ষণের পরে শ্বাসবোধ, স্থলপিণ্ডের দক্ষিণোদবে রক্ত সংঘত হইয়া রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া বন্ধ হয় এবং তাহাতেই মৃত্যু হয়

ক্যাপুলারী এক্সাইটিশ্।—কৈশিক নলী সকল আক্রান্ত হইলে এই বোগ উপস্থিত হয়

লক্ষণ —বেদনা সচরাচর অত্যন্ত অথবা এককালেই উদ্ভাব অভাব, কিন্তু কাসিজন্ত পেশী ববেদনা বড় তীব্র হয় শ্বাস প্রশ্বাস অতি দ্রুত, কখন মিনিটে ৫০ বা ততোধিক বাব হইয়া থাকে, উদ্ভাব সাহিত সাঁ সাঁ শব্দ হয়—বোধ হয় যেন নিশ্বাস বন্ধ হইল অতি প্রবল কাস, বোগী সম্মুখে ঝুঁকিয়া বসিতে ও পার্শ্বদিক হস্ত দ্বারা ধরিয়া থাকিতে ভালবাসে। অতি কষ্টে গাঢ় চট্‌চটে শ্বাস নির্গত হয়। জ্ববেব সম্ভাপ ১০৩ ডিগ্রী বা ততোধিক হইতে দেখা যায়

চিকিৎসা।—পীড়া প্রশান্ত হইবার পরেই অক্সিজেন ১ গ্রেন বা মার্কিয়া সিকি.গ্রেন, ৫ গ্রেন কার্বনেট অফ স্যামোনিয়া, অথবা ১০ হইতে ২০ গ্রেন মাত্রায় মিউবিরেট্ অফ স্যামোনিয়া কিম্বা অঙ্গু পরিমাণে স্ক্রবা সেবনে আরোগ্য হইতে পারে

এই সকল ঔষধে উপকার না দর্শিলে এবং প্রথমোক্তা উত্তীর্ণ হইলে অস্ত্র, ত্বক এবং মুণ্ডপিণ্ডের উপর ক্রিয়া দর্শে এরূপ চিকিৎসা করিবে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে কোন প্রকার লবণাক্ত বিবেচক দিবে তদনন্তর ইপিধ্যাক্, স্কুইল, অথবা স্যাশিটেট্ ও কার্বনেট অফ পটাশ ব্যবহার করিবে

য্যালোপ্যাথিকে কাশাদি রোগ চিকিৎসা । ২২৫

সিরপ সিলি		১ ড্রাম ।
স্পিবিট ইথাব নাইট্রিক		২ ড্রাম ।
টীং হায়েশায়েমশ		২০ বিন্দু ।
য্যাকোয়া বোজ		১ আং ।

এক এক মাত্রায় সেবনীয় অথবা,—

পটাস নাইট্রাস	}	১০ গ্রেন ।
বা পটাস মাট্রোস		১৫ গ্রেন ।
ভাইনম্ ইপিক্যাক		১০ বিন্দু ।
য্যাকোয়া ক্যাস্কব		১ আং

এক এক মাত্রা আবশ্যকমত ব্যবহার করিবে প্রথমাবস্থায় যদি গর্দি বসিয়া যায়, তবে গরম জলের বাষ্প শ্বাস গ্রহণ করিতে দিবে, অথবা মুকি বা অর্ধ গ্রেন পবিমাণে ইপিক্যাকুয়ান্না প্রয়োগ করিবে । বোগীব নিস্তেজকতা ক্ষুদ্রি পাইলে কোনরূপ উত্তেজক ও শোষা নিবাবক ঔষধ দিতে হইবে । নিম্নে তাহার অনুষাযী দুইটী প্রেক্ষিপ শত্রু প্রদত্ত হইল

স্পিবিট য্যামোনিয়া য্যাবোমেটিক		২০ বিন্দু ।
স্পিবিট ক্রোবোফবম		১৫ বিন্দু
টীং সেনিগা		৩০ বিন্দু ।
টীং হায়েশায়েমশ		১৫ বিন্দু ।
য্যাকোয়া ক্যাস্কব		১ আং

এক মাত্রায় জ্ঞান জ্ঞানিবে আনিশ্যকমত প্রয়োগ করিবে

য্যামোনি কার্বনেটিশ		৩ গ্রেন ।
ভাইনম্ ইপিক্যাক		১০ বিন্দু ।
টীং সেনিগা		৩০ বিন্দু ।
ডিকক্ট সেনিগা		১ আং

এক মাত্রা উত্তরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে

বক্ষস্থলে বেদনার ভাবতম্য বিবেচনায় শর্ষপ পলজা, তাপি তৈরে বা ফুপ, অথবা বেলেক্তা বা ব্যবহার করিবে প্রথমাবস্থায় মশিনাব পুলটিশেও

বিশেষ উপকার দর্শে ক্যাপুলাবী ব্রঙ্কাইটিশ হইলে বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশে সর্বদা পুলটিশ দ্বারা আবৃত রাখা যাইতে পাবে বসন্তেই উষ্ণতা ৬০ হইতে ৬৮ ডিগ্রি বক্ষা কবিত্তে হইবে এবং গবম জলের বাষ্প দ্বারা বায়ুর আর্দ্রতা বাজায় কবিত্তে চেষ্টা কবিবে

পথ্য — দুগ্ধ, যাবোবুট, মাংসেব কাথ, বিফটী, ইত্যাদি লঘু আহাব দিবে বোগী দুর্বল হইলে উহার সহিত মদিবা মিশ্রিত কবিত্তে পাবিবে

পুরাতন ব্রঙ্কাইটিশ ।—দীর্ঘকাল কাশ বে গ সঞ্চিত থাকিলেই এই পীড়ার উদ্ভব হইয়া থাকে

লক্ষণ ।—ইহার লক্ষণ সর্বত্র সমান নহে । কাশি কখন সামান্য কখন অগ্নি হয়, কাশির সহিত হবিৎ, ঈষৎ পীত, এবং পুষ্পসংযুক্ত শ্বেদা নির্গত হওয়া ভিন্ন আব কোন লক্ষণ দেখা যায় না । শীতকালে ঐ শ্বেদা এবং কাশি বৃদ্ধি হয় ; প্রভাতে গাত্রোত্থান কবিলে ও বাত্রে নিদ্রা যাইবার সময় উহার বৃদ্ধি হয়, শ্বেদা নির্গত করিতে কষ্ট হয়, শ্বেদায় কখন কখন বক্ত মিশ্রিত থাকে । বক্ষস্থলে অগ্নি বেদনা, ক্ষুধা-হান্য, শবীর শীর্ণ ও রাত্রিতে ঘর্ম হওয়ায় কখন কখন ক্ষয়কাশ বলিয়া এম জন্মে ব্রঙ্কাবস্থায় সাধাবনতঃ এই বোগ হইতে দেখা যায় ।

চিকিৎসা ।—বোগী বয়স এবং স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনায় চিকিৎসা কবিত্তে হইবে । অনেক স্থলেই য়ামোনিয়া, সেনিগা, ইপি-ক্যাক, ক্রোবোফরম ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় । বিবেচনামতে নিম্ন-লিখিত ঔষধ ব্যবস্থা কবা গিয়া থাকে ।

য়ামোনি কার্বনেটিশ	...	৫ গ্রেন
ক্লিবিট ইথার	...	২০ বিন্দু
টীং সিলি	...	২০ বিন্দু
টীং ক্যাম্ফর কম্পাউণ্ড	...	১০ বিন্দু ।
টীং ল্যাভেণ্ডিউলী কম্পাউণ্ড	...	১ ড্রাম ।
ইনফিউজন্ সেনিগা	...	১ আং

এক এক মাত্রায় আবশ্যকমত প্রয়োগ কবিনে

• য্যালোপ্যাথিকে কাশাৰ্দি রোগ চিকিৎসা । ২২৭

সিবপ সিলি	...	১ ড্রাম
য়্যালিড নাইট্রিক ডিল	...	১০ বিন্দু
টীং হায়েসায়েমশু	...	১৫ বিন্দু।
স্পিরিট ক্লোরোফর্ম	...	১৫ বিন্দু।
ডিকষ্ট সিল্কোনা	...	১ আং

• এক এক মাত্রায় দিবে

সিবপ সিলি	...	১ ড্রাম।
স্পিরিট য়্যামোনিয়া য়্যাবোমেটিক	...	২ ড্রাম।
লাইকর মর্ফিয়া হাইড্রোক্লোরিক	...	১০ বিন্দু।
ইন্ফিউজন্স পার্পেটেরি	...	১ আং।

শোথানিঃসরণাতাবে কষ্ট হইলে—

সিল্কোনা	...	৫ গ্রেন
বা সেনিগা	...	৫ গ্রেন
কার্বনেট অফ য়্যামোনিয়া	...	৫ গ্রেন।
জল	...	১ আং।

এক মাত্রায় আবশ্যিকমত প্রয়োগ ক্যবস্থা।

বক্ষঃস্থলে ভাববোধ এবং অধিক বর্ষ না থাকিলে এবং শোথ নিৰ্গত হইলেও ডিক্জন সিল্কোনা অন্যান্য ঔষধের সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে।

কোন কোন স্থলে আবশ্যিক হইলে বিবেচনামত বক্ষঃস্থলের সম্মুখে ও পশ্চাত্তাগে সর্ষপ পলস্তারা, ত্যাপিন তৈলে বা ফুপ, য়্যামোনিয়া বা তৈলের লিনিমেন্ট দেওয়া যাইতে পারে।

অতিরিক্ত শোথ নিবারণ জন্ম,—

গবম জল	...	১ আং
তাপিন	...	১০ ফোঁটা।
বা ক্রিয়াজেট	...	১০ ফোঁটা।

একত্র মিশ্রিত করিয়া আত্মাণ লইতে দিবে অথবা,—

ট্যানিক য়্যালিড	...	১ গ্রেন।

জল .

১ আং ।

এক মাত্রা জল দুই তিন বাব দিবসেব মধ্যে ব্যাবহার কবিবে .

পূর্বে যে যে গেষ্মানিবানক, ঔষধেব সহিত বলকাবক ঔষধ ব্যাবহার কবিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে বলকাবক ঔষধেব মধ্যে নড়া-ভমিকা, লৌহ এবং সিল্কোনা বিশেষ উপকাৰী . ফস্ফেট অফ আয়রন, জীকুনিয়া এবং কুইনাইনও ব্যাবহৃত হইয়া থাকে

নিগোনিয়া বা ফুস্ফুস প্রদাহ ফুস্ফুসে প্রদাহ হয় ফুস্ফুসেব দক্ষিণাংশ বামাংশ অপেক্ষা দ্রুত কষ্টযুক্ত হইয় থাকে উপর অপেক্ষা নিম্নে খণ্ডেই প্রায় পীড়া আক্রমণ কবে ইহাব সহিত অন্যান্য বোগ মিশ্রিত না থাকিলে প্রায় চৌদ্দ দিন ইহাব ভোগকাল বলিয়া জানিতে হইবে

* সাধারণ লক্ষণ — পীড়া প্রকাশ হইবার পূর্বে প্রায়ই অসুবোধ, কম্প, কালি, কোন কোন স্থলে বহু দিন পূর্বে ক্ষুধামান্দ্য, দৌর্বল্য, হস্তপদাদি ও বক্ষঃস্থলে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় পীড়া প্রকাশিত হইলে বোগী অসুস্থ ও অস্থির, শ্বাসপ্রশ্বাস সম্বন্ধে কষ্টকর, এবং প্রদাহের স্থান ও প্রাবল্যানুসারে উহার সংখ্যা মিনিটে ৩০ হইতে ৬০ পর্যন্ত হইতে পারে এবং বৃদ্ধাবস্থায় ১০০ হইতে ১২০ নাড়ী দ্রুত-গামী, জিহ্বা ও ওষ্ঠ নীলবর্ণ, কখন ব শ্বেত, ঔষৎ পীতবর্ণ নামা বিজ্ঞত, রোগী উত্তানভাবে শয়ন করিয়া থাকে . পীড়ার উপশম হইলে এই সকল লক্ষণ ক্রমে অন্তর্হিত হয়, নতুবা জিহ্বা টাইফয়েড অবস্থার ন্যায় কটাবর্ণ, নাড়ী অত্যন্ত দ্রুতগামী, দেহ ঘর্মাক্ত, প্লেব মনোবিকার ও অচেতন্য দ্বারা মৃত্যু উপস্থিত হয় । বিশেষ লক্ষণ সমুদায় নিম্নে একটিভ হইল

শ্বাসকষ্ট ।—সাধারণতঃ ছয় হইতে দশদিনেব মধ্যে অত্যন্ত যন্ত্রণা-দায়ক হয় প্রত্যেক মিনিটে ৩৫ বা ৪০ বাব হইলেও শ্বাসকষ্ট হয় না; কিন্তু উহার সংখ্যা ৬০ হইতে ১০ হইলে শ্বাসবোধ হইবার সম্ভাবনা

* কাশী ।—ইহা বোগেব প্রথমাবস্থাতেই আরম্ভ হয়, কিন্তু অনেক স্থলে প্রদাহেব দুরূহতাব সহিত বৃদ্ধি হইতে থাকে প্রথমে অল্প এবং

শুদ্ধ কাশী হয় কিন্তু আক্কেপ জন্ম কাশের ঞায় এমন হয় যে, বোগী চেষ্টা করিয়াও কাশী বন্ধ কবিতে পাবে না। উঠিয়া বসিলে বা দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিলে কাশীর বৃদ্ধি হয়। ক্রমে উহাব সহিত শ্বাস নিৰ্গত হইতে থাকে এবং পীড়া সাংঘাতিক হইলে শ্বাসবাহ্য উহা অত্যাঙ্গ বা এক-বাবে বন্ধ হয়।

শ্লেষ্মা। —প্রথমে স্বাভাবিক সর্দিব ঞায় থাকে, হই এক দিন পবে কখন বা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আটাব ঞায় অর্ধসচ্ছ লোহমালেব ঞায় বর্ণনিশিষ্ট ও চট্চটে হয়। শ্লেষ্মাব সহিত রক্তচিহ্ন থাকে না, কিন্তু রক্তের ভাগ মিশ্রিত থাকে, উহাব পবিমানানুসারে উহাব বর্ণ ঈষৎ পীত, ঈষৎ লাল বা স্পষ্ট লালবর্ণ হয়।

ত্বকের সস্তাপ। —এই বোগে ত্বকের সস্তাপ স্বভাবতঃ বৃদ্ধি হয় প্রথম দিবসেই প্রায় ১০২ হইতে ১০৪ ডিগ্রী উঠে দ্বিতীয় তৃতীয় দিবসে প্রায় ১০৭ হইতে দেখা যায়, —ইহাতেও বোগীকে বক্ষা পাইতে দেখা গিয়াছে। ১০৯ ডিগ্রী পর্যন্তও হইতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু এরূপ অবস্থায় বোগী বক্ষা পায় নাই। সস্তাপ প্রাতে সর্বাপেক্ষা অঙ্গ, মধ্যাহ্নে তাহা অপেক্ষা অধিক, সায়াহ্নে সর্বাপেক্ষা অধিক হয়।

নাড়ীর গতি। —সর্বত্র সমান নহে। সচবাচব তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসে ১২০ বা ১৩০, পীড়া সাংঘাতিক হইলে ১৬০ পর্যন্ত হইতে পারে। কখন কখন নাড়ী ক্ষণবিলুপ্ত বোধ হয়। কখন ৬০ ৭০ বার হয়; এরূপ স্থলে জ্বরের লক্ষণ বর্তমান থাকে না।

মস্তিষ্কের লক্ষণ। —শিরঃপীড়া, নিদ্রাব অভাব, অস্থিরতা এবং রাত্তিকালে অঙ্গ প্রলাপ হইতে দেখা যায়।

প্রস্রাবের অবস্থা। —রক্ত বা বক্তব আভাযুক্ত পীতবর্ণ, দোষ-যুক্ত অর্থাৎ উহাব সহিত শুক্রধাতু মিশ্রিত থাকে।

এই রোগেব আবৃত্তাবধি পরিণাম পর্যন্ত সাধাবণতঃ তিন ভাগে বিভাগ করা যাইতে পাবে, এক এক ভাগকে এক এক অবস্থা নির্দেশ করা যায়।

প্রথমাবস্থা। —পূর্ষবেদনা না থাকিলে পশুকাব গতির বিশেষ

পরিবর্তন হয় না। স্বব প্রতিধনিব বিশেষ পরিবর্তন অল্প ৩ হইতে দেখা যায় না। ফুস্ফুসেব বক্তাধিক্যেব অগ্নয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস অতি দুর্বল বোধ হয়। সচবাচর স্বব প্রতিধনি স্বাভাবিক অৱস্থাপেক্ষা তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে

দ্বিতীয়াবস্থা। —সচবাচর আক্রান্ত দিকে পশুঁকাব গুতিব অস্পতা, এবং অন্যক্রান্ত দিকে উহাব স্বন্ধি হয়। সচবাচর স্বব-প্রতিধনি তীক্ষ্ণ, কখন কখন স্বাভাবিক অপেক্ষাও হ্রাস হইয়া থাকে। প্রতিঘাতে সগর্ভ শব্দ উৎপন্ন হয়, কিন্তু উপরে ফুস্ফুসেব অন্যক্রান্ত অংশ থাকিলে শূন্য-গর্ভ শব্দ হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস গভীর, এবং কখন কখন আক্রান্ত স্থানেব উপর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, কিন্তু মধ্যস্থলে নলীব এবং পার্শ্বে কর্কশ ও ফুৎকারবৎ হয়।

তৃতীয়াবস্থা। —এই অবস্থায় কেবল ফুস্ফুসেব ঘনত্বের ভৌতিক লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু ফুস্ফুসেব মধ্যে স্ফোটক বা উহাব গ্যাংগ্রীন হইলে অল্পকাল লক্ষণ আবিভূত হয়। উহাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ অল্পভূত হয় না, কিন্তু বহু ই কার্য ঐ স্ফোটকের ক্রন্দ নির্গত হইয়া উহা একটা গহ্ববে পবিণত হয়। ঐ গহ্বরের আয়তন, প্রাচীরের অবস্থা এবং উহার মধ্যস্থ বায়ু ও দ্রব পদার্থের পরিমাণানু-সাবে প্রতিঘাত শব্দের রূপান্তর হয়, এবং প্রতিধনি ও বব্লিং বা গ্যাংগিং শব্দ উদ্ভূত হয়।

চিকিৎসা। —এই রোগেব চিকিৎসাসম্বন্ধে নানা লোকে নানা প্রকাব বলিয়া থাকেন। ফলতঃ সাধাবণ প্রচলিত মত নিম্নে শিখিত হইতেছে। প্রথমাবস্থায় বোগীব উদর পরিষ্কারার্থ এবং তৈল বা কোন লবণাক্ত যুগ্ম বিবেচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। বোগীকে শুষ্কবস্ত্রাবে রাখিয়া গৰ্ভ জলেব বাষ্প দ্বাৰা বাসগৃহের উষ্ণতা এবং আদ্রতা সুস্পা-দন কৰিতে চেষ্টা করিবে। প্রথমে জবেব অবস্থায় নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে।

লাইকর য্যামোনিয়া ম্যাগ্নিট্যাটিশ	...	১৫	বিন্দু।
ভাইনন্ ইপিক্যাক	...	৫	বিন্দু
জল	...	১	আং

য্যালোপ্যাথিকে কাশাদি রোগের চিকিৎসা। ২৩১

এক এক মাএাষ ৩৪ বাব ব্যবহার করিবে।

সাইটেট অফ পটাশ	১২০ গ্রোন
লাইকব য়ামোনিয়া য়াশিট্যাটিশ্	৪ ড্রাম।
স্পিবিট য়ামোনিয়া য়াবোম্যাটিক	২১ ড্রাম
টীং য়াকোনাইট	২০ বিন্দু
জল	৭১ আং

ছয় মাত্রা হইবে চাৰি বা ছয় ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা সেবন করাইবে।

বোগী দুর্বল হইলে নিম্নোক্ত একাবে য়ামোনিয়া মিক্চাৰ দিবে

কার্বনেট অফ য়ামোনিয়া	৫ গ্রোন
স্পিবিট ক্লোবোফবম	১৫ বিন্দু
লাইকব য়ামোনিয়া য়াশিট্যাটিশ্	২ ড্রাম
মিউশিলেজ য়াকেসিয়া	১ আং।

স্পিউটমেব সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকিলে, ঘন কাশি হইলে এবং বক্ষঃস্থলে বেদন অধিক বেধ হইলে, শরীরিক উত্তাপ ও নড়ীর স্পন্দনাদিকা ইত্যাদির প্রতিকাব জ্ঞা,—

আর্গট	২ ড্রাম।
জল	৭১ ড্রাম।

দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

অনেকে বলেন, এই রোগে বিশেষ কোন ঔষধ ব্যবহার না করিয়া আভাবিক রোগোপশম শক্তি দ্বারা ব্যাধির উপশম চেষ্টা করিবে ইহাতে জ্বরের পাছভাবকালে লঘু আহার ও দীতল জল পান করিতে দেওয়া যায়, এবং ক্রমে পুষ্টিকর পথ্য ও তৎসহ মদ্য ব্যবস্থা করা গিয়া থাকে

এই বোগেব সকল অবস্থায় যে, কিছু উষ্ণকর ঔষধ সেবন করাইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই, অতিবিক্ত প্রবিয়ানে উত্তম ঔষধ প্রয়োগে যে হানি হইতে পারে, তৎপক্ষে বুদ্ধিমান চিকিৎসকের সাবধান থাকা কর্তব্য নিম্নলিখিত অবস্থা ঘটিলে অবশ্য বলকাবক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবেব রক্তসঞ্চালনের উদ্দীপনা ব্যতীত প্রলাপ, অত্যন্ত

জগগামী বা দুর্বল নাড়ী, শ্বাসমণ্ডলের নিস্তেজকতাব সহিত দৌর্বল্য, বোগী বৃদ্ধ বা দুর্বল অথবা অন্য কোন বোগের উপসর্গরূপে এই পীড়ার প্রকাশ এবং বোগী নিতান্ত বলহীন হইলে আর গৃহম ঔষধ ভিন্ন উপায়াস্তব নাই । আবশ্যক বোধ হইলে ২৫ ঘণ্টার মধ্যে ক্রমে ক্রমে ১ পাইন্ট পর্যন্ত ত্রাণ্ডি ব্যবহার কবা যাইতে পারে । নিম্নোক্ত ঔষদগুলি এই বোগের দুর্বলাবস্থায় বিশেষ ফলপ্রসূত ।

ভাইনাম্ গ্যালিশাই	১ ড্রাম ।
কার্বনেট অফ্ য়ামোনিয়া	৫ গ্রেণ ।
ক্লোরিক ইথাব	১০ বিন্দু ।
টীং ক্যাম্ফব	১০ বিন্দু
টীং মস্ক	৫ বিন্দু
পবিত্র জল	১ আং ।

এক মাত্রা বোগের অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োগ করিবে চক্ষের বেদনার উপর তিসির পুল্টিস, পোস্ত চে' ডিক ফোগেটেমিন্ দিবে

নিদ্রাভাব ও বেদনানিবারণার্থ অহিফেন ব্যবহার কবা যাইতে পারে । ইহাতে শ্বেশা উদ্যমেব ব্যাঘাত জন্মিবাব আশঙ্কা থাকিলে হাইড্রেড অফ ক্লোব্যাল্ প্রয়োগ দ্বারা নিদ্রাভাব দূর করিতে হইবে । জ্বরের অত্যন্ত প্রাবল্য হইলে পূর্ণমাত্রায় কুইনাইন সেবন কবান যাইতে পারে । শ্বেশা তুলিতে কফ ও উহা আটাবৎ হইলে য়াল্ক্যালাইন্ ব্যবহার করিবে

কার্বনেট বা ক্লোবাইড অফ্ য়ামোনিয়া	৫ গ্রেণ
টীং সেনিগা	১০ বিন্দু
স্কুইল	১০ বিন্দু ।
জল	১ আং

এক এক মাত্রায় আবশ্যকমত প্রয়োগ করিবে । এইরূপ চিকিৎসায় বোগী আবোগ্যলাভ করিলে কিয়দ্দিন কড়লিভাব অযেল ১৫ বিন্দু, টীং ফীল ১০ বিন্দু, নিয়মিতরূপে দুগ্ধের সহিত সেবন কবাইবে, এবং বল কারক খাদ্য খাইতে দিবে

লবিউলব বা ব্রঙ্কো নিমোনিয়া — ইহার লক্ষণ সকল

স্যালোপ্যাথিকে কাশি রোগ চিকিৎসা। ২৩৩

পৃথকরূপে বর্ণনা নিম্নয়োজন, তবে মাহা দ্রাবা ব্রহ্মাইটীস্ এবং নিমো-
নিয়া হইতে ইহাকে পৃথক কবিতে পাবা যায় তাহাই নিয়ে প্রকটিত হইল।

লক্ষণ — সাধারণ নিমোনিয়ায় কম্প্র প্রভৃতি যে সকল পূর্ব লক্ষণ
দৃষ্টি হয়, ইহাতে প্রায় তাহা দেখা যায় না। তবে লক্ষণকেই ইহার
প্রধান লক্ষণ বলিতে হইবে। দেহের সন্তাপ সচরাচর ১০৩ ১০৪ ১০৫
ডিগ্রী পর্যন্ত হইয়া থাকে। অসুখ দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকে, কিন্তু জ্বর স্বল্প হইয়া
কোন নিয়ম থাকে না। সন্তাপ স্বাভাবিক অৱস্থার তুল্য হইয়া তৎপক্ষে
জ্বরের আধিক্য হয়, ত্বক অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হয় না, অথচ ঘর্ম ও হইয়া
থাকে। নাভীর স্পন্দনসংখ্যা অধিক হয়, কিন্তু শীতল উহা দুর্বল ও
বিষম হইয়া পড়ে। অত্যন্ত ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস হয়। শ্বাস অধিক
উঠে না, এজন্য বিশেষ কষ্ট হইতে থাকে।

চিকিৎসা — লাবণিক ঔষধের সহিত ভাইনম ইপিক্যাক্ ব্যাব-
হার কৰা কর্তব্য। বোণী দুর্বল হইলে,—

কার্বনেট অফ ম্যাগনেসিয়া	৫ গ্রাম
টীং সেনিগা	২ ড্রাম।
জল	১ আং।

এক এক মাত্রা বিবেচনামত সেবন করাইবে

পুষ্টিকর পথ্য ও তৎসহ ত্রাণি প্রভৃতি গব্য ঔষধ সেবনে বিশেষ
ফল দর্শে। বোগের উপশমকালে কডলিবার অয়েল, পোর্ট ওয়াইন
খাইতে দেওয়া আবশ্যিক।

পুৰাতন বা ইণ্টারস্টিশিয়াল্ নিমোনিয়া — পূর্বে যে নিমো-
নিয়ার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সেই কিছু পুৰাতন ভাবাপন্ন হইলে এই
পীড়া জন্মে।

লক্ষণ — অধিক দিন ব্যাপিয়া এই পীড়া অবস্থিতি করে, এবং
প্রথমে ইহার লক্ষণাদি ততটা প্রকাশ পায় না; পীড়া যখন স্পষ্টতঃ
আবির্ভূত হয়, তৎসহ তাহার লক্ষণ সমূহ উপস্থিত হইয়া থাকে।
স্থানিক লক্ষণের মধ্যে পার্শ্বে এক প্রকার টানা বোদনা, শ্বাসকষ্ট ও
কাশীই প্রধান; শ্বাস অতি কষ্টে উঠিত হয় ও উহা অত্যন্ত দুর্বল হয়

চিকিৎসা ।—সরকারের চিকিৎসার স্থায় এই নিমোনিয়ার চিকিৎসা করিতে হইবে । বলকারক ঔষধ যথা,—কডলিবার অয়েল, লৌহ প্রভৃতির সহিত পুষ্টিকর খাদ্য দিবে । কার্বলিক য়াসিড অথবা ক্রিয়োশোটের আত্মা লইলে স্পিউটার দোষেব ও পরিমাণের ক্ষারতম্য হইয়া থাকে । আইওডাইড অফ পোটাসিয়ম দ্বারাও অনেক সময় বিশেষ উপকার দর্শে ।

ফুসফুসের গ্যাংগ্রীণ ।—এবল পুরাতন নিমোনিয়া, কফকাশ, ক্যান্সার, দৌর্বল্যজনিত জ্বর, ক্ষুদ্র বিষদ্বারা বক্তেব বিযাক্ততা, আহা-রীয় অব্যবস্থা, কদর্য স্থানে বাস, অতিরিক্ত সদ্যপান ও স্নায়বিক শীড়ার আত্মশয্য হেতু এই বোগ জন্মিয়া থাকে ।

লক্ষণ ।—অতীব দুর্গন্ধময় নিশ্বাসবায়ু স্লেথ্যব সহিত ক্রন্দ নির্গম, ক্রিয় পবিমাণে রক্ত ইত্যাদি ইহাব প্রধান লক্ষণ । সাধুবর্ণতঃ রক্তস্রাব দ্বারাই রোগীকৃত হয় কখন কখন ছেকটিক জ্বর ইহাব সহিত দেখিতে পাওয়া যায় । এই জবে বোগী প্রায় বক্ষা পায় না ।

চিকিৎসা ।—অধিক পরিমাণে পুষ্টিকর পদার্থেব সহিত প্রচুর আতি, য়ামোনিয়া, বার্ক, ইখব, মিনাবল্ য়াসিড, কুইনাইন্ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে । সর্বদা কার্বলিক য়াসিড, ক্রিয়োশোট ও তাপিগ তৈলের বাষ্প গ্রহণ করিলে নিশ্বাসের দুর্গন্ধ নষ্ট হয় । কেহ কেহ এই রোগে কার্বলিক য়াসিড ও হাইপোক্রেবাইড ব্যবস্থা কবেন । পীড়া পুরাতন হইলে বলকারক ঔষধ, কডলিবার অয়েল, পুষ্টিকর খাদ্য, স্থান পরিবর্তন বিধেয় বলকারক ঔষধ,—

কার্বনেট অফ য়ামোনিয়া	৩০ গ্রেন
টিং য়াকোনাইট	৪০ বিন্দু ।
টিং সিল্কোনা	৫৬ ড্রাম ।
য়াকোয়া মেস্ক পিপারেটা	৭৬ আং ।

ছয় মাত্র । দিবসে তিনবার প্রয়োগ করিবে

ফুসফুসের স্ফীতি ।—অত্যন্ত রোগেব আত্মসুজিকরূপে এই

স্যাংলোপ্যাথিক কাশীদি রোগ চিকিৎসা । ২৩৫

পীড়া হইয়া থাকে । অবের পব সাধারণ শোথ, টাইফস্ জ্বর, ত্রুকাই-
টিশ, নিমোনিয়া, ফুস্ফুসে রক্তাধিক্য প্রভৃতি বোগের সহগামী হয় ।

লক্ষণ —বক্ষঃস্থলে ভারবোধ, মথন শ্বাসপ্রশ্বাস ও তজ্জন্য কষ্ট,
অপ্পা ক শী, সচরাচর তবল, কখন বা আঠাব ছায় ফেলা যুক্ত শ্বাস নির্গম
ইত্যাদি ইহার সাধারণ লক্ষণরূপে পবিগণিত হয় ।

চিকিৎসা ।—বোগের কাবণ বিশেষরূপে অবধাবিত করিয়া
চিকিৎসায় প্রযুক্ত হইবে । যুক্তপিণ্ডেব পীড়াবশতঃ এই ব্যাধি উপস্থিত
হইলে বিবেচনামত অতি বিবেচক বা মর্গকাবক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে । হুং-
পিণ্ডেব পীড়া প্রযুক্ত হইলে তদনুযায়ী চিকিৎসা করিবে

সিফ্লিস্ বা উপদংশ জন্ম ফুস্ফুসের পীড়া ।—
উপদংশ জন্ম ফুস্ফুস পীড়া জন্মিয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—এই বোগে উপদংশের ছায় চিকিৎসা করিতে
হইবে, নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে ।

সিরপ ফেবি আইওডাইড ৪ ড্রাম ।

মিউসিলেজ ট্র্যাগাকাঙ্ক ১ আং ।

ওলিয়াই মবহ ৪ আং ।

বড় চামচের এক চামচ মাত্রায় দিবসে ২ ৩ বাব প্রয়োগ করিবে ।

ফুস্ফুসের ক্যান্সার ।—এই পীড়া অতি কমই হইতে
দেখা যায় । কেহ কেহ ইহাকে সংক্রামক, কেহ বা কুলজ বলিয়া
নির্দেশ করেন ।

লক্ষণ ।—কাশি, শ্বাসকষ্ট, বক্ষঃস্থলে তিরবেধনবৎ বেদনা, চাপিয়া
ধবিলেও রক্ত পায়, কাশির সহিত শ্বাস নির্গত হয়, ফুস্ফুস হইতে
রক্তজাব হইতে দেখা যায়, জ্বর, রাতে ঘর্ম, বলহীনতা ইত্যাদি লক্ষণ
প্রাথমিক উপস্থিত হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—যে যে যন্ত্রণা প্রবল থাকে, তাহার প্রতিকার করাই
উপযুক্ত চিকিৎসা । তজ্জন্য বলকাবক ঔষধ, পুষ্তিকর খাদ্য, নির্মল
বায়ু, গরম কাপড়, কুপিত মলাদি নির্গম বিধেয় । যন্ত্রণা নিবারণ
জন্ত,—

একুষ্ঠাষ্ট ওপিয়াই	...	১ গ্রেণ ।
গফিয়া হাইড্রে ক্লোবাইটিশ	...	২ গ্রেণ ।
একুষ্ঠাষ্ট হায়েমায়েমস্	...	৩ গ্রেণ ।
একটি বঁটা প্রস্তুত করিয়া শয়নেব পূর্বে খাইতে দিবে		
রক্তেব ক্রিয়া বৃদ্ধিজন্ত, —		
টীং কুইনি কম্পোজিট	...	২ আং ।
সিরপ ফেরি আইওডাইড	...	২ ½ ড্রাম ।
ইনফিউজন্ কলম্বা	...	২, ৭ ½ আং ।
দুই গাড়া ।	দিবসে ৩ বাব ।	

খাইসিস্ বা ক্ষয়কাশ ।—এই বোগেব প্রথমে জ্বর বা সর্দির লক্ষণাদি ব্যতীত কাশি আরম্ভ হয় সেই কাশি সচবাচব শুক্ল স্লেথার সহিত রক্তচিহ্ন বা স্পষ্ট বক্ত থাকে বেদনার অভাব বা অস্পৃশ্যতা, উহা সর্বদাই পার্শ্ব বা স্কন্ধদেশে হইয়া থাকে এবং কাশির সহিত বৃদ্ধি হয় না। অস্বাভাবিক শব্দ কেবল ফুস্ফুসেব উর্দ্ধ খণ্ডে এবং বক্ষঃস্থলেব এক-দিকেই বর্তমান থাকে । ইহারা স্থায়ী এবং দুই দিকে অবস্থিত হইলে মধ্যমধ্যে একদিক হইতে অন্তর্হিত হয়

লক্ষণ ।—শিরঃপীড়া, অজীর্ণতা, পিত্তাধিক্য, ক্ষুধামান্দ্য, উদ্যম-রাহিত্য, দৌর্বল্য ইত্যাদি ইহাব সাধাবণ লক্ষণ রক্তিকালে অস্থিবতা এবং বোগী আপনাকে স্পষ্ট বোধ করিতে পাবে না শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে থাকে । মাংসপেশী শিথিল, মুখমণ্ডল রক্তরিহীন, কেশ পতন, অঙ্গুলীব অগ্রভাগ স্থূল, ঘূহু ও শুষ্ক কাশি, এই কাশি শয্যাভ্যাগেব পরে এবং বাঁহে শয়ন করিবার সময় অধিক হয় । কিছু দিন পরে কাশি বাড়িতে থাকে, অস্পৃশ্য প্রমের পব অধিকতর বৃদ্ধি পায়, এবং উহার সহিত অস্পৃ নির্যাসবৎ রক্তচিহ্নবৎ স্লেথ নির্গত হয় ক্রমে অস্পৃ প্রমের রোগী প্রান্ত হইয়া পড়ে, এবং এ অবস্থায় পরীক্ষা করিলে সযন শ্বাস-প্রশ্বাস, দেহের সস্তাপ ৯৯ ৫ হইতে ১০২ ডিগ্রী, নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুতগামী ও বলহীন বোধ হয় । অস্পৃ উদ্দীপনাব পরেই মুখমণ্ডল আরক্ত, কখন কখন শরীরে জ্বর বোধ, বাত্রিকালে মধ্য মধ্য কম্প, এবং প্রাতঃকালে

থর্ম হইতে থাকে । জিহ্বা পবিকৃত বা লেপযুক্ত, নাড়ীৰ স্পন্দনসংখ্যা ৬০ হইতে ১৪০ পর্য্যন্ত হইতে পারে । প্রস্রাব প্রথমে বক্তবর্ণ বা পরি-
কৃত, পরিমাণে অল্প এবং ঘোলা হয় । স্রীলোকের স্রীধর্মের অভাব
বা অধিক্য এবং কখন কখন একবারে বন্ধ হইয়া যায় ।

কোন কোন স্থলে উপরি উক্ত লক্ষণের সহিত অজীর্ণতা এবং
প্রথমাবস্থায় জ্বের-লক্ষণাদি একবারে দেখা যায় না । অকস্মাৎ ফুস্ফুস
হইতে বক্ত বহির্গত হইতে পারে, অথবা শরীরে শীতলতা লাগাইলে
কাশি হয় এবং বক্তচিহ্নযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে । কখন কখন
ইহাব পূর্বে দীর্ঘ শ্বাসভঙ্গ, এবং প্রাতঃকালে অল্প কাশি হয় । চিকিৎসা
দ্বারা কিয়দ্বিষসেব জন্ত অনেকানেক লক্ষ্য নিবৃত্ত কবিতে পারা যায়
বটে, কিন্তু নীত্র উহাবা পুনঃ প্রকাশিত হইয়া উঠে । শ্বাসকৃচ্ছ, ক্লেশকর
কাশি এবং পুঁষ বা বক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হয় । দেহ বিবর্ণ, হৃদ উষ্ণ,
ওষ্ঠ দীর্ঘ রক্ত বা নীল বর্ণ, অল্প উদ্বীপনের পবেই গাওস্থল উজ্জল বক্তবর্ণ,
এবং মধ্যাহ্ন ও রাত্রিকালে প্রভূত থর্ম ও অতিশয় দুর্বলতা হয় । ইতি-
মধ্যে রোগীৰ উঠিবাব শক্তি প্রায় থাকে না । অঙ্গুলিব অগ্রভাগ স্থল ও
অতিশয় দুর্বলতা হয় । অনেক স্থানে শ্লুবি সিজ্ঞা পার্শ্ববেদনা, উদবাময,
জিহ্বা পবিকৃত বা লেপযুক্ত, মুখগহ্বরে স্যাংপথি, ক্ষুধামান্দ্য, নিদ্রা-
হীনতা, অবয়বের শুষ্কতা ও আকৃঞ্চন, পাদক্ষীতি, এবং ক্রমে প্রলাপেব পূর্ব
স্বভা উপস্থিত হয় । কখন কখন আত্মবোধ শূন্য হইয়া বিনা ক্লেশেই
বোঁগী প্রাণত্যাগ কবে । কখন বা শেষাবস্থা পর্য্যন্ত মনোবিকাৰ জন্মে
না, এবং স্বভাষজ্ঞান অধীৰ হইয়া প্রাণত্যাগ কবে ।

চিকিৎসা ।—খাদ্যের বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে । দুগ্ধ,
সর, মাখন, ডিম্ব, কচী, নানা প্রকার মাংস প্রভৃতি পুষ্টিকর জব্য খাইতে
দিবে । অন্নাক্ত জব্য একবারে নিবেধ; আহাবেব পবে কেহ কেহ
কিঞ্চ পরিমাণে সেরি ও ক্র্যাবেট মদ্য সেবনের পরামর্শ দেন । মধ্যে
মধ্যে আহাবেব পরিবর্তন কর্তব্য, নিত্য একপ্রকার খাদ্য ব্যবহার
করিতে দিবে না ।

যেখানে পরিষ্কৃত বায়ু সংকালিত হয়, এরূপ স্থানে সধ্যমত ভ্রমণ,

বাসগৃহেব বায়ু যাহাতে পরিষ্কৃত এবং সুন্দররূপে সংকালিত হইতে
পাবে তাহার ব্যবস্থা কবিত্তে হইবে গরম বস্ত্র পরিধান যথা,—ফ্রান্সেল
কিরা “শ্রমিয় লেদাব” (হবিগেব চর্মে নির্মিত বস্ত্রেব আয় পরিষ্কৃত পবি-
চ্ছদ) নরদা গাজে বাঁধা আবশ্যক। লবণাক্ত গরম জলে গাঁজ গাৰ্জনা
করিয়া তোয়ালে দিয়া সেই জল মুছিয়া ফেলা কর্তব্য।

সমুদ্রতীরবর্তী কোন স্থানে বায়ুপরিবর্তনেব জন্ত অবস্থিতি করা
বিধেয়।

এই রোগে অজীর্ণ ও ক্ষুধামান্দ্য স্বতঃই উপস্থিত হয়, তাহাব মুহিত
অগ্নাধিক্য, মুখেব বিকৃত স্বাদ, আহাবে অস্পৃহা ইত্যাদি ঘটয়া থাকে,
তজ্জনিত নিম্নোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

গ্যাবোমোটিক স্পিরিট অফ গ্যামোনিয়া	... ১০ বিন্দু।
টীং অরেন্সাই	... ১০ বিন্দু।
টীং কার্ডেমুম্ কম্পাউণ্ড	... ১৫ বিন্দু।
ইন্ফিউজন্ কলম্বা	... ১ আং।

এক মাত্রা। এইরূপে দিবসে ৩ ৪ বাব সেবন কবান কর্তব্য।

ফুস্ফুস হইতে রক্তাধাব হইলে,—

গ্যালিক গ্যাশিড	... ১২ গ্রোণ
পল্‌ব ইপিক্যাক কম এপিয়াই	... ৫ গ্রোণ

এক একটা মোড়া প্রস্তুত কবিয়া ৮।১০ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিবে।

কাশির প্রতিকার জন্ত,—

লাইকর মর্ফিয়া হাইড্রোক্লোরেটিশ্	... ৪০ বিন্দু।
ডাইঃ হাইড্রোসিয়েনিক গ্যাশিড	... ২০ বিন্দু।
সিবিপা. সিলি.	... ৫৫ ড্রাম
গিউশিলেজিনিশ্ গ্যাকেশিয়া	... ৫৫ আং।

৩৪ ঘণ্টা অন্তর বড় চামচেব এক এক চামচ খাইতে দিবে।

১০ গ্রোণ গাজায়. সিল্লিয়স, কাশি নিবাবণেব মহৌষধ।

রক্তাধাবেব ক্রিয়ায় উত্তেজনায়া নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা।

ডিজিট্যালিস্ ফুস্ফুস্	... ১২ বিন্দু

যাতনোপাযাথিকে কাশাদিরোগ চিকিৎসা । ২৩৯

ক্যাস্কব মিক্শচার ১ আং ।

সিবপ অফ অরেঞ্জ ২ ড্রাম

হাইড্রোসিয়েনিক য়াশিড (ডাইলিউড) ১ বিন্দু ।

এক মাত্রা । বিবেচনামত ব্যবহার কবিবে

বাত্রিকালে খর্ষাধিক্য নিবারণ জন্য —

অক্সাইড অফ জিঙ্ক ১২ গ্রেন ।

এক্সট্রাক্ট কনিয়াই আবশ্যকমত ।

ভেল্ হইওমায়েমি ১৮ গ্রেন ।

ছয়টা বটা প্রস্তুত কবিবে । বাত্রিকালে শয়ন কবিবাব সময় এক

একটা বটা খাইতে দিবে ।

উদ্বাসময় নিবারণার্থ ;—

টিং ক্র্যাটেমবিয়া ১১ ড্রাম ।

সিবপ প্যাপেভেবিস্ ৫ ড্রাম ।

ইন্ফিউজন্ ম্যাটিকা ৭৫ আং ।

৩ ৪ ঘণ্টা অন্তর বড় চামচের এক এক চামচ খাইতে দিবে ।

অতি খর্ষ নিবারণ জন্য মস্কোবিয়া অপব নাম এগাবিক মুস্ অত্যন্ত উপকারী । ইহাব ১ ভাগ লিকুইড এক্সট্রাক্ট ১০০ ভাগ জলে মিশ্রিত করিয়া তাহাব ৫ বিন্দু পরিমাণে দিবসে ৩ বাব সেবনে রোগী আবেগ্য লাভ কবে শয়নের পূর্বে সেবন করাইলে বিশেষ ফল দর্শে ।

বমন ও বমনোদ্বেগ থাকিলে,—

নাপথ ১০ বিন্দু

টিং কার্ডেমুস্ কমঃ ১ ড্রাম

কপূবেব জল ১ আং

৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন কবাইবে । অতি মাত্রায় সেবনে কখন কখন বমন হইতে পারে । একপ ঘণ্টা লে ঔষধ বন্ধ করিয়া দিবে ।

বেদনা অধিক হইলে ফোমেণ্ট, পুটিশ বা টিং আইওডাইন প্রয়োগেই নিবাবিত হয় ।

• জ্বরের জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে —

সল্ফেট অফ কুইনাইন্	৫ গ্রো
সল্ফিউরিক অ্যাসিড অ্যাবোমোটিক	৫ বিন্দু
ইন্ফিউজন্ কোয়াসিয়া	১ আং

এক মাত্রা । এইরূপ মাত্রায় ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন কবাইবে ।

কুস্কুমেসর প্রদাহ নিবারণের জন্য পিট্টোলিয়াম ৩ হইতে ৫ গ্রোণ
৮টিকাকারে ব্যবহার কবিলে বিশেষ ফল দর্শে ।

দৌর্বল্য নিবারণ কবিতে হইলে,—

কডলিভ অয়েল	১০ বিন্দু
সিৰপ্ অফ ফস্ফেট অফ আয়রন	১০ বিন্দু
হাইপো ফস্ফেট অফ লাইম	১০ বিন্দু ।

দুগ্ধেব সহিত সেবন কবাইবে কডলিভ অয়েলের মাত্রা ক্রমশঃ
বৃদ্ধি কবিতে হইবে ।

কডলিভ অয়েল পরিপাক না হইলে, 'প্যাংক্রিয়াম' ১ হইতে ৩
ড্রাম পর্যন্ত দুগ্ধসহযোগে ব্যবহার কবিবে ।

প্লুরিসি বা প্লুরাইটিস্ । প্লুরা অর্থাৎ কুস্কুস্ ও বক্ষগহ্ববেব
আবরণেব প্রদাহ প্রথমাবস্থায় জ্বাগমেব ন্যায় কম্পা ও সচবাচর পার্শ্ব
সূচীবধনবৎ বেদনা হইয়া থাকে । ত্বরিত ও অসম্পূর্ণ শ্বাস-প্রশ্বাস,
শুদ্ধ ও ক্ষণস্থায়ী কাশী, কঠিন ত্রুতগামী নাড়ী, প্রথমে সর্দি উঠেনা,
পরে উহা বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

লক্ষণ । গাত্র বোমাঙ্কিত কখন কখন প্রকৃত কম্প ত্বকেব উষ্ণতা,
পার্শ্ববেদনা, শ্বাসকষ্ট, ক্ষণস্থায়ী ও শুষ্ক কাশি, বেদনাব দিকে শয়ন
করিতে কষ্টবোধ, জ্বর—কখন সামান্য, কখন বা নিমোনিয়াব ন্যায় প্রবল
ও ত্বকেব উষ্ণতা ১০০ হইতে ১০৩ ডিগ্রী পর্যন্ত হইতে পাবে শ্বাস-
প্রশ্বাসেব সংখ্যার সহিত নাড়ীব সংখ্যা ব্যতিক্রম হয় না । শ্বাস প্রশ্বাস
প্রতি মিনিটে ৪০ হইলে নাড়ীব স্পন্দন ১২০ হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু
নিমোনিয়াতে এরূপ হয় না, উহাতে শ্বাস-প্রশ্বাস ৬০ বা ৬৪ হইলে নাড়ী
১০০ বা ১০৮ হয় । অন্যান্য লক্ষণেব প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়াও এই লক্ষণ
দ্বাৰা দুইটি ব্যাধিকে পৃথক কবিয়া চিনিতে পারা যায় ।

চিকিৎসা ।—রোগী দুর্বল হইতে আবৃত্ত হইলে বলকর পথ্যাদি দ্বারা রোগীর বল রক্ষা কবিতে চেষ্টা কবিবে । বোগীকে অতি সুস্থি-
ভাবে শয্যাশয় শয়ন কবিয়া থাকিতে বলিবে এবং প্রাণবাহ্য পূর্ণ
শ্বাস গ্রহণকালে প্লুবার উভয় প্রদেশে পবম্পব ঘর্ষণ এবং যেদনা সৃষ্টি
হইবার সম্ভাবনায় গভীর শ্বাসগ্রহণ কবিতে নিষেধ কবিবে । ফ্রান্সেল
বন্ধনী দ্বারা বক্ষস্থল অঙ্গ জোবে বান্ধিয়া রাখিলে বক্ষপ্রাচীরেব গতির
স্বাভাবিকতা হইতে পাবে বোগী যত দুর্বল হইবে, ততই প্রুদাহিক কার্য
সকলেব সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা ব্রমোফর্ম বা পারদ সেবন কোন
মতেই উচিত নহে । অহিফেন অথবা ডোনার্স পাউডার দ্বারা বেদনা
নিবারণেব প্রয়াস হাইবে তাহার পব নিম্নলিখিত ঘর্ষণকাবক ঔষধিব
ব্যবস্থা কবিবে

লাইকর য়ামোনিয়া য়াসিটেটিস্	...	৪ ড্রাম ।
পোটাসি সাইট্র্যাটিস্	...	২ ড্রাম ।
স্পিরিট য়ামোনিয়া য়াবোমেটিক	...	১ ড্রাম ।
কপূরের জল	...	৬ আং ।

১ আউন্স পবিমাণে ৩ ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন কবাইবে

লাইকর য়ামোনিয়া য়াসিটেটিস্	...	৪ ড্রাম
স্পিরিট ইথাব নাইট্রিক	...	৩ ড্রাম ।
পোটাসি নাইট্রেটিস্	...	১ ড্রাম ।
কপূরের জল	...	৬ আং ।

১ আউন্স ৩ ৪ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে ।

স্থানিক বেদনা নিবারণজন্য পোস্টচেড্রি একফ্রাক্টেব সহিত মশিনার
পুল্টিশ ব্যবহার অথবা পোস্টচেড্রির সহিত ফোমেণ্টেশনে অনেক
উপকার হইবার সম্ভাবনা বেদনা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইলে বেলে-
ডোনার পলস্ত্র ব্যবহার কবিবে । কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে যত্ন বিবেচক ঔষধ
দ্বারা অস্ত্র পবিষ্কার কবিবে য়াবোকেট, দুগ্ধ, মাগুদানা, ত্রণ, পুষ্টিকর
পথ্য ও শীতল পানীয় দিবে ।

এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা কিছু যে একবারে প্রদাহ নিবৃত্তি হয় এমন নয়,

গ্লুবার গহ্বর মধ্যে প্রায়ই ইফিউজন হইয়া থাকে ; এ অবস্থায় বোগীকে উত্তেজক ঔষধ না দিয়া নয় অথচ পুষ্তিকর ঔষধ দিবে বিবেচনামত বেদনাব উপর আইওডাইড অফ মার্করীর মলম, সর্ষপ পলজ্রা ও বেলে-স্ত্রাব ব্যবহারে উপকার দর্শিতে পাবে। ইহাব সহিত নিম্নলিখিত মূত্র-কারক ঔষধ দিবে

পিলঃ হাইডার্জ	...	...	১ গ্রেন।
পল্‌ব ডিজিটেলিস্	...	...	১ গ্রেন।
পল্‌ব সিলি	...	...	১ গ্রেন।
একটি বটী প্রস্তুত করিবে	এইরূপে ৩৪ টী বটী দিবসে সেবন		

করিতে দিবে।

নাইট্রিক ইথার	...	...	১০ বিন্দু।
জুমিয়ার জিন্	...	...	২ ড্রাম।
য়ানিটেট্ অফ পটাশ	...	...	৫ গ্রেন।
জল	...	...	১ আং

দিবসে ৩৪ বার খাওয়াইবে উপরি লিখিত মাত্রা একবারের জন্ত জানিবে।

বোগ প্রবৃত্তন হইলে :—

টীং আইওডাইন্‌ কম্পাউন্ড	...	...	২ বিন্দু
আইওডাইড অফ পটাশিয়াম্	...	...	২ গ্রেন
কডলিভার অয়েল	...	...	১৫ বিন্দু
টীং ফেবি মিউবিয়োটীক্	...	...	৫ বিন্দু

এক এক মাত্রা দিবসে ২৩ বার খাইতে দিবে

হাইড্রোথোর্যাক্স।—এই রোগ প্রায় সাধারণ শোচনীয় সহিত দেখা যায়।

লক্ষণ।—অতি সত্ত্ব বা অগ্নি অগ্নি সিবম সঞ্চিত হইতে পাবে। অগ্নি অগ্নি হইলে লক্ষণাদি বিশেষ কষ্টকর হয় না। শ্বাসকষ্ট, কিয়ৎ পরিমাণে শ্বেতা নির্গত, মুখ ও ওষ্ঠ ঈষৎ নীলবর্ণ, পদদ্বয় ঈষৎ স্ফীত, নাড়ী ক্ষুদ্র, ক্রান্তগামী বা বিষম, অল্প প্রস্রাব ইত্যাদি ইহাব সাধারণ

লক্ষণ যে পর্যন্ত সিরমেব পরিমাণ অল্প থাকে, সে পর্যন্ত রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে পারে কিন্তু অধিক হইলে শ্বাসকষ্টেব আতিশয্য হেতু সর্বদা উপবেশনাবস্থায় থাকিতে চাহে ।

চিকিৎসা ।—প্লুবিমীষ ঙ্গায়

শ্বাসকাশ বা য্যাজমা ।—ইহাতে মধ্য মধ্য শ্বাসকষ্ট, তাহার সহিত ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ, বক্ষঃস্থলে টানবোধ, মানসিক উদ্বেগ, ক্লেশকব কাশ, এবং কাশিতে কাশিতে বমন ও বমনোদ্বেগ হয় ।

লক্ষণ ।—আলস্রবোধ, বমনোদ্বেগ, উদর স্ফীতি ও অন্যান্য অজীর্ণতার লক্ষণ, চক্ষু, মস্তক ও বক্ষঃস্থল ভারবোধ, নিজাভাব হয় । প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাত্রি দুই প্রহবেব সময় বা তাহার কিছু পূবে আক্ষেপযুক্ত হাঁপানি আরম্ভ হয় । অকস্মাৎ শ্বাসকষ্ট ও বক্ষঃস্থলে টানবোধ হইয়া রোগী জাগিয়া উঠে ক্রমে ঐ শ্বাসকষ্ট বাড়িতে থাকে, এবং ফুস্ফুস্ বায়ুর অভাব জন্য বোগী অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে । শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হইবার জন্য বোগী বসিয়া থাকিতে চাহে, কিন্তু কিছুতেই অস্থখ নিবারণ হয় না ।

এই অবস্থায় নড়ী স্বল্প ও দুর্বল, মুখমণ্ডল উদ্বেগযুক্ত, চক্ষু প্রফুল্ল, এবং ত্বকু শীতল ও ঘর্ষাক্ত হইতে পাবে রোগীব অবস্থা দেখিলে আতিশয় কষ্টভোগ করিতেছে বলিয়া জানিতে পাবা যায় । কখন কখন বোধ হয় যেন হঠাৎ যত্ন হইল এ অবস্থায় রোগীর স্বভাব বড় কম্প হইয়া থাকে । কিয়ৎকাল পবে অল্প বিরাম হইতে আরম্ভ হয়, এবং কাশিতে কাশিতে শ্লেষ্মা নির্গত হইলে শ্বাসকষ্ট দূর হয়, এবং রোগী আপনাকে সুস্থ বোধ করিয়া নিজা যাইতে চাহে ।

চিকিৎসা ।—এই পীড়ার চিকিৎসা দুই প্রকারে করা গিয়া থাকে । এক—প্রথমতঃ রোগ আক্রমণকালে এবং দ্বিতীয়তঃ দুই বা ততোধিক হইবার মধ্যবর্তী সময়ে ।

প্রথমোক্ত সময়ে চিকিৎসা করিতে হইলে যদি পাশাশয়ে গল থাকা বিবেচনা হয়, তবে বিরচক ঔষধ, ভুক্ত দ্রব্য অজীর্ণাবস্থায় উহাতে থাকিলে বমনকর ঔষধ প্রয়োগ, এবং রোগীব বাসগৃহে যাহাতে বায়ুমণ্ডলনের

সুব্যবস্থা কবা যায়, তাহাব উপায় দেখিতে হইবে রোগীকে কোন মতে কথা কহিতে দিবে না, এমন কি আবশ্যকীয় জব্য তাহার নিকটে সর্বদা উপস্থিত রাখিবাব উপদেশ দিবে, যেন তাহাকে চাহিয়া লইতে না হয় সন্মুখে তাকিয়া উপর্যুপরি বাথিয়া তাহাব উপব ঝাঁক দিয়া বগিয়া থাকিবাব উপদেশ দিবে

চিকিৎসা — ইহাতে একরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া সর্বত্র ফুল-লাভ করিতে পাৰা যায় না। এজন্য বোগীব প্রকৃতি দেখিয়া চিকিৎসা কহিতে হইবে ইহাতে ডিপ্রেসেন্ট বা দৌৰ্বল্যকর, সিডেটিভ বা অবসাদক, এবং স্টিমিউলেন্ট বা উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়।

দৌৰ্বল্যকর ঔষধের মধ্যে বমন কবাইবাব জন্য ২০ গ্রেণ মাত্রায় ইপিক্যাফুয়ানহা ব্যবহার করিলে ১৫ মিনিট মধ্যে বমন হয়।

অবসাদক ঔষধ — তামাকু; — ইহাব ধুম পানে শ্বাসকষ্টের অনেক লাঘব হয়। ধুতুবা পাতা কলিকাষ দিয়া তাহাকে অগ্নি সংযোগে ধুমপান কবিলে অনেক স্থলে পীড়া যাপ্য থাকে

একফ্রাক্ট ফ্র্যাগোনিয়াই	...	...	৪ গ্রেণ।
একফ্রাক্ট বেলেডোনা	...	...	২ গ্রেণ।
কোনাই	...	...	২ গ্রেণ।

একটী বটী প্রস্তুত কবিয়া ব্যতিকালে শয়নের পূর্বে সেবন করিলে রাত্রে শ্বাসকষ্ট থাকিবে না

ক্লোরোফর্মের আণগ্রহণ করিয়া অনেকে একবারে পীড়া হইতে মুক্তিলাভ কবিয়াছে।

— দোরার ধূমে বোগীব বাসগৃহ আচ্ছন্ন কবিয়া বাথিতে গাবিলে পীড়া আক্রমণ কবিত্তে পাবে না

উত্তেজক ঔষধাদির প্রয়োজন হইলে কফি সেবনই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু উহা দুগ্ধ বা চিনির সহিত ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। প্রবল পীড়ার সময়ে গবম জলৈব সহিত কিয়ৎ পরিমাণে স্পিৰিট, ব্রাণ্ডি, হাইস্কি বা জিন্ ইত্যাদি সুরা সেবনে এই পীড়ার উপশম হইয়া থাকে।

স্বরভঙ্গ বা গ্যাকোনিয়া ।—এই বোগে সামান্য স্বরভঙ্গ হইতে বোঁবাব ন্যায় বাক্যহীনতা পর্যন্ত জন্মিতে পারে । ইহাব কারণ দুই প্রকার ;—ক্রিয়াবিকার বা নির্মাণবিকার, এবং এই ব্যাধি কিয়দিঘস বা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে ।

ক্রিয়াবিকার জন্য স্বরভঙ্গ ।—সাধারণতঃ অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা এই পীড়ার প্রকৃতি অবগত হইতে পাওয়া যায়, এজন্য ইহা সহজে নিষ্কর্য কবিতে পারা যায়

লক্ষণ ।—বোগী কিছু দিনের জন্য ধীরে ধীরে ফুন্ ফুন্ কবিয়া কথা কহে, পরে পুনরায় স্বর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু আবার এই পীড়া প্রকাশ হওয়াও বিচিত্র নহে ।

চিকিৎসা ।—লৌহস্ফটিক ঔষধ প্রয়োগ, এবং মানসিক স্থিরতা দ্বারা এই ব্যাধির উপশম হইতে পারে ।

অধিক পরিমাণে রক্তজাব, প্রবল জ্বর, ডিপথিরিয়া, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগ জন্য এই পীড়া হইলে, সেই বোগেব চিকিৎসা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইলে এই বোগ তাহ দ্বারাই প্রশমিত হয়

নির্মাণবিকারজন্য স্বরভঙ্গ ।—স্বর-রঞ্জুর নিকট সিরসসঞ্চার, অর্থাৎ ক্ষত, প্রদাহ, কণ্ঠনালীর নিকট কোন টিউমারের নিপীড়ন, মস্তিষ্কেব পীড়া ইহাব কারণমধ্যে গণ্য ।

চিকিৎসা ।—স্বর-রঞ্জুর নিকটস্থ স্থানের প্রদাহ বা ক্ষত নিবারণ জন্য ৪০ হইতে ৮০ গ্রেণ নাইট্রেট অফ সিল্ভার ১ আউন্স জলের সহিত লোশন কবিয়া বাহ্য প্রয়োগ কবিবে । গ্ৰন্থীক্ষয় জন্য হইলে, ঐ স্থান চিরিয়া দিবার ব্যবস্থা কবু যাইতে পারে

বৈদ্যকে কাশাদি রোগ চিকিৎসা।

কাশের নিদান এবং সংশ্রাণ্তি ।—যে ব্যক্তির মুখ ও নাসিকা দিয়া ধূম বা ধুলি প্রবেশ কবে,যে মনুষ্য ব্যায়াম এবং কক্ষান্ন ভক্ষণ করে, তাহার অতি কুপিত প্রাণবায়ু দূষিত উদানবায়ু অঙ্গগত হইয়া কাসার ন্যায় শব্দ করিয়া দোষেব সহিত নির্গত হয় কাসার শব্দের ন্যায় শব্দ হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে কাস বলিয়া নির্দেশ করেন

কাশের সংখ্যা ।—কাশ রোগ পাঁচপ্রকার,যথা,—বাতজ,পিত্তজ, কফজ, ক্ষতজ, ক্ষয়জ ।

কাস ও ক্ষয়ের কারণ নিরূপণ ।—বলবান ব্যক্তিও যথাসময়ে কাশ বোগেব প্রতিকার না করিলে সামান্য কাসই উত্তবোত্তব ধাতুশোষ রোগে অর্থাৎ ক্ষয়বোগে পরিণত হইয়া থাকে

কাশের পূর্বরূপ ।—সকল প্রকার কাশ রোগের পূর্বে মনুষ্যের গলা ও জিহ্বা কণ্টকাক্তবৎ হয় কণ্ঠদেশে কণ্ডু এবং ভোজনীয় দ্রব্যে অকচি হয়

বাতজ কাশের লক্ষণ ।—পীড়িত ব্যক্তির হৃদয়ে, ললাটের একদেশে, মস্তকে, উদরে এবং পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা ও মুখ শুষ্ক, স্বর কিঙ্ক শক্তির হীনতা, সর্বদা কাশবেগ এবং শুষ্ক কাশি হয় ।

চিকিৎসা ।—অত্র ১৬ তোলা, কপূর্ব, জৈত্রী, বালা, গজপিপ্পলী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালিসং পত্র, দাওঁচিনী, নাগেশ্বর, কুড়, ধাইফুল, প্রত্যেক ৫ তোলা হবিভুকী, আগলা, বহেড়া, ত্রিকটু, প্রত্যেকে ১০ আনা । এলাইচ,জায়ফল,প্রত্যেক ১তোলা; গন্ধক ১তোলা, পারদ ১০ তোলা ; এই সমস্ত জলে মাড়িয়া সিদ্ধ চণক প্রমাণ বটীকা কবিবে আদা ও পানের সহিত সেবন কবিবে ঔষধ সেবন করিয়া জল পান করিবে । ইহার নাম "শ্যজারাত্র ।"

কাশাসংহার ভৈরব রস ।—পাবন, গন্ধক, তাম্র, শঙ্খ, ভস্ম, মোহামার খই, লৌহ, মরিচ, কুড়, তালীশপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা একত্রিত করিয়া ফুলকুড়ি, কেশুরিয়া, নিসিন্দা, কাকমাটি, ঘন-ঘসিয়া, শালপানি, গিমা, বায়ুনহাটী, হবিতকী, বাসক প্রত্যেকেব ২ তোলা রসে ভাবনা দিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটী অনুপান বাসক, শুঠ ও কণ্টকাবীৰ কাথ *

পিত্তজ কাশের লক্ষণ ।—পিত্তজন্য কাশে উকদেশ দাহ, জ্বর, মুখশোষ, মুখ তিক্ত, পিপাসা, পীতবর্ণ বমন ও কটু কাশ হয়, রোগী পীতবর্ণ এবং দাহযুক্ত হয়

* চিকিৎসা । বেলছাল, গনিয়ারীছাল, সোনাছাল, গাড়াবীছাল, পাঞ্চলছাল, বেড়েলাছাল, শালপানি, চাকুলে, মুগানি, মাযানি, পিপ্পলী, গোস্কক, বৃহতী, কণ্টকাবী, কাকড়া শৃঙ্গী, ভুই আমলা, জাম্বা, জীবন্তী, কুড়, অণ্ডক, হবিতকী, ওলঞ্চ, ঋদ্ধি, জীরক ঋষভক, শঠি, মুখা, পুনর্গবা, মেদ, ছোট এলাইচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুশ্মাণ্ড, বাসকমূল, কোকোলী, কাকজঙ্ঘা প্রত্যেক ১ পল ; ঋথবদ্ধ গোটা আমলা ৭৮/০ ছটাক সমুদয় একত্র ৬৪ সেব জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সেব থাকিতে নামাইবে কাথ ছাঁকিয়া পুটলীবদ্ধ আমলকীর বীজ ফেলিয়া দিয়া ৬ পল ঘৃত ও ৬ পল তিল তৈল একত্র মিশাইয়া ভাজিয়া শিলায পেষণ করিবে মিছবি ৫০ পল, কাথ জল এবং পেষিত বীজ শূন্য আমলকী একত্রে পাক করিবে ; ঘনীভূত হইলে বংশলোচন ৪ পল, পিঁপুল ২ পল, ওড়ক, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর ইহাদেব প্রত্যেক ২ তোলা । এই সমুদয় চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নাড়িয়া নামাইবে, শীতল হইলে মধু ৬ পল মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে । মাত্রা ২ তোলা । অনুপান ছাগগুড় ইহাব নাম “চ্যবনপ্রাশ ”

• তালীশাদি চূর্ণ ।—তালীশ পত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুঠ ৩ তোলা, পিপ্পলী ৪ তোলা, বংশলোচন ৫ তোলা, দাক্ষিণি ০ তোলা, এলাইচ ০ তোলা, এই সকল চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত চিনি ৩২ তোলা মিশাইবে

কফজ কাশের লক্ষণ ।—কফজ কাশে মুখের লিপ্ততা, শবীরের অবসন্নতা, শিরে বেদনা, শবীরে রুক্ষাধিক্য, অকৃতি, শবীরেব শুষ্কতা, কণ্ঠ ও কাশের সময় অতি ঘন কফ নির্গত হয়

চিকিৎসা ।—বাসক মূলের ছাল ১২ ০ সেব, জল ৬৭ সেব, শেষ ১৬ সেব শেষ ১৬ সেব কাথের সহিত ১২ ০ সেব চিনি মিশ্রিত কবিয়া পাক কবিলে . গাঢ় হইয়া আসিলে ত্রিকটু, গুড়ক, জপত্র, এলাইচ, কটফল, মুখা, কুড়, জিবা, পিপ্পলিমূল, কমলাগুড়ি, চই, বংশলোচন, কটকী, গজপিপ্পলি, তালীশপত্র, ধনে, প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নাড়িয়া নামাইবে শীতল হইলে মধু ১ সেব মিশাইয়া লইবে বাসি শীতল জলের সহিত সেবন কবিলে অগ্নি ও বঙ্গাভুযাযী ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্যন্ত মাত্রা ব্যবস্থেয় ইহার নাম “বৃহদ্রাসাবলেহ ।”

চন্দ্রামৃত রস ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, ধন্যা, সৈন্ধব লবণ প্রত্যেক ১ তোলা পাৰা, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ২ তোলা, মোহাগার খই ৮ তোলা, মবিচ ৪ তোলা, এই সমস্ত ছাগদুগ্ধে পেষণ কবিয়া ৯ বতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত কবিবে অম্লপান বভোঁপল, নীলেপল, কুলখ কলয়, আদা, ইহাদির কাছাবও বস বা পিপ্পলী চূর্ণ ও মধু

ক্ষতজ কাশের নিদান ও লক্ষণ ।—অতি মৈথুন, ভাববহন, পথশ্রম, যুদ্ধাদি এবং সজোবে ধাবমান অশ্ব ও হস্তীধাবন, এই সমস্ত কাৰণে বাহাব উৰ ক্ষত হয়, দুই বায়ু তাহাব সেই উৰক্ষত অবলম্বন কবিয়া কাশবোগ উৎপাদন কবে . সেই ব্যক্তিব প্রথমে শুষ্ক কাশ, অনন্তর শোণিতের সহিত কফ নির্গত হয় । কঠদেশে শূলবিদ্ধবৎ অতিশয় বেদনা, বক্ষস্থলে ভঙ্গবৎ বেদনা, শূলবিদ্ধবেদনা এবং বক্ষস্পর্শে কাতব হয় । সন্ধিস্থানে বেদনা, জ্বর, শ্বাস, কৃষ্ণা ও বোগী স্বরভেদপীড়িত হইয়া কাশবোগে সময়ে সময়ে কপোতেব ন্যায় অব্যক্ত শব্দ কবে

চিকিৎসা ।—স্বর্ণ ১ তোলা, অভ্র ২ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, পাবদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, যুক্তা ৪ তোলা, প্রুরাল ৪ তোলা, এই সকল অব্য গোক্ষুব, বাসক ও ইক্ষুর বসে মাড়িয়া বিলম্বটার অগ্নিতে বন্ধ মুখায় বালুকা যত্নে ১ গ্রহব পাক কবিবে . ঔষধ অগ্নি হইতে

তুলিয়া তাহাব সহিত যুগনাভি ৪ তোলা, কপূর্ব ৪ তোলা মিশ্রিত কবিয়া মাড়িয়া লইবে। মাত্রা ২ বতি ইহাব নাম “সমস্ত তলক রস।”

সর্বদাজ স্তম্ভব রস পাঁচ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, মোহা-
গারু খই ২ তোলা, মুক্তা, প্রবল, লক্ষা প্রত্যেক ২ তোলা, স্নেহ ০ তোলা
এই সমস্ত নিম্নোক্ত বসে মাড়িয়া গোলাকার কবিয়া বন্ধ মুখ য গজপুটে
পাক কবিলে স্নেহ ৩ তোলা হইলে তুলিয়া লোই তেঁলা ও হিঙ্গুল ০
আনা মিশ্রিত কবিয়া উত্তমরূপে মাড়িলে মাত্রা ২ বতি; অম্পান
পিপ্পলী চূর্ণ ও মধু

ক্ষয়জ কাশের নিদান ও লক্ষণ — বিষম আহার, অতিশয়
ভোজন, অতি মৈথুন এবং মল মুত্রাদির বেগ ধাবণ জন্ত যুগী এবং
শোকসন্তপ্ত ব্যক্তির দোষ জন্ত অগ্নি দূষিত হইলে, মন্দাগ্নি নিমিত্ত বায়ু,
পিত্ত ও কফ কুপিত হইয় দেহের ক্ষয়কারক কফজ কাশ উৎপাদনকরে।
রে গীব শবীবে প্লববিধ বদেদনা, জ্বর, দাহ, মোহ ও বলক্ষয় জন্মায়
ধাতুকষয়যুক্ত দুর্বল এবং ক্ষীণ মাংস হইয়া কাশের সহিত পুঁয়নুক্ত
কষির উদ্গীবণ করে। ইহা সমস্ত লক্ষণযুক্ত হইলে তাহা চিকিৎসা।

চিকিৎসা — পাঁচ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা,
মবিচ ১০ তোলা, অত্র ৪ তোলা, বিষ ১ তোলা এই সমস্ত নেরুর বসে
মাড়িয়া মাষকলাই প্রমাণ বটা কবিলে অম্পান বহেড়া ফলের ছাল
চূর্ণ ও মধু ইহাব নাম “পঞ্চাঙ্গ ৩ রস”

ভাগোত্তর গুড়িকা — পাঁচ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, পিপ্পলী
৩ তোলা, হবিয়বী ৪ তোলা, বহেড়া ৫ তোলা, বাসক ৬ তোলা, বায়ুন-
হাটী ৭ তোলা, এই সমস্ত চূর্ণ ২১ বাব বাবলাব আটায় ভাবনা দিয়া মধু-
সংযুক্ত কবিয়া বহেড়ার আয় গুড়িকা কবিলে

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ — ক্ষয়জ কাশ ক্ষীণ ব্যক্তিদ্বিগের দেহনাশক,
ইহা ক্ষয়জনিত হইলে বলবান ব্যক্তিদ্বিগের সাধ্য অথবা যাপ্য হয়
এই কাশবোগাক্রান্ত মনুষ্য যদি পাদ-চতুষ্টয় সমন্বিত অর্থাৎ বোগী, ভূতা
চিকিৎসক ও ঔষধ যদি উপযুক্ত হয় এবং যদি কাশ অস্পকালজ হয়,
তবে তিনিও কদাচিত এই বোগ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। রোগদ্বিগের

জ্বাজ্জ্বিত ক শব্দে যাপ্য বৈদ্যগণ পূর্বোক্ত বাতাদি জ্বা কালক্রমে মধ্য মাধ্যকে আবোগ্য এবং যাপ্যকে পথ্যাদি দ্বাৰা সাম্য রাখিবেন •

হিকা ও শ্বাসের কারণ ।—দাহজনক, গুরুপাক, ক্ষেদজনক ও আপাচ্য দ্রব্য ভোজন, শীতল জলাদি পান, শীতল দ্রব্য ভোজন, শীতল স্থানে বাস নাসিকাদিতে ধূলি ও ধূমাদি প্রবেশ, অতিশয় বায়ু ও বৌদ্ধ সেবন, পবিত্রম, ভাববহন, অত্যন্ত পথশ্রম মলমূত্রাদি বর্ষণ ধাবণ, ও উপবাসাদি কাৰণে হিকা এবং শ্বাস কাল জন্মে ।

হিকার স্বরূপ এবং বৃৎপত্তি ।—উদানের সহিত মিলিত প্রাণবায়ু যেন যকুৎ, প্লীহা ও অন্ত্রসকলকে মুখ দিয়া বাহির করিবাব নিমিত্তই ‘হিক্’ শব্দ কবিতা উর্দ্ধদিকে পুনঃ পুনঃ উত্থিত হইয়া থাকে “হিক্” শব্দ হয় বলিয়া হিকা বলা “হিক্” শব্দকাৰী বায়ু অতি শীঘ্রই প্রাণ নাশ করে

হিকার ভেদ ও সংপ্রাপ্তি —বায়ু কক্ষের অন্তর্গত হইয়া অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রিকা, গন্তীবা, মহতী, এই পাঁচ প্রকার হিকা জন্মায় ।

হিকার পূর্বরূপ ।—হিকা বোগ জন্মিবাব অব্যবহিত পূর্বক কষ্ট এবং উৎস্থানের গুরুতা, মুখে কষায়ত, উদবেব গুড গুড় শব্দ, এই সমস্ত লক্ষণ হয়

অন্নজা হিকার লক্ষণ ।—উপর্যুপরি পান এবং অতিশয় অন্নাদি সেবনে কুপিত বায়ু উর্দ্ধগত হইয়া যে হিকা বোগ জন্মায়, তাহার নাম অন্নজা হিক

যমলা হিকার লক্ষণ ।—বেগদ্বয় অর্থাৎ প্রত্যেক বাঁয়ে দুইটি দুইটি কুরিয়া যে হিকা কণবিলম্বে উঠে এবং বেগকালীন মস্তক ও শ্রীবা কম্পিত হয়, তাহার নাম যমলা হিকা

ক্ষুদ্রিকা হিকার লক্ষণ —যে হিক কষ্ট ও বক্ষস্থলেব সন্ধিস্থান হইতে উঠিয়া বিলম্বে মন্দবেগে প্রকাশ পায়, তাহার নাম ক্ষুদ্রিকা হিকা

গন্তীবা হিকার লক্ষণ ।—বহু উপদ্রব্যযুক্ত হইয়া নাভিস্থান হইতে ভয়ানক শব্দ কবিতা যে হিকা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম গন্তীবা

মহা হিকার লক্ষণ ।—সমস্ত শবীৰ কম্পিত কৰিষা বস্তি, হৃদয়, মস্তক, এই তিন স্থানে অতিশয় বেদনা জন্মাইয়া যে হিকা নিবন্তৰ উঠে, তাহাব নাম মহা হিকা

অবস্থাভেদে অসাধ্য লক্ষণ —হিকা উঠিবাব সময় শবীৰ সঙ্কোচিত এবং দৃষ্টি উৰ্দ্ধদিকে বিস্তাৰিত হইলে সেই হিকা অসাধ্য ; অধিকন্তু যাহাব শবীৰ দুৰ্বল, অগ্নে অকচি এবং সৰ্বদা হিকাব বেগ হয়, সেই হিকা এবং গন্তীবা ও মহা হিকা অসাধ্য

কারণবিশেষে অসাধ্য লক্ষণ সঞ্চিত দোষযুক্ত অকচি-জন্ম কৃশ, ব্যাধিহেতু ক্ষীণ শবীৰ, বৃদ্ধ এবং অতি মৈথুনশীল ব্যক্তিব হিকাভয়েৰ যে কোনটী জন্মিলে বোগীৰ আশু প্রাণ নষ্ট হইতে পাবে ।

যমলার অসাধ্য লক্ষণ ।—যমল হিকায় প্রলাপ, বেদনা, মোহ, তৃষ্ণা, এই সকল লক্ষণ হইলে অসাধ্য অক্ষীণ, প্রসন্নচিত্ত, সমধাতু ও প্রসন্নইন্দ্রিয় ব্যক্তির যমলা হিকা সাধ্য, অথবা অসাধ্য

মুষ্টিযোগ —(১) বুলবীজের শাখ, রসাজন ও খই চূর্ণ । (২) কটুকী ও অৰ্ণ গেরী মাটি (৩) পিপ্পল, আমলকী, চিনি ও শুঁট (৪) হিবাকস ও কষেতবেলেব শস্য (৫) পাকলেব ফল এবং পুষ্প । (৬) পিপ্পল ও খেজুবেব মাতি এই ছয় প্রকাৰ অবলেহ মধুব সহিত উত্তম-রূপে মাড়িয়া যে কোনটী ২ মাসা মাত্র য় ২ ঘণ্টা অন্তৰ লেহন করিলে হিকার শান্তি হয়

মধুব সহিত যষ্টিমধু চূর্ণ, চিনিব সহিত পিপ্পলী চূর্ণ, ওড়ৈব সহিত শুঁট চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে হিকাব নিবারণ হয় ।

মক্ষিকাব বিষ্ঠা স্তন্যদুগ্ধে বা জালুতাব জলে ওলিয়া বা স্তন্যদুগ্ধে রঙ চন্দন ঘসিয়া নস্য লইলে হিকাব শান্তি হয়

মধু বা কেশেব মূল চূর্ণ সেবন কবিলে সত্ত্ব হিকা ভাল হয় ।

কদলীমূলের রস মধুব সহিত পান করিলে হিকা নিবারণ হয় ।

মাসকলায়েব ধূম গ্রহণ করিলে বা এলাইচ চূর্ণ ২ মাসা চিনিব সহিত সেবন করিলে প্রবল হিকাব উপশম হয় ।

ময়ূরপুচ্ছ আবদ্ধ পাএ বাখিয়া ভস্ম কবিবে পরে ডাছাব সহিত
পিপ্পলী চূর্ণ ও মধু মিলাইয়া সেবন কবিলে হিকার নাশ্ত হয়

শ্বাসের লক্ষণ — শ্বাস দোষভেদে মহা, উর্দ্ধ, ছিন্ন, তমক ও
ক্ষুদ্র এই কয়েক ভাগে বিভক্ত বাতাসিক ক্ষুদ্র, কল্কাধিক তমক,
কফবাতাসিক এবং পিত্তসংস্কৃত ছিন্ন মহাশ্বাস ও উর্দ্ধশ্বাস কর্তৃক উৎপন্ন
হয়

শ্বাসের পূর্বরূপ স্ব স্ব বোগ সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইবার পূর্বে
হৃদয়ে নানাপ্রকার বাতনা, শূলবিদ্ধবদেদনা, বেদনাব সহিত উদবেব
ক্ষীততা, মল মূত্র বোধ, মুখেব বিবসতা ও ললাটেব একদেশে বেদনা
হইয়া থাকে

শ্বাসের উৎপত্তি বৎকালে কফপধান প্রাণবায়ু উদক ও
অন্নবহ জ্বাত সকলকে ক্ষেপ্তা দ্বাৰা বোধ কবিয়া বিপথগামী হইয়া সৰ্ব্বত্র
গমন কবে, তৎকালে শ্বাসবোগ উৎপন্ন হয়

মহাশ্বাসের লক্ষণ ।—যাহাব বায়ু উর্দ্ধে নীত হয়, সেই ব্যক্তি
দুঃখিত হইয়া সংকট মত্ত বঁচেঁড়ের চক্ষু নাড় কবিয়া নিবন্তর দীর্ঘনিশ্বাস
পরিত্যাগ কবে জ্ঞানলোপ, চঞ্চলচক্ষু সচক্ষু ও মুখ প্রসারিত ও মল-
মূত্রেব বোধ হয় বোগী বাক্যলাপে অক্ষম ও ক্লান্তমনা হইয়া এমন
মজোবে নিশ্বাস পরিত্যাগ কবে যে, বহুদূর হইতেও শ্বাস কর্ণগোচর
হইয়া থাকে এই মহাশ্বাসযুক্ত ব্যক্তি শীঘ্রই বিপদগ্রস্ত হয়

চিকিৎসা ।—হবিজা, মবিচ, কিসুমিস্, পুৰাতন গুড়, রান্না, পিপ্পলী,
শাঠী, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ একত্র মিশ্রিত কবিয়া ৪ মাসা মাত্রায় সৰ্বপ
তৈলেব সহিত লেহন কবিয়া সেবন কবিবে ।

বিজুপল্লব রস, বাসক পত্রের রস, শ্বেত ডাঙ্কুনি পত্রের রস, কটু
তৈলে মিশ্রিত কবিয়া পান কবিবে

কুশ্মাণ্ডশস্যচূর্ণ ৪ মাস উষ্ণ জলেব সহিত পান কবিবে

শোধিত গন্ধক ৫ বতি এবং মবিচ চূর্ণ ৫ বতি একত্র যত্নেব সহিত
সেবন কবিবে

শৃঙ্গাদি চূর্ণ ।—কাঁকড়া শৃঙ্গী, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কটকাবী, বায়ুন-

হাটী, কুড়, জটামাংসী, পঞ্চলবণ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ একত্র কনিয়া উত্তমকপে মাড়িবে মাত্রা ২ মাস। অল্পপান উষ্ণ জল

উর্দ্ধশ্বাসের লক্ষণ — বোগী দীর্ঘকাল উর্দ্ধশ্বাস পাবিত্যাগ কনিয়া অধঃশ্বাস গ্রহণ করিতে অক্ষম, মুখপ্রান্তে শ্বাসপ্রান্তে আরও হেতু প্রাপ্ত বায়ু কর্তৃক পীড়িত, উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া চঞ্চল নমনে ইতস্ততঃ দর্শন, মুখ শুষ্ক, মোহ, বেদনা, দুর্বলতাপীড়িত হয় এই শ্বাস প্রকোপিত হইলে অধঃশ্বাস মনুষ্যের হৃদয়েই স্তম্ভিত হইয়া থাকে, উর্দ্ধশ্বাস, মোহ এবং স্তানিয়ুক্ত ব্যক্তির প্রাণনাশ কবে

চিকিৎসা — লৌহ ৪ তোলা, অভ্র ১ তোলা, চিনি ৪ তোলা, মধু ৪ তোলা, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, জাফা, পিপ্পলী, কুলবীজের মাস, বংশলোচন, তালীশপত্র, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, কুড়, নাগেশ্বর, প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা এই সকল লৌহপাত্রে লৌহদণ্ডে ২ প্রহর মাড়িবে। মাত্রা অর্দ্ধ মাস। হইতে ২ মাস। মধু সহিত সেবন বিধি। ইহার নাম “মহাশ্বাসারি লৌহ।”

শ্বাসকূটার রস। — পাণা, গন্ধক, বিরা, মোহাগাব খই, মনছাল, মরিচ, ত্রিকটু, ইহাদেব সকলের সমভাগ জলে মাড়িয়া ১ বতি প্রমাণ বটী করিবে। অল্পপান আদার রস ও মধু।

হ্রিন্ধশ্বাসের লক্ষণ — যাহাতে বোগী সজোবে এবং সবিস্ফেদে অর্থাৎ থাকিয়া থাকিয়া শ্বাস পাবিত্যাগ কবে, মর্মভেদী বেদনায় পীড়িত হইয়া কখন কখন শ্বাস পাবিত্যাগ কবিতে পাবে না, মল মুজের রোধতা, ঘর্ষ, মোহ, বস্তিস্থান জালা, অশপূর্ণ নেত্র, দৌর্বল্য, এক চক্ষু বক্তবর্ণ, চিত্তচাঞ্চল্য, প্রলাপ ও মুখ শুষ্ক, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে হ্রিন্ধশ্বাস বলে। এই শ্বাসে রোগী শিথিল হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে

চিকিৎসা। — বায়ুনহাটীব মূল ৫০ পল, বাসকমূলের ছাল ৫০ পল, কণ্টকারী ৫০ পল, জল ৯৬ সেব, শেষ ২৪ সের, ৪ টী বাহুড়ের মাংস পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ ৪ সেব, ছাঁকিয়া উত্তম কথ একত্র কবিবে; তাহাতে চিনি ২ সেব, দিয়া পাক কবিবে; ঘন হইয়া আসিলে নামাইবে

এবং উহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুখা, তালীশ পত্র, নাগেশ্বর, বামুনহাটীব মূল, বচ, গোক্ষুবী, গুড়ত্বক, এলাইচ, তেজপত্র, জীবা, যমানী, বনযমানী, বংশলোচন, কুলথ, কলায়, কটফল, কুড়, কঁকড়া শৃঙ্গী, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা পরিমাণ প্রক্ষেপ দিবে মাত্রা ০ তোলা হইতে ১ তোলা অল্পপান বোগ বিবেচনা কবিয়া স্থির কবিবে ইহার নাম “ভার্গী শর্কর ”

শ্বাসচিকিৎসামণি ।- লৌহ ৪ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, পাৰা ১ তোলা, অভ্র ২ তোলা, স্বর্ণমাস্কিক ১ তোলা, মুক্তা ০ তোলা, স্বর্ণ ১০ তোলা সমুদয় একত্রে মাড়িয়া কণ্টকারীব রসে, আদার রসে, ছাগ ছন্ধে ও যক্ষ্মিগধুব কাথে ভাবনা দিয়া ৪ বতি প্রমাণ বটী * অল্পপান মধু ও বহেড়া চূর্ণ

তমক শ্বাসের লক্ষণ —যৎকালে বায়ু বিপবীত ভাব প্রাপ্ত হইয়া গস্তক ও গ্রীবাদেশ আশ্রয় কবিয়া শ্বেদ্যাকে প্রকোপিত কবিয়া পীনস অর্থাৎ ছর্দি বোগ উৎপাদন কবে, তৎকালীন কফদ্বারা আবৃত হইয়া অতি বেগবান ও যুঁর্ব-শব্দযুক্ত হৃদয়পিড়ক শ্বাস উৎপাদন কবে । রোগী অন্ধকাব দর্শনেব ত্রায় উদ্বেগযুক্ত হইয়া কার্যে অক্ষম হয় এবং কাশিতে কাশিতে মোহ প্রাপ্ত হয় । বোগী শ্বেদ্যামোচনে অক্ষম হইলে অতিশয় দুঃখী এবং তাহার মোচন কবিয়া মুছর্ত কাল স্মৃখী হয় । বোগীব কণ্ঠদেশে কণ্ঠ হয়, এবং বহুকষ্টেও কথা কহিতে পাবে না, শয়ন কবিয়া নিদ্রা লাভ করিতে পাবে না ।

শয়ন কবিলে পশ্চদেশে অতিশয় বেদনা বোধ কবে, উপবেশন করিলে কিঞ্চিৎ স্মৃখ বোধ কবে ও উষ্ণ প্রার্থনা করে চক্ষুব স্ফীততা, ললাটে ঘর্ম, কর্তনবৎ বেদনায়ুক্ত শুষ্ক মুখ, পুনঃপুনঃ শ্বাস বোগ এবং গজাবোহী মনুষ্যেব ত্রয়ি গাত্র চালনা হয় এই বোগ মেঘে নীল দ্রব্য এবং পূর্বাদিকেব বায়ু সেবনে বর্জিত হয় । এই শ্বাস যাপ্য, অল্প দিনেব হইলে সাধ্য

চিকিৎসা ।—বামুনহাটীব মূল ১০০ পল, দশমূল প্রত্যেক ১০ পল, বজ্র নিখিল বদ্ধ হবিতকী ১০০ টা, ১১৬ সেব জলে গমিক করিয়া ২৯

সেব থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এই জলে পূর্বোক্ত হবিতকী ১০০টি এবং পুৰাতন গুড় ১০০ পল দিয়া পাক করিবে ঘনীভূত হইলে উহাতে ত্রিকটু, গুড়তক, তেজপত্র, এলাইচ, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল এবং যবক্ষীর ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু ৬ পল দিবে মাত্রা ১ তোলা হইতে ৪ তোলা হবিতকী ১ টি বা উহাৰ আংশিক একত্র সেবা ইহাৰ নাম ‘ডাঙ্গীগুড়া’

শৃঙ্গী গুড়ামৃত —কণ্টকাবী, বৃহতী, বাসকমূলব ছাল, গুলঞ্চ, প্রত্যেক ৫ পল, শতমূলী ১৫ পল, বায়ুনহাটী ১০ পল, গোক্ষুবী পিপ্পলী-মূল প্রত্যেক ১ পল, পাকল ছাল ৩ পল এই সমুদয় কুটিয়া ৩২ সের জলে সিদ্ধ করিবে এবং ৮ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয় তাহাতে পুৰাতন গুড় ১০ পল, মৃত ৫ পল ও দুগ্ধ ১০ পল দিয়া পাক করিবে ঘন হইলে কঁকড়াশৃঙ্গী ২ তোলা, জায়ফল ৩ তোলা, তেজপত্র ৩ তোলা, এবঙ্গ ৪ তোলা, বংশলোচন ৪ তোলা, গুড়তক ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা, কুড় ৪ তোলা, শুষ্টি ৭ তোলা, পিপ্পলী ৮ তোলা, তালীশপত্র ৩ তোলা, জয়িতী ১ তোলা, এই সমস্ত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু ১ পল মিশ্রিত করিবে মাত্রা ২ তোলা কাঠবিড়ালের মাংস চূর্ণ ১ ভাগ ও সবিচচূর্ণ ৪ ভাগ একত্রে ম ডিয়া ৩ মাংস পরিমাণ বটী করিবে ঔষধ সেবনের পবেই ইহাৰ একটী বটিকা চর্কণ করিয় জলপান করিবে অন্তাবে ঔষধ দুগ্ধের সহিত সেবা

ক্ষুদ্র শ্বাসের লক্ষণ —কক্ষ্ম জ্বর্য সেবন ও পবিত্রম জন্ত কোষ্ঠ-স্থিত বায়ু দূষিত হইয়া উর্দ্ধদিকে গমন করিয়া অগ্নি প্রকাশিত লক্ষণযুক্ত যে শ্বাসবোগ উৎপন্ন করে, তাহার নাম ক্ষুদ্র শ্বাস অগ্ন্যগ্ন শ্বাস যৈ প্রকার শব্দীবেব ক্লেশদায়ক, এই শ্বাস সেই প্রকার কষ্টপ্রদ নহে, অধিকন্তু ইহাতে ভোজনাদিব বাধা এবং শব্দীর কোন প্রকার গান্নি কি বেদনা জন্মায় না এই শ্বাস সাধ্য বলবান ব্যক্তিব অগ্নি লক্ষণযুক্ত সমুদয় শ্বাসই সাধ্য, কেহ কেহ বলেন, ক্ষুদ্র শ্বাস সাধ্য, তমক শ্বাস কৃষ্ণ সাধ্য ও মহাশ্বাস, উর্দ্ধশ্বাস, ছিন্নশ্বাস অসাধ্য দুর্বল ব্যক্তিব তমক শ্বাসও অসাধ্য

চিকিৎসা ।—পাণ্ড ২ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, এই উভয় জ্বর্য মৃত-

কুমারী বসে ১ মাস মাড়িয়া ৩ ভাগ পরিমিত তাম্রপাত্রে উহা দ্রাব্য
প্রলিণ্ড কবিয়া এক দিগম বালুকা যন্ত্রে পাক কবিবে । ঐ তাম্র উদ্ধৃত
কবিয়া চূর্ণ কবিবে । মাত্রা ২ বতি । ঔষধ সেবনেব পব রাখালশাখার
মূল, দেবদারু, ত্রিকটু, ইহাদেব কাথ চিনিব সহিত সেবন কবিবে । ইহাব
নাম “সূর্য্যাবর্ত বস” ।

কলকাসন — পাখ, পত্র, মূল ও ফলসহ পেষিত ধুস্তুর ৪ পল,
বাসক মূলেব ছাল ৪ পল, যষ্টিমধু, পিপ্পলী, কটকাবী, নাগেশ্বর, শুঠ,
বামুনহাটী, তালিণপত্র, প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল, ধাইফুল ১৬ সেব, ত্রাঙ্গা ২০
পল, জল ১২৮ সেব, মধু ৬ ০ সেব । এই সমস্ত উত্তমরূপে মিশ্রিত কবিয়া
অস্থিত পাত্রে ১ মাস বাখিয়া অবশেষ ছাঁকিয়া লইবে । মাত্রা ২ তোলা ।

হিকা শ্বাসের আশু মারকজ্ঞ বর্ণন — প্রাণনাশী অনেক বোগ
থাকিলেও তাহাবা হিকা ও শ্বাসেব আশু শীঘ্র প্রাণনাশ কবে না ।

স্বরভেদেব নিদান ও সংপ্রাতি । — উচ্চৈঃস্ববে কথা কওয়া,
অধ্যয়ন কবা, বিষপান, কঠদেশে মুদ্রাবাদি আঘাত, এই সমস্ত কাবণে
অকুপিত বায়ু স্ববৎ প্রেতে প্রবেশ কবিয়া স্বরভেদ বোগ জন্মায়
ইহা ছয় প্রকার, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, মেদজ, ক্ষয়জ

বাতজ স্বরভেদের লক্ষণ — বাতজ স্বরভেদে চক্ষু, মুখ, মল,
মূত্র কৃষ্ণ বর্ণ হয় এবং স্বর গর্দভেব ন্যায় কর্কশ হয়

চিকিৎসা । চই, অন্নবেতস, ত্রিকটু, তিত্তিডী, তালীশপত্র,
জীবা, বংশলোচন, চিতামূল, ওড়ক, তেজপত্র, এলাইচ, এই সমুদয় দ্রব্য
সমভাগে লইয়া পুরাতন ওড়েব সহিত মাড়িয়া সেবন কবিবে

কুলপাতা মৈন্ধব লবণেব সহিত ঘূতে ভাজিয়া খাইবে ।

বনযমানী, ছরিদ্র, আমলকী, যবক্ষর, চিতামূল ইহাদেব চূর্ণ সমভাগ
ঘূত ও মধু সহিত লেহন কবিবে । ইহাব নাম “চব্যাদি চূর্ণ”

পিত্তজ স্বরভেদের লক্ষণ । পিত্তজ স্বরভেদে চক্ষু, মুখ, মল,
মূত্র পীতবর্ণ এবং কথা কহিবাব সময় গলদেশ জ্বালা কবে

চিকিৎসা । — মূল এবং পত্র সহিত ত্রাঙ্গী শাক জলে ধোত কবিয়া
উদ্বৃথলে পেষণ কবিয়া তাহাব বস বাহিব কবিয়া লইবে । এই বস ১৬ সেব,

ঘুত ৪ সের, কল্কার্থ হবিজা, মালতী পুষ্প, তেউড়ীমূল, হবীতকী প্রত্যেক ১ পল, পিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, চিনি, বচ, প্রত্যেক ২ তোলা যুজ্জ্বলিত পাক কবিবে ইহার নাম “ব্রহ্মীঘুত ”

ক্ষুদ্রপ্রায়োগ ।—ব্রাহ্মীবস : তোলা, মিছবি ০ আনা একএ কবিয়া ভক্ষণ

কফজ্বরশ্রভেদের লক্ষণঃ কফজ্বরশ্রভেদে সর্বদাই বোগীব কণ্ঠদেশে শ্লেষ্মাযুক্ত থাকে দিবসে কফের অগ্নিতা প্রযুক্ত অগ্নি বথা কহিতে পাবে রাত্রিতে শ্বর বোধ হয়

চিকিৎসা ।—উত্তমরূপে জাবিত অত্র ১ পল লইয়া কণ্টকাবী, বেড়েলা, গোক্ষুব, ঝুতকুমাবী, পিপ্পলীমূল, ভৃঙ্গবাজ, নামক, কুলপত্র, আমলা, হবিদা, গুলঞ্চ, প্রত্যেকে ১ পল পবিমিত রসে পৃথক পৃথক মাড়িয়া লইবে বটিকা ব পবিমাণ ১ বতি ইহার নাম “ত্র্যম্বকাজি ।”

ক্ষুদ্র প্রায়োগ —শেফালিকা ছালের রস ১ তোলা, আদাব বস ১ তোলা একত্রে ভক্ষণ ।

পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, মবিচ, শুষ্ঠী, এই সমুদয় প্রব্য সমভাগে চূর্ণ কবিয়া গোমুত্রের সহিত সেবন

ত্রিদোষজ্বরশ্রভেদের লক্ষণঃ ।—ত্রিদোষজ্বরশ্রভেদে পূর্বেক্ত বাতাদিব সমস্ত লক্ষণ জন্মে এই শ্রভেদ অসাধ্য

চিকিৎসা ।—হবিজা, বচ, কুড, পিপ্পলী, শুষ্ঠী, যমানী, জীবা, যক্ষী-মধু, সৈন্ধব, লৌহ, অত্র প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা । কিঞ্চিৎ ঘূতের সহিত সর্বদা লেহন কবিবে। ইহার নাম “কল্যাণলেহ”

ক্ষয়শ্রভেদের লক্ষণ ।—ধাতুজনিত শ্রভেদে কথা কহিবাব সময় কণ্ঠদেশে বেদনা বোধ হয় ও ধূম নির্গমনের ব্যাধি বোধ হয়, বাক্যের অগ্নিতা হয় ; বাকবোধ হইলে এই শ্রভেদ অসাধ্য

চিকিৎসা ।—গব্য ঘূত ৪ সের কণ্টকাবীর রস ১৬ সের কল্কার্থ বাস্মা, বেড়েলা, গোক্ষুব, ত্রিকটু মিলিত ১ সের কাঁচা কণ্টকাবীর অভাবে শুষ্ক কণ্টকারী ৮ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ কবিয়া ১৬ সের প্রাকৃতিতে নামাইয়া ঐ কাঁথের দ্বাবাই ঘূত পাক কবিবে মাত্রা ২ তোলা

মেদজ স্বরভেদেব লক্ষণঃ মেদেজ স্বরভেদে বোগীব বাক্য
কঠিন হইয়া থাকে, অর্থাৎ কথা স্পষ্ট বুঝা যায় না কক বা মেদ দ্রাব
* গলদেশ জড়িত থাকে এবং পিপাসা হয়

চিকিৎসা ককজ স্বরভেদেব চিকিৎসার ন্যায়

স্বরভেদেব অসাধ্য লক্ষণঃ দুঃস্বপ্ন, হৃদ্ধ এবং গুণ ব্যক্তিব
বয়স্ককালোক্ত ও ও জন্মাবধি জাত স্বরভেদ অসাধ্য। অতিশয় মেধযুক্ত
ব্যক্তিব স্বরভেদ এবং ত্রিদে বজ্র স্বরভেদ অসাধ্য

বাজযক্ষ্মার কারণ নিরূপণ বাত যুত্র ও পৃথীয়েব বেগবোধ
ধাতুক্ষয়, অত্যন্ত সাহস, এবং বিষম অনশন, এই চতুর্বিধ কারণে ত্রিদেব-
জন্মিত যক্ষ্মা বোগ জন্মে

বিষয়টি সংগ্রাহিত নিরূপণঃ —মল্লযোব কফপ্রধান দোষে রস-
বহ ধর্মী সকল কক্ষ হইলে এবং অতিশয় মৈথুনকাবী ব্যক্তিব শুক্রক্ষয়
হইলে অন্যান্য ধাতু সালও ক্ষয় হয়, সূত্রবাং সেই মল্লযা শুদ্ধ হইতে
থাকে ।

পূর্বরূপ । ক্ষয় বোগ জন্মিবাব পূর্বে শ্বাস, অঙ্গবেদনা, মুখ
হইতে কফপ্রাব, কাস, নিদ্রা ও চক্ষুব শুষ্কতা হয় কক্ষ ব্যক্তি মাংস-
ভোজনেচ্ছু ও বমনাভিলাষী হইয়া থাকে* অধিকন্তু বোগী যেন কাক,
শুক, শল্লকী ময়ূর, গৃধ, কপি, কুকলাসাদিগকে বহন করিতেছে এইকপ
অপ্ন দর্শন করে এবং জলবহিত নদী, ব যু, ধূম ও দাবাগ্নিপীড়িত বৃক্ষ
সমূহ তাহার দৃষ্টিপথে অধিকা হয়

সাধারণ লক্ষণঃ —স্কন্ধ ও পদদেশে অভিতাপযুক্ত, হস্তপদে
বিশেষরূপে সত্তাপ, সর্বকালীয় জ্বর, এই সকল বাজযক্ষ্মার সাধাবণ
লক্ষণ, ভোজেব মতে কাস, জ্বর, বক্রপিও এই তিনটি উহাব লক্ষণ

বাতাদিভেদে লক্ষণ বাতাদিক্য বাজযক্ষ্মা হইলে স্বরভেদ,
শূল, অংগ ও পার্শ্বের সঙ্কোচ হয় পিত্তাদিক্য বাজযক্ষ্মা হইলে জ্বর,
দাহ, অতীসার ও রক্তপ্রাব হয় । শ্লেষ্মাদিক্য বাজযক্ষ্মা হইলে মস্তকেব
পরিপূর্ণতা, অকচি, কাস কঠিন এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়

চিকিৎসা —পাবা ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা,

মুণ্ডাভ্য ২ তোলা, মোহাগ ২ মাসা। এই সমস্ত কাঞ্জিতে পোষণ করিব
গোলাকার করিবে শুষ্ক করিয়া মুম্ব মধ্যে রাখিয়া লবণযুক্ত পাক
করিবে ১০ মাত্র ৪ বতি মধু কিম্ব পিপ্পলী চূর্ণের সহিত সেব্য
পথ্য। নম্বু মাংসের মুম্ব, ছাগদধি, ১ বা ৩ ক, ছাগমাংস ও মৃতপদ ব্যঞ্জন
নাদি অধিক আবে জবা, বেগুন, তৈল, নিম্ব ও উল্লেভ ভক্ষণ নিষেধ
ক্রাসংসর্গ একবারে ত্যাগ করিবে কোষ দিও ত্যাগ কর কর্তব্য।
ইহার নাম 'মুগাণ্ড' বস

যক্ষ্মাশ্রুত লোহ বাস, তালীশপত্র বপূর্ব, খুলকুড়ি, শিল্পা-
জতু, ত্রিকটু নিফল, নিডল মুম্ব চিত্রাণু, ৫ ভোকে ১ ভাগ, সমুদয়েন
সমান লোহ ওকএ ম দিবে

রাজযক্ষ্মার পোত্রাখ্যয়তা। বেগী বতপিত্তকঃশূক উক
একাদশ প্রকার লক্ষণযুক্ত অথবা কাশ, অতীস ব, পীথবেদন, শ্বশ্বেদ
অকচি, জ্বর, এই ছয় লক্ষণ যুক্ত ব বাস, শ্বাস ও বতাগম এই
তিন প্রকার লক্ষণযুক্তই হউক, মাংসাদি ও বলক্ষয় হইলে বাশেজু বৈদ্য
উক্ত বোগীকে ত্যাগ করিবেন উক্ত একাদশ, ছয় অথবা তিন প্রকার
লক্ষণাক্রান্ত বেগীর মাংস বহাদি ক্ষয় হইলে ত্যজ্য, কিন্তু মাংস বলাদি
ক্ষয় না হইয়া সমস্ত লক্ষণযুক্ত হইলেও চিকিৎসা সে বোগী অতি-
ভোজী অথচ ক্ষীণ অতীস ব পীড়িত এবং যাহাব কে য ও উদবে শে য
হইবে, চিকিৎসক তাহাকে ত্যাগ করিবেন

রাজযক্ষ্মার অসাধ্য লক্ষণ শুক চক্ষু, অকচিযুক্ত, উল্লম্বা-
পীড়িত, কষ্টে রক্ত প্রস্রাবশীল বোগীকে যক্ষ্মা বৈ কবে

চিকিৎসা।—পাচ ৩ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র
১ তোলা, মনঃশিলা ২ তোলা, হরিতাল ২ তোলা, এই সমস্ত একত্র
মাড়িয়া বড় বড় কড়ির মধ্যে পুরিবে এবং মোহাগ ছাগজু পোষণ
করিয়া তাহার দ্বারা কড়ির মুখ বন্ধ করিয়া লেপ দিবে, শুকান্তলে গন্ধ
পুটে পাক করিয়া নীতন হইলে ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে ১০ মাত্র ৪ বতি
অল্পপান মৃত ও মধু। পিপ্পলী ব মনিচ চূর্ণের সহিত সেবন করিবে।
ইহার নাম "রাজমুগাণ্ড বস"

শিলাযত্যাতি লৌহ ।—শিলাজতু, যষ্টিমধু, ত্রিকটু, স্বর্ণমাস্কিক, প্রত্যেক সমভাগ, সকলেব সমান লৌহ, একত্রে মাড়িবে দুগ্ধেব সহিত সেবন কবিবে ।

ব্যবয়াদিজনিত ধাতুশোষ ।—অতিশয় ব্যবয়, অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ, শোক, বার্কক্য, পবিত্রম, অতিশয় পথগমনজন্য শোষ এবং ব্রণাক্ত জন্য ও উষ্ণকৃত জন্য শোষের ক্ষয়েব লক্ষণ বলা যাইতেছে ।

ব্যবয় শোষের লক্ষণ —যে ব্যক্তিব অতি মৈথুন জন্য শোষ অর্থাৎ ক্ষয় হয়, সে শুক্রক্ষয়জনিত লক্ষণাক্রান্ত হয়, অর্থাৎ তাহার শিশ্ন ও কোষে বেদনা হয়, মৈথুনে আশক্তি জন্মে, মৈথুন কবিগে বহুকালে শুক্র নির্গত হয় এবং উহাতে অল্প পরিমাণে রক্ত মিশ্রিত থাকে, তাহার শবীর পাণ্ডুবর্ণ ও শুক্রাদি ধাতুর উত্তর উত্তর ক্ষয় হয়

চিকিৎসা —স্বর্ণমাস্কিক, বিড়ঙ্গ, শিলাজতু, হরীতকী, লৌহ, এই সমুদয় দ্রুত ও মধুযুক্ত কবিয়া লেহন কবিবে

কল্যাণসুন্দরাত্র ।—জাবা অত্র ১ পল, আমলা, মুখা, বৃহতী, শতমূলী, ইক্ষু, বিল্বপত্র, গনিয়বী পত্র, বাসক পত্র, কটকবী, সেল পাক, বেড়েলা প্রত্যেকেব ১ পল, পবিমিত জলে পৃথক পৃথক মাড়িয়া ১ রতি বটী কবিবে

শোকজ শোষের লক্ষণ —শোকজন্য শোষে অতি চিন্তা-শীলতা, অঙ্গনিথিতা ও শুক্রক্ষয় জন্য শোষের অন্য লক্ষণ সমুদয় উপস্থিত হয়

চিকিৎসা —ছাগদ্রুত ৪ সের, ছাগবিষ্ঠাব বসন্ত ৪ সের, ছাগমূত্র ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের, ছাগদধি ৪ সের, একত্র পাক কবিয়া যবক্ষার চূর্ণ ১ সের প্রক্ষেপ দিয়া নার্মাইবে মাত্রা ১ তোলা; ছাগনাংস ভক্ষণ, ছাগদুগ্ধ পান, চিনিব সহিত ছাগদ্রুত পান, ছাগসেবা, ছাগমধ্যে গমন অত্যন্ত উপকারক, ইহার নাম “অজাপক্ক দ্রুত ”

কাঞ্চণাত্র রস —স্বর্ণ, বসসিদ্ধব, মুক্তা, লৌহ, অত্র, প্রবাল, হরিতকী বোপ্য, হৃগনাভি, মনছাল প্রত্যেক সমভাগ জলে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটী কবিবে, দোষানুসারে অনুপান ব্যবহেয় ।

বার্দ্ধক্যজ শোষের লক্ষণ । যাছার বয়োধিকতা প্রযুক্ত শোষ হয়, সে ক্ষীণ, কর্ণাক্ষম, অস্পর্শ, দুর্বল, ইন্দ্রিয়শক্তির অপ্ৰাপ্ততা, কম্প ও অকচিযুক্ত হয় এবং ভগ্ন কঁাসাব আঘাত কবিলে যেকপ শব্দ হয়, বোগীর অর তক্রপ হয় কাশি-হইতে থাকে কিন্তু কিছুই নির্গত হয় ন। নবী-বেব ওকতা, মুখ, নাসিকাস্চক্ষু হইতে জলজাব, মন উৎসাহ শূন্য এবং বর্ণ কম্প হয়

চিকিৎসা ।—বস্মিস্ফব ১ তে'ল, স্বর্ণ ১০ তে'ল, গন্ধক ১ তে'ল, এই সমুদয় দ্রব্য চিতাব বসে ও স্বতকুমারীর রসে ১ প্রহর ও ছাগছন্ধে ৩ প্রহর মাড়িয়া তাহার সহিত প্রবাল, যুক্তা, বঙ্গ প্রত্যেকে ১ তোলা পরিমাণে মিশাইয়া মাড়িয়া চক্রাকার করিবে, পবে ঐ চক্রসকল বন্ধ যুগ্ম গজপুটে পাক করিবে, শীতল হইলে ঔষধ তুলিবে। অমুপান মধু ও ছাগছন্ধ । ইহাব নাম 'চুডামনি বস' "

বৃহদ্রসেন্দ্র গুড়িকা ।—পাবা ৪ তোলা, স্বতকুমারীর বস, ত্রিফলা চূর্ণ, চিতার রস, রাই সবিসা চূর্ণ, বুল, হবিজা, ইটকচূর্ণ, ধুতুবা পাতার বস এবং আদাব বসে পৃথক পৃথক মাড়িয়া মোট কাপড়ে ছাকিয়া লইবে। পবে জয়ন্তী, কানছিঁড়া, কাকমাটী ইহাদেব প্রত্যেকের রসে ভাবনা দিয়া ও শুষ্ক করিয়া পশ্চাৎ ভৃগুবাজ রসে শোধিত গন্ধক ১ পল, গরিচ, মোহাগা স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে, হবিতাল, অত্র প্রত্যেক ৩ তোলা, সমুদয় আদাব বসে মাড়িয়া ২ বতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অমুপান আদাব রস ঔষধ সেবনের পব ছন্ধ ও মাংসের যুগ পান করা উচিত

অধ্বজ শোষের লক্ষণ ।—যাছাব অতিশয় পথগমনজন্ত শোষ হয়, সে হস্তপাদাদি চালনে অক্ষম, শরীর কম্প, স্পর্শজানহীনতা, পিপাসা-হান, গলা ও মুখ শুষ্ক হয়

চিকিৎসা ।—তিল তৈল ১৬ সেব দ্ব্যর্থ—বক্তচন্দ্রম, শালপানি, ংকুলে, কণ্টকাবী, বৃহতী, গোক্ষুর, যুষ্ঠা, ভূমি কুম্ভাণ্ড, অশ্বগন্ধা, ায়ানি, আমলা, শিবীষছাণ, পদ্মকাষ্ঠ, বৈণাবমূল, সবলকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, গন্ধভাঙ্কলে, মুর্ধামূল ত্রিষঙ্গু নীলোৎপল, বাল, বেডেলা, গৌবক্ষচাকুলে, য়াণ, পত্রমূল, সমুদয়ে ৫০ পল, শ্বেত বেঁড়েলা ৫০

পল, পাকার্থ জল ৬৪ সেব,শেষ ১৬ সেব ; ছাগদুগ্ধ, শতমূলীব বস,লক্ষাব জল বা কাথ, কাঁজি, দধির মাথ প্রত্যেক ১৬ সেব , হবিং, ছাগ, শশক, প্রত্যেকেব মাংস ৮সেব । প্রত্যেকেব পাকার্থ জল ৬৪সেব,শেষ ১৬ সেব, কাথ পৃথক পৃথক কবিবে কল্কার্থ—শ্বেতচন্দন, অগুরু, কাঁকড়া, নখী, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, গুড়ত্বক, যুগ্মল, হরিদ্রা, দাক হরিদ্রা, শৃঙ্গারলতা, তনুতুল, বক্তোৎপল, ওগবপাতুক, কুড়, ত্রিফলা, পল্লবফল, মুর্খামূল, গোটেল, নালুকা, দেবদাক, সবলকাঠ, পদ্মকাঠ, বেণাবমূল, ধাইফুল, বেলগুঁঠ, বসোতা, মুখা, শিলাবস, বালা, বচ, মঞ্জিষ্ঠ, লোধ, গোবী, জীবন্তী, প্রিয়ঙ্গু, শঠি, এলাইচ, কুম্ কুম্, খাটানী, পদ্মকেশব, ব্রাহ্মা, জৈত্রী, গুঁঠ, ধন্থা, প্রত্যেক ৪ তোলা ; গন্ধদ্রব্য জটামাংসী, সুবামাংসী, দনা,চম্পকপুষ্প,প্রিয়ঙ্গু, গুড়ত্বক, গোটেল, বালা, কুড়,মকরক পুষ্প,পিড়িংশাক সমুদয় মিলিও ২ পল এবং গন্ধকবিবজা, কুম্ভব:খাটী, নখী, নালুকা,শুল্ক প্রত্যেক ১ পল,এলাইচ,লবঙ্গ, শিলাবস, শ্বেতচন্দন, জাতীপুষ্প, খাটানী, কাঁকড়া, অগুরু, লত কস্তুরী, কুম্কুম প্রত্যেক ৪ তোলা , য়নাভি ২ তোলা, কপূর্ব ১ তোলা পাকান্তে তৈল ছাঁকিয়া নামাইবে ইহাব নাম “মহাচন্দনাদি তৈল ।”

দ্রাক্ষারিফট —জাঙ্গা ৬ ০ সেব, পাকার্থ জল ১২৮ সেব,শেষ ৩২ সেব । এই কাথে ১৫ সেব গুড়-মিশাইয়া তাহাতে গুড়ত্বক, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু হবিং,পিপ্পলী, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ পল পরি মাল দিয়া মাড়িয়া ষতভাণ্ডে ১ মাস মুখ বন্ধ কবিয়া রাখিবে উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইবে

ব্যায়াম শোষের লক্ষণ — ব্যায়াম শোষের অধ শোষের সমস্ত লক্ষণ বলবানরূপে প্রকাশিত হয় এবং ক্ষত ভিন্ন উৎকৃষ্ট জন্তু শোষের সমুদয় লক্ষণ প্রকাশিত হয়

চিকিৎসা — উত্তমরূপে ভ্রূষীকৃত স্বর্ণ ১ ভাগ,বসমিস্থব ০ ভাগ, মুক্ত ভ্রূষ ৩ ভাগ, গন্ধক ৪ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৫ ভাগ, প্রবাল ৭ ভাগ, মোহাগার খই ২ভাগ,সমুদয় টাবা লেবুব বসে তিন দিন মাড়িয়া গোলাকাব কবিবে এবং তাহা রৌদ্রে শুক কবিয়া মুখা য়ধ্যে লবণ যত্নে মাক

কবিবে নীতল^{*} হইলে তুলিয়া তাহার সহিত হীৰক অভাবে
কৈক্রান্ত ১ ভাগ মিশ্রিত কবিয় মাড়িয়া লইবে মাত্র ২ রতি, অল্পপান
মুতমিশ্রিত মবিচ বা পিপ্পলী চূর্ণ এই ঔষধ সেবন কবিলে স্বতাদি
বলকব জ্বর্য আহাব কবা উচিত ইহার নাম 'মহা যুগাঙ্গবস' "

রত্নগর্ভ পট্টলী বস । বসসিদ্ধর হীৰক, স্বর্ণ, বৌপা, সীসা,
লৌহ, ভাঙ্গ, মুক্তা, স্বর্ণমাস্কিক, প্রবাস, "জ্ঞাভঙ্গ, এই সমস্ত ৭ দিন আদাব
বসে মাড়িয়া ও চূর্ণ কবিয়া কড়িব ভিতর প্রবেশ কবাইবে কিঞ্চিৎ
সোহাগা আকন্দআটায় পেষণ কবিয়া ইহার কড়িব মুখ বন্ধ কবিবে।
যুক্তিকাভাণ্ডে বাখিয়া উহার মুখ বন্ধ কবত আৱত কবিয়া গজপুটে পাক
কবিবে নীতল^{*} হইলে তুলিয়া চূর্ণ কবিবে নিমিদ্ধাব বসে ৭ দাব,
আদাব বসে ৭ বাব ও চিতাব বসে ২১ বাব ভাঙ্গনা দিয়া শুষ্ক কবিবে
মাত্রা ৪ রতি । মধু ও পিপ্পলী চূর্ণের সহিত সেবনীয়

ত্রৈজনিত শোষের লক্ষণ —ত্রণযুক্ত ব্যতির ত্রঃ হইতে বক্ত-
ক্ষয়, ত্রণের বেদনা ও আহারযজ্ঞনা এই তিন কাবণে যে শোষ অর্থাৎ
ক্ষয়বোগ হয় তাহা অসাধ্য

চিকিৎসা । ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাইচ, জায়ফল, লবঙ্গ প্রত্যেক
১ তোলা, ৯ তোলা লৌহ, ছাগছন্ধে পেষণ কবিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী
কবিবে অল্পপান মধু ইহার নাম 'ক্ষয়কেশবী' "

বিন্ধ্যবাসি যোগ ত্রিকটু, শতমূলী, ত্রিফলা, বেডেলা, শ্বেত
বেডেলা, প্রত্যেক ১ তোলা, ৯ তোলা লৌহ একত্র মাড়িয়া লইবে ।

হোমিওপ্যাথিকে কাশাদি চিকিৎসা।

সর্দি —শীতল অথবা ভিজা ভূমিতে বাস, কিম্বা সহসা বায়ু পরিবর্তনহেতু সর্দি হইয়া থাকে।

লক্ষণ —প্রথমতঃ শীতানুভব, কম্পা, পরক্ষণে জ্বরের অন্ত্যন্ত লক্ষণ সহকারে উত্তাপ, মস্তকেব সন্মুখভাগ ভাব এবং চাপবোধ, নাসা বন্ধবৎ, অবিণাত্ত জলপাত ও হাঁচি

চিকিৎসা। —নাস বন্ধ ও শুষ্ক, অনববর্ত জল পড়ার জন্য ওষ্ঠ ক্ষতযুক্ত, আবদ্ধ, ক্ষীত, হাঁচি এবং নাসিকা চাপ ও ভাববোধ-হইলে আবেগ্য না হওয়া পর্যন্ত তিনটি ক্ষুদ্র বটী অথবা একটি বৃহৎ বটী কিম্বা এক ফোটা ‘মার্কিউবিয়াস্’ প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে

মস্তিকেব সন্মুখভাগ ভাববোধ ও বেদনায়ুক্ত, নাসিকার একটি রক্ত বন্ধ ও আর এক বন্ধ হইতে জলপাত, প্রচুব শ্বেদা নির্গম, ঘর্ষ, তৃষ্ণা, ও নাতিশয় ক্ষুধা হইলে পূর্বেকৃত প্রকারে “বেলেডোনা” প্রয়োগ করিবে

কাশি। কঠ কিম্বা বন্ধেব প্রদাহ জন্য এই ব্যাধি উৎপন্ন হয় ইহাতে সদা সর্বক্ষণ এবং অতি কষ্টকর কাশি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ প্রদাহিত কঠ এবং টানযুক্ত ইউতুলা হইতে উৎপন্ন হয়, এজন্য কঠ পরীক্ষা আবশ্যক।

চিকিৎসা —সর্দি এবং নৈত্যজ্ঞাত কশ্মি, তদ্বিকল্পে হেমযুক্ত হাঁপানী, কাশিবাব সময় দীর্ঘশ্বাস টানিতে বক্ষঃস্থলে চাপবোধ হইলে বোগোপশম না হওয়া পর্যন্ত “ডাল্‌কামাবা” ক্ষুদ্র তিনটি বটী অথবা একটি বৃহৎ বটী, কিম্বা এক ফোটা আবক ২৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে

সন্ধ্যার সময় কিম্বা রাতিতে ওক খুক খুক কবিয়া কাশি ও তৎসহ

হোমিওপ্যাথিকে কাশাদি চিকিৎসা । ২৬৫

আক্রমণ থাকিলে, অতি অল্প চালনাতেও কাশিব উদ্বেক, কণ্ঠনালীতে স্ফুটস্ফুটানি অনুভব হওয়া প্রযুক্ত কাশিব বৃদ্ধি এবং কাশিবাব সময় শিবঃপীড়া ও মুখ রক্তিম বর্ণ হইলে উপবোক্ত প্রকারে “বেলেডোনা” প্রয়োগ করিবে।

গুরুতর কম্পাবিশিষ্ট কাশিতে, কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাসে শ্বাস একত্রিত হওয়ায় শ্বাস তীব্রবোধে তীব্র জন্মিলে এবং বস শ্বাস ত্যাগ কঁবা কষ্টকর, মুখমণ্ডল শ্বেতাভ এবং বমন থাকিলে, উপরোক্তরূপে ডাম্-কাশাবাব ছায় “ইপিক্যাকুয়ানহা” দিবে।

শীতকালেব কাশিতে, বায়ু তাপের পবিবর্তন জন্ত কাশিতে, এবং পান ও আহারের পব কাশিতে পূর্ববৎ “বাইওনীয়া” সেবন করাইবে।

রাত্রিকালে শিশুদেব কাশি বৃদ্ধি, অতিশয় ক্রন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাসে ফৌস্ ফৌস্ শব্দ থাকিলে “ক্যামোমিলা” দিবে।

মাত্রা।—হুইটী, স্কুড্র অথবা অর্ধটী বড় বটী উপশম না হওয়া পর্যন্ত ২ ও ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

শুক কাশিতে শ্বাসবোধ, বমন হইবার পব মুচ্ছা, হাঁপানি কাশিব ছায় শ্বাস ফেলিতে কষ্ট এবং শব্দী ব দুর্বল হইলে “ভেবেট্রাম” ব্যবস্থা করিবে।

দীর্ঘকাল স্থায়ী কাশি, বিশেষতঃ ফুস্ফুসেব কোন বোগেব সহিত সংজ্ঞাব থাকিলে, বুক টানবোধ ও বেদনায়ুক্ত হইলে “ফস্ফরস্” দিবে।

শ্বাসকাস —এই রোগ যাব পব নাই কষ্টদায়ক। ইহাব যাতনায় রোগী অস্থির হইয়া ২ ও দিন এক অবস্থাতেই থাকে, শ্বাসকষ্ট ক্রমশঃ অল্প অল্প কমিয়া তাইসে।

লক্ষণ।—কষ্টকর নিশ্বাস এই বোগেব লক্ষণ। এই বোগেব নির্দিষ্ট কাল নাই। নিশ্বাস ফেলিবার সময় বক্ষঃস্থল কোঁকড়ানি বোধ, কাশি, এবং পবে শ্বাস নির্গম হয়। কোন কোন অবস্থায় শীত শীত এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া মুখ স্ফীত ও নীলবর্ণ হইয়া পড়ে মুখে উদ্ভি-গতা ও ক্রেশের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কোন কোন স্থলে ক্রান্তি, পেটফাঁপা, শিবঃপীড়া, পাকস্থলী অসুস্থ, নির্জীব ভাব প্রভৃতি পূর্ববর্তী লক্ষণ।

চিকিৎসা ।—নিদ্রাকালে মুচ্ছা, নীত্র নীত্র শ্বাস প্রশ্বাস ও কষ্টকর ই গানি, বক্ষঃস্থলেব অভ্যন্তবে সাঁ সাঁ ও বাঁ বাঁ শব্দ, অতিশয় উদ্বেগ ও মুখ অপবিকৃত থাকিলে ‘ইপিক্যাকুয়ামহা’ তিনটী ক্ষুদ্র বা একটী বড় বটী অথবা এক বিন্দু আবক এক কাঁচা জলেব সহিত আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত আবশ্যকমত এক বা অধিক ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ কবিবে ।

উহাতে উপকার না দর্শিলে বিশেষতঃ বুক চাপা, নিশ্বাসকষ্ট, দৌর্বল্য, ঘর্ষ ও বক্ষঃস্থলেব ভিতর জ্বালা থাকিলে পূর্বোক্ত প্রকারে ‘আর্শেনিক’ ব্যবস্থা কবিবে ।

কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস এবং বক্ষঃস্থল চাপবোধ থাকিলে উপবোক্ত প্রকারে ‘ফস্ফবস্’ দিবে ।

সর্দি কিম্বা ফ্রুপিণ্ডেব অগ্নাত বোগেব সঙ্গে এই শ্বাস ক্লেশ থাকিলে শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর, পবিশ্রমে বোগেব বৃদ্ধি, বাত্রিতে বোগীব অবস্থা মন্দ এবং বক্ষে চাপবোধ হইলে পূর্বের নিয়মমত ‘ব্রাইওনীয়া’ প্রয়োগ কবিবে ।

স্ববভঙ্গ । কঠিনাশীতে ক্ষত, অথবা প্রবল কাশির জন্ম হইলে এবং বাত্রিকালে বোগেব আধিক্য থাকিলে, দিবসে তিনবার “বেলে-ডোনা” খাইতে দিবে ।

দৌর্বল্য এবং বক্ষে বেদনা থাকিলে বাজে ও প্রাতে “ফস্ফবস্” প্রয়োগ কবিবে ।

কঠিন এবং কাসাব শব্দেব স্থায় কাশি থাকিলে “হিপার সলুফার” বাত্রিকালে এবং প্রাতে প্রয়োগ করিবে । আবশ্যক হইলে তাহার পরে “স্পঞ্জিয়” দেওয়া কর্তব্য ।

অতিরিক্ত বাক্যব্যয় এবং গান কবিবার পব এই পীড়া হইলে “হেমা-মিলিশ” দিবসে তিনবার দিতে হইবে, এবং কুলি করিবার জন্ম দিতে হইবে ।

কঠিনালীর প্রদাহ —জলে ভিজা, শীতল বাতাস গায়ে লাগান, অকস্মাৎ উষ্ণ স্থান হইতে শীতল স্থানে আসা ইত্যাদি কারণে কঠ-

নালীতে শুষ্ক বেধনযুক্ত বেদনা, প্রদাহ এবং কষ্টকর যন্ত্রণা অনুভব হইতে থাকে ।

চিকিৎসা ।—পন্থ গিনিট অন্তর “গ্যাকোনাইট” প্রয়োগ, গবম জুলের বাষ্প নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ, এবং কণ্ঠনালীর উপরে তিসির পুন্টিশ প্রয়োগে যদি শীঘ্র উপকার না দর্শে, তবে “স্পঞ্জিয়া” “গ্যাকোনাইটেব” সহিত পর্যায়ক্রমে প্রথমে ১৫ মিনিট, পরে অর্ধ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিবে । ইহাতেও পীড়া শাস্তি না হইলে “ইপিক্যাকুয়ানহা” এবং “গ্যাকোনাইট” পর্যায়ক্রমে দিবে ।

কাশা ।—নীতল বাতাস গায়ে লাগাইবাব বা অন্য কোন প্রকারে শৈত্যানুভব করিবার পর কাশি হয়, তাহার সহিত খন শ্লেষ্মা প্রচুব পবিমাণে নির্গত হইতে থাকে, গলা মঁ মঁ কবে, শ্বাসকষ্ট, জ্বর, অস্থিবৃত্তা, এবং দৌর্বল্য ইত্যাদি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় । এরূপ অবস্থায় প্রকৃত কাশবোগ অনুমান করিতে হইবে ।

চিকিৎসা ।—প্রথমতঃ “ব্রাইওনিয়া” এবং “ইপিক্যাকুয়ানহা” এক ঘণ্টা অন্তর পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে ।

শ্লেষ্মা যখন গাঢ় হইতে থাকিবে, তখন “ব্রাইওনিয়া” এবং “পুস্ফেসে-টিল” প্রয়োগ করিবে ।

যদি শ্লেষ্মা ফেনায়ুক্ত হয় এবং তাহার বন্ধে টান এবং বেদনা অনুভব হয়, তবে “ব্রাইওনিয়া” এবং “ফুস্ফেস” দিবে ।

জ্বর বন্ধ হইলে কাশি এবং গলা মঁ মঁ নিব বন জন্য প্রতিদিন তিনবার “হিপ্পার সল্ফার” খাইতে দিবে ।

পথ্য ।—মাংসের কাথ, ঐন্ডেল, বার্লি, গবম জল, বিফ্টি, ব্ল্যাক্ টী, লিন্সিড্ ইত্যাদি ।

বন্ধস্থলে তিসির পুন্টিশ বাহ প্রয়োগ ব্যবস্থা করিতে হইবে ।

ফুস্ফুসের প্রদাহ ।—নীতল বাতাস লাগান অথবা অন্য কোন প্রকারে শৈত্যানুভব করিবারাত্র এই পীড়া অনেক সময় উপন্ন হইয়া থাকে । কস্প, জ্বরবোধ, বন্ধস্থলে টান এবং নিশ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট অনুভূত হইতে থাকে ; সামান্য কাশি, বিসর্গ শ্লেষ্মা, কথ্য কহিতে কষ্ট, মুখ রক্তিমাবর্ণ হয় ।

চিকিৎসা ।—কম্পব অব্যবহিত পবেই রোগীকে বিছাণায় শয়ন
করাইয়া প্রতি দশ মিনিট অন্তর “য়াকোনাইট” প্রয়োগ করিবে শ্বাস-
কষ্ট অধিকতর হইলে দুইবারেব পব একবার “কস্ফরাস্” দিবে

অব কমিলে যদি কাশিব বৃদ্ধি হয় এবং শ্বাসে হ্রাস হয়
তবে প্রতি ঘণ্টায় পর্যায়ক্রমে “ব্রাইওনিয়া” ব্যবহার করিবে

যদি মুখগুলা মলিনতর, শ্বাস প্রশ্বাস হাব পব নাই বৃষ্টদায়ক, এবং
বোগী অতিশয় দুর্বল হয়, তবে “য়ান্টিমর্টার্ট” এবং “আর্শেনিক”
প্রথমতঃ ১৫ মিনিট অন্তর, পরে অর্ধ ঘণ্টা অন্তর পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ
করিবে

রোগীকে স্থিরভাবে পরিকৃত শয্যায় রাখিবে, গৃহমধ্যে যাহাতে
নির্মল বায়ু সঞ্চালিত হয়, তাহাব উপায় করিবে, নৈশ ও শীতল বায়ু
এবং স্নিগ্ধ জব্য সেবন নিষেধ গবম চা এবং বিফ্টি খাইতে দিবে ।
ব্রিফ্টাব এবং পুন্টিশ দিবে না

প্লুরিসি —উপবোক্ত রোগেব লক্ষণগুলির অতিবিক্ত বাম অথবা
দক্ষিণ পার্শ্বে তীব্র বেদনা, ক্ষুদ্র এবং কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস, কম্পাশিরো-
বেদনা, অব এই বোগের প্রধান লক্ষণ

চিকিৎসা —প্রথমতঃ অর্ধ ঘণ্টা অন্তর “য়াকোনাইট” তাহাব
পব “ব্রাইওনিয়া” প্রয়োগ করিবে ।

অব বিচ্ছেদেব পব শ্বাস প্রশ্বাস আভাবিক হইলে, পার্শ্বেব বেদনার
জন্ত রাত্রিকালে এবং প্রাতে “মাকু’বিয়াস্” দিবে

পথ্য ।—কস্ফসের উত্তেজনা বোগে যেরূপ খাদ্য ব্যবস্থা হইয়াছে
ইহাতেও তদ্রূপ জানিতে হইবে ।

পার্শ্বে বেদনাব আবির্ভাব হইলে তাহার উপর ব্রিফ্টার দিবে ।

কণ্ঠমালীর ক্ষত ।—শীতাহুত্বেব লক্ষণেব সহিত গলাব কষ্ট-
দায়ক বেদনা, উত্তাপ, ক্ষত, শুষ্কতা, কোন জিনিষ গলাধঃ করিতে
কষ্টানুভব, ইত্যাদি ইহাব প্রধান লক্ষণ

চিকিৎসা ।—অব থাকিলে “য়াকোনাইট” তাহাব পব “বেলে-
ডোনা” দিতে হইবে ।

গীওব স্ফীতি কিম্বা দন্তমূলে স্ফীতি প্রসূক্ত প্রাণ্ডে এবং বাত্রিকালে “মাকুরিয়াম্” প্রয়োগ করিবে

ইহাতেও যদি উপকাৰ ন দর্শে এবং গলা উজ্জ্বল এবং প্রদাহযুক্ত হয়, তবে প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর “যাপিস্” দিতে হইবে।

কুইন্সি — উপরি লিখিত কঠিনালী ব ক্ষত বোগের সহিত এক বা উভয় টন্সিলেব বৃদ্ধি এবং প্রদাহ থাকিলে, তাহাকে কুইন্সি বলে। কঠিনালী ব ভিতর ও ইউতুলা লোহিতবর্ণ এবং স্ফীত হয়। প্রদাহ এবং স্ফীতি ক্রমশঃ যাইতে পাবে কিম্বা যে পর্যন্ত না পুষ সঞ্চিত হয়, সে পর্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে পাবে। এই দুই উপসর্গ বর্দ্ধিত হইলে শ্বাসকষ্ট এবং কোন দ্রব্য গলাধঃ করিতে বড় কষ্ট হয়

চিকিৎসা — প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর পর্যায়ক্রমে “বোলেডোনা” এবং “মাকুরিয়াম্” ব্যবস্থা করিবে

রাত্রিকালে গলার চতুর্দিকে দৈর্ঘ্য বন্ধনী রাখিয়া রাখিবে এবং গরম জলে এক চামচা সর্ষপ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেই জলে পা ডুবাইয়া এবং গাত্র বস্ত্রাবরণে আবৃত রাখিবে

পরীক্ষা দ্বারা যদি স্ফীততার বৃদ্ধি অনুমান হয়, তবে সর্বদা গরম জলের বাষ্প নিশ্বাস লইতে দিবে এবং “যাপিস্” ও “ছিপাব” খাইবার ব্যবস্থা করিবে। যতক্ষণ ফোড়াটি ফাটিয়া না যায়, ততক্ষণ এইরূপে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে

পুষ অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত এবং গাঢ় হইলে, কম তেজস্ব কণ্ঠিলোশন কুলি করিতে দিবে।

জলে ভিজিলে বা অন্ত্যন্ত শৈত্য লাগাইলে কুইন্সি হইয়া থাকে

ক্যান্সাব — এই পীড় যানপূর্বনাই, সংঘাতিক এবং ভীতিজনক। কেবল্যাবস্থার পর জীলোকেব প্রায়ই এই পীড়া হইতে দেখা যায়। বৃক্ষস্থলে বেদনা হইবাগাত্র কোন মতে উপেক্ষা করিবে ন

চিকিৎসা — অবস্থা বিবেচনায় “হাইড্রাস্টিস,” “আর্শেনিক,”

“কোনিয়াম,” “বোলেডোনা” এবং “গ্যালিফান” ব্যবহার করিবে

ছাঁকিমীমতে কাশাদি রোগ চিকিৎসা।

সর্দির কাশির চিকিৎসা।

অপ্প নীতান্নভব, সামান্য কাশি, কৈষং গাঞোযতা ইত্যাদি সর্দি
কাশির লক্ষণ

চিকিৎসা।—এই ব্যাধি রাত্রিকালে শুষ্ক খাদ্য গ্রহণ, গবম কাপড়
বাখা ইত্যাদি প্রতিকাবেই আরোগ্য হইতে পারে। যদি তাহাতে
না সারে তবে—

আদাব রস ০ ফোলা।

মধু ০ তোলা।

আদাব রস গবম করিয়া তাহাতে মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতে এবং
সন্ধ্যায় সেবন করিবে

অন্য উপায়।

দোবাবা মদ ০ পোয়া

লক্ষা মবিচের গুঁড়া ২০ মাসা।

হিঙ্গু ৮ মাসা

একত্র মিশ্রিত করিয়া ৩ দিন বাখিবে পরে ঐ মদিরা ছাঁকিয়া
প্রাত্যহ্ বাজে শয়নকালে অর্ধ ছটাক পরিমাণে খাইবে

অন্য উপায়।

আফিজি ১ মাসা।

হিঙ্গু ১ মাসা।

গোল মবিচ ২ মাসা

জলে মাড়িয়া ১৬টি বঁটা করিবে। আবার ন হওয়া পর্যন্ত প্রাতে
ও সন্ধ্যায় এক একটা বঁটা সেবন করিবে

শ্বাসকাশের বিবরণ — কাশি হয়, নিশ্বাস গ্রহণেব এবং পবিত্র্যাগেব সময় গলা সাঁই সাঁই কবে, বক্ষঃস্থলে টান বোধ হয়, নিশ্বাস জোবে চলে, কখন কখন শোষা নির্গত হইয়া থাকে .

উপায়

ধুতুবাব শুষ্ক পাঁতা চূর্ণ ৫ বৃত্তিকে এক ছিলিম তানাবেব সহিত মিশ্রিত কবিয়া তাহাব ধূম পান কবিত্তে দিবে

অন্য উপায় ।

সৈন্ধব লবণ এক তোলা ছোট মটবেব মত টুকুবা কবিয়া একটা নেকড়ায় বাঁধিয়া তাহাব চতুর্দিকে যুতিকাব প্রলেপ দিয়া অষ্ট গ্রহব আওনে পোড়াইবে ; যখন দেখিব যে, সেই লবণ নীলবর্ণ হইয়াছে, তখন তাহাকে নামাইয়া চূর্ণ কবিয়া ২ ধান ওজনে প্রতি দিন সেবন কবিলে সন্ধি উঠিবে, টান কমিবে এবং বোগী শাস্ত্যলাভ কবিবে ।

অন্য উপায় ।

তাম্বকেব গোড়ব উঁটা ৫ সেব । উত্তমরূপে দ্রব কবিয়া তাহাব ভস্মে ৫ সেব জল দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত কবিবে তাহাব পর ঐ মিশ্র দ্রব্যকে কাপড়ে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিবে এবং নীচে একটা পাত্র রাখিবে । যখন ঐ জল বিন্দু বিন্দু কবিয়া পাত্রে পড়িয়া নিঃশেষিত হইয়াছে বেধ হইবে, তখন সেই জল আশ্বে ফেলিতে থাকিবে, সাবধান যেন সমস্ত জল না নড়ে । জল ফুটাইয়া গেলে পাত্রেব নীচে লবণবৎ স্বেত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যাইবে তখন উত্তমরূপে শুকাইয়া উপরোক্ত সৈন্ধব লবণের পরিমাণে প্রতিদিন খাইতে দিবে ।

ক্ষয়কাশের লক্ষণ ।—বক্ষঃস্থলেব এক দিকে বা উভয় দিকে বেদনা ও কাশী হয় । প্রথমে ঐ কাশি শুষ্ক, পরে কাশিবাব সময় অধিক বেদনা হয়, অঙ্গ জ্বর হয়, রাত্রিকালে অধিক ঘর্ষ নির্গত হয়, শরীর শুষ্ক ও শীর্ণ হয় । এই বোগ নানা প্রকার কোন কোন প্রকারে ৩ ৪ বৎসব পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে । যে সময় ফুস্ফুস অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া প্রযুক্ত নিশ্বাস উত্তমরূপে চলিতে না পারে, সে সময় মৃত্যু প্রাপ্ত হয় এই

বোগেব প্রথমাবধি উপযুক্ত চিকিৎসা হইলে বোগী বক্ষ পাইতে পাবে, কিন্তু বিনাশে চিকিৎসা আবস্ত করিলে প্রায়ই মারী গিয়া থাকে।

কারণ —এই বোগেব কাবন ভালরূপে অবগত হওয়া বড় কঠিন। বোধ হয় সর্দি হইতেই ইহাধ স্বভূপাত হইয়া ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে থাকে। নিম্ন ভূমিতে কিন্তু জলসিক্ত স্থানে এ পীড়াব প্রাদুর্ভাব বড় অধিক দেখা যায় ন। পার্বত্য প্রদেশে ই ইহা ব প্রধাণ্য প্রবলরূপে দৃষ্টিগোচর হয়।

চিকিৎসা —বায়ুপরিবর্তন জন্য যে দেশেব জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, সেই দেশে যাওয়া কর্তব্য। ঔষধেব জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আফিঙ্গ	...	১ মাস।
বেউচিনি	...	৪ মাস।
সাবান	...	২ মাস।

জলে মর্দন কুবিয়া ১৬ টী বটী প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ প্রাতে এবং সন্ধ্যায় এক একটী বটী সেবন করাইবে। কিন্তু ইহা ব সহিত—

তিসির বীজ	...	১০ ছটাক
গবম জল	...	১ সেব।

তিসির বীজ গবম জলে ১ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং পিপাসা হইলে এই জল খাইতে দিবে। ইহাতে যদি জ্বর অধিক হয় তবে, মোটা ১ বতিকে দুই তোলা আন্দাজ জলে ভিজ ইয়া খাওয়াইবে। দিসের মধ্যে একপো ৩-৪ বার খাইতে দিবে।

দশম অধ্যায়।

য্যালোপ্যায়িক হৃৎপিণ্ডের গীড়ার চিকিৎসা।

পেরিকার্ডাইটিস্ ব হার্ডক্ট প্রদাহ ইহাকে কোন কোন স্থানিক গীড়ার স্থানিক আবির্ভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে এবং বাত, মুত্রপিণ্ডের ত্রাইটিস্ ব্যাধি, পাইমাৰি ও স্কর্বি গীড়ার সহিত সচবাচব এই ব্যাধি হইতে দেখ যায়

লক্ষণঃ আঘাতের সময় মচর চব ইহাকে ব্যাধি বলিয়া অনুমান হইয়া না, কখন ব লক্ষণসকল প্রবলরূপে আবির্ভূত হয় প্রথমে সামান্য জ্বর ও বক্ষঃস্থলে সামান্য ভাববোধ হইয়া থাকে তদন্ত আর প্রবল জ্বর, হৃৎপিণ্ড বেদনা, স্বদ্রেক, তন্নিম্নে ও গণ্ডে ঐ বেদনার সঞ্চাব, প্রবল হৃদেপন, হৃৎপিণ্ডের গতির অনিশ্চয়তা ও দূর হইতে উহাৰ স্পষ্ট অনুভব, নাড়ীর বৈষম্য, ঘন ঘন শ্বাস পাতন, বামদিকে শ্বসন কবিত্তে অসমর্থতা, মুখমণ্ডলে উদ্বেগ, গলাধঃকরণে ক্লেশ, কর্ণে শব্দ, মস্তক দুর্গন্ধ, এবং নাগাবদ্ধ হইতে বক্তব্যবও হইতে পারে গীড়ার যত বৃদ্ধি হয়, ততই সাতিনায় দুর্বলতা কাশি, মধ্যো মধ্যো আক্ষিপিক শ্বাসনয়, কচিং মুর্চ্ছনা, এবং মুখমণ্ডল ও হস্তপাদাদি ক্ষীণ হইয়া হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অতি দুর্বল হইতে থাকে উহাৰ আবেগ বিষম ও কম্পাশ্রিত, এবং শব্দ ক্ষীণ ও উহাৰ স্ভাবের পবিত্রন হয় অতি দুর্বল গীড়ায় শ্বাসকেন্দ্রের ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য শীঘ্রই প্রকাশিত হয় বিশেষতঃ অস্থিরতা, মুখমণ্ডল বিকৃত, ধূমকেতাববৎ আক্ষিপ, এবং প্রবল প্রণাপ উপস্থিত হইতে পারে

চিকিৎসা। বোগীকে অস্থিরভাবে পবিকৃত শয্যায শয়ন কবা ইবে গৃহেব তাপ ৬৫ ডিগ্রী মাহাতে রক্ষা পায় তাইব চেটা কবিনে।

কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে,—

সলফেট অফ ম্যাগনেসিয়া

..

..

১২ গ্রাং

কার্বনেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া . . . ১২০ গ্রেণ

ম্যাগ্নেসিয়া মেন্থ পিপারবিটা . . . ৭২ আং ।

দ্রব্যমাত্রা প্রতি দিন প্রাতে এক এক মাএা সেবন কর্তব্য

দুই ড্রাম পবিমাণ কল্‌চিকম্ ওয়াইন উহাব সহিত মিশ্রিত করিলে
কোন কোন সময় বিশেষ ফল দর্শে

অথবা,—

ভাইনম্ ম্যাগ্নিটমনি . . . ২ ড্রাম

সল্‌ফেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া . . . ২ আং

লাইকব ম্যাগ্নোনিয়া ম্যাগ্নিট্যাটিম্ . . . ৪ ড্রাম ।

— সিবপ প্যাপাভেবিস্ . . . ৫ ২ ড্রাম

ম্যাগ্নেসিয়া ক্যাম্ফর . . . ৭ ২ আং

আটমাত্রা চক্ৰিশ ঘণ্টাব মধ্যে ২ ৩ বাব খাইতে দিবে

বাওবোগ জন্ত পীডায় অগ্রে বাওব চিকিৎসা করাই যুক্তিযুক্ত, এজন্ত —

বাইকার্বনেট অফ পটাশ . . . ২ ড্রাম

জল . . . ১ আং

একমাএা, দুই তিন ঘটা অন্তর সেখন করাইবে

বেদনা নিবারণ জন্ত ৪ ৫ ঘটা অন্তর ১ গ্রেণ পবিমাণে অহিফেন
ব্যবহার করা যাইতে পারে পোস্ত টেডিব ফোমেন্ট অথবা মসিনাব
বড় বড় পুনর্টিস দিতে হইবে পানীয়রূপে নিম্নোক্ত কোন একটা
প্রক্রিয়া করিবে ।

বাইকার্বনেট অফ পটাশ . . . ২ আং

লেমন সিবপ . . . ২ আং ।

জল . . . ১ ২ পাইন্ট

সমস্ত দিন পান করিবে অথবা,—

ক্লোবেট অফ পটাশ . . . ৬০ গ্রেণ

সিবপ হেমিডেস্‌মি . . . ২ আং

জল . . . ২ পাইন্ট

তৃণাকালে পান করিবে

য্যালোপ্যাথিকে হুংপিণ্ডেব পীড়ার চিকিৎসা ২৭৫

গৰম জলের বাষ্প নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ, লঘু আর্হাব যথা,—যাবাষট, সাণ্ডানা, দুধ, যবেব মণ্ড ইত্যাদি দুর্বলবস্থায় বিফ্টি, মাংসের কোল এবং নিবেচনামুসাবে মদিবা ব্যবস্থা কবিত্তে পাৰা যায়।

স্লেদেষ্টেব মধ্যে অধিক পৰিমাণে য়াফিউজন্ হইলে হুংপিণ্ডেব উপর বড় বেলেস্তাবা প্রয়োগ কবিলে তাহার পৰ নিম্নোক্ত ঔষধ খাইতে দিবে

আইওডাইড পটাশ	...	১৫—৩০ গ্রোন।
ডাইনম্ কল্‌চিসাই	...	১ ½ ড্রাম।
টীং হায়েসায়েমন্	...	১ ½ ড্রাম।
সল্‌ফেট অফ অ্যাগ্নেসিয়া	..	২২০ গ্রোন।
ইন্‌ফিউজন্ য়ান্‌ট্রিমিডিস্	..	৭ ½ আং।

ছয় মাত্রা। এক এক মাত্রা দিবসে তিনবার

এই সকল উপায়ে পীড়ার উপশম না হইলে পেরিকার্ডিয়ম ছিদ্র কবিয়া উহার মধ্যস্থ সিবম বাহির কবা যাইতে পাবে। পেরিকার্ডিয়ম ইহা ব্যতীত জাব উপায়ান্তর নাই

প্রবল এণ্ডকার্ডাইটিস্ —হুংপিণ্ডেব অভ্যন্তরে ও হুংকার-টেব আবরণ অতি সূক্ষ্ম ঝিল্লীর প্রদাহ এই পীড়া জন্য হুংপিণ্ডেব অন্যান্য পীড়া জন্মে, অতএব অতি সাবধানে ইহার প্রকৃতি পর্যালোচনা কবা কর্তব্য

লক্ষণ।—এই পীড়া অতি কঠিন হইলে শ্বাসকষ্ট, বক্ষঃস্থলে তাব-বোধ ও অসুখ বোধ, রোগী সর্বদা টিঙভাবে শয়ন কবিয়া থাকিতে চাহে। জ্বর, নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্বল ও ক্ষণবিলুপ্ত, কখন কখন দেহ শীতল, ঘর্ষাজ ও অতিশয় শ্বাসকষ্ট হয়, এবং ক্রমে অস্থিরতা ও মুচ্ছনা উপস্থিত হইতে পাবে। প্রদাহের স্থান অঙ্গ বা উহ পুৰান হইলে উপবেশিত লক্ষণ প্রবল হয়না। বাতবোগেব সহিত এই পীড়া জন্মিলে সহজে ইহার অভাব অবগত হওয়া যায় না। উপবেশিত লক্ষণ সকলকে সাধারণ লক্ষণেব মধ্যে জানিতে হইবে, কিন্তু পীড়া কঠিন হইলে নিম্নোক্ত লক্ষণ সকল ভাবিত্ত হয

কম্প, গাত্রেব উত্তাপ, প্রভূত ঘৰ্ণ, বৃদ্ধ বিবৰ্ণ, কখন বা হবিদ্রাবৰ্ণ, পিত্তাধিক্য, উদবাগয, মুখমণ্ডল আকুঞ্চিত ও উদ্বিগ্নযুক্ত, নিতান্ত নিস্তেজকত, বিড়বিড়ে প্রলপ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পাবে ফুস্ফুস্, বক্ষ ও মস্তিষ্কেব মধ্যে পাইমিয়া জনিত পদার্থেব সঞ্চয় এবং স্ফোটকও হইতে পাবে

চিকিৎসা হৃদয়ে প্রদাহেব ন্যায্য ইহাব চিকিৎসা কবিতে হইবে

সায়্যানোসিস্ —হৃৎপিণ্ডেব এবং বড় বড় বক্তবহা নড়ীব নানাপ্রকার বৈলক্ষণ্য এবং পীড়া জন্য দেহের সমস্ত বক্ত ফুস্ফুসে অক্সিজেনেব সহিত মিলিত ও উত্তমরূপে পবিত্রিত না হওয়াতে ত্বকের এক প্রকার বিশেষ নীলিমা বর্ণ হয় ।

লক্ষণ ত্বকের বিবৰ্ণতা সহিত সচবাচব নিশ্বাসবায়ু ও গাত্রেব শীতলতা, হৃদেপন, মধ্যে মধ্যে শ্বাসকষ্ট, অল্প উদ্দীপনাতেই মুচ্ছনা, ইত্যাদি লক্ষণ বর্তমান থাকে কিয়দ্বিবস পবে সচবাচব অঙ্গুলীব অগ্রভাগ ক্ষীণ ও নখ ভিতর দিকে বক্র হয়, অনেকস্থলে উত্তমরূপে জননেন্দ্রিয়েব বর্দ্ধন হয় না কখন কখন ব্রহ্মাই হইতে বক্তপ্রাব হইতে দেখা গিয়াছে ; শেষাবস্থায় প্রায় আভ্যন্তরিক যন্ত্রে বক্তসঞ্চয় ও শোথ জন্মিয়া থাকে যে কারণ প্রযুক্ত হউক, বক্তসঞ্চালনের আধিক্য হইলেই ত্বকের বিবৰ্ণতা বৃদ্ধি হয় কোন কোন স্থলে সম্ভাবন ভূমিষ্ট হইবাব কিয়দ্বিবস পবে এই পীড়াব ছিন্ন প্রকাশ পায় শেষাবস্থায় এই পীড়া জন্য অনেক নিশ্বাস মূঢ় হইয়া থাকে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের এই পীড়া অধিক হয়, কিন্তু তাহাব কাবণ এ পর্য্যন্ত অবধাবিত হয় নাই

চিকিৎসা । এই ব্যাধিব প্রতিকার কিছুতেই হইবার নহে, তবে কোন প্রকার উপায় দ্বাব বাহ্যতে বোগেব আশু যন্ত্রণা নিবারণ হয়, তাহাই কবা কর্তব্য পুষ্টিকর আহাব, উষ্ণ বস্ত্র ব্যবহার, মানসিক উদ্দীপন ও শারীরিক অম হইতে নিবৃত্তি, শ্বাসকষ্ট স্থানে বাস ইত্যাদি উপায় দ্বাবা বোগ যাপ্য বাধিতে চেষ্টা কবিবে

মিউডো ব কৃত্রিম য্যাঞ্জাইন পোক্টোবিস্ হঠাৎ বেদনা, হুংপিণ্ডে অসুখবোধ, হৃদেপন, শ্বাস প্রশ্বাসেব ব্যতিক্রম, মুচ্ছাবোধ, মস্তক ঘূর্ণন, মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও নাড়ী দুর্বল হয় অবস্থ দেখিয়া বোধ হয় পীড়া সাংঘাতিক, কিন্তু প্রায় অনিষ্ট ঘটে না রক্তেব অস্পৃশ্যতা, নানাপ্রকার স্নায়বিক পীড়া, হিষ্টিবিধা, গা উট্ প্রভৃতি বোগেব সহিত এই পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়

এই বোগেব ভাবী ফল অশুভ জানিতে হইবে প্রথমাক্রমে যত্ন •। হইলেও পরে ইহাদ্বারা যত্ন হইবার সম্ভাবনা

চিকিৎসা —যাহাতে পীড়ার আক্রমণ না হইতে পারে, তাহাবই বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে; সর্বদা আফিজ সঙ্গে রাখা আবশ্যক বোগেব আক্রমণ সম্ভাবনা জানিতে পারিলেই উহা সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে পীড়াতিশয়কালে যামোনিয়া, ব্রাণ্ডি প্রভৃতি উত্তেজক এবং ইথাব, অহিফে, ক্লোবাল, ক্লোবোফবম, ব্যালিবিযেন ইত্যাদি আক্ষেপনিবারক ঔষধ ব্যবহাবেও বিশেষ ফল দর্শে

ডাক্তার ট্যানার নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা কবেন —

স্পিবিট ইথাবিস্	..	১১ ড্রাম।
স্পিবিটস্ যামোনি যাবোমেটিক্	.	২ ড্রাম
টীং ক্যাম্ফব কম্পাউণ্ড	..	১ ড্রাম।
যাকোয়া ক্যাম্ফব	...	৬ আং।

এক আউন্স মাত্রায় বিবেচনামত সেবন করিতে দিবে

এই সমস্ত ঔষধ সর্বদা বোগীব নিকটে রাখিবে এবং বেদনা উপস্থিত হইলেই সেবন করিতে হইবে তাপিণ্ডেব ফুপ, মর্ষপ পানত্বা অথবা ফোমেন্টেশন দ্বারা উপকারেব সম্ভাবনা যে সকল ব্যক্তিব এই পীড়া হইয়া থাকে, তাহাদের উত্তেজক দ্রব্য আহাব, মদিবাপান, উচিতাধিক পবিশ্রম, আহাবেব পব অমণ ও মানসিক উদ্দীপন হইতে নিবৃত্ত থাকা কর্তব্য

সন্কোপ বা মুচ্ছনা। —হুংপিণ্ডেব ক্রিয়াভাব হইতেই এই বোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহাব পবেই স্নায়ুগুণেব ও তৎপবে যুস্মুস্মেব ক্রিয়াব ব্যতিক্রম হয়

লক্ষণ হঠাৎ এই রোগ উপস্থিত হইলে ইহা দ্রাব যত্ন হইতে পাবে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই রোগ ক্রমশঃ প্রকাশ পায় এবং মুচ্ছা হইবার পূর্বে নিম্নোক্ত লক্ষণ সমুদায় দেখিতে পাওয়া যায় দুর্বলতা, অল্পভব, মস্তক ঘূর্ণন ও কম্পন, বমনোদ্বেগ, কখন কখন বমন, মুখমণ্ডল বিবর্ণ, শীতবোধ ও কম্পা, কখন বা উষ্ণতা বোধ, উহাব সহিত নির্যাসবৎ চট্‌চটে ঘর্ষ, অত্যন্ত দ্রুত, ক্ষুদ্র ও দুর্বল নাড়ী, কখন দীর্ঘনিশ্বাস, অত্যন্ত অস্থিরতা, মানসিক বিকাব, শব্দ ও দর্শনেন্দ্রিয়েব ব্যতিক্রম জ্ঞান জ্ঞাপ দৃষ্টি, আলোকদর্শনে অনিচ্ছা, কর্ণে শব্দবোধ ইত্যাদি পূর্বলক্ষণ সম্পূর্ণরূপে মুচ্ছা হইলে বোগী এককালে জ্ঞানশূন্য ও চক্ষুেব স্বচ্ছাংশ ক্ষিপ্ত হইয়া য়ত ব্যক্তিব ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, এবং শীতল চট্‌চটে ঘর্ষ, য়দু, দুর্বল, বিষম অথবা অন্তত্ব নাড়ী, বিষম ও য়দু শ্বাস প্রশ্বাস এবং ক্রমে এককালেই উহাব অভিাব কখন কখন কন্‌লশন এবং স্ফিষ্টব পেশী মিথিল হওয়া প্রযুক্ত ইচ্ছা অস্বপ্নে মল মূত্র নির্গত হইতে থাকে এই সময় স্থপিত্ত পবীক্ষা করিলে উহাব আবেগ অতি য়দু বোধ হয় বা এককালেই বোধ হয় না এই অবস্থায় কিয়ৎকাল থাকিয়া বোগী আবোগ্য লাভ কবে বা য়ত্নমুখে পতিত হয়

চিকিৎসা — বোগীর অবস্থানের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যিক বোগীকে হবাইজটোলি বক্রভাবে শয়ন কবাইয়া মস্তক কিঞ্চিৎ নত কবিয়া রাখিবে দেহ সম্মুখভাগে বক্র এবং জাহ্নদ্বয়েব মধ্যে মস্তক অবনত কবিয়া রাখিতে পাবিলে মুচ্ছা নিবারণ কবা যাইতে পারে । বোগীব গাত্রবসন উন্মোচন করিয়া দিবে, যাহাতে . গায়ে বিশুদ্ধ বায়ু লাগিতে পায়, তাহার ব্যবস্থা করিবে নাগারক্লে ম্যাগোনিয়া ও মুখমণ্ডলে শীতল জল ছিটকাইবে এবং স্থপিত্তের উপবে হস্ত দ্বাবা বা কোন উত্তেজক লিনিমেন্ট * দ্বাবা মালিশ করিবে ত্রাণ্ডি, য়ামে -

* স্টিমিউলেটিং লিনিমেন্ট লিনিমেন্ট সেপানিস, লিনিমেন্ট ওপিয়াই, লিনিমেন্ট ক্যাম্‌ফর কম্পোজিটি, প্রত্যেক অর্ক অ উন্স, টীং অ রিক দেও ড ম ।

য্যালোপ্যাথিকে হৃৎপিণ্ডেব পীড়াব চিকিৎসা। ২৭৯

নিয়া, ইথাৰ, যুগনাভি প্রভৃতি গবম ঔষধ সেবন কৰাইলে শীঘ্ৰ জ্ঞানো-
দ্রেক হইতে পাবে বোগী ঔষধ গলাধঃকৰণে অসমর্থ হইলে পিচকাৰী
দ্বাৰা ঔষধ ব্যবহার কৰিবে হস্ত পদাদিৰ শিৰায় চাপ দিয়া দেহ-
মধ্যস্থস্থলে বক্তাধিক্য কৰিতে চেষ্টা কৰিবে গবম জলে বোতল পূৰ্ণ
কৰিয়া তাহাৰ তাপ বা ঘৰ্ম দ্বাৰা দেহেৰ সম্ভাপ বক্ষায় যত্নবান হইবে
হৃৎপিণ্ডেব উপাৰ সৰ্ষণ পলস্তাব বা তাৰ্পিণ তৈল দ্বাৰা মালিশ কৰিলে
উপকাৰ দৰ্শে। অনিষ্ট ঘটিকাৰ সম্ভাবনা দেখিলে নিউমোগাট্টিক
স্নায়ুতে গ্যালুভ্যানিজম্ ব্যবহার, কৃত্ৰিম শ্বাস প্রশ্বাস এবং ট্ৰান্সফিউ-
জন্ বা দেহান্তৰ হইতে বক্তাসংকামণ ইত্যাদি উপায় অবলম্বন কৰা গিয়া
থাকে। অতি বক্ত বক্তত্ব জন্ম এই পীড়া হইলে শোথোক্ত প্রক্রিয়াদ্বাৰা
দ্বাৰা বিশেষ উপকাৰেব সম্ভাবনা।

পাল্পিটেশন্ বা হৃদ্পেদন — যৌবনাবস্থায় স্ত্রীজাতি, স্নায়ু-
প্রধান ঋতু, ইত্যাদি স্থলেই এই পীড়াব আধিক্য হইয়া থাকে স্থলকায়
অতি মেধযুক্ত ব্যক্তি আহাৰ কৰিলে, অজীৰ্ণ বোগপ্রাপ্ত হইলে বা শাবী-
বিক পৰিণাম না কৰিলে এই পীড়া দ্বাব আক্রমণ হইবার অধিক
সম্ভাবনা

লক্ষণ — সচরাচৰ এই বোগেব সহিত হৃৎপিণ্ডেব ক্ৰিয়া সত্ত্ব ও
ঘন ঘন হইয়া থাকে উহাৰ ক্ৰিয়া সম্পূর্ণরূপে নিয়মিত হইতে পাবে,
অথবা উহাৰ সহিত বৈষম্য বা ক্ষণবিলুপ্ততা জন্মিয়া থাকে অনেক
স্থলেব তেজোব অসমতা জন্মে। হৃৎপিণ্ডে বোগী নানা প্রকাৰ অস্থখ
অভূত কৰে ও জানিতে পাবে যে, হৃদ্পেদন হইতেছে এবং এইকণ
অভূতবেব সহিত বক্ষঃস্থলেব মধ্যে কোন বস্ত্ৰ গড়ান, হঠাৎ পাড়িয়া
যাওয়া ইত্যাদি নানা কষ্টবোধ হইতে থাকে উৎকট আতিশয্যেব
সহিত মূৰ্ছাবোধ, কখন বা প্রকৃত মূৰ্ছা, সমান শ্বাস প্রশ্বাস, বক্তবোধেব
স্বায় বোধ, শিৰঃপীড়া, মুখমণ্ডলেব অ বক্ততা, মস্তক ঘূৰ্ণন, উষ্ণতা বোধ,
দৃষ্টিব ব্যতিক্রম, কৰ্ণে শব্দ, হস্তপদাদি শীতল ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ
পাইতে থাকে।

চিকিৎসা। — হৃদ্পেদনেব আধিক্যেব সময় যদি কোন পকাৰ

প্রত্যাহ ও উত্তেজন বর্তমান থাকে, তবে উহা দূর করা নিতান্ত কঠিন।
তৎপবে ত্রাণি, ইথাব গ্যাংগোনিয়া, অ'হিফেন বা মর্ফিয়া, হাইড্রোমিথ্যানিক
গ্যাংগিড, যুগনাভি, টীং ল্যাবেণ্ডাব, হিন্দু গ্যাংগোনিয়াম্ প্রভৃতি আক্কেপ-
নিবাবক, অবসাদক, এবং উষ্মকব ঔষধ সেবন করাইবে তন্মধ্যে
নিম্নোক্ত ঔষধ বিশেষ ফলপ্রসূ

ডিজিট্যালিস্ জুগ	১২ বিন্দু ।
ক্যাস্কব মিক্চাব	১ অং
মিবপ অফ অবের্জ	২ ড্রাম ।
ডাইঃ হাইড্রোশিয়েনিক	১ বিন্দু

এক মাত্রায় বিবেচনা মত প্রয়োগ করিবে

মদিবা, তামাকু বা চ এককালে পবিত্র্যাগ করিতে হইবে অতিবিজ্ঞ
অধ্যয়ন, অগ্ন্যন্ত মানসিক চিন্তা হইতে বিবর্তি, স্ত্রীসংসর্গ পবিত্র্যাগ,
ইত্যাদি উপায় দ্বারা স্বেপনের আতিশয় নিবারণ করিবার চেষ্টাবান্
হইবে বাত বা অগ্নি কোন দৈহিক পীড়া থাকিলে, তাহার উপায়
চিকিৎসা করিবে, এবং সুপথ্য ও খাদ্যদ্রব্য ঔষধ দিবে। তন্মধ্যে
মিনাবেল্ গ্যাংগিডস্, বুইনাইন, স্ট্রিক্‌নিয়া বা নক্সভমিকা, লৌহযাটিত
ঔষধই প্রশস্ত

শীতল জলে স্নান, নিয়মিত শারীরিক শ্রম, স্থান পরিবর্তন, ইত্যাদি
উপায় দ্বারা সাধাবণ স্বাস্থ্যবর্ধন, স্নায়ুশুল ও বস্তুর অবস্থা উন্নতি
করিতে চেষ্টা করিবে।

টীং ফেবিমিউরিয়েটিক	১০ বিন্দু
টীং ডিজিট্যালিস্	১০ বিন্দু
নক্সভমিকা	১০ বিন্দু
জল	১ অং

এক এক মাত্রায় আবশ্যক মত প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বিশেষ
ফললাভের পবিচয় পাওয়া গিয়াছে

কিছু দিনের ভ্রম স্বেপনের উপর বেলেডোনা পলস্তাব। ব্যবহার
করা যাইতে পারে স্বেপনের চিকিৎসা সম্বন্ধে যে যে ব্যবস্থা করা

য্যালোপ্যায়িক হৃৎপিণ্ডের পীড়াব চিকিৎসা । ২৮১

হইল, হৃৎপিণ্ডের অন্যান্যরূপ পীড়াতেও তদ্বাচ উপকার দর্শিতে
পাবে ।

হৃৎপিণ্ডের বাপচার বা বিদার —এই বোগ প্রায় হইতে
দেখা যায় না । হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের নির্গাণবৈলক্ষণ্যহেতুই ইহা উপন্ন
হইয়া থাকে । কোন কাবণে হৃৎপিণ্ডের পীড়া হইলে, তাহার পব যদি
কোন উদ্দীপক কাবণ ঘটে, তবে এই ব্যাধি হয়, নতুবা হয় ন । ফলতঃ
উদ্দীপক কাবণই এই বোগের জন্মদাতা । আঘাতপ্রযুক্ত এই পীড়া
জন্মিতে পাবে ।

লক্ষণঃ যে কাবণবশতঃ এবং বিদারের আঘতন বেরূপ সংঘ-
টিত হয় তদনুসাথে লক্ষণাদিব ভাবতম্য হইয়া থাকে । হৃৎপিণ্ড বিদার
হইবামাত্র এই বোগীর স্বভাৱ হইতে পাবে, অথবা চীৎকার শব্দ কবিতা
বোগী, চেতনাশূন্য হয় এবং প্রাণত্যাগ কবে । এইকপ ঘটনা হইলে
হৃৎপিণ্ডে হঠাৎ তীব্র বেদনা, বক্ষঃস্থলে ভাববোধ, শ্বাসকষ্ট, এবং হৃৎ-
পিণ্ডের ক্রিয়ার অভাব ইত্যাদি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় । কখন
বোগী আপনাকে অস্থ বোধ কবে কিন্তু পবক্ষণেই বোগের পুনরাব্রমণ
হইয়া জীবন নষ্ট কবে । কেহ কেহ বলেন, ইহাতে বোগী আবেগ্য
লাভ করিতে পাবে ।

ইন্ট্রাথোরাসিক্ টিউমার —বক্ষঃগহ্বর মধ্যে যানিউবিজম,
ক্যান্সার, এণ্‌জুডেশন পদার্থ, সমবেত মোটিক ঝিলি বা মেদ পদার্থ
ইত্যাদি স্ফোটকরূপে উপন্ন হইতে পাবে এবং ইহাদিগকে ইন্ট্রাথোর-
সিক্ টিউমার কহে ।

লক্ষণঃ সর্বত্র সমান লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রায়ই
অপ্প বা অধিক পবিমাণে বেদনা, অস্থিবতা, কানি, শ্বাসকষ্ট, ফেণযুক্ত বা
আঠাবৎ স্লেষ্মা নির্গম, হৃৎপিণ্ড, শ্ববভঙ্গ, কখন কখন গলাধঃকরণে কষ্ট
ও ফুস্ফুস্ হইতে বক্তব্য হইয়া থাকে । ইহা দ্বারা কখন কখন গ্লুবিমি,
নিমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্ এবং কষ্ট ও টেকিয়াব প্রদাহ হইতে পাবে ।
উহাদের নিপীড়ন কর্তৃক কোন বৃহৎ ব্রঙ্কাই আনদ্ধ হইলে ফুস্ফুসের
কল্যাপ্পও হইতে পাবে । কখন বা বক্ষঃ প্রাচীরের ক্ষীতি, পশুকাব ও

বক্ষাশ্চিব নিদাবণ, হৃৎপিণ্ডেব সংস্থান এংশ, ইত্যাদি দুক্লহ লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়

চিকিৎসা ।—চিকিৎসা দ্বারা একবারে এই পীড়া দূর কর যায় না, এজন্য উপযুক্ত ঔষধাদির দ্বারা উপস্থিত ক্লেশ নষ্ট করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য বিবেচক ও মুত্রকারক ঔষধ,—কপিং, আইওডাইড অফ মার্কবিব মলমেব বাহু প্রযোগ, আইওডাইড পোটাসিয়ামেব মলম ব্যবহার, ও প্রয়োজন হইলে বিবেচনামুসাবে আক্ষেপনিবারক ঔষধ—স্পিরাইট অফ ক্লোবোফবম, র্যামোনিয়া, বেলডোনা ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা

বৈদ্যকমতে হৃদ্রোগ চিকিৎসা ।

হৃদ্রোগের কারণ ।—অত্যাশ্রয় জ্বা, গুরুপাক জ্বা, কষায় ও তিক্ত জ্বা ভোজন, অতি পবিত্রম, পুনঃপুনঃ ভোজন, চিন্তা ও মল মূত্রেব বেগ বোধ, এই সকল কারণে হৃদ্রোগ জন্মে । ইহা পাঁচ প্রকার—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ ও ক্রিমিজনিত ।

হৃদ্রোগের উপাতি ও লক্ষণ —কুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ বস দূষিত কবিয়া হৃদয়ে নানা প্রকার বেদনা জন্মায় হৃদয়ে বেদনা জন্মায় বলিয়া আয়ুর্কেদাচার্য্যগণ ইহাব নাম হৃদ্রোগ রাখিয়াছেন

বর্ত্তিজ হৃদ্রোগের লক্ষণ —বাতজনিত হৃদ্রোগে হৃদয়ে নানা প্রকার ব্যথা অর্থাৎ কখন হৃদয়বিদ্রবৎ, কখন বা আকর্ষণবৎ বেদনা হইয়া থাকে

চিকিৎসা —হরীতকী ৫০ টা, মচল লবং ২ পল এই উভয়েব সহিত সূত পাক কবিয়া সেবন কবিবে । ইহাব নাম “দিল্লভক সূত ”

কল্যান সুন্দর রস ।—রসসিদ্ধ, অত্র, রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ, হিঙ্গুল, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া চিহ্নাব রসে ১ দিন মাড়িবে হাণীশ-
ড়ার রসে সাত দিন ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে যাত্রা ১ রতি ।
অম্লপান ঈষৎ জল ।

পিত্তজ হৃদ্রোগের লক্ষণ ।—পিত্তজনিত হৃদ্রোগে পিপাসা,
জ্বালা, হৃদয়েব ক্লান্ততা, মুখ হইতে ধূমেব ন্যায় নির্গত, মুচ্ছা, ঘর্ম ও
মুখশোষ হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা । যুত ৪ সেব । কাথার্থ—অর্জুন ছাল ৮ সেব, জল
৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, কল্ক—অর্জুন ছাল ১ সের । ইহার নাম “অর্জুন
যুত ”

হৃদয়ার্ণব রস ।—পাণা, গন্ধক, তাম্র, ত্রিফলার কাথে ও কাক-
মাটিব রসে এক এক দিন মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে ।

কফজ হৃদ্রোগের লক্ষণ ।—কফজনিত হৃদ্রোগে শবীবের
শুষ্কতা, কফপ্রাব, অকচি, অগ্নিমান্দ্য, শুষ্কতা ও মুখেব মধুরতা জগে ।

চিকিৎসা ।—অর্জুনছাল, বচ, বাস্মা বেড়লা, গোবক্ষ চাকুলে,
হবীতকী, শঠী, কুড়, পিপ্পলী, শুষ্ঠ প্রত্যেকে সমভাগ চূর্ণ একত্র মিলা-
ইবে যাত্রা ১০ তোলা অম্লপান উপযুক্ত গব্য যুত ইহার নাম
“ককুভাদি চূর্ণ ”

প্রত্যাকর বটী ।—স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অত্র, বংশলোচন, শিলাজতু
প্রত্যেকে সমভাগ অর্জুনছালের কাথে ভাবনা দিয়া ছায়াশুক
করিবে । যাত্রা ৪ রতি ; অম্লপান যথাযোগ্য ।

ত্রিদোষজ হৃদ্রোগের লক্ষণ ।—ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে পূর্বোক্ত
বাতজ, পিত্তজ, কফজ হৃদ্রোগের সমস্ত লক্ষণই লক্ষিত হয় ।

চিকিৎসা ।—স্বর্ণ, অত্র, লৌহ, বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, বৈক্রান্ত প্রত্যেক
১ তোলা । কপূরের জলে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে
ইহার নাম “বিশেষ্বর রস ”

শঙ্কর বটী ।—পারদ ৪ ভাগ, গন্ধক ৮ ভাগ, লৌহ ৩ ভাগ, সীসা
২ ভাগ, সমুদয় একত্র করিয়া ক্রমাগত কাকমাটি, চিতা, আদা, জয়ন্তী,

বামক, বিলু ও অর্জুনেনব বসে ভাবনা দিবা ২ স্নাত প্রমাণ বচী কবিবে,
অল্পপান ঈষদুষ্ণ জল

ক্রিমিজন্ম হৃদ্রোগের লক্ষণ ।—ক্রিমিজন্মিত হৃদ্রোগে হৃদয়ে
নানা প্রকাব ব্যথা, কণ্ডু অর্থাৎ চুল্কনা, বমন, বিবমিষা, অকচি, চক্ষু
শ্যামবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ পীত মিশ্রবর্ণ, শোথ হয় ও রোগী অন্ধকার দর্শন
করে

চিকিৎসা ।—অর্জুনছাল ১২ ০ সেব, দ্রাক্ষা ৬ ০ সের, মউলফুল
২০ পল, একত্র করিয়া ২৫৬ সের জলে সিদ্ধ কবিয়া ৬৪ সেব থাকিতে
নামাইয়া কাথ জল ছাঁকিয় লইবে । অনন্তর ঐ জলে শুড় ১২ ০ সেব
গুলিয়া ধাইফুলচূর্ণ ২০ পল নিক্ষেপ কবিয়া মুখবদ্ধ ভাঙে ১ মাস বাখিবে ;
ইহাতে অন্তর্যসেক ক্রিয়া দ্বারা অরিষ্ট প্রস্তুত কবিবে

হৃদ্রোগের উপদ্রব ক্রান্তি, হ্রস্বলতা, শোথ, এই সমস্ত
হৃদ্রোগের উপদ্রব ক্রিমি বোগে যে সকল উপদ্রব উল্লিখিত হইয়াছে,
ক্রিমিজন্ম হৃদ্রোগেও তাহা দৃষ্ট হয়

হোমিওপ্যাথিকে হৃদ্রোগ চিকিৎসা ।

অনেকেই অনুমান কবেন যে, যকৃতের ক্রিয়া বিকৃতি, পেট ফাঁপা,
এবং অজীর্ণাদি পীড়া জন্ম হৃদযেব পীড়া জন্মিয়া থাকে এবং তজ্জন্য
অধিকতর কষ্ট ভোগ কবিত্তে হয় এই সকল অপেক্ষাও হৃৎপিণ্ডেব
অস্বাভাবিক ক্রিয়া বিকৃতি জন্ম এই পীড়া সর্বদাই উৎপন্ন হইতে দেখা
যায়

লক্ষণ ।—হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত ক্রিয়া কেবল মাত্র তাহার অতি-
বিকৃত কার্য্য কবণ দ্বারা হয় না, প্রত্যুত পেট ফাঁপাব জন্ম বিরুদ্ধ পাকস্থলী,

উত্তেজনা, উত্তেজক দ্রব্য, চা, কফি এবং তামাকু ও ভূতি দ্রব্য সেবনে জন্মিয়া থাকে

চিকিৎসা ।—পেট ফ পা, সুবাপ ন, চা কিম্বা কফি সেবন জন্ত এই পীড়া জন্মিলে, প্রতিদিন তিনবার ‘নক্সডমিকা’ সেবন কবাইবে উত্তেজনা জন্ত হইলে “য্য কোনাইট” ব্যবস্থা কবিতে হইবে ।
ওতিবিক্ত কার্যকরণ জন্ত হইলে ‘আর্গিকা’ প্রয়োগ কবিবে ।
যদি শ্বাসকষ্ট থাকে, তবে “ক্যাস্টাস” ব্যবহাবে বিশেষ ফল দর্শে
এই সকল কারণ বিবেচনা কবিয়া তাহাব ধ্বংস কবিবার চেষ্টা কবিলে বোগী মত্বর আবোগ্য লাভ কবিবে তাহাব কিছুমাত্র সন্দেহ নাই

হাকিমীমতে হৃদ্রোগ চিকিৎসা ।

এই বোগে শরীরের রক্ত ক্রতগামী হইয়া তেজে চলে, অন্তঃকরণ খব খব কবে, বক্ষস্থ পাঁজরের নীচে তাহা দেখিতে বা অনুভব কবিতে পাওয়া যায় হস্ত দ্বাৰা পৰীক্ষা কবিলে অধিকতর ধুক ধুক কবে নিশ্বাস শীঘ্র চলে, মস্তক ঘোবে, শয়নকালে কিঞ্চিৎ আবাম বোধ হয়

চিকিৎসা ।—অতিশয় পথ চলিবে না, অতিবিক্ত কর্ম কবিতে কাস্ত থাকিবে, সুখে শয়ন করিবে, কিম্বা স্থিৰ হইয়া বসিয়া থাকিবে এবং অল্প বা লঘু আহাব করিবে । বায়ু বিকৃতি জন্য এই পীড়া হইলে যত্ন বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ কবিবে তদনন্তর,—

পিঁপুলচূর্ণ	...	...	১০ আনা ।
এলাইচ	...	...	১০ আনা
বচচূর্ণ	...	...	১০ আনা ।
হিঙ্গু	...	...	১০ আনা ।

সোরা	...	..	/০ আনা ।
সৈন্ধব	...	...	/০ আনা ।
শুষ্টি চূর্ণ	...	..	/০ আনা
যমানী চূর্ণ	...	..	/০ আনা

লেবুব রসে মর্দন করিয়া চারিটি বটী করিবে । প্রতিদিন প্রাতে এক একটা বটী জলেব সহিত খাওয়াইবে ।

পিত্ত বিকৃতি জন্ম এই ব্যাধি হইলে, পিওজন্ম জ্ববে যেরূপ চিকিৎসা করিতে হয়, সেইরূপ কবিবে । প্রথমে নিম্বকাথেব সহিত বচ চূর্ণ প্রয়োগ করিতে হইবে । পরে উপবোক্ত ঔষধ সেবন করাইবে ।

ক্রিমি জন্ম এইরূপ হইলে তিন দিন ঘৃতান্ন এবং দিষ্ট দ্রব্যে প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ কবিবে, পরে লবণাক্ত বিবেচক সেবন কবিবে । সর্বশেষে—

বিড়ঙ্গ চূর্ণ	...	...	১০ আনা ।
শোধিত সুবা	...	...	১ তোলা ।
জল	...	...	১০ ছটাক ।

একত্রে ভক্ষণ কবিবে

পথ্য যবেব পালো, সব চাউলের ভাত, মৎস্যেব ঝোল ইত্যাদি ।

একাদশ অধ্যায় ।

ম্যালোপ্যাথিকে মূত্রযন্ত্র ও মূত্রাশয়ের পীড়ার চিকিৎসা ।

মূত্রপিণ্ডের কঞ্জেশন্ ।—কোন প্রকার জ্বব, বিশেষতঃ স্ফোটক জন্ম জ্বব, শৈত্য ও অর্জতা, ক্যান্থারাইডিস্, তাপির তৈল, সোরা, কিউবেব, কোপেবা প্রভৃতি ঔষধের অধিক মাত্রা সেবন, স্ফপিণ্ডেব বা ফুস্-মূসেব কোন পীড়া বশতঃ সাধারণ শিবা সম্বন্ধীয় রক্তসঞ্চালনে ব্যাঘাত,

স্যানোপ্যাথিকে মূত্রযন্ত্র ও মূত্রাশয়ের পীড়ার চিকিৎসা। ২৮৭

উদবের টিউমার বা সগর্ভ জরায়ু দ্বারা এক বা উভয় রিন্যাল শিবার বা উহার উপবেব অধোগহাশিরাব পীড়ন জন্ম এই বোগ জন্মে

লক্ষণ —মূত্র পরিমাণে অল্প, ঘোব বর্ণ ও অপেক্ষাকৃত ঘন হয় এবং স্থিতিভাবে বাথিলে অধিক পরিমাণে ইউবেটস্ অধঃপতিত হয় কোন প্রকার বক্তাধিক্যে মূত্রের পরিমাণ অধিক, আপেক্ষিক গুরুত্ব অল্প, ও উহা জলবৎ হয়। কটিদেশেব নিকটে অধিক ভাববোধ, অথবা কিয়ৎ-পরিমাণে বেদনা ও অসুখ বোধ হইতে পারে। কণ্ঠেশচন্ দুব হইলে মূত্র স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

চিকিৎসা —বোগীকে শয়নাবস্থায় রাখিবে, মূত্রপিণ্ডের উপর কপিং বা ফোমেটেশন্ ব্যবহার করিবে এবং বিবেচনা মতে বিবেচক ঔষধ দিবে

নিক্রাইটস্ বা মুএপিণ্ডের প্রদাহ।—ঋমা ধাতুবিশিষ্ট লোকদিগের প্রকাশ্য কারণ ব্যতীত এই বোগ জন্মিতে পারে শীতলতা, আর্দ্রতা, নানা প্রকার যান্ত্রিক অপকারণ, সামান্য আহারের সহিত অধিক মদ্য পান, ওষধরূপে অধিক পরিমাণে ক্যান্থারাইডিস্, ত্যাপিন তৈল, অথবা অন্যান্য মূত্রকারক দ্রব্য সেবনে এই পীড়া জন্মে।

লক্ষণ।—কটিদেশে বিশেষতঃ দক্ষিণ মুএপিণ্ডে শূলবৎ বেদনা, কখন কখন উকদেশেব স্পর্শানুভববাহিত্য ও আক্রান্ত দিকের কোষ উর্দ্ধগামী ও আকৃষ্ট হওয়াতে বোগী অত্যন্ত যাতনা বোধ করে। এই সকল লক্ষণের সহিত কম্পা, জ্বর, বমনোদ্বেগ, বমন, উৎকট পিপাসা, নাড়ী কঠিন, ক্ষতগামী ও পূর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, উদবান্ধান, ইত্যাদি লক্ষণ আবির্ভূত হয়। কখন কখন মূত্র আদৌ উৎপন্ন হয় না। কখন বা সর্বদা প্রস্রাবের বেগ হইলেও মূত্র পরিমাণে অল্প ও ঘোব বর্ণ হয়, এবং উহার সহিত রক্তকণা থাকিতে পারে। কখন কখন বক্তের মধ্যে ইউরিক্সা মিশ্রিত হইয়া বক্ত বিষাক্ত হওয়াতে পীড়ার প্রথমাবস্থাতেই কোমা দ্বারা রোগীর মৃত্যু হয়। কখন বা টাইফয়েড অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া দৌর্ভাগ্য প্রযুক্ত বোগী প্রাণত্যাগ করে

চিকিৎসা।—গরম জলের ফোমেটেশন, সর্বদা গরম জলে কটি-

দেশ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বাখা, বাম্পাভিষেক, যুহু নিবেচক ও ঘর্ষকাবক ঔষধ এবং অহিফেণ ও ডোবার্স পাউডার দ্বারা প্রদাহেব প্রতিকার কবিবে সর্বদা শয়ন কবিয়া থাক, এবং লঘু ও তবল দ্রব্য আহাব করা কর্তব্য স্থানিক বেদনা অতি কষ্টদায়ক হইলে, সর্ষপ পলস্তা বা প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়

দৌৰ্ব্বল্যেব অথবা গ্রন্থিমধ্যে পুষ্টিযোৎপত্তিব লক্ষণ প্রকাশ পাইলে দুগ্ধ, ডিম্ব, সব, উডেজক ও বলকাবক ঔষধ দাবা বোগীৰ বলবক্ষাব চেষ্টা কবিতে হইবে। পদ্রিপাক *ত্তিব বৃদ্ধি হইলে পুষ্টিকর ঘন পদার্থ আহাব কবিতে দিবে।

টীং ফেবিপাবক্লোবাইড	..	...০	১২ ড্রাম
ডাইঃ য্যাশিড হাইড্রোক্লোবিক	.	.	১২ ড্রাম
টীং হায়েসায়েমন্		.	২২ ড্রাম।
ইন্ফিউজন্ কোয়াশিয়া		...	৭২ ড্রাম

ছয়মাত্রা। প্রতিদিন তিনবাব সেবন কবাইবে অথবা—

টীং ফেবিপাবক্লোবাইড	..	..	১২ ড্রাম
ফস্ফেট অফ জিঙ্ক	...	...	৬ গ্রেণ।
টীং কলছা	..	..	৫২ ড্রাম।
গ্লিস্‌বিণ	...	.	৪ ড্রাম
জল	.	.	৭২ আং

ছয় মাত্রা ; দিবসে তিন মাত্রা সেবন কবিতে দিবে

ডাইউরিসিস্ বা মূত্রাধিক্য। প্রতিদিন অধিক পরিমাণে পাণ্ডুবর্ণ পরিষ্কৃত মুএ নির্গত হইলে উহাকে মূত্রাধিক্য বলা যায় কেহ কেহ ইহাকে ডায়েবিটিস্ ইন্সিপিডিস্ বা বিশ্বাদ ডায়েবিটিস্ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন কিন্তু ডায়েবিটিস্ বা শর্কবায়ুক্ত মুএব সহিত ইহাব কোন সম্বন্ধ নাই এই বোগে মূত্রেব সহিত শর্কবাব লেশমাত্র থাকে না

লক্ষণ।—প্রবল পিপাসা ও মুএব পরিমাণেব বৃদ্ধি এই দুইটিকে পীডাব বিশেষ লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে মূত্রেব জলীয়াংশেবই

স্যালোপ্যাথিকে মূত্রযন্ত্র ও মূত্রাণযেব পীড়িত চিকিৎসা। ২৮৯

বৃদ্ধি হয়। উহার ঘন পদার্থ আন্তরিক অবস্থায় থাকে কখন কখন মূত্রেব পবিমাঃ এতাদিক বৃদ্ধি হয় যে, যে পবিমাঃ আত্মবীয় তবল দ্রব্য ভক্ষণ করা যায়, তাহা অপেক্ষাও প্রত্নাবেব পরিমাণ অধিক হয়।

চিকিৎসা। প্রত্নাবেব জলীয়াংশ অধিক হইলে কোন একাধ সঙ্কোচক লৌহঘটিত ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়

টীং ফেবি মিউবিষেটীস্ . . . ১০ বিন্দু।

জল . . . ১ আং।

একমাত্রা। দিবসে তিনবার সেবন করাইবে

স্যাংমোনিও সল্ফেট অফ আয়রন ৫—১০ গ্রেন।

দিবসে ৩। ৪ বার সেবন করাইতে পারা যায়।

তবেব ক্রিয়া সূচাকরূপে সম্পন্ন না হইলে গবম জলে স্নান করাইবে। যদি মূত্রেব সহিত ঘন পদার্থের আধিক্য হেতু নবীৰ দুর্বল হইয়া পড়ে, তবে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে

স্যাশিড ফস্ফরিক ডাইনিউড . . . ১০ বিন্দু।

টীং মিল্লোনা . . . ৫ ড্রাম।

টীং নিউসিস্ ডিমিসি . . . ৫ বিন্দু।

স্যাংকোয়া মেম্ব পিপাবেটা . . . ১ আং।

একমাত্রা, দিবসে তিন বার অথবা,—

টীং ফেবি পাবক্লোরাইড . . . ১৫ বিন্দু।

স্যাশিড হাইড্রোক্লোরিক ডাইনিউড . . . ১০ বিন্দু।

ওলিঘাই মেম্ব পিপাঃ . . . ৫ বিন্দু।

ইন্ফিউজন্স কোয়াশিয়া . . . ১৫ আং।

একমাত্রা, ছয় ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিবে

অহিফেন, কডলিবার অয়েল প্রভৃতিও অবস্থানিশেবে বিবেচনামত সেবন করান যাইতে পারে। কেহ কেহ এই রোগে অর্গট অফ বাই, ট্যানিক্ স্যাশিড, অক্সাইড অফ জিঙ্ক, আইওডাইড অফ পটাশিয়াম, স্যালাফোর্টিডা, ক্যাম্ফর, নাইটেট অফ পটাশ প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া থাকেন

কাইলগ্ ইউবাইন অথবা কাইলসংযুক্ত মূত্র ।—যুগ্মেব সহিত মেদ পদার্থেব অণু সমদায় বর্তমান থাক প্রযুক্ত উহা দুগ্ধবৎ শ্বেত-বর্ণ হয়, এইবপ মূত্ৰকে কাইলাস্ মূত্র কহে কখন কখন এই প্রকাব পদার্থেব সহিত বক্তকণা য়ালবিউমেন, কাইবিন ও এক প্রকাব উপবি-শুদ্ধ য়ালবিউমেন দেখিতে পাওয়া যায়

লক্ষণ — দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ মূত্ৰ নিঃসৃত ও তাহাব সহিত কখন কখন বক্তকণা থাকতে উহা লোহিত বর্ণ হয়, এবং কোম কাবণে উহা মূত্ৰাশয়ের মধ্যে সংযত হইলে মূত্ৰাববোধ হইয়া থাকে অত্যাশ্রয় লক্ষণ সচবাচর অতি সামান্য, কিন্তু পীড়া কঠিন হইলে দৌৰ্বল্য, শবীবের শীর্ণতা, কটিদেশে বেদন ও অত্যাশ্রয় লক্ষণাদি উপস্থিত হইয়া থাকে। কখন কখন একপাশে যে দিবাভাগে যেপ্রজ্বাব নির্গত হয়, তাহা স্মাভাবিক, কিন্তু বোগী প্রাতঃকালে উঠিয়া যে মূত্র ত্যাগ কবে, তাহা দুগ্ধবৎ শ্বেত বর্ণ দেখা গিয়া থাকে প্রজ্বাব পবিমাণে অধিক, দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ, মূত্রত্যাগেব ক্রিয়ালক্ষণ পবে উহা সংযত হয় ও যে পাণ্ডে রাখা যায়, ঐ সংযত মূত্র তাহাব বর্ণ ধারণ কবে, কিছুক্ষণ পবে কাহাব কাহ ব উহা ঈষৎ পীত বর্ণ জব পদার্থে ও সংযত শ্বেত পদার্থে বিভক্ত হয়, অথবা ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ পদার্থ নীচে পড়িয়া থাকে কখন কখন শ্বেতবর্ণ পদার্থ সবেব স্থায় উপবে ভাসিয়া উঠে।

নীতপ্রধান ব নাতিনীতোষ্ণ প্রদেশে এই ব্য দি পায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

চিকিৎসা ।—পীড়াব প্রকৃত কাবণ এখনও পর্যন্ত পবিজ্ঞাত হওয় যায় নাই, এজন্য ইহাব চিকিৎসাও অসম্পূর্ণ বহিয়াছে তবে দেখা গিয়াছে যে, কোন ন কোন স্কেচক ঔষধ, বিশেষতঃ গ্যালিক য়াশ্রিড দ্বারা অনেক স্থলে উপকার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। টীং ফেরি মিউবিয়োট অথবা য়ামোনিয়া প্রযোগেও উপকাবের সম্ভাবন আছে।

মূত্ৰপিণ্ডের ক্যান্সার ।—এই পীড়া অতি অস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় মূত্ৰপিণ্ডেব অত্যাশ্রয় পীড়ার স্থায় এই পীড়ায় প্রথমে কার্টিক্যাল পদার্থ ও পবে উহাব আভ্যন্তরিক পদার্থ আক্রান্ত হইয়া

য়্যালোপ্যাথিকে মূত্রযন্ত্র ও মূত্রাশয়েব পীড়ার চিকিৎসা । ২৯১

থাকে। মূত্রপিণ্ডে ক্যান্সার পদার্থ সংকীর্ণ হইলে উহার আয়তনেব বৃদ্ধি হয়, কোন কোন স্থলে এতাদিক বৃদ্ধি হয় যে, উহাকে ওভেবিব বৃহৎ টিউমার বলিয়া ভ্রম জন্মে।

লক্ষণ।—মূত্রেব সহিত বক্ত নির্গত হয়, অতি সামান্য কারণেই সৰ্বদা বমনোদ্যোগ হয়, সদাসৰ্বদা দৈহিক দুৰ্বলতা ও বক্তাশ্পতাব লক্ষণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এবং মূত্র পরীক্ষা করিলে ক্যান্সার কোষ, কনেক্টিভ টিস্যুস্ স্ফ্রা ও বক্তকণা দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা।—উপযুক্ত পথ্যাদি দ্বাৰা যত দিন সম্ভব বোগীকে জীবিত রাখিতে চেষ্টা করিবে এবং অহিফে, বেলেডোনা প্রভৃতি অব-সাদক ঔষধ দ্বাৰা যাতনা নিবারণ করিবে।

য়্যামোনিয়া কার্বনেটিস	৩০ গ্রেণ।
টীংল্যাবেণ্ডিউলা কম্পজিটা	২ আং।
ইন্ফিউজন্ সিঙ্কোনা ফ্লোঃ	৭২ আং
ছয় মাত্রা। ছয় ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা অথবা,—	
য়্যামোনিয়া কার্বনেটিস	৩০ গ্রেণ।
স্পিবিটাস্ ইথাবিস্	২২ ড্রাম।
ইন্ফিউজন্ ক্যাবিওফিলি	৭২ আং।

ছয় মাত্রা। প্রতি দিন তিন বাব সেবন বিধি

মূত্রপিণ্ডের টিউমারকেল —মূত্রপিণ্ডেব কটিকল অংশে প্রথমতঃ নডিউল আকার ধূসর বা পীতবর্ণ টিউমারকেলে দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহা মিলিত হইয়া কেজিনবৎ অবস্থা প্রাপ্ত ও কোমল হইয়া যে সকল বিষম্ স্ফোটকবৎ গহ্বরব নিৰ্মিত হয়, তাহাদেব সহিত মূত্র-পথেব সমাগম হওয়ায়, ঐ পথ দিয়া টিউমারকেল পদার্থ ও পুঁজ বহির্গত হয়।

লক্ষণ।—প্রথমত মূত্রপিণ্ডে অতীব বেদনা ও সৰ্বদা মূত্রভ্যাগ হইতে থাকে, দেহের অত্যন্ত শীর্ণতা, দৌৰ্বল্য ও হেটিক জ্বর হয়, এবং কিছু দিবস পরে ফুস্ফুস্, অন্ত্র বা অন্যান্য যন্ত্র আক্রান্ত হইলে উহাদেব পীড়াব লক্ষণ প্রকাশ পায় সৰ্বত্রই মূত্রেব পবিগণ অস্পষ্ট হয় উহা

অপ্পা অগ্নাও হয় ও উহাতে অধিক পবিমাণে পুঁজ ও অনেক স্থলে
বক্ত থাকে

চিকিৎসা — ক্ষত শুকাইবার জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে
পাল্‌ভেবিস্ গোমাইসি ৪০ গ্রেন
পোটালি ব্রোমাইড . ৩০ গ্রেন ।
ম্যাংগ্নেসি ক'র্বনেটস ৬০ গ্রেন
ছয়টি মোড়া প্রস্তুত করিয়া প্রতিদিন ৩ মোড়া সেবন করাইবে ।

বক্তজাব নিবাবণার্থ,—

গ্যালিক য়াশিড্ . ১২ গ্রেন ।
পল্‌ব ইপিক্যাক্ কমঃ ওপিও . ৫ গ্রেন ।

এক পুবিয়া এই কপ এক একটী ৮ বা ১২ ঘণ্টা অন্তর দিবে

পেল্‌ভিক ভিসিবার্‌ব পীডা নিবাবণার্থ,—

জিঙ্গ অক্সাইডি ৬০ গ্রেন
এক্সট্রাক্ট বেলডোনা . . ৪০ গ্রেন
বিউটরি ক্যাকোয়া . . ১ আং
ওলিয়াই ওলিভ ১২ ডাম ।

৮ মাত্রা বিবেচনামত প্রয়োগ করিবে ।

রক্তসংস্থানজনিত কষ্ট নিবাবণ করিতে হইলে, শুক ইবার যে ঔষধ
ব্যবস্থা করা গিয়াছে, তাহাই প্রয়োগ করিবে

প্যারাসাইটিক্ বা পরাস্ পুষ্টির বর্ধন ।—কখন কখন মূত্র-
পিণ্ডের, বিশেষতঃ বাম পিণ্ডে হাইড্রেটিড টিউমার জন্মিয়া থাকে এবং
অবশেষে উহা আয়তনে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে .

লক্ষণ এই টিউমার প্রায়ই গোলাকার হইয়া থাকে কখন
বিষম ও খণ্ডযুক্ত, স্থিতিস্থাপক অথবা ক্রিয়ৎপবিমাণে সঞ্চালনশীল,
মূত্রপিণ্ডে তীব্র বেদনা অনুগান, কখন কখন মনে হয় যেন ঐস্থানে কিছু
বিদীর্ণ হইল, ইউরিখার শেষ পর্য্যন্ত স্থানে অতিশয় বেদনা, সর্বদা মূত্র-
ত্যাগে ইচ্ছা ও মূত্রত্যাগে ক্রিয়ৎপবিমাণে অসমর্থতা, অবশেষে প্রাণ-
বেব সহিত বক্ত, পুঁজ দেখিতে পাওয়া যায় .

য়্যালোপ্যাথিকে মূত্রপিত্ত ও মূত্রাণয়ের পীড় র চিকিৎসা। ২৯৩

কখন কখন মূত্রপিত্তে নিম্নলিখিত য়্যাণ্টোজোয়া সকল দেখা গিয়া থাকে এই সকল কীট দেহেব অত্যাশ্রয় স্থলেও দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে তত অনিষ্টকাবক হয় না, মূত্রপিত্তে ইহাবা অত্যন্ত অনিষ্টকর এই কীট থাকা সত্ত্বে, কোন কোন দেশে এপিডেমিকরূপে হিম্যাটিউবেয়া প্রকাশ পায়। শৈল্পিক ঝলীকে উন্নত বালবর্ণ একিমোমিসমুক্ত চিহ্ন, স্থানিক প্রদাহ, তাহাব পবে পুঁয়োৎপত্তি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হইতে দেখা যায়

চিকিৎসা —কীটধ্বংসেব এবং অত্যাশ্রয় উপসর্গের প্রতিকারার্থ নিম্নোক্ত ঔষধ বিধেয়

য়্যালিড সল্ফিউরিক্ য়্যাবোমেটিক্	..	১২ ড্রাম
টীং ক্যাম্ফর কন্ ওপিযাই	.	২ আং।
য়্যাকোয়া সিনেমন্	..	৭২ আং।

ছয় মণা আহাবের পূর্বে প্রতিদিন তিনবাব খাইতে দিবে।

সিষ্টিক পীড়া।—অনেকে অনুমান করেন যে, প্যাল্পিগিয়ানু ক্যাপ্‌সিউল সকল অথবা অবকদ্ধান্ত মূত্রাশ্রয়ণালী প্রসাৰিত হইয়াই সিস্টের উৎপত্তি হয় জীবিতাবস্থায় এই সকল সিস্ট হইতে একটা টিউমার জন্মিয় থাকে কখন কখন ঐ টিউমার অত্যন্ত বড় হয় এই পীড়ায় প্রায়ই ইউরিমিয়াব লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া বাগী প্রাণত্যাগ কবে

হাইড্রোনিফোসিস্ বা মূত্রপিত্তের শোথ।—যে কোন কাবণে ইউবিটারের স্থায়ী অবরোধ হইলে এই অবস্থা হইতে পাবে অনেকের জন্মাবধি এই ঘটনা ঘটিতে পাবে, কিন্তু ইউবিটারের মধ্যে শিলা বা অথ কোন পদার্থ বদ্ধ হইয়া, যান্ত্রিক পরিবর্তন বা ক্ষত প্রযুক্ত উহাব স্ফীকৃচা হইয়া—অথবা কোন টিউমার দ্বারা নিপীড়িত হইয়া এই বোগ জন্মিতে পারে।

লক্ষণ।—ইউবিটবেব অবরোধ জানিতে পাবিলেই এই পীড়া সন্দেহ করা যাইতে পাবে। প্রভাবের বিশেষ পরিবর্তন না হইয়া যদি মূত্রপিত্তে বেদনাহীন, কোমল, কিছু পরিমাণে সঞ্চাৎনশীল টিউমার প্রকাশিত হয়, তবে এই পীড়াপ্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে কখন

কখন হঠাৎ অববোধ নিবাবিত হইয়া টিউমার অদৃশ্য হয় এবং অধিক পরিমাণে মূত্র নির্গত হয় । ইহাব পর টিউমারের স্যাক শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে । কখন উভয়দিকে হাইড্রোনিফোসিস্ হইলেও অনেক দিন পর্যন্ত ইউরিনিয়ার কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় না ; কিন্তু এইরূপ স্থলে বোগীব মৃত্যু হয়

চিকিৎসা — বোগীকে সর্বদা স্থিতিবৎবে রাখন করাইয়া রাখিবে, প্রস্রাববোধ নিবারণ জন্ত মূত্রকাষক ঔষধ দিবে, ইত্যাদি

ক্যাল্কিউলস্ ডায়াথিসিস্ বা শিলাধাতু ।—দৈহিক কাবণ-বিশেষের দ্বারা প্রস্রাবের সহিত নানা প্রকার ঘন পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় এই সকল পদার্থ জমাট হইয়া শিলা বা পাথরী জন্মে

মূত্রেব এই ঘন পদার্থ অতি সূক্ষ্ম হইলে ইহাকে অধঃপতিত সামগ্ৰী কহা যায় উহাবা কঙ্করবৎ দৃঢ় বৃহৎ হইলে গ্রাভেল বা অশ্মরী বলে, এবং ক্ষুদ্র প্রস্তর বা নুড়ী ব হয় বৃহৎ হইলে উহাদিগকে ক্যাল্কিউলস্, স্টোন বা পাথরী বলা গিয়া থাকে ।

যে সকল দৈহিক অবস্থা বিদ্যমানে এই পীড়া জন্মে, তাহাদিগকে সচবাচর ডায়াথিসিস্ বলে ইহাদের মধ্যে লিথিক, অগ্জ্যালিক ও অস্ফ্যাটিক্ য়াশিড ডায়াথিসিস্ এই তিন প্রকার ধাতু প্রধান ।

ইহাদের কাবণ, লক্ষণ এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে কয়েকটি স্থল স্থল বিষয় লিপিবদ্ধ হইতেছে

লিথিক য়াশিড ডায়াথিসিস্ —এই ধাতুতে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম, কখন অত্যুৎপ কখন বা অতিশয় অধিক হয় কিন্তু প্রায়ই দেহ সাতিশয় দুর্বল, এবং অজীর্ণের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে মূত্রে অধিক পরিমাণে অধঃপতিত পদার্থ দেখিলে পাওয়া যায় প্রদাহ, জ্বর, ব্যাক্রিকালৌহস্তপদাদিতে মোচড়ানর স্থায় বেদনা, সর্বদা অধিক মাংসাহার, শ্রমোভাব ও ত্বক অপবিকৃত হইলে এই রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা । জল বায়ুর সহিত এই বোগের অধিক সম্বন্ধ আছে চল্লিশ হইতে ষাইট বৎসরের মধ্যে এই পীড়া প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় জ্বর বা বাতের স্থায় অধিক পরিমাণে টিশুর ধ্বংস, এবং মত্র কতিপূর্বণের অভাব,

য়্যালোপ্যাথিকে মূত্রযন্ত্র ও মূত্রাশয়ের পীড়ার চিকিৎসা । ২৯৫

অত্যপ্প পৰিভ্রমেব সহিত অধিক মাংসভোজন, অজীর্ণতা বা অন্য কোন কাৰণে আহাবীষ দ্রব্যেব সমীকরণেব ব্যতিক্রম, ত্বকের ক্রিয়া হানি, যান্ত্রিক আঘাত বা অন্য কাৰণে মূত্রপিণ্ডেব রক্তাধিক্য হয়

চিকিৎসা — পীড়ার কাৰণ বিশেষকপে অনুসন্ধান কৰিয়া চিকিৎসা কৰিতে হইবে ত্বক ও অন্ত্ৰেব ক্রিয়াব প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক। মূত্ৰেব দ্রবীভবন শক্তিব বৃদ্ধিজন্য অম্ল পৰিমাণে তরল দ্রব্য পান কৰিতে দিবে মূত্ৰকাষক ঔষধ এজন্য ব্যবস্থা কৰা যায় ইউ-রিক য়াশিডেব অল্পত্ব দূৰ কৰিবাব জন্য য়াল্‌কালাই ব্যবহার প্রয়োজন হয়। আহাবেব দুই ঘণ্টা পূৰ্বে অৰ্দ্ধ ড্রাম পৰিমাণে বাইকাৰ্বনেট অফ পটাশ অধিক জলেব সহিত মিশ্রিত কৰিয়া সেবন করান আবশ্যক গাউট বা বিউম্যাটিজম্ থাকিলে উহাব সহিত কল্‌চিকম সংযোগ কৰিলে বিশেষ উপকাৰ দৰ্শে

অগ্জ্যালিক্ য়াশিড ডায়াথিসিস্ অত্যন্ত শাবীৰিক ও মানসিক পৰিভ্রম, অত্যন্ত বতিক্রিয়া, আহাবেব অনিয়ম, বাত্রে শৈত্য লাগান, পৃষ্ঠবংশেব নিম্নে আঘাত ইত্যাদি কৰণে এই পীড়া জন্মে।

লক্ষণ — বোগী দুৰ্বল, নিশ্বেজ, শীর্ণ ও নিশ্চেচ্চ, চক্ষু ও মুখমণ্ডলেব বর্ণ পাঙ্গাশ বা কটা, ত্বক আঁসবৎ স্ফোটকযুক্ত, অপ্প প্রমেই ক্লান্তি-বোধ, সম্ভাব কক্ষ, রোগী সৰ্বদাই আত্মপীড়াব বিষয় চিন্তা কৰে, এবং আরোগ্যলাভে হতাশ হয় অজীর্ণতা, উদরাগান ও আহাবেব পৰে হ্রদ্বপন হইতে পাবে কটিদেশে বেদনা ও মৈথুনশক্তিব অনেক হ্রাস, কখন কখন ক্ষয়কাশেব লক্ষণ প্রকাশিত হয়, এবং ইহাব সহিত হৃৎপিণ্ডেব পীড়াও জন্মে সৰ্বদাই প্রত্নাৎ ত্যাগ কৰিবাব ইচ্ছা ও প্রত্নাৎ কৰিবাব সময় মূএদ্রাব উত্তৰোধ ও উহাতে যাতনা হয়

চিকিৎসা — ত্বক ও অন্ত্ৰেব ক্রিয়া যাহাতে প্রকৃত অবস্থায় থাকে, তাহাব প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে লঘু এবং পুষ্টিকৰ দ্রব্য খাইতে দিবে, স্নৰা পরিত্যাগ কৰিবে নিতান্ত আবশ্যক হইলে অত্যপ্প পৰিমাণে ত্রাণ্ডি জলেব সহিত খাইতে দিবে। চিনি খাইতে সম্পূৰ্ণ নিষেধ ঔষধেব মধ্যে নাইট্ৰোমিউৰিষেটিক্ য়াশিডে বিশেষ উপকাৰেব আশা কৰা যায়।

জিহ্বা এবং লৌহযুক্ত ঔষধও বিশেষ উপকারী। এই ধাতু ক্রমে ইউরিক য়াশিডরূপ ধাতুতে পরিণত হইতে পাবে, তজ্জন্য অল্প ব্যবহার দ্বারা চিকিৎসা বিহিত নহে।

ফস্ফ্যাটিক য়াশিড ডায়াথিসিস্।—দুর্বলতাই সর্বপ্রধান লক্ষণ। বোগী দুর্বল, শ্বাসপ্রাধান-ধাতুবিহীন, বক্তবিহীন, মানসিক বা শারীরিক শ্রমে অক্ষমতা, যন্ত্রের ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য ও কটিনেশে সর্বদা বেদনামুভব হয়।

চিকিৎসা —অন্যান্য ধাতু ন্যায্য চিকিৎসা করিবে। ঔষধের মধ্যে মিউবিষেটিক্, নাইট্রিক বা নাইট্রোমিউবিষেটিক্ য়াশিডদ্বারা ফস্ফেট পদার্থ জরীভূত ও অন্ত্রবহা বাড়ী বলবৃদ্ধি হয়। এই সকল ঔষধের সহিত পুষ্টিকর ও অনায়াসপাচ্য জব্যাদি আহার দিবে। অধিক উত্তেজাদি বা মদ্য একবারে পরিভ্যাগ করিবে।

রিনাল্ ক্যাল্কিউলাই বা মূত্রপিণ্ডে শিলা —মূত্রপ্রস্থি-
মধ্যে যে সকল কঙ্কর দেখা যায়, তাহা প্রায়ই ইউরিক য়াশিড ও অগ
জেনেট অফ লাইম দ্বারা প্রস্তুত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু সমুদায় একত্র
হইয়া অথবা সংযত বক্ত কাইব্রীণ বা অন্য কোন পদার্থের চতুর্দিকে
সঞ্চিত হইয়া ইহা উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ।—কোমবে মন্দ মন্দ বেদনা ও ভারবোধ, মূত্রপিণ্ডে সূচ্যপ্র-
বেধনেন ন্যায্য বেদনামুভব হয়, পাকশায়ের উত্তেজন, ও মধ্যে মধ্যে
বমন হইতে পাবে, কোন প্রকার শারীরিক পরিশ্রমে পৰ মূত্রের সহিত
বক্ত বা সংযত কাইব্রীণ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষণে ক্ষণে মূত্রত্যাগের
ইচ্ছা হয়, এবং মূত্রদ্বারের অগ্রভাগে বেদনা ও আক্রান্তিকের অণুকোষ
টান বোধ হয়, আক্রান্তিকের উত্তেজিত স্পর্শামুভববাহিত্য, বেদনা ও
অঙ্গপ্রস্থ হইতে থাকে। উত্তেজন জন্য মূত্রপিণ্ডের প্রদাহ হইয়া জ্বরভাব
হইতে পাবে। কখন কখন মূত্রপিণ্ড হইতে পুঁষ নির্গত হয়।

কঙ্কর মূত্র পিণ্ডে সঞ্চিত হইবার কিছু দিন পাবে মূত্রপ্রণালী দিয়া
নীচের দিকে আসিতে থাকে। ঐ কঙ্কর ক্ষুদ্র এবং পবিত্র হইলে নাগি-
বাব সময় বিশেষ কষ্ট হয় না, কিন্তু বড় এবং কোণযুক্ত, অথবা উষ্ণা খুস্কা

য়্যালোপ্যাথিকে মূত্রযন্ত্র ও মূত্রাশয়ের পীড়ার চিকিৎসা। ২৯৭

হইলে মূত্রপ্রণালীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল উপস্থিত করে

বমন হইতে থাকে, দেহ শীতল, কঙ্গিও ও ঘর্ষাক্ত হইতে পারে এবং দাক্ষিণ্য অসহ্য বেদন মূত্রপিণ্ড হইতে উৎদেশে বিস্তারিত হয় কখন কখন অণ্ডকোষের উত্তেজন, বেদনা ও উহাতে টান বোধ হয়। নাড়ীর ব্যতিক্রম ঘটে না, কেবল মূত্রাশয়ের প্রদাহ হইলে পবিত্রতন ঘটিতে দেখা গিয়াছে যদি ইউরিটাইটসের মধ্যে কঙ্গর আবদ্ধ থাকে এবং কোন মতে অধোগামী না হয়, তবে উপবোক্ত লক্ষণগুলির আতিশয্য হয়। অনেক স্থলে প্রস্রাব দ্বারা ইউরিটাইট প্রসারিত হওয়ায় কঙ্গব মূত্রাশয়ে পতিত হয়, ও রোগীর সকল কষ্ট দূর হয়। কিন্তু অধঃপতিত না হইলে ক্রমে মূত্র সঞ্চিত হইয়া মূত্রপিণ্ডেব নিষ্কাশনবিকার প্রযুক্ত মূত্র নির্গত না হওয়ায়, বোগী প্রাণত্যাগ করে

চিকিৎসা। — দুই প্রকারে এই বোগের চিকিৎসা হইতে পারে কঙ্গর বাহির হইবার সময়ে বোগীর ক্লেশ নিবারণ, আর শীলধাতু বিদ্যমান থাকিলে, বদ্ধাবস্থা নিবারণ পদার্থ সঞ্চিত না হয় তাহার উপায় বিধান করা কর্তব্য

কঙ্গব অধোগামী হইবার সময় গবম জলের ফোমেণ্টেশন বড় উপকারী কখন কখন বোগীর এত যত্ননা হয় যে, ক্লোবোফর্ম দ্বারা অচেতনতা করা আবশ্যিক হইতে পারে। এই ঔষধ সেবন করাইলেও কঙ্গব নির্গত হইয়া থাকে বেলেডোনা দ্বারাও বিশেষ ফল পাওয়া যায় অহিফেন, মর্ফিন প্রভৃতি অবসাদক ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই সকল ঔষধ সেবনের পূর্বে অধিক মাত্রায় জলীয় দ্রব্য ও দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া কর্তব্য। কোন কোন স্থলে বিবেচক ঔষধ দ্বারা উপকার দর্শে। কঙ্গর অতি বৃহৎ আকার ধারণ করিয়া মূত্রপিণ্ডে আবদ্ধ থাকিলে কেহ কেহ উদর প্রাচীর কর্তন করিয়া উহা বাহির করিবার উপদেশ দেন।

মূত্রাশয়ের উত্তেজনা। — এই বোগে নিবৃত্তব মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হয়। মূত্রপিণ্ড বা মূত্রাশয়ের ক্রিয়াবিকার, দৈহিক জায়বীয় উত্তেজন,

মূত্রাশয়েব ভিত্তব টিউমার বা পাথরী, অর্শজন্য উত্তেজন, জ্বায়ুব সংস্থান
ভ্রংশ, গর্ভাবস্থা বা টিউমারজনিত উত্তেজন, মূত্রপিণ্ড, মূত্রাশয়, প্রোষ্টেট-
গ্রান্ডি ও মত্রমার্গের যান্ত্রিক পীড়াবশতঃ এই রোগ জন্মে

লক্ষণ ।—ক্ষণেক্ষণে মূত্রত্যাগেব ইচ্ছা, এই ইচ্ছা নিবারণ করিবার
চেষ্টা করিলেও বিশেষ কষ্ট হয় এই পীড়া হিষ্টিরিয়া জন্য না হইলে
প্রস্রাব তথিত হয় ন একপং হইলে প্রস্রাবেব ঘন পদার্থ অপেক্ষা
জলীয়াংশেব বৃদ্ধি হইয়া থাকে কিছু দিন এই অবস্থায় থাকিলে মূত্রা-
শয় খর্ব হয়, তাহা হইলে উচ্চাব মধ্যে ২ ৩ আউন্সেব অধিক মূত্র
থাকিতে পাবে না ।

শৈশবাবস্থায় ক্রিমি জন্ত মূত্রেব বেগধাবনে অসমর্থতা জন্মে প্রৌঢ়া-
বস্থায় ইচ্ছা অসত্ত্বে মূত্রপিণ্ড হইলে মূত্রাশয় বিস্তৃত হওয়া জানিতে
হইবে

চিকিৎসা ।—চা, কফি প্রভৃতি উষ্ণ পানীয় পবিত্যাগ করিয়া সব-
বৎ ইত্যাদি স্নিগ্ধ জিনিষ ব্যবহার করা কর্তব্য

মূত্র অধিক ক্ষাব অগ্নাক্ত হইলে নাইট্রোমিউবিয়োটীক য্যাশিড,
টীং বেলেডোনা, ডিকক্সন প্যাবেবা এক মাত্রা, আবশ্যিক মত প্রয়োগ
কবিবে মূত্র অধিক অগ্নাক্ত হইলে লাইকর পোটাসি, ডিকক্সন বুকুব
এক মাত্রা । দিবসে ২ বাব সেবন কবিতে দিবে ।

বাত্রিকালে স্ননিদ্রা না হইলে অহিফেন, হায়েসামেসমস্ অথবা
বেলেডোনা ব্যবহারে উপকার দর্শে

সাধাবণ দৌর্বল্য অথবা জীলোকেব বজোনিঃসবর্ণেব সহিত এই
রোগ হইলে লৌহঘটিত ঔষধে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, এজন্ত টীং
ফেবিমিউবিয়োটিস, টীং ক্যান্থারাইডিস্ ও জল এক মাত্রা । দিবসে
তিনবার সেবন কবান যাইতে পাবে

ছেলেদের ইচ্ছা না থাকিলেও যে মূত্রত্যাগ হয়, তজ্জন্ত বেলেডোনা
দেওয়া গিয়া থাকে প্রাতঃস্থান এবং কডলিবার অয়েল ব্যবহারেও
উপকার দর্শে জীলোকদিগেব যোনিতে বেলেডোনা এবং অক্সাইড
অফ জিঙ্কের পেসাবি প্রয়োগে পীড়াব উপশম হয়

ম্যালোপ্যাথিকে মূত্রযন্ত্র ও মূত্রাশয়ের পীড়ার চিকিৎসা। ২৯৯

মূত্রাশয়ের স্প্যাজম বা আক্কেপ। দৈহিক অন্যান্য যন্ত্রের
যে রূপ আক্কেপ হয়, মূত্রাশয়েও সেইরূপ হইয়া থাকে

লক্ষণ।—উদরের নিম্নভাগে অত্যন্ত বেদনা হয়, ইচ্ছা নাই তথাপি
মূত্রত্যাগ হইতে পাবে, কিন্তু প্রায়ই মূত্রাণবোধ হয় মূত্রত্যাগ কবিরায়
ইচ্ছা হয়, কিন্তু প্রাপ্তব হয় না। দীর্ঘকাল এই পীড়া থাকিলে বোগীব
মৃত্যু হইতে পাবে।

চিকিৎসা।—উষ্ণ জলে স্নান ফোমেন্টেশন, অথবা কোন অবসা-
দক ঔষধ প্রয়োগে আক্কেপ নিবারণ হয় নিকটবর্তী কোন যন্ত্রের
বিকৃতি জন্ত এই পীড়া জন্মিলে টীং ফেব্রিমিউরিয়েটিস্ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ
কবিলে ফললাভ কবা যায় পেবিনিয়মে কপূরমিশ্রিত পুন্টিশ দিনে
উপকার হয়। আশু প্রতিকাবেব জন্ত ইথাব, মর্ফিয়া ও বেলেডোনা
উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এ অবস্থায় কোন প্রকার উত্তেজক খাদ্য দিবে না। কেবল দুগ্ধ,
ভিষ প্রভৃতি খাদ্য ব্যবস্থা করিবে যাহাতে বোগীব গায়ে শীতল
বাসব অথবা কোন প্রকারে শৈত্য না লাগে, তাহাব বন্দেবস্ত করিতে
হইবে স্রীমহবাস ও পবিত্রম একবাবে পরিত্যাগ কবিবে

মূত্রাশয়ের প্যারালিসিস্ বা পক্ষাঘাত —মূত্রাশয়েব কোন
ক্রিয়া প্রযুক্ত অথবা স্নায়ুকেন্দ্রেব কোন পীড়া, এবং শারীরিক দৌর্বল্য
হেতু মূত্রাশয়েব পেশী নিষ্ক্রিয় হয় অর্থাৎ কোন কাজ করিতে পাবে না।

লক্ষণ।—প্রস্রাব বন্ধ হয়; মূত্রে স্যামোনিয়াব ত্রায গন্ধ এবং
উচ্চ স্ফারাক্ত হইয়া থাকে মূত্রাশয়ের গ্রীবা ও সিস্তমণিতে বেদনা,
মূত্রাশয়েব স্পর্শানুভবশক্তিব অভাব হওয়ায় মূত্রত্যাগেব ইচ্ছা থাকে না,
নাড়ী ক্ষতগামী ও দুর্বল, জিহ্বা লেপযুক্ত, অগ্নিমান্দ্য, রাত্ৰিকালে ভাল
নিদ্রা হয় না, মানসিক বিকৃতি ও ক্রমশঃ জীবনীশক্তির হ্রাস হওয়ায়
দৌর্বল্য হেতু রোগী প্রাণত্যাগ কবে

মূত্রেব বেগ সহ কবা অর্থাৎ যখন প্রস্রাবেব বেগ হয়, মূত্রাশয় পবি-
পূর্ণ হইয়া উঠে, সে সময় প্রস্রাব ত্যাগ না করিয়া থাকিলে এই ব্যাধি
জন্মিয়া থাকে :

চিকিৎসা ।—মূত্রাশয় সাতিশয় প্রসারিত হওয়া প্রযুক্ত এই পীড়া হইলে শলাকা ব্যবহার দ্বারা প্রসার কবাইবে, কিন্তু সাবধান হইতে হইবে যেম এককালে মূত্রাশয়স্থ সমস্ত মূত্র নির্গত হইতে না পারে, সেকপ হইলে হঠাৎ রোগীৰ মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা

দিবসে ২ ও বাব ২. গ্রোন মাত্রায় জীক্‌নিয়া, অথবা আর্গট অফ বাই সেবন কবাইয়াও ফললাভ হইয়া থাকে ইলেক্ট্রিসিটি প্রয়োগ, শীতল জলে স্নান, পৃষ্ঠবংশেব নিয়ন্ত্রণেবেলেক্ত্রাবা, য়ালোসংযুক্ত মৃদু বিরেচক ঔষধ প্রয়োগে উপকার হইবার সম্ভাবনা মস্তিষ্ক অথবা কশেককা মজ্জাব পীড়াবশতঃ এই বোগ যটিলে মধ্য মধ্য শলাকা দ্বাৰা মূত্র ত্যাগ কবাইবে এবং উৎকট বোগেব চিকিৎসা কবিবে

মূত্রাশয়েব প্রদাহ —নানা কাবণে এই বোগ জন্মে । এই প্রদাহ দুই প্রকাব,—প্রবল ও পুৰাতন অনেক স্থলে বহুদিনেবু পুৰাতন প্রদাহ হইতেও প্রবল জন্মিয়া থাকে

লক্ষণ ।—কম্প, মূত্রাশয়েব উপব দাকণ বেদনা, মূত্রমার্গেব মধ্য উষ্ণতা, সৰ্বদা মূত্রত্যাগে ইচ্ছা, অল্প পৰিমাণে প্রসার, প্রখর জ্বর, বমনোদ্বগ, মানসিক দৌৰ্বল্য, সাধাবণতঃ দৈহিক অসুস্থতা, ইত্যাদি ইহার প্রধান লক্ষণ মূত্রত্যাগেব পবেই ঐ বেদনাৰ হ্রাস হয়, আবার যখন মূত্র সঞ্চিত হইতে থাকে, তখনই বেদনাৰ সূত্রপাত ও মূত্রসঞ্চয়েব সহিত উত্তোষ ও উহাব বৃদ্ধি হয়

চিকিৎসা ।—অন্যান্য প্রদাহেব স্থায় ইহাব চিকিৎসা কবিতে হইবে । তজ্জন্ত অহিফেন ও বেলেডোনা সেবন বা উহাদেব বাহ প্রয়োগ কবিবে ফোমেন্টেশন, গরম জলে কটি পর্যন্ত ডুবাইয়া রাখা, কোষ্ঠ পৰিকাব রাখিবাব জন্ত এবং তৈল সেবন কবাইয়া বিশেষ উপকাব ~~প্রদায়~~ মূত্রাববোধেব লক্ষণাদি প্রকাশ পাইলে শলাকা দ্বাৰা প্রসার কবাইবে এইরূপ ব্যবস্থা কবিয়া তাহাদেব সহিত লঘু আহাব দিবে, বোগীকে স্থিৰভাৱে বাখিবে, এবং যখনই দৌৰ্বল্যেব লক্ষণ দেখিবে, তখনই তাহাব প্রতিকাব কবিবে

মূত্রাশয়েব পুৰাতন প্রদাহ ।—কোন প্রকাৰ পীড়াভোগেব

ম্যালোপ্যাথিকে মূত্রযন্ত্র ও মূত্রাশয়ের পীড়ার চিকিৎসা ৩০১

পৰ এই ব্যাধি জগিতে পাবে, তদুভিন্ন আবণ্ড বহুতব কাবণে ইহার উৎপত্তি হয়

লক্ষণ ।—দৈহিক অসুখ, মূত্রাশয়েব প্রাচীবেব স্পর্শানুভব শক্তির হ্রাস, সর্বদা মূত্রত্যাগে ইচ্ছা, মূত্র পবিমাণে অল্প ও তাহার সহিত পুঁথ মিশ্রিত থাকে । কখন কখন মূত্রাশয়েব মৈথিক ঝিল্লীৰ শিক্রিশনেব আধিক্য হেতু মূত্রেব সহিত অধিক পবিমাণে অর্ধ স্ফুট নির্য়ামবৎ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় এই অবস্থাকে মূত্রাশয়েব ক্যাটাব বলে

চিকিৎসা ।—দূষিত মূত্র নির্গত করিবার জন্য *লাকা প্রয়োগ আবশ্যক হয় ।

আধ সেব জলের সহিত ২০ গ্রেণ পবিমাণে একফ্রাক্ট অফ হায়েমায়ে-মস্ বা ৫ গ্রেণ একফ্রাক্ট অহিফে মিশ্রিত করিয়া অথবা সস্কোচক ক্রিয়াব প্রয়োজন হইলে ২।৩ বিন্দু নাইট্রিক ম্যাগনিড ১৪ আউন্স জলের সহিত মিশাইয়া মূত্রাশয় ধৌত করিয়া দেওয়া কর্তব্য

ঔষধের মধ্যে ইন্ফিউজন্ ইউভাআনাই বা বুকু ও ডিককান প্যারেরা দেওয়া উচিত আইসুলও দেশীয় মশু, খব অথবা মসিনা সিদ্ধ কবিয়া তাহার জল পান কবিতে দিলে বিশেষ উপকাৰেব সম্ভাবনা । অহিফেণ ও বেলেডোনার পেসাবী—স্রীলোক হইলে অক্সাইড অফ জিঙ্কের সহিত বেলেডোনার পেসাবী ব্যবহারে বাত্রিকালের অনিদ্ৰা দূৰ হয় ।

মৎস্য, মাংস, অর্ধসিদ্ধ ডিম্ব ও দুগ্ধ, বিবেচনানুসাবে মদিরাদি পুষ্টি-কর পথ্য ব্যবহার্য্য । পরিপাকশক্তির হানি হইলে আহারীয়েব সহিত পেপ্সিন গ্রহণ করা কর্তব্য । শাবীরিক শ্রম একেবাবে পবিহার্য্য

মূত্রাশয়ের টিউমার ।—অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় মূত্রাশয়েও টিউমার হইতে পাবে উহা যে প্রকারেব হউক না কেন, পাথরীর ন্যায় লক্ষণাদি প্রকাশ পায় যথা,—গতত মূত্রত্যাগ, মূত্রত্যাগকালে, এক প্রকার অসুখ ও যন্ত্রণা, মধ্যে মধ্যে মূত্রেব সহিত পুঁথ মিশ্রিত থাকে

চিকিৎসা ।—যন্ত্রণানিবারণ জন্য অহিফেন ও অন্যান্য অবসাদক ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে । রক্তপ্রাব নিবারণ জন্য সংকোচক ঔষধ, দৌর্বল্য নিবারণ জন্য বশকাসক ঔষধ ও পুষ্টিকর পথ্যেব প্রয়োজন । এই সকল প্রক্রিয়া দ্বাৰা বোগেব যাতনা মাত্র নিবারিত হইবে । তিস্তিন্ন বোগ নষ্ট কবিবার সম্ভাবনা নাই ।

বৈদ্যকে মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগ চিকিৎসা ।

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের কারণ ও উৎপত্তি ।—অত্যন্ত পুবিশ্রম, ভীক্ষুবীৰ্য্য ঔষধ ও কক্ষ্য দ্রব্য সেবন, অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গ, অতিশয় মদ্য পান, হস্তী-ঘোটকাদিতে দ্রুত গমন, মজল ভূমিজাত প্রাণীর মাংস-ভক্ষণ, উপর্যুপরি ভোজন, অজীর্ণ প্রভৃতি কারণে কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ, বস্তিস্থানে যাইয়া মূত্রকৃচ্ছ্র বোগ জন্মায় । কষ্টে প্রত্ৰাব হয় বলিয়া ইহার নাম মূত্রকৃচ্ছ্র ।

মূত্রকৃচ্ছ্রের প্রকারভেদ —বাতাদি ভেদে ইহা আট প্রকাব যথা,—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, শৈল্যজ, পুৰীযজ, অশ্মরীজ ও শর্করাজনিত ।

বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ ।—বাতজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র বোগে কঁচুকি, বস্তি ও লিঙ্গানলে অত্যন্ত বেদনা হয় এবং এমশঃ অঙ্গ অঙ্গ করিয়া প্রত্ৰাব নির্গত হয় ।

চিকিৎসা ।—কুশ, কাশ, শর, উল্লু ও কৃষ্ণ ইক্ষু ইহাদেব মূল মিলিত ২ তোলা জল অর্দ্ধ সেব, শেষ অর্দ্ধ পোয়া । এই কাথ পান করিবে । উল্লুর পরিবর্তে বেণার মূল ব্যবহৃত হয় । ইহাব নাম “পঞ্চভূগ মূল ।”

পঞ্চভূগ ক্ষীর ।—গুশাদি পঞ্চভূগ মূল মিলিত ২ তোলা, দুগ্ধ ১

পোয়া, জল ১ সের সমুদয় একত্র পাক কবিয়া সমুদয় জল নিঃশেষিত হইলে সেই ক্ষীৰ পান কবিবে ।

পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র লক্ষণ ।—পিত্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র বোগে বস্তিতে বেদনা ও জ্বালা জগ্নায় এবং প্রস্রাব বক্তিমিশ্রিত ও পীতবর্ণ হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—আমলকী, জাফা, ভূমিকুশ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, গোক্ষুববীজ, মিলিত ২ তোলা, জল আধ সেব, শেষ ৮০ পোয়া শীতল হইলে চিনি অর্দ্ধ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন কবিবে ইহাব নাম “ধাতাদি ”

শতাবর্যাদি ।—শতমূলী, কাসমূল, কুশমূল, গোক্ষুববীজ, ভূমিকুশ্মাণ্ড, শালি তণ্ডুল, কৃষ্ণ ইক্ষু মূল, কেশব, সমুদয়েব কাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া শীতল করিয়া সেবা

ওড়ের সহিত আমলকী খাইবে

কাঁকড় বীজ, যষ্টিমধু, দাকহরিজা, তণ্ডুলেব জলের সহিত সেবা বা আমলকী রস ও মধুব সহিত দাকহরিজা বাটিয়া খাইবে ।

কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র লক্ষণ —কফজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র বস্তি ও লিঙ্গানলে শোথ হয় এবং মূত্রেব পিচ্ছিলতা জন্মে

চিকিৎসা ।—মৃত ৪ সেব । কাথার্থ—গোক্ষুব ২ সের, জল ১৬ সেব, শেষ ৪ সেব, এবণ্ড মূল ২ সেব, তৃণ পঞ্চমূল মিলিত ২ সেব, জল ১৬ সেব, শেষ ৪ সেব, শতমূলীব রস ৪ সেব, কুশ্মাণ্ড রস ৪ সেব, ইক্ষু-রস ৪ সের ; পাক সিদ্ধ হইলে উষ্ণাবস্থায় ছাঁকিয়া ২ সেব চিনি মিষ্টাইয়া নাড়িয়া লইবে অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ ইহাব নাম “ত্রিকণ্টকাদ্য মৃত ”

তারকেশ্বর রস ।—পাৰা, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, অত্র, ছবালভা, যব-ক্ষার, গোক্ষুব বীজ, হরিতকী প্রত্যেক সমভাগ লইয়া একত্র মাড়িবে । কুমড়ার জলে, কুশাদি পঞ্চতৃণ মূল কাথে, গোক্ষুববসে ক্রমান্বয়ে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে ; মধুব সহিত মাড়িয়া সেবা সেবনান্তে পাকা যজ্ঞডম্বুর ফল চূর্ণ ২ তোলা মধুযুক্ত কবিয়া লেহন কবিবে ।

ত্রিদোষজ মূত্রকৃচ্ছ্র লক্ষণ —ত্রিদোষজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র, পূৰ্ব্বোক্ত বাতজ, পিত্তজ, কফজ, মূত্রকৃচ্ছ্র লক্ষণ সকল লক্ষিত হয়

চিকিৎসা ।—ভূমিকুশ্মাণ্ড, গোক্ষুববীজ, যষ্টিমধু, নাগেশ্বর, প্রত্যেক ৪ মাসা পাক জন্য জল আধ সেব, শেষ ৮০ পোয়া প্রক্ষেপ মধু ৪ মাসা এই কাথেব সহিত রসসিন্দুব সেবন করিবে ইহাব নাম “মূত্রকৃচ্ছ্র হব ”

বৃহদ্ধাএ ।—আমলকী, জাম্ব, যষ্টিমধু, ভূমিকুশ্মাণ্ড, গোক্ষুববীজ, কুশমূল, কৃষ্ণ ইক্ষু মূল, হরিতকী প্রত্যেক ২ মাসা, জল ০ সেব, শেষ ৮০ পোয়া । প্রক্ষেপ চিনি অর্ধ তোলা

শৈল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্র লক্ষণ —মূত্রবহ স্রোত সমূহে কোন প্রকার আঘাত লাগিলে বা অস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত হইলে এই বোগ জন্মে ইহাতে বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়

চিকিৎসা —কুশ, কাস, বেণা, কৃষ্ণক্ষু, ঘাগড়া, ইহাদেব মল-প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সেব এই কাথ ছাঁকিয়া ইহাতে ২ সের চিনি দিয়া পুনর্বার পাক করিবে দেখনীয় হইলেই নঃসঃইয় যষ্টিমধু, কাকুড় বীজ, শসা বীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, গুড়-ত্বক, এঃইচ, নাগেশ্বর, বকণ ছাল, গুলঞ্চ, পিষঙ্গু প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নাড়িয়া লইবে । ইহাব নাম “কুশাবলেহ ।”

ত্রিকণ্টকাদি —গোক্ষুববীজ, সৌদালফলেব মজ্জা, বেণা, কাস, ছবালভা, পাষাণভেদী, হরিতকী, সমুদয় চূর্ণ সমভাগ মধুব সহিত সেব্য

গোক্ষুব বীজেব কাথে যবক্ষার সংযুক্ত করিয়া পান করিবে

পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্র লক্ষণ । মলমূত্রের বেগধাবণ করিলে মল কুপিত হইয়া এই রোগ জন্মায় ইহাতে পেট ফাঁপা, বাতশূল ও মূত্র সঙ্কোচন প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়

চিকিৎসা ।—হরিতকি, গোক্ষুব বীজ, সৌদাল মজ্জা, পাষাণভেদী, ধন্যা, ছবালভা ইহাদেব কাথ মধুযুক্ত করিয়া পান করিবে

যবক্ষাব চিনি সমভাগ গিশাইয়া সেব্য ।

বৈদ্যকে মূত্রকৃচ্ছাদি রোগ চিকিৎসা । ৩০৫

উত্তমরূপে পেষিত ছুড়ুড়ের বীজ বাসী, জলেব সহিত সেবনীয়

মধুর সহিত যবক্ষার সেবনে উপকার দর্শ

তক্রের সহিত গন্ধক, যবক্ষার, চিনি মিশ্রিত কবিয়া পান করিবে ।

নারিকেল মুচি তুলুনেদকেব সহিত খাইবে । ইহাব নাম “হরীত-
কাদি ও প্রমেহোক্ত চন্দ্রকলা ।”

অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছুর লক্ষণ — অশ্মরীজ নিত মূত্রকৃচ্ছ্রে মূত্রা-
শয়ে ও লিঙ্গানলে বেদনা এবং মূত্রেব সহিত শুক্র নির্গত হইয়া থাকে

চিকিৎসা । যত ৪ সের, কল্কার্থ দাড়িম্ব বীজ, বিড়ঙ্গ, হিবিজা,
ছই, জীবা, ত্রিফলা, শুঠ, পিপ্পলী, গোক্ষুর বীজ, যমানী, ধন্যা, অন্নবেতম,
পিপ্পলী মূল, কুলশুঠ, মৈন্ধব, লবণ প্রত্যেক ২ তোলা । পাকার্থ জল
১৬ সেব মাত্রা যথাযোগ্য ইহাব নাম ‘দাড়িমান্দ্য যত’

বেদবিদ্যা বটী — পাবা, অজ, কান্তলৌহ, মীমা, প্রত্যেক
সমভাগ ত্রক্ষীবসে ১ দিন মাড়িয়া বালুকা যন্ত্রে পাক করিবে । পবে
তুলিয়া চূর্ণ করিবে । অজ, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মধুব, বৈক্রান্ত, হিবা-
কস প্রত্যেক পূর্বেক্ত দ্রব্যের সমান এবং মুখা, বক্তচন্দন, নারিকেল মূল,
কযেতবেল, হিবিজা, দাকহরিজা, প্রত্যেক চূর্ণ পূর্বেক্ত দ্রব্যের সমান ।
সমুদয় জমীবেব রসে ২ প্রহর মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে । অল্পপান
মধু, আমলকী, আমলকী রস, গুলঞ্চ রস

শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছুর লক্ষণ । — শর্করা অর্থাৎ অশ্ববী
গুড়িকাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে রোগে হৃদয়ে বেদনা, শরীর কম্পন, পেটে বেদনা,
অগ্নিমান্দ্য ও মূর্ছা, ও প্রস্রাবকালীন দুঃসহ যাতনা হয় মূত্রেব সহিত
শর্করা অর্থাৎ অশ্ববী গুড়িকা নির্গত হইয়া মূত্রপথ পবিকার হয় বলিয়া
বোগী প্রস্রাব করিয়া কিয়ৎক্ষণ শূন্য থাকে কিন্তু পুনর্বার শর্করা প্রস্রাব-
পথ রোধ করে, এবং তখন সহজে প্রস্রাব নিঃসরণ হয় না বলিয়া বোগীব
ভয়ানক যাতনা হয়, এমন কি প্রস্রাবসময়ে মূর্ছা পর্যন্ত হইয়া
থাকে ।

চিকিৎসা । — দেবদারু ৬০ সেব, বাসকছাল ২০ সেব, মঞ্জিষ্ঠা,
ইন্দ্রযব, দস্তীমূল, তগবলাহুকা, হিবিজা, দাকহরিজা, বাস, বিড়ঙ্গ, মুখা,

নিবীষছাল, খদিবকাঠ, অর্জুনছাল প্রত্যেক ৫০ সেব যমানী, ইন্দ্র-
যব, বক্তচন্দন, গুলঞ্চ, কটকী, চিতামূল, প্রত্যেক ১ সেব, পাকজন্ম
জল ৫৫২ সেব, শেষ ৬৪ সেব মধু ৩৭ ০ সেব, ধাইফুল ২ সেব, ত্রিকটু
১০ পোয়া, গুড়তক, তেজপত্র, এলাইচ, প্রত্যেক ০ সেব ত্রিফল ০
সেব, নাগেশ্বর ০ পোয়া । সমুদয় একত্র আয়ুতপাত্রে ১ মাস বাথিবে ।
ইহার নাম “দেবদার্ববিষ্ট ”

শিলাজতু প্রয়োগ ।—সালসাবাদিগণের কাথে শিলাজতু
ভাবনা দিয়া ইহারই কাথে উত্তমরূপে পেষণ কবিয়া সেবন করিবে ।

শিলাজতু প্রয়োগানুসাবে স্বর্ণমাক্ষিক সেবন করাইলেও উপকার
প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

মূত্রাঘাতের কাবণ ও প্রকারভেদ ।—প্রায়ই মল মূত্রের
বেগবোধ করিলে বায়ু পিত্ত কফ দূষিত হইয়া মূত্রাঘাত রোগ উৎপাদন
করে । ইহা ত্রয়োদশ প্রকার যথা,—বাতকুণ্ডলিকা, অফীলা, বাতবস্তি,
মূত্রাভীত, মূত্রজঠর, মূত্রোৎসঙ্গ, মূত্রক্ষয়, মূত্রগ্রন্থি, মূত্রশুক্র, উষ্ণবাত,
মূত্রসাদ, চিড়িঘাত, বস্তিকুণ্ডল ।

বাতকুণ্ডলিকার লক্ষণ ।—কক্ষম জ্বা সেবন, মল মূত্রের বেগ
রোধ কবিলে বায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মূত্রাশয়ে বেদনা জন্মায় ও মূত্র
নিঃসরণ শক্তির হ্রাস কবে । একটী সছিদ্র পাত্রে জল রাখিয়া যদি
তাহা ঘূর্ণন যায়, তাহ হইলে যেমন ঐ ছিদ্র দিয়া জল ঝরলতাবে
নির্গত না হইয়া অপ্পে অপ্পে নির্গত হয়, সেইরূপ বায়ু কর্তৃক মূত্রাশয়-
স্থিত মূত্র ঘূর্ণিত হওয়াতে মূত্র সবলভাবে নির্গত না হইয়া একটু একটু
করিয়া বাহির হয় । এই লক্ষণযুক্ত বোগকে “বাতকুণ্ডলিকা কহে ”

অফীলার লক্ষণ ।—দূষিত বায়ু মূত্রাশয়ের ও মলদ্বার স্ফীত
করিয়া মলদ্বার ও মূত্রাশয়েব মুখ বন্ধ কবিয়া গতিশীল ও উন্নত অফীলা
জন্মায় । ইহাতে মল মূত্র বন্ধ ও অতিশয় বেদনা হয় ।

বাতবস্তির লক্ষণ ।—মূত্রবেগ বোধ করিলে মূত্রাশয়স্থিত বায়ু
মূত্রাশয়ে বেদনা জন্মায়, ইহা অত্যন্ত ক্লেশপ্রদ, বহুযত্নে শান্তি হয় ।

মূত্রাভীতের লক্ষণ ।—বহুক্ষণ মূত্রেব বেগবোধ কবিলে প্রত্যাব

• কবিবাব সময় প্রস্রাব সবলভাবে ন হইয়া অল্পে অল্পে নির্গত হইয়া থাকে •

মূত্রজঠরের লক্ষণ ।—মূত্রবেগ কোম্বে দূষিত, আপান বায়ু দ্বারা উদর পরিপূর্ণ হয়, উদবে.বেদনা, নাভীব.নিম্ন দেশ ক্ষীত ও বেদনা জন্মে, মূত্রাশয়ের নিম্ন দেশ ক্ষীত ও বন্ধ হইয়া যায়

মূত্রোৎসর্গের লক্ষণ ।—যে বোগে বস্তিতে অর্থাৎ মূত্রাশয়ে কি লিঙ্গেব অগ্রভাগে মূত্রবদ্ধ হয়, অতিশয় কুস্থনে অর্থাৎ বেগপ্রদানে বক্তেব সহিত মূত্র নির্গত হয়, মূত্র নিঃসরণকালীন বেদনা জন্মে,—কখন বা জন্মে না, তাহাকে মূত্রোৎসর্গ কহে

মূত্রক্ষয়ের লক্ষণ ।—যে বোগে কক্ষম ও ক্লান্ত ব্যক্তিব বস্তিস্থিত পিত্ত ও বায়ু মূত্রাশয়ে জ্বালা ও বেদনা জন্মায়, তাহাকে মূত্রক্ষয় বলে ।

মূত্রগ্রন্থির লক্ষণ ।—ব্যস্তিব মুখমধ্যে আশ্রয়ীভূত ঝায় গোলাকার যে অচল ক্ষুদ্র গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইট উৎপন্ন হয়, তাহাকে মূত্রগ্রন্থি বলে ।

মূত্রশুক্লের লক্ষণ ।—মূত্রবেগধারণ করিয়া স্ত্রী-সদম কবিলে স্থানচ্যুত শুষ্ক প্রস্রাবকালীন প্রস্রাবেব আগেই হউক বা পবেই হউক ভস্মধৌত জলের ঝায় নির্গত হয় ।

উষ্ণ বাতের লক্ষণ ।—ব্যায়াম, পথভ্রম, বৌদ্রসেবন প্রভৃতি কারণে কুপিত বায়ু পিত্তেব সহিত মিলিত হইয়া মূত্রাশয়কে আশ্রয় করিয়া মূত্রাশয়, লিঙ্গ ও মলদ্বাবে জ্বালা জন্মায়, অধিকন্তু পুনঃপুনঃ প্রস্রাব হইয়া থাকে এবং প্রস্রাবেব বর্ণ দীপ্য রক্তবর্ণ কিম্বা হরিদ্রা বর্ণ হয়, কখন বা কেবল রক্তই নির্গত হয় ।

মূত্রসাদের লক্ষণ ।—পিত্ত বা কফ অথবা পিত্ত ও কফ উভয়ই বায়ুদ্বারা গাঢ় হইলে মূত্রসাদ জন্মে ইহাতে মূত্রের বড় পীত,শ্বেত,বক্ত-বর্ণ হয় এবং প্রস্রাব গাঢ় হইয়া থাকে এতদ্ভিন্ন পিত্ত গাঢ় হইলে গোবোচনার বর্ণ, কফ গাঢ় হইলে সমস্ত বর্ণই হইয়া থাকে ।

চিড়িঘাত্তের লক্ষণ ।—বায়ু দ্বারা কক্ষম ও দুর্বল ব্যক্তির মল পাকশয় হইতে মূত্রস্রোতে নীত হইলে মলসংযুক্ত ও মলের গন্ধযুক্ত মূত্র নির্গত হয় ।

বস্তিকুণ্ডলের লক্ষণ ।—এত পথগমন, উপত্যন অর্থাৎ লক্ষ্য প্রদান, নিয়ত পবিত্রম, অভিষাত, বস্তিদেশ পীড়ন প্রভৃতি কাৰণে বস্তি স্বীয় স্থান হইতে উৰ্দ্ধগত হইলে বস্তি গর্ভস্থল্য গোলাকাব ভাবে স্থিত হয়, ইহাকে বস্তিকুণ্ডল কহে । ইহাতে বোগী শূলবৎ পীড়া, স্পন্দনবৎ পীড়া, জ্বালা প্রভৃতি দ্রাব্য পীড়িত হইয়া বিন্দু বিন্দু মূত্রত্যাগ কবে এবং বস্তি পীড়ন কবিলে ধাবাবাহিক প্রস্রাব হয় । এতদ্ভিন্ন বস্তিদেহে আঁবও নানা প্রকার যন্ত্রণা হইয়া থাকে ।

* চিকিৎসার সুবিধাজন্য পিত্ত ও কফের লক্ষণ নির্ণয় ।—বাতকুণ্ডলিকা, অফীনা প্রভৃতি পিত্তাৱিত হইলে মূত্রাশয়ে জ্বালা, বেদনা ও মূত্রের রঙ নানা প্রকাব হয় এবং কফাৱিত হইলে শরীরেব গুরুতা ও শোথ হয় এবং মূত্র গাঢ়, স্নিগ্ধ ও স্বেতবর্ণ হইয়া থাকে ।

* মুষ্টিযোগ ।—কঁকড় বীজ বাটা ২ তোলা ও সৈন্ধব লবণ ২ মাসা ৪ তোলা কাঞ্জিকে গুলিয়া পান কবিবে ।

কুশ্মাণ্ড রস ৪ তোলা, যবক্ষার ৪ মাসা, পুৰাতন গুড় ১ মাসা একত্র সেবন কবিবে ।

পত্র, ফল ও মূল সহিত গোম্মুব স্বক্কেব কাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান কবিবে ।

নল, কুশ, কাস, কৃষ্ণ ইক্ষু, ইহাদের মূলেব সূনীতল কাথেব সহিত শর্করা মিশ্রিত কবিয়া প্রত্যহ প্রাতে পান কবিবে ।

তেলাকঁচার মূল কাঞ্জিতে বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিবে ।

* লিঙ্গমধ্যে কপূৰ চূর্ণ প্রবেশ, বা যবক্ষার ও চিনির সহিত কুশ্মাণ্ড রস সেবন কবিবে ।

খইরা শাক্কেব বীজ জলের সহিত অথবা কদ্রজটা লতার মূল তরু সহিত সেবনে অশ্রুণী বোগের শান্তি হয় ।

বাসি শীতল ছক্কের সহিত অন্ন ভোজনে এবং তুলোদকেব সহিত চন্দন ও চিনি সংযুক্ত কবিয়া পান কবিলে উষ্ণবাত নিবারণ হয় ।

গোয়ালিয়া লতাব মূল স্বত, তৈল ও তক্রের সহিত সেবন কবিলে মূত্রবোধ আবোগ্য হয় ।

কঁজি ও সৈন্ধব লবণেব সহিত বসসিন্ধব সেবন কবিলে সকল প্রকার মূত্রাঘাত ভাল হয়

উশীরাদ্য তৈল ।—তিল তৈল ৪ সের, কল্কার্থ মূল, পঁত্র, ফল সহিত গোক্ষুব ১২ ০ সেব, জল ৬৪ সেব, শেষ ১৬ সেব, বেণাব মূল ১২ ১০ সের, জল ৬৪ সেব, শেষ ১৬ সেব তৈল ৪ সেব কল্কার্থ বেণাব মূল, তগর পাটুকা, কুড়, যক্ষীমধু, বক্তচন্দন, বহেড়া, হরীতকী, কণ্টকাবী, পদ্ম-কাঠ, উৎপল, অনন্ত মূল, বেড়েল, কঁকলা, গুলঞ্চ, গোবক্ষ চাকুলে, গোক্ষুর, শুলফা, শ্বেত বেড়েল, মৌরী; প্রত্যেক ২ তোলা । এই তৈল মর্দনে মূত্রাঘাত নষ্ট হয় ।

মূত্রাঘাতের সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ ।—মূত্রাঘাত রোগে বস্তি-মুখের ছিদ্র স্লেষ্মা দ্বারা বন্ধ হইলে এবং পিত্তেব প্রবলতা থাকিলে তাহা অসাধ্য অর্থাৎ অচিকিৎসনীয়, অধিকন্তু যদি বস্তিমুখের ছিদ্র অপ্রকাশিত থাকে এবং কুণ্ডলীকৃত না হয়, তাহা হইলে সাধ্য ।

কুণ্ডলীকৃতের লক্ষণ —বস্তি কুণ্ডলীকৃত হইলে তৃষ্ণা, নোহ ও শ্বাস হইয়া থাকে । এই লক্ষণাকৃত মূত্রাঘাত রোগও অচিকিৎসনীয় ।

অশ্মরী রোগের উৎপত্তি ।—বায়ু বস্তিস্থিত শুক্র ও মূত্র অথবা পিত্ত ও কফ শোষণ কবিলে গুরু পিত্তে বোচনার ন্যায় ক্রমে অশ্মরী অর্থাৎ পাথরী জন্মে

অশ্মরী রোগের প্রকারভেদ ।—অশ্মরী কথ্যে পাথরী রোগ চারি প্রকার যথা ;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও শুক্রজ শুক্রজ অশ্মরী ভিন্ন সমস্ত অশ্মরীতেই কফের প্রাধান্য থাকে, অর্থাৎ অশ্মরী উৎপাদনের কারণ অণুব অশ্মরীগ্রস্ত ব্যক্তি অচিকিৎসিত না হইলে প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে ।

অশ্মরী রোগের পূর্ব লক্ষণ ।—অশ্মরী জন্মবার পূর্বে মূত্রাশয়ের ক্ষীণতা, উহাব নিকটবর্তী স্থানে অতিশয় বেদনা, মূত্রে ছাগলের গন্ধ, মূত্রকৃচ্ছ অর্থাৎ প্রস্রাব কবিতে মূত্রকৃচ্ছ রোগের স্থায় যাওনা, অকচি শু ভ্রূর হইয়া থাকে ।

অশ্মরী রোগের সাধারণ লক্ষণ — নাভিতে সেবনীতে অর্থাৎ লিঙ্গে ও মূত্রাশয়েব উর্দ্ধদেশে বেদনা হয় এবং অশ্মবী দ্বারা মূত্রবাহী স্রোত বন্ধ হইলে মূত্র থামিয়া থামিয়া নির্গত হয় বায়ু দ্বারা অশ্মরী বন্ধ হইলে মূত্র হইলে সরলভাবে গোমেদমনিম্নদৃশ্য পরিকার প্রভাব হইয়া থাকে মূত্রের আঘাতে মূত্রস্রোতে ক্ষত হয় বলিয়া প্রভাবের বেগ দেওয়ায় সময় বেদনা ও রক্তমিশ্রিত মূত্র নির্গত হয় ।

বাতজ অশ্মরীর লক্ষণ ।—বাতজ অশ্মবীতে রোগী যাতনায় দন্তে দন্তে ঘর্ষন, লিঙ্গ মর্দন ও নাভি পীড়ন করে এবং আর্তনাদ করিতে কবিত্তে শব্দের সহিত মলত্যাগ ও বিস্ম বিস্ম প্রভাব হয় ; অপর অশ্মরী শ্যামবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ পীত মিশ্রবর্ণ বা রক্তবর্ণ ও কটকটরূপে দৃষ্ট হয় ।

চিকিৎসা ।—বকণছাল, শুঠ, গোক্ষুর মিলিত ২ তোলা, জল ৩ সের, শেষ ৮০ পোয়া, প্রক্ষেপ যবক্ষার ২ মাসা, পুৱাতন গুড় ২ মাসা ; এই কাথ পান করিবে ইহার নাম “বকণাদি কাথ ।”

* ক্ষুদ্র প্রয়োগ ।—গোক্ষুরী বীজ চূর্ণ মধু ও ছাগ দুগ্ধে মিশাইয়া পান করিলে অশ্মবী নষ্ট হয় ।

পিত্তজ অশ্মরীর লক্ষণ । পিত্তজনিত অশ্মবী রোগে মূত্রাশয়ে জ্বালা ও স্পর্শে উষ্ণ বোধ হয় । অশ্মরীভায়ালা বীজের দ্বারা বড় কাল বা লাল অথবা হরিদ্র বর্ণ হইয়া থাকে ।

* চিকিৎসা ।—ঘৃত ৪ সেব, কাথার্থ পেষিত বকণছাল ১২ ০ সেব, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের : কল্কার্থ বকণমূলের ছাল, কদলীমূল, নিম্ব-মূলের ছাল, কুশাদি পঞ্চ ভূগের মূল, গুলঞ্চ, শিলাজতু, কঁকড়বীজ, দুর্বা, তিলনালের ক্ষার, পলাশক্ষার, যুইমূল, প্রত্যেক ২ তোলা । মাঞা ৩ তোলা হইতে ২ তোলা ঘৃত সেবনের কিছু পবে পুৱাতন গুড়ের সহিত অধিরায় সেবন করিবে । ইহার নাম “বকণ ঘৃত ”

* ক্ষুদ্র প্রয়োগ ।—বকণ ছালের কাথ বা কল্কের সহিত পুৱাতন গুড় এবং সজিনামূলের গবম কাথ সেবন করিবে ।

কফজ অশ্মরীর লক্ষণ —কফজনিত অশ্মবী বোর্গে মূত্রাশয় ভাব ও শীতল হয় এবং স্রুচীবিদ্ধবে বেদনা কবে । অধিকন্তু অশ্মরী বৃহদাকার,

মসৃৎ কখন বা খবখব হয় অশ্ববীর বর্ণ মধুব ছায় অথবা শ্বেত-
বর্ণ হয়

চিকিৎসা —মৃত ৪ সেব, কাথার্থ বকর্ণছাল ৮সের, জল ৬৪ সেব,
শেষ ১৬ সেব কুলথ কলাই, মৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, চিনি, পানশিউলী,
যবক্ষার, কুম্মাণ্ডবীজ, গোক্ষুব বীজ প্রত্যেক ১ পল ইহাব নাম
“কুলখাদ্য মৃত”

ক্ষুদ্র প্রয়োগ বকর্ণছাল, শুঠ, গোক্ষুববীজ, তালমূলী, কুলথ
কলায়, কুশাদি তৃণ পঞ্চমূল মিলিত ২ তোলা, জল ০ সেব, শেষ ৮০
পোয়া। প্রক্ষেপ চিনি ২ মাসা, যবক্ষাব ২ মাসা

শুক্রেজ অশ্ববীর লক্ষণ শুক্রেব বেগ বোধ কবিলে, বায়ু স্থান-
চ্যুত শুক্র নিদ্র ও অণ্ডকোষের মধ্যে অর্থাৎ মূত্রাশয়েব মুখে শোষণ করিয়া
অশ্ববীর জন্মায়। এই অশ্ববীর বেগে মূত্রাশয়ে বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ রোগ
ও অণ্ডকোষে শোথ জন্মিয়া থাকে। অপর শিশুদিগের শুক্রেব বেগ
অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গমাভিলাষ জন্মে না এবং তজ্জন্ত শুক্র স্থান এষ্ট হয়না,
সুতরাং তাহাদের শুক্রজনিত অশ্ববীর উৎপন্ন হয় না তাহাদের কেবল
বাত, পিত্ত ও কফজ অশ্ববীর জন্মিয়া থাকে

চিকিৎসা। —পাৰা ১ পল, গন্ধক ২ পল, শিলাজতু ১ পল, সমুদয়
একত্র কবিয়া ক্রমান্বয়ে শ্বেতপূর্ণর্বা, বাসক, শ্বেত অপবর্জিতার বসে
এক এক দিন মাড়িয়া শুকাইয়া ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া দোলা যন্ত্রে শ্বেদ
প্রদান করিবে। মাত্রা ২ বতি। অল্পপান ভূম্যামলকীর ফল ও রাখাল
শর্শাব মূল দুন্ধের সহিত পেষিত

আনন্দ ঘোগ। —তিলনাল ভস্ম, আপাদ ভস্ম, আমলকী কাণ্ড
ভস্ম, মিলি ৩ ১/২ সের, জল ৬৪ সেব, শেষ ১৬ সেব এই ১৬ সেব ক্ষার
জল ছাঁকিয়া পাক করিয়া সমুদয় জল নিশেযিত করিবে মাত্রা ২ বতি
কল্পধন ছাগমূত্র

প্রমেহ রোগের কারণ। —সুখে উপবেশন অর্থাৎ উৎকৃষ্ট
আসনে উপবেশন করিয়া কোন কার্য কৰা, কেবল শয্যায শয়ন, অধিক
পরিমাণে দধি ও দুগ্ধ সেবন, গ্রাম্য ছাগ, মেঘ প্রভৃতি ও মৎস্যাদি এবং

মজল ভূমিজাত অর্থাৎ ববাহ কচ্ছপ প্রভৃতি প্রাণীৰ মাংস ভক্ষণ, নূতন তণ্ডুলার, চিনি, মিষ্টি প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য এবং কফজনক দ্রব্য ভোজনে প্রমেহ জন্মে

প্রমেহ রোগের উৎপত্তি।—পূর্বোক্ত কাৰণে দূষিত কফ মূত্রাশয়স্থিত মেদ, মাংস এবং শরীরস্থিত ক্লেদ দূষিত কবিয়া প্রমেহ উৎপাদন করে, উষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্য ভোজন ও অগ্নিসন্তাপাদি গ্রহণে দূষিত পিত্ত মেদ মাংস প্রভৃতি দূষিত করিয়া প্রমেহ জন্মায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পিত্ত ও কফেব বল কম পড়িলে বায়ু পূর্বোক্ত মেদ মাংস প্রভৃতি শোষণ ও দূষিত করিয়া প্রমেহ জন্মায়।

প্রমেহের প্রকারভেদ।—প্রমেহ বিংশতি প্রকার, যথা,—কফজ, ১০ প্রকার, পিত্তজ ছয় প্রকার, বাতজ চারি প্রকার

দোষভেদে সাধ্যা সাধ্য ও যাপ্য নির্ণয় যে চিকিৎসাতে কফেব শান্তি হয়, সেই চিকিৎসাতেই মেদ মাংস প্রভৃতির দোষ হয় বলিয়া কফজ প্রমেহ সাধ্য। যে ঔষধে পিত্ত প্রশমিত হয়, সেই ঔষধেই মেদ বৃদ্ধি করে বলিয়া পিত্তজ প্রমেহ যাপ্য, এবং বায়ু শীত্র অন্যান্য দ্রব্য ক্ষয় করিয়া অনিষ্টোৎপাদন করে বলিয়া বাতজ প্রমেহ অসাধ্য।

দোষ ও দূষ্য।—বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনটি দোষ মেদ, রক্ত, শুক্র, জল, বস, লসীকা, মজ্জা, রস, ওজ, মাংস এই দশটি দূষ্য

প্রমেহের পূর্বরূপ।—প্রমেহ বোগ জন্মিবাব পূর্বে দন্ত, চক্ষু প্রভৃতিতে গুল জন্মে এবং হস্ত ও পদ জ্বালা, শরীরেব চিকণতা অর্থাৎ তৈলাক্তবৎ লক্ষিত হয়, মুখেব মধুরতা জন্মিয়া থাকে।

প্রমেহের সামান্য লক্ষণ।—অধিক পবিমাণে কর্দমমিশ্রিত জলের ন্যায় প্রস্রাব সর্ব প্রকার প্রমেহ বোগেই হইয়া থাকে।

এক দোষ জনিত প্রমেহ নানা প্রকার হওয়ার কারণ।—যেমন শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ, লোহিত প্রভৃতি বর্ণেব সংযোগে পিঙ্গল ও পাটলাদি বিরোধপ্রকার বর্ণ কল্পিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া মেদ মাংস প্রভৃতিব সংযোগে মূত্রেব বর্ণ প্রভৃতিব ভেদ হয় বলিয়া এক দোষ জনিত প্রমেহ নানা প্রকার কল্পিত হইয়াছে।

কফজনিত দশ প্রকার প্রমেহেব ভেদ —

উদক মেহের লক্ষণ — উদক মেহে নির্মল, শ্বেতবর্ণ, শীতল, গন্ধহীন, ঘোলা, পিচ্ছিল ও জলেব স্থায় প্রভাব হয়

ইক্ষু মেহের লক্ষণ । ইক্ষু মেহে প্রভাব ইক্ষুবসেব স্থায় অত্যন্ত মধুর অর্থাৎ মিষ্ট হয়

• সান্দ্র মেহের লক্ষণ — সান্দ্র মেহে পার্শ্বায়িত অর্থাৎ ভাঁতেব মাডেব স্থায় গাঢ় প্রভাব হয়

সুরা মেহের লক্ষণ । — সুরা মেহে সুরাব স্থায় প্রভাব হয়, এবং ঐ প্রভাব কোন পাণ্ডে বাখিলে উপবের অংশ পাতলা ও নীচেব অংশ গাঢ় লক্ষিত হয়

পিষ্ট মেহের লক্ষণ — পিষ্ট মেহে চাউলেব গুঁড়া অঙ্গ জলে মিশ্রিত কবিয়া লেপন কবিত্তে পাবা যায়, সেই প্রকার গাঢ় ও শ্বেতবর্ণ প্রভাব হয় এ ভিন্ন বোগী বোগাঙ্কিত হইয়া থাকে

শুক্র মেহের লক্ষণ । — শুক্র মেহে বোগী শুক্রেব বর্ণযুক্ত বা শুক্রমিশ্রিত মূত্রত্যাগ কবে

সিকতা মেহের লক্ষণ — সিকতা মেহে বালুকাকণাব ন্যায় কঠিন কণাযুক্ত ও অপরিষ্কার প্রভাব হয়

শীত মেহেব লক্ষণ শীত মেহে মূত্র ভাবযুক্ত ও অতিশয় শীতল হয়

শনৈর্মেহের লক্ষণ । — শনৈর্মেহে বোগী পুনঃ পুনঃ অঙ্গ ৮ বি-
মাণে প্রভাব কবিয়া থাকে

লালা মেহের লক্ষণ । লালা মেহে মুখস্থিত লালার স্থায় তক্ত-
যুক্ত এবং পিচ্ছিল প্রভাব হয়

চিকিৎসা । — স্বর্ণ ২ ভাগ, বৌপ্য ২ ভাগ, বঙ্গ, সীসা, লৌহ,
প্রত্যেক ৩ ভাগ, অভ্র, প্রবাল, মুক্তা, প্রত্যেক ৪ ভাগ সমুদয় একত্র
মাড়িয়া ক্রমান্বয়ে গব্যদুগ্ধ, ইক্ষুবস, বাসকছালেব বস, লাক্ষাব কাথ, বালীব
কাথ, কদলীমূলেব বস, মোচাব রস, পদ্মেব বস, মান্তী পুষ্পেব বস ও

মৃগনাভি এই সমুদায় দ্বারা ভাবনা দিবে মাত্রা ২ বতি অল্পপান স্বতঃ, চিপি ও গধু ইছাব নাম “বসন্ত কুসুমাকার ”

বৃহদ্রসেশ্বর রস —বঙ্গ, পাৰা, গন্ধক, বোপা, কপূৰ, অত্র প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণ, মুক্তা প্রত্যেক ৪ মাগা, এই সমস্ত কেশুরিয়াবি বসে ভাবনা দিবে মাত্রা ২ বতি

মোমেশ্বর রস ।—শাল মূলেব ছাল, অর্জুন মূলেব ছাল, লোধু কাঠ, কদম্ব মূলেব ছাল, অণ্ডক, বক্তচন্দন, গনিয়াবী মূলেব ছাল, হরিদ্রা, দাক হরিদ্রা, আগলকী, দাড়িম বীজ, গোক্ষুব বীজ, জামেব মূলেব ছাল, বেণাব মূল প্রত্যেক ৪ তোলা পাৰা, গন্ধক, ধাতা, মুখা, এলাইচ, তেজপত্র, পদ্মকাঠ, লৌহ, বসোত, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, মোহাগা, জীরা, প্রত্যেক অর্ধ তোলা, গুণ্ণুল ৪ তোলা, স্বতে মাড়িবে ; ১৬ বতি প্রমাণ বটিকা কবিবে অল্পপান ছাগছক, নাবিকেল জল, শীতল বীৰ্য্য পাক তৈল এবং যবেব ঘূস প্রভৃতি

মেহ মুদগাব রস ।—বসোত, বিট লবণ, দেবদাক, বেলশুঠ, গোক্ষুব বীজ, দাড়িম বীজ, প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ৬ তোলা, গুণ্ণুল ১ পল, এই সমুদয় স্বতে মাড়িয়া ৬ রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত কবিবে

পঞ্চানন রস —পাৰা, গন্ধক, লৌহ, অত্র প্রত্যেক ১ তোলা, বঙ্গ ৮ তোলা এই সমস্ত একত্র মধুব সহিত ১ দিন মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা কবিবে অল্পপান শীতল জল ।

পিত্তজনিত মেহ ছয় প্রকার, যথা,—

নীল মেহের লক্ষণ ।—নীলমেহে বোগীব নীলবর্ণ প্রস্রাব হয় ।

কৃষ্ণ মেহের লক্ষণ —কৃষ্ণ মেহে বোগীব কালীব ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ মূত্র ক্ষবিত হইতে দেখা যায় ।

হরিদ্রা মেহের লক্ষণ । হরিদ্রা মেহে মূত্র হরিদ্রাবর্ণ ও কটু-রসমংযুক্ত হয় এবং প্রস্রাবকালীন দিগ্ভানল জ্বালা করে ।

মঞ্জিষ্ঠা মেহের লক্ষণ ।—মঞ্জিষ্ঠা মেহে মঞ্জিষ্ঠাধৌত জলেব ন্যায় লোহিতবর্ণ প্রস্রাব হয়

রক্ত মেহের লক্ষণ —বক্ত মেহে বোগীব দুর্গন্ধ ও লবণযুক্ত এবং উষ্ণ ও বক্তবর্ণ প্রভাব হয় ।

ক্ষার মেহের লক্ষণ —ক্ষারমেহে ক্ষাবধৌত জলের ন্যায় মূত্র গন্ধ, বর্ণ ও বসযুক্ত হয় এবং ক্ষাবের জল স্পর্শ কবিলে ঘেরূপ পিচ্ছিল বোধ হয়, মূত্রও সেইরূপ পিচ্ছিল হইয়া থাকে

চিকিৎসা তিল তৈল ৪ সেব, কল্কার্থ বেলছাল, সোনাছাল, গাভারী ছাল, পাকল ছাল, গণিয়ারী, গুলঞ্চ, আমলা, দাড়িম ফল মিলিত ১২ ০ সেব, জল ৬৪ সেব, শেষ ১৬ সেব, দুগ্ধ ৪ সেব, কল্কার্থ নিমছাল, চিবাঁতা, গোক্ষু, দাড়িম, বেগুন, বেলশুঁঠ, দেবদারু, দারু-হরিদ্রা, মুখা, ত্রিফলা, ওগব পাছকা, জাফা, জামছাল, আমছাল, বেণাব মূল, মিলিত ১ সেব ইহাব নাম “মেহ মিহিব তৈল ”

মুহা দাড়িমাদ্য ঘৃত ঘৃত ৪ সেব, কাথার্থ পাক দাড়িম ২ সেব, জল ১৬ সেব, শেষ ৪ সেব যবভগ্নুল ২ সেব, জল ১৬ সেব, শেষ ৪ সেব । কুলথ কলায ২ সেব, জল ১৬ সেব, শেষ ৪ সেব শতমূলীব রস ৪ সেব, গব্যদুগ্ধ ৪ সেব কল্কার্থ জাফা, পিণ্ড খজ্জুব, ত্রিফলা, বেগুন, জীবক, ঋষভক, কঁকলা, ক্ষীব কঁকলা, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দেবদারু, হবিদ্রা, দারুহবিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, এলাইচ, ভূমিকুস্মাণ্ড, গোবক্ষচাকুলে, শিগা-জতু, গুড়ত্বক, বেণাব মূল কৃষ্ণাঞ প্রত্যেক চূর্ণ ৩ তোলা

বিড়ঙ্গাদি লৌহ ।—বিড়ঙ্গ ত্রিফলা মুখা, পিপ্পলী, জীব, কৃষ্ণ-জীবা, প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব সমান লৌহ একত্র মাড়িবে মাত্রা ৬ রতি ।

চন্দ্রপ্রভাদি বটী —সোমবাজী, বচ, মুখা, চিবাঁতা দেবদারু, হবিদ্রা, অ’তইচ, দারুহবিদ্রা, পিপ্পলীমূল, চিতামূল, তেউড়ী, দস্তীমূল, তেজপত্র, গুড়ত্বক, এলাইচ, বংশলোচন, প্রত্যেক ২ তোলা, ধন্থা, ত্রিফলা, চই, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, স্বর্ণমানিক, ত্রিকটু, যবক্ষাব, মাচিক্ষাব, সৈন্ধব লবণ, মূচল লবণ, বিট লবণ প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, চিনি ৮ তোলা, শিলাজতু ১৬ তোলা গুগগুল ১৬ তোলা, এই সমুদয় একত্র মাড়িবে, ৬ রতি প্রমাণ বটীকা কবিবে ।

বজ্রাফটক —পাৰা গন্ধক, লৌহ, বৌপ্য, খৰ্পৰ, অজ্র, তাম্র, প্রত্যেক সমানভাগ, সৰ্বসমান বঙ্গ একত্র মাড়িয়া গজপুটে পাক করিবে শীতল হইলে উদ্ধৃত কবিবে মাত্রা ২ বতি অন্নপান মধু, হবিজাচূর্ণ ও আমলকীব রস

বাতজনিত প্রমেহ চাবি প্রকাৰ,—

বসা মেহের লক্ষণ —বসা মেহে বসামিশ্রিত ও বসার বর্ণযুক্ত প্রস্রাব পুনঃ পুনঃ হইয়া থাকে ।

মজ্জা মেহের লক্ষণ —মজ্জা মেহে মজ্জাব ন্যায় শ্বেতবর্ণ-বিশিষ্ট এবং মজ্জামিশ্রিত প্রস্রাব হইয়া থাকে

ক্ষৌদ্র মেহের লক্ষণ —ক্ষৌদ্র মেহে কষায় ও মধুর রস যুক্ত এবং স্নেহশূন্য প্রস্রাব হইয়া থাকে ।

হস্তি মেহের লক্ষণ ।—হস্তি মেহে বোগী মত হস্তীর ন্যায় সৰ্বদা অধিক পৰিমাণে লগীকাযুক্ত প্রস্রাব কবে ।

চিকিৎসা ।—রসসিদ্ধব, লৌহ, বঙ্গ, অজ্র প্রত্যেক সমভাগ মধুব সহিত ১ দিন মাড়িয়া ১ মাসা প্রমাণ বটীকা কবিবে অন্নপান মধুযুক্ত পক বজ্রডম্বুব ফল চূর্ণ ইহাব নাম “তাবকেশ্বব রস ”

সোমনাথ রস ।—পালিধা বসে শোধিত পাৰা ২ তোলা এবং ইন্দুবকানি পানাব বসে শোধিত গন্ধক ২ তোলা ; উভয়ে কর্জলী করিয়া ইহাব ৮ তোলা লৌহ মিশ্রিত কবিয়া স্নতকুমারীব রসে মাড়িবে । ইহার সহিত অজ্র, বঙ্গ, বৌপ্য, খৰ্পর, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা মিশ্রিত কবিয়া স্নতকুমারী ও খুলকুড়িব বসে ভাবনা দিয়া ২ বতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত কবিবে অন্নপান মধু

সৰ্বেশ্বব রস ।—স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, নিম্বজতু, লৌহ, অজ্র, স্বর্ণ-মাক্ষিক, যষ্টিমধু, পিপ্পলী, মবিচ, শুঠ, সমুদয একত্রে ১ গ্রহব মাড়িয়া কর্জলেব ন্যায় কবিবে কেশুরিয়া ও সিদ্ধিব বসে মাড়িয়া ২ বতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত কবিবে

মেহ মূল্যার বটী —বসো৩, বিট লবণ, দেবদাক, বেগুণ্ট, গোক্ষুরী বীজ, দাড়িম বীজ, চিবা৩া, পিপ্পলীম ল, গোক্ষুর, ত্রিফলা,

তেউড়ী মূল প্রত্যেক ১ তোলা, সর্ব সমান লৌহ, গুগ্গলু ১ পল, এই সমুদয় যত দাবা মাড়িয়া ১ মাসা প্রমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে অল্প-পান ছাগছন্ধ বা জল।

মেহ কুলান্তক রস।—বঙ্গ, অভ্র, পাঁবা, গন্ধক, চিরাতা, পিপ্পলী মূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তেউড়ী, রসোত, বিড়ঙ্গ, মুখা, বেলশুঁঠ, গোক্ষুর বীজ, দাড়িম বীজ প্রত্যেক ১ তোলা, শিলাজ ২ পল এই সমুদয় বন কাঁকু-ডেব বসে মাড়িয়া ৪ রতি বটিকা করিবে অল্পপান ছাগছন্ধ, জল, আম-লকীর রস বা কুলথ কলায়েব কাথ

মেহানল রস —রসসিন্ধুর ও বঙ্গ সমভাগে লইয়া মধুব সহিত মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে অল্পপান কুচের মূল সহিত ছন্ধ

প্রমেহ মিহির তৈল।—তিলতৈল ৪সের, কাথার্থ লাক্ষা ৮সেব, জল ৩৪ সেব, শেষ ১৬ সের শতমূলীর রস ৪ সের, ছন্ধ ৪ সের, দধির মাৎ ১৬ সেব কল্কার্থ শুলফা, দেবদাক, মুখা, হরিজা, দাকহরিজা, মূর্কী-মূল, কুড়, অশ্বগন্ধা, শ্বেতচন্দন, রেণুক, কটকী, যষ্টিমধু, বাস্মা, গুড়তক, এলাইচ, বায়ুনহাটী, চই, ধত্বা, ইন্দ্রযব, কবঞ্জ বীজ, অণ্ডক, তেজপত্র, ত্রিফলা, নালুকা, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, গঞ্জিষ্ঠা, সবল কাষ্ঠ, পদাকার্ষ, লোধ, মোরি, বচ, জীরা, বেণার মূল, জায়ফল, বাসক ছাল, তগব পাছকা, প্রত্যেক ২ তোলা

বৃহৎ দাড়িমান্দ্য য়ত।—য়ত ৪সেব, কাথার্থ পক দাড়িম ৮ সেব, জল ৩২ সেব, শেষ ৮ সেব, কল্কার্থ দাড়িম বীজ, চই, জীরা, বিড়ঙ্গ, হরিজা, দাকহরিজা, জাঙ্কা, পিও খজ্জুর, যুঞ্জাত অভাবে তালমালতী, নীলোৎপল পুষ্পা, গজুপিপ্পলী, বনযমানী, মহানিষ, কাঁকলা, শুঁঠ, বচ, দেবদাক, চই, কুড়, গাঙ্গারী মূলেব ছাল, যষ্টিমধু, অনন্ত মূল, বাখাল শশার মূল, মূর্কী, বংশলোচন, কাঁকড়া শুল্কী, ধত্বা, কুলথ কলায়, মহামেদ, নিনছাপ, বৃহত্তী, কটকারী, ডানকুনি, ত্রিফলা, বাসক ছাল, ছাতিম ছাল, নিসিন্দা ছাল, এই সমস্ত মিলিত ১ সেব, জল ১৬ সের

কফজ প্রমেহের উপদ্রব।—তগ্নিমান্দ্য, অকচি, বগি, অতি নিজা, কাম, নামাজাব, এই সকল কফজ মেহেব উপদ্রব

পিত্তজ প্রমেহের উপদ্রব — পিত্তজনিত প্রমেহে নিদ্রা ও মূত্রাশয়ে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, অণ্ডকোষ ফাটিয়া যায়, জ্বর, জ্বালা, পিপাসা, অন্নোদগার, মূৰ্ছা ও জলবৎ বাহ্যে এই সকল উপদ্রব ঘটিয়া থাকে

বাতজ প্রমেহের উপদ্রব ।—বাতজনিত প্রমেহে উদ্যবর্ত রোগ, কম্প, হৃদয়ে বেদনা, কটু, তিক্ত, কষায় প্রভৃতি রসযুক্ত দ্রব্য ভক্ষণে ইচ্ছা হয়

প্রমেহের অসাধ্য লক্ষণ । প্রমেহ বোগী পূৰ্ব্বোক্ত উপদ্রব দ্বারা আক্রান্ত হইলে অতিশয় ধাতুক্ষয়জনিত দুর্বল ও পীড়াগ্রস্ত হইলে তাহাকে যত্নাযুখে পতিত হইতে হয় ।

অপর অসাধ্য লক্ষণ ।—বীজ দোষে অর্থাৎ পিত্তা পিত্তামহ হইতে উৎপন্ন যে প্রমেহ বোগ চলিয়া আসিতেছে, তাহা অসাধ্য । অপব বংশপবম্পরাগত যে কোন বোগই হউক, তাহাও অসাধ্য

মধু মেহের লক্ষণ ও উৎপত্তি ।—ধাতুক্ষয়ে বায়ু কুপিত হইয়া, বা পিত্ত ও কফ বায়ু পথ বন্ধ করিলে বায়ু কদ্ধগতি হইয়া মধু মেহ উৎপাদন করে এই মেহে মধুর গ্রাস প্রভাব হয়, বিশেষতঃ পিত্ত ও কফ দ্বারা বায়ুজ্যোত কদ্ধ হইলে বায়ু যে মধু মেহ উৎপাদন করে, সেই মেহে বায়ুর লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং বিনা কাবণে রোগ হ্রাস ও বৃদ্ধি পাইয়া কষ্টসাধ্য পবিণত হইয়া থাকে

সমস্ত প্রমেহই যথাসময়ে চিকিৎসিত না হইলে মধুর গ্রাস মিষ্ট প্রভাব হয় বলিয়া সমস্ত মেহকেই মধু মেহ বলা যাইতে পারে

পীড়কার লক্ষণ ও প্রকারভেদ ।—প্রমেহ রোগে শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বনিতা, অলজী, মস্লিকী, সর্ষপিকা, পুঞ্জিনী, বিদাবিকা, বিদ্রধী, এই দশপ্রকার পীড়কা অর্থাৎ এণ বিশেষ জন্মে ইহাবা সন্ধি, মর্থ, অণ্ডকোষ, মস্তক প্রভৃতি মাংস সংযুক্ত স্থানেই হইয়া থাকে

শরাবিকার লক্ষণ —যাহার বেষ্ঠন সবাবিব গ্রাস উন্নত ও মধ্যস্থান নিম্ন তাহাকে শরাবিকা কহে.

কচ্ছপিকার লক্ষণ।—যে পীড়কা কচ্ছপেব পৃষ্ঠদেশেব গ্রায উন্নত এবং জ্বালাযুক্ত, তাহাকে কচ্ছপিকা বলে

জালিনীর লক্ষণ —যে পীড়কা মাংসদ্বাৰা অল্পত হইয়া উঠে এবং বাহ্যতে জ্বালা থাকে, তাহাকে জালিনী কহে

বনিতার লক্ষণ।—যে নীলবর্ণ ও বড় পীড়কা পৃষ্ঠ ও উদবে জন্মে এবং ক্লেশপ্রাপ্ত ও অত্যন্ত বেদনা জন্মে, তাহাব নাম বনিতা

অলজীর লক্ষণ —যে পীড়কা বক্ত অথবা শ্বেতবর্ণ এবং ক্ষেচ-কেব গ্রায হয়, তাহাকে অলজী কহে

মসূরিকার লক্ষণ। যে পীড়কাব বর্ণ ও আকৃতি মসূব কলাযেব গ্রায, তাহাকে মসূবিকা কহে

সর্ষপিকার লক্ষণ যে পীড়কাব বর্ণ ও আকৃতি সর্ষপ তুল্য, তাহাকে সর্ষপিকা কহে

পুত্রিনীর লক্ষণ।—যে পীড়কা অধিক স্থান ব্যাপ্ত হইয়া উঠে এবং অধিক উন্নত হয় না, তাহাকে পুত্রিনী কহে

বিদারিকার লক্ষণ।—যে পীড়কা ভূমিকুণ্ডাণ্ডেব গ্রায গোলাকাব ও কঠিন হয়, তাহাকে বিদাবিকা কহে

বিদ্রধীর লক্ষণ —যে পীড়কা বিদ্রধী বোগেব সমস্ত লক্ষণযুক্ত অর্থাৎ বিদ্রধীৰ সদৃশ হয়, তাহাব নাম বিদ্রধী

পীড়কার লক্ষণ —বায়ু, পিত্ত ও কফ কর্তৃক পীড়কা জন্মে, অতএব কফজ প্রমেহে কফজ পীড়কা, পিত্তজ প্রমেহে পিত্তজ পীড়কা, বাতজ প্রমেহে বাতজ পীড়কা হইয়া থাকে, অপব প্রমেহ বোগ ব্যতীতও মেদ দূষিত হইয়া পীড়কা জন্মে। পরন্তু পীড়কা উপপন্ন মাত্রে উহার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় না বলিয়া সেই সময়ে পীড়কা বলিয়া নিশ্চয় জ্ঞান যায় না, অতএব পীড়কার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে চিকিৎসা কর্তব্য

পীড়কার অসাধ্য লক্ষণ —যদাপি ব্যক্তিব মলদ্বার, হৃদয়, শ্রদ্ধ ও মূৰ্খ স্থানে পীড়কা জন্মিলে এবং উপদ্রব অর্থাৎ পিপাসা,

কাস প্রভৃতি উপস্থিত হইলে চিকিৎসক সেই সকল বোগীকে ভাগ্য কবিবেন

চিকিৎসা —মধু মেহ ও পীড়কাব চিকিৎসা প্রমেহেব চিকিৎসাব
গ্রায

হোমিওপ্যাথিকে মূত্রপিণ্ড ও মূত্রাশয়ের পীড়া চিকিৎসা ।

প্রমেহ ।—স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিব মূত্রযন্ত্র হইতে পুঁজেব গ্রায
ক্রেদ নিঃসরণ হয়, তাহাকেই প্রমেহ বোগ বলে

কারণ ।—স্ত্রীসংসর্গে স্ত্রী লোকের মূত্রযন্ত্রে অথবা লিঙ্গপ্রভাগে
বিষ বিশেষ উদ্ভব দ্বাবাই এই ব্যাধিব উৎপত্তি হইয়া থাকে অনেক
স্থলে এরূপ হয় যে, স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়েব প্রদাহেব তাবতম্য হইয়া
থাকে সমুদ্রজলে স্নান, শাবীবিক প্রমাধিক্য, অতিবিক্ত মাদক দ্রব্য
সেবন প্রভৃতি দ্বাবাও ইহাব উৎপত্তি হইতে দেখা যায়

লক্ষণ ।—মূত্রযন্ত্র বেদনায়ুক্ত, সঙ্কুচিত ও স্ফীত হয়, সর্বদা মূত্র
ভ্যাগেব ইচ্ছা হইয়া থাকে, প্রস্রাবকালে অসহ্য যন্ত্রণানুভব এবং কখন
কখন প্রদাহযুক্ত বেদনা নিবন্ধন মুখ সঙ্কুচিত হওয়ায় মূত্র একেবারে
বন্ধ হইয়া যায়

বিনা কারণে কামোদ্ভেক হয়, তজ্জন্য বোগীব বিলক্ষণ যন্ত্রণানুভব
হয় । পুরুষাদি মোটা ও সঙ্কুচিত হয়, এবং তাহাব নিম্নভাগে পুঁষ
জমাট হইয়া যাওয়ায় লিঙ্গাববক ত্বক আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হয় না ।
কঁচুকির শিরা সমুদয়ে বেদনা হয় কোষ্ঠপদাহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া
যখন অওকোষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, তখন উহাও স্ফীত হইয়া ঝুলিয়া

• ছোঁগিওপ্যাথিকে শূত্রপিও ও শূত্রাশয়েব চিকিৎসা ৩২১

পাড়ে এবং ভজ্জন্ত মাতি*য যজ্জগাহুভুত হয় ও তৎসহ বেদনা, ক্ষীতি, জ্বর ও বমন হইয়া থাকে

লিঙ্গাববক চর্ম উণ্টাইয়া নিজ্জাধামেব উপব সঙ্কুচিত হয়, ঐ চর্ম আকর্ষণ দ্বারা প্রকৃত অবস্থায় বাখা কষ্টকর ও অসাধ্য হয়, ভজ্জন্ত যার পাব নাই যাতনা হইতে থাকে

যখন অধিক পবিমাণে পুঁজ নির্গত হয়, অথবা একেবাবে বদ্ধ হইয়া যায়, তখন জাহু অথবা নাড়িব নিম্নস্থ অপব কোন গ্রন্থি বাতরোগাক্রান্ত হয়, এবং ভয়ানক যাতনা, দৌর্বল্য, অত্যন্ত ক্ষীণতা ও জ্বর অনুভূত হয় স্ত্রীলোকদিগেব এই রোগ প্রায় হয় না

চিকিৎসা ।—আবস্তাকালে “থ্যাকোনাইট,” “জেলুমিনিম্” দিবে ।

যখন পুঁজ বাহিব হইতে থাকিবে, তখন “কেনাভিস্,” “মেটাইডা” প্রয়োগ করিবে সেই পুঁয ঈষৎ লালবর্ণ হইলে “প্রিটমেলিনম্” দিতে হইবে

বেদনা বিহীন অবস্থায় সবুজ পুঁজ নির্গমনে “মার্কুরিয়ম্” দিবে ।
সাদা এবং সিবগযুক্ত ক্লেদে “সল্ফার” প্রয়োগ করা কর্তব্য

ঘন এবং দধিবৎ পাদার্থ নির্গমে “পল্‌মেটিল্লা” দিবে

শূত্রকালে কষ্ট ও কষ্টকর লিঙ্গাথানে “ক্যাছাবাইডিস্” ব্যবস্থা করা যায় ।

প্রস্রাবেব সহিত বক্তপ্রাবে “ক্যাছাবাইডিস্,” “পল্‌মেটিল্লা” দিতে হইবে

লিঙ্গ নিম্নদিকে বক্ত হইলে “থ্যাকোনাইট,” “ক্যাফর,” “মার্কুরিয়ম্” ও “পল্‌মেটিল্লা” প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে

শূত্রপ্রণালীেব নিম্নস্থ গ্রন্থী ক্ষীণ হইলে “পল্‌মেটিল্লা,” “মার্কুরিয়ম্,” “নাইট্রিক গ্যালাইড” দিবে

অশ্লেপযুক্ত সন্ধোচে “কেনাভিস্,” “ক্যাছাবাইডিস্,” “মার্কুরিয়াম্,” “নক্সভমিকা,” “পল্‌মেটিল্লা” ব্যবহার করিবে

আম্বাত্তাবিক : দৃঢ়তা ও তৎসহ সন্ধোচন হইলে “রিমেটিস্,” “পিট্রোল,” “সল্ফার” ইত্যাদি প্রয়োগ করিবে ।

ফাইমে সিস, প্যাৰ'ফাইমো'সিস্ (মুদা) হইলে “কেনাবিস্,” “মাকু'বিস্,” “পল্‌মেটিল্‌,” “সল্‌ফাৰ” দিলে উপকাৰ দৰ্শিবে

লিঙ্গাধাৰ ও গুৰ্ভাৰ প্রদাহ এবং বেদনায়ুক্ত, ভিত্তবে তীক্ষ্ণ বেদনা হইলে “নাইট্ৰিক য়া সিড্‌,” “সিনেবেবিস্,” “য্যাশিড্‌ ফস্‌ফবিক্‌,” “থুজা,” “ফেবম্‌,” “নেট্ৰম্‌ মিউব্‌,” “সিপিয়া” ব্যবহাবে বিলক্ষণ ফললাভ হয় ।

গুটিকাভাবের ক্ষত হইলে “মাকু'বিস্,” “সিনেবেবিস্” প্রয়োগ কবিবে ।

যদি এই বোগেৰ উপসর্গরূপে বাগী উঠে, তবে “মাকু'বিস্,” “সিনেবেবিস্” দিবে

অণ্ডকোষে বেদনা হইলে “পল্‌মেটিল্‌,” “মাকু'বিস্,” “ক্লিমেটিস্,” “নাইট্ৰিক য়াসিড্‌” দিতে হইবে

চক্ষের প্রদাহ অর্থাৎ চক্ষের জ্বালা ইত্যাদি থাকিলে “মাকু'বিস্,” “নাইট্ৰিক য়াসিড্‌,” “ইউক্রেসিয়া,” “বেলেডোনা,” “হিপার সল্‌ফাৰ” প্রযোগে উপকাৰ দৰ্শিবে

চক্ষের প্রদাহ অর্থাৎ চক্ষুজ্বালা ইত্যাদি থাকিলে “মাকু'বিস্,” “নাইট্ৰিক য়াসিড্‌,” “ইউক্রেসিয়া,” “বেলেডোন,” “হিপার সল্‌ফাৰ” প্রযোগে উপকাৰ দৰ্শিবে

সন্ধিস্থল সকল বেদনায়ুক্ত ও ক্ষীণ হইলে “ক্লিমেটিস্,” “পল্‌মেটিল্‌,” “কোপেবা,” “অর্শে,” “হিপার সল্‌ফাৰ,” “ম্যাগ্নেসিয়া,” “থুজা” ব্যবহার কবিবে

প্রমেহ রোগ প্রবর্তন হইলে “সিপিয়া,” “নাইট্ৰিক য়াসিড্‌,” “সিলিসিয়া,” “চায়না,” “ফেবম্‌,” “মাকু'বিস্,” “সল্‌ফাৰ,” “থুজা,” প্রযোগ কবিবে

অণ্ডকোষে প্রদাহ জন্মিলে “ক্লিমেটিস্,” “পল্‌মেটিল্‌” দিতে হইবে

মূত্রপ্রণালী সঙ্কোচিত হইলে “কেনাবিস্,” “ক্লিমেটিস্” ; মূত্রাশয়ের নিম্নস্থ বৃহৎ গ্রন্থি প্রদাহিত হইলে “নাইট্ৰিক য়াসিড্‌,” “পল্‌মেটিল্‌,” “ফস্‌ফাস্‌,” “সেলিলিয়ম্‌,” “সল্‌ফাৰ,” “থুজা” দিবে

হোমিওপ্যাথিকে মূত্রপিণ্ড ও মূত্রাশয়ের চিকিৎসা । ৩২৩

ঔষধের সহিত নিম্নোক্ত উপায়গুলি আন্তঃসঙ্গিকরূপে চিকিৎসাক অন্তর্গত জানিতে হইবে পবিমিত পবিমাণে এবং উত্তেজনা শূন্য লঘু-পাক দ্রব্য ভক্ষণ, স্বতপক দ্রব্য, পিষ্টক, পনির, লবণাক্ত মাংস, চা, কফি, বিয়ার, স্পিরিট প্রভৃতি মাদক দ্রব্য পবিত্যাগ, প্রচুব শীতল জল, যবেব মণ্ড, গাঁদ, চোয়ান জল, তিসি, ইমাবগুল ও মিহিদানার সববৎ প্রভৃতি তবল দ্রব্য পান ব্যবস্থা। মূত্রাশয়েব প্রদাহযুক্ত শৈল্পিক ঝিল্লী মতল প্রত্নাবেব অগ্ননাশক ক্ষাবণুগযুক্ত দ্রব্য ভক্ষণ কবা কর্তব্য। প্রদাহ বস্থায় শাবীবিক ব্যায়াম অনুচিত। কোষযন্ত্রে প্রদাহ থাকিলে যতদূব সম্ভব হেলিয়া বক্রভাবে অবস্থিতি করিতে হইবে, শারীরিক পবিশ্রম অপবিসর্ধ্য বিবেচনা হইলে কোষযন্ত্রে একটা পটী বন্ধন কবা নিতান্ত কর্তব্য। রোগীকে গরম ত্র ব্যবহাব করিতে দিবে না। বাত্রিকালে মাছবেব উপব শয়ন কবা হইবে। চিও হইয়া শয়ন করা ভাগ নয। শীতল জলে বা সমুদ্রজলে স্নান, পবিমিত পান ও ভোজন এবং বোগের প্রবল অবস্থায় নির্মল বায়ু সেবন ও পুষ্টিকব আহাব নিতান্ত আবশ্যক।

এই রোগ কখন কখন এতদূশ দৃষ্টিকিৎশ হইয উঠে যে, হোমিও-প্যাথিকে ইহাব সম্পূর্ণ প্রতিকাব কবা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু রোগেব পূর্বরূপে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা কবিলে এই বোগেব উপসর্গরূপে যে অন্যান্য বোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইতে পায় না এবং র্যাংলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা কবিলে যে সমুদায় বিষময ফল উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে পাবে না।

পিচকাবী প্রয়োগ সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ, কাবণ উহা প্রয়োগ করিলে প্রমেহস্রাব বন্ধ হইয়া কোষ প্রদাহযুক্ত ও ক্ষীত হয় এবং অন্যান্য উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে।

বাহ্য প্রমেহ।—এই বোগে লিঙ্গযুগেব উপবিভাগ ক্ষতযুক্ত হয় এবং উহা হইতে পুঁথস্রাব হইতে থাকে। প্রধানতঃ প্রমেহ জন্ত সম্পর্শন হইতে উৎপন্ন হয়; এই রোগ সন্তানগণকে অধিকতব আক্রমণ কবে।

লক্ষণ —লিঙ্গযুগের উপবিভাগে জ্বালা ও বেদনা পাব উৎপন্ন

হইয়া উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ধারণ করে, কিছু ক্ষীত হয় এবং বস্ত্রের ঘর্ষণে বা চাপ লাগিলে যাতনা বোধ হয় .

চিকিৎসা ।—মূত্রমার্গের মুখে এবং লিঙ্গাববক ত্র্যেকের পার্শ্বে ও ভিতরের দিকে গুটীর আকার দেখা যাইলে “নাইট্রিক য়াশিড” খাইতে দিবে ।

লিঙ্গাববক ত্র্যক অপেক্ষ উজ্জ্বল, গাঢ় রক্তবর্ণ ও গুটি লিঙ্গমুণ্ডের উপরি-ভাগে উৎপন্ন হইলে “কেনাবিস্” বড় উপকারী ঔষধ ।

মূত্রমার্গে সড় সড় কবা, এবং লিঙ্গবন্ধনীর নিকটবর্তী স্থলে কণ্টক-বেধনবৎ বেদনামুভব এবং তৎসহ লিঙ্গাববক ও সেই মুণ্ডে জালা বিদ্য-মান থাকিলে “চায়না” প্রয়োগে বিশেষ ফললাভ করা যায়

লিঙ্গমুণ্ড ও তৎসংলগ্নাববকে ভিতর হইতে পুঁয়শ্রাব, কামোদ্দীপক কণ্ডুয়ন অর্থাৎ চুলকানি থাকে এবং উহা প্রদাহ জন্ম ক্ষীত হয়, তবে “মার্কুবিস্” প্রয়োগ করিতে হইবে ।

লিঙ্গমুণ্ডের পশ্চাৎভাগে কণ্ডুয়ন হইলে “নক্সাতমিকা” ব্যবহারে সুফল দর্শে

উক্ত স্থান ক্ষত হইলে “থুজা” ব্যবহার কবা যায়

লিঙ্গমুণ্ড আরক্তিম, ক্ষীত ও নীতল হইলে “সল্ফার” প্রয়োগ কর্তব্য ।

লিঙ্গবন্ধনের ক্ষীতি ও টান এবং লিঙ্গমুণ্ডে অনববত শরবেধনবৎ বেদনা থাকিলে “সেবাইনা” দিতে হইবে

আহারান্তে ডাবের জল পান প্রমেহ বোগের পক্ষে বড় উপকারী ।

মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রাবরোধ ।—(১) কোন যান্ত্রিক প্রদাহ, (২) কোন যন্ত্রে ক্ষত, (৩) মূত্রপিণ্ড অথবা মূত্রাশয়ের পীড়া, (৪) স্বক্কাবস্থায় মূত্রাশয়ের গ্রীবাব নিকটবর্তী গ্রন্থিব পীড়া জন্য এই ব্যাধির উৎপত্তি হয় ।

চিকিৎসা—বোগী সমর্থ হইলে তাহাকে শয্যা হইতে উঠাইয়া গবমজগের গামলায় বসাইবে এবং সর্ষপবীৰ ফ্যানেল দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে, কিম্বা তাপিন তৈল মাখাইয়া ফোমেন্ট করিবে ।

হাকিমীমতে প্রমেহাদি পীড়ার চিকিৎসা। ৩২৫

জ্বাৰুভব হইলে প্রতি অৰ্দ্ধ ঘণ্টা বা .৫ মিনিট অন্তর “য্যাকো-নাইট” অথবা “ক্যান্থাবাইডিস্” প্রয়োগ করিবে।

জ্বরবোধ না থাকিলে অৰ্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর “নক্সভমিকা” ও “ক্যান্থাবাইডিস্” দিতে হইবে।

উপবোক্ত উপায়ে প্রস্রাব না হইলে শলাকা প্রয়োগ দ্বারা প্রস্রাব কবাইতে হইবে।

অসম্মত মূত্রবেগ।—অনেক সময় এরূপ হয় যে, মূত্রবেগ সম্ভবণ কবা রোগীর পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠে ইচ্ছা না থাকিলেও আপনা হইতে মূত্র নির্গত হইয়া থাকে। এরূপ পীড়া প্রায়ই বার্ষিক্যাবস্থায় উপস্থিত হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।—রক্তাবস্থার পীড়ায় “আর্শেনিক” ও “নক্সভমিকা” প্রয়োগ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় এরূপ হইলেও “নক্সভমিকা” প্রয়োগ করা যায়।

কখন কখন কান্সি জন্ম এই পীড়া হইতে দেখা যায়, এরূপ হইলে “পল্‌সেটিনা” দ্বারা উপকাৰ দর্শে।

বালক এবং যুবা ব্যক্তিদিগের এই পীড়া হইলে রাত্রিকালে শয়নের পূর্বে “বেলেডোনা” এবং “ক্যাল্‌বেবিয়া” এক সপ্তাহ কাল ব্যবহার করিলে পীড়া শান্তি হইবে। এই পীড়া ক্রিমিজন্ম হইলে “সিনা” ব্যবহার করা কর্তব্য।

হাকিমীমতে প্রমেহাদি পীড়ার চিকিৎসা।

প্রমেহ।—প্রস্রাবের দ্বাবদিয়া পূঁয়েব মত এক প্রকার পদার্থ নির্গত হয় এবং জ্বালা ও বেদনা করে, বিশেষতঃ প্রস্রাব ত্যাগ করিবার সময় সেই জ্বালা অধিকতর বৃদ্ধি হয়, কোনমতে তাহা সহ হয় না। মিদ স্ফীত হইয়া উঠে।

কারণ । অশুচী স্রীগমনই ইহার প্রধান কারণ ।

কাবাব চিনি চূর্ণ ... ১ ম সা ।

গঁদ ... ১ মাস ।

আবোণ্য না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন ২ ৪ বার সেবন করাইবে ।

বোণের আবন্তের সময় নিম্নোক্ত ঔষধ দ্বারা পিচ্কারী দিবে ।

তুঁতে চূর্ণ ... ২ রতি

জল ... ১ ছটাক ।

অণ্ডকোষ ফুলিয়া উঠিলে তাহার পশ্চাতে জোক বসাইবে এবং নিম্নোক্ত ঔষধ খাইতে দিবে

বিটলবণ ... ১০ রতি ।

সোরা ... ১০ রতি

রেউচিনি ... ১৬ রতি

একএ চূর্ণ করতঃ অর্ধ ছটাক জলের সহিত খাইতে দিবে ।

কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে এরও তৈল অর্ধ ছটাক খাইতে দিবে ।

ইহাতে ফুল কটিলে পুনর্ব্বার উক্ত প্রকারে পিচ্কারী দিবে ।
পিচ্কারী দিবার জন্য উপায়, যথা,—

ফট্‌কিবি ... ২ রতি ।

জল ... ১ ছটাক ।

একত্র মিশ্রিত করিয়া লিঙ্গছিদ্রে পিচ্কারী দিবে ।

ইন্দ্রবাকলী ... ২০ রতি ।

শ্বেত তুঁতিয়া ... ১ রতি

পারদ চূর্ণ ... ১০ রতি

জলে মাড়িয়া ২টী বটী প্রস্তুত করিবে এবং সন্ধ্যাকালে দুইটী বটীই খাওয়াইয়া প্রাতঃকালে ভেবেণ্ডার তৈল অর্ধ ছটাক খাইতে দিবে ।

আবাম না হওয়া পর্যন্ত তিন দিন অন্তর উক্ত প্রক্রিয়া করিবে ।

কেবল পিচ্কারী দ্বারা এই বোগ প্রশমিত হইতে পারে, কখন বা উপবোক্ত বটীকা সেবনেও উপকার দর্শিতে পারে । বোগ কঠিন হইলে উভয়বিধ প্রক্রিয়াই করিতে হইবে । অধিক দিনের পীড়া হইলে

হাকিমীমতে প্রমেহাদি পীড়ার চিকিৎসা। ৩২৭

আবাম হওয়া কঠিন হয় ; যদি ঔষধাদিতে অ বাম ন হয়, তবে নীচেব লিখিত উপায় অবলম্বন করিবে

কাবাব চিনিব তৈল ২০ ফাঁট

এই মাএয় দিবসেব মধ্যে ৩৪ বাব খাওয়াইনে, পিচ্কাবী মানিবে, আব মধ্যে মধ্যে অতি অল্প মাত্রায় তাপিন তৈল খাওয়াইবে। ইহাতে বোগী নিশ্চয় আবোগ্য লাভ কবিবে

প্রমেহ পীড়া স্ত্রী-পুরুষ উভয়েবই তুল্য কিন্তু পুরুষেব এই বোগ হইতে আব এক প্রকাব পীড়া জন্মে, তাহাতেও পুঁয়েব আয় বীৰ্য্যপাত হয় এই ব্যাধি জীগমন দ্বাৰা হয় না, কেবল কামবন্ত্ৰেব দৌৰ্বল্য জন্ম হইয়া থাকে। ইহাতেও উপবিলিখিত ইন্দ্রবাকনীৰ বটীকা প্রয়োগ কবিবে এবং শ্বেত তুঁতিয়া এক বতিতে অর্দ্ধ ছটাক জলে মিশ্রিত কৰিয়া পিচ্কারি মানিবে

আব এক প্রকাব প্রমেহ বোগ আছে, তাহাতেও পুঁয়েব ন্যায় পদার্থ নির্গত হয় কিন্তু তাহাতে কোন বেদনা কিম্বা জ্বালা থাকে না প্রমেহ বোগ অনেক দিনেব পুৰাতন হইলে একপ পীড়া জন্মে

চিকিৎসা।—শলাকাব উপবে পাবা অথবা তাপিন তৈলেব ওলেপ মাখাটয়া দুই তিন বাব লিঙ্গেব ভিতর প্রবেশ কবাইবে এবং নিম্নোক্ত ঔষধ প্রয়োগ কবিবে

কাবাব চিনি চূর্ণ	..	..	৪ বতি
লৌহ চূর্ণ	..	...	৪ বতি।
গাঁদ	...	..	৪ বতি।
মিছরী	..	..	৪ বতি।
চ খড়ি	..	..	৪ বতি

এবএ মিলিত কৰিয়া ৩টী বটী প্রস্তুত কৰিয়া প্রতিদিন পাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে সেবন কবাইবে।

অন্য প্রকার প্রমেহ।—দিবসে কিম্বা রাত্রে শয়ন কৰিবাব সময় শুক্রপাত হয় ; একপ শুক্রপাত কখন মনেব কামোদ্বেক হওয়া প্রযুক্ত, কখন বা বিনা কাৰণে হইয়া থাকে, তাহাতে শবীব ও মন দুৰ্ব্বল হয়

এই প্রকার বোগে কখন কখন মনুষ্যের জীবনহানি পর্যন্ত হইতে পারে যদি সাক্ষাৎসম্বন্ধে উক্ত বোগে প্রাণনষ্ট না হয়, তবে উহা কর্তৃক আবণ্ড অনেক সাংঘাতিক বোগ জন্মে, যাহাতে জীবনবক্ষা অসাধ্য হইয়া উঠে । উহা হইতে সাধাবণতঃ উন্মাদ বোগ জন্মিতে পারে ।

কারণ ।—মনেব অপবিত্রত, অপবিত্র বস্তু্যের প্রত্যক্ষ দিলে, অথবা হস্তমৈথুন কবিলে এই পীড়া প্রায় জন্মিতে পারে

চিকিৎসা ।—মনকে সর্বদা শুচি ও সচ্ছন্দ রাখিবে শরীর বেশ পবিত্র পবিত্র রাখিবে, হস্তমৈথুন জন্ত এই ব্যাধি জন্মিলে উক্তবিধ অসৎ পন্থা হইতে বোগীকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিবাহ করিতে উপদেশ দিবে বুঝাইয়া দিবে যে, তাহা না করিলে তাহাব বহুশূন্য জীবনেব অপচয় ঘটিবে

অপ্প আহাব কবিত্তে দিবে, তাহাব তাৎপর্য এই যে, যেন অমিত-আহাব জন্য অজীর্ণ দোষ না ঘটে দুগ্ধ, মাংস ও মসলাদি খাইতে দিবে না । কেবল যখন দৌর্বল্য ঘটিবে, তখন উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ কবিত্তে হইবে, তখন ক্ষুধা বিবেচনায় ঐ সকল দ্রব্য দিতে পারা যাইবে যাহাতে শরীর শীতল থাকে, তাহাব উপায় করিবে এ অবস্থায় যেন শরীর বা মন কোন একাবে উত্তেজিত না হইতে পায় তৎপক্ষে সাবধান লইতে হইবে নিয়মিত এম কবিত্তাব উপদেশ দিবে । অন্য কোন পবিত্রম ব্যবস্থা না কবিত্তা প্রাতে ও মাঝাহে কিয়দূর এমণ কবিত্তে বলিবে, অর্থাৎ কোন মতে শরীরে আলস্য ন জোটে । মানসিক চিন্তা কবিত্তে একবাবে নিষেধ কবিত্তা দিবে

অণ্ডকোষেব নীচে হইতে গুহদ্বাবেব নিকট পর্যন্ত ফোস্কাজনক মলম বসাইবে পাবে,—

পাবদ চূর্ণ	...	...	...	১ রতি
মুসব্বব	...	...	...	৪ রতি

জলে মর্দন কবিত্তা দুইটী বটী করিবে এবং একবারে দুইটীই সেবন কুবাঁইবে আবার ন হওয়া পর্যন্ত প্রতি তিন দিন অন্তর্ব এই প্রক্রিয়া

ছাকিমীমতে প্রমেহাদি পীড়ার চিকিৎসা ৩২৯

কবিবে যাহাতে পতিদিন কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এমন ব্যবস্থা কবিবে অর্থাৎ যুগ্ম বিবেচক ঔষধ দিবে

যুগ্মাবরোধ ।—এই বোগে তলপেটে বেদনা করে, প্রস্রাব বন্ধ হয়, কখনও বিন্ধ বিন্ধ পতিত হয় ।

কাশ্মণ —মূত্রাশয়েব মুখ প্রদাহযুক্ত ও মূত্রনলি বন্ধ হয়, এই জন্ত প্রস্রাব নির্গত হইতে পারে না

প্রস্রাবের বেগ ধারণ কবিলে অর্থাৎ যখন প্রস্রাব ত্যাগ কবিবার বেগ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু কোন কারণে প্রস্রাব ত্যাগ ঘটিয়া উঠিল না, এরূপ হইলে মূত্রাশয় পূর্ণ হওয়া প্রযুক্ত তাহাব শির সমুদায় সঙ্কুচিত হইতে পারে না, এজন্যও কখন কখন প্রস্রাব বন্ধ হয়

প্রস্রাবনলির দ্বাবে পাথরি আটকাইলে কিম্বা যা হওয়াব জন্ত পুঁথ জমাট হইলে তাহাতেও মূত্রবন্ধ হয়

চিকিৎসা —গরম জলে কাপড় ভিজাইয়া তাহা তলপেটে রাখিয়া দিবে এবং এক কলসী শীতল জল মস্তকে ঢালিয়া দিবে

ভেবেণ্ডার তৈল অর্দ্ধ ছটাক গরম জলের সহিত খাইতে দিবে, তাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে, পাবে—

সোবা	..	১ তোলা
শস বীজ		০ তোলা
কাজি	.	অর্ধ ছটাক

একত্র বাটিয়া তলপেটে প্রক্ষেপ দিবে, আর,—

সোবা	..	৫ বতি
কাজি	..	১ তোলা

একত্র মিশ্রিত কবিয়া প্রতি ঘণ্টায় সেবন করাইবে ইহাতে ৩ ৪ ঘণ্টা মধ্যে প্রস্রাব হইবে নিঃশঙ্ক ন হয় তাহা হইলে শলা ব্যবহার কবিবে ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

স্যালোপ্যাথিকে শিফ্লিস্ বা উপদংশ চিকিৎসা ।

শৃঙ্গাবকালে জননেন্দ্রিয়েব কোন না কোন স্থান দিয়া এক প্রকাব বিষ শবীবে প্রবেশ কবে হাম, বমন্ত, আবত্ত জ্বব যেমন একপ্রকাব বিষ হইতে উৎপন্ন, এই পীড়াও তজ্জপ একপ্রকাব বিশেষ বিষ হইতে যে উৎপন্ন হয় তৎপক্ষে সন্দেহ নাই

লক্ষণ —এই বিষ শবীবে প্রবেশ কবিলে ক্ষত প্রকাশ হইবাব পূর্বে দুই তিন সপ্তাহ উছা গুপ্তভাবে থাকিতে পাবে ঐ বিষ কখন প্রকাশ্যঃ কার্য্য কবিতো আবত্ত কবে, তখন লিঙ্গমুণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ দেখিতে পাওয়া যায় উহাব চতুর্দিক কঠিন এবং ঐ ব্রণ বিদীর্ণ হইয়া ক্ষত প্রকাশ পায় ঐ ক্ষত হইতে পুঁয় নির্গত না হইয়া একপ্রকাব বিবর্ণ জলবৎ ক্লেদ নির্গত হইয়া থাকে দশ পনব দিন এইরূপে থাকিলে বোগীব আলস্যবোধ, উদ্যমহীনতা এবং জ্বববোধ হয় কখন কখন জ্ববেব সঙ্গে কম্প হইতে দেখা যায় । মধ্যে মধ্যে জ্ববেব উপশম হইয়া থাকে, তজ্জন্ত সবিবাম্ বা সম্প্রবিবাম জ্বব বলিয়া এম জন্মে কখন কখন যক্ৰুৎ ও প্রকাশ্যেব ব্যতিক্রম ঘটিয়া ক্ষুধামান্দ্য, বিকৃতশ্বাস, জিহ্বা নেপযুক্ত, বমননেচ্ছা, উদবাসয় ও শিবঃপীড়া হইয়া থাকে । কখন সমুখ কপালে, কখন পশ্চাৎ কপালে, কখন সমস্ত গ্রীবাদেশে, কখন বা সমস্ত মস্তকে, কখন পঞ্চম যুগল স্নায়ুব উর্ধ্ব বা অধোশাখায় স্নায়বিক বেদনা হওয়ায় বোগী অত্যন্ত যত্নগ্ৰস্ত কবে । সচবাচব এই সকল লক্ষণ বাণিকালে বৃদ্ধি এবং প্রাতঃকালে উপশম হয়

দ্বিতীয়াবস্থায় ত্বেব উপবিভাগে কণ্ডু অর্থাৎ চুলকানী হয় এই সকল কণ্ডু তাম্রবর্ণ ও চকাকাব হইতে দেখা যায় প্রকৃতি ক্ষত প্রকাশ হইবাব প্রায় দেড় মাস পবে ইছাবা প্রকাশিত হয় ত্বেবেব উপব কণ্ডু

য়্যালোপ্যাথিকে শিফ্লিস্ বা উপদংশ চিকিৎসা । ৩৩১

বাহিব হইব ব কালে অথবা তাহার পূর্বে কখন কখন মুখগহ্বর ও গলা-
ভ্যন্তরের শৈথিল্য বিল্লীতে ক্ষত হইয়া থাকে কখন কখন চক্ষের
পাতায় দৃঢ় ক্ষত হইতে দেখা যায় । নখ পুরু, নিম্নবেথায়ুক্ত ও বক্র হয় ।
কণ্ঠ বাহিব হইবাব পূর্বে কখন কখন মস্তক, নেত্র ও শ্রবণ কেশ পতন
হইতে দেখা যায় এই সময়ে পোষ শরীরে জ্বরভাব, দৌর্বল্য, মস্তক-
বেদনা, শ্রীবাদেশস্থ গ্রন্থি সকল ক্ষীণ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়
এরূপ অবস্থায় কখন কখন দুই মাস হইতে ছয় মাস পর্যন্ত অতি
দীর্ঘ হয় ।

তৃতীয়াবস্থা ২ । ৩ মাস হইতে অনেক দিন পর্যন্ত অবস্থিতি করিতে
পারে বোগী স্ত্রাবস্থায় থাকতে মনে কবে যে, নীবোগ হইয়াছে,
কিন্তু কখন কখন এই অবস্থায় জিহবা, ওষ্ঠ ও হস্তপাদাদিতে নানা প্রকার
ক্ষত হইয়া থাকে

চতুর্থাবস্থা কতকাল অবস্থিতি করে তাহার নিশ্চয়তা নাই । এই
অবস্থার সাধারণ লক্ষণ—মুখগহ্বরে, গলাভ্যন্তরে ও ত্বকে নানা প্রকার
অসম্যাকৃতি ক্ষত, পেলী, শ্বায়ু প্রভৃতি গলাভ্যন্তরিক যন্ত্রের পীড়া ইত্যাদি
হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য অধিকতর সাংঘাতিক বোগান্তর প্রাপ্ত হইয়া
বোগী প্রাণত্যাগ করিতে পারে

চিকিৎসা ।—এই বোগে পারদ ব্যবহারসম্বন্ধে নানা মতভেদ দৃষ্ট
হয় ফলতঃ যিনি যাহাই বলুন, অণ্যান্য ঔষধ প্রয়োগে যদিও বোগোপ-
শম হয় বটে, কিন্তু তাহাতে বিলক্ষণ কালবিলম্ব ঘটে, এবং সেই কাল-
বিলম্ব হইলে অন্যান্য অনেক অনিষ্ট হইতে পারে ; এজন্য সম্ভব পীড়া
শান্তি করিতে হইলেই পারদ নির্ভীক প্রয়োজনীয়, ইহা সকলেই স্বীকার
করেন পারদ নিম্নোক্ত তিন প্রকার ব্যবহার করা যাইতে পারে ।
পারদের বটিকা বা রুপিল, * ক্যালোমেল বা কবোসিভ সল্লিমেট মেবন,
পারদখটিত মলম গাত্রে মর্দন, বা পারদযুক্ত বাষ্পাভিষেক গ্রহণ শৈশ-

রুপিল ।—পারদ ২ ভাগ, কন্ফেক্সন্ অথ বোজ ৩ ভাগ, তৈল-
মধু চূর্ণ ১ ভাগ

বাবস্থায় পাবদঘটিত মলম গাত্রে মর্দন কবাই সর্ব্বতে ভাবে কর্তব্য ।
 এক বা দুই ড্রাম পবিমাণে পাবদেব মলম প্রতিদিন মর্দন করিলেই দস্ত
 মাড়ি ক্ষীত ও বেদনাযুক্ত হইতে পাবে পাবদেব বাম্পাভিষেক কবিতে
 হইলে প্রথমে ২ ৩ দিন প্রত্যহ, পরে মণ্ডাহে দুইবার ব্যবহার করিলেই
 কৃতকার্য হইতে পাবা যায় পাবদ সেবন প্রণালী কয়েকটি নিম্নে বিবৃত
 হইতেছে

হাইড্রার্জ বাই কম িটা . . . ৫ গ্রেণ

পল্ভুরিস্ ইপিক্যাক্ কম ওপিয়াই . . . ৫ গ্রেণ ।

একত্র মিশ্রিত কবিয়া ৮ ১০ ঘণ্টা অন্তর সেবন কবিতে হইবে ।

পিলিউলা ক্যালোমেলাস্ কম্পজিটা . . . ৫ গ্রেণ ।

এক্সট্রাক্ট ওপিয়াই . . . ২ গ্রেণ ।

জলে মর্দন কবিয়া এক একটি বটী প্রস্তুত কবিবে প্রাত্রে এবং
 সন্ধ্যায় এক একটি প্রয়োগ কবিবে এই বটিকাকে “কম্পাউণ্ড ক্যালো-
 মেলা পিল্” বলে

হাইড্রার্জিবাই আইওডাইড ভিবাইড . . . ১২ গ্রেণ

এক্সট্রাক্ট লিউপুলি . . . ৬০ গ্রেণ ।

এক্সট্রাক্ট ওপিয়াই . . . ২—৫ গ্রেণ

জলে মাড়িয়া ২৪টি বটী প্রস্তুত কবিবে এবং প্রতিদিন ২ ৪টি সেবন
 কবিতে দিবে

হাইড্রার্জিবাই আইওডাইড ভিবাইড . . . ৬ গ্রেণ

এক্সট্রাক্ট কনিয়াই . . . ৬০ গ্রেণ

জলে মর্দন কবিয়া ৬টি বটীক প্রস্তুত কবিবে এবং প্রাত্ৰাত্রে শয়ন-
 কালে এক একটি খাইতে দিবে . . .

ক্ষত নিবারণ জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার কবা যাইতে পারে ।

পটাসি আইওডাইড . . . ৩০—১২০ গ্রেণ ।

গিসবি . . . ২ আং ।

টিং য়াকোনাইটি . . . ২২ বিন্দু ।

ডাইনম্ ইপিক্যাক্ . . . ১ ২ ড্রাম

গ্যালোপ্যাথিকে স্ফিলিস্ বা উপদংশ চিকিৎসা ৩৩৩

সাক্সি টেব্যাক্সি ৫ ১ ড্রাম ।

ডিকক্সন সারসা কম্পোজিটী ৭ ১ আং

ছয় মাত্রা । দিবসে তিনবার প্রয়োগ করিবে

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উপদংশে নিম্নোক্ত ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ ।

হাইড্রার্জিরাই আইওডাইড ডিবাইড ২ গ্রেন

একফ্রাক্টী ওলিফাই ১ গ্রেন

একফ্রাক্টী হায়েমায়েমী ৬ গ্রেন

ছইটী বটিকা প্রস্তুত করিবে এবং প্রতিদিন বাত্রি ১১ টাব সময়
যখন শয়ন করিতে যাইবে, সেই সময় একটী খাইতে দিবে

আহাবের পূর্বে স্ফিলিস্ জলের সহিত ৩—১০ গ্রেন মাত্রায় আইও
ডাইড অফ পটাসিয়ম ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শে অস্থি পর্যন্ত আক্রান্ত
হইলে এই ঔষধ বিশেষ কার্যকর, কিন্তু অধিক দিন সেবনে ছর্দি, কাশি,
অস্ত্রের উত্তেজন ইত্যাদি অহিতকর ব্যাপার ঘটিতে থাকে তাহা হইতে
আরম্ভ করিলেই উহার ব্যবহারে ক্ষান্ত থাকিবে

মুখগহ্বরের ক্ষত এবং মুখে লাল নিঃসরণ করিতে হইলে কোবেট
অফ পটাশ পারদেব সহিত ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শে ।

গাত্রের চাঁকা চাঁকা দাগ হইলে ওৎপ্রতিকারার্থ,—

হাইড্রার্জিরাই ব্রোমাইডি ১ গ্রেন

একফ্রাক্টী সারসা লিকুইড ১ ১ ড্রাম

ডিকক্ট সারসা কম্পোজিটী ১ ১ আং

প্রতিদিন তিনবার সেবন করাইতে হইবে

গাত্রবেদন, নিদ্রাভাব এবং সাধাবণ উত্তেজন নিবারণার্থ আফিম
ব্যবহার করিবে . . .

এই বোগে নানা প্রকার লোশন ব্যবহৃত হইয়া থাকে সেই সকল
লোশন দ্বারা ক্ষতস্থান দৌত করিতে হয়. নিম্নে কয়েকটী লোশন প্রস্তু-
তের নিয়ম লিখিত হইল

লাইম ওয়াটার ১ আউন্স

ক্যালোমেল ৫ গ্রেন ।

নেকড়ায় ভিজাইয়া ক্ষত স্থানের উপর দিও হইবে

হাইডার্জিবাই কবোগিভী মল্লিগেটী ৪—৬ গ্রে° ।

য়াকোয়া ডিফিলেটী ২ ই আং

উপবোক্ত প্রকারে প্রয়োগ করিবে

পথ্য —প্রথম ক্ষত অবস্থায় উষ্ণ দ্রব্যাদি ভক্ষণ নিষিদ্ধ, কিন্তু দ্বিতীয়াবস্থায় শবীর দুর্বল ও শীর্ণ হইলে পুষ্তিকর অথচ লঘুপাক পথ্য দিবে । এ অবস্থায় মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, দুগ্ধ প্রভৃতি অপথ্য বলা যাইতে পারে । গবম কাপড় যথা —ফ্ল্যানেল, বনাত প্রভৃতি দ্বারা সর্বদা শবীর আবৃত রাখা কর্তব্য । উষ্ণজলে স্নান এবং বাষ্পাভিষেক দ্বারা শাবীরিক যন্ত্রণার বিশেষ শান্তি হইবার সম্ভাবনা

বৈদ্যকে উপদংশ চিকিৎসা ।

উপদংশের কারণ ও প্রকারভেদ । লিঙ্গানলে হস্তেব আঘাত, অনুরাগবশতঃ স্রীকর্তৃক নখবিদ্ধ ও দংশিত, লিঙ্গানল অপবিদ্ধাব, অত্যন্ত স্রীসংসর্গ, যোনিদোষ, এবং ক্ষার ও উষ্ণজলে লিঙ্গানল প্রক্ষালন করিলে উপদংশ অর্থাৎ গবমি রোগ জন্মায় ।

বাতজ উপদংশের লক্ষণ ।—বায়ুজনিত উপদংশ রোগে লিঙ্গ নলেব অগ্রভাগে, বেটনচর্মেব নীচে, উন্নত মাংসবেটনেব নিম্ন প্রদেশে অথবা উপরে নানাপ্রকার বেদনায়ুক্ত ক্ষেপটক অর্থাৎ ফুস্কুড়ি জন্মে এবং লিঙ্গনলি কম্পিত হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—শুষ্ক পারা, বঙ্গভস্ম শ্বেত খদির, হরীতকী ভস্ম, কোমল কদলী ফুল ভস্ম, সুপাবী ভস্ম, প্রত্যেক ১ তোলা, হিঙ্গুল, হরিতাল, গন্ধক, তুঁতে, পদ্মকাষ্ঠ, সরল কাষ্ঠ, শ্বেত চন্দন, বক্তচন্দন, দেব-

দাক, বকমকাঠ, নাগেশ্বর কঠ, প্রত্যেক ১ মাস। এই সমস্ত একত্রিত
কবিষ চূর্ণ কবিবে। লৌহপাণ্ডে লৌহদণ্ড দ্বারা আমকুলেব বস, তুলসী
পত্রের বস, পুবাণ্ড ও গুড় ও ঘূতেব সহিত মাড়িয়া ৬টি গুলি প্রস্তুত কবিবে।

ধূম গ্রহণের নিয়ম ।—বেগীব মুখ, নাসিকা ও কণ ভিন্ন অপব
সমস্ত গাএ শুষ্ক বস্ত্রে আবৃত কবিয়া তাহাব মধ্যে সবাত্তে নিধূম অগ্নিব
অঙ্গাব বাখিয়া তাহাতে পূর্কোক্ত একটী গুলি নিক্ষেপ কবিবে। পীড়া
রুদ্ধি হইলে ২টী হইতে ৪টী পর্যন্ত গুলিব ধূম গ্রহণ কর্তব্য। ত পবা
লাওয়া শেষ হইলে শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা ঘর্ম মুছিয়া ফেলিবে। তিন দিন এই
রূপ করিলে বোগ সম্পূর্ণ আবেগ্য হইবে। ঐ তিন দিন দিবসেব পব
উষ্ণজলে স্নান কবিবে। এক মাস অতি সাবধানে থাকিবে। শাক,
অন্ন, দধি, গুড় অন্ন, পাঁচস, প্রভৃতি দ্রব্য ইহাতে কুপথ্য।

রুম গুণ্ণুল ।—পাণ্ডন যন্ত্র শোধিত পারা ১০০ বতি, চিনি
৩০০ বতি শোধিত মহিষাক্ষ গুণ্ণুল ৪০০ বতি, ঘূত ১০০ বতি, এই সমুদায়
একত্রে উত্তমরূপে মাড়িয়া ২০ টী বটিকা প্রস্তুত কবিবে। প্রথম তিন
দিবস প্রত্যহ ৩টী কবিয়া, চতুর্থ দিবস হইতে ১টী কবিয়া সেবনীয় ; ১৪
দিনে সমুদয় ঔষধ শেষ হইবে।

পথ্য । প্রথম দিবসে পাদাংশ, দ্বিতীয় দিবসে অর্দ্ধেক, তৃতীয়
দিবসে পাদোদন অর্থাৎ ৬০ আনা পবিমাণে আহ ব কর্তব্য। গুড়যুক্ত
বাজ্ঞন ও মসুর ডাইলেব যুস্, শাকের মধ্যে পুনর্গনা এবং পলুতা, তিক্তপত্রী
অর্থাৎ কঁাকবোল, গোক্ষুবী, পুটপত্রী, কুলেখাড়া এই সমস্ত ঘূতে ভাজিয়া
আহাব কবিবে। লবণ নিষিদ্ধ, ইহার পবিবর্ত্তে চিনি এবং বাটনাব
পরিবর্ত্তে ধনের বাটনা ব্যবহার কবিবে। অন্যান্য মসূলাব পবিবর্ত্তে
কৃষ্ণজীব, হিঙ্গু, জীবা ব্যবহার্য। ভৈবববমোক্ত নিয়ম প্রতিপালন
কবিবে।

পিত্তজ উপদংশের লক্ষণ — পিত্তজনিত উপদংশে লিঙ্গনালের
অগ্রভাগে পূর্কোক্ত স্থানে ক্লেদযুক্ত পীতবর্ণ স্ফোটক উৎপন্ন হয় এবং
ইহা জ্বালা করে।

চিকিৎসা — ঘূত ও মেব, কাথার্থ—চিবাত, নিমপত্র, ত্রিফলা, পটোল

পত্র, করঞ্জবীজ, জা ভীপত্র, খদিবকাঠ, অমনছ ল, প্রত্যেক ১ সেব অর্থাৎ সমুদয়ে ৮ সেব, জল ৬৭ সের, শেষ ১৬ সেব কল্কার্থ পূর্বোক্ত কাথ জায় প্রত্যেক ১ পল, অর্থাৎ সমুদায় ১ সেব ইহাব নাম “ভূনিম্বাদ্য ঘৃত ”

অগারধুমাদ্য তৈল ।—তৈল ৪ সেব, কল্কজব্য গৃহেব সুল ১ পল ১ কর্ষ ৫ মাসা ৩ বতি, হবিজা ২ পল ২ কর্ষ ১০ মাসা ৬ বতি, মদ্য বীজ ৪ পল জল ১৬ সেব

রক্তজ উপদংশের লক্ষণ ।—বক্তজনিও উপদংশে লিঙ্গনালের অগ্রভাগে বেটনচর্মেব নীচে, উন্নত মাংসবেটনেব নিম্নপদেশে অথবা উপরে মাংসেব বর্ণযুক্ত অথবা কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক জন্মে এবং উহা হইতে বক্তজাব হয় অপব পিত্তজ উপদংশেব সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়

চিকিৎসা ।—পত্রা ২ বতি, অহিফেন ১২ রতি ; এই দুই জব্য বৌহপাত্রে নিম্নদণ্ডাবা তুলসী পত্রেব বসে মাড়িয়া ইহাব সহিত হিঙ্গুল ২ বতি মিশাইয়া পুনবায তুলসীব রসে মাড়িবে পবে জয়ত্রী, জায়ফল, খোবাসানি, যমানী আকবকবা, প্রত্যেক ৩২ বতি ইহাদেব দ্বিগুণ খদিব উহ ব সহিত সংযুক্ত কবিয়া তুলসীব রসে মাড়িয়া চণক প্রমাণ বটী কবিবে প্রত্যহ সাবংকালে দুইটী কবিয়া সেবন কবিবে ইহাব নাম “বস শেখর ”

ক্ষুদ্র প্রয়োগ —প্রত্যহ ত্রিফলাব কাথে অথবা ভীমবাজেব রসে ক্ষত দৌত কবিবে

কটাহ অথবা নূতন হাড়িব মধ্যে হবিতকী, আগলকী, বহেড়া সম-ভাগে বাখিয়া উহাতে সবা ঢাকা দিয়া নীচে অগ্নি জ লিয়া দিবে কিয়ৎক্ষণ পবে ঐ সমস্ত ভস্ম হইলে, ঐ ভস্ম লইয়া মধুর সহিত মিশা ইয়া উপদংশীয় ক্ষতে পলেপ দিবে

শিরীষ ছাল কিম্বা হবিতকী পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ বসাক্ষণ সংযুক্ত কবিয়া বা মধু ও বসাক্ষণ একত্র মিশাইয়া প্রলেপ দিবে

বফজ উপদংশেব লক্ষণ ।—বফজনিও উপদংশে লিঙ্গনালের অগ্রভাগেব পূর্বোক্ত স্থানে যে স্ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহ হইতে গাঢ়

পুঁজজাব হয় এবং লিঙ্গন ল অত্যন্ত ক্ষীণ ও প্রস্রাবের সহিত শুক্রস্রাব
হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—স্বত ৪ সেব, কাথার্থ—করঞ্জাবীজ নিষ্পত্র, অর্জুন
ছাল, শালছাল, জামছাল, বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বথ, পাকুর, বেত, ইহাদের
প্রত্যেকের ছাল, এই সমস্ত ৮ সেব, জল ৬৪ সেব, শেষ ১৬ সেব। কল্ক
দ্রব্য পূর্বোক্ত কাথ দ্রব্য সকল মিলিত ১ সেব ইহাও মাধ “করঞ্জাদি
স্বত।’

রসভৈরব।—শোধিত পারা ১০০ বতি, চিনি ৩০০ বতি, এই উভয়
দ্রব্য লৌহপাত্রে নিষ্পদণ্ড দ্বারা ১ প্রহর মাড়িয়া ১০০ বতি খদিব দিয়া
মাড়িয়া কাজলের গায় কবিয়া ২০ টী বটিকা পল্লভ কবিবে এবং ঐ বটী
গুলি গোধূম চূর্ণের সহিত বাখিবে। উপদংশের বিযজ্ঞ গাত্রে সমুদয়
ব্রণ নিঃশেষ হইয়া নির্গত হইলে ঔষধ সেবন করিবে প্রথম তিন
দিবস প্রত্যহ ৩টী কবিয়া সেবন কবিবে চতুর্থ দিবস হইতে প্রত্যহ এক
একটী কবিয়া সেবা। ১৪ দিনে বটিকা শেষ হইবে ও রোগের শান্তি
হইবে।

পথ্য।—চিনি ও অম্প স্বতসংযুক্ত উষ্ণ জল, জলপান বা
জলস্পর্শ একবারে নিষিদ্ধ অসহ্য তৃষ্ণা হইলে ইক্ষু ও দাড়িগাদি দ্বারা
নিবারণ কবিবে মলচ্যাপান্তে উষ্ণ জল দ্বারা শৌচক্রিয়া সম্পাদন
করিয়া তৎক্ষণাৎ শুষ্ক বস্ত্র দিয়া গৃহদেহ মুছিবে। বায়ু, বৌদ্র, অগ্নি-
তাপ একবারে বর্জনীয়

বর্ষা বা শীত ঋতুই ঔষধ সেবনের উপযুক্ত কাল। ইহাতে যদি মুখ-
বোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তদুপযুক্ত চিকিৎসা কবিবে। পবিত্রাগ্নি,
পথ-পর্ষাটন, ভাববহন, অধ্যয়ন, দিবানিদ্ৰা পবিত্যাগ কবিবে। সর্বদা
কপূর্বাদি সুবাসিত তাম্বুল চর্ষণ আবশ্যক। ইহাতে কফনাশক অথবা
বায়ু ও পিত্তের অবিবোধোক্তি বিধান করিবে লবণ, অা, দিবানিদ্ৰা,
স্ত্রীলোকেব মুখদর্শন নিষিদ্ধ। এইরূপে ১৪ দিন গত হইলে উষ্ণ জলে
স্নান ও জাঙ্গল মাংসেব যুগ্ম ব্যবস্থেয়। রোগী প্রকৃতস্থ না হইলে ব্যায়াম-
াদি কবিবে না। নিয়মের অনুবর্তী ও জিতেজিয় হইয়া ঔষধ সেবনীয়।

ত্রিদোষজ উপদংশের লক্ষণ — ত্রিদোষজনিত উপদংশে লিঙ্গনালের অগ্রভাগে, চর্মের নীচে মাংসপিণ্ডে যে ক্ষোটক হয়, তাহাতে বাতজ, পিত্তজ, কফজ ক্ষোটকের সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা। — মবিচাধবা লৌহপানে লৌহদণ্ড দ্বারা বিষতিন্দ্র মাণ্ডিক, পবে ক্রমান্বয়ে সিজমু, স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে, পাঁচা ময়ূদায় ধর্ম কবিয়া একত্রে ভুত করিবে ইহ দ্বারা লিঙ্গে প্রলেপ দিবে ঐ প্রলেপ শুষ্ক হইলে তাহার উপবিভাগেই পুনর্বার প্রলেপ দিবে, শুষ্ক প্রলেপ তুলিবে না। এক শুষ্ক হইলে অপব দিবে, এইকপ পুনঃপুনঃ করিলে যোগেব শান্তি হয়।

ক্ষুদ্র প্রয়োগ — শুষ্ক বাবলা পত্র, শুষ্ক দাড়িম ফলের ছাল, বা মাল্লম্বেব অঙ্কি চূর্ণ করিয়া উপদংশে লাগাইবে কববীষ মূল দ্বারা প্রলেপ দিলে উপদংশ ভাল হয়।

জয়ন্তী, জাতী, করবী আকন্দ বা মৌদাল ইহাদের পনেব কাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা উপদংশেব ক্ষত ঘোত করিবে।

অসাধ্য লক্ষণ। — উপদংশ বোগে যাহাব সমস্ত লিঙ্গনাল ক্রিমি অর্থাৎ কীট কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া অণ্ডকোষমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাব সেই উপদংশ আবোগা হইবে না।

মৃত্যুলক্ষণ। — যে ব্যক্তি উপদংশ বোগ উৎপন্নমাত্রে চিকিৎসিত না হইয়া স্ত্রীমৎসর্গে বত থাকে, তাহাব লিঙ্গে শোণ ও জ্বালা উপস্থিত হয় এবং লিঙ্গনালের অগ্রভাগে, আবরণচর্মের নীচে মাংসপিণ্ডে যে ক্ষোটক জন্মায়, সেই ক্ষোটক পাকিয়া ক্ষত হয়, এবং ঐ ক্ষতে কীট জন্মিয়া লিঙ্গনাল ক্ষয় করিয়া বোগীর প্রাণনাশ করে।

লিঙ্গবর্তির লক্ষণ। — অকুরের জ্বায় উষ্ম দীর্ঘ উপযুক্তপরিমিত ও পিচ্ছিল যে মাংসজাল লিঙ্গনালে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে কুকুটেব শিখার জ্বায় হইয়া অণ্ডকে যেন অভ্যস্তবে, সন্ধিতে অথবা পূর্বে সন্ধিতে প্রবেশ করে, তাহাকে লিঙ্গবর্তি বা লিঙ্গার্শ বলে।

হোমিওপ্যাথিকে উপদংশ চিকিৎসা ।

জননেদ্রিয়েব ক্ষত হইলেই তাহাকে উপদংশ কহে অনেক উপদংশ বোগ গোপনে আবাদ করিবার অভিনায়ে কাহাবও উপদেশ না লইয়া তাড়াতাড়ি কষ্টিক দিয়া বা পোড়াইয়া দেন, তাহাতে কুফল ব্যতীত স্বফল ফলে না । সাধাবণ জ্ঞানে এই টুকু বুঝিতে হইবে যে, যে বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া এই ব্যাধির উৎপাদন করিয়াছে, উপবেব একটু ত্বক দগ্ধ করিলে আদি কাবণ এককালে নষ্ট হওয়া কতদূর সম্ভব ! যদিও য্যালোপ্যাথিকে মার্কবী সেবনে বোগীর পৰিণামফল বড় মন্দ হয়, নানা প্রকারে কষ্টভোগ করিতে হয়, কিন্তু হোমিওপ্যাথিকে “মার্কু-বিয়াস” ব্যবহারে সে সকল আশঙ্কা কিছুমাত্র থাকে না ।

পুঁষযুক্ত বিস্তৃত ক্ষত থাকিলে এবং বিছানায় চৰ্ম্মির স্থায় দাগ হইলে “মার্কফবস” বড় উপকারী

পারদ হইতে যখন কোন উপকার না দর্শে, তখন “সিনাবাবিশ” প্রয়োগ করিলে খুব ভাল ফললাভ হয় ।

যে সকল ঘাযের কিনারা উচ্চ, এবং প্রায়ই বাহ্যদেব হইতে বক্তপাত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেই সকল স্থলে “য়্যালিড নাইট্রিক” প্রাথ “মার্কুবিয়সেব” কার্য্য করে

কখন পুরুষাঙ্গ ফুলিয়া উঠে এবং গায়ে চাকা চাকা দাগ বা মিলমিলাব স্থায় বাহিব হয়, তখন “য়্যাকোনাইট” ব্যবহার করা কর্তব্য ।

যখন ঘাযেব কিনারা খুব কঠিন এবং সুগাত্র আঘাতে বক্তপাত হয় ও তাহা হইতে পাতলা পুঁষ বহির্গত হইতে থাকে, তখন “আর্শেনিকম” বড় উপকার দেয় ।

যখন পুঁষ খুব বেশী পৰিমাণে নির্গত হয়, ও পুঁষ দুর্গন্ধযুক্ত, বক্ত

মিশ্রিত অথচ পাতলা এবং ক্ষত উত্তেজিত থাকে, তখন “মিলিসিয়া” প্রয়োগ করিবে

ছোট ছোট ক্ষত হইলে যখন ঐ ক্ষত সকলের ধাব পুষ্পযুক্ত ও ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখন ‘আর্জেন্ট নাইট’ প্রয়োগ করা কর্তব্য।

ক্ষত পুষ্পপূর্ণ থাকিলে এই ঔষধটি অত্যন্ত উপকারী বলিয়া বিশ্বাস হয়।

অন্য কোন বোগে অসুস্থ থাকিবার কালে ক্ষত হইলে “সল্ফার” গ্রহণ উপকারী। যখন ক্ষত অত্যন্ত অধিক হয়, তখনও এই ঔষধে বিলক্ষণ কার্য্য করে

বিস্তৃত ক্ষত সমুদায়ে এই ঔষধটি অত্যন্ত ফলপ্রদ জানিতে হইবে।

স্ত্রীলোকে এই পীড়ায় পুষ্প থাকিলে ‘আর্শেনিক’ ও ‘কক্টিকম’ ব্যবহার্য্য

রক্ত পড়িতে থাকিলে “কার্বোভেজ”, ‘হিপার সল্ফার’ প্রযোজ্য।

অগ্নিদাহের ন্যায় যাতনা থাকিলে “আসিক্যালিক” দেওয়া যুক্তযুক্ত।

পুরুষাঙ্গে গভীর ক্ষত হইলে “মার্কিউরিয়স্” দিবে

লোহিত বর্ণ কিনাবায়ুক্ত বিস্তৃত ক্ষত হইলে “থুজা” উপকারী বলিয়া গণ্য

ক্ষতের কিনাবা কাঁচা মাংসের মত হইলে “মাকু’বিয়াস” প্রয়োগ করিতে হইবে

কিনাবা উচ্চ হইলে ‘আইওডিয়াম’ ব্যবহার করিবে

কিনাবা কঠিন এবং ক্ষত অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইলে “আর্শেনিক” দিবে।

ক্ষত জলীয় পুষ্পবিশিষ্ট হইলে “আর্শেনিক” দিতে হইবে।

হাকিমীমতে উপদংশ চিকিৎসা ।



উপদংশ বোগে প্রস্রাবদ্বারে কিস্বা তাহার নিকটে ধ হয়, জ্বালা কবে, কাহার বা জ্বালা হয় না, কখন কখন ফুলিয়া উঠে, বেদনা কবে, লিঙ্গযুগ্গবেফনের পশ্চাতেও ধা হয় ।

কারণ ।—উপদংশরোগাক্রান্ত বোগীব সহবাসে থাকিলে এই বোগ জন্মে, কিস্বা তাহার পুঁষ কোন প্রকাবে অন্তেব শোণিতেব সহিত মিশ্রিত হইতে পারিলে এই ব্যাধি জন্মিয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—প্রথম চারি দিবসের মধ্যে চিকিৎসা করিলে আব রুদ্ধি হয় না, রোগ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয় । যদি চারি দিন মধ্যে চিকিৎসা না হয়, তবে উপদংশ রোগেব বিষ সমস্ত শবীরে ব্যাপ্ত হয়, তখন আব শীত্ৰ ভাল হইবার সম্ভাবনা থাকে না । প্রথমতঃ পারদ চূর্ণ ৪ মাসা ছয় ভাগ করিয়া প্রত্যহ এক এক ভাগ খাওয়াইবে যদি রোগ কঠিন বোধ হয়, তবে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার খাওয়াইবে । ইহাতে দন্তমাড়ী ক্ষীত ও তাহা হইতে ক্লেশ নির্গত হইতে থাকিলে নিম্নোক্ত বিরেচক ঔষধ দিবে ।

বিট লবণ	...	...	১০ রতি ।
সোরা	...	...	১০ রতি
বেউচিনি	...	...	১৬ রতি ।

এই তিন জব্য চূর্ণ করত অল্প জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সন্ধ্যাকালে খাইতে দিবে । ইহাতে যদি কোষ্ঠ খোলসা না হয়, তবে প্রাতঃকালে ভেবেণ্ডার তৈল অর্দ্ধ ছটাক খাওয়াইবে ইহাতে নিশ্চয়ই কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে ।

অন্য উপায় ।

পারদ চূর্ণ	...	...	৩ রতি ।

ছয়ভাগ কবিয়া ছয় দিবসে সেবন করাইবে যে সময়ে মুখ আসিবে, সেই সময়ে নিম্নোক্ত উপায় অবগম্বন করিবে।

জোলাপ	..	..	..	৫ বতি
অনন্তমূলচূর্ণ	.	...	...	৫ রতি

অর্দ্ধ ছটাক জলে গুলিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহাতে কোষ্ঠ পবিষ্কার হইবে এবং মুখে বক্ত ও লালতাব বন্ধ হইবে

এরূপে মুখে লাল ও বক্তাদিপ্রাব কখন বিশেষ উপকারক নহে। কাবণ, পাবা খাইতে খাইতে যখন ক্লেদ শরীর পবিপূর্ণ হয়, তখন উহা মুখ ও দন্তগাড়ি দিয়া নির্গত হইতে থাকে অতএব দন্তমূলে বেদনা হইতে আরম্ভ করিলেই উপবোক্ত জোলাপ দিবে

আর যদি উপবোক্ত প্রকারে ক্লেদ নির্গমন বন্ধ হইয়া আবার একপে ক্লেদ নির্গত হইতে থাকে, তবে পূর্বোক্ত জোলাপ দিবে অথবা লেবুব বসে, তেঁতুলের সববতে, কিম্বা ফট্‌কিরি জলে বাবম্বাব কুলকুচা করিলে ক্লেদ নির্গম বন্ধ হইবে

এই বোগ বিনা চিকিৎসায় অধিক দিন বাখিলে অথবা চিকিৎসা দ্বারা কে ন ফল না পাইলে, সন্ধিস্থল সকল ক্ষীত ও বেদনাযুক্ত হয়, কখন কখন নাসিকার অস্থি ক্ষয় হইয়া তালুতে ছিঁড় হয়, অথবা অন্য প্রকারে শরীরে নানা স্থানে ক্ষত হইতে থাকে এই সকল ক্ষত শুকাইবার জন্য ঘায়ে পাবাব প্রলেপ মাখাইবে এবং পাবা খাইতে দিবে তাহাতে উপকার না দর্শিলে সাসিফ্রাস্‌ তৈল ৫বিদ্ধ পবিমাণে দিবসের মধ্যে তিনবার খাওয়াইবে।

অন্য প্রকার।

সালসা	.	৩ মাস।
জল	..	১ সেব

সিদ্ধ কবিয়া অর্দ্ধসেব থাকিতে নামাইবে, এবং সেই জল প্রত্যহ ক্যালোমেন্‌ সেবনেব পন ১ ছটাক পবিমাণে খাওয়াইবে

অন্য উপায়।

চালসা	.	.	.	১৪ গামা
গোয়াকম	.	.	.	৫ গামা
সাসিফাস্ তৈল	.	.	.	২০০ ফেঁ টা
জৈষ্ঠমধু	.	.	.	১ ছটাক

প্রথমে জৈষ্ঠমধু, গোয়াকম ও চালসা দুই সেব জলে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে, তাহার পরে সাসিফাস্ তৈল একটু সবাবেন সহিত মিশ্রিত করিয়া ঐ কাথে দিবে। প্রাতে এবং সন্ধ্যায় এক ছটাক পরিমাণে খাওয়াইবে।

—

ত্রয়োদশ অধ্যায়।



য্যালোপ্যাথিকে ধ্বজভঙ্গ চিকিৎসা।

এই ব্যাধি স্ত্রী পুরুষ উভয়েবই হইতে পারে। ইহাতে বতিশক্তি একদাবে থাকেনা। মানসিক চিন্তা, অত্যধিক পরিমাণে এবং অযথা-রূপে ইন্দ্রিয়পরিচালনা, উদ্যমভঙ্গ, মনঃকষ্ট, শোক-দেবাদি প্রবল বিপুল-পবনতা, অতিশয় আশক্তি ক্ষোভ ইত্যাদি ইহাব বলবৎ কারণ। এই সকল কারণে ধ্বজভঙ্গ বোগ হইলে বোগী আরোগ্য হইবার প্রত্যাশা করা যায়।

জুব অথবা অল্প কোন ব্যাধিঞ্জর বোগী প্রকৃত স্বাস্থ্যলাভ না করা বা পূর্ববল লাভ না করা পর্যন্ত বতিশক্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু বল-কারক ঔষধ—নক্সভমিকা, ক্যান্থারাইডিস্, ইণ্ডিয়ান হোপা, হাইপো-ফস্ ফাইট অফ লাইম, অথবা শে ডা সেবনে কিম্বা সমুদ্রজলে স্নান, পুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণ, উত্তেজক লিনিমেন্ট, মর্দন, এবং ৩ ডিও প্রয়োগ দ্বা বা প্রশমিত হইতে পারে।

মস্তকেব পশ্চাচ্চাগে আঘাত, উচ্চস্থান হইতে পতন, অথ কোন গুরুতর আঘাত কর্তৃক এই পীড়া জন্মিলে প্রায়ই তাহাতে অরোগ্য হয় না। মেরুদণ্ডে আঘাত বা তাহাব কোন পীড়া জন্ম হইলে শুক্রপাত এবং কামশক্তি হইলেও সহবাসেব সামর্থ্য থাকে ন। অতিবিক্ত তামাকু সেবন জন্ত পরিপাকশক্তিব হানি, শ্বাসু এবং পেশীসম্বন্ধীয় ক্রিয়াবিকৃতি হইতে, জননেন্দ্রিয়েব অপব্যবহৃত তথ্য তত্তিবিক্ত এবং অনিয়মিত ইন্দ্রিয়সেবা, মূত্রপিণ্ডে ক্ষত, মূত্রাশয়েব উত্তেজন প্রভৃতি কাবণেও এই ব্যাধি জন্মে ।

চিকিৎসা।—যাহাতে শুক্র ধাতুব বৃদ্ধি ও গাঢ় জন্মে একপ উপায় কবিত্তে হইবে

কুইনি সল্‌ফেটিস্	..	..	১৮ গ্রেণ
এক্ট্রাক্ট নক্সামিকা		.	৩ ৬ গ্রেণ
এক্ট্রাক্ট জেন্‌শন্	..	..	৩৫ গ্রেণ

বাবটী বটী প্রস্তুত কবিয়া প্রাতে এবং সন্ধ্যায় এক একটী সেবন কবিত্তে দিবে

ফেবিঘেট য্যামোনিয়াই ট্রাটিস্	..	..	২০ গ্রেণ ।
লাইকর ট্রীকনিয়া		.	২ ড্রাম ।
ইন্‌ফিউজন্ কোয়াসিয়া	.	..	৪ আং

চারি মাত্রা এক আউন্স মাত্রায় দিবসে দুইবার খাইতে দিবে

কডলিবার অয়েল	...	..	২ ড্রাম ।
সিরপ ফেবি আইওডাইড	..	.	২০ বিন্দু
ইন্‌ফিউজন্ কলদা	..	...	১ আং

এক মাত্রা এইরূপ এক এক মাত্রা প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সেবন কবাইবে

পথ্য।—মাংসেব ঝোল, কটী, ঘৃতপাক ব্যঞ্জন, সদ্য প্রস্তুত মিঠাই, খাজা প্রভৃতি ছানার জব্য দেওয়া অব্যবস্থা,—পরিপাকশক্তির প্রখ-
বতা থাকিলে অল্প পবিমাণে দিবাব হানি নাই ।

দিব নিদ্রা, অতিভোজন, উষ্ণ বায়ু সেবন ইত্যাদি নিষিদ্ধ সর্বদা

পরিষ্কার পবিচ্ছন্ন থাকা, পরিষ্কার পবিচ্ছন্ন পবিধান, স্নিগ্ধি জন্য ব্যবহার কর্তব্য মানসিক চিন্তা একবারে পবিহার কবিত্তে হইবে

বৈদ্যকে ধ্বজভঙ্গ চিকিৎসা ।

ধ্বজভঙ্গের লক্ষণ ও প্রকারভেদ — ব্যক্তি-অশক্তি পুরুষকে ক্লীব কহে এবং এই শক্তিহীনতাব নাম ক্লীবতা ক্লীবতা মাত প্রকার, পত্যেকেব লক্ষণ নিম্নে লিখিত হইতেছে

ভ্রূশোঁকাদি কাবণে ও অন্যান্য নানা প্রকার অহৃদ্য হেতু বমনোৎসুক ব্যক্তিব মন ব্যাহত হইলে শিথ পতিত হয়, উহার উন্নমন শক্তি থাকে না সেইরূপ বিদেষভাজন স্রীসঙ্গমেও ক্লীবত উপস্থিত হয়; ইহার নাম মানসিক ক্লীবত

কটু, অন্ন, উষ্ণ ও লবণ জন্য অপবিমিত ভোজন কবিলে পিত্ত বৃদ্ধি হইয়া শুক্রক্ষয় এবং ত্রিমিত্ত ক্লীবত উপস্থিত হয় ইহার নাম পিওজ ক্লীবত ।

যে ব্যক্তি অধিক স্রীসঙ্গমাশক্ত, কিন্তু বাজিকব ঔষধাদি সেবন কবে না, তাহার ধাতুক্ষয় জন্ম ধ্বজভঙ্গ বোগ জন্মে

মহালিঙ্গ বোগজন্ম ক্লীবত জন্মে

বীৰ্য্যবাহী শিবা ছিন্ন হইয়া ধ্বজভঙ্গ বোগ উৎপাদন করে

কামোদ্বেগবশতঃ সঞ্চালিত চিত্ত বলবান ব্যক্তিব মৈথুনবিকল্প হইলে শুক্রস্তম্ভ জন্ম ক্লীবত উপন্ন হয়

জন্মাবধি ক্লীবত প্রাপ্ত হইলে তাহাকে সহজ ক্লীবত কহে

মর্গচ্ছেদ জন্ম যে ক্লীবত এবং সহজ ক্লীবতা অসাধ্য, অর্থাৎ বীৰ্য্যবাহী শিবা ছিন্নজন্ম ও শেষোক্ত ক্লীবতা অসাধ্য

চিকিৎসা — স্ব৩৪ সের, কাথ জন্য ছাগ মাংস ১২ ০ ১সব জল

৬৪ সেব, পেয় ১৬ সেব, অশগন্ধা ১২ ০ সেব জল ৬৪ সেব শেষ ১৬ সেব;
ছাগছন্ধ ১৬ সেব মূর্ত্তার্থ কুম্ভকুম্ ৪ তোলা কল্কার্থ বেডেলা মূল,
গোধূম, অশগন্ধা, গুলঞ্চ, গোক্ষুব, কেশুব, ত্রিকটু ধন্য, তালাক্ষুব, ত্রিফলা,
যুগনাভি, আলকুশী বীজ, মেদ মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষভক, শঠী,
দাক্ষবিজা প্রিষঙ্গ, মঞ্জিষ্ঠ, তগব পাছুকা তালীশ পত্র এলাইচ, তেজপত্র,
গুড়ত্বক, নাগেশ্বর, জাতীপুষ্পা, সবলকঠ, জয়ত্রী, ছোট্ট এলাইচ,
উৎপল, অনন্ত মূল, তেঁা কুচাব মূল, জীবন্তী, ঋষি, বৃদ্ধি, ডুম্বব, প্রত্যেক
২ তোলা পাকান্তে যত শীতল হইলে ছাঁকিয়া তাহাব সহিত ১ সেব
চিনি মিশাইবে মাত্রা ২ তোলা অল্পপান উষ্ণ জল ইহাব নাম
“অমৃতপ্রাশ যত ।”

ক্রীমদনান্দ মোদক । পাবা, গন্ধক, লৌহ, প্রত্যেক ১ তোলা,
অত্র ৩ তোলা, কপূর্ব, সৈন্ধব, জটামাংসী, আমলকী, এলাইচ, শুঁঠ,
পিপ্পলী, মবিচ, জয়ত্রী, জায়ফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, জীবা, কৃষ্ণজীবা, যষ্টি
মধু, বচ, কুড়, হবিজা, দেবদাক, হিজলবীজ, মোহাগা, বামুনছাটী, শুঁঠ,
নাগেশ্বর, কঁাকড়া শৃঙ্গী, তালীশপত্র, জাফা, চিতামূল, দন্তীবীজ, বেডেলা,
গোবক্ষ চাকুলে, গুড়ত্বক, ধন্য, গজপিপ্পলী, শঠী, বালা, মুখা, গন্ধভাঙ্কলে,
ভূমিকুশাও, শতমূলী, আকন্দমূল, আলকুশীবীজ, গোক্ষুব বীজ, বিদ্ধভৃক-
বীজ, সিদ্ধিবীজ, প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা এই সমস্ত চূর্ণ শতমূলীব বসে
মাড়িয়া শুষ্ক করিয়া পুনর্বার চূর্ণ করিবে এই সমস্ত চূর্ণের এক চতুর্থাংশ
শিমুলমূল চূর্ণ, শিমুলমূল সহিত সমুদয় চূর্ণের অর্ধেক সিদ্ধিচূর্ণ, সমুদয়
একত্র করিয়া ছাগছন্ধে পেয় করিবে সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি
ছাগছন্ধে মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে যথাসময়ে পূর্বেক্ত চূর্ণ প্রক্ষেপ
দিয়া পাক সমাপ্ত করিবে পাবে গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর,
কপূর্ব, সৈন্ধব, ত্রিকটু, এই সমুদয়েব কিছু কিছু গুঁড়া যত ও মধু
মিশাইয়া মোদক বান্ধিবে, অল্পপান গব্যছন্ধ ও চিনি ঔষধ সন্ধ্যান্তালে
সেবনীয়

কামিনী দর্পণ —পাবা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা মাড়িয়া
কর্জলী প্রস্তুত করিয়া তাহাব সহিত গুড়বাব বীজ চূর্ণ ২ তোলা মিশাইয়া

ধুতুরার তৈলে মাড়িবে। মাত্রা ২ বতি অন্নপান চিনি ইহা সেবনে
বতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

বৃহচ্চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ।—শোধিত সূক্ষ্ম অর্ণ পান ১ পল,
শোধিত পাবা ৮ পল, উভয়কে উত্তমরূপে মাড়িবে, ইহাব সহিত ১৬ পল
গন্ধক মিশাইয়া কর্জলী কবিবে। রক্তবর্ণ কাপাঁসেব পুষ্প স্বতকুমাবীব
রসে ভাবনা দিয়া মাড়িয়া শুষ্ক কবিয়া সমতলবোতলেব মধ্যে রাখিয়া এক
খণ্ড খড়ি দ্বারা মুখবদ্ধ কবিবে। ঐ বোতলকে বালুকাপূর্ণ হাঁড়িব ভিতর
উর্দ্ধমুখে বসাইয়া গলা পর্যন্ত বালুকা পূর্ণ কবিবে। অনন্তর ক্রেমাগত
৩ দিন জ্বাল দিবে। ইহাতে বোতলের অন্তর্ভাগে যে সমস্ত ঔষধাংশ
সংলগ্ন হইবে, তাহা বাহির করিয়া লইবে। ঐ সংলগ্ন পদার্থ ১ পল,
কপূর ৪ পল, জাযফন, ত্রিকটু, লবঙ্গ, যুগনাভি প্রত্যেক ৪ মাসা, সমুদয়
একত্র মাড়িবে। মাত্রা ৫ বতি পানের সহিত সেব্য, পথ্য যত, যনী
ভূত হৃদ্ধ, মাংস, পিষ্টক, প্রভৃতি। কামোদিত কামিনীগণেব গর্ভ নিবা-
রণেব অমোঘ ঔষধ।

কামদীপক।—শ্বেত পুনর্গবা মূল চূর্ণ ২ পল, শিমুল মূলেব বসে
৩ বাব ভাবনা দিয়া তাহাব সহিত মোচবস ২ পল এবং গন্ধক ৪ পল
মিশ্রিত কবিয়া সমুদয় উত্তমরূপে চূর্ণ কবিয়া মাএ ৪ মাসা, যত ও মধুব
সহিত সেবনীয়; পঞ্চশবা পাবা ও গন্ধককে পৃথকরূপে ২১ বাব শিমুল
মূলেব বসে ভাবনা দিয়া কর্জলী কবিবে। বালুকা যন্ত্রে পাক মানা ২
বতি, পানের সহিত সেবনীয়। পথ্য মাংস, মদ্য, মহিষহৃদ্ধ। ইহা
সেবনে বীৰ্য্য বৃদ্ধি হয়।

সিদ্ধশাল্মলী কল্প।—ভূমি কুম্ভাও, তালগুলী, আমলকী, শ্বেত
পুনর্গবা, প্রত্যেক সমভাগ। গন্ধক অর্দ্ধভাগ, পাবা গন্ধকের অর্দ্ধেক;
ইহাতে কর্জলী প্রস্তুত কবিবে। সমুদায় একত্রে মিশ্রিত কবিয়া শ্বেত
শিমুলের রসে ও মহিষেব দুধে পৃথক পৃথক ৭ বাব ভাবনা দিয়া শুষ্ক
করিবে। মাত্রা ৪ মাসা; অন্নপান যত ও মধু। ঔষধ সেবনের পর দুধ
পান কবিবে।

ত্রিকণ্টকাদ্য মোদক —গোমুদবীজ, কুলেখাড়া বীজ, অশ্বগন্ধা,

ভালমূলী, আগকুলী বীজ, গোবক্ষ চাকুলে, যষ্টিমধু, বেড়েলা প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ চূর্ণের ৮ গুণ দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া চূর্ণ পবিমিত যতে ভাজিয়া দ্বিগুণ চিনি মিলাইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে ২ মাসা হইতে ৪ মাসা পর্যন্ত অগ্নিবলমত ব্যবস্থেয়

চন্দনাদি তৈল তিল তৈল ৪ সেব, বঙ্কার্থ শ্বেত চন্দন, বকমকাঠ, কালিযাকার্ত, অণ্ডক, কৃষ্ণাণ্ডক, দেবদারু, সবলকার্ত, পদ্মকার্ত, তুঁদ, কপূর্ব, যুগ্ননাভি, মুয়ুক, দ'ন', শিল'বস, কুম্ভকুম্, জ'য়ফল, জাতীপত্র, লবঙ্গ, ছোট এলাইচ, কাঁকনা, বড় এলাইচ, গুড়ত্বক, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বালা, বেণার মূল, জটামাংসী, দাকচিনি, সুবামাংসী, কপূর্ব, শৈলজ, মুখা, বেণুক, প্রিযঙ্গু, সবল নির্য়াম, গুগ'গুল, লাফা, ধুনা, নখী, ধাইফুল, গেন্টেলা, মঞ্জিষ্ঠা, তগর পাছকা, মোম প্রত্যেক ১০ তোলা, যথাবিধি পাক করিবে ।

পুষ্পধন্য ।—বসসিন্ধব, সীসা, লৌহ, অজ, বজ, সমুদায় একত্র করিয়া ধুতুরা, সিদ্ধি, যষ্টিমধু শিমূল মূল এবং পানের বসে ভাবনা দিবে যত, মধু, দুগ্ধ ও চিনিব সহিত সেব্য

পূর্ণচন্দ্র ।—বসসিন্ধব, অজ, লৌহ, শিলাজতু, বিড়ঙ্গ, অর্ণমান্নিক, প্রত্যেক সমভাগ, যত ও মধু সহিত মাড়িয়া ২ বতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে

কামাগ্নি সন্দীপন ।—পাবা, গন্ধক, হিঙ্গুল, মনছাল, প্রত্যেক ১ পল । একত্র মাড়িয়া ক্রমান্বয়ে আদ, ধুতুবাবীজ, জয়ন্তী ও ভৃগ্বাজেব বসে ৭ বার করিয়া ভাবনা প্রদান করিয়া কাচ কুপীৰ মধ্যে বালুকা যত্রে ৬ দিন পাক করিবে নির্দিষ্ট দিনে উদ্ধৃত করিয়া উহার সহিত এলাইচ, জায়ফল, কপূর্ব, যুগ্ননাভি, মুবিচ, অশ্বগন্ধা সমভাগে মিলাইয়া মাড়িবে, মাত্রা ২ বতি, প্রাতঃকালে সেব্য

হোমিওপ্যাথিকে ধ্বজভঙ্গ চিকিৎসা ।



অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়, ভয়, শোক, মানসিক উদ্বেগ, কটু, অম্ল, উত্তেজক
লাবণিক দ্রব্য সেবন, অতিবিক্রমাদক দ্রব্য ভক্ষণ, ইত্যাদি কারণে
বতিশক্তি নষ্ট হয় ।

লক্ষণ ।—মনোমধ্যে কামোদ্বেগ হয় না, হইলেও বেতঃপাত বা
জননেন্দ্রিয়েব উত্তেজনা থাকে না, লিঙ্গের উত্থান শক্তি নষ্ট হয় মন
সর্বদা উদ্যমশূন্য, কোন কাজে চেফা থাকে না শাবীবিব বলের ধাবণা-
শক্তির অপেক্ষাকৃত হ্রাস হয়, ইত্যাদি

চিকিৎসা ।—ধারণাশক্তির হ্রাস হইলে “সলুফাব” প্রয়োগ
কবিলে উপকার দর্শে

কামবিপ্লুচরিতার্থ শুক্রক্ষয় প্রযুক্ত এই পীড়া হইলে “ফস্ফরস্” ব্যব-
হারে বিশেষ ফললাভ হয় ।

মানসিক চিন্তা, ভয়-শোকাদি জন্ম পীড়া হইলে “নগ্নভমিকা” প্রয়োগ
করিতে পাবা যায়

অধিক শুক্রপাতই এই বোগের প্রধান কারণ, অতএব তজ্জন্ম “চায়ন”
বড় উপকারী

পথ্য ।—লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য বিশেষ উপকারী, মানসিক
চিন্তা জন্ম পীড়া হইলে প্রাণপানে চেফা কবিলে হইবে, যাহাতে তদ্রূপ
চিন্তা না থাকিতে পাবে সর্বদা সচ্ছন্দমনে থাকিতে চেফা করা
কর্তব্য নিশ্চিত ও নিরুদ্ধেগ থাকিয়া ঔষধ সেবন কবিলে বিশেষ
উপকার দর্শিবাব সম্ভাবনা । পবিকার ও পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিধান
কবিবার বিষয়ে যত্ন লইতে হইবে

ছাকিমীগতে ধ্বজভঙ্গ রোগ চিকিৎসা।

—104—

অতিবিক্র শূক্ৰক্ষয়, ধাতুদৌৰ্বল্য, মানসিক চিন্তা, স্ন্যাদি মাদক দ্রব্য অধিক গাএয সেবন, জননেদ্রিষেব অসদ্যবহার, হস্তমৈথুনাди জন্ত এই পীড়া জন্মে এই বোগ দুই প্রকার।

লক্ষণ।—দ্বিবিধ বোগেব মধ্যে এক প্রকার বোগে মনে কামবৃত্তিব উত্তেজনা হয়, কিন্তু জননেদ্রিষেব পবিচালনশক্তি থাকে না।

অন্য প্রকার বোগে কামবৃত্তিব উত্তেজনা বা জননেদ্রিষেব পরিচালনা কবিবাব শক্তি উভয়ের কিছুই থাকে না।

চিকিৎসা।—এই বোগেব চিকিৎসা জন্ত অনেক প্রকার ঔষধ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু পবীক্ষা দ্বার যে গুলি বিশেষ ফলপ্রদ, সেইগুলিই নিম্নে লিখিত হইল।

কুচিলা	.	..	...	১ সেব
ভূমি কদম্ব	.	...	.	১ সেব
চিবাতা	.	.	.	১ সের।
অনন্ত মূল	.	...	..	১ সেব
সালমা	...	..	...	১ সেব
গিছবি	...	..	...	১ সের।
জল	..	.	...	৪৮ সের
বংশলোচন	.	..	...	অর্দ্ধ পোয়া

বংশলোচন ব্যতীত সকল দ্রব্য একএ অগ্নিতে চাপাইয়া জ্বাল দিবে। সমস্ত জল শেষ হইয়া যখন আটাবৎ হইয়া আসিবে, তখন তাহাতে বংশলোচন চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত কবিবে। দীওল হইলে যখন বটিকা প্রস্তুত কবণেব উপযুক্ত হইবে, তখন ১ হইতে ২ বতি পবিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। এক একটী বটী প্রাতে ও সাযাহে অর্দ্ধ পোয়া

গাবম ছুঙ্কেব সহিত সেবন কবাইবে। যদি ঔষধ সেবনে গাবম বোধ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ অর্দ্ধ সেব গাবম ছুঙ্কে অর্দ্ধ ছটাক মিছবি মিশ্রিত কবিয়া খাইতে দিবে

পথ্য —মুতপক জব্য, লুচী, মিঠাই, মাংসেব বোজ প্রভৃতি।

তবকী মোনা	..	..	..	১০ আনা
ঐ রুপা	...	.	.	৮ আনা
মুক্তা চূর্ণ	...	.	.	১০ আনা
মবকত চূর্ণ	.	...	..	০ আনা
প্রবাল চূর্ণ	...	..	..	০ আনা
খসুখসু	..	.		১০ আনা

গোলাপ জলে মর্দন কবিয়া ছোট মটবেব মত বটী প্রস্তুত কবিবে বোগীর অবস্থা বিবেচনা কবিয়া একটী, বা প্রান্তে ও মধ্যায় দুইটী বটী সেবন কবাইবে

মিষ্কি বীজ	.	.	.	০ আনা
জাফল	..	..	...	৮০ আনা
লবঙ্গ	...	...		১০ আনা
কপূর্ব	..	...		১০ আনা
মরিচ	...	..	.	৮০ আনা
জটামাংসী	...	...	...	৮০ আনা
ছোট এলাইচ	...	..	..	৮০ আনা
জয়ত্রী	.	...	..	৮০ আনা।

সমস্ত চূর্ণকবতঃ চাবা সিমুলেব মূলেব বসে মর্দন কবিয়া এক একটী কচের মত বটী প্রস্তুত কবিবে ৬ সেই বটী দুই বেলা দুইটী ছুঙ্কেব সহিত- সেবন কবিতে দিবে।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

য়্যালোপ্যাথিকে অণুকোষ বৃদ্ধির চিকিৎসা ।

এই বোগে অণুকোষ মধ্যে সিবম সঞ্চিত হয় ইহাতে অণুকোষ নিম্ন এবং পশ্চাৎদিকে অস্বাভাবিক হইয়া থাকে ইহাতে যে সিবম সঞ্চিত হয়, তাহা পীতাত, সাধারণতঃ ১০ ১২ আউন্স হইতে দেখা যায়

প্রথমতঃ টিং আইওডাইন মর্দন কবিত্তে হইবে - তাহাতে স্ফুটন না হইলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াব প্রয়োজন হয় ।

টিং আইওডাইন ৩ জল উভয়ে মিশ্রিত হইলে তাহার ইঞ্জেক্সন দেওয়া কর্তব্য

নিম্নলিখিত ঔষধিগণ অণুকোষে মালিশ কবিলেও বিশেষ ফল দর্শে

হাইড্র'জিরাই ৩ আইওডাইড কব্রি ৮ গ্রোন

অক্সুয়েটী সিম্পলাইসিস্ ১ আং

একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত কবিত্তে হইবে ইহাকে "বেড আইওডাইড অয়েন্টমেন্ট" বুলে

ইহাতে উপকার ন দর্শিলে অণুকোষেব উপবেব ত্তকে ছিদ্ৰ কবিয়া সিবম নির্গত কবা আবশ্যক হয়

বৈদ্যকে অণুকোষ বৃদ্ধির চিকিৎসা ।

কুঁচুকি হইতে অণুকোষে যে ধমনী প্রবেশ কবিয়াছে, দূষিত অধো-গমনশীল বায়ু সেই ধমনীতে প্রবেশ কবিয়া ধমনীকে দূষিত কবে এবং বেদনা ও শোথ জন্মাইয়া অণুকোষকে বৃদ্ধি কবে ।

কুরণের প্রকারভেদ ।—কুবণ্ড মাত প্রকার যথা ,—বায়ুজন্য, পিত্তজন্য, কফ জন্ম, বক্ত জন্ম, মেদ জন্ম, মূত্র জন্ম, অত্র জন্ম মূত্র ও অত্রজনিত কুবণ্ড বায়ুজনিত কুবণ্ডের অন্তর্গত হইলেও কাবণ ও চিকিৎসাভেদেব জন্ম পৃথক পৃথক রূপে লিখিত হইল

বায়ুজন্য কুরণের লক্ষণ —ইহাতে বিনা কাবণে কুবণ্ডে বেদন হয় এবং বায়ুপুৰ্বিত চর্মপুটক স্পর্শ করিলে যে রূপ বোধ হয়, কুবণ্ড স্পর্শ করিলেও সেই প্রকার বোধ হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—অত্র, গন্ধক, পিপ্পলী, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিকাব, মোহাগা, ত্রিফলা, হরিতাল, মনছাল, পাবা, বনযগানী, শুল্ফা, জীবা, হিঙ্গু, মেথী, চিতামূল, চই, বচ, দন্তীমূল, তেউড়ী, মুখা, শিলাজতু, লৌহ, বসাক্ষন, নিম্ববীজ, পটল পত্র, বিদ্ধড়ক, প্রত্যেক ২ তোলা ; শোধিত জয়-পাল ১০০টা ; সমুদয় একত্র চূর্ণ করিবে মাত্রা ১ মাসা হইতে ২ মাসা পর্যন্ত আহাবেব পব সেব্য ইহার নাম “ভক্তোত্তরীয় ”

মুষ্টিযোগ । গব্য ঘৃত ২ তোলা ও মৈন্ধব ০ তোলা ; এই দুই দ্রব্য একত্র কবিয়া গামুকেব মধ্যে দিন বোঁজে রাখিবে এই ঘৃত কুবণ্ডে মালিশ কবিবে

পিত্তজন্য কুবণ্ডের লক্ষণ —ইহাতে কুবণ্ডে জ্বালা ও উষ্ণতা জন্মে, পাকা যজ্ঞদুগ্ধবেব ঞায় কুরণেব বর্ণ হয় ও পাকিয়া থাকে

চিকিৎসা । ঘৃত ৪ সের , বাসক, মুণ্ডিবী, এবণ্ড, বিল্বপত্র, কণ্টকাবী, প্রত্যেকের বস ৪ সের, দুধ ৪ সেব কল্ক দ্রব্য—শুল্ফা, গুণাঞ্চ, দেবদারু, রক্তচন্দন, হবিদ্রা, জীরা, কৃষ্ণজীবা, বচ, নাগেশ্বর, ত্রিফলা, গুণ্ণুল, গুড়ত্বক, জটামাংসী, কুড়, তেজপত্র, এগাইচ, রাস্না, কঁাকড়াশুঙ্গী, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, অশ্বগন্ধা, শৈলজ, কটুকী, মৈন্ধব, তগর পাছকা, কুড়, জায়ফল, মৃণাল, প্রত্যেক দুই তোলা ইহার নাম “শতপুষ্পাদ্য ঘৃত ”

মুষ্টিযোগ ।—কোন তাম্রপাত্রে ঘৃত ও মৈন্ধব লবণ বাখিয়া বোঁজে উত্তপ্ত করিয়া মেঘলোম দ্বাৰা ঘর্ষণে মল নির্গত কবিয়া কুবণ্ডে মালিশ কবিবে

কফজন্য কুরণ্ডের লক্ষণ —ইহাতে কুবণ্ড শীতল, ভাবযুক্ত, স্নিগ্ধ ও বর্ধিত হয় এবং অগ্নি বেদনা হয়

চিকিৎসা। —এবণ্ড ৪ তিল তৈল ৪ সেব কাথদ্রব্য—সৈন্ধব, মদনফল, কুড়, গুলফ, হিজল, বচ, বাল, মষ্টিমধু, বায়ুনহাটী, দেবদারু, শুষ্ঠি, কটফল, পুষ্কব মূল, মেদ, চই, চিতামূল, শঠী, বিডঙ্গ, আতাইচ, গ্রামালত, বেগুন, নীলহুফ, শালপানি, বেলশুষ্ঠ, বনযমানী, পিপ্পলী, দন্তী-মূল, বাস্মা, মিলিত ১ সেব জল ১৬ সেব । ইহাব নাম “বৃহৎ সৈন্ধা তৈল ”

মুষ্টিযোগ । বহুবাব বৃক্ষের বীজ এবং আদা একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিবে

রক্তজন্য কুরণ্ডের লক্ষণ ।—ইহাতে বুরণ্ড কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটকে আবৃত হয় এবং পিত্তজ কুরণ্ডের লক্ষণ নক্ষিত হয়

চিকিৎসা । —এবণ্ড তৈল ৪ সেব কাথদ্রব্য এবণ্ড মূল ১২ ০ সেব, শুষ্ঠী ১ পল, যব ৮ সেব, জল ৬৪ সেব, শেষ ১৬ সেব, হুক্ষ ১৬ সেব কল্কদ্রব্য এবণ্ডমূল ৪ পল, আদা ৩ পল মাত্রা ২ তোলা অল্প-পান উষ্ণ হুক্ষ হুক্ষ ও অন্ন পথ্য ইহাব নাম “গন্ধর্কহস্ত তৈল ”

মুষ্টিযোগ ।—নীলোৎপলেব মূল সহিত বাটিয়া, কিম্বা গৃহস্থিত ভেকের রক্ত দ্বারা প্রলেপ দিবে

শ্বেদজন্য কুরণ্ডের লক্ষণ ।—ইহাতে কফজন্য কুবণ্ডেব লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং কুবণ্ড তালের আকৃতি ও বর্ণ প্রাপ্ত হয়

চিকিৎসা । পাবা ১ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, ত্রিফল মিলিত ৩ ভাগ, চিতামূল ৫ ভাগ, এবণ্ড তৈলে মর্দিত ৩ গুণ্ডুল ৫ ভাগ এই সমস্ত এবণ্ড তৈলেব সহিত মাটিয়া ওড়িকা প্রস্তুত ক্রুবিবে অল্পপান আদা বস ও তিল তৈল ঔষধ সেবনান্তে শুষ্ঠি ও এবণ্ড মূলেব কাথ শেষ বোগীব পৃষ্ঠদেশে এবণ্ড তৈল মাখাইয়া শ্বেদ প্রদান কবিবে বিবেচন হইলে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন কবিবে

গুণ্ডজন্য কুরণ্ডের লক্ষণ । গুণ্ডেব বেগ ধাবণ কবিলে কোমল ও বেদনায়ুক্ত কুবণ্ড জন্মে এবং বোগীব গমনকালীন জলপূর্ণ চর্মপুটকেব

হোমিওপ্যাথিকে কোষরুদ্ধির চিকিৎসা। ৩৫৫

ন্যায় কুবণ্ড লক্ষণালিত হয় মূত্ররুদ্ধ, বোগের বেদনাব স্থায় অণুকোষে বেদনা জন্মিয়া নীচে চলিয়া যায়

চিকিৎসা। পিপ্পলী চূর্ণ ২ তোলা, চিতামূল চূর্ণ ৪ তোলা, দন্তী-মূল চূর্ণ ৮ তোলা হবিতকী ২০ টা, পুবাভন গুড় ১৬ তোলা সমুদয় একত্র মাড়িয়া ০ তোলা পবিমানে মোদক প্রস্তুত করিবে এতে মধু সহিত সেবনীয় ইহার নাম “কৃষ্ণাদ্য মোদক”

পিপ্পলাদ্য চূর্ণ।—পিপ্পলী, ত্রিফলা, দেবদারু, শুঠ, পুনর্নবা এতোক ২ পল, বিক্রডকচূর্ণ ১৪ পল, একত্র মাড়িবে। মাণা অর্দ্ধ তোলা কাজিৰ সহিত সেব্য

হোমিওপ্যাথিকে কোষরুদ্ধির চিকিৎসা।

নানা কারণে হাইড্রোসিন্‌স্‌ অণুকোষ রুদ্ধি হইয়া থাকে সাধারণতঃ স্ফুটান্‌ভিলানী, পবিত্রমহীন ও অধিক মাত্রায় যতদুষ্কপায়ী ব্যক্তিদিগেব এই বোগ জন্মিতে পাবে।

লক্ষণ।—প্রথমতঃ অণুকোষ বেদনায়ুক্ত ও স্ফীত হয়, তদ্বারা শীতান্‌ভব, কম্পা এবং জ্বর হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—জ্বর এবং অণুবোষেব স্ফীতি নিবারণ জন্য “মার্কুরিয়স” প্রয়োগ করিবে।

বেদনা এবং জ্বর উপশম জন্য “আর্শেনিক” দিবার ব্যবস্থা করা যায়।

অবস্থাবিশেষে “আইওডাইন” এবং “য়্যাপোসিনাম্” দেওয়া গিয়া থাকে।

হাকিমীমতে কোষরুদ্ধির চিকিৎসা ।

যদি অণুকোষ ফুলিয়া উঠে, এবং মাংসেব ন্যায় শক্ত বোধ হয়, তবে তাহাকে কেবল কাপড়ের থলিৰ মধ্যে রাখিয়া উপবদিকে টানিয়া বান্ধিবে, যেন ফুলিয়া না পড়ে । যদি প্রদাহ অধিক থাকে, তবে দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত কটীৰ কিস্মা ময়দার পুলটিশ বাঁধিবে । যদি অঙ্গ বেদনা থাকে, তবে মুসকর জলে গুলিয়া ঈষৎ গরম কবিয়া তাহাতে প্রলেপ দিবে, যদি ইহাতে আবাম না হয়, তবে নীচের লিখিত ঔষধ ব্যবস্থা কবিতে হইবে

আফিম	...	...	১ ভাগ ।
সবিষাব তৈল	...	...	২ ভাগ

একত্র মিশ্রিত কবিয়া প্রত্যহ ২ ৩ বাব মর্দন কবিবে

পীড়া অধিক দিনের হইলে নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন কবিলে বিশেষ ফল দর্শে

পাবার প্রলেপ	...	...	১ ছটাক ।
রসাঞ্জন	...	...	৩ মাসা

একত্র মিশ্রিত করিয়া ১ মাসাব হিসাবে প্রত্যহ ২ ৩ বাব মর্দন কবিবে । এই ঔষধ ব্যবস্থার সময় উপবোক্ত প্রকারে অণুকোষ বাঁধিয়া রাখিবে

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

য়্যালোপ্যাথিকে অর্শরোগ চিকিৎসা ।

ইংবাজীতে এই বোগেব নাম হিমবএওস্ । গুহ ও সবলান্ত্রেব নিম্ন-ভাগে বক্ত বহা নাড়ী থাকে, এই নাড়ী অশুস্থাবস্থা বা স্ফীতিকে অর্শ অথবা হিমবএওস্ বা পাইলস্ কহে । হিমবএওস্ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ইণ্টাবন্যাল্ আভ্যন্তরিক এবং এক্সটাবন্যাল্ বাহ্য । গুহেব উপবিভাগে থাকিলে তাহাকে আভ্যন্তরিক এবং নিম্নে অর্থাৎ বাহিরে থাকিলে তাহাকে বাহ্য “বলি” বলে ।

কারণ ।—স্থানিক উত্তেজন, যথা—অধিকক্ষণ অশ্বারোহণ, সর্জন য্যালো, রুবার্ব প্রভৃতি বিবেচক ঔষধ সেবন, ফিসচুলা, ক্ষত, ক্ষীকচার প্রভৃতি সরলান্ত্র অথবা গুহেব ব্যাগোহ, জবায়ুর পীড়া, মুত্রযন্ত্র ও জননে-দ্রিয়ের নানাপ্রকার পীড়া প্রভৃতি কারণে এই রোগেব উৎপত্তি হইয়া থাকে ।

লক্ষণ । অর্শে বাহ্য বলি গুহেব পার্শ্বের নিম্নভাগে অবস্থিত হয় এবং অনেকস্থলেই ত্বক দ্বাবা ও কিয়ৎপরিমাণে শৈথিল্য বিলী দ্বাবা আবৃত থাকে । ইহার বর্ণ সচরাচর ঐ স্থানেব স্বাভাবিক বর্ণের ন্যায় অথবা দীর্ঘ লালবর্ণযুক্ত ও রক্তসংস্থানেব অবস্থানুসারে উহার আয়তনের ভারতম্য হইয়া থাকে । এজন্য উহা কখন কোমল ও শিথিল এবং ত্বকের ভাঁজ মাত্র বলিয়া বোধ হয় ; কখন বা স্ফীত, দৃঢ় ও যেন বিদীর্ণ হইবার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয় ।

বলি অল্প দিনের হইলে ছোট, স্থানিক উষ্ণতা বিশিষ্ট, কণ্ডুয়ন ও গলনির্গমের পর স্ফীত বোধ ভিন্ন আব কোন বিশেষ অশুখ জানা যায় না । কিন্তু আয়তনে বৃহৎ ও উত্তেজিত বা প্রদাহযুক্ত হইলে যারপর-নাই তীব্র যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠে । কেবল যে বলিব মধ্যেই দপ্পদপে

বেদন থাকে এমন নহে, ঐ বেদনা সবলান্ত্র, পেৰিটোনিয়ম এবং নিও
স্বেব মধ্যে অল্পভূত হইয়া থাকে । কিছুদিন পাবে বলিব মধ্যস্থ বক্ত পুঁতে
পৰিণত হইলে বক্তগাৰ হ্রাস হয় । ক্ৰমে শিথিল না হইয়া কঠিন, দু
মাংসপিণ্ডৰূপে পৰিণত হয় ।

আন্তান্ত্রিক বলি গুহেব ধাবেব উপবিভাগে থাকে, এবং সচৰাচৰ উহ
লক্ষ ও গৌলকাৰ দেখা যায় । লক্ষ বলি পায়ই গুহেব ১ ২ ইঞ্চি
উপবে থাকে ও উহা স্পঞ্জের ন্যায় স্থিতিস্থাপক, দৃঢ়, কম্পাভ, লাল বা কটা
বৰ্ণযুক্ত এবং মূলদেশে প্রশস্ত ও উপবিভাগে ক্ৰমে সূক্ষ্ম । একপ বলি
আয়তন প্রায় পৰিবৰ্ত্তিত হয়ন ও উহা হইতে বক্তজাব হইতেও দেখা যায়ন

গৌলকাৰ বলিই সৰ্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহা হইলেই
অধিক বক্তজাব হয় । কখন ইহার মূল প্রশস্ত বা সূক্ষ্ম হইয়া থাকে
এজন্ত সবলান্ত্রের মধ্যে স্থলিখা অবস্থিতি কবে । আন্তান্ত্রিক বলি
সত্ত্বে গুহেব নিকট জ্বালা, উষ্ণতা, কণ্ডুয়ন ও বেদনা বোধ হয় এবং মনে
হয় যেন সবলান্ত্রের মধ্যে কোন বস্তু বহিয়াছে । মল নিৰ্গমেব পৰ এই
সকল অস্থখ বড়ই বৃদ্ধি হয়, বোধ হয় যেন অত্র না গিয়া পড়িয়াছে
মলনিৰ্গমেনেব বেগেব সময় আন্তান্ত্রিক বলি ও মিউকস্ মেম্ব্রেন বাহিৰে
আইসে এবং শীত্ৰ উঠিয়া না গেলে স্ফিণ্টৰ পেণী দ্বাৰা উহাবা আবদ্ধ
থাকিতে পাবে । বলি বড় হইলে যদি মল নিৰ্গমের সময় বাহিব হয়
তবে বে গীকে অঙ্গুলী দ্বাৰা তাহা ভিতরে প্রবিষ্ট কৰাইতে হয় । বক্ত
জাবই আন্তান্ত্রিক বলিব একটী বিশেষ লক্ষণ । ইহাব পরিমাণ কখন
ঐচ্ছিক কখন অস্পষ্ট । কখন এত অধিক হয় যে, ইহাতেই বোগীর যত্ন
হইতে পাবে । বক্তজাবেব সময়ের কোন নিয়ম থাকে না । কখন কখন
কেবল কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, কখন অন্য কোন প্রকারে স্বাস্থ্যবৈকল্য হইলে
এই ঘটনা ঘটে । কখন বা কিছুদিন ধৰিয়া প্রতিদিনই বক্তজাব হয়
কখন প্রতি মাসে, কখন বা দুই চারি মাসে অথবা ছয় মাসে হইয়া থাকে
যখন আরম্ভ হয়, তখন প্রায় তিন চাৰি দিবস পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া ষষ্ঠদিব
সেব মধ্যেই বদ্ধ হয় । কেহ কেহ বিবেচনা কবেন, যে দুখিত বক্ত সঞ্চিত
হয়, তাহা নিৰ্গত হইয়া যাওয়াই মঙ্গলকৰ, বদ্ধ কবিলে বোগান্ত্র উপ

স্থিত হইতে পাবে অত্যধিক পরিমাণে বক্তৃতাবে দৌর্জল্যজন্য বোগীর মৃত্যু হওয়া আশ্চর্য্য নহে, এজন্য তন্নিবারণপক্ষে মনোযোগী হওয়া কর্তব্য ।

চাবি প্রকারে এই পীড়া শেষ হইতে পাবে । অল্প দিনেব পীড়া হইলে ও বোগেব প্রকৃত কাবণ নিবারণ করিতে পাবিলে ক্রমে বলি আপনা হইতে শুদ্ধ হইয়া আপনা হইতে নষ্ট হইতে পাবে । প্রদাহ জন্ম বলির ভিত্তবস্থ রক্ত সংযত ও উহাতে এফিউজন্ ও ক্রমে উহা বিশেষ অম্লখ ব্যতীত ঐ ভাবে থাকিতে পাবে । প্রদাহ জন্ম বলিব ভিত্তব পুঁথ সঞ্চিত ও ক্রমে পুঁথ বহির্গত হইলে উহা শুদ্ধ হইতে পাবে । আভ্যন্তর বলি বাহিব হইয়া স্ফিণ্টর পেশী দ্বারা আবদ্ধ হইলেও উহা পুনরায় উঠিতে না পাবিলে দৈহিক লক্ষণাদিব পব গলিত হইয়া খসিয়া যাইতে পাবে

চিকিৎসা — চিকিৎসা আবস্ত কবিবার পূর্বেবিবেচন কবা উচিত যে, ইহা স্থানিক পীড়া নহে, দুববর্ত্রী ভিসিবার অববোধ বা পীড়াব লক্ষণ ও ফল মাএ অনেক স্থলে স্থানিক চিকিৎসা ব্যতীত কেবল ঐ দুববর্ত্রী পীড়াব প্রতিকার কবিতে পাবিলে উহা প্রশমিত হইতে পাবে । স্থানিক চিকিৎসা আবশ্যক হইলেও উহাকে দৈহিক চিকিৎসাব আন্তঃসঙ্গিক বলিয়া বুঝিতে হইবে

বোগীর দৈহিক অবস্থাব ও ভিসিবার অববোধেব তারতম্যানুসাবে এই চিকিৎসার তাবতম্য হইয়া থাকে বোগী দুর্বল ও বক্তবহা নাড়িসকল শিথিল হইলে বলকাবক ঔষধ, পুষ্টিকর পথ্য ও বিবেচনানুসাবে যত্ন বিবেচক ঔষধ দ্বারা পীড়াব প্রতিকার আবশ্যক, কোন মতে অতি বিবেচক ঔষধ প্রয়োগ কর্তব্য নহে । গোলমবিচেব কন্ফেক্সন্ এক্রপ স্থলে উপকারী বলিয়া যানিতে হইবে । মোণামুখীব হইলে কুচুয়াবী, গন্ধক ও এবও তৈল সর্কোৎকৃষ্ট ইহাদেব যে কোনটী হউক সপ্তাহে দুই তিন দিবস সেবন কবিলে কোথ পবিদ্ধাব থাকিতে পাবে

থ্রেসিপিতেটেড সল্ফাব ৩০ গ্রোণ

বাইটাটেট অফ পটাশ ৩০ গ্রোণ

কন্ফেক্‌সন্ অফ সেনা	...	...	৬০ গ্রেণ
সিবপ্	...	...	২ আং

এক মাত্রা এক দিবস অন্তর বার্তিক লে সেবন করাইবে ।

যৌবনে বা বার্দ্ধক্যে গুহেব শিথিলতা জন্ম অর্শ হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে

কন্ফেক্‌সন্ অফ সেনা	...	...	৭০ গ্রেণ ।
কন্ফেক্‌সন্ অফ ফিউবেবা	...	...	৭০ গ্রেণ

এক মাত্রা সেবন করাইবে

গোলমবিচ প্রয়োগ করিলে উহা অন্ত্র মধ্যে সঞ্চিত থাকে, এজন্য মধ্যে মধ্যে বিবেচক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যিক । যক্ষ্মে অবরোধের লক্ষণ বর্তমান থাকিলে মিনাবেল য়্যানিড, ট্যারাক্সিকম্, হাইড্রোক্লোবেট অফ য়্যামোনিয়া প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে

মদিরা পান অভ্যাস থাকিলে উহাও পরিমাণ অল্প করিয়া দিবে, অথবা একবারে বন্ধ করিবে । অনাস্বত স্থানে প্রত্যহ কিছুক্ষণ শাবীরিক শ্রম করিতে দিবে । অধিকণ অলসভাবে বসিয়া থাকা কর্তব্য নহে । কোমল শয্যা এ বোগেব উত্তেজক, অভ্যেস তাহা পরিহার করা কর্তব্য । যাহাদিগকে দিন বার্তিক মধ্যে অধিক সময়ই বসিয়া থাকিতে হয়, তাহাদের অনেকের অর্শ হয় ।

প্রতিবার মলত্যাগের পর গুহদ্বার গবম জলে ধৌত করিলে উপকার দর্শে । অভ্যন্তরে বলি হইলে নিম্নোক্ত উপায়ে পিচ্কাবী দেওয়া কর্তব্য

সল্‌ফেট অফ আয়রন	...	...	১ গ্রেণ ।
পরিষ্কৃত জল	...	...	১ আং ।

একত্র মিশ্রিত করিয়া পিচ্কাবী প্রয়োগ কর্তব্য । অথবা,—

টীং ফেরিমিউবিযেটিস্	...	...	১ গ্রেণ ।
পরিষ্কৃত জল	...	...	১ আং

উত্তমরূপে পিচ্কাবী দিবে ।

অর্শ প্রদাহ বা বেদনায়ুক্ত হইলে গবম জলে ধৌত করা, পুন্টিশ

যথবা পোস্ট ডেড্রিফ ফোমেন্টেশন এবং উপযুক্ত বোধ বহিনে জনোকা বসান যাইতে পারে। এ অবস্থায় লঘু আহার ও ঘ্রু বিবেচন ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য।

নিম্নোক্ত তিন প্রকার উপাযাবলম্বনে লি পতিত হইতে পারে।
(১) ক্ষতকর ঔষধ দ্বারা বলি দখল করা, অনেক স্থলে নাইট্রিক য়্যানিড ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু আভ্যন্তর বলি জন্য ব্যবহৃত করা উচিত, বাহ্য বলিতে প্রয়োগ করিলে বিশেষ অনিষ্ট হয় ওহেব একধাবে স্পেকিউলমের মধ্য দিয়া একটা তুলি দ্বারা বলিতে নাইট্রিক য়্যানিড মাখাইলে সুবিধ হয় কিন্তু সাবধান হইতে হইবে বলি ভিন্ন অস্ত্র য়্যানিড না লাগে তাহার পবে চা খড়ি জলে ওলিয়া তাহাতে লিট ভিজাইয়া তদ্বারা বলির গাণ মুছিয়া লইবে যদি ওহেব কিয়দূবে বলি থাকে, তবে বোগী কোৎ দিনে উছা বাহির হইয়া আইসে, তাহ হইলেও সুনিধামতে য়্যানিড মাখান যাইতে পারে (২) লিগেচার দ্বারা বলি বন্ধন,—আভ্যন্তর বলিতেই এই ব্যবস্থা করা যায় (৩) ছুবিকা দ্বারা বলি বর্তন, অনেকে আভ্যন্তর বলি কর্তন করিতে চাহেন না, কেননা উক্ত বলি কর্তনের পৰ বক্ত্রাব বন্ধ করা নিতান্ত সহজ নহে যাহাৰা ভালরূপ অস্ত্রবিদ্যা না জানেন, তাহাদের এ সকল কাজ করা কোনমতে যুক্তিযুক্ত নহে

বাহ্য বলি এবং আভ্যন্তর বলির চিকিৎসাসম্বন্ধে নিম্নোক্ত কয়েকটি উপায অবলম্বন করা কর্তব্য

বাহ্য বলি চিকিৎসায় যখন কোষ্ঠ পবিকার বাখ আবশ্যক হইবে তখন,—

কন্ফেক্সনিক্ সেনা	...	..	১ আং।
পোটাসি টার্ট্রাসিস্	..	..	১ আং
মাক্সি ট্যাবাক্সাসি	.	.	১ আং।

আহারের পূর্বে এক চামচ পবিমাণে খাইতে দিবে

পেপ্সিন্ পোশি	.	৩২ গ্রোন
একুফ্রাক্টি য্যালোজ্ বার্বাডেনিস্	.	৮ গ্রোন

শিল্পবিদ

বটী বঁধিব ব উগায়ুক্ত।

আটটা বটী হইবে প্রত্যেক বাব আছাবেব পূর্বে এক একটা ঋ ঠেতে দিবে

আভ্যন্তর বলিব চিকিৎসায গাণনিক যোগাশিঙ, ফটুকিনি, অথবা চীং পাবলোবাইড অথ আযবৎ ব পিচকাবী দিবে বলি বাহিব হইয়া সহজ প্রবিষ্ট না হইলে তাহাতে ববফ দিলে উপ ক ব দর্শিবে যজ্ঞগা নিতান্ত অসহ্য হইলে অহিফেৎ ব্যবহাবে উপ নাম হয়

বৈদ্যকে অর্শরোগের চিকিৎসা।

অর্শরোগের সংপ্রাপ্তি।—উহস্থান অর্থাৎ মলদ্বার সার্ধ পঞ্চাঙ্গুলি পবিত্রিত বচিঃ নির্দিষ্ট আছে ইহা তিন বলিতে বিভক্ত ঐ বলিগুলি শাঙ্খব পৌঁচেব ত্রায উপর্যুপ বি স্থিত ঐ বলিএযেব নাম যথাঃমে সম্ববণী, বিসর্জনী এবং প্রব হিনী ইহাদেব অপ ব নাম বাহু বলি, ও অভ্যন্তরস্থ দুইটীব নাম আভ্যন্তর বগি ইহাতে বাতজ, পিওজ, কফজ, ত্রিদোষজ, বওজ, সহজ ভেদে ছয় প্রকান অর্শ জন্মে

অর্শরোগের সংপ্রাপ্তি পূর্বক রূপনির্ণয় — দুই বায়ু, পিত্ত, কফ, ত্বক, মাংস এবং মেদ দূষিত করিয়া মলদ্বারস্থ বলি নামিকা, না ও মেটে, যে নানা মাংসাকুর জন্মায়, তাহাদিগকে অর্শ কহে

বাতজ অর্শের লক্ষণ।—কুশায, কটু, তিক্ত, কক্ষম, শীতল, স্নেহ জবা ভোজন, অস্প ও অপবিমিত ভোজন, তীক্ষ্ণন্যাদ্যপান, অতিশয় মৈথুন, উপবাস, শীতলদেশে বাস, শীতকালে অতিশয় ব্যায়াম, শোক, প্রবল বায়ু ও প্রচণ্ড বৌজ সেবন, এই সমস্ত কাবৎে বয়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অর্শরোগ জন্ম য

বাতজ অর্শের লক্ষণ বাতপ্রচোপজন্ম মলদ্বারস্থ বলিতে যে

সকল মাংস প্রবোহ হয়, তাহাবা শুষ্ক অর্থাৎ প্রাববহিত এবং চিৎ চিৎ বেদনায়ুক্ত, উপচয়বহিত, ধূমবর্ণ, ঈষদ্রবর্ণ, কঠিন, অপিজ্জিল, কৰ্ণণ, অর্থাৎ গোজিহ্বা স্পর্শের ত্রায খবস্পর্শ, বিসদৃশ অর্থাৎ পবস্পর্শ অসমান, বক্র, স্ফুমাগ্র ও কান্ধিত মুখ এবং আকৃতিতে কদম্ব পুষ্প কর্জুর তুল্য, কতকগুলি বা শ্বেত সর্ষপ তুল্য হয় বোগীব মস্তক, পার্শ্ব, স্বক, কটি, উরু, উরুর উপবিন্ধিত সন্ধি, এই সমস্ত স্থানে অতিশয় বেদনা হয় হাঁচি, উদ্বাহ, উদবে বেদনা ও অধ্বান, হৃদয়ে বেদনা, অকচি, কান, শ্বাস, অগ্নিব বিষমতা, অর্থাৎ কখন সম ন কখন বা পবিপাকশক্তি ন অভাব, কণ্ঠে স্নন্ স্নন্ শব্দ এবং প্রান্তি জন্মে অধিকন্তু বোগী শব্দ ও কুন্তনের সহিত অম্পা পাষণবৎ, প্রদ্বিল, পিজ্জিল, বিবদ্ধ মলত্যাগ কবে এতদ্ভিন্ন বোগীব নখ, বিষ্ঠা, মূত্র, নেত্র ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়

চিকিৎসা। — শুঁঠ, ভেলাব মুটি, বিদ্ধড়ক বীজ, প্রত্যেকেব চূর্ণ সমভাগ দ্বিগুণ ওড়েব সহিত মোদক পাক কবিয়া ৪ মাসা পবিমাণে শীতল জলের সহিত সেব্য ইহাব নাম “নাগবান্দ্য মোদক”.

লবণোত্তমাদি চূর্ণ । সৈন্দব লবণ, চিতামূল, ইন্দ্রযব, যবেৎ চাউল, ডহবৎবজ্জ বীজ, ঘোড়ানিমেষ ছান, প্রত্যেকেব চূর্ণ সমভাগ, একত্রে গিণাইয় ২ মাসা মাএয় তক্রেব সহিত সেবন কবিবে

পিত্তজ অর্শের কাবৎ কটু, অম্ল, লবৎ, উষ্ণ জ্বা ৩ জন, অতিশয় পবিত্রম, অগ্নি ও সূর্য্যকিবৎ সেবন, উষ্ণদেশে বাস, উষ্ণকাল, ক্রোধ, মদ্যপান, অশ্রুয়া অর্থাৎ পবেব সম্প্রতিতে দ্বেষ কব, বংশকবীবাদি ভক্ষণ, তীক্ষ্ণ পানীয়, তীক্ষ্ণ ঔষধ, উষ্ণ পানীয়, উষ্ণ অম্ল ও উষ্ণ ঔষধ সেবন, এই সমুদায় পিত্ত অর্শের কাবৎ .

পিত্তজ অর্শের লক্ষণ — পিত্তজনিত অর্শ বোগে অর্শ সকল রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ এবং উহাদের অগ্রভাগ প্রভায়ুক্ত ও নীলবর্ণ হয় । উহারা সংখ্যায় অম্পা, অামগন্ধযুক্ত অম্পা ও কোমল হয়, কতকগুলি শুকেন জিহ্বাব, ন্যায় স্ফুমা, কোন গুলি যকৃতপিণ্ডবৎ, কোন গুলি যবেব মধ্যব ন্যায় স্থল, কোনটা জলৌকার মুখের তুল্য হয় এবং উহা হইতে পাণ্ডবা বক্তপ্রাব হয় । এতদ্ভিন্ন এই অর্শে দাহ, শুষ্কতা, ঘর্ষ, অকচি, মোহ

প্রভৃতি উপদ্রব জন্মায় এবং বোগী কখন নীল, কখন পীত, কখন বক্তবর্ণ পিত্তের সহিত অপর অথচ উষ্ণ মলত্যাগ কবে বোগীব নখ, বিষ্ঠা ও মূত্র, শ্যাম, পীত ও হবিজাবর্ণ হয়

চিকিৎসা । মবিচ ১ ভাগ, শুঁঠ ২ ভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ, বন-ওল ৮ ভাগ, গুড় সকলের সমান লইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে মাত্রা ১ তোলা, শীতল জলের সহিত সেব্য ইহা নাস “স্বপ্ন শ্রুবণ মোদক”

বৃহচ্ছূরণ মোদক —ওলচূর্ণ ১৬ তোলা, চিতামূল ৮ তোলা, শুঁঠ চূর্ণ ৪ তোলা, মবিচ ২ তোলা, ত্রিফলা, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, তালীশ-পত্র, ভেলাব মুগী, বিডঙ্গ, প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা তালমূল ৮ তোলা, বিদ্ধডক ১৬ তোলা, গুড়ক ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা ক্ষুদ্রচূর্ণ প্রস্তুত করিয়া দ্বিগুণ পুৰাতন গুড় দিশাইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে মাত্রা ১ তোলা, শীতল জলের সহিত সেব্য ঐষধ সেবনকালে গুরু ও বল-কাবক পথ্য ব্যবস্থেয়

কফজ অর্শের কাবণ —শুষ্ক, স্নিগ্ধ, শীতল, লবণ, অন্ন ও গুরু-পাক দ্রব্য ভোজন, এবং বাবে শ্রমত্যাগ, দিবানিদ্রা, কোমল শয্যা এবং আসনজনিত স্থখে আসক্ত থাকা, প্রাগ্‌বাত সেবন, শীতল দেশে বাস, শীতকাল এবং সর্বদা নিশ্চিন্ত থাকা, এই সমুদায় কফজ অর্শের কাবণ

কফজ অর্শের লক্ষণ —যাহার শ্লেষ্মাশিক্য হেতু অর্শ বোগ জন্মে, তাহার অঙ্গুবে মূলদেশ অতি বিস্তীর্ণ ও নিবিড়াকার হয় এবং ঐ অঙ্গুর অঙ্গ বেদনায়ুক্ত, শুষ্কবর্ণ, দীর্ঘ অথচ স্থূল, স্নিগ্ধ অর্থাৎ তৈল স্রুতান্ত্র অনন্য বর্ত্তলাকার গুরু দ্রব্যাক্রান্তে বন্যায় ভাববোধক, অচল, পাকয্য রহিত, আর্দ্র বস্ত্রায়ত তুল্য, মনিতুল্য মসৃণ, এবং অর্শ স্পর্শ করিলে অত্যন্ত দুঃখবেধ হয় উহা বা শ্রমভায়ত অঙ্গ বেদনা ও কণ্ডুযুক্ত হয় প্রোক্তা-ঙ্গুর মধ্যে কে ন কোনটী বংশাস্থুর তুল্য কোন কোনটী কণ্টকীফল তুল্য, কোন কোনটী বা গরুর শুনসদৃশ হইয়া থাকে বোগীব উরুর উপবি-স্থিত সন্ধিদ্বয়ে বদনবৎ পীড় অর্থাৎ চালনাদিতে অক্ষম হয় বোগীব মলদ্রাব, মূত্রাণয় ও নাভিতে আকর্ষণবৎ পীড়া বোধ হয় বোগীব শ্বাস, কাস, বমনেচ্ছা মুখ হইতে জলস্রাব, অচি, মেহ, মূত্রক্ষু,

নিবোজাত্য অর্থাৎ মস্তক আর্জ ও ভাবী, নীত, শ্রীমন্ত্রে অনুসাহ
অগ্নিব যুত্বতা, বসি ও অতিসাব, গ্রহণী প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হয় মলত্র ব
দিয়া কফেব সহিত বসাব গ্রায অনেক পবিমাণে মল নির্গত ও আশা
শযেব বেগেব মত বেগ হয় অর্শেব মুখ হইতে ক্লেদ ও বলাদি ভ্রাব
হয় না, দৃঢ় মলাদির পীড়নেও তাহার মুখ বিদীর্ণ হয় ন বোগীব
চর্ম, নখ, মূত্র, পাণ্ডুবর্ণ ও স্নিগ্ধ হয়

চিকিৎসা মান, ওল, ভেলাব মুঠী, তেউড়ী, দন্তী, ত্রিকটু,
ত্রিকলা, চিতা, মুখা, বিড়ঙ্গ, প্রক্যেকেব চূর্ণ সমভাগ সর্বসম ন লৌহ-
ভস্ম, মাত্রা ১ মাসা ইহার নাম “মানশুবণাদ্য লৌহ ”

প্রাণদা গুড়িকা — শুষ্ঠী ৩ পল, মরিচ ৪ পল, পিপ্পলী ২ পল,
চই ১ পল, তালীশ পত্র ১ পল, নাগেশ্বর ৪ তোলা, পিপ্পলী মূল ২ পল,
তেজুপত্র ১ তোলা, ছোট এলাইচ ২ তোলা, গুড়ত্বক ১ তোলা, বেণাব
মূল ১ তোলা, পুৰাতন গুড় ৩০ পল সমুদয় একত্রে মাড়িয়া মোদক
প্রস্তুত করিবে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে গুঠেব পবিবর্ত্তে হবিওকী ব্যবস্থেয়
মাত্রা ০ তোলা, তরুপান দুগ্ধ ও জল

সহজ ও ত্রিদোষজ অর্শের কাবণ — পূর্বোক্ত বাতাদিত্রয়েব
মিশ্র কাবণ জন্ম যে অর্শ রোগ জন্মে, তাহার নাম ত্রিদোষজ অর্শ । সহজ
অর্শেব অর্থাৎ শরীরেব সহিত জাত যে অর্শ, তাহার সমান লক্ষণযুক্ত
হয় । সহজ জাত অর্শেব বিবরণ পরে বলা যাইতেছে

সহজ ও ত্রিদোষজ অর্শের লক্ষণ — যে অর্শ পূর্বোক্ত
নিবিধ দোষেব লক্ষণযুক্ত, সেই অর্শ ত্রিদোষজনিত বলিয়া অভিহিত,
সহজজাত অর্শের লক্ষণ সাঙ্গিপাতিক অর্শের তুল্য ।

চিকিৎসা । — তেউড়ী, চিতা, নিসিন্দা, সীজ, মুণ্ডুবী, জুই আমলা,
প্রত্যেক ৮ পল, জল ৬৪ সেব, শেষ ১৬ সেব যত ২৪ পল গরম কবিয়া
তাঁহাতে মনছাণ বা বৈচিব মূলেব বস দ্বাৰা শোধিত উৎকৃষ্ট লৌহভস্ম
১২ পল নিক্ষেপ কবিয়া তৎপবে তাঁহাতে উক্ত কাথ ও ২৪ পল চিনি
দিবে । ঘনীভূত হইলে বিড়ঙ্গ ৩ পল, ত্রিকটু প্রত্যেক চূর্ণ ৬ তোলা,
ত্রিকলা চূর্ণ ৫ পল, এবং শিলাজতু ১ পল দিয়া শীতল হইলে যথু ২৪ পল

দিয়ে ম না ১ ছইতে ৪ ১ মা ছুপ্ত মাংসাদি বলকব এবং গুরুপ্রব
ব্যবস্থেয় বাণেব কোড়, কঞ্জিক ককাবাদি নিষিদ্ধ। ইহাব ন ম
“অগ্নিমুখ লৌহ ”

চন্দ্রপ্রভা ঔড়িক । বিডঙ্গ, চিতামূল, ত্রিকটু ফিফলা দেবদারু,
চই, চিবাতা, পিপ্পলিঃ, মুগা, শঠী, বচ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্দ্রব, মচললবণ,
যবক্ষাব, মাচিক্ষাব, হবিজা দাকহরিজা, ধন্তা, গজপিপ্পলী, আতইচ,
প্রত্যেক ২ তোলা, শিলাজতু ৮ পল বিশুদ্ধ গুগ্গলু ২ পল, লৌহ ২
পল, চিনি ৪ পল বংশলোচন ১ পল, দস্তীমূল, তেউডী, ওড়ক, তেজপত্র,
এলাইচ মিনিত ১ পল গুগ্গলু ও শিলাজতু শোধন কবিষা চূর্ণ
কবিবে, রসসিদ্ধ ১ পল এই সমুদয় একত্র মিশ্রিত কবিষ বটী
প্রস্তুত কবিবে প্রথমে ৪ বতি ছইতে আদন্ত কবিষা ৪ মাসা পর্যন্ত
সেবনীয় অল্পপান যত ও মধু ঔষধ সেবনেব পব তেউডী, দস্তীমূল
ওড়ক, তেজপত্র ও এলাইচ ইহাদেব চূর্ণ কিছু কিছু তক্ষণ কর্তব্য

নিত্যোদিত রস । -পাৰা,তাম্র, লৌহ,অত্র,বিষ,গন্ধক,পেতোক্তের
সমস্ত গ মর্কসম্পন্ন ভেলা, একএ উত্তমরূপে মাড়িয়া ওল ও মানে
বসে তিন দিন ভাবনা দিবে। মাত্রা মাসকলাই প্রমাণ বটী অল্পপান
ছাগমাংসেব যুয অভাবে ছাগদুগ্ধ

বক্তজ অর্শের লক্ষণ —যাহাব বক্তাধিক্য হেতু অর্শ বোগ
জন্মে, তাহাব মলদ্বাবেব অক্ষুবসকল পিত্তজ অর্শেব লক্ষণ যুক্ত হয় বিশেষ
যতঃ উহাদেব বর্ণ গুঞ্জা বা প বাণেব ঞ্চায় লোহিত এবং উহাবা বট প্রবো-
হেব ঞ্চায় গুহদেশে অবস্থিতি কবে বলিয়া বোগী মনে কবে যেন মল
দ্বাবে গোঁজ প্রবিষ্ট হইয়া বহিয়াছে এই সকল অক্ষুব কঠিন মলদ্বা
পীড়িত হইলে, তাহা ছইতে মহম উষ্ণ ও দুই বক্তজাব হয়,এবং তজ্জন্ম
বোগী পাণ্ডুবর্ণ বা বিবর্ণ, পাকয্য ও অতিসাবাদি বক্তক্ষয়জনিত লক্ষণা
জান্ত হয় বোগী কৃষ্ণ, উৎসাহশূন্য, বিকলেদ্রিয় হয় মল কঠিন, হবিত
বর্ণ ও কক্ষম হয় এবং মলদ্বাব দিয়া বায়ু নির্গত হয় না

বক্তজ অর্শের বাতাদিভেদে লক্ষণ —যে বক্তার্শে বোগী
ও গম্প এবং ফেণামি ও ও অনঃ বর্ণ হয়, বটী, উক ও মলদ্বাবে শূন্য

শ্বেদন জন্মায়, বোগী অতি দুর্বল হয়, সেই অর্শকে বাতানুবন্ধ বলে বক্তার্শ পিত্তার্শেব লক্ষণযুক্ত বলিয়া পৃথক পিত্তানুবন্ধ নাই যেঅর্শে বহু কালে শুক্র, পীত, স্নেহযুক্ত, ভাবী, শীতল মণ নিঃসৃত হয়, নিঃসৃত বক্তেব ঘনত্ব, স্বেদনত্ব, পাণ্ডুর এবং পিচ্ছিলত্ব দৃষ্ট হয়, মলদ্বার পিচ্ছিল ও আর্দ্র যজ্ঞাবগুষ্ঠিতবৎ বোধ হয় এবং ঔক বস্তু ও স্নিগ্ধ বস্তু অদি কাবৎ হয়, তবে সেই অর্শকে 'স্বানুবন্ধ বলিয়া' জ্ঞানিবে

চিকিৎসা। —কুডচি মূলেব ছাল ১০০ পল, জল ৬৪ সেব, শেষ ৮ সেব থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিবে ইহাব সহিত পুৰাতন গুড ৩০ পল ও স্নাত ৮পল মিশাইয়া পাক কবিবে ঘনীভূত হইয়া আসিলে ভেলাবমুঠী, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা বসোত, চিতামূল, ইন্দ্রযব, বচ, আতাইচ, বেলশুঠা, প্রত্যেকেব চূর্ণ ১ পল দিয়া নামাইবে শীতল হইলে ৮ পল-মধু মিশাইয়া পাইবে মাত্রা ০ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত অনুপান ছাগদুগ্ধ অভাবে জল

ক্ষদ্র প্রয়োগ —ইন্দ্রযব ২তোলা, জল অর্দ্ধসেব, শেষ ৮০ পোয়া ইহাতে শুষ্ঠচূর্ণ ২ মাসা মিশাইয়া সেবন কবিবে বেলশুঠেব কাথে শুষ্ঠ প্রক্ষেপ দিয়া সেবনে উপকার হয় ঘোষালতাব মূল বাটিয়া বক্তার্শে প্রলেপ দিবে

খোসাতোলা কৃষ্ণ তিল ৪ তোলা ননীব সহিত ৪ মাসা নাগেশ্বরচূর্ণ ননীব সহিত, কিম্বা দধিব সব ঘোলেব সহিত প্রত্যহ সেবনে বক্তার্শ ভাল হয়

কচি পদ্মপত্র বা কৃষ্ণতিল বাটিয়া চিনি ও ছাগদুগ্ধেব সহিত সেবন কবিলে বক্তার্শেব বক্ত্রাব নিবাবিত হয়

ছাগদুগ্ধেব সহিত শতমূলীরস বা দুাড়িমের রস চিনিব সহিত সেবনে বক্তার্শেব বক্ত্রাব নিবাবিত হয়

সাধ্যাস ধ্যত্ব নির্ণয় বাহ্য বলিতে বাতাদি এক দোষজ এবং অচিবোৎপন্নঅর্শ মুখসাধ্য দ্বিতীয়বলিতে দ্বিদোষোজ এবং সংবৎসব অতিক্রান্ত অর্শ কৃষ্ণসাধ্য অন্ত অর্থাৎ তৃতীয় বলিতে ত্রিদোষজ এবং সহজ অর্শ অসাধ্য এতদ্ব্যতীত বাহ্য বলিতে জাত দ্বিদোষোবৎ অর্শ

কৃচ্ছ্রসাধ্য, ত্রিদোষজ ও সহজ যাপ্য দ্বিতীয় বলিতে জাত একদে মৌ
বল অর্শ কৃচ্ছ্রসাধ্য, দ্বিদোষোৎপন্ন যাপ্য, ত্রিদোষাধিক্য হইলে অসাধ্য
এবং তৃতীয় বলিতে জাত এক দোষাধিক্য যাপ্য, আব সকল প্রকার
অসাধ্য যাপ্য অর্শ বোগও দোষ এবং বলিভেদে অসাধ্য হয়

উপদ্রব ও অসাধ্য লক্ষণ —যে অর্শবোগাক্রান্ত ব্যক্তিব হস্ত,
পদ, মুখ,নাভি,গুহুদ্বার ও অণ্ডকোষে শোথ হয়, এবং হৃদয় ও পার্শ্বদেশে
শূলবেদনা হয়, সেই অর্শ অসাধ্য যাহার হৃদয়েব পার্শ্বদেশে শূল
বেদনা, ইন্দ্রিয় মোহ, বমি, সর্ব্বাঙ্গ বেদনা, জ্বর, পিপাসা, গুহদেশ
পকতা এই সমস্ত উপদ্রব থাকে, তাহাব অর্শবোগ প্রাণনাশক হয়
উপবোক্ত উপদ্রবেব একটীও থাকিলেও প্রাণনাশ কবে তৃণা, অকচি,
শূলবেদনা পীড়িত, গুহুদ্বার দিয়া রক্তস্রাব ও অতিসাবযুক্ত বোগী
অর্শবোগ কর্তৃক বিনষ্ট হয়

মেঢ়জাদি অর্শেব স্বরূপ মেঢ়াদিজ ও নাভিজ অর্শ বেগে
অঙ্কুর মহীলতাব মুখ মদুশ পিচ্ছা ও কোমা হয় এবং বাতাদিজ
অর্শেব লক্ষণযুক্ত হয়

ছোনিওপ্যাথিকে অর্শ চিকিৎসা ।

অনেকে অনুমান কবেন, এই বোগেব কারণ কোষ্ঠবদ্ধতা এবং
নববিচ্ছিন্ন বসিয়া থাকা এই বেগে গুহুদ্বারেব বাহিরে অথবা ভিতরে
বস অথবা গোলাকাব মাংসখণ্ড জন্মে, তাহাকে বলি বনে এবং তাহা
দিয়া সময়ে সময়ে বও স্রাব হয় সেই রক্তস্রাব কখন অল্প, কখন অধিক,
কখন উপযুপবি প্রতিদিন হয়, কখন বা কিছু দিনেব জন্য স্থগিত থাকিয়
আবার বও স্রাব হইতে থাকে উভয়বিধ অর্শেবই জন্য অতিশয় তীব্র
যজ্ঞণা হইতে থাকে ।

চিকিৎসা । সাধারণ অর্শ প্রতিদিন প্রাতে “নক্সভমিকা” এবং বাত্রিকালে “সল্ফার” প্রয়োগ করিতে হইবে

রক্তস্রাব হইতে থাকিলে তাহা নিবারণ জন্ত বাত্রিকালে “হেমামিলিস্” এবং প্রাতে “নক্সভমিকা” দিবে

ক্যাষ্টর অয়েলের ব্যবস্থা দ্বারা কোষ্ঠ পবিত্র হইলে “হেমামিলিস্”-লেপ্সন দ্বারা ধোত করিবে

লঘু আহার, গরম জলে স্নান, গরম জলে বসি ধোত করা, নিয়মিত রূপে অল্প ব্যায়াম ইত্যাদি দ্বারা বেগের অনেকটা উপশম হয়

ছাকিমীমতে অর্শ চিকিৎসা ।

মলের সঙ্গে বক্ত পড়ে, মল নির্গমনের সময় গুহদ্বার বেদনা করে, কখন কখন ৩৭কালে পেঁয়াজের কোশাব গায় বাহির হয়

কারণ ।—উদরে মল সঞ্চিত হইয়া বঠিন হওয়া প্রযুক্ত এই রোগ জন্মিয়া থাকে

রেউচিনি ১ মাস ।

মাত্গুড় ৪ বিহু ।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া আবার না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় খাইতে দিবে

জলশৌচ করিবার সময় ফট্ কিবি অথবা তুঁতিয়ার জলদ্বারা ধোত করা আবশ্যিক

তুঁতিয়া হইতে তাম্র বাহির করিয়া ৩দ্বারা আংটি প্রস্তুত করত সেই আংটি বামহস্তের অঙ্গুলিতে রাখিলে জলশৌচের সময় সেই অঙ্গুলীকেব সহিত গুহদ্বারেব ঘর্ষণে অর্শের অনেক উপকর হয় ; এমন কি যন্ত্রণাদি সমস্ত কমিয়া যায় ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

য্যালোপ্যায়িকৈ অল্লবৃদ্ধির চিকিৎসা ।

এই রোগে অণ্ডকোষ দুইটীর একটি অথবা উভয়টি স্বস্থান হইতে উপবি উত্থিত হয়, তৎকালে বোগী জ্ঞানশূন্য হয়

লক্ষণ ।— শিবা খেঁচিয় ধবে, বেদনায়ুক্ত হয়, শবীবের শ্লানি বোধ হয়, আলম্বপ্রিয়তা জন্মে, কোষ্ঠবদ্ধ হয়, বোগী আক্রমণের সময় এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া অণ্ডকোষ স্বস্থানচ্যুত হইয়া উত্থিত হইলেই বোগী অচেতন হইয়া পড়ে ।

চিকিৎসা — ফোমেটেশন, অহিফেণ সেবন, কোন কোন স্থানে বিবেচক ব্যবহার করা যায় মূলাশয়ের উপর ববফ স্থাপন ইত্যাদি দ্বারা উপকার দর্শে । অণ্ডকোষ যাহাতে উত্থিত হইতে না পায়, তজ্জন্ত ট্রু স্ নামক যন্ত্র ব্যবহার করা উচিত । মিঃ জন উড যে ট্রাস্ পদ্ধতি করিয়াছেন, তাহাই অতি উৎকৃষ্ট । তাহা ব্যবহার করিলে কোষ উত্থিত হইবাব কোন আশঙ্কা থাকে না । এই পীড়া আক্রমণের নির্দিষ্ট কাল নাই । কখন কখন বহু দিন অন্তর, কখন দুই চারি পাঁচ ঘাস অন্তর, কখন বা উপযু্যপরি দুই তিন দিন আক্রমণ কবিয়া থাকে পুনঃপুনঃ আক্রমণে রোগীর দৌর্বল্য বৃদ্ধি হইতে থাকে । একপ অবস্থায় বলকারক ঔষধ ও পুষ্তিকর খাদ্য ব্যবস্থা কবিত্তে হইবে তাহা না হইলে এই উপসর্গ স্বভে পীড়া আক্রমণ কবিলে রোগীর প্রাণনষ্ট হইবাব বিলক্ষণ সম্ভাবন, অতএব সে পক্ষে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে

বৈদকে অস্ত্রবৃদ্ধির চিকিৎসা ।



অস্ত্রবৃদ্ধির কারণ ও লক্ষণ ।—বায়ুজনক জ্বর্য ভোজন, অত্যন্ত শীতল জলে অগ্নাহন পূর্বক স্নান, গলমূত্রের বেগবোধ মূত্রের বেগ উপস্থিত না হইতে বেগপ্রদান, ডারবহন ও পথশ্রম প্রভৃতি কাবগে দূষিত বায়ু ক্ষুদ্রান্ত সংকোচিত করিয়া স্থায় স্থান হইতে কুঁচকিতে লইয়া গেলে কুঁচকিতে গ্রন্থিল শোথ জন্মে এই অবস্থায় চিকিৎসিত না হইলে উক্ত সংকোচিত গ্রন্থিল ক্ষুদ্রান্ত কর্তৃক অণ্ডকোষে নীত হইলে ইহা স্ফীত ও বেদনায়ুক্ত হয় এবং ইহাকেই অস্ত্রবৃদ্ধি কহে পূর্বোক্ত গ্রন্থিল ক্ষুদ্রান্ত অণ্ডকোষে থাকিয়া অত্যন্ত যাতনা প্রদান করে বলিয়া অণ্ডকোষ ধরিয়া চাপিলে ঐ ক্ষুদ্রান্ত শব্দ পূর্বক কোষকে স্ফীত করিয়া উপরে উঠিয়া যায়, এবং তাহাতে বোগী কথঞ্চিত স্থস্থ হয় এবং কোষ ছাড়িয়া দিলে অত্র পুনর্বার অণ্ডকোষে প্রবেশ কবে এই অস্ত্রবৃদ্ধিতে বাতজ কুবণ্ডের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং চিকিৎসা দ্বারা প্রশমিত হয় না।

চিকিৎসা ।—পাঁচা, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, তাম্র, কঁাসা, হরিতাল, তুঁতে, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, বিড়ঙ্গ, বিদ্ধড়কবীজ, শঠী পিপ্পলীমূল, আকনাদি, হরুষ, বচ, এলাইচ, দেবদারু, পঞ্চলবণ, প্রত্যেক সমভাগ লইয়া বটী প্রস্তুত করিবে ইহার নাম “বৃদ্ধিবাধিকা বটিকা”

বৃহৎদন্তী হরিতকী ।—যুত ১৬ সের কাথ জ্বর্য দন্তীমূল ১২ ০ সেব, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সেব, দুধ, ভূমিকুশ্মাণ্ড রস, তালগুল্লীব রস, শিমূল মূলেব রস, কুড়চি ছালের রস, প্রত্যেক ১৬ সেব । কল্ক জ্বর্য দন্তীমূল, বেড়েলা, জাঙ্গা, পীত বেড়েলা, শীতমুলী, সবলকাঠ, অনন্তমূল, স্থামালতা প্রত্যেক ১০ সের পাঁকার্য জল ১৬ সের

হোমিওপ্যাথিকে অন্তরুদ্ধির চিকিৎসা।

অত্যন্ত কষ্টজনক শ্বাস প্রশ্বাস, কাশি প্রভৃতিব পৰ যদি উৰ্ব উপৰ যত্নপূৰ্ব্বক বেদনা হয় হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধাবিলে কিঞ্চিৎ উপশম হইয়া থাকে, কিন্তু পুনৰায় কাশি বা দীর্ঘশ্বাস গ্রহণেব পৰ পুনরায় বেদনামুভব হয়, তখনই অণ্ডকোষ উপবে উঠিবাব আশঙ্কা কবিতো হয়

চিকিৎসা।—দিবরাত্রি ট্রাস্ যন্ত্র ব্যবহার কৰা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তাবদিগেব মতেও যুক্তিযুক্ত বলিয়া অবধারিত হইয়াছে।

রাত্রি এবং প্রাতঃকালে “নক্সভমিকা” প্রয়োগ কবিতো হইবে এবং ‘আণিকা’ লোশন দ্বারা কোষ ধৌত কবিতো

যদি ট্রাসেব প্যাড খানিব ঘর্ষণে সেই স্থানে ক্ষত হয়, তবে প্যাডেব নিম্নে তুলা দিয়া ট্রাস্ ব্যবহার কবিলে ভাল হয়

— —

হাকিমীমতে অন্তরুদ্ধির চিকিৎসা।

— ৫৫৭ —

এই রে গ যারপবনাই প্রাণনাশক। আক্রমণকালে বোগীব চৈতন্য থাকে না, মৃত্যেব ন্যায় পড়িয়া থাকে। বায়ু সবল হইলে তবে অণ্ডকোষ স্থানে আইসে এ বোগী চৈতন্যলাভ করে।

লক্ষণ।—ক্ষুধামান্দ্য, অগ্নীর্ণ, আলস্যবোধ, গাত্রবেদনা, মনের সচ্ছন্দহীনতা ইত্যাদি লক্ষণ হই এক দিবস থাকিবাব পর হঠাৎ এক দিন অণ্ডকোষ উপবে উঠিয়া যায়, সেই সময় বোগী অচেতন হইয়া পড়ে। চিকিৎসা না হইলে মৃত্যু হওয়া বিচিত্র নহে

চিকিৎসা।—বোগীকমণকালে মৃত ও শীতল জল তরপোটে

য়্যালোপ্যাথিকে কণ্ঠাগত রোগের চিকিৎসা । ৩৭৩

মালিশ করিবে না কৈ মুখে জলের ঝাপটা মারিবে । মুখে মরিচ গুঁড়া দিবে দাঁতে দাঁতে লাগিয়া থাকিলে তাহা পৃথক করিয়া দিবার চেষ্টা করিবে । অনববত পাখা দ্বাৰা বাতাস করিতে থাকিবে তাহার পৰ রোগীৰ চৈতন্য হইবে । এই বোগ একবার হইলে শীত্র দূৰ হয় না । আফিম সেবন ইহাব উৎকৃষ্ট প্রতিকার নিয়মিতরূপে অহিফেন সেবনে বহুদিনেব পুৰাতন অস্ত্রবদ্ধি দূৰ হইতে দেখা গিয়াছে একবারে অহিফেন সেবন বোগীৰ পক্ষে যদি কষ্টকর হয়, তবে অল্প মাত্রায় সেবন করাইবে, অথবা আফিম জলে বা আমকল পাণ্ডাব বসে ভিজাইয়া ছাঁকিয়া সেই জলীয়ামশ পান করিতে দিবে । এইরূপ ১০ ১২ দিন কবিলেই আব কিছু কবিতো হইবে না ।

মধ্যে মধ্যে মুছ বিবেচক ঔষধ সেবন কবান কর্তব্য । তাহা হইলে আরু মল কুপিত হইবার জন্ত পীড়া আক্রমণ করিতে প রিবে না । সে জন্ত ভেবেঙার তৈল সৰ্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

য়্যালোপ্যাথিকে কণ্ঠাগত রোগের চিকিৎসা ।

ক্যাটার ।—বায়ুপথেব কোন কোন স্থানেব প্রদাহকে এই আখ্যা দেওয়া যায় ।

কারণ ।—কেহ কেহ অনুমান কবেন যে, সৰ্বদা উষ্ণ গৃহে বাস, উপযুক্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের অভাব, কক্ষমন্ডাব, বৌদ্রে ভ্রমণ, দেহেব উষ্ণতা নিবাবণেব পূর্বে শৈত্যসেবা ইত্যাদি কাৰণে এই রোগ জন্মে ।

লক্ষণ ।—দৌৰ্বল্য, আলস্যবোধ, পৃষ্ঠ ও হস্তপদাদিতে বেদনা, সম্মুখ কপালে টান ও ভাব বোধ, চক্ষুৰ জ্বালা এবং আলোকদর্শনে

অনিচ্ছা, নাগাগর্হস্বেব অববোধ, তজ্জন্য বিশেষ অস্থখবেদ, গলাগ-
ত্ভিতব বেদনা, স্বেব পরিবর্তন, কখন কখন গ্রীবার পেশীতে বেদনা,
জিহ্বা ফবায়ুক্ত, পিপাসা, নাড়ী জঃগ মী ও বেগবতী হইয়া থাকে
অনেক স্থলে ক্ষণেক্ষণে হাঁচি, দুই দিবস এই অবস্থা থাকিয়া নাসিকা
দিয়া ক্লেদ নির্গত হয় এই ক্লেদ স্বাভাবিক নহে, স্বেচ্ছ ও নির্যাসবৎ
কাশি, এবং এই সকল লক্ষণেব সহিত জ্বর বোধ হইয়া থাকে
ক্ষুধামান্দ্যও ইহাব অন্ততম লক্ষণ ।

চিকিৎসা ।—সামান্য সর্দি নিবারণার্থ লঘু আহার, অমঃশাখায়
উষ্ণ জল সেক, যুগ্ম বিবেচক ঔষধ, নিদ্রাব পূর্বে ১০ গ্রেণ ডোভার্স পাউ-
ডাব, উষ্ণজলে স্নান বা বাম্পাভিষেক দ্বাবা বিশেষ উপকার দর্শে, অথবা
কখন কখন ২০ বিন্দু টিং ওপিয়াই, বা কিয়ৎ পরিমাণে ত্রাণ্ডি ব্যবহারে
বোগের উপশম হয় অন্যান্য ঔষধেব মধ্যে নিম্নে কয়েকটি লিখিত
হইল

গর্ফিয়া	..	...	২ হইতে ১ গ্রেণ
নাইট্রেট অফ বিশ্ণু	...	...	১ ড্রাম
গাঁদচূর্ণ	...	...	৩ ড্রাম ।

একত্র মিশ্রিত কবিয়া নস্যগ্রহণ

কেহ কেহ বলেন ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত জ্বর পদার্থ সেবন একেবারে নিষিদ্ধ

একট্রাক্ট ওপিয়াম ১ গ্রেণ

পল্ড ইপিক্যাকু ১ গ্রেণ

পটাশি নাইট্রেটস্ ৮ গ্রেণ ।

গ্লিসিবিগ বটী প্রস্তুতের উপযুক্ত

দুইটী বটী প্রস্তুত কবিয়া ব ত্রিকালে শয়নেব পূর্বে সেবন কবিত্তে দিবে ।

ল্যারিঞ্জাইটিস্ বা কণ্ঠনালীর প্রদাহ ।—এই পীড়া দুই
প্রকার, ব্যাকিউট বা প্রবল এবং ক্রনিক বা পুরাতন ।

লক্ষণ ।—ঈষৎ কম্পের পব জ্বর, টনসিলের প্রদাহ, স্বাভাবিক
স্বেব বিকৃতি, আফেপিক কাশি, শ্বাসনির্গম, কণ্ঠনালীতে বেদনা, টান-
বোধ, নিপীড়নে বেদনা । হৃদ্বি, শব্দযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস, শ্বাসদ্রুত, গলাগঃ করণে

য্যালোপ্যাথিকে কণ্ঠাগত বোগের চিকিৎসা। ৩৭৫

বেদন, কখন কখন শ্বাস বন্ধ হইল বলিয়া বোধ হয়, উপরজিহ্ব পুরু, প্রদাহযুক্ত এবং কঠিন বোধ হয়। এই সকল লক্ষণের সহিত প্রদাহিত জ্বর, মুখমণ্ডলেব আবদ্ধতা, ত্বক্ উষ্ণ এবং নাড়ী পূর্ণ ও কঠিন হইতে পারে। তাহার পর মুখমণ্ডল উদ্বিগ্নযুক্ত ও বত্ৰবিহীন, ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ নীলবর্ণ, চক্ষু জলপূর্ণ, নাসাবন্ধু প্রসাবিত, নাড়ী ক্ষতগামী, দুর্বল এবং বিবস, অবভজ বা অববোধ ও গ্রীবদেশের সন্মুখভাগ ক্ষীণ হয়। ইহাতে বোগী নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠে, এবং হঠাৎ শ্বাস বন্ধ হইল বলিয়া ভীত হয়। শয়নে শ্বাসকষ্টের বৃদ্ধি হয়, এজন্য বোগী বসিয়া থাকিতে ভালবাসে। অন্ন নিদ্রা হইলেই শ্বাসবোধ জন্ম ভীত হয় এবং জাগ্রিয় উঠে। এম্বে প্রলাপ, অচেতন্য, ইত্যাদি উপস্থিত হইয়া তিন চারি দিন মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে।

• চিকিৎসা। — চিকিৎসা যত শীঘ্র আবস্ত কৰা হয় ততই মঙ্গল। বোগীকে অতি স্থির এবং সাবধানে রাখিয়া বাক্যব্যয় কথিতে নিষেধ করিবে। বোগীর বাসগৃহের বাতাস পরিষ্কার পবিচ্ছন্ন এবং ঈষদ্বষ্ণু রাখিতে প্রয়াস পাইবে।

শ্বাসকষ্ট নিবারণ জন্ম গরম জলের বাষ্প অথবা উহাতে হাইড্রো-সিযেনিক্ য়াসিড বা স্পিৰিট অফ ক্লোবোফরম মিশাইয়া শ্বাস লইতে দিবে।

পূর্বে কেহ কেহ এই বোগে বক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা কবিতেন, কিন্তু উহা নিতান্ত অশুভজনক। উপদংশ রোগেব সহিত এই পীড়া হইলে পাবদাভিসেক ও উহার সহিত অল্প মাত্রায় পাবদ সেবন করিণে উপকার দর্শে।

গ্রীবাঘ এক্ষুণ্টি বেলডোমা এবং মরিণার পুষ্টিস্ দিবে। ব্লিষ্টার, ক্যালোমেণ্ অথবা টার্জাবেটেড য়াণ্টিমনি প্রয়োগ বক্তমোক্ষণেব ন্যায় একবারে পবিত্যাগ কবাবে।

পথ্য। — দুগ্ধ, অসিদ্ধ ডিম্ব, বিফলি, মদিবা বা এটিও, ইত্যাদি

কণ্ঠনালীর পুরাতন প্রদাহ — কোন প্রবল পীড়ার পর এই বোগ হইতে পারে, কিন্তু তদ্যতীত নিম্নলিখিত কারণে প্রায়ই ইহা ঘটিয়া

৭ কে (১) অতিশয় হাঁকাছাকি করা, চীৎকার শব্দে গান বা বোদন
(২) ক্ষয় ও উপদংশ পীড়া । (৩) গলা হইতে উত্তেজনাব বিস্তার । (৪)
ক্ষত বা কোন প্রকার মাংস বৃদ্ধি হেতু কণ্ঠনালীতে উত্তেজন । (৫)
বিকবেণ্টে স্নায়ু উত্তেজন (৬) সতত উত্তেজক পদার্থগুণে শ্বাস গ্রহণ ।
(৭) দীর্ঘকাল মদির বা অতিরিক্ত তামাকু সেবন (৮) সার্বদিক শোথ
প্রযুক্ত হইতে পারে ।

লক্ষণ ।—কথা কহিবার পৰ কণ্ঠনালীতে একপ্রকার অস্বাভাবিক বোধ
হয়, সৰ্বত্র এই লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় না । কিন্তু স্বাভাবিক স্ববেব পৰি-
বর্তনই ইহার বিশেষ কারণ । স্ববেব দুর্বলতা, কোন কোন স্থলে আক্ষেপ-
যুক্ত কাশি, এবং তজ্জন্য বিশ্রাম কষ্ট, তৎসহ ঘং ধং শব্দ, শ্বাসকষ্ট,
গলাধঃকরণে ক্লেশ, শ্বাসনির্গম ইত্যাদি ইহার প্রধান লক্ষণ ।

চিকিৎসা ।—শুষ্ক বায়ুযুক্ত স্থানে বাস, কণ্ঠনালীর স্থিতিবতা রক্ষা,
স্থানিক উত্তেজন ব দূরীকরণ, অতিরিক্ত তামাকু সেবন পবিত্যাগ, গল-
দেশে প্রচুর পবিমাণে বস্ত্রাবরণ ; ইহাতে প্রতিকার না হইলে স্থান পবি-
বর্তন বিধেয় ।

উপদংশ এবং ক্ষয়কাশের সহিত এই ব্যাধি জন্মিলে বলকারক ঔষধ
প্রয়োগ, এবং পাকযন্ত্রেব ক্রিয়ার প্রতি মনযোগ রাখিতে হইবে । অনেক
স্থলে নাইট্রেট অফ সিল্ভার, ক্লোরাইড বা সল্ফেট অফ জিঙ্ক, ফট-
কিরি, পারক্লোরাইড অফ আয়রন, সল্ফেট অফ কপারের বাহ্য প্রয়োগে
বিশেষ ফললাভ হয় । ক্রিয়ামোট, কার্বলিক য়াসিড, জুনিপার তৈল
প্রভৃতি ঔষধ ঔষ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গলাভ্যন্তরে শ্বেক দিলে
উপকার দর্শিতে থাকে । কোনায়ম, বেনজয়েন, ইথাব, ক্লোবোফরম প্রভৃতি
অবমাদক ঔষধের শ্বেক দিলে কণ্ঠনালীর উত্তেজন হ্রাস হইতে পারে
আক্রান্তস্থানে তুলি দ্বারা কোন ঔষধ লাগাইতে হইলে উহা গ্লিসেরিনের
সহিত মিশ্রিত করা আবশ্যিক ।

গ্ৰাটিমের ইডিম বা স্ফীতি ।—এই রোগে কণ্ঠনালীর প্রদা-
হের স্থায় লক্ষণাদি প্রকাশিত হইতে পারে । অত্যাধ জল, ক্ষতকর অন্ন
অথবা ক্ষার ভক্ষণে এই রোগ জন্মিতে পারে । এই সকল জন্য গলাধঃ

১. হ্যালোপ্যাথিকে কঠিনত বোগেব চিকিৎসা। ৩৭৭

১। বিবাহ সময় কণ্ঠ ও গলনাণীৰ পেশী অকস্মাৎ আকৃষ্টিত হইয়া নাসা
বন্ধ ও মুখ দিয়া উছাৰা বাহিৰ হওয়াতে উক্ত স্থানেব যথেষ্ট ক্ষতি হয়,
কিন্তু ইচ্ছাপূৰ্ব্বক এহে কবিলে উছাৰা পাকায়ৈ গমন কৰে

ক্ষত কোনরূপে কোন স্থানে মাংসাদিব বর্জন, ল্যাবিংসেব উপাশ্চিব
নেণোনিম্ ইত্যাদি পীড়া জন্ম উত্তেজন হইলেও এই ব্যাধি জন্মিতে
পাবে স্কাৰলট্ ডুব, টাইফয়েড্ বা টাইফাম্ ডুব, বসন্ত, ইবিসিপেলুস্
প্রভৃতি বোগেব আত্মসঙ্গিকরূপে এই বোগ দেখা যায় গলাব
স্তম্ভেব প্রদাহ বিস্তৃতি জন্ম এই পীড়া হইয়া থাকে। মূত্রপিণ্ডেব
পীড়াব জন্ম সাধাবণ্ ড্রপ্টি এবং কখন কখন হেমপিণ্ডেব ও শিবাৰ অব-
বোধেব সহিতও হইতে পাৰে

চিকিৎসা। উক্ত স্থানে ১ আউন্স জলেব সহিত ৬০ গ্রেণ নাই-
ট্রেট্ অফ সিল্ভাৰ মিশ্রিত কবিয়া ব্যবহার কবিলে উপশম হয়। কেহ
কেহ স্ক্ৰীও স্থান বিদীৰ্ণ কবিয়া উছাৰ ক্রেদ বাহিৰ কবিয়া দিবাৰ পৰামর্শ
দেন

ল্যাবিংসেব প্যারালিমিস্ বা পক্ষাঘাত এই বোগ মচ-
বাচন চাৰি প্রকাৰে হইতে পাৰে যথা, -

১। উভয় দিকে য়াব্‌ডক্টৰ পেশীৰ পক্ষাঘাত - ইহাকে হিষ্টিবিয়া
বা ক্রিয়াবিকাৰ জন্য অবভজ বলে অব বন্ধ হয়, এবং প্রায়ই কামি-
বাৰ সময় পদ হয়। বোগী ফুম্‌ফুস্ কবিয়া কথা কহে, স্পষ্ট শব্দ
উচ্চাৰণ কবিত্তে সমর্থ হয় না

২। একদিকেব য়াব্‌ডক্টৰ পেশীৰ পক্ষাঘাত - ইহাতে বাবজীবন
জ্বৰেব কপান্তৰ থাকিয়া যায়

৩। উভয় দিকেব য়াব্‌ডক্টৰ পেশীৰ পক্ষাঘাত। - শ্বাসকষ্ট এবং
সশব্দ শ্বাসপ্রশ্বাসই ইহাৰ লক্ষণ। মধ্যো মধ্যো শ্বাস জন্য উছাদেব বৃদ্ধি
হইয়া থাকে

৪। একদিকেব য়াব্‌ডক্টৰ পেশীৰ পক্ষাঘাত। - ইহাতে অল্প মাত্র
শ্বাসকষ্ট ও শ্বাসপ্রশ্বাসেব সহিত সামান্য মাত্র শব্দ থাকে

চিকিৎসা। - য়াব্‌ডক্টৰ পেশীৰ পক্ষাঘাত হইলে স্থানিক ক্যারে-

উহাজে মৃদু দ ব উ কাব পাশ্চ হওয়া যাব ইহ ব্যবস্থ ব কবিত হইলে
থ ইবযেড ১ ক ইক এড উপাধিব উপব এক পোল সংস্থাপন কবিলে,
এবং উপব পোলে অববজ্জু স্পর্শ কবিলে যান্ডক্টব পেশীব পক্ষাধ্বত
হইলে স্ব সর্বোধ নিবাবন র্থ টেকি ওটমি আবশ্যক হইতে পাবে

গলনালীব প্রবল প্রদাহ - বক্ষের গর্ভ ব এদেশে, গলনালীব
ধাবে ধাবে কিছু বোনা হয় ক্ষত থাকিলে স্থায়ী এবং তীব্র বেদনা
হইয়া থাকে গলাধ কবনে কষ্ট ও বেদনা বোধ হয় গলনালী খেঁচিতে
থাকে ও বমন হয় পীড়া উৎকট হইলে বক্ষঃস্থলে ভাববোধ হয়,
এবং অবব ন্যায় দৌহিক লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইতে পাবে

চিকিৎসা - সমান্য পীড়ার চিকিৎসা আবশ্যক হয় না, তবে
কঠিন হইলে বে গৌরব ববক চুমিতে দেওয়া, তাপ পরিমাণে স্তম্ভন
কবিত দেওয়া, গলনালীতে ক্ষত হইলে পিচ্কাবী ধাবা বোর্ড কবিয়া
দেওয়া, বাহির দিবে ফোমেটেশন ও বেদনা নিবাবন জন্য অফিফেন
প্রয়োগ কর্তব্য

গলনালীব পুরাতন পীড়া। ইহা দুই প্রণীতে বিভক্ত হইতে
পাবে প্রথম ক্রিয়াবিকার, দ্বিতীয় যান্ত্রিক পীড়া

ক্রিয়াবিকারের লক্ষণ। গলনালীব কোন স্থানে যেন কোন
বস্তু আবদ্ধ হইয়া আছে একপ বোধ হয়, কিন্তু উহাব বেদনা থাকে না
আঁহাবী ব জব্য গ্রহণে গলনালী কবিত কষ্ট বোধ হয় উক্ত জব্য হযত
এককালে গলাব নীচে যায় না অথবা অতি কষ্টে চলিয়া যায় এইরূপ
সময়ে বক্ষে ভাববোধ, শ্বাসাববোধের মত কষ্ট এবং গ্রীবাদেশের পেশীব
আক্ষেপিক আকুঞ্চন হইতে পাবে কখন কখন অজীর্ণের লক্ষণ প্রকাশ
পায় বিশেষতঃ উদবান্ধান. অগ্নোদীর্ণগমহকারে আক্ষেপ হয়

যান্ত্রিক বিকারের লক্ষণঃ ক্যান্সার, আঘাত, ক্ষত বা ক্ষয়
প্রাপ্ত হইবাব পব সিকেটিয়া বশতঃ স্ফুলতা ও সঙ্কোচ, গ্রাণীবাব পদ্যাব
স্ফুলতা উপদংশিক বর্জন, ক্ষত ও ক্ষতের পার্শ্ববদ্রুতা ও ক্ষীতি
বিবৃদ্ধ আইবযেড গ্রন্থি বক্ষঃস্থল ব গ্রীবাব বিবৃদ্ধি ইত্যাদি

চিকিৎসা - যান্ত্রিক মারাবন অবস্থার পতিনক্ষ্য বাগিতে হইবে।

হিষ্টিবিধা থাকিলে হিঙ্গু, য্যালো নৌহ, কার্বনেট অফ জিঙ্ক, প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করিবে। দুকহ্ স্ন যবিক পীড়ায় স্ট্রিকনিয়া ও ইলেক্টিসিটি প্রযোগে উপকার দর্শে ।

যেথেষ্ট পরিমাণে নাসবৎ পুষ্টিকর দ্রব্য আহাৰ করিতে দিবে। সহজে খাদ্য দ্রব্য গলাধঃকরণ ন হইলে ফ্যাক পাম্প দ্বারা আহাৰ করাইনে। এই রোগের সহিত অজীর্ণের চিকিৎসাও কর্তব্য । বলকর ঔষধ, কড-নিবাব অয়েল, উষ্ণকর দ্রব্য এবং পুষ্টিকর পথ্য ব্যবস্থা করিবে। ফর্গমেন উপর বেলডোনার পলস্তাবা ও বেলডোন বা বেলডোনার নিনিমেষ্ট প্রযোগ করিবে। অহিফে, মর্ফিয়া বা অন্যান্য মাদক দ্রব্য, উষা ও বরফ প্রভৃতি স্থানিক ব্যবহারে বেদনা, নিদ্রাব অভাব ও বমন ও ভৃতি উপাগর্গ নিবারণ করিবে।

বৈদ্যকে কণ্ঠগত রোগ চিকিৎসা ।

এই বোগকে বোহিণী আখ্যা দেওয়া হয়। কুপিত পিত্ত ও কফ রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া গলদেশে যে অক্ষুর উৎপাদন করে, এ অক্ষুর গলনলীৰ ছিদ্র রোধ করিয়া বোগীৰ প্রাণনাশ করে ।

বায়ুজন্য বোহিণীৰ লক্ষণ —বাত বোহিণীতে জিহ্বায় বেদনা ও গণ্ঠমধ্যে মাংসাক্ষুর জন্মে; এবং বাতজনিত গন্যাস্তম্ভ প্রভৃতি বলবান পদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা ।—এই বোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া লবণ দ্বারা ঘর্ষণ এবং ঈষদ্ভক্ষ তৈলের কবল ধারণ করা বিধেয়।

পিত্তজন্য বোহিণীৰ লক্ষণ । গলদেশের মধ্যে শীঘ্র মাংসাঙ্গুর জন্মে ও তাহা শীঘ্র পাকিয়া উঠে, এবং তাহা হইলে প্রবল জ্বর হইয়া থাকে।

চিকিৎসা — কচন্দন চিনি ও মধু দ্বারা ঘর্ষণ এবং জাফা ও পাক্ষেব কাথে কবল গ্রহণ কবিত্তে দিবে।

কফজন্য রোহিণীৰ লক্ষণ — ইহাতে যে মংসাঙ্গুব জন্মে, তাহাতে গলনলীৰ ছিদ্র বোধ হয়, এবং অঙ্গুবগুলি দৃঢ় হইয়া থাকে।

চিকিৎসা — গুল ও কটকী দ্বারা ঘর্ষণ কবিয়া অপরাঞ্জিতা, বিডঙ্গ, দস্তী, সৈন্ধব লব, এই সকলেব সহিত সিদ্ধ তৈল এব নস্ত্র ও কবল ধাবণ ব্যবস্থা।

রক্তজন্য রোহিণীৰ লক্ষণ — পিত্তজন্য রোহিণীৰ ন্যায় ইহ ব চিকিৎসা কবিত্তে হইবে।

কণ্ঠশালুক রোগ — গলাব ভিত্তবে কুলবীজেব ন্যায় যে কণ্ঠকয়ূক্ত গ্রন্থি উৎপাদন কবে, ঐ গ্রন্থি কৰ্কণ ও স্থিব হয় এই লক্ষণ-যুক্ত বোগেব নাম “কণ্ঠশালুক”

চিকিৎসা — নিকাব সমীপদেশে বিদ্র কবিলে অথবা সেকা লিকা মূল চর্ষণ কবিলে উপকাব হয়।

অধজিহ্বেব লক্ষণ — কফ ও বত্ জিহ্বাব উপবে জিহ্বাব অগ্রভাগ সদৃশ যে শোথ জন্মে, তাহাকে অধজিহ্ব কহে। উহ পাৰ্শ্বিকো কোন পকাবে বোগেব উপগম হয় না।

চিকিৎসা — জিহ্বা উর্ধ্বদিকে আকর্ষণ কবিয়া মণ্ডলাগ্র বড়িশ দ্বাৰা বোগস্থান ছেদন এবং তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ জন্ম দাৰা ঘর্ষণ কবিলে অম্পা শোণিত্ত্রাব কবিয়া শোধন ক্রিয়া কবিত্তে হইবে।

বলায়ের লক্ষণ — কফ পলংধ্যে বিস্তৃত ও উন্নত যে শোথ জন্মে, তাহাব নাম বলয়। উক্ত শোথপ্রযুক্ত বোগী আহাবীয় বস্তু গিলিত্তে পাবে ন, এবং ঔষধ দি দ্বাৰা কোন অবস্থাতেই ইহাব বলক্ষয় কবিত্তে পাবা যায় না। সুতরাং এই বোগ অচিকিৎস।

বলণ্ডেব লক্ষণ — কুপিত কফ ও বায়ু কৰ্জুক গলনলীতে শোথ জন্মে। ঐ শোথে মর্গচ্ছেদী বেদন হয়, এবং বোগীব শ্বাসকষ্ট হইয়া থাকে। এই বোগে বোগী যাব পাব নাই যত্রণা ভোগ কবে।

চিকিৎসা — বত্ মে ফণ, তীক্ষ্ণ জবেয়র নস্ত্রাদি পযোগ, এবং দাক-

হরিদ্রা, ওডক, নিমছাল, দ্রাক্ষা ও ইন্দ্রযব এই সকলেব কাথ পান করা যুক্তিযুক্ত

একবৃন্দের লক্ষণ ।—কফ ও বক্তকর্তৃক গলনালীর মধ্যে যে গোলাকাব অথচ উন্নত ও ঈষৎ ঘূহু শোথ জন্মে, তাহাব নাম একবৃন্দ এই শোথে জ্বালা ও কণ্ডু জন্মে, এবং শোথ অতি অস্প পাকিয় থাকে

চিকিৎসা ।—মধুসংযুক্ত হরীতকীব কাথ, অথবা কটুকী, আতইচ, দাকহবিদ্রা, আকনাদি, মুখা ও ইন্দ্রযব এই সকল গোমুত্রে সিদ্ধ করিয়া পান করিতে দিবে

বৃন্দের লক্ষণ —বায়ু, পিত্ত ও বক্ত দূষিত হইয়া গলাব মধ্যে যে গোলাকাব ও উন্নত শোথ উৎপাদন কবে, ঐ শোথে বেদনা ও অত্যন্ত জ্বালা হয়, এবং প্রবল জ্বরও উপস্থিত হইয়া থাকে

চিকিৎসা —উপবোক্তরূপে চিকিৎসা কবিবে জ্বর থাকিলে জ্বরও ঔষধ দিবে

শতশ্লীর লক্ষণ বায়ুপিত্তকফ কর্তৃক গলাব মধ্যে মাংসাস্থিব-বেষ্টিত যে বর্ত্তি উৎপন্ন হইয়া গলাব ছিদ্র বোধ কবে, ঐ বর্ত্তিতে নানা প্রকাব বেদনা অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও কফজন্য বেদনা, জ্বালা ও কণ্ডু প্রভৃতি উপজব হইয়া থাকে এবং এই বোগ শতশ্লী নামক অস্ত্রের ন্যায় আকাববিশিষ্ট হয় বলিয়া উহাব নাম শতশ্লী হইয়াছে আয়ুর্বেদ-বিশাবদ পণ্ডিতগণ ইহাকে অসাধ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, এজন্য চিকিৎসা লিখিত হইল না ।

শিলাযুর লক্ষণ কফ ও বায়ুকর্তৃক গলনালীব মধ্যে যে দৃঢ়, অতিশয় বেদনায়ুক্ত ও আমলকীবীজসদৃশ গাঁহটে জন্মে, তাহাব নাম শিলায়ু । গলনালীব মধ্যে উক্ত প্রকাব গ্রন্থি থাকে বলিয়া বোগী মনে কবে যেন ভুক্ত দ্রব্য গলাব মধ্যেই সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে

চিকিৎসা ।—শস্ত্রদ্বাবা ইহাকে বিদৌর্ণ কবিয়া দিলে একবারে উপশম হইয়া থাকে ।

গলবিদ্রম্বিব লক্ষণ —বায়ু, পিত্ত ও কফ কর্তৃক গলাব মধ্যে সমস্ত গলা ব্যাপিয়া যে শোথ উৎপন্ন হয় এবং ঐ শোথে নানা প্রকাব

বেদনা অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও কফজ্ঞান বেদনা, জ্বালা ও কণ্ঠ প্ৰতীতি জ্ঞান
এবং ত্রিদোষ উগ্র বিজ্ঞান লক্ষণ সকলও হইয়া থাকে । এই বোগের
নাম গলবিজ্ঞান ।

চিকিৎসা ।—এই বোগে, যদি মর্ম্মস্থানোৎপন্ন ন হয়, তবে সুপাক
অবস্থায় ছেদন কবিয়া দিবে

গলগৌষের লক্ষণ ।—কফ ও বাত গলদেশে যে বৃহদাকাব শোথ
উৎপাদন করে, এই শোথ গলনলীর ছিদ্র বোধ করে বলিয়া বোগী পান ও
ভোজনে অসমর্থ হয় অপবক্ক শোথ অতি বৃহৎ হয় বলিয়া উদান
বায়ুর গতি বোধ হইয়া থাকে এবং বোগী অতি প্রবল জ্বালা বোধ
করে । এই বোগের নাম গলগৌষ

চিকিৎসা ।—ছেদন কবিয়া ত্রিকটু, বচ ও মৈন্ধব লবণ, অথবা
গুড় পিপ্পল মূল, বচ, মৈন্ধব লবণ, পিপ্পল, আকনাদি ও বৈবর্ত মুস্তি
মধুর সহিত মিশ্রিত কবিয়া ঘর্ষণ কবিবে

শ্বরশ্লেষের লক্ষণ ।—অবদ্র বোগে বোগী মুর্চ্ছিত অথবা অন্ধকাব
দর্শন কবিতে কবিতে সর্বদা মজোবে নিশ্বাস বিভ্রাণ করে এবং ভক্ষ্য
দ্রব্য গিলিতে অসমর্থ হয় অপবক্ক বোগীর শ্ববতঙ্গ, কণ্ঠ শুষ্ক এবং
কফদ্বার বায়ুজ্ঞাত ক্ষুদ্র হয় । এই বোগ বায়ুকর্জক উৎপন্ন হয় এবং
ইহাব নাম শ্বরশ্লেষ

চিকিৎসা ।—পিপ্পল, পিপ্পল মূল, চত্রি, চিতামূল, শুঠ, তালিশ
পত্র, এলাইচ, মবিচ, গুড়ক, পলাশ ফার, ঘণ্ট পাঁকলী ক্ষাব, যবক্ষ ব,
এই সমুদায় দ্রব্য দ্বিগুণ পুৰাণ গুড়ের সহিত পাক কবিয়া কুলপ্রমাণ
বটিকা প্রস্তুত করিবে, এবং ৭ দিন ঘণ্টাপাঁকলীর ক্ষাব মধ্যে রাখিয়া
দিবে, পশ্চাৎ খাইতে দিবে ।

মাংসতানের লক্ষণ ।—বায়ুপিণ্ডকফ কর্তৃক গলাব মধ্যে
বিস্তৃত শোথ জন্মে এই বোগের নাম মাংসতান উক্ত শোথ ক্রমে
ক্রমে গলনলীর ছিদ্র বোধ কবিয়া বোগীকে অভ্যন্ত কেশ প্রদান করে,
এবং কি উহা তে যে গাঁব প্রাণ প্রাপ্ত নহে হয়

হোমিওপ্যাথিকে গলগত রোগ চিকিৎসা । ৩৮৩

চিকিৎসা । এই বোগে উপবোত ঔষধ ব্যবস্থ করিবে, ৭৭০
ক্ষদ্র ও ফট্‌কিবিল জলে শোধ দৌত কর ইবে ।

— —

হোমিওপ্যাথিকে গলগত রোগ চিকিৎসা ।

— — —

গলায় ঘা শৈত্যাম্ভব গলদেশে বেদনা, উত্তাপ, ক্ষত, শুষ্কত,
কোন দ্রব্য গাধঃকরণে কষ্ট ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়

চিকিৎসা অতিশয় জ্বর থাকিলে “ম্যাকোনাইট” এবং তাহার
পরে “বেলেডোনা” দিবে উভয় ঔষধই দুই ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ
কবিবে

চিরুকেব ভিতর কোমাতা অথবা ম্যাণ্ডেব ক্ষীতি থাকিলে বাত্রি এবং
প্রত্যেক কালে “মাকু’বিয়াম্” দিতে হইবে

ইহাতে যদি আবোগ্য না হয় এবং গলদেশে প্রদাহ থাকে এবং
চাকচিক্য হয়, তবে প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর “ম্যাপিশ্” প্রয়োগ কবিতে
হইবে

গলায় গবম কাপড় জড়াইয়া দিবে এবং পদে গবম “মার্টার্ড বাথ”
দিবে

গলদেশের প্রবল ক্ষত উপবে যে সাধাবন ক্ষত রোগের
বিষয় লিখিত হইল, তদতিবিক্ত এই বোগে গলদেশের পেশী সমুদায়
টান বোধ হয়, ক্রমাগত জ্ববোধ থাকে, তরল দ্রব্য গলাধঃকরণেও
প্রভুত কষ্ট প্রভূত হয়, গল’র ভিতরে প্রদাহ এবং ও কটী বা ততো’ধিক
ক্ষত দেখিতে পাওয়া যায়

• চিকিৎসা । জ মিশ্রিত কম ভেজ কণ্ডি ফ্লুইডে কুল্লি কবিয়া
ক্ষত দৌত কবিবার উপদেশ দিবে প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর “মাকু’বিয়াম্”
কবোসিভাম্” প্রয়োগ কবিবে গবম কাপড়দ্বারা গ দেশ বেষ্টিত
কবিয়া রাখিবে

ছূর্ণক এবং দৌর্গল্য বৃদ্ধি হইলে ‘ন্যাপ্টিসিয়’ প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর ছয়বার খাইতে দিবে ইহাতে আবেগা না হইলে প্রত্যেক ঘণ্টা অন্তর ‘আর্শেনিন’ দিবে

অন্যপ্রকার ক্ষত ।—তত্ত্বিত্ত্ব দ্বাৰে নাক্যবায় এবং গীতাদি কবিরাব পৰ গা চিবিষ এই ক্ষত হয়

চিকিৎসা —জলের সহিত “হেমামিলিন্” মিশ্রিত কবিষা কুল্লি কবিতে এবং এক বা দুই ঘণ্টা সেবন কবিতে দিবে

তিন বা তিন শয়নের পূর্বে “ক্যালি বাইক্রেম স্” ব্যবহার কবিতে উপদেশ দিবে প্রতিদিন প্রাতে শীতল জলে গলদেশ ধৌত কবাইবে

ছাকিমীমতে গলগত রোগ চিকিৎসা ।

গলদেশে বেদন হয়, ক্ষীততা জগে, তাহা লালবর্ণ হয়, স্ফোটকেব আকার ধারণ কবে, কোন জব্য গলাধঃ কবিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, কখন কখন প্রদ হ এত বৃদ্ধি হয় যে, তজ্জন্তু জ্বব হয় বোগী সর্বদাই যন্ত্রণা ভোগ কবে, অস্থির হয়, কোনক্রমে স্থির থাকিতে পাবে ন

চিকিৎসা ।—ফট্ কবিব জলে কুল্লি কবিষা বেদনামুক্ত স্থান ধৌত কবিব উপদেশ দিবে তাহার ১৬. সুল ও লবণ মিশ্রিত কবিষা ঐ স্থানে টিপিষা দিলে স্বাস্থ্য অমুভব হয় তাহাতে যদি উপশম না হয়, তবে অজ্ঞাব চিবিষা দিলে পুঁষ বক্ত নির্গত হয় এবং বোগী আবেগা লাভ কবে

গলাব উপর গবম কাপড় বাঁধিষা বাখিব উপদেশ দিবে, কোনমতে শীতল বাতাস যাহাতে না লাগে একপ ব্যবস্থা কবিবে

তবল অথচ হুহুহু জব্য খাইতে দিবে যাহাতে বোগীর বল থাকে একপ ঔষধ ও পথ্য দিতে হইবে এমন স্থানে মাংসেব কোণ

ব্যবস্থা করা যাইতে পারে যদি কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে এমন বিবেচনা কর, তবে ঘূহু বিরেচক ঔষধ দিবে, তজ্জন্ত ভেবাণ্ডাব তৈল বিশেষ উপযুক্ত । বোগী ঔষধ খাইতে অসমর্থ হইলে পিচকাবী দ্বারা ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।

তুঁতিয়াব জলে ক্ষত ধোত করিবার বিষয়ে অনেকে যুক্তি দেন ; কিন্তু ঐ জল দৈবাৎ উদবস্থ হইলে বমন হইবার সম্ভাবনা, এজন্য সাবধান হইতে হইবে যাহাতে ঐ জল পাকস্থলীতে পৌঁছিতে না পাবে

যত প্রকার ঔষধই প্রয়োগ করা যাউক না কেন, স্ফোটক চিবিয়া দিলে যেমন সহজে আবার হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না । এজন্য অস্ত্রচিকিৎসা বিশেষ উপকারী কিন্তু অস্ত্রবিদ্রাঘ পাবদর্শী না হইলে কখন অস্ত্রধাবনে চেষ্টাবান হইবে না, কাবণ, শিবা বিংডিও হইলে বও প্রাব বদ্ধ করা বড় কঠিন স্থলবিশেষে বোগীর প্রাণনষ্ট হইয়া থাকে ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

ম্যালোপ্যাথিকে গলগণ্ড চিকিৎসা ।

দীর্ঘকাল চূণেব লবণ মিশ্রিত জল পান করিলে গলাব উপর ক্ষীণি জন্মে গলগণ্ড প্রথমাবস্থায় কোমল থাকে, পবে দৃঢ় হয় কখন থাব যেড এন্দি সমুদায়, কখন বা তাহার মধ্যস্থন, কখন বা তাহার পার্শ্বদেশ মাত্র ক্ষীণিত হয় পীড়ার প্রাবত্তে বোগী শ্রীহীন হইয়া থাকে তদ্য-তীত অপব কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না কখন উক্ত স্থানের ধমনী সকল দপ্‌দপ্‌ করে এবং স্বপ্নিওব ক্রিয়া বৃদ্ধি হয় তাহার সহিত অজীর্ণ, বমনোদ্বোগ, ক্ষুধামান্দ্য, চিত্তোদ্বোগ ইত্যাদি লক্ষণ আবি-ভূত হইতে থাকে এন্দি অত্যধিক ক্ষীণিত হইলে নিকটবর্তী স্থানের পীড়ন জন্ত শ্বাসকষ্ট ও গলাধঃকরণে বিশেষ যতনা বোধ হয় এই ব্যাধি পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিক হইয়া থাকে

যে যে স্থানের জল বোদা, অর্থাৎ সূক্ষ্মাদবিহীন, সেই জলে প্রায়ই চূর্ণের লবণ, অর্থাৎ ফস্ফেট বা কার্বনেট অফ ক্যালসিয়াম মিশ্রিত থাকে, সেই জল পানে এই পীড়া হয়। অযোধ্যার সবু নদীর তীরস্থ সেকোবা গ্রামে, গোবখপুরে, নেপালের কোন কোন স্থানে এই পীড়া অধিক পৰিমাণে হয়।

চিকিৎসা — এই পীড়া যে দেশবিশেষে জাতি ভাষার সন্দেহ নাই জীলোকের এই পীড়া হইলে বাহ্যতে প্রাথমিক বক্ষণ হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য। আইওডাইন ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ, কেহ কেহ আইওডাইন ও পাটাসিয়াম একত্রে ব্যবহার কবিয়া থাকেন।

আইওডাইন	...	...	৫ গ্রেন।
আইওডাইড অফ পাটাসিয়াম	..	..	১০ গ্রেন
জল	..	..	১ পাইন্ট

ইহাকে “লিউগেন্স সলিউশন” কহে। এই ঔষধ প্রথমে ১ ড্রাম চাওয়া দিবসে তিনবার সেবন কবাইবে। তাহার পর ক্রমে মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

কেহ কেহ নিম্নোক্ত প্রকারে আইওডাইড অফ পাটাসিয়ামের মত ব্যবহার কবিয়া থাকেন।

আইওডাইড অফ পাটাস	..	..	৬৪ গ্রেন
কার্বনেট অফ পাটাস	...	..	৪ গ্রেন
পবিত্র জল	..	...	১ ড্রাম
পুরুরের বসা	..	..	১ আং।

আজ কালি অনেক নিম্নোক্ত প্রকার প্রস্তুত বেড আইওডাইড অফ মর্কবিব মলমে বহুতর বোগী আবেগ্য কবিয়াছেন।

হাইড্র জিবাই আইওডাইড কএম	...	...	৮ গ্রেন।
আক্সুয়েন্টি সিগ্লামিসিস্	...	...	১ আং

উৎকৃষ্ট জল মিশ্রিত কবিনে

মেজব হেমশ্চেরূপে ইহা ব্যবহার কবিয়া বহুতর গলগণ্ড আবেগ্য বিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে বিখিত হইল।

বৈদ্যকে গলগণ্ড ও গণ্ডমালাদি রোগের চিকিৎসা । ৩৮৭

বসা বা মোম ১ আং

হাইড্রার্জ আইওডাইড কবচ ৬ গ্রেণ

একএ উত্তমরূপে মিশ্রিত কবিয়া মলম ও স্তূত কবিত্তে হইবে এই মলম গলগণ্ডের উপর মাখাইয়া ২৩ ঘণ্টা সূর্য্যকিরণে খুলিয়া রাখিবে । কয়েকদিন এইরূপে ব্যবহার কবিলে উছার উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি হয় ঐ সকল ফুস্কুড়ি শুকাইলে আবার ঐ মলম ব্যবহার করিবে

এই সকল ঔষধে আবোগ্য না হইলে অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন হইয়া থাকে

বৈদ্যকে গলগণ্ড ও গণ্ডমালাদি রোগের চিকিৎসা ।

গলগণ্ডের আকার — গলদেশে কুবণ্ডের ন্যায় যে নিম্নচল শোথ হয়, ঐ শোথ ছোট হউক বা বড় হউক, উহাকে গলগণ্ড কহে ।

গলগণ্ডের উৎপত্তির নিয়ম ।—বায়ু, কফ ও মেদ গলদেশের পশ্চাৎভাগস্থিত শিবাঙ্গয় আশ্রয় করিয়া গলদেশে আপন আপন লক্ষণ-যুক্ত গলগণ্ডকে উৎপন্ন কবে

বায়ুজন্য গলগণ্ডের লক্ষণ — কৃষ্ণবর্ণ শিবাঙ্গবা ব্যাণ্ড, স্ফটী-বেধনবৎ বেদনায়ুক্ত, শ্যামবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ ও পীত মিশ্রিত বর্ণ, অথবা বক্তবর্ণ হয় এবং অনেক বিলম্বে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং উহা প্রায় পাকেনা, কখন বা পাকিয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন অকচি, তালু ও গলা শুষ্ক হয় ।

চিকিৎসা — সর্ষপ, সজিনাবীজ, মসিনা, যব ও গুলাব বীজ, এই সমুদায় জলভঞ্জে বাটিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড ভাল হয় ।

পুবাণ কুস্মাণ্ডের রস, বিট ও সৈন্ধব লবণের সহিত মিশ্রিত কবিয়া মস্ত্র গ্রহণ করিলে এই বোগ প্রশমিত হয়

পাক তিতলাউষেব মধ্যে জল বা মদ্য সা ৩ দিন র থিযা তাহা পান কবিত্তে দিবে ইহাব সহি ৩ স্পৃথ্য গ্রহণ কর্তব্য ।

ভুখী তৈল ।—কট্ট তৈল ৪ সেব, তিতলাউষেব রস ১৬ সেব । কল্কার্থ বিড়ঙ্গ, যবক্ষাব, মৈন্ধব, বাস্মা, চিরাতা, ত্রিকটু, দেবদাক মিলিত ১ মের এই তৈলেব নস্য গ্রহণ কবিলে উপকার দর্শে

কফজন্য গলগণ্ডের লক্ষণ —কফ জন্য গলগণ্ড দৃঢ়, ভাব, দেহের সমান বর্ণ, কণ্ঠযুক্ত, শীতল ও আকাবে বড় এবং অধিক দিনে বৃদ্ধি হয় । মুখেব মধুবতা ও তালু এবং গলা কফের দ্বারা ব্যাপ্ত হয় ।

চিকিৎসা —যোষাফল বা তিতলাউষেব বসে পিপ্পল চূর্ণ মিশ্রিত কবিয়া নস্য লইতে দিবে সোদানুব মূল চাউলেব জলের সহিত বাটিয়া নস্য ও প্রলেপ দিলে উপকার হয়, নিসিন্দাব মূল জলে বাটিয়া নস্য লইতে দিবে ।

ত্রিফলা ৩ ভাগ, ত্রিকটু ৬ ভাগ, কাঞ্চনছাল ১২ ভাগ, চূর্ণমম্বটির সমান গুগ্গলু ; ত্রিফলা চূর্ণেব ১০ গুণ মধু ; একত্রে মাড়িয়া ২ মাসা পবিমাণে গুড়িকা ব্যবহার কবিবে ইহাব নাম “কাঞ্চন গুড়িকা ”

নিগুণ্ডী তৈল ।—তৈল ৪ সেব, নিসিন্দাব বস ১৬ সেব । কল্কার্থ জীলাদলাব মূল ১ মের । এই তৈলেব নস্য লইতে দিবে

মেদজন্য গলগণ্ডের লক্ষণ —মেদজন্য গলগণ্ড স্নিগ্ধ, ভাব, সূৰ্গন্ধ, কণ্ঠ ও অঙ্গ বেদনায়ুক্ত এবং শবীবের সহিত বৃদ্ধি ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় রোগীর মুখগণ্ড স্নিগ্ধ ও গগনলীর মধ্যে শব্দ হয়

চিকিৎসা । কট্ট তৈল ৪ সেব, কেশুরিয়াব রস ১৬ মের, চাকুন্দা বীজ ০ মের পাক শেষ হইলে মেটে সিদ্ধব ১০ সেব দিয়া নামাইবে । এই তৈল গলগণ্ডে মর্দন কবিবে ইহাব নাম “সিদ্ধবাদি তৈল ,”

রাখালশলা অথবা শ্বেত অপরাজিতার মূল গোমুজে বাটিয়া প্রলেপ দিবে

বাখুনহাটীব মূল তণ্ডুলোদকে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কুবণ্ড ও গণ্ডবোগ জাবোগ্য হইয়া থাকে

অসাধ্য লক্ষণ —এক বৎসরের অধিক কালের গলগণ্ড এবং অকটি,

বৈদ্যকে গলগণ্ড ও গণ্ডমালাদি রোগের চিকিৎসা। ৩৮৯

শ্বাসকৃচ্ছ, দুর্বলতা ও শ্ববভঙ্গ এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি অচিকিৎসনীয়

গণ্ডমালার আকার।—বক্ষ, স্কন্ধ, গ্রীবাৎ পশ্চাত্তাগস্থ শিরাদ্বয়, গলদেশ ও কুঁচকিতে মেদ ও কফকর্জক বদবি অর্থাৎ কুলেব বা আগলকীব আকারে যে বহুসংখ্যক ক্ষেপটক জন্মে, তাহাদিগকে গণ্ডমালা বলে। এই গণ্ডমালা অনেক বিলম্বে পাকে।

চিকিৎসা।—তৈল ৪ সের কল্কার্থ কুটিত ছুঁচা ১ সের, পাকেব জল ১৬ সের

শেওড়ার ছালেব কাথ এবং কল্ক দ্বারা সিদ্ধ তৈল ব্যবহার করিলে গণ্ডমালা ভাল হয়

অপচী রোগের আকার —যদি পূর্বেত্ত গণ্ডমালার ক্ষেপটকের মধ্যে কতকগুলি পাকে, কতকগুলি হইতে জ্বলজ্বাব হয়, কতকগুলি লয়প্রাপ্ত হয়, এবং কতকগুলি নুতন উৎপন্ন হয়; এবং ঐগুলি অধিক দিন ব্যাপিয়া থাকে, তাহা হইলে উহাদিগকে অপচী কহে। এই রোগ যদি সর্দি, পার্শ্ববেদনা, কাশ, জ্বর ও বমনযুক্ত হয়, তবে চিকিৎসা বলিয়া জানিবে।

চিকিৎসা।—সজিনামূল, দেবদারু, কাঁজির সহিত সমভাগে পেয়ণ করিয়া জ্বর উষ্ণকবতঃ প্রলেপ দিলে অপচী ভাল হইয়া থাকে।

সর্ষপ, নিমপত্র ও ভেলাব মুঠী দধি দিয়া ছাগমূত্রেব সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিবে

পুয্যানক্ষত্রে ডান্‌কুনি শাকের অথবা অপবাজিতাব মূল গলদেশে বন্ধন করিতে দিবে।

গুণ্ধ্যাদ্য তৈল।—কুঁচমূল, করবী মূল, বিদ্ধড়ক, আকন্দেব আটা ও সর্ষপ, এই সমুদায় কল্ক ও তৈলের চতুর্গুণ মিশ্রিত দ্বারা ক্রমশঃ দশবার পাক করা তৈলে পিঁপুল, পঞ্চলবণ ও মরিচ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তদ্বারা মর্দন করিলে অপচী, নাড়ীভ্রণ, বলাকি, অর্শ, অর্কুদ ও ব্রণ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

হোলিওপ্যাথিকে গলগণ্ড রোগ চিকিৎসা ।

গলাব সম্মুখভাগেব মাংস ক্ষীণ হয়, ক্ষীণ হইয়া খুব বড় হইয়া থাকে বোদা জল পান অর্থাৎ, যে দেশেব জলো চূর্ণের লবণ মিশ্রিত থাকে, সেইরূপ দেশে এই পীড়া অধিক হয় ইংলণ্ডে ডার্বিসায়াবে এই পীড়া অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে, এজন্য এই বোগেব নাম 'ডার্বিসায়াব নেক' বলা হয়

চিকিৎসা —এক পক্ষ কাল বাত্রে 'স্পঞ্জিয়া' খাইতে দিবে ইহাতে যদি আবোগ্য না হয়, তবে এক সপ্তাহ কাল ঔষধ বন্ধ রাখিয়া গাবাব ১৫ দিন একপে এই ঔষধ খাইতে দিবে ।

পানীয় জল উত্তমরূপে সিন্ধ ও পবিত্রাব করিয়া লইতে হইবে

ছাকিমীমতে গলগণ্ড রোগের চিকিৎসা ।

এই বোগে গলা ফুলিয়া থাকে, একবারেই যে কিছু ফুলিয়া বড় হয় এমন নহে, অগ্রে সামান্য ক্ষীণ হয়, তাহার পর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ইহাতে বেদনা থাকেনা; যেন গলাব উপবিভাগে দ্বিতীয় গণ্ডা স্থত হইল বোধ হয় চাপিলে লাগেনা; প্রথমতঃ কিছুদিন ভার বোধ হয়, পরে তাহা থাকে না অল্পে অল্পে সে ভার অনুভবই হয় না

চিকিৎসা ।—পানাতম্য গোমুঞে পাককবিয়া পান করিতে দিবে

গোম	..	অর্দ্ধ ছটাক
মেটেসিন্দুব	...	১ তোলা ।

'তরুণে' মিশ্রিত করিয়া গলা প্রস্তুত করিবে, সেই মলম গলগণ্ডেব পর প্রতিদিন উত্তমরূপে মর্দন করিবে তিন দিনের পর তিন দিন

য্যালোপ্যাথিকে জিহ্বা ও মুখরোগ চিকিৎসা । ৩৯১

এক বাথিবে যদি ফুসুড়ি বাহির হয়, তবে তাহা ভাল না হওয়া পর্যন্ত ঔষধ লাগাইবে না ।

তুডতুড় পাঁতা	..	২ তোলা
বহুন	...	০ তোলা ।
কটফল	.	০ তোলা
চিঠামূল	..	০ তোলা

একত্র উত্তমরূপে পেষণ করিয়া গলগণ্ডেব উপর প্রলেপ লাগাইবে

উনবিংশ অধ্যায় ।

য্যালোপ্যাথিকে জিহ্বা ও মুখরোগ চিকিৎসা

গ্রাম 'ইটিস্' বা 'জিহ্বা প্রদাহ' : অত্যন্ত ক্ষিভাব আত্মসঙ্গিক রূপে এই পীড়া হইতে দেখা যায় যান্ত্রিক আঘাত, উষ্ণ জ্বর জ্বর গলাধঃকরণ, ক্ষতকর জ্বর ওক্ষণ, এবং মৌমাছি ও বোত্বা দংশনেও জিহ্বাব প্রদাহ জন্মিতে পারে ।

লক্ষণ ।—টনসিল্ বা জিহ্বাব নিকটবর্তী স্থানে বিস্তৃত হইয়া ইহাব প্রদাহ হয়না কখন কখন প্রদাহেব পব ফোটক জন্মিতে পারে কোন প্ৰকাণ্ড কাবণ না থাকিলে যদি জিহ্বাপ্রদাহ জন্মে, তবে তাহাব সহিত জ্বর, মানসিক নিস্তেজতা ও শারীরিক দুর্বলতা বর্তমান থাকে অত্যন্ত পীড়াব আত্মসঙ্গিকরূপে হইলে শীঘ্রই দৈহিক অস্বাস্থ্যাব লক্ষণ উপস্থিত হয় ।

চিকিৎসা । পিচ্কাবীদ্বারা বিবেচক ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে, জিহ্বাতে বরফ দেওয়া কর্তব্য কঠিনলোশন দ্বারাও বিশেষ ফল দর্শে কখন কখন বক্রাতিশয় দূর করিবার জন্য উপবিভাগ বিদীর্ণ করা আশংক্য হয় । প্রদাহ জন্য জিহ্বা মূলেব স্থলতা জন্য প্রাণবোধ হইবার

সম্ভাবন থাকিলে টেকিয়া চ্ছেদ করা কর্তব্য। বে গী দুর্বল হইলে
য্যামোনিয়া প্রভৃতি উৎকর্ষ ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। মুখ দিয়া আহাব
গ্রহণে অসমর্থ হইলে পিচুকাবী দ্বারা খাদ্য উদবস্থ করাইবে।

পূর্বাণন গ্লানাইটিস্ —কোনকপে প্রবল পীড়া প্রবাতন হইলে
তাহার উত্তেজন হেতু ইহা জন্মিতে পারে।

চিকিৎসা পূর্ববৎ করিতে হইবে।

জিহ্বাক্ষত —জিহ্বায় নানা প্রকারে ক্ষত হইতে পারে। উহা
মকলেই অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক ও সহজে আবেগ্য হয় না। পাকযন্ত্রে
দীর্ঘকাল স্থায়ী হুবহু পীড়াই ইহা একমাত্র কারণ।

চিকিৎসা। —লঘু আহব, যুহু বিবেচক ঔষধ, ক্ষতে তুঁতে
সংযোগ, দন্তোৎপাটন বা দন্ত হইতে টাটকা দূরীকরণ দ্বারা ইহাদেব
চিকিৎসা করিবে।

নিশ্বাসে দুর্গন্ধ ও আত্মসজ্জিক দন্তমাড়ী পীড়া দ্বারা পারদর্জনিত
জিহ্বাক্ষতেব কারণ নির্ণয় হইতে পারে।

চিকিৎসা। —লবণাঙ্ক বিবেচক, ক্লোরোট অফ পটাশ ১০ হইতে
১২ গ্রেণ ও তুঁতেব কুল্লি দ্বারা (১ আউন্স জলে ৫ গ্রেণ) পারদর্জন
ক্ষত শীত্রে আবাম হয়।

উপদংশজন্ম ক্ষত প্রায়ই গভীর হয় না। ইহা জিহ্বাব পার্শ্বেই
প্রায় দুইগোচর হয়, সহজে আবেগ্য হয় না। কিন্তু পারদাভিধেক,
অথবা আইওডাইড অফ মার্কবি ও কফিকেব স্থানিক ব্যবহার দ্বারা
আবেগ্য হইতে পারে। আইওডাইড অফ মার্কবী নিম্নোক্তরূপে
ব্যবহার করিতে হয়।

হাইড্রার্জঃ আইওডিঃ ভিবিডি ৬ গ্রেণ।

একফ্রাক্ট কোনাই ৩০ গ্রেণ।

ছাটী বটীকা প্রস্তুত করিবে, ঐ বটীক এক একটী প্রত্যহ বাত্রিকালে
খাইতে দিবে।

জিহ্বাব ক্যান্সার জিহ্বায় যে ক্ষত প্রকাশিত হয়, তাহার
মূল দৃঢ় ও পার্শ্ব বন্ধ হয়।

‘ম্যালোপ্যাথিক’ জিহ্বা ও মুখরোগ চিকিৎসা । ৩৯৩

লক্ষণ — দুকহ বেদনা, অতিশয় শালা নিঃসরণ ও ক্যান্সারের দৈহিক চিহ্ন ইহাৰ প্রধান লক্ষণ জানিতে হইবে . প্রথমে বোগী জিহ্বায় ও গলাধঃকরণে যন্ত্রণা বোধ কবে, শীঘ্র শীঘ্র যাতনা বৃদ্ধি পাইয়া কৰ্ণ মধ্যে শব্দাবগনবৎ বেদনা ছইতে থাকে, অথবা ঐ বেদনা গলাৰ ভিতর গিয়া কানিৰ উত্তেজনা জন্মায় . কখন কখন এই ক্ষত মুখগহ্ববেব মৈথিক শিল্পী ও দন্তমাড়ী আক্রমণ কবে এবং উহা যত বিস্তৃত হয়, ততই উহাৰ ক্লেদ অতিশয় দুৰ্গন্ধযুক্ত হয় . বাত্রিকালে নিদ্রা ছয না, গলাধঃকৰণে ও বাঁকোচ্চাবণে কষ্ট হয়, কখন কখন সমস্ত মুখগহ্বৰ বিস্তৃত, ক্ষতযুক্ত ও কঙ্গেস দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ হওয়াতে শ্বাসরোধ ছইতে পাবে ; কিন্তু দৌৰ্বল্যই এই বোগে পাণনাশেব কাৰণ হয় .

চিকিৎসা — বেদনা নিবাবণ এবং শবীর পোষণই চিকিৎসাৰ প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া জানিতে হইবে . অস্থিফেণ দাবা বেদনা নিবাবণেব সাহায্য ছইতে পাবে . ম্যাটিকো পত্র চূর্ণ, পাবক্লোবাইড অফ আয়বণেব . ম্যাটিউবেটেডে মোলিউশন্ ও ববফরাবা রক্তশ্রাব বন্ধ কবিবে . দুধ, কাঁচা ডিম্ব ও বিফটী দ্বাৰা দেহেব বলবদ্ধা কবিত্তে ছইবে . উপবোক্ত ঔষধ সকলেব ব্যবহাবণালী নিম্নে লিখিত ছইল .

যন্ত্রণা নিব বণ জন্ম ,—

একফ্রাক্ট ওপিয়াই	..	..	২—৩ গ্রোণ
একফ্রাক্ট বেলেডোনা	.	...	৪ গ্রোণ
একফ্রাক্ট কনিয়াই	...	..	৩ গ্রোণ ।

একটি বটী ছইবে . এইরূপ এক একটি বটী ৩ । ৪ ঘণ্টা অন্তৰ খাইতে দিবে .

লাইকবিস্ মর্ফিয়া ছাইড্রোক্লোব্যাটিস্	..	..	২০ বিন্দু ।
ক্লোবোফব'ম	...	..	১০ বিন্দু ।
টীং ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা	..	..	২০ বিন্দু
পাল্ভাবিস্ ট্র্যাগাক্যান্থা কম্পাজিটী	..	..	৩০ গ্রোণ ।
স্পিবিটাস্ ইথাবিস্	...	..	৪০ বিন্দু ।
ডাইঃ ছাইড্রোসিয়েনিক য়াশিড			৪ বিন্দু ।

জল		১১ আং ।
এক মাত্র বাত্রিকালে খাইতে দিবে		
বস্ত্র পরিষ্কার জন্য ;—		
বিবি'রয়া সল্ফেটিস্	..	৩০ গ্রেন ।
সল্ফিউরিক্ য়ানিড য়াবোমেটিক্	.	৪০ বিন্ড ।
সিবপ অক্সাণ্ডি		১ আং
য়াকোয়া অক্সাণ্ডি		৭১ আং ।
ছয় মাত্র । দিবসে তিনবার খাইতে দিবে		
ফেবি টাটাংরেটি		৬০ গ্রেন ।
স্পিবিটাস্ য়ামোনিয়া য়াবোমেটিসাই		২১ আং
ইন্ফিউজন্ কোয়াসিয়া		৭১ আং
ছয় মাত্র। দিবসে তিন বার খাইতে দিবে		
স্থানিক রুদ্রিব শান্তি জন্য ;—		
কুইনি সল্ফেটিস্		২৪ গ্রেন ।
এক্সট্রাক্ট বেনেডোনা		৪ গ্রেন
ক্যাস্কর		৩০ গ্রেন
কন্ফেক্সন্ বোজ গ্যালিশ		বটী প্রস্তুতের উপযুক্ত ।
বারটী বটী কবিবে দিবসে ২ ৩টী সেৱন কবাইবে		
এক্সট্রাক্ট য়াকোনাইট্		৮ গ্রেন
এক্সট্রাক্ট ওপিয়াই		৮ গ্রেন
এক্সট্রাক্ট ছায়েসায়েমস্		১৬ গ্রেন
আটটী বটী প্রস্তুত কবিবে । প্রত্যেক চাবি, ছয় বা আট খণ্টা অন্তর এক		
একটী খাইতে দিবে		
স্থানিক যন্ত্রণা নিবারণার্থ ;—		
প্লাসি আইওডাইড	.	৬০ গ্রেন
আজুয়েন্টি য়াট্রোপিয়া		৬০—১২০ গ্রেন ।
আজুয়েন্টি সিম্‌প্লাইসিস্		১ আং
একত্র মিশ্রিত কবিয়া মর্দন		

য়্যালোপ্যাথিকে জিহ্বা ও মুখরোগ চিকিৎসা । ৩৯৫

ময়িণাব পুন্টিস, হেমলকের পুন্টিস ও নিম্নোক্ত একাবে সাইট্রিক
য়্যালিড লোশন ব্যবহার করিবে

জিল্লি সল্ফেটিস্	...	..	১৬ গ্রোন ।
স্পিবিটাম্ বোজ ম্যাভিনা	..	..	১২ ড্রাম ।
টীং ল্যাভেণ্ডিউলি কম্পোজিটা	..		১২ ড্রাম
জল	..	..	৭২ আং

মিশ্রিত করিয়া ধৌত করিবে

ক্যান্সারযুক্ত জিহ্বাংশচ্ছেদ কবিত্তে কেহ কেহ উপদেশ দেন, কিন্তু
তাঁহাতে যে বিশেষ উপকার দর্শে এমন বোধ হয় না । কিন্তু উৎকট
উপসর্গের নিবারণ জন্য কখন কখন ইহা আবশ্যক হয় জিহ্বার স্থলতা-
প্রযুক্ত শ্বাসকষ্ট, অতিশয় বেদনা ও অনবরত লালানিঃস্রবণ হেতু বিশেষ
কষ্ট ও রক্তস্রাব হইলে এই উপায় অবলম্বন কবিত্তে হয় ইহা দ্বারা অশু
উপকার দর্শে তাহার সন্দেহ নাই

জিহ্বার বিদার ও টিউমার ইত্যাদি ।—দীর্ঘকাল স্থায়ী
ক্লেশকর জিহ্বার বিদার হইলে তাহার কবিত্তে ও কথা কহিতে রড় কষ্ট
হয় । কোন বিশেষ দৈহিক অবস্থা বা পাকযন্ত্রের ক্রিয়া বিপর্যাস বশতঃ
এই পীড়া না লইলে—

গ্লিস্ট্রিন	..	..	... ১ আং ।
সোহাগা	...	...	.. ২ ড্রাম ।

একত্র মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে

স্থানিক ঔষধ প্রয়োগে উপকার না দর্শিলে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার
করিবে ।

পটাশি আইওডাইড	..	...	... ২০—৩০ গ্রোন ।
টীং সর্পেন্টাবিয়া	...	...	... ২২ ড্রাম ।
গ্লুক্সু বা গোয়ামাই	..	...	... ৭২ আং

ছয় মাত্রা দিনসে তিন বার খাইতে দিবে

কখন কখন জিহ্বার উপরিভাগে এপিথিলিয়ামবহিত পবিকৃত, চিকন
ও অণুরূতি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাতে ক্ষত বা বিদার থাকেনা,

এবং জিহ্বার অন্যান্য অংশ স্নায়ু বলিয়া বোধ হয় কোন কোন স্থানে উপদংশ জন্ত জিহ্বা ব এই অবস্থা হইয়া থাকে তাহা হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা ।

হাইড্রোজেনাই কবোমিত সল্লিমেটী	..	..	১ গ্রেন
য়ামোনিয়া হাইড্রে ক্লোরাটিস্	..	..	৫ গ্রেন
পটাশি অ ইওডাইড্	.	.	৭০ গ্রেন
জল	...	..	২২ ড্রাম
একফ্রাক্ট সারাসা লিকুইডি	.	.	২২ আং।

ছোট একচামচ ঔষধ বড় একপ্লাশে দিয়া দ্বিবে তিনবার খাইতে দিবে ।

ওয়ার্ট ও কণ্ঠিলোগাকেও জিহ্বার শৈথিল্য বিলম্ব সাধারণ পীড়া মধ্যে গণ্য করিতে হইবে ওয়ার্ট কর্তন করিয়া ও কণ্ঠিলোগা উপদংশ-নিবারণ ঔষধ দ্বারা দূরকরিতে চেষ্টা করিবে

কোন কোন স্থানেও শৈথিল্য বিলম্ব বা তন্নিম্ন টিসু পুরু, দৃঢ়, স্থূল ও প্যাপিলিয়ুজ এবং কখন উহাদের মধ্যে মধ্যে ফাটা দৃষ্ট হয় ইহা বা প্যাপিলিওমা প্যাচেস নামে খ্যাত এরূপ হইলে জিহ্বার স্নায়ু ও বাক্যের জড়তা জন্মে তৎপ্রতিকারার্থ নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে

পাটাসিগাই অাইওডাইডি	..	..	৪০ গ্রেন।
টীং বৈয়াই	...	..	২ আং।
একফ্রাক্ট সারাসা লিকুইডি	.	..	২২ আং

একপ্লাশ জলে এক ছোট চামচ ঔষধ দ্বিবে তিনবার খাইতে দিবে

একফ্রাক্ট কোনাই	...	.	৩৬ গ্রেন
পাল্ডাবিস্ ইপিঃ কম ওপিয়াই	.	.	২৪ গ্রেন।

বারিটি ঘটা প্রাপ্ত করিয়া ৩৪ ঘণ্টা অন্তর এক একটা খাইতে দিবে ।

জিহ্বার বিবৃদ্ধি ।—কখন কখন জন্মাবধি বিবৃদ্ধি হইতে দেখা যায় । একত্র তিহ্বা মুখের বাহিরে আসিয়া থাকে । ছুবি, লিগেচার অথবা একবাণ দ্বারা ইহা কর্তন করিয়া দিতে হয়

জিহ্বার ফিনাম স্ব ভাবিক অপেক্ষা ছোট হইলে উহাকে বদ্ধজিহ্বা

য়্যালোপ্যাথিকে জিহ্বা ও মুখরোগ চিকিৎসা । ৩৯৭

কঁহে । ইহা দ্বারা গতিব ব্যাঘাত জন্মিলে কাঁচির অগ্রভাগ নিয়ম করিয়া তদ্বাৰা কাঁচিয়া দিলে জিহ্বার গতিব যে ব্যাঘাত থাকে, তাহা সারিয়া যায় .

কোষযুক্ত ও সন্মৈদ টিউমার কর্তন দ্বারা নষ্ট করা আবশ্যিক ফ্রাইব্রস ও কনেক্টিভ টিস্সু দ্বারা নির্মিত কঠিন টিউমার ও জিহ্বা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহাদেব সুল লম্বা হইলে সহজেই কর্তন করা যাইতে পারে

র্যানিউলা —কেহ কেহ বলেন এই পীড়া জন্মিলে ভেঁকেব শ্রায় শব্দ করে এই জিহ্বাস্ফীতি অর্ধমুচ্ছ, তবলাযিত ও জিহ্বাব নিম্নে স্থিত ইহাব ভিতর লিণ্ট প্রবেশ করাইয়া বা ইহাব অগ্রভাগ কর্তন করিয়া ইহা নষ্ট করিবে

মুখগহ্বরের পীড়া এই পীড়া নানা প্রকারেব হইয়া থাকে, যথা, —ক্যাটারেল, কলিকিউলাব, যাপাথস্, আল্‌মারেটিভ্, প্যারাসা ইটিস্, গ্যাংগ্রিন্স ও মার্কিউরিয়েল্

স্থানিক উত্তেজনা বশতঃ অনেক স্থলে এই পীড়া হইতে দেখা যায় মুখপ্রক্ষালনে অবহেলা, দন্তোদগমেব উত্তেজনা, ভগ্নদন্ত, অসম্পূর্ণ বর্দ্ধিত বা প্রদাহিত চুচুকবিশিষ্ট স্তনপান বা দীক্ষকাল স্তনপান, রাসায়নিক বা যান্ত্রিক অপকাব, উত্তাপ, শীতলতা, অতিরিক্ত তামাকু সেবন, আঘাত, ক্ষত ইত্যাদি কাবনে এই পীড়া জন্মে

১। সামান্য বা ক্যাটারেল —এই পীড়া প্রবণ হইলে গালের অভ্যন্তরে বা মুখের কোণে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র উজ্জ্বল লালবর্ণ তালিব আকাবে চিহ্ন দেখা যায় অবশেষে ঐ তালি বিস্তৃত ও সংযুক্ত হইয়া সমস্ত প্লাম অরুত করিয়া থাকে আক্রান্ত স্থান স্ফীত হয় বেদনা, অমুখ ও উষ্ণতা বোধ, মুখমধ্যে প্রলেপের অনুভব, স্বাদেব অস্পতা বা বিকৃত-স্বাদ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় অনেকস্থলে নিশ্বাসবায়ুতে দুর্গন্ধ হইতে পাবেন জিহ্বা ক্ষায়যুক্ত, ক্ষুধামান্দ্য, শৈশবে অস্ত্রেব ক্রিয়াব ব্যতিক্রম, উদবাস্থান প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা পাকঘন্ত্রেব ক্রিয়াবিকাৰ জানিতে পাৰা যায় । শিশুব মুগ্ধা হয় না ও স্বভাব খিট্ খিটে হইয়া থাকে

২ কলিকিউল রব প্যাপিলারী —ইহা হইতে প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উন্নত ও কঠিন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় ক্রমে ইহা বা কোমল ও ছিন্ন হইলে ভিতবস্থ পদার্থ বহির্গত হয় । তৎপবে ক্ষুদ্র, চক্রাকাব, স্পষ্ট ক্ষত প্রকাশ পাইয়া থাকে । এই ক্ষতের চারিদিক আবৃত হয় ও বোঁগা বেদনা অনুভব কবে

৩ । য়্যাপ্ থস্ বা ও প্ স্ ক্ষত ।—ইহায় ওষ্ঠ, গাল, ঠালু ও জিহ্বায় শ্বেতবর্ণ বা শ্বেত পীত মিশ্রিতবর্ণের চিহ্নাকাবে বহির্গত হয় প্রায়ই ইহাদেব সংখ্যা অধিক হইতে দেখা যায়, পবে ইহা বা পৰ্শ্পর সংযুক্ত হইয়া একাকার ধাবণ কবে ইহাদেব চারিদিকে আবৃত মণ্ডল হয়. ইহাদেব ভিতবেব পদার্থ ক্রমে অস্বচ্ছ হয় এবং ভেদনিকেল বিদীর্ণ হইয়া পড়ে ইহাদেব সহিত অত্যন্ত যত্না হয়, এবং স্তনপান, চৰ্ব্বণ ও গলাধঃকরণ কথিতে কষ্ট হয় গালের ভিতবেব সিক্রিসনেব ও লালীৰ বৃদ্ধি হইয়া থাকে প্রায়ই নিশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়, শিশু অস্থির হয় ও জ্বর বোধ কবে, আহাব করিতে চাহেনা, সৰ্বদা জঃপানেব ইচ্ছা প্রকাশ করে । জিহ্বা ক্ষারযুক্ত, উদরাময় ও বমন হইতে দেখা যায় ।

৪ । আল্ মারেটেড্ বা ডিপ্ থিরাইটিক্ প্রদাহ ।—এই রোগ এণ্ডেমিকরূপে প্রকাশিত হইতে পাবে ইহা পায়ই নীচেব মাড়িব ধারে আবৃত্ত হয় কিন্তু পশ্চাদিকে এবং ওষ্ঠ, জিহ্বা ও গালে বিস্তৃত হইতে পাবে মাড়ী রক্তপূর্ণ, ক্ষীত ও স্ফাণ্বৎ হয় উহা হইতে সহজে রক্তআব হইয়া থাকে এই সকল ক্ষতের ধাব উন্নত ও উহাদেব পার্শ্বস্থ বিল্লী বক্তপূর্ণ, ক্ষীত ও ইডিমায়ুক্ত হয়। উহা বা প্রায়ই গভীর হয় না, প্রায়ই পীতবর্ণ, পাঙ্গাশ পদার্থ দ্বাৰা আবৃত থাকে

৫ । প্যাবাসাইটীস্ বা ফাঙ্গস্ প্রদাহ —ইহাকে থ্রাম্ বলে । প্রথমে লালবর্ণ তালি নির্গিত হয়, উহাব দৈর্ঘ্য শ্বেতবর্ণ চিহ্ন লাহিব হয় ; উহা বা ক্রমশঃ বিস্তৃত ও সংযুক্ত হইয়া বৃহৎ তালিব আকার ধারণ কবে তাহাব স্তলতা সৰ্বত্র সমান নহে দেখিতে ছেঁড়া ছুধেরণায়, অতি কোমল, প্রথমে মুখেব কোণেব নিকট সঞ্চিত হয়, কিন্তু মুখগহবরেব সৰ্বত্রই সঞ্চিত হইতে পাবে । মুখমধ্যে অত্যন্ত বেদনা ও

অশুখ বোধ হয় মুখ উষ্ম ও শুষ্ক হয়, এবং প্রথমাবস্থায় লাল পৰিমাণে
 অঙ্গ হইয়া থাকে অনেক স্থলে পূৰ্ব্ব প্রকাশিত কোন পীড়া যথা,—জ্বর,
 থাইসিস্ ও অন্যান্য দৌৰ্বল্যকৰ পীড়াৰ সহিত ইহাকে দেখিতে পাওযু
 যায় বিশেষ বিশেষ প্রবল জ্বৰেৰ সহিত এই পীড়া হইতে ততদূৰ
 আশঙ্কা থাকে না, কিন্তু পুৰাতন পীড়াৰ সহিত হইলে সচবাচৰ উহা
 মৃত্যুৰ কাণ্ড হইয়া উঠে

৬। গ্যাংগ্রিন্সপ্রদাহ বা ক্যাক্সামেরিস্ নোমা —এই বোগ মচরাচব হয় না বটে,কিন্তু ইহা সকল প্রকার ক্ষত অপেক্ষা কঠিন। এই বোগ অতি গুপ্তভাবে আক্রমণ কবে প্রায়ই গালের অভ্যন্তর * প্রদেশে ইহাব সঞ্চাব হয় প্রথমে নির্দিষ্ট সীমায়ুক্ত কঠিন ক্ষীতি ও উহাব চতুর্দিকে ইডিম বেষ্টিত থাকে। ইহাব আবরণ এক প্রায়ই প্রস্রুত, চাকুচিক্যবিশিষ্ট, উষ্ণ ও লালবর্ণ, মধ্যস্থল উজ্জ্বল লাল, ক্রমে চাবিদিক ফিকে হইয়া আটমে, কখন কখন পাণ্ডুবর্ণ ও চিহ্নযুক্ত হয় প্রথমাবস্থায় মিউমেটস্ লালবর্ণ হয়, কিন্তু শীঘ্রই বিবর্ণ ও গ্যাংগ্রিন্স হইয়া থাকে, এবং প্রায়ই উহাব উপর ভেসিকেল হইতে দেখা যায় তৎপবে যে ক্ষুদ্র ও বিষম ক্ষত বাহিব হয়,তাঁহাব পার্শ্বদেশ বন্ধুর ও ঈষৎ নীল বা লালবর্ণ এবং মধ্যস্থল ক্ষয়যুক্ত হয় তাঁহা সত্ত্বব বিস্তৃত হইতে থাকে, ক্রমে সমুদায় গাল ও প্রায় সমস্ত মুখমণ্ডলে প্রসাবিত হইতে পাবে কিন্তু যদি এই ধ্বংসক্রিয়া থামিয়া যায়,তবে ঐ স্থান পরিকৃত ও গ্রানুলেশনযুক্ত হয় ও ক্ষত ক্রমশঃ শুকাইয়া যায় গ্যাংগ্রিন যে সর্বত্র এইরূপে প্রসাবিত হইয়া থাকে এমন কিছু নয়, ইহা দ্বাবা কেবল গালে ছিদ্ৰ হয়, এবং অবশেষে তাঁহা বুজিয়া যাইতে পাবে, অথবা পার্শ্বস্থ চিহ্নতে রক্তসঞ্চাব এবং উহা ক্ষীত ও কঠিন হইতেও পাবে

এই বোগে বেদনা ও স্পর্শস্থিভবশক্তিৰ অস্পতা অথবা এককালে
অভাব হইতে পাবে। ইহাই এই বোগের বিশেষ লক্ষণ মুখ হইতে
অতীব দুৰ্গন্ধময় লাল প্রচুব পাবিমাণে নির্গত হয় উহাৰ সহিত
পুঁথ ও রক্ত-মিশ্রিত থাকে নিশ্বাসবায়ু অত্যন্ত দুৰ্গন্ধযুক্ত হয়,
সচৰাচৰ জ্বৰ দেখা যায় না, ত্বক শীতল থাকে, এবং কিছুদিন পর্যন্ত

বোগীর আহারে আশ্রয় থাকে পীড়া ক্রমঃ বৃদ্ধি হইলে বোগী দুর্বল হয়, অবশেষে নিতান্ত তেজহীন হয় এই অবস্থায় নাড়ীও বাহীন হয় বোগী শেষাবস্থা পর্যন্ত আহার করিতে পাবে এবং বলবতী তৃষ্ণা জন্মে উদবাসয় হইতে পাবে যত্ন হইবাব পূর্বে বোগী প্রায়ই প্রলাপ বকে ও নিদ্রাবল্য হয় পাইগিয়া বা য়াঙ্গিনিয়া দ্বারা এই বোগে যত্ন হইয়া থাকে

৭। মার্কিউরিয়েল মুখপ্রদাহ।—অতিবিক্ত পারদ সেবন করিলে প্রথমে দন্তমাতী লাল ও ক্ষীণ হয় উহাতে বেদনা থাকে ও উহা দিয়া বক্তব্য ব হয় মুখে এক প্রকার বিশেষ ধাতুৰ আশ্রয় বোধ হয় লালার পবিমান বৃদ্ধি ও নিশ্বাসে এক প্রকার দুর্গন্ধ হইয়া থাকে পবে দন্তের পার্শ্ব হইতে ক্ষত হইতে আবন্ত হয় ও দন্তমাতী শিথিল হইতে থাকে মুখগহবর ও জিহ্বাতে বিস্তৃত প্রদাহ ও ক্ষত হইতে পাবে পৃথোৎপত্তি এবং গ্যাংগ্রিও হইতে দেখা যায় প্রভুতপরিমাণে লালার আব হইতে থাকে ও উহার সহিত নানা প্রকার রৌদ মিশ্রিত থাকে। লালপ্রতি, লিথক ও অ নির্মাণ বেদনায়ু ও ক্ষীণ হয় তাহার সহিত মুখমণ্ডলে বেদন প্রথঃ করণ করিতে ও কথা কহিতে কষ্ট হয়

পুৰাতন দৌৰ্বল্যায়ু পীড়ার সহিত হ্যাস্ উপস্থিত হইলে রোগী প্রায়ই আবেগালাভে সমর্থ হয় না, শীঘ্রই তাহার যত্ন উপস্থিত হয়

চিকিৎসা —পথ্যবিষয়ে, বিশেষতঃ শৈশবাবস্থায় বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে যাহাতে শিশু অতিবিক্ত পান না কবে তাহার যত্ন লইবে মাতার স্নানস্থাব প্রতি দৃষ্টি রাখিবে স্তনের চুচুক যাহাতে পবিত্র থাকে সে পক্ষে মনোযোগী হইবে জননী বা শিশু কোনমতে উত্তেজক দ্রব্য ভক্ষণ না কবে যাহাতে পাকযন্ত্রের ক্রিয়া ক্ষুদ্র অবস্থায় থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবে বিরেচকের আবশ্যক হইলে এবং তৈল, রবার্ব ব ম্যাগ্নেশিয়া ব্যবহার করিবে। অগ্ননাশক ঔষধ, বিশেষতঃ দুগ্ধ সহিত চুণের জল, কার্বনেট অফ সোডা, ম্যাগ্নেশিয়া ও ফুলথড় দেওয়া কর্তব্য

ক্ষত স্থানে অধিক মিউকস থাকিলে কার্বনেট অফ সোড বা ক্লোরিট

স্যানিটেশ্যনিক জিহ্ব ও মুখবোগ চিকিৎসা । ৪০১

অফ পটাশের সলিউশন দ্বারা মুখ ধৌত কবাইবে অধিক উত্তেজনা থাকিলে মিউসিলেজ প্রভৃতি সামগ্রী দ্বারা মুখ ধৌত কবিতো উপদেশ দিবে দুর্গন্ধ নিবারণ জন্য কণ্ডিব সলিউশন্ ব্যবহার কবিলে ইহার পৰ ফট্‌কিবি প্রভৃতি সংকোচক ঔষধ দেওয়া বিশেষ অবস্থানিশেষে নাইটেট্‌ অফ সিল্ভারের বাতি অথবা উহার নোশন ব্যবহার করা যায়

সল্‌ফাইড অফ সোড ১ ড্রাম ।

পবিত্র জল ১ জাং ।

উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে তাহা দ্বারা ক্ষত ধৌত কবিলে

নির্জল নাইট্রিক স্যানিড অথবা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্বারা বিগলিত স্থান ধুস কবিয়া দেওয়া কর্তব্য নোধ হয় বাহির দিকে পল্‌টিস্‌ও দেওয়া যাইতে পারে তদ্বারা শেদনাব শান্তি হয় এৱং বোগী আপনাকে অস্থ বোধ কবে

বিস্তৃত ক্ষত থাকিলে টিং ফেবিমিউবিয়োটিস্‌ ও ক্রে বেষ্ট অফ পট শ ও পুষ্টিকর পণ্যের ব্যবস্থা কবিতো হইবে অর্গেনিক ব্যবহারেও অনেক স্থলে উপকর লাভ হয়

পথ্য মাংসের যুগ, কোন প্রকার মদ্য, প্রাণি, স্যামোনিয়া, বার্ক, কুইনাইন, লেইছ ব্যতীত প্রস্তুত চিকিৎসা হইতে বঞ্চিত ন বলা দেও অপ্রাপ্তি হয় ন সবদেওব গায় কোবেট অফ পট শের সলিউশনও খাওয়ান যাইতে পারে

লালাগ্রন্থির পীড় —এই বেগ স্পর্শসংক্রামক । যৌবনাবস্থার পবে এই পীড়া প্রায়ই হয় ন স্ত্রীলোক অপেক্ষ পুরুষের অধিক হইয়া থাকে

লক্ষণ । দুই হইতে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত ইহা ওষ্ঠ অবস্থায় থাকে ।

স্থানিক লক্ষণ সমুদায় প্রকাশিত হইবার ২-১ দিন পূর্বে জ্বর হয় জ্বরের সঙ্গেই কর্ণমূলগ্রন্থিতে বেদনা হইয়া থাকে । জ্বর প্রায় পীড়ার শেষাবস্থা পর্যন্ত থাকে কিন্তু অনেক স্থলে বোগের লক্ষণ সকল অপ্রকাশিত হইলেই জ্বরের বিনাম হয় কর্ণমূলের ক্ষীতি গলা পর্যন্ত

বিজৃত হয়, টিপিানে স্থিতিস্থাপক বলিয় বোধ হয় মধ্যস্থল যেকপ দৃঢ় হয়, চাবিদিক মেকপ হয় না আক্রান্ত স্থানে বেদনা, অমুখ ও টানবোধ হয় মুখবান্দান, চর্ষণ ও কোন জিনিষ গলাধঃকরণ কবিত্তে বেদনাব বৃদ্ধি হয় মধো মধো লাল নিসৃত হইতে থাকে কখন কখন বোগী বধিব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিবসেই ক্ষীতি বৃদ্ধিতে এবং ২-৩ দিন পাবেই অদৃশ্য হয়

চিকিৎসা। অনেক স্থলে এই বোগের চিকিৎসার প্রয়োজন কবে না পীড়া কঠিন হইলে অন্যান্য চিকিৎসা কবিত্তে হইবে চিকিৎসার আবশ্যেই কোষ্ঠ পরিষ্কার বাখিবাব চেষ্টা কবিলে লবণাঙ্ক ঔষধ দ্বারা তৃক ও মুত্রপিণ্ডেব ক্রিয়া বৃদ্ধিব উপায় কবিত্তে হইবে পীড়া শান্তি হইবাব সময়ে কু নাইন প্রয়োগ কবিলে দুগ্ধ, বিফ্টি ও ভূতি অব অব্য আহাব কবিত্তে দিলে স্থানিক প্রক্রিয়াব মধ্যে ফোমেণ্টেশন্ ব্যবহার কবিলে বেণ্ডেডোনার পলস্ত্রাবা অথবা উহাব একুইফ্রাণ্টেব গ্লিসেরিন মিশাইয়া প্রয়োগ কবিলে আবশ্যক মত জলেকা বসান যাইতে পাবে পুঁয়োৎপন্ন হইলে গ্রন্থি বিদীর্ণ কবিয়া দিলে কাঠিচ্য দূর কবিবাব জন্য টীং আইওডাইন ব্যবস্থা কবিলে

লাক্ষণিক প্যারটাইটিস্ ।—কোন কোন প্রবল পীড়ার উপ-
গর্গকপে প্যারাইটিও গ্রন্থিব প্রদাহ হয়

লাক্ষণে। পায়ানস্তায় লক্ষণাদি অতি স্মার্ট এবং গ্রন্থিপ্রদাহ অগ্রে অগ্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে গ্রন্থি মধ্যে পুঁয় জন্মিলে উহাব আববক এক লালবর্ণ এবং কোন না কোন স্থান উন্নত হয় এবং উহাতে ফ্লাকুয়েশন্ বোধ কবিত্তে পার্শ্বায়া বাহ্য দিক দিয়া পুঁয় নির্গত না হইলে কণ, ফেলিস, মুখগব্বন, গ্রন্থিবর অগ্রেভাগ, এবং বক্ষঃস্থল দিগেও বাহিব হইতে পাবে নিস্তেজকতা তিন্ন আব কোন দৈহিক লক্ষণ দেখিত্তে পাওয়া যায় না ।

চিকিৎসা . পুথটিস্ ও ফোমেণ্টেশন্ দ্বারা বিশেষ উপকার লাভ হয় । পুঁয় জন্মিলে চিবিয়া দিয় বলকব ও উহা ঔষধেব সহিত পুষ্টিকব খাদ্য দিলে

স্যালাইভেসন্ বা লালানিঃসরণ নানা কাবনে মুখ
হইতে অতিবিক্ত মাত্রায় লালানিসৃত হইয়া থাকে এই লালানিঃ অবস্থা
সুস্থাবস্থায় নহে

চিকিৎসা — ইহাব প্রকৃত কাবন অনুসন্ধান করিয়া চিকিৎসা
কবিলেই সঙ্গর শুধবাইয়া যায় ফট্‌কিবি, ট্যানিক য়াশিড, ক্ষদিব
প্রভৃতি ঔষধেব স্থানিক ব্যবহাব দ্বারা বোগোপশম হইয়া থাকে ।
ইহাতে আবোগ্য না হইলে অহিফেন দ্বারা বিশেষ উপকাব দর্শে ;
অথবা নিম্নেব লিখিত ঔষধ ব্যবহাব কবিতে দিবে

ক্লোবেট অফ পাটাস ১০ গ্রেন

ডিক্লান্‌ সিক্সোনা ১ আং ।

এক মাএা আবশ্যকমত প্রয়োগ করিবে ।

বৈদ্যকে মুখরোগ চিকিৎসা ।

মুখরোগেব কারণ — আনুপ মাংস, ক্ষীব, দধি ও মৎস্যাদি
অপবিমিত ভোজন কবিলে বায়ু, পিও, কফ কুপিত হইয়া মুখরোগ
জন্মায় মুখবোগ অনেক প্রকার, ক্রমে তাহা লিখিত হইতেছে ।

বাতজ ওষ্ঠরোগেব লক্ষণ — ইহাতে ওষ্ঠ কক্‌শ, পকয
অর্থাৎ খবখবা, শুক ও বিদীর্ণ হয় এতদ্ভিন্ন ওষ্ঠে নানা প্রকাব বেদনা
হয়

পিওজ ওষ্ঠরোগেব লক্ষণ — ইহাতে ওষ্ঠেব চতুর্দিকে
পীতবর্ণ পীড়কা অর্থাৎ ফুস্কুড়ি জন্মে এবং তাহাতে জ্বালা ও বেদনা হয়,
পীড়কা পাকিয়া থাকে

কফজ ওষ্ঠরোগেব লক্ষণ — ইহাতে ওষ্ঠ পিচ্ছিল, শীতল,
ভাব ও বেদনামুক্ত হয় ও ওষ্ঠেব বর্ণবিশিষ্ট পীড়কা দ্বাবা ব্যাণ্ড হয় ।

ত্রিদোষজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ — ইহাতে ওষ্ঠ কখন কখন শুষ্ক, কখন পীতবর্ণ ও কখন। শ্বেতবর্ণ হয়, ওষ্ঠে নানাবর্ণবিশিষ্ট বহুমণ্ড্যক পীড়ন জন্মে

রক্তজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ । — ইহাতে শর্করুবেব বর্ণেব শ্রায় বর্ণবিশিষ্ট পীড়না জন্মে এবং তাহা পীড়ন করিবে বক্ত্র্যাব হয় অধিকন্তু ওষ্ঠেব বক্ত্র্য দ্বিত ও ওষ্ঠ বক্ত্র্য বর্ণ হয়

মাংসজ ওষ্ঠের রোগের লক্ষণ — ইহাতে ওষ্ঠ ভাব, স্থূল ও মাংসপিণ্ডের স্থায় উন্নত হয় মথেন মধ্য হইতে ওষ্ঠদ্বয়প্রান্তে কীট জন্মে

মেদজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ — ইহাতে ওষ্ঠ ভাব ও স্বভাব উপবিভাগেব শ্রায় ক্ষয় হয়, ওষ্ঠ হইতে অধিক পবিমানে ক্ষটিকেব শ্রায় পবিক্ষান জন্মান হয়, ইহাতে ১৩ হয়, ইহাতে মেদ উৎপন্ন হয়, তাহ জাব শুষ্ক হয় না এবং উহাব কোমলতাও জন্মে ন

অভিযাত্তজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ । — ওষ্ঠে কোন কোন আঘাত লাগিলে যে ওষ্ঠ রোগ উৎপন্ন হয়, সেই রোগে ওষ্ঠ বিদীর্ণ হইবা থাকে পবন্তু এই রোগে কক্ষ, বক্ত্র্য ও বায়ুব সংশ্লব থাকে

চিকিৎসা — ছ তিম ডাল, বেণ ব মূল, পটোলপত্র, মুখ, কটুকী, ষষ্টিমধু মে দাণ্ড মূল, বক্ত্র্যচন্দন, এই সমুদয়েব কাথ পান করিবে ইহা নাম 'সমুদাদি' "

পটোলাদি । — পটোলপত্র, শুকী, ত্রিফলা, রাখাল মূল ব মূল, খাল ডুম্বল, কটুকী, হবিজা, দাকহরিজা, গুলঞ্চ, এই সমস্ত জব্যেব কাথ পান ব মুখে ধারণ করিলে মুখরোগ নষ্ট হয়

ত্রিফলা, জাকনাডি, জাকনা, জাতীপত্র ইহাদের কাথ পান করিলে বা ত্রিফলা স্তফণ করিবে

পিপ্পলী, জীবা, কুড়, ইন্দ্রয়ন, এই সমস্ত জব্য ৩ দিবস চর্ষণ করিবে ।

কাণাদির দাবা মুখ দক্ষ হইলে ত্রিফল কাথ, নীলোদ্ভিপলেনব কাথ, হাত, চিনি বা মধুকৃত কাথ ২ গুব ধারণ করিবে

চণ্ডাণ্ড গেল যুগে দ হইবে তেবেব চার্জিব গঠন করিবে

মুখ, কুড, এলাইচ, যষ্টিমধু, এলবালুকা, এই সমুদায় চৰ্ব্বণে মুখেব পুতিগন্ধ, জ্বাপান ও বস্মন ভক্ষণ জন্য দৌর্গন্ধ দুব হয়

শীতাদ রোগের লক্ষণ অভিঘাতাদি কাৰণ ব্যতীত কখন কখন অকস্মাৎ দন্তবন্ধন মাংস হইতে বক্ত্রাব হয়, দন্তবন্ধন মাংস ক্রমবর্ণ, দুর্গন্ধ, ক্লেশযুক্ত, শীর্ণ ও মৃদু হয় এবং ইহা পাণ্ডিষা উঠে এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত বোগীকে শীতাদ কহে ইহা বক্ত্র ও কফ কর্তৃক উৎপন্ন হইয়া থাকে

দন্তপঞ্জুরের লক্ষণ । কফ ও বক্ত্র দুইটী অথবা তিনটী দন্তেব মূলে শোথ জন্মায়

দন্তবেষ্টির লক্ষণ যে বোগে দন্তমূল হইতে পুষ্ণ ও বক্ত্র ভ্রাব হয় এবং দন্ত সচল হয়, সেই বোগেব নাম দন্তবেষ্টি বক্ত্র দূষিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন কবে

শৈশিশের লক্ষণ । দূষিত কফ ও বক্ত্র দন্তমূলে যে বেদনামুক্ত শোথ উৎপাদন কবে, এবং ঐ শোথ হইতে লাল্য অর্থাৎ বসজ্রাব হয়

মহা শৈশিশের লক্ষণ । যে বোগে দন্ত সকল সঞ্চালিত হয় এবং দন্ত, ওষ্ঠ ও তালু বিদীর্ণ হইয়া থাকে, তাহাকে মহাশৈশিশ বলে । ইহা বায়ু ও কফকর্তৃক উৎপন্ন হয় ।

পরিদরের লক্ষণ ।—যে বোগে দন্তমূলের মাংস সকল শীর্ণ ও দন্তমূল হইতে বক্ত্রভ্রাব হয়, তাহাকে পরিদর কহে ইহা কফ, রক্ত, পিত্ত হইতে উৎপন্ন হয়

উপকুশের লক্ষণ ।—ইহাতে দন্তের বন্ধনমাংস পাকে এবং জ্বালা কবে, দন্ত সঞ্চালিত হয় ইহা রক্ত, পিত্ত কর্তৃক উৎপন্ন হয় ।

বৈদর্ভের লক্ষণ ।—ইহাতে দন্তেব মাংসবন্ধনে কোন প্রকাৰ আঘাত লাগিলে দন্তমূলে অত্যন্ত শোথ বা জ্বালা হয়, ইহা পাকে ও দন্ত সঞ্চালিত হয়

খলিবন্ধনের লক্ষণ ।—বায়ুকর্তৃক এক দন্তমূল হইতে আব এক দন্ত উৎপন্ন হয় । ইহা উঠিবার সময় অত্যন্ত বেদনা জন্মে, কিন্তু দন্ত উঠিলে আব বেদনা থাকেনা

করাল দন্তের লক্ষণ ।—বায়ু, পিত্ত ও হইয়া দন্ত আশ্রয় করতঃ দণ্ডসকলকে অসমান ও বিকটাকার কবিয়া থাকে, তাহা নাম করাল । এই রোগেব শাস্তি হয় না ।

অধিমাংসেব লক্ষণ —কফ হ্রুগ্ধবেব শেষ দন্তমূলে অর্থাৎ কসেব শেষ দন্তমূলে একতর বেদনায়ুক্ত শোথ জন্মায় এবং ইহা হইতে লালান্দ্রাব হইতে থাকে, পবন্তু দন্তমূলে বায়ু, পিত্ত, কফ, ত্রিদোষজ এবং আগন্তুক, এই পাঁচ প্রাকার নালী অর্থাৎ শোথ জন্মে এই নালীব লক্ষণ পূর্বেও বায়ু, পিত্ত, কফ ও ত্রিদোষজ এবং আগন্তুক নাড়ীত্রণেব লক্ষণের তুল্য হইয়া থাকে

চিকিৎসা —খদির ১২ ০ সেব, জল ৬৪ সেব, শেষ ৮ সেব এই কাথে জয়ত্রী, কপূর্ব, সুপাবী, বাবলা পত্র, জায়ফল, মিলিত ২ সেব প্রক্ষেপ ও যথাবিধি পাকি সমাপন কবিয়া গুডিকা প্রস্তুত কবিবে ইহাব নাম “খদিব বটিকা ”

দশম সংস্কার চূর্ণ ।—শুষ্ঠি, হবীতকী, মুখা, খদিব, কপূর্ব, গুণাক ভস্ম, মবিচ, লবঙ্গ, গুড়ত্বক, প্রত্যেকে সমভাগ । সর্বসমান ফুল খড়ি চূর্ণ

সহকার বটী ।—আমছাল ১২ ০ সেব, জল ৬৪ সেব, শেষ ১৬ সেব নিগছাল ১২ ০ সেব, জল ৬৪ সেব, শেষ ১৬ সেব খদিব কাষ্ঠ ১২ ০ সেব, জল ৬৪ সেব, শেষ ১৬ সেব অশনছাল ১২ ০ সেব, জল ৬৪ সেব, শেষ ১৬ সেব এই চাবি কাথ একত্র করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে যথাসময়ে শ্বেতচন্দন, বালা, বক্তচন্দন, গেবিমাটী, লবঙ্গ, ধাই-ফুল, হবিজা, দাকহরিত্রা, লোধ, জায়ফল, শ্যামালতা, গুড়ত্বক, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, হবীতকী, আমলা, বহেড়া, বটের সুবি, মঞ্জিষ্ঠা, জটা-মাংগী, মুখা, বিটলবণ, শুষ্ঠী, পিপ্পলী, মবিচ, মোহ ও কপূর্ব প্রত্যেক ১ পল প্রক্ষেপ দিবে । নামাইয়া মটবেব ন্যায় গুডিকা প্রস্তুত কবিবে ।

দালনের লক্ষণ —দূষিত বায়ু দন্তে যে বিদীর্ণবৎ বেদনা জন্মায়, আয়ুর্কৈদিক পণ্ডিতেবা ইহাকে দ লন বলেন

ক্রিমিদন্তের লক্ষণ ।—দণ্ডে কখন কখন নৃয়াবর্ণ ছিদ্র জন্মে

এবং তজ্জন্ম দন্ত সঞ্চালিত হয় এবং দন্তমূলে অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত শোথ জন্মে এই শোথ হইতে জলশ্রাব হয়, এবং দন্তে বিনা কাবণে অর্থাৎ স্পর্শাদি কাবণ ব্যতীত বেদনা হইয়া থাকে

ভগ্ননকের লক্ষণ ।—ইহাতে বায়ু কুপিত হইয়া দন্ত ভগ্ন ও মুখ বক্র কবে

দন্তহর্ষের লক্ষণ ।—ইহাতে দন্ত শীতল ও কক্ষ্ম বায়ু এবং তন্ম জ্বোত্ব সংস্পর্শন সহ হয় না ইহা বায়ু ও পিত্ত কর্তৃক উৎপন্ন হয়

দন্তবিদ্রাবির লক্ষণ ।—যে বোঁগে দন্তমূলবন্ধন মাংসেব উভয় পৃষ্ঠে বেদনায়ুক্ত শোথ জন্মে এবং ঐ শোথ বিদীর্ণ হইলে উহা হইতে পুঁষ ও বক্তশ্রাব হয়, আৰ বিদীর্ণাবস্থায় উহা হইতে ময়লায়ুক্ত জলশ্রাব হয়, তাহাকে দন্তবিদ্রাবি কহে

• দন্তশর্করার লক্ষণ ।—যাহাতে দূষিত রসি কফ কর্তৃক দন্তস্থিত নল শুষ্ক হয়, তাহাব নাম দন্তশর্কবা

কাপালিকার লক্ষণ ।—যে বোঁগে কাপালাস্থিৰ ন্যায় কঠিন দান্তাবয়ব বিদীর্ণ হয়, তাহাব নাম কাপালিকা ইহাতে বাল্যকালাদি সর্ষাবস্থাতেই দন্তেব হানি জন্মাইয়া থাকে

* যাবদন্তের লক্ষণ ।—রক্ত এবং পিত্ত কর্তৃক দন্ত দূষিত হইলে দন্ত শ্যামবর্ণ, কৃষ্ণপীতবর্ণ অথবা নীলবর্ণ হয়

চিকিৎসা ।—তিল তৈল ৪ সেব ; কাথ জ্বা—বকুল ফল, লোধ, ছাউফ, নীলঝাঁটি, সৌদাল পত্র, বাবলাব ছাল, শাল বৃক্ষের ছাল, খদির কাষ্ঠ, অশন ছাল মিলিত ১২ ০ সেব, জল ৬৪ সেব, শ্বেষ ১৬ সেব । কল্ক জ্বা কাথ জ্বা সমস্ত মিলিত ১ সেব এই তৈল মুখে ধৃত বা নস্য-স্বরূপে গৃহীত হয় ইহাব নাম, 'বকুলাদ্য তৈল '

অরিমোদাদ্য তৈল ।—তিল তৈল ৮ সেব, কল্ক জ্বা—গুয়ে-বাবলাব ছাল ১২ ০ সেব, জল ৬৪ সেব, শ্বেষ ১৬ সেব কল্ক—মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, যষ্টিমধু, গুয়েবাবলাব ছাল, খদির কাষ্ঠ, কটুফল, লাক্ষা বটছাল, ছোট এলাইচ, কপূর্ব, অণ্ডক, পদ্মকাষ্ঠ, লবঙ্গ, কঁাকলা, জায়ফল নিফল, রক্তচন্দন, গেবিমাটি, গুড়ত্বক, নাগেশ্বর, ধাইফুল, প্রত্যেকে ২ তোলা

বাতজ জিহ্বাবোগের লক্ষণ — ইহাতে জিহ্বা চমৎ বিদীর্ণ, প্রাপ্ত অর্থাৎ বনগ্রাহ্যে তসমর্থ এবং কতক লক্ষণ স্বদেশে পদেব ন্যথ কটকযুক্ত হয়

পিণ্ডজ জিহ্বাবোগের লক্ষণ । — ইহাতে জিহ্বা বড়বর্ণ, দীর্ঘকটকনেষ্টিত এবং জিহ্বাতে জ্বালা হয়

কফজ জিহ্বাবোগের লক্ষণ — কফ কর্তৃক জিহ্বা অত্যন্ত ভদ্র ও শল্যবী কটক সদৃশ মাংসাদ্রুণ বেষ্টিত হয়

অল্যামের লক্ষণ — কফ ও বক্ত কর্তৃক জিহ্বা ততো অত্যন্ত রোগ-দায়ক শোথ উৎপন্ন হইয়া জিহ্বাকে স্তম্ভিত ও বদ্ধিত করে, এবং জিহ্বা মূঃ পাবিয়া থাকে

উপজিহ্বার লক্ষণ । — কফ ও বক্ত জিহ্বামূলে জিহ্বাব অগ্রভাগেব ন্যথ শোথ জন্মায় এই শোথ কণ্ডু ও জ্বাল, এবং উহা হইতে লাল স্রব হইয়া থাকে

চিকিৎসা । — গব্য সূত ৪ সেব ১ লতী, শল্যসিমা, নিদ্র, বাবলা, বাঁটা ও শাঃ, ইহাদেব পত্রাদি বস ও কাথ প্রত্যেক ৪ সেব; কল্ক জব্য শেতচন্দন, বেনাব মূল বক্তচন্দন চাঁপাছাল, তম্বা ছাল, বটছাল, নীলমূল, হবিয়া, দেবদারু, মৈন্ধব চবঃ, দাকহবিয়া, শুষ্ঠী, কুড়, পিপ্পলী, মিলিত ১ সেব । কণ ইকব তাম্রপাত্রে পাক করিবে ইহা গণ্ডু য ও পানার্থ ব্যবহায্য ইহাব নাম ‘মালত্যা দ্য সূত ’

জাতাদ্য তৈল — তিল তৈল ৪ সেব, জাতিপত্র বস, চোব-কাঁচকীর বস, বকুলছালেব কাথ প্রত্যেক ১৬ সেব কল্ক জব্য — খদির কঠ, আত্রকেশী, হবীতকী, আম্বলকী, বহেড়া, শুষ্ঠী, পিপ্পলী, মবিচ, চই, নীলোৎপল, কুড়, বর্টিমধু, হবিয়া, দাকহবিয়া, মুগা, বালা, লেংগ, মেটে মিন্দ্র, সর্গগেবি, বটেন সুবি ও লৌহ মিলিত ১ সেব, যথাবিধি পাক কার্য্য করিবে

গল্ল শুষ্ঠীব লক্ষণ । — কফ ও বক্ত কর্তৃক তালুমূলে বায়ুপূর্ণ চর্মপুটকসদৃশ দীর্ঘাক ব শোথ উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য বোগীব নিপাসা, ক ম ও শাগ জন্মে

তুণ্ডিকেরীর লক্ষণ ।—কফ ও রক্ত কর্তৃক তালুতে যে জ্বালা ও সূচীবিদ্ধবৎ বেদনায়ুক্ত ও ক্রতব শোথ জন্মে, এই শোথ তুণ্ডিকেবী মদুশা, অর্থাৎ কার্পাস ফলের আয় হয় বলিয়া ইহাকে তুণ্ডিকেবী বলে

অগ্রসের লক্ষণ । দুষিত বক্ত কর্তৃক তালুতে রক্তবর্ণ অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত ক্ষুদ্র শোথ হয়, তজ্জন্ত বোণীব জ্বব হইয়া থাকে ।

কচ্ছপের লক্ষণ ।—দুষিত কফ তালুতে বেদনাবিহীন শোথ জন্মায়; ইহা কচ্ছপেব আয় উন্নত হয় বলিয়া ইহাব নাম কচ্ছপ । উক্ত শোথ বহু বিলম্বে হ্রাসি প্রাপ্ত হয় ।

তালুর্কুদের লক্ষণ ।—দুষিত বক্ত তালুতে পদ্বকুড়িব আয় শোথ জন্মায়, তাহাতে পূর্বোক্ত বক্তর্কুদের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় বলিয়া তাহাব নাম তালুর্কুদ

মাংসসংঘাতের লক্ষণ ।—কুপিত কফ তালুব মাংস দুষিত করিয়া বেদনাবিহীন যে মাংসাক্কুব উৎপাদন কবে, তাহাকে মাংস-সংঘাত বলে ।

তালুপুপ্পুটের লক্ষণ ।—কফ ও মেদ কর্তৃক তালুদেশে বদবি অর্থাৎ কুলমদুশা বেদনাবিহীন ও স্থায়ী শোথ উৎপন্ন হয় ।

তালুশোষের লক্ষণ ।—বায়ুকর্তৃক তালু বিদীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া থাকে ইহাব নাম তালুশোষ ।

তালুপাকের লক্ষণ ।—পিও কর্তৃক তালু পাকিয়া থাকে

চিকিৎসা —পারা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, শিলাজতু ৪ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য গোমূত্র, আকন্দ পত্র বস, জাতিপত্রের বস, নিম্বপত্র-বস ও জলপিপ্পলীব বসে ৭ বার কবিয়া মাড়িয়া ৮ বতি প্রমাণ বটি প্রস্তুত করিবে ইহাব নাম “মুখবোণাহব বস ।”

সহাচর তৈল ।—নীলবাঁটি ১২ ০ সেব; জগ ৬৪ সেব, শেষ ১৬ সেব । তৈল ৪ সেব । কল্ক দ্রব্য—অনন্তমূল, খদিব কাষ্ঠ, ওয়েন-বাবলার ছাল, জাগছাল, যষ্টিমধু প্রত্যেক ৪ তোলা এই তৈল মুখে ধারণ করিবে ।

বোহিণী রোগের উপাধি ।—কুপিত পিত্ত এবং কফ, রক্ত ও

মাংসকে দূষিত কবিয়া গলদেশে অক্ষুব উৎপাদন করে, ঐ অক্ষুব গল-
নালীৰ ছিঁজ বোধ কবিয়া বোগীৰ প্রাণনাশ করে

বাতজ রোহিণীর লক্ষণ ।—ইহাতে সমস্ত জিহ্বায় বেদনা, গল-
মধ্যে মাংসাক্ষুবোৎপত্তি, এবং বাতজ মধ্যান্ত্র প্রভৃতি বলবান উপদ্রব
উপস্থিত হয়

পিত্তজ রোহিণীর লক্ষণ —ইহাতে গলদেশে মাংসাক্ষুব
জন্মিয়া পাকিয়া উঠে এবং বোগী প্রবল ভ্রবাক্রান্ত হয়

কফজ রোহিণীর লক্ষণ —ইহাতে দৃঢ় মাংসাক্ষুব জন্মিয়া
গলনালীৰ ছিঁজ বোধ করে ।

ত্রিদোষজ রোহিণীর লক্ষণ ।—ইহাতে গলদেশে মাংস-
ক্ষুবের মধ্যে পাকে এবং বাতজ, পিত্তজ, কফজ রোহিণীর লক্ষণ প্রকাশ
পায় ইহা কোনরূপে প্রশমিত না হইয়া অত্যুপ কাল মধ্যে রোগীর
প্রাণনাশ করে

রক্তজ রোহিণীর লক্ষণ —ইহাতে গলদেশে স্ফোটকযুক্ত
মাংসাক্ষুব উৎপন্ন হয় এবং পিত্তজ রোহিণীর লক্ষণ লক্ষিত হয় ইহা
চিকিৎসা দ্বারা প্রশমনীয়

কণ্ঠশালুকের লক্ষণ ।—কফ গলদেশের ভিতরে বদনী অর্থাৎ
কুলবীজেব সদৃশ কটকযুক্ত গ্রন্থি উৎপাদন করে ঐ গ্রন্থি কৰ্শ
ও স্থিৰ হয় এই বেগ শস্ত্রসাধ্য

অধিজিহ্বেব লক্ষণ —কফ ও বক্ত জিহ্বাব উপবে জিহ্বাব
অগ্রভাগ সদৃশ যে শোথ জন্মায়, ইহা পাকিলে কোন প্রকারেই রোগেব
উপশম হয় না

বলয়ের লক্ষণ —কফ গলমধ্যে বিস্তৃত ও উন্নত শোথ জন্মায় ;
এই শোথ হেতু বোগী আহারীয় বস্তু গিলিতে পাবে না এবং চিকিৎসা
দ্বারা কোন মতেই বলক্ষয় কবা যায় না, স্তবনাং ইহা অচিকিৎসনীয় ।

বলশৈব লক্ষণ কুপিত বায়ু ও কফ গলনালীতে শোথ জন্মায়,
ইহাতে বোগী মর্মচ্ছেদী বেদনা ভোগ কবে, এবং শ্বাসপ্রশ্বাসিত হইয়া
থাকে এই বোগ অত্যন্ত যন্ত্রণাপদ

একরূন্দের লক্ষণ ।—কফ ও রক্ত কর্তৃক গলনালীর মধ্যে গোলাকাব অথচ উন্নত ও ঈষৎ মুহু শোথ জন্মে এই শোথে কণ্ডু জন্মে ও জ্বালা কবে, শোথ থাকিয়া থাকে ।

রূন্দের লক্ষণ ।—বায়ু, পিত্ত ও রক্ত দূষিত হইয়া গলাব মধ্যে গোলাকাব উন্নত শোথ উৎপাদন কবে, ইহা বেদনা ও জ্বালা কবে । রোগীর প্রবল জ্বর উপস্থিত হয় ।

শতশ্লীর লক্ষণ ।—বায়ু, পিত্ত ও কফ কর্তৃক গলাব মধ্যে মাংসাক্রববেষ্টিত যে বর্তি উৎপন্ন হইয়া গলার ছিদ্র রোধ করে, ইহাতে নানা প্রকাব বেদনা অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও কফজ বেদনা, জ্বালা, কণ্ডু প্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে । শতশ্লী নামক অস্ত্রের ন্যায় হয় বলিয়া ইহাব নাম শতশ্লী হইয়াছে । ইহা অসাধ্য

শিলাযুর লক্ষণ ।—কফ ও বায়ুকর্তৃক গলনালীর মধ্যে যে দৃঢ় বেদনায়ুক্ত আমলকী বীজ সন্নিবিষ্ট জন্মে তাহাব নাম শিলায়ু গলনালীতে এই প্রকার গ্রন্থি থাকাতে বোগী মনে কবে যেন ভুক্ত জব্য গলার মধ্যেই সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে । ইহা শাস্ত্রসাধ্য ।

গলবিদ্রম্বিব লক্ষণ ।—বায়ু পিত্ত ও কফ কর্তৃক সমস্ত গলা ব্যাপিয়া যে শোথ উৎপন্ন হয়, ইহাতে নানা প্রকাব বেদনা অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও কফজ বেদন, জ্বালা ও কণ্ডু প্রভৃতি জন্মে এবং পূর্বেক্ত ত্রিদোষজ বিদ্রম্বিব লক্ষণ লক্ষিত হয়

গলোৎসের লক্ষণ ।—কফ ও রক্ত গলদেশে বৃহদাকাব শোথ উৎপাদন কবে ইহা গলনালীর ছিদ্র রোধ কবে, তজ্জন্য বোগী পান ভোজন কবিতে অসমর্থ হয়, অধিকন্তু শোথ অতি বৃহৎ হয় বলিয়া উদান বায়ুব গতি কষ্ট হয়, রোগীর প্রবল জ্বর হয়

স্বরহ্রস্বের লক্ষণ ।—ইহাতে রোগী মূর্ছিত হইয়া অন্ধকার দর্শন করিতে করিতে সর্বদা মজোবে নিশ্বাস ত্যাগ করে, ভক্ষ্য জব্য গিলিতে অসমর্থ হয় অপর বোগীর শব্দভঙ্গ, কণ্ঠ শুষ্ক, এবং কফ দ্বাবা বায়ু-প্রোত কষ্ট হয় এই বোগ বায়ু কর্তৃক উৎপন্ন হয় ।

মাংসতানের লক্ষণ ।—পিত্ত বায়ু কফ কর্তৃক গলাব মধ্যে বিস্তৃত

শোথ উৎপন্ন হয়, ইহা ক্রমে ক্রমে গলনালীৰ ছিদ্র রোধ কবিয়া রোগীৰ বড়ই ক্লেশ দেয়, এমন কি এত পর্য্যন্ত নাশ কবে ।

বিদারীৰ লক্ষণ ।—দুষিত পিত্ত গলনালীৰ মধ্যে ভাস্কবর্ণ, জ্বালা ও স্থচীবেধনবৎ বেদনায়ুক্ত বিদীর্ণমাংস ও দুৰ্গন্ধময় শোথ জন্মায় । মনুষ্য যে পার্শ্বে অধিক শয়ন কবে, সেই পার্শ্বেই প্রায় এই বোগ হয় ।

চিকিৎসা —পাৰা, গন্ধক, শিলাজতু, এবাল ও লৌহ প্রত্যেক ১ ভাগ, স্বর্ণ ০ সিকি ভাগ এই সমস্ত একত্র কবিয়া নিমছাল, অশানছাল ও চিতামুলের বসে ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া ২ বতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত কবিবে বহুবাব ছাল, ত্রিফলা বা অণ্ডকব কাথের সহিত প্রত্যহ প্রাতে একটী কবিয়া সেব্য ইহাৰ নাম “রসেন্দ্র বটী ।”

লাক্ষাদ্য তৈল —তিল তৈল ৪ সের, লাক্ষাবস ৪ সেব, দুধ ৪ সেব, খদিবের কাথ ১৬ সের কল্কদ্রব্য—লোধ, কটফল, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকেশব, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, উৎপল, ঈষ্টিমধু প্রত্যেক ১ পল এই তৈলের গাণ্ডু কবিবে

বাতজ সর্বসন্দের লক্ষণ ।—সমস্ত মুখমণ্ডলে যে ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহ কে সর্বসব কহে ইহা দুষিত বায়ুকর্জক মুখমণ্ডলে হইয়া থাকে

পিত্তজ সর্বসন্দের লক্ষণ । পিত্ত কুপিত হইয়া মুখমণ্ডলে যে রক্তবর্ণ বা পীতবর্ণ ফোটক উৎপাদন কবে, ইহাতে জ্বালা থাকে এবং ফোটক গুলি পরস্পর তফাৎ হইয়া উৎপন্ন হয়

কফজ সর্বসন্দের লক্ষণ ।—দুষিত কফ মুখমণ্ডলে বেদনামুখ্য এবং মুখের বর্ণ তুল্য ফোটক জন্মায়, ইহাতে কণ্ডু হইয়া থাকে

মুখরোগের অসাধ্য লক্ষণ ।—ত্রিদোষজ, মাংসজ, রক্তজ ও ঠ-বোগ অসাধ্য দন্তমূলবোগেব মধ্যে ত্রিদোষজ নালী ও ত্রিদোষজ মহা-শৈলিক অসাধ্য জিহ্বাবোগেব মধ্যে অণাস্ক, তালুবোগেব মধ্যে ভাস্কবর্জ, এবং কণ্ঠরোগেব মধ্যে স্ববল্ল, বলয়, বৃন্দ, বলাশ, বিদাবিকা, গলৌষ, মাংসতান, শতঙ্গী ও ত্রিদোষজ বোহিণী অসাধ্য ।

চিকিৎসা ।—খদিব ১২ ০ সেব, ওয়েবাবলারছাল ৩১০ সেব,

জল ২৫৬ সেব, শেষ ৬৪ সের এই কাথ ছাঁকিয়া পুনরায় পাকার্থ চড়াইবে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে ঘন হইলে এলাইচ, বেণামূল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বালা, অনন্তমূল, তমালছাল, মঞ্জিষ্ঠা, মুখা, লৌহ, যষ্টিমধু, ববাক্রান্তা, ত্রিফলা, বসোত, ধাইফুল, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, গেবিমার্জী, দাকহরিদ্রা, কটফল, চাকুন্দেবীজ, লোধ, বটেব সুবি, হুবালাভা, জটামাংসী, হরিদ্রা, রাস্না, অথবা কুন্দক, দাকচিনি, প্রত্যেকে ২ তোলা; কঁকলা, জায়ফল, জয়ত্রী, লবঙ্গ প্রত্যেকে ৮ তোলা চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে নীতল হইলে নামাইয়া কপূর্ব ০ সের মিশ্রিত করিয়া মটরপ্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে এই গুড়িকা মুখে ধারণ করিবে। ইহা নাম “বৃহৎ খদির বটী” .

মূর্চিযোগ ।—হবীতকী, মউবী, কুড় ও বালা এই সমুদায় দ্রব্য সমুভাগে লইয়া গোমুত্রে সিদ্ধ করিয়া প্রত্যহ সেবন করিবে ।

বাতিক সর্ষসব রোগে সৈন্ধব চূর্ণ দ্বারা প্রতিসারণ এবং বায়ুনাশক ঔষধের সহিত সিদ্ধ তৈলের কবল ও নস্য ব্যবস্থেয় .

পৈত্তিক সর্ষসব রোগে বিরেচনাদি দ্রব্য দেহ শুদ্ধন করিয়া মধু, নীতল প্রভৃতি পিত্তনাশক ক্রিয়া করিবে

কফজ সর্ষসবে প্রতিসারণ গণ্ডুষ ধূম প্রদান, সংশোধন ও কফন চিকিৎসা-ব্যবস্থেয়

জাতীপত্র, গুলঞ্চ, জাম্বা, জাকনাডি, দাকহরিদ্রা, ত্রিফলা এই সমুদায়ের নীতল কাথ ও মধুসংযুক্ত করিয়া গণ্ডুষ ধারণ করিবে ।

ঘনীভূত দাকহরিদ্রা কাথ মধুর সহিত লেহন করিবে ।

হোমিওপ্যাথিকে মুখরোগাদি চিকিৎসা ।

ক্যাংকর । দন্তমাজী কিম্বা গালের ভিতর ছোট-ছোট ক্ষত হয় এই রোগ প্রায় অজীর্ণ জন্মই হইয়া থাকে

চিকিৎসা — বাত্রে শয়ন কবিবার সময় “ম্যাকোনাইট”, তৎপরে বাত্রে এবং প্রাতে “মাকুরিয়াস” প্রয়োগ কবিবে

সল্ফাইট অফ সোডা জলে মুখ ধৌত কবিত্তে দিবে ।

মুখ এবং দন্তমাজীর ক্যাংকর । দন্তমাজী উষ্ণ, ক্ষীত, স্পঞ্জের ন্যায়, দন্ত এবং মুখ হইতে বক্তমিশ্রিত লালান্নাব, দৌৰ্ব্বল্য, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়

চিকিৎসা ।—“হাইড্রাস্টিস্”, “ব্যাণ্টিসিয়া” কিম্বা “আর্শেনিক” বাত্রি এবং প্রাতে সেবন কবিত্তে দিবে এইরূপে সপ্তাহকাল চিকিৎসা কবিবে “হাইড্রাস্টিস্” জলে মুখ ধৌত কবিত্তে হইবে পানার্থ লেমন এবং লাইমজুস্ ব্যবস্থা কবিবে পথ্য—ফ্রুইট বিফ্টি, দুগ্ধ এবং সেডাওয়াটার

ক্যাংক্রাম ওরিস ।—গিলগিলার পবে প্রত্যেক শিশুর নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, ক্লেশযুক্ত লাল, অত্যন্ত দৌৰ্ব্বল্য, অস্থিৰতা, একদিকের গাওস্থল ক্ষীত দেখিতে পাওয়া যায় এইরূপ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইলে গালের ভিতর দিক বিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা কবিবে ।

চিকিৎসা ।—এরূপ পরীক্ষায় যদি সম্ভবতঃ দগ্ধ গালের ভিতর দেখা যায়, তাহা হইলে প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর “সিউবিয়েটিক য়াশিড” উহাতে প্রয়োগ কবিবে । ৫ ড্রাম জলে ৩ ড্রাম ডাইলিউড য়াশিড মিশ্রিত করিয়া ধৌত করিত্তে দিবে

সেবন জন্ম উক্ত য়াশিডেব ও বিন্দু এক ঘণ্টায় এবং পর ঘণ্টায় “ব্যাণ্টিসিয়া” প্রয়োগ কবিবে বার ঘণ্টা পবে যদি রোগীর অবস্থা মন্দ

দেখ, তবে প্রতি অর্ধ ঘণ্টা অন্তর “আর্শেনিক” ব্যবহার করিবে এবং উক্ত যাসিডের প্রয়োগ চলিতে থাকিবে ।

ঔষধ সেবনের মধ্যে মধ্যে স্ট্রিং বিফ্টি খাইতে দিবে । ইহাতে বোগীর বল রক্ষা হইবে ।

নার্সিংসোর মাউথ ।—যে সকল স্ত্রীলোক দীর্ঘকাল শিশু-দিগকে স্তন পান করান, তাঁহাদিগের জিহ্বায় ক্ষত ও মুখের প্রদাহ হইতে দেখা যায় । ওজ্জ্বল তবল এবং কৌমল্য দ্রব্য ব্যতীত অল্প দ্রব্য ভক্ষণে সামর্থ্য থাকে না ।

চিকিৎসা ।—শিশুর স্তনপান বন্ধ করিতে হইবে, এবং দিবসে তিনবার “হাইড্রোফীস্” ব্যবস্থা করিবে, আর উহার সলিউশন্স ক্ষত-স্থানে দিবে । তৎপরে “চায়না” কিম্বা “আর্শেনিক” খাওয়াইবে । খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে দিতে হইবে, কিন্তু উত্তেজক খাদ্য কোন মতে দেওয়া যাইতে পারে না ।

থ্রাস্ ।—যদিও এই পীড়া বালকদিগেবই অধিক হইয়া থাকে, কিন্তু বয়োরদ্ধদিগেবও হইতে দেখা যায় । জ্বর, ক্ষয়কাশ, ক্যান্সার প্রভৃতি ক্ষয়বোগেব শেষাবস্থায় হইতে দেখা যায় । ইহা অতিরিক্ত দৌর্বল্যেব চিহ্ন । এই বোগে সাদা দাগ অথবা দহিব তালিব ছায়া জিহ্বার উপর, গালের ভিতর এবং গলায় দৃষ্টিগোচর হয় ।

চিকিৎসা ।—ইহা উপস্থিত হইবা মাত্র উগ্র “বোব্যাক্স লোসনে” ধৌত করিতে হইবে । বালকেব হইলে “আর্শেনিক” ও তৎপশ্চাৎ “ক্যাংমোমিলার” আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিবে ।

খাদ্য সর্বতোভাবে পরিবর্তিত করিতে হইবে, এবং যে পাত্রে দুগ্ধাদি প্লেয় দ্রব্য দেওয়া হয়, তাহা খুব পরিষ্কার রাখা কর্তব্য ।

দন্তমাড়ীর স্ফোটক —গালের অভ্যন্তরে শৈত্য লাগিলে উপরেব দন্তমূলে এই স্ফোটক বা ফোড়া জন্মে, কিম্বা উপর অথবা নিম্নেব মাড়ী পুৰাতন ভগ্ন দন্তমূলেব উত্তেজনা ও উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—পর্যায়ক্রমে দুই ঘণ্টা অথবা “বেলেডোনা” এবং “ছিপার” প্রয়োগ করিবে । দন্তমাড়ী উত্তমরূপে বিদীর্ণ করিয়া দিবে ।

অনেক সময় একপ হয় যে, কিছুতেই পীড়া শান্তি হয় ন। একপ হইলে ভগ্নদন্তমূলের অবশিষ্টাংশ বাহিব করিয়া দিলে বোগী স্বাস্থ্যলাভ করে ।

মুখক্ষীতি ।—দন্ত অথবা দন্তমাড়ীতে শৈত্য লাগিলে এই পীড়া হয় ইহা আকাবে অভ্যন্ত বড় এবং যন্ত্রণাদায়ক হইয়া থাকে

চিকিৎসা ।—গরম জলে সর্ষদাই ধোত করিবে । প্রতিবার ধোত করিবার পরে ক্ল'নেক দিয়া তাহ'র উপ'র নেকড়া জড়াইয়া রাখিবে

প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর “বেলেডোনা” ও “মাকু'রিয়াস্” পর্যায়ক্রমে দিবে যদি ক্ষীত স্থান উজ্জ্বল হয়, তবে “ম্যাপিস্” ব্যবহার করিবে

হাকিনীমতে মুখরোগাদি চিকিৎসা ।

নানা কাবণে মুখের ভিতর ও ওষ্ঠে ক্ষত হইতে দেখা যায়, উহা দীর্ঘ শুষ্ক হয় না । অধিক দিন এই পীড়া অচিকিৎসিত থাকিলে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া সাংঘাতিক হইয়া উঠে

চিকিৎসা ।—রোগ আবৃত্ত হইলেই অর্ধ ছটাক ভেরেণ্ডার তৈল খাইতে দিবে কোষ্ঠ পবিত্কার হইলে নিম্নাক্ত জনে মুখ ও ক্ষত ধোত করিবে দিবে

ফটুকিবি ০ তোলা ।

পাপড়ি ক্ষয়ের ১০ তোলা ।

জল ১ পোয়া ।

একত্র মিজিত করিয়া উত্তমরূপে কুল্লি করিতে উপদেশ দিবে ।

ঘৃত ১ পোয়া ।

ত্রিশিবা মনসার শস্য ২ তোলা ।

বন-নীলের রস ১ ছটাক

উত্তমরূপে পাক করিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইবে ।

বিংশ অধ্যায় ।

স্যানোপ্যারিকে দন্তরোগে চিকিৎসা ।

দন্তের গ্যাংগ্রিন, পাল্পের প্রদাহ, ক্যাক্সের নিক্রেমিস্, এবং নিউ র্যাল্জিয়া হইতে দন্তের পীড়া জন্মিয়া থাকে

১ । দন্তে গ্যাংগ্রিন হইতে দন্তরোগ ।—অজীর্ণাদি রোগ, পাবন ব্যবহার, স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় দন্তমাড়ি শিথিল হইয়া হয় ।

চিকিৎসা ।—ক্ষত উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিতে হইবে, পাচা মাংস না থা কিতে পাবে এমন ব্যবস্থা করিবে পিচ্কাবী দিয়া ভাল করিয়া গরম জলে ধৌত করিয়া, রক্তপ্রাব নিবারণ জন্য কটন উলে ক্রিয়ামোট রাখাইয়া ক্ষত স্থানে বসাইয়া দিবে কিন্তু সান্দ্রপান, যেন ক্রিয়ামোট লালার সহিত উদরস্থ না হয়, তাহা হইলে প্রাণনাশের সম্ভাবনা পারক্লোরাইড অফ আয়রন অথবা ট্যানিক অ্যাসিডের সলিউশন দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে

২ পাল্পের প্রদাহ জন্য দন্তরোগ —পাল্প অনারত হইলেই তরল পানীয় অব্যবশীত বা উষ্ণতা জন্য প্রদাহ জন্মে

চিকিৎসা ।—গরম জলে বাইকার্বনেট অফ সোডা মিশ্রিত করিয়া ক্ষত ধৌত করিবে । তাহার পবে কটন উলে ক্রিয়ামোট, ক্লোরোফর্ম, লবঙ্গের তৈল, টীং ফর কোনাইট, ক্যাজুপট্ অয়েল, তাপিগ তৈলে কপূর্ব, কিম্বা ট্যানিক অ্যাসিড ও ইথাং ভিজাইয়া ক্ষত স্থানে দিবে । ইহাদের এক একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ

৩ । ক্যাক্সের নিক্রেমিস্ জন্য দন্তরোগ ।—ক্যাক্স এবং ভগদন্তের মূলাবশিষ্ট প্রদাহযুক্ত হয় পুনঃ পুনঃ তাহাতে বেদনা ও ক্ষত হইয়া এই পীড়া উপস্থিত হয়

চিকিৎসা ।—ভগদন্তের মূলাবশিষ্ট উৎপাটিত করিয়া দিলেই উপ-

কাব হইয় থাকে কার্বলিক য়াশিড এবং নাইট্রেট অফ গিল্ড বেন লোশন প্রযোগেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ।

৪ নিউরেল্জিয়া জন্য দন্তরোগ ।—দীর্ঘকাল পীড় ভোগ, অন্তঃস্থ অবস্থায় এবং বাতজন্য পীড়ায় এই ব্যাধি হইয় থাকে

চিকিৎসা।—কলচিসক, য়াকোনাইট, আইওডাইড অফ পটাশিয়ম প্রভৃতি ঔষধ প্রযোগে পীড়া শাস্তি হয় কুইনাইন ইহাও অন্যতম ঔষধ ।

বৈদ্যকে দন্তরোগ চিকিৎসা ।

এই বোগে দন্তমূল ক্ষীত ও বেদনায়ুক্ত হয়, কনকন কবে, কখন কখন জ্বালা করে ও অসহ্য যাতনায়ুক্ত হয় । বোগী মুখব্যাদানে কষ্ট বোধ কবে, কিছু খাইতে চাহেনা, যেন সর্বদা কোন দাকণ যন্ত্রণাগ্রস্থ, ক্ষুধা থাকিলেও খাইতে ইচ্ছা থাকেনা, উষ্ণ পেষ দ্রব্যে স্পৃহা থাকে, তাহাও দন্তমূলে স্পর্শ করিলে কষ্ট বোধ হয়, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, জিহ্বা সবল থাকে, মুখেও দুর্গন্ধ এই বোগের সাধারণ লক্ষণ মধ্যে পবিগণিত ফলতঃ এই বোগ নানা দোষ জন্য হইলেও সাধারণতঃ প্রতিকার একরূপ, এজন্য ইহা দেন পৃথক পৃথক চিকিৎসা লিখিত হইল না । ঔষধগুলি যথাস্থানে লিখিত হইল

তুঁতে তাম্র	.	২ বতি ।
নাবিকেলপাতাতাম্র	.	২ বতি
তেজঃ ত্র চূর্ণ	...	২ বতি ।
জায়ফল চূর্ণ	...	২ বতি
একত্র মর্দিত কবিয়া দন্ত পরিষ্কার কবিত্তে দিবে		
ফট্‌কিবি	...	১ তোলা
চ খড়ি	...	১ তোলা
পুবাঁতন ধবেন দেওয লেব যুতিক।	...	১ তোলা ।
একত্র মিশ্রিত কবিয়া দন্ত মার্জন কবিবে ।		

দাঁকচিনি চূর্ণ	.	০ আনা ।
সুপাবি ভস্ম	...	০ আনা ।
তুঁতিয়া ভস্ম	...	০ আনা ।
কপূর্ব	.	০ আনা ।
ক্ষদিব	..	০ আনা ।

একত্রে মিশ্রিত কবিয়া দন্ত মার্জনা করিবে .

সোণামুখী	..	০ তোলা ।
জাদি হবীতকী	..	১০ তোলা

অর্দ্ধ সেব জলে সিদ্ধ কবিয়া অর্দ্ধ পোষা থাকিতে নামাইয়া তাহাতে অর্দ্ধ তোলা আদার বস মিশ্রিত কবিয়া খাইতে দিবে এইরূপ এক দিন খাইবাব পব নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে

ছোট এলাইচ চূর্ণ	...	০ আনা ।
বড় এলাইচ চূর্ণ	.	০ আনা ।
তেজপত্র চূর্ণ	...	০ আনা ।
লক্ষ্যমনিচ চূর্ণ	.	০ আনা ।
কপূর্ব	..	১০ আনা ।
তুঁতে ভস্ম	..	০ আনা ।
গোলাপ জল		২ তোলা

একত্র মর্দন কবিয়া শুষ্ক করিবে । তাহা ধাবা প্রতিদিন প্রাতে দন্ত মার্জনা করিলে দন্তশূল প্রভৃতি বোগ নষ্ট হইবে

গঁদ চূর্ণ	.	১০ তোলা ।
তুঁতে ভস্ম	...	০ তোলা ।
ফট্‌কি বি	..	০ তোলা ।
চা খড়ি	...	১ তোলা
দাঁকচিনি চূর্ণ	...	১০ তোলা ।
কাঁবাবচিনি চূর্ণ	...	০ তোলা
ক্ষদিব	...	০ তোলা ।

একত্র মিশ্রিত কবিয়া দন্ত মার্জনা করিবে যদি পাবনপুট দন্ত-

বোগ হয়, তবে নিম্নোক্তে লেখাবে তাহাব প্রতিকাব কবিবে ।

জামছাল	.	১ তোলা ।
আমছাল	..	১ তোলা ।
কষেদবেল ছাল	..	১ তোলা ।
বাবলাছাল	...	১ তোলা ।
তরুণছাল	..	১ তোলা ।
তালমাঁড়া		১ তোলা ।
ক্ষদিব	..	১ তোলা ।
জল	..	১ মের ।

হোমিওপ্যাথিকে দন্তরোগ চিকিৎসা ।

শৈতাজন্ম এই ব্যাধির উদ্ভব হইয়া থাকে ভগ্ন অথবা ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তেব স্নায়ু প্রদাহ হইতেও হইতে পারে দন্তমূল বেদনামুক্ত হয় অজীর্ণ দোষ এই বোগেব অন্যতম কারণ গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলে কেব এই পীড়া হইতে দেখা যায় অন্যান্য বোগেব সহচররূপে দন্তেব পীড়া হইয়া থাকে

চিকিৎসা ।—অত্যন্ত বেদনা থাকিলে “বেলেডোনা” ও “মার্কুবি-য়াম্” দুই ঘণ্টা অন্তর পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ কবিতে হইবে

স্নায়বিক উত্তেজনা হেতু এই পীড়া হইলে, বিশেষতঃ যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ে ইহাব আক্রমণ হইতে থাকে, তবে প্রথম প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর “জেলুমিনিয়াম্” ও “আর্শেনিক” পর্যায়ক্রমে দিবে, পক্ষে তিন ঘণ্টা অন্তর দিতে হইবে

বালকেব পীড়ায় অর্ধ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা “ক্যামোমিলা” দেওয়া কর্তব্য এবং “ক্যামোমিলার” জলে মুখ ধৌত কবিয়া দিতে হইবে

দন্তমাড়িতে যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত থাকিলে এবং বোগী দুর্বল হইলে “ফস্ফরাস্” প্রয়োগ অবশ্যক গরম জলে ক্ষত ধৌত কবিবে মুখ

পানিকার বাথিনে গরম মেক উপকারজনক জানিতে হইবে “নিউক্যা-
লাইন” এবং “আর্শেনিকেব” দ্বারা প্রয়োগ করিবে

হাকিমীমতে দন্তরোগ চিকিৎসা ।

এই রোগে দাঁতের গোড়া আলগা হয়, বক্তমিশ্রিত লালাজাব হইতে থাকে, বেদনা হয়, ক্ষুধামান্দ্য, অকচি, অংচ ক্ষুধা থাকিলেও খাইতে অনিচ্ছা, কখন কখন দাঁতের গোড়া দিয়া পুঁথ পড়িতে থাকে, পাচা গন্ধ বাহির হয়, মাংস ক্ষুজ খণ্ডাকাবে বাহির হয়, বোগীব বাক্ষক্ষুর্ভি থাকে না, সর্বদাই বিমর্ষ, যন্ত্রণায় অস্থির, আগম্যপ্রিয় হইয়া সর্বদা নিশ্চেষ্ট-ভাবে কালযাপন করে

চিকিৎসা ।—নিম্নোক্ত মজ্জন ও মালিশ এই বোগে বিশেষ উপ-
কার ।

আকন্দ আটা	...	...	১ ছটাক
হরিতকী চূর্ণ	...	...	১ তোলা
ফটকিরি চূর্ণ	...	...	১ তোলা ।

সর্বপ্রথমে আকন্দ আটা নেকড়ায় মাখাইয়া শুষ্ক করিবে উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে তাহা দ্রব করিবে সেই ভঙ্গাবশেষের সহিত ফটকিরি ও হরিতকী চূর্ণ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দন্তে মজ্জন দিবে

গোলমবিচ চূর্ণ	...	...	০ তোলা ।
ছোট এলাইচ চূর্ণ	...	...	১০ তোলা ।
কপূর	...	...	১০ তোলা ।
আকন্দ আটা চূর্ণ	...	...	১০ তোলা
ফটকিরি	...	...	১০ তোলা ।

একত্র মিশ্রিত করিয়া গোলাপ জলে মাড়িয়া শুষ্ক করিবে । তাহার পরে ৩ তিদিন তিনবার উহা দ্বারা দন্ত মজ্জন করিবে ।

একবিংশ অধ্যায় ।

য়্যালোপ্যাথিকে নানারোগ চিকিৎসা ।

নাশাবজ্রের পুৰাতন প্রাদাহকে ইংবেজীতে ওজিনা বা বাইনবিয়া
কহে ইহাতে নাসা গমম, দূঢ় ঝিল্লী ক্ষীত ও অতীব দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত
ও পুঁষ এবং মিউকসমসংযুক্ত ক্লেদ নির্গত হইয়া থাকে

লক্ষণ ।—কারণের প্রকারভেদে এই বোগের নানা প্রকার রূপভেদ
হইয়া থাকে সর্দির পীড়ায় শৈল্পিক ঝিল্লীর ক্ষীততা হেতু নাসাবজ্র
দিয়া বায়ু গমনাগমনের প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত বিশেষ এক প্রকার অশ্লুখ
জন্মে এই লক্ষণের সহিত শ্লুখকপালে বেদনা, কাশি, সাধারণ
দৌর্বল্য, মানসিক নিস্তেজতা এবং অতিশয় যন্ত্রণ দায়ক ও দুর্গন্ধময়
প্রভূত মিউকাস ও পুঁষ মিশ্রিত ক্লেদ নির্গত হয় কখন কখন ক্লেদ
পুঁষময় হয়, এবং শৈল্পিক ঝিল্লীর ক্ষত থাকিলে তাহাতে বক্ত মিশ্রিত
থাকে । এই ক্লেদ পদার্থ এতাদৃশ দুর্গন্ধময় যে, বোগী অপরের নিকট
তজ্জগ্ন বসিতেও ঘৃণা ও লজ্জা বোধ কবে ঔষধে বোগের প্রতিকার
না হইলে বোগী নিত্যন্ত নিকৎসাহ, ক্ষুধাশূন্য, শীর্ণ ও নিদ্রাবিহীন
হইয়া অতি কষ্টে কালযাপন কবে

নাসাবজ্র মধ্যে স্ফোটক জন্মিয়াও কখন কখন অতীব দুর্গন্ধময় ক্লেদ
নির্গত হইয়া থাকে । পলিপসের সহিত এই রোগের জন্ম হইবার
সম্ভাবনা । পীড়ার কারণ উত্তমরূপে স্থির করিতে না পারিলে নাসাদর্পণ
দ্বারা নাসাগহবের উর্দ্ধভাগ পরীক্ষা করিয়া উক্ত স্থানের ক্ষীততা এবং
অস্থির অবস্থা অবগত হওয়া কর্তব্য

চিকিৎসা ।—ইহাতে স্থানিক এবং সার্বঙ্গিক উভয়বিধ চিকিৎসা
কবাই প্রয়োজন । দুর্গন্ধ ক্লেদ পবিত্র জল দ্বারা গরম জলের পিট্কাবী
ব্যবহার করা কর্তব্য

ফট্‌কিবি

...

...

১০ প্রোগ

জল	...	...	১ আং
মিশ্রিত করিয়া এই জন্মে নামাবন্ধ ধৌত করিবে, অথবা—			
লাইকব পটাসি পাবমান গ্যানেটিস্	.	.	২ ড্রাম ।
জল	...	.	৮ আং
মিশ্রিত করিয়া ইহা দ্বারা নামা ধৌত, অথবা—			
ক্লোবাইড অফ জিঙ্ক	..	..	১০—১২ গ্রোন ।
জল	...	..	৮ আং
একত্র মিশ্রণে নামা ধৌত, অথবা—			
কার্বলিক স্যাশিড	...	..	১ ড্রাম
জল	...	.	১৬ আং
একত্র মিশ্রিত করিয়া ধৌত করিবে ডাছাব পব ক্ষত শুষ্ক করিবার জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে ।			
স্যাঙ্কুয়েন্টি হাইড্রার্জিরাই নাইট্র্যাটিস্	..	..	৪০—১২০ গ্রোন
স্যাঙ্কুয়েন্টি সিটাসিয়াই	...	...	২৪০ গ্রোন ।
একত্র মিশ্রিত করিয়া ইহাব ১ ড্রামে ১ ড্রাম জল দিয়া নামারন্ধ্রে লাগাইতে দিবে ।			
উপবোক্ত ঔষধে ক্ষত শুষ্ক না হইলে নীচের লিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে ।			
প্লাস্টি অ ইওডাইড	...	...	৬০ গ্রোন
স্যাঙ্কুয়েন্টি স্যাট্রোপিয়া	..	.	৬০—১২০ গ্রোন
স্যাঙ্কুয়েন্টি সিম্পাইসিস্			১ আং
একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিতে দিবে ইহাব নাম “আইও-ডাইড অফ স্লেড অয়েন্টমেন্ট”			
নিম্নোক্ত ঔষধ খাইতে দিবে,—			
টীং ফেরি পারক্লোরাইডি	...	...	১১ ড্রাম
পোটাসি ক্লোরাইটিস্	.	..	১২০ গ্রোন
লাইকবিস্ অর্শেনিকেলিস্	..	...	১৫ গ্রান ।
জল	.	.	১ আং

ছয় মাত্র	এক এক মাত্রা ৩	৪ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে	অথন —
ডাইনি ফেবি	.	..	৪ আং
লাইকবিস্ আর্শেনিকেলিস্	.		২০ বিন্দু
সিবাপি জিঞ্জাবেবিস	..	.	১৬ আং
ছয় মাত্রা	বড় তিন চামচ জলের সহিত	এক এক মাত্রা দিনসে	
তিন চ	৮ চ ২	ইতে দিবে	.

বৈদ্যকে নামারোগ চিকিৎসা ।

অপীনস্ রোগের লক্ষণ —যে বোগে বায়ু ও শ্বেদ কৰ্ত্তৃক নাসিকা পথ বদ্ধ হয় এবং আর্দ্র ও উষ্ণ হয়, বোগী কোন বস্তুর গন্ধ আত্মানে অসমর্থ ও মধুবাতি বস অনুভব করিতে পাবেনা, বিশেষতঃ কফ বাতাদি প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ হয়, সেই বোগেব নাম অপীনস্ বা পীনস্

পুতিনস্ত্রের লক্ষণ ।—যে বোগে বিদগ্ধ কফ, পিত্ত ও বক্ত কৰ্ত্তৃক গলা ও তালুতে নীত এবং পুতিভাবাপন্ন বায়ু মুখ ও নাসিকা দিয়া নির্গত হয়, সেই বোগেব নাম পুতিনস্ত্র ।

নাসিকাপাকের লক্ষণ ।—যে বোগে আর্দ্রপ্রিয়স্থিত পি ও নাসিকাতে অত্যন্ত পাকযুক্ত অথবা আর্দ্রতা ও পুতিভাবাপন্ন ত্রণ উৎপাদন করে, তাহাব নাম নাসিকাপাক

পুঁথরক্তের লক্ষণ —ললাটদেশে গ্রহাণ ও পীড়নাদি আঘাত লাগিলে নাসিকা হইতে যে রক্তমিশ্রিত পুঁথআব হইয়া থাকে, সেই বোগেব নাম পুঁথ রক্ত

ফবথুর লক্ষণ ।—আর্দ্রপ্রিয়স্থিত শৃঙ্গাটক নামক মর্গস্থ ন দুষিত হইলে বায়ু কফের সহিত নাসিকা দিয়া প্রবাহ শব্দেব সহিত নির্গত হয়, ইহাকে ফবথু অর্থাৎ হাঁচি বলা যায়

আগন্তুক হাঁচিব লক্ষণ ।—বাজিকা দি তীক্ষ্ণদ্রব্য ভক্ষণে অতিশয় কষ্ট অর্থাৎ কাল জব্দা মেননে, সূর্য্যোব দিকে নিবীক্ষণ করিলে বা

শুক্রাণির দাব নামিকাস্থিত তরুণাশ্রিত নামক মর্থ মধ্য তি ত হইলে হাচি
হইয়া থাকে

প্রশ্নাতুর লক্ষণ ।—যে বোগে মস্তকে পূর্ণাধিত কক্ষ দ্বারা
মাস্তপে বিদ্রক ও লবণতাবাপন হইয়া নামিকা দিগ নির্গত হয়, সেই
বোগেব নাম জন্ম

দীপ্ত রে রেব দক্ষণ ইহাতে নামিকা জ্ঞান কবে, ম ক
হইতে ধূমেব ন্যায় বায়ু নির্গত হয় এবং বোগী নামিকাকে জদীপ্ত
অগ্নিব ন্যায় বোধ কবে

প্রতীনাহের লক্ষণ ইহাতে বায়ু ও কক্ষ নামিকাজ্যোত কক্ষ
কবে

নামাশ্রাবের লক্ষণ —ইহাতে নামিকা হইতে পীত বা শ্বেত
বর্ণ ঘৃণ্ত অথবা তাল কক্ষাব হয়

নামাশোমের লক্ষণ ।—ইহাতে নামিক জ্যোত অতি উষ্ণ ও
শোষিত হয়, বোগী অতি কষ্টে শ্বাস পশ্ব স গ্রহ ও পনিভাগ কবে।

পীনমের অপক্ক লক্ষণ —পীনম বে গেব আঘাবস্থাতে অর্থাৎ
অপক্কাবস্থাতে বোগীব মস্তকে গুরুত, অকচি, নামিকা হইতে জ্ঞান
জ্ঞান, জ্ঞাপটে স্র ও নামিকা হইতে পূর্ণ পূর্ণ জলজ্ঞান হয়।

পীনমের পক্ক লক্ষণ ইহান পক্কাবস্থাতে পূর্ণোক্ত সমস্ত
লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং নামাবস্থাস্থিত শোষা ঘৃণ্ত হয় এবং স্র ও বর্ণ
পবিকান হয়

প্রতিশ্রায় বোগের অর্থাৎ মর্দির মাদ্যাজনক কাব ।—
মন মূত্রের বেগ দাব, অজীর্ণ রোগ, নামিকাজ্যোতে মূনি প্রবেশ, অতি
ক্লেশ, মূত্রের ভিত্তোজনক ধূমাদি নামিকাপথে প্রবেশ কর্তৃক অর্থাৎ
এব বজ্রব কার্য অত্র ক্ষুভে কবা, নাজি জাগব, অত্যন্ত দিবানিশা,
অজিণয় শীতল পান, হিম সেবন, অতিরিক্ত জীমৎসর্গ, শোকজনিত,
নাম্প, এই সমস্ত কানবে শোষ মস্তকে ঘনীভূত হইলে কৃষ্ণিত বায়ু মাদ্য
প্রতিশ্রায় মর্দি ওয়া ব।

মর্দির অপর কারণ —বায়ু তি ত কক্ষ মূত্রক পূর্ণক হইক

অথবা একএই হউক, এবং বক্র স্থায়ী স্থায়ী স্থানে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে নিগ্রহ ও দিবানিজা দ্বারা কুপিত হইয় মস্তকে যাইয়া সর্দি উৎপাদন করে

সর্দির পূর্বলক্ষণ — সর্দি হওয়ার পূর্বে মস্তক ভার, শবীর বেদন, বোম্বাধ ও হাঁচি হয়, নাসিকা হইতে ধূম নির্গমন ও তালু জ্বালা প্রভৃতি অন্য প্রকার উপদ্রব হয়

বাতজ সর্দির লক্ষণ—ইহাতে নাসাজ্যোত বন্ধ নাসিকা হইতে জলস্রাব, গলা, তালু ও ওষ্ঠশোথ, ললাটে পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, পুনঃপুনঃ হাঁচি, মুখে বিবসতা ও স্রবভঙ্গ হয়

চিকিৎসা — ত্রিকটু, চিতামূল, তালীশ পত্র, তৈতুল, অন্নবেতস, চই, কুম্বজীবা, প্রত্যেক ১ তোলা এলাইচ, গুড়ত্বক, তেজপত্র, প্রত্যেক ২ মাগ, পুণ্ড্রক গুড় ৯ তোলা ৬ মাগা, একত্র মাড়িয়া লইবে অল্পপান উষ্ণ জল । ইহার নাম ‘বোম্বাদ্য চূর্ণ ’

ক্ষুদ্র প্রয়োগ ।—পঞ্চ লবণেব সহিত সিদ্ধ যত পান এবং তর্দিতোক্ত নম্রাদি ব্যবহৃত্যে ।

পিত্তজ সর্দির লক্ষণ ।—ইহাতে নাসিকা হইতে উষ্ণ ও পীত বর্ণ কফস্রাব হয় এবং বোম্বাধ ক্রম, পাণ্ডুবর্ণ ও মস্তক হইয়া থাকে

চিকিৎসা ।—কটু তৈল ১ সেব, কল্কজব্য—আকনাদি, হবিজা, দাকহবিজ, মূর্খামূল, পিপ্পলী, জ ভীপত্র, দস্তীমূল মিলিত ১৬ তোলা, জল ৪ সেব । ইহার নাম ‘পাঠাদি তৈল ’

কফজ সর্দির লক্ষণ —ইহাতে বোম্বাধ যেন সহসা ধূমযুক্ত অগ্নি বমন করে এবং নাসিকা হইতে অধিক পরিমাণে শীতল পাণ্ডুবর্ণ কফ নির্গত হয়, এতদ্ভিন্ন বোম্বাধ শবীর ও চক্ষু শ্বেতবর্ণ এবং মস্তক ভার এবং কণ্ঠ, তালু, ওষ্ঠ ও মস্তকে কণ্ডু হইয়া থাকে

চিকিৎসা ।—তৈল ১ সেব ; কল্ক জব্য—ঝুল, পিপ্পলী, দেবদাক, যবক্ষা, কবজীজ, সৈন্ধব আপাজবীজ, মিলিত ১৬ তোলা । জল ৪ সেব ইহার নাম ‘শিখরি তৈল ’

চিত্রক তৈল ।—তৈল ৪ সেব, গোমূত্র ১৬ সেব । কল্ক জব্য—

চিচামূল, চই, যমানী, কণ্টকারী, কবজীবীজ, মৈন্ধব লবণ গিলিত ১ সেব । ইহাব নষ্ট গ্রহণ করিবে

ত্রিদোষজ সর্দির লক্ষণ ।—ইহাতে সর্দি পকই হউক আর অপকই হউক, সহসা নিবৃত্তি পাইয়া পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হয় ।

চিকিৎসা ।—পুৰাতন গুড় ১০০ পল, কাথার্থ চিচামূল ৫০ পল, জল ৫০ সের, শেষ ১২ ০ সেব আমলকীর রস অভাবে কাথ ১২ ০ সেব, গুলঞ্চ ৫০ পল, জল, ৫০ সেব, শেষ, ১২ ০ সেব দশমূল প্রত্যেক ৫ পল, ৫০ সের জল, শেষ ১২ ০ সেব এই সমুদয় কাথ একত্রিত করিয়া ত হাতে গুড় গুলিয়া ছাঁকিয়া হবিতকী চূর্ণ ৮ সেব দিয়া পাক করিবে । পাক সিদ্ধ হইলে শুষ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, গুড়রস, তেজপত্র, এলাইচ প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল, যবক্ষার ৪ তোলা পক্ষেপ দিবে পবদিনে মধু ২ সের মিশাইবে। অগ্নিব- বিবেচনা করিয়া ০ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রা ব্যবস্থা করিবে ইহার নাম “চিকক হবিতকী ”

সর্দির কৃচ্ছ্রসাধ্য লক্ষণ । যে প্রতিশ্যায়ের বোগীর নাসিকা কখন আর্জ কখন শুষ্ক, কোন সময়ে জাল ও কোন সময়ে নাসিকাস্রাব পাকিব হয়, বোগী কোন বস্তুর গন্ধ ভুলভব করিতে পাবে না, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়, সেই প্রতিশ্যায় কৃচ্ছ্রসাধ্য

রক্তজ প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ ।—ইহাতে নাসিকা হইতে রক্ত- স্রাব, চক্ষু তীব্রবর্ণ হয় এবং বোগী উকক্ষত, উকক্ষত প্রভৃতি বোগীক্রান্ত হইয়া থাকে, অধিকন্তু পিত্তজ প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ লক্ষিত হয়

চিকিৎসা ।—জঘন্তী পত্র পুট পাক করিয়া মৈন্ধব লবণ ও তৈলেন্দব গহিত প্রত্যাহ সেবন করিবে

আহাবের অব্যাহিত পবক্ষত ইং বনের সহিত সুগন্ধি অজুয়া মাখ- কলাই ভক্ষণে সর্ব শেযজ ও দীর্ঘকালোৎপন্ন প্রতিশ্যায় নাশিত হয়

পিপ্পলী, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ, মরিচ, ইহাদেব নষ্টে প্রতিশ্যায় নিব- রিত হয়,

প্রতিশ্যায়ের অসাধ্য লক্ষণ ।—ইহা উৎপন্ন হইলেই চিকিৎ- সিত না হইলে ক্রমে দুষিত হইয়া পড়ে, তখন বিশেষ চিকিৎসার চাব-

এসা কবিরেও আবেগ্য হয় না। অসাধারণত্ব য বোঝাব উদরে শ্বেত-
বর্ণ, স্নিগ্ধ ও সূক্ষ্ম ক্রিমি জন্মে এবং ক্রিমিজন্মিত শিববোগেব লক্ষণ
প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

বুদ্ধিপ্রাপ্ত প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ — প্রতিশ্যায় অতিশয় বুদ্ধি
প্রাপ্ত হইলে বোগ্যেব বদ্বিত্য, দৃষ্টিশক্তিহীনতা, আশ্রয়শক্তিহীনতা,
প্রবণ চক্ষুবোগ, অগ্নিসান্দ্য ও কাণ জন্মিয়া থাকে ।

হোমিওপ্যাথিকে নামারোগ চিকিৎসা ।

— ৮ = ৫৫২ —

নামারোগ প্রধানতঃ ৮ বি প্রকার যথা,—ওজিনা, এপিগ্টিয়াগ্টিম্,
পিম্পাগ্ অফ দি নোজ, ও লম্ অফ দি সেক্স অফ স্মেল্

ওজিনা — এই বোগে নাম বন্ধেব মধ্যগত মিউকস্ মেম্ব্রেনে
ক্ষত হয়। দুর্গন্ধময় এক প্রকার ক্রেন্দ প্রব হইয়া থাকে

কারণ । — পূব, উপদংশ, ক্ষত, নসারঞ্জে কোন অব্যব প্রবেশ,
কাটা।। লভুতিই ইহান প্রধান কারণ

চিকিৎসা । — এই বোগে সহজে বা শীঘ্র অ নাম হয় না। নামাব
উপায় বোদন, • মনোবোধ ক্ষত ও প্রদাহ এবং পীতবর্ণ নামা প্রব থাকিলে
“অনমে” প্রয়োগ বর্ত্তব্য

এপিগ্টিয়াগ্টিম্ । এই পীড়ায় নামাবদ্ধ হইতে বক্তৃতা হইয়
কখন কখন বক্তৃতা।। এত অল্প ইয় যে, চিকিৎসা ব্যতিনেকেও আনাম
হয়। মন কে ন কোন সময় বক্তৃতা।। এত অল্প ইয় ও এত দীর্ঘ-
কাল স্থায়ী হয় যে, চিকিৎসা না ব।।। সাংঘাতিক হইয়া উঠে ।

কারণ । — মস্তক ব নানি কান কোন স্থানে আঘাত, অতিবিক্রম, ম,
মদি, মনমিক উদেগ মিনা, রক্ত শিঙ, ম্যামোপ্লেথী, অ্যোনোকদিগেন
অনিয়মিত জল খান, উষ্মা, ইত্যাদি ইহান প্রধান কারণ মধ্য গণ্য ।

চিকিৎসা । — নাম হইতে বক্তৃতা।। ও আন হইলে ‘হোমিও-

লিশ্” দিবে । বগ ও ললাটে অত্যন্ত বেদনার সহিত এই বোগ হইলে “বেলেডোনা” দেওয়া কর্তব্য ।

পলিপাস্ অফ দি নোজ —এই বোগে নামাবদ্ধ হইতে এক প্রকার শব্দ হইতে থাকে, বোগী নিশ্বাস প্রশ্বাস জন্ত মুখ খুলিয়া বাধে, গলাধঃকরণে কষ্ট, পীড়িত অংশ বদ্ধিত হয়, নামাবদ্ধের ভিতর দেখিলে পলিপাস্ দেখিতে পাওয়া যায় উহা গিউকস্ মেম্ব্রেনে গঠিত, পীড়ন, গোলাকার, অগ্রভাগ ক্রমঃ সূক্ষ্ম ।

চিকিৎসা । —“ফস্ফবস্”, “থুজ্”, “ওপিয়ম্” প্রভৃতি উত্তম ঔষধ

লস্ অফ দি সেন্স অফ স্মেল্ —এই বোগে আত্মশক্তির হানি হয় পুৰাতন ক্যাটাৰই ইহার প্রকৃত কারণ ।

চিকিৎসা —“সল্ফার”, “মার্কুবিয়াস্”, “পল্‌মেটীলা” ব্যবস্থা ।

হাকিমীমতে নামারোগ চিকিৎসা ।

লক্ষণ —এই বোগ নানা প্রকার নামারোগ হইতে রক্তজীব, নামা মধ্যে গে লাকাব পদার্থের গঠন, তদ্বার শ্বাসবদ্ধ প্রযুক্ত বে গীর হুত্ব পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে কখন কখন রোগী একবারে আত্মশক্তি বর্জিত হয় ।

কারণ —ইহার কারণ নানা প্রকার নাম বা মস্তকে আঘাত লাগিলে নামাবদ্ধ হইতে রক্তজীব ঘটিয়া থাকে নামামধ্যে প্রণাদি হওয়াও ইহার অন্ততম কারণ ।

চিকিৎসা —নামা মধ্য হইতে রক্তজীব নিবারণ জন্ত কামিনী কুলের পাতার নস্য গ্রহণ উপকারী শীতল জলের নস্য গ্রহণে আশু রক্তজীব বন্ধ হয় দেশীয় কুম্বাও ঘূতে ভাজিয়া চিনির সহিত খাইতে দিবে । কুম্বাওর মোবকা বড় উপকারী

গরম জলের পিচকারী দিয়া তাহার পব গন্ধক চূর্ণ দুই ভাগ ও মোম

এক ভাগ উত্তমরূপে মর্দন কবিয়া লাগাইবে । এই ঔষধ নাগিকা মধ্যে ক্ষত হইলে প্রয়োগ কবিতে হইবে

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

য়্যালোপ্যাথিকে চক্ষুরোগ চিকিৎসা ।

ইহাতে চক্ষের তাবাব পার্শ্বে ও ভিতরে বেদন হয়, জ্বালা কবে, আব ক্রিম বর্ণ হয়, ভিতর কব্ কব্ কবে, অত্যন্ত যাতনা হয়, সূর্য্যকিরণে দৃষ্টি-পাত কবিতে হইলে বোগী কষ্ট বোধ কবে, হবিৎবর্ণের জ্বা ব্যতীত অন্য বর্ণের জ্বা দৃষ্টি সহ্য কবিতে পাবে না । ইহাকে অপ্‌থাল্মিয়া বলে

লক্ষণ — শববেদনবৎ যজ্ঞণা অনুভূত হইয়া থাকে, সাধারণতঃ এই বোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং পুৰাতন হয় কেশপুষ্টক টিহুব বিনাশ এক প্রকার ক্লেদ সঞ্চিত হয় ।

চিকিৎসা ।—সাধাবণ স্থান্যেব দিকে দৃষ্টি বাধিবে বলকাবক ও পবিবর্তক ঔষধ প্রয়োগ কবিতে হইবে আর্শনিক, স্ট্রিপ, কডলিবাব অয়েল, মাংস, লুপ্ত পণ্য, এবং বায়ু পরিবর্তন বিধেয়

স্থানিক প্রয়োগ ।—যাহাতে চক্ষের উপর ক্লেদ সঞ্চিত না হয়, তৎপক্ষে সাবধান হইয়া চক্ষু পবিকার বাধিতে হইবে যে সকল অয়েন্টেমেন্ট ব্যবহার কবিতে হইবে, সে গুলি রীতিমত জলমিশ্রিত করিবে, যাহাতে উগ্র না হয় সে পক্ষে সাবধান হওয়া আবশ্যক । নাই-টেট অফ মার্করি, বেড অক্সাইড অফ মার্কবি, কিস্বা বেড অক্সাইড অফ জিঙ্ক, জলমিশ্রিত সব য়ানিটেট্ অফ লেড ইত্যাদি ঔষধেব বাহ প্রয়োগ আবশ্যক

রেড অক্সাইড অফ মার্করি অয়েন্টেমেন্ট —

হাইড্রাজিরাই কব্রি ৮ গ্রেণ ।

আজুয়েন্টি সিম্প্লিসাই ১ আং ।

একত্র মিশ্রিত কবিবে ।

কখন কখন বা চক্ষু অতিশয় জল পড়ে, চক্ষু আরক্তিম হয়, বেদনা কবে একপা স্থলে বেলেডোনা প্রভৃতি ঔষধেব বাহ্য প্রয়োগ করিলে তাহা অবিলম্বে সাবিয়া যায় রোগী কোন মতে চক্ষু সূর্য্যকিরণ না লাগায়, অজীর্ণকর জব্য ভক্ষণ না কবে, তৎপক্ষে বিশেষ নিষেধ জ্ঞানিতে হইবে ।

বৈদ্যকে নেত্ররোগ চিকিৎসা ।

নেত্ররোগের কারণ — বৌদ্ধ কিম্বা অগ্নিতাপে তাপিত হইয়া জলে অবগাহন, অনেক দূর নিরীক্ষণ, রাত্রি জাগরণ, অতিরিক্ত ঘর্ষ, চক্ষুতে ধূলি ও ধূম প্রবেশ, ক্রোধ ও শোকবশতঃ বমনবেগ বোধ, অতিশয় বমন, বাত্রিতে জ্বাশ সেবন, ক্রমে মল মুত্র ও বায়ুব বেগ ধাবণ, সর্বদা বোদন, মস্তক আঘাত, অতিশয় সুরাপান, এক ক্ষতুব কার্য্য অন্য ক্ষতুতে কবা, অত্যন্ত শাবীরিক ক্রেশ, অতিশয় জীমৎসর্গ, চক্ষুয় জল রোধ, সূক্ষ্ম বস্তু নিরীক্ষণ, এই সমস্ত কাৰণে চক্ষুবোগ জন্মে

অভিস্যন্দ । — বায়ু, পিত্ত, কফ এনং বক্তজনিত চারি প্রকার অভিঘ্যন্দে অর্থাৎ নেত্রজলজ্ঞানে সর্ব প্রকার চক্ষুবোগ অর্থাৎ অধিসমূহ বাতপর্য্যয় প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে

বাতাভিঘ্যন্দের লক্ষণ — ইহাতে চক্ষুতে সূচীবিন্দনং বেদনা, চক্ষুর জড়িমা, কব্‌কবিকা, কণ্ঠ্যতা, মস্তক বেদনা, বোমর্ষ ও চক্ষু হইতে জলজাব হয়, কিন্তু দৃষ্টিশক্তিব কোন দোষ ঘটে না

চিকিৎসা । — হবিতকী, হরিদ্রা, পিপ্পলী, পঞ্চ লবণ, এই সমুদায়ের বর্টি দ্বারা চক্ষুর তিমির নষ্ট হয় ইহাব নাম “হবিতক্যাদি বর্টি ।”

কুমারিকা বর্টি । — তিলফুল ৮০ টা, পিপ্পলী ৮ উল ৬০ টা, জাতীফুল ৫০ টা, মবিচ ১৬ টা, সমস্ত একত্রে মাড়িয়া বর্টি প্রস্তুত করিবে ।

পিত্তাভিঘ্যন্দের লক্ষণ । — ইহতে চক্ষু জ্বালা, চক্ষু হইতে ধূম

নির্গত, অধিক ৬ নিম্নাং উষ্ণ জলপ্রাব, চক্ষু পীতবর্ণ এবং পাকিয় থাকে
চক্ষু জ্বালা করে বলিয়া রোগী চক্ষে শীতল জল লাগাইতে ইচ্ছা করে

চিকিৎসা ।—ঘৃত ৪ সেব কাথ জল্য—ত্রিফলা প্রত্যেক ২ সেব,
জল ৪৮ সেব, শোষ ১২ সেব হুগ্ধ ৪ সেব ; কল্ক জল্য—ত্রিফলা, ত্রিকটু,
জাঙ্গা, যষ্টিমধু, কটুকী, পুণ্ডরীক কাথ, ছোট এলাইচ, বিডঙ্গ, নাগেশ্বর,
নীলোৎপল, অনন্তমূল, আমাণ্ডা, বজ্রচন্দন, হবিজ, দাকহবিজা,
প্রত্যেক ২ তোলা ইহাব নাম “ত্রিফলা ঘৃত ”

ভৃঙ্গরাজ তৈল —তিল তৈল ৪ পল ভৃঙ্গরাজ ৪ সেব কল্ক—
যষ্টিমধু ১ পল ইহাব নাম গ্রহণ করিবে

কফাভিষ্যন্দের লক্ষণ —চক্ষুতে শোথ, কণ্ঠ, নয়নের গুরুতা
ও শীতলতা হয় এবং চক্ষু হইতে পিচ্ছিল জলপ্রাব হয় রোগী চক্ষুতে
উষ্ণ বস্তু লাগাইতে ইচ্ছা করে

চিকিৎসা —হরীতকী, বচ, কুড়, পিপ্পলী, মবিচ, বহেড়াব মজ্জা,
শঙ্খনাভি, মনহাল, এই সমস্ত ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া বর্ষি প্রস্তুত
করিবে চক্ষে ইহাব অঞ্জন প্রদান করিবে ইহাব নাম চন্দ্রে দয়া বর্ষি

নয়নস্থানবর্ষি —পিপ্পলী ১ ভাগ, হরীতকী ২ ভাগ, জলে
পেষণ করিয়া বর্ষি প্রস্তুত করিবে

রক্তাভিষ্যন্দের লক্ষণ —ইহাতে চক্ষে জ্বালা প্রভৃতি পিষ্টা-
ভিষ্যন্দের লক্ষণ প্রকাশ পায়

চিকিৎসা ।—যষ্টিমধু, ত্রিফল প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ৪ তোলা
এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া শয়নকালে ঘৃত ও মধু সহিত ২ মাস
পরিমাণে সেব্য ইহাব নাম “মধুকাদ্য লৌহ ”

নয়ন চন্দ্র লৌহ ।—ত্রিকটু, ত্রিফলা, কঁকড়া শর্জী, শর্জী, রাসা,
শুঁঠ, জাঙ্গা, নীলোৎপল, কঁকলা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, নাগেশ্বর, বৃহত্তা,
কণ্টকারী, মিলিত ২ পল, লৌহ ১ পল, অজ ১ পল ; একত্র মাড়িয়া
ক্রমাশ্রয়ে ত্রিফলাব কাথ, তিলতৈল, ভিসরাজের রসে ভালনা দিয়া বৃদ্ধ
জাতীর আয় বটিকা প্রস্তুত করিবে

হোমিওপ্যাথিকে চক্ষুরোগ চিকিৎসা ।



অপ্‌থ্যাল্মিয়া —দৈন্যপ্রযুক্ত চক্ষে প্রদাহ জন্মে দৈহিক অবস্থা বিকৃতি, শীতল বাতাস সেবন ইহাব অন্যান্য কারণ মধ্যে পরিগণিত

চিকিৎসা —ঈষৎ ঠাণ্ডা কিংবা ঝল ঝল পানীতে চক্ষু ধোত করিবে তাহার পর শীতল চষেব জল উৎকর্ষে ব্যবহার করিবে অনন্তর “বেরোডোনা” এবং “মাকুবিয়াস্” দুই ঘণ্টা অন্তর পর্য্য যকমে ব্যবহার করিবে ছায়া দ্বারা আলোক হইতে চক্ষু বক্ষ করিবে কিন্তু ব্যাণ্ডেজ বা অন্য কোন প্রকারে চক্ষু চাপিয়া বন্ধ করা উচিত নহে চক্ষের উপরে সবুজ নেকড়ার আবরণ মাত্র দেওয়া কর্তব্য যদি বোগ অত্যন্ত প্রবল হয়, তবে বোগীকে অন্ধকাবগ ঘূহে বন্ধ করা আবশ্যিক

চক্ষু হইতে রক্তপাত ।—এক পাইন্ট জলে বড় এক চামচ “বেলিস টীঞ্চাব” মিশ্রিত করিয়া সেই জলে চক্ষু ধোত করিবে তাহার পর দুই ঘণ্টা অন্তর ‘র্যাফোনাইট’ প্রয়োগ করিতে হইবে

চটাই ।—এই বোগে চক্ষে স্ফোটক জন্মে, চক্ষের তারায় সম্ভব বা বিনশ্নে ক্রন্দ নির্গত বা সঞ্চিত হয়, দৈহিক ক্রিয় বিশেষ বা অঙ্গাঙ্গ দ্বারা এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে

চিকিৎসা ।—বাতি এবং প্রাতঃকালে ছয় মাত্র ‘হিপার’ প্রয়োগ করিয়া তাহার পরে এক সপ্তাহ বাতি এবং প্রাতঃকালে ‘পার্মোটিলা’ ব্যবহার করিবে গরম জলে চক্ষু ধোত করিবে

চক্ষের পীড়া কোন মতে উপেক্ষনীয় নহে, ইহা দ্বা বিশেষ অনিষ্ট-পাতের সম্ভাবনা

চক্ষে কোন বাহ্য বস্তু পতিত হইলে, যথা,—বালুক, কেশাংশ, ধূলা, কুটা ইত্যাদি নাসা দ্বারা প্রবল শ্বাস গ্রহণে আবেগ্য হইতে পারে । তাহাতে ক্ষুদ্র না হইলে চক্ষের উপর পাতা নিম্নে পাতার উপর স্থাপন করিয়া একটু মর্দন করিলে তাহা সাবিয়া যায় কমানের কোন ভিজাইয়া, কিন্তু পালক দ্বারা পতিত বস্তুকে স্ত নাশ্রুতিত করা যাইতে পারে

তাহাতেও কৃতকার্য না হইলে খোড়ার কেশাণ্ড বা কুঁটি দ্বারা সবাইয়া দেওয়া যায় ।

কোন কলেব নিকটে থাকিবাব কালে যদি পশুবিয়া কষলাব, লৌহেব বা অপব কে ন জবোব ক্ষুজাংশ পতিত হয়, তাহা হইলে স্তম্ভমাণ্ড ছুবি-
কাবে অগ্রভ গ, সূচী, অথবা লাম্বোটেব অগ্রভাগ দ্বাব উহা বাহির কবা যায।

তাহ ব পব “বেলিস্” অথবা “ক্যালেন্ড্রিউলাব” জ্বলে চক্ষু ধৌত
কবিবে যে পর্যন্ত না বেদনা সবে, সে পর্যন্ত এইরূপ কবিয়া বাত্রি-
কালে শয়ন কবিবার সময় চক্ষেব উপব কোমল বস্ত্র দিয়া বাধিবে এবং
প্রতি অর্ধ ঘণ্টা অন্তব “ম্যাকোনাইট” খাইতে দিবে

ছাকিনীমতে চক্ষুরোগের চিকিৎসা ।

চক্ষুর ছানিপড় । চক্ষেব উপতারার উপবে প্রান্ত চক্ষেব উপব
শুকবর্ণ দৃষ্ট হয় কোন কোন সময় উহা তাবাব এক পার্শ্বে, কখন বা
তাহাব চতুঃপার্শ্বে ব্যাপ্ত হইয়া ঐ তাবাকে সম্পূর্ণরূপে লুকায়িত বাখে

কারণ - চক্ষুতে প্রদাহ জ্বিলে অথবা কোন প্রকাব আঘাত
লাগিলে যদি ক্ষত হইয়া থাকে, তবে ঐ ঘা শুষ্ক হওয়ায় কিনা প্রদাহ বন্ধ
হওয়ার পবে ঐ তাবাব উপব প্রান্ত চর্ম পুরু হয় ও সেই চর্ম শুকবর্ণ দৃষ্ট
হইয়া থাকে তাহাতে দৃষ্টিব হ্রাসভা হয়

চিকিৎসা ।—নিম্নোক্ত উপায়ে চক্ষেব চিকিৎসা কবিনে যথ ,—

মেটিয়া সিদ্ধব		২০ রতি
শ্বেত তুঁতিয়া		৫ রতি
চর্বি		০ ছটাক

এই সকল অব্যাকে উত্তমরূপে মিশ্রিত কবিয়া প্রত্যহ এক মটব
আন্দাজ লইয়া চক্ষুৰ প তাব ভিতবে লাগাইবে পূবে ঐ ঔষধ যেন
ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া চক্ষুর চতুর্দিকে লাগিয়া যায়, এই জন্ত চক্ষের
উপবে হস্ত দিয়া তাহাকে যেন মর্দন কবিয দেওয়া হয় । আর দুই মাস

অবধি ছয় মাস পর্য্যন্ত এই ঔষধ প্রত্যহ ব্যবহা কবিবে ।

অন্য প্রকার ছানির বিবরণ ।—এই বোগ নানা প্রকার । প্রথমে চক্ষুর স্বচ্ছাংশের ভিতরে অল্প মলিন বোধ হয়, এবং তাহা বড় দিবসেব হইলে চক্ষুর উক্ত অংশ শুক্লবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, অথবা কিছু শাদ ও তাম্রবর্ণ মিশ্রিত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ বর্ণ দেখায় এবং চক্ষু চিকণ বেধ হয় ইহাতে কেহ অল্প, কেহবা একবারে দেখিতে পায় না ।

চিকিৎসা ।—এই রোগ আবৃত্ত হইবার সময় অর্থ ২ যখন দৃষ্টিব তেজ অল্প হইতে থাকে, তখন নীচেব লিখিত ঔষধ ব্যবহা কবা কর্তব্য ।

পাৰদ চূৰ্ণ

..

১১০ মাসা

এক দিবস অন্তর খাইতে দিবে এই নিয়মে তিন মাস কিম্বা ছয় মাস নিত্য খাওয়াইতে থাকিবে ইহাতে যদি দন্তমূলে বেদনা বৃদ্ধ হয়, তবে যতদিন বেদনা না সাবে, ততদিন ঔষধ বন্ধ রাখিয়া আবার খাওয়াইতে থাকিবে ইহাতে আরোগ্য না হইলে অস্ত্রবিদ্যা অনুসারে ছেদন করিবে ।

রাতিকাগার বিবরণ ।—দিবসে অল্প এবং রাতিকালে কিছু-মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না ।

চিকিৎসা ।—এই বোগেও এক দিবস অন্তর উপবোক্ত ঔষধ সেবন কৰাইবে মগ্ধাহকাল এই ঔষধ ব্যবহা কবিলেই রাতিকাগা রোগ সারিয়া যাইবে

চক্ষু ঘোলাপড় —চক্ষের কাল অংশ ক্ষীণ হয়, ঐ ক্ষীণি কখন কখন পাতাব ভিতরে থাকে, কখন বা অত্যন্ত মূলিয়া উঠিয়া পাতার বাহিবে আসিয়া পড়ে

চিকিৎসা ।—যে পর্য্যন্ত চক্ষু ঐ ক্ষীণি চক্ষের সঙ্গে সমান না হয়, সে পর্য্যন্ত প্রতিদিন সূচী দ্বারা ঐ ফুলার এক পার্শ্বে ছিদ্র করিয়া তাহা হইতে জল নির্গত কৰাইবে, অথবা ঐ ফুল যদি ছোট হইয়া থাকে, তবে কিছু দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ উক্ত প্রকারে জল বাহিব কবিলেই আরাম লাভ হইবে যদি বড় হইয়া থাকে, তবে অস্ত্র-বিদ্যানুসাবে তাহা কাটিয়া দিতে হইবে ।

বাপ্‌সা দেখা ।—ইহাতে সহজ মনুষ্যের ঞ্চায় দেখিতে পায়

যায়, কেবল তাহাব পুত্রী কখন কখন বড় হয়, কে ন কোনসময়ে অল্প দুগি হয়, কখন ব বিছুই দেখিতে প ওয়া যায় না।

চিকিৎসা —সর্বদা আলোকবহিঃ নির্জন গৃহমধ্যে বোগীকে রাখিবে এবং নিম্নোক্ত ঔষধ মর্দন করিবে

চক্ষু হইতে বর্ণ পর্যন্ত যে স্থান, সেই স্থানে অর্থাৎ বগে ভেবেটিয়া প্রোনেপ এক ও ১ প' শ্বে ওর্ধ্ব মাসা প'বিমাণে আবাম না হওয়া পর্যন্ত পাত্যহ মর্দন করিবে

মাংসবৃদ্ধি। চক্ষুর কোণ হইতে মাংসেব স্থায় এক প্রকাব চর্ম একে ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া ভোগ ব উপবিভাগকে আচ্ছ দিত কবে

চিকিৎসা —অতিশয় পাতলা চিমটা ব দ্বারা চর্মকে ধরিয়া তীক্ষ্ণ সূচ কাঁচি দ্বারা কাটিয়া ফেলিলে আবোগ্য হয়

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

য়্যালোপ্যাথিকে কর্ণরোগ চিকিৎসা।

ওটাইটিস্।—অবগেজিয়েব নানা অংশ ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে

বাহু মিটাসের প্রদাহ। দূষিত রক্ত, অবগক্রিয়া ব খাতযুক্ত অবস্থা, যন্তকের পার্শ্বিক বেদনা, পুঁথ কিন্না অথ কোন প্রকার দূষিত রক্তেদ সঞ্চয় দ্ব রা ইহাব উদ্ভব হইয়া থাকে

লক্ষণ —চিবুকাস্থিতে দাক্ষণ বেদন, অবগপথ রোধ, বধিবতা, আক্রান্ত দিগেব হাঁওের ক্ষীতি, দুই একদিন পরে তবৎ এবং প্রচুব রক্তেদ নির্গম ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কখন কখন কর্ণান্তান্তবে ফোটক জন্মে, তাহাতে তীক্ষ্ণ বেদনা, অবগক্রিয়া ব ব্যতিক্রম ঘটয়া থাকে

চিকিৎসা।—সাধারণ স্বাস্থ্যেব প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক দুগ্ধ ও অথ বা গুটিকর খাদ্য, কুইনাইন, আয়বন, ক্লোরের্ট অফ পটাস, কড্-লিডার অয়েল, সামুদ্রিক বায়ুসেবন ব্যবস্থা স্থানিক প্রয়োগ জন্ম

ফোমেটে*ন্, পুর্টিশ্ পিচকারী দ্বাৰা ক্লেদ পৰিষ্কার কৰণ, গ্লিমবিন
কিষা অনিভ অয়েলেব ইন্জেক্সন্ ইত্যাদি প্রয়োগ কৰা কৰ্ত্তব্য

অটোরিয়া — নানা প্রকাৰ কর্ণবোগেৰ লক্ষণ যথ , — ক্যাটাব-
জনিও প্রদাহ, মেম্বণেৰ উপৰি বেদনা ইত্যাদি কোন প্রকাশ্য কাৰণ
ব্যতিবেকে শিশুদিগেৰ দন্তোদমেব সময় এই পীড়া উপস্থিত হয় ।

লক্ষণ — দুৰ্গন্ধযুক্ত পুঁথ নিৰ্গত হয়, তৎক্ষণে দিন পাবে উহা হুঁহি ৩
হয়, তাহাব পৰ প্রায়ই পীড়া পুৰাতন হইয়া কষ্ট দিতে থাকে দীৰ্ঘকাল
পৰে ঐ ক্ষত কর্ণাভ্যন্তরেব যন্ত্ৰ বিকৃত ও ক্ষয় বৰিয়া অস্থিকে আক্ৰমণ
কৰে পৰিশেষে মস্তিষ্কপৰ্য্যন্ত প্রসাৰিত হইয়া আক্ৰমণ কৰে তখন
অত্যন্ত বাতনা, জ্বর, কন্ডলশন, কোমা, প্রভৃতি দ্বাৰা মৃত্যু উপস্থিত হয় ।

চিকিৎসা — গৰম সাবানজলে পিচকারী দ্বাৰা কর্ণাভ্যন্তৰ ধৌত
কৰিবে সাধাবণ স্বাস্থ্যেৰ প্রতি দৃষ্টি রাখিবে” দুগ্ধ, পুষ্টিকৰ খাদ্য, মাংস
ইত্যাদি পথ্য দিবে । ঔষধেৰ মধ্যে কুইনাইন, ফীল এবং পেপ্সিন ;
ফস্ফেট অফ আশৰ, আইওডাইড অফ আয়ৰ, আইওডাইড অফ
পটাশিয়ম এবং গোয়াকম, কিষা সাবসা প্যারিলা, কডলিচাব অয়েল
ইত্যাদি আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ব্যবস্থা

আইওডাইড অফ আয়ৰণ মিক্শচাব, যথ ;—

পটাশি আইওডাইডি	...	...	১২ গ্ৰেণ ।
ফেবিয়েট কুইনি সাইট্ৰাটিস্	...	...	৩০ গ্ৰেণ
টীং য়াকোনাইটি	...	...	২৫ বিন্দু ।
ইনঃ চিরাভা	...	...	৫১ আং

ছয় মাত্রা । দিবসে তিন বাৰ খাইতে দিবে

* আইওডাইড অফ পটাশিয়ম্ মিক্শচাব যথা ;—

পটাশি আইওডাইডি	...	...	৪০ গ্ৰেণ
টীং রেয়াই	...	...	২ আং ।
একফ্ৰাষ্ট্ৰ সাবসা লিকুইড	...	...	১১ আং ।

এক গাম জলে ছোট এক চামচ ঔষধ মিশ্ৰিত কৰিয়া দিবসে তিন
বাৰ খাইতে দিবে ।

বাহ্য প্রয়োগেব মধ্যে গ্লিসেরিন, অলিভ অয়েল এবং য়ালাম ও জিফ প্রভৃতিব ইঞ্জেক্সন্ প্রয়োগ করা যায়

বৈদ্যকে কর্ণরোগ চিকিৎসা ।

বাতজ কর্ণরোগেব লক্ষণ । ইহাতে বায়ুকর্তৃক কর্ণমা শুষ্ক, প্রবণশক্তিব লোপ, কর্ণে বেদনা ও শব্দ হইয়া থাকে

চিকিৎসা ।—মহৎ পঞ্চমূলেব আট অঙ্গুলিপরিমিত কাঠখণ্ড সকল ছেদন করিয়া খণ্ডপট্টবস্ত্রে বেষ্টিত ও তৈলে সিঁকা কবিশ্চ আলিত কবিশ্চ, ইহা হইতে যে সমস্ত তৈলবিন্দু পতিত হইবে, সেই সমস্ত সূত্রেণ অবস্থায় কর্ণে পুৰণ কবিশ্চ এইকপ দেবদারু, কুড় ও সবলকাঠে দীপিকা তৈল প্রস্তুত কবিশ্চ কর্ণে দিবে ইহার নাম “দীপিকা তৈল ”

ইন্দুবটী ।—শিগাজড়, অঃ, লৌহ, প্রত্যেক ১ ভাগ, স্বর্ণ মিকি ভাগ ; এই সমুদায় একত্র কবিশ্চ কাকমাটি, শতমূলী, আমলকী ও গাণ্ধেব রসে ভাবনা দিয়া ২ বতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত কবিশ্চ । আমলকীর রস বা উহার কাথের সহিত প্রতিদিন প্রাতে এক একটী সেব্য ।

পিত্তজ কর্ণবোগেব লক্ষণ ।—ইহাতে কর্ণ জ্বলা এবং বক্ত-বর্ণ শোথ হয়, ইহা বিদীর্ণ হইলে পীতবর্ণ দুর্গন্ধ পুঁথুপ্রাব হয়

চিকিৎসা ।—ভিল তৈল ১ সের, ধুতুরা পাতার রস ৪ সের কল্ক দ্রব্য হবিদ্রা ৮ তোলা । ইহার নাম “নিশা তৈল ।”

বিল্ব তৈল ।—ভিল তৈল ৩ সের, ছাগ দুগ্ধ ১৬ সের । কল্ক—গোমূত্র পিষ্ট বেল শুঁঠ ১ সের এই তৈল কর্ণে পুৰণ কবিশ্চ

কফজ কর্ণবোগেব লক্ষণ ।—ইহাতে কর্ণে কণ্ডু এবং অগ্নি বেদনায়ুক্ত স্থির শোথ হয়, ইহা বিদীর্ণ হইলে স্নিগ্ধ ও শ্বেতবর্ণ পুঁথুপ্রাব হয়

চিকিৎসা ।—কটু তৈলে শম্বকের মাংস সিদ্ধ করিয়া ঐ তৈল কর্ণে পুৰণ কবিশ্চ ইহার নাম “শম্বক তৈল ।”

দশমূলী তৈল ।—তিল তৈল ৪ সের কাথ জবা—দশমূল মিলিত
১২ ০ সেব, জল ৬৪ সেব, শেখ ১৬ সের কল্ক জবা—দশমূল ১ সেব

ত্রিদোষজ কর্ণরোগের লক্ষণ ।—ইহাতে বায়ু, পিত্ত ও কফজ
কর্ণবোগেব সমস্ত লক্ষণ জন্মে এবং কর্ণ হইতে অধিক পানিমাণে পুষ্ণ-
প্রাব হয় ।

চিকিৎসা । তিল তৈল ১ সেব, ছাগুদ্রব ৪ সেব, কল্কার্থে বস্মন,
অমলা, হবিভাল মিলিত ২ পল ইহার নাম “লশুনাঙ্গী তৈল ”

সারিবাতি বটী অনন্তমূল, যষ্টিমধু, কুড়, ওড়ুদ্রব, ভেজপত্র,
এলাইচ, নাগেশ্বর, ত্রিফল, নীলোৎপল মূল, গুলঞ্চ, লবঙ্গ, হবীতকী,
আমলা এবং বহেড়া প্রত্যেক সমভাগ সূর্য্য সুমান অত্র, অত্রৈব সমান
লৌহ এই সমস্ত জবা একত্রিত করিয়া কেশুবিয়ার রস, অঙ্কুরনছালেয়,
কাথ, ঘবের কাথ, কাকমাটির রস এবং কুঁচ মূলের কাথে ভাবনা দিয়া
৬ বতি প্রমাণ বটি করিবে অম্লপান ধবোক্ষ দুগ্ধ, শতমূলী রস বা
চন্দনজন । প্রতিদিন একটি করিয়া সেবন করিবে ।

পরিপোটকের লক্ষণ —কর্ণেব সৌন্দর্য্য সম্পাদনের জন্য কর্ণ-
প্রান্তে বৃদ্ধি কবিত্তে হইলে, অঙ্গ অঙ্গ বৃদ্ধি না করিয়া সহসা বৃদ্ধি কবিত্তে
উহাতে অঙ্গ বিদাবণযুক্ত কৃষ্ণাকর্ণ মিত্রবর্ণ ও শুদ্ধ শোথ হয়

উৎপাতের লক্ষণ ।—কর্ণে ভাবী আভবণ পরিধানে অত্র বা
তাড়ন কি ঘর্ষণে বস্ত্র এবং পিত্ত কুপিত হইয়া কর্ণে শুষ্ক জাল, পানতা
ও বেদনায়ুক্ত শ্যামবর্ণ শোথ জন্মায়

উন্মাদকের লক্ষণ ।—কর্ণপ্রান্তে বনপূর্বক বৃদ্ধি করিলে বায়ু
কুপিত হইয়া কফের সহিত মিলিয়া কর্ণপ্রান্তে শুষ্ক, বেদনাবহিত এবং
কণ্ডযুক্ত শোথ উৎপাদন করে, ইহাকে উন্মাদক বলে ইহা ভিন্ন ত্রিদো-
ষেও ইহা জন্মে সংবর্দ্ধমান কর্ণপ্রান্তে অবিধিপূর্বক বৃদ্ধি হইলে কর্ণে
ত্রিদোষ কর্তৃক জালা ও বেদনায়ুক্ত শোথ উৎপন্ন হয় এবং ইহা প কিয়া
থাকে

পারিলেহীর লক্ষণ ।—কফ, রক্ত, ক্রিমি কুপিত হইয়া কর্ণপ্রান্তে

গগনশীল কণ্ডু, জা । বোদনায়ুক্ত পীড়কা উৎপাদন কবে । এই পীড়কা কর্ণেব পাত্ত ও স্রোত লেহন অর্থাৎ মাংসশূন্য কবে বলিয়া ইহাকে গবিনেহী কহে

কর্ণশুলের লক্ষণ । দুষিত বায়ু স্রীষ স্রীষ কাবনে কুপিত কফ, পিত্ত ও বক্তেব সহিত মিলিত হইয়া কর্ণে অভ্যন্ত ক্লেশদায়ক বেদনা জন্মায়

কর্ণনাদের লক্ষণ —মাংস কর্ণস্রোতে অবস্থিতি করিলে বোগী অনববত ভেদী, স্রুদগ, শঙ্খ প্রভৃতিব শব্দ শ্রবণ কবিয়া থাকে

বধিরতাব লক্ষণ ।—বায়ু অথবা স্লেষ্মায়ুক্ত বায়ু শব্দবহু স্রোত সকল আৱৃত কবিলে শ্রবণশক্তিব লোপ হয়, তজ্জনয় বধিবতা বলে

কর্ণক্ষেতের লক্ষণ —বায়ু, পিত্ত ও কফেব সহিত মিলিত হইয়া কর্ণকূহবে বেগুব অর্থাৎ বাঁশিব স্রাঘ শব্দ কবে

কর্ণস্রাবের লক্ষণ —মস্তকে কোন প্রকার আঘাত হাগিলে অথবা অবগাহন প্রভৃতি কাবনে কর্ণে জল প্রবেশ কবিলে, কিম্বা কান পাকিলে বা বিজধি বোগে বায়ুকর্তৃক কর্ণ হইতে পুঁথ নির্গত হইলে, কর্ণস্রাব কহিয়া থাকে

কর্ণগুথকের লক্ষণ । বায়ু ও কফ মিলিত হইয়া কর্ণে প্রথমতঃ কণ্ডু অর্থাৎ চুলকনা জন্মায় পিত্ত দ্বাবা সেই স্লেষ্মা শুষ্ক হইলে কর্ণে গুথক অর্থাৎ থনি উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাব নাম কর্ণগুথক

কর্ণপ্রতিনাহের লক্ষণ —পূর্বেও কর্ণগুথক তবন হইয়া মুখ ও নাসিকা দ্বাবা নির্গত হইলে তাহাকে কর্ণপ্রতিনাহ কহে ইহাতে বোগীব অর্দ্ধাবভেদক শিববোগ উপস্থিত হইয়া থাকে

ক্রিমিকর্ণের লক্ষণ মাংস শোণিতকোষে কীট জন্মিবে অথবা সন্ধিকান্দি কর্ণবিননে অণ্ড প্রসব কবিলে কীট নির্গত হয় বলিয়া ইহাব নাম ক্রিমিকর্ণক

কর্ণপ্রবিষ্ট পতঙ্গকীটাদির লক্ষণ —পতঙ্গ ও শতপদী অর্থাৎ কেরো প্রভৃতি কীট সকল কর্ণকূহবে প্রবেশ কবিলে অবতি অর্থাৎ চিত্র-চাঞ্চল্য, ব্যাকুলতা ও কর্ণে অতিশয় বেদনা হইয় থাকে, কিন্তু কর্ণপ্রবিষ্ট

কীট সকল চলিয়া বেড়াইলে কর্ণে অত্যন্ত বেদন ও ক্ষয় হয় এবং কীট সকল ম্রিত থাকিলে শব্দ হয় না ও অল্প বেদন হইয়া থাকে ।

কর্ণবিজ্রমির লক্ষণ ।—দোষে অর্শ বায়ু পিত্ত কর্ণে অথবা অভ্রমাত ও ক্ষতাদি কাৰণে কর্ণে বিজ্রমি জন্মিলে বোগী অন্ধকার দর্শন করে, কর্ণে বেদনা, জ্বাল, কর্ণ উষ্ম, কর্ণ হইতে বক্রস্রাব কিম্বা পীতবর্ণ পুষ্পস্রাব হইয়া থাকে

কর্ণপাকের লক্ষণ ।—পিত্তাধিক্য বর্শতঃ কর্ণপ্রোত ভ্রাজ্জ হইলে অথবা কর্ণে জল প্রবেশ কবিলে, কিম্বা কর্ণবিজ্রমি পাকিলে যে, বর্ণবিনন পাকে, তাহাকে কর্ণপাক বলে

পুতি কর্ণের লক্ষণ —ইহাতে কর্ণ হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পুষ্প নির্গত হয় এবং কখন কর্ণে বেদনা থাকে, কখন বা থাকে না

কর্ণশোথাদির লক্ষণ —কর্ণে যে শোথ, অর্শুদ ও অর্শ জন্মিয়া থাকে, তাহাতে যথাক্রমে পূর্বোক্ত অর্শুদ ও অর্শের লক্ষণ সমস্ত উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা ।—কর্ণবোগেব উপবি লিখিত লক্ষণ সমুদয় পূর্বোক্ত বাতাদিব অবস্থাতেদ মাত্র, স্মৃৎবাৎ পৃথক চিকিৎসা চিহ্নিত হইল না ।

হোমিওপ্যাথিকে কর্ণরোগ চিকিৎসা ।

কর্ণে ময়লা জমাট হইয়া থাকা ইহতে বেদন হয় যেন কর্ণেব মধ্যে কোন জিনিস আবদ্ধ হইয়া আছে, কিম্বা এমন হয় যে, রোগী কিছুই শুনিতে পায় না

চিকিৎসা —ক্লেয়ট্রস জলে পিচ্কারী দিয়া অল্প পানিমাগে দ্বিস-
রিণ অথবা ম্যালমও অথেন কর্ণেব ভিতর দিবে

কর্ণে বেদনা অথবা প্রদাহ ।—শীতল বাতাস বা অগ্নি কোন প্রকারে শৈত্য লাগিলে কাণেব ভিতর কট্‌কট্‌ মপ্‌দপ্‌ কবিত্তে থাকে এই যন্ত্রণা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বেগীব পাশে সমস্ত হয়

চিকিৎসা। —শৈত্যশযুক্ত এই ব্যাধি জন্মিলে প্রাতি ঘণ্টায় “যাকোনাইট” প্রয়োগ করিবে

বধিরতা। —কর্ণে মমলা জন্মিয়া যদি বধিরতা হয়, তবে কয়েক বিচ্ছিন্ন গ্লিমবিং অথবা স্যালগু অয়েল দিয়া তুলা বসাইয়া দিবে

টন্সিল্ অথবা গলাব বেদনা জন্ম হইলে বাজে “বেগেডোনা” এবং প্রাতে “মাকুবিয়াম্” দিবে, অথবা ছোট এক চামচ জলে ৩০ বিন্দু “হেপাটিক” দিয়া সেই ঔলে কুচি করিয়া কণ্ঠাব ভিতর ধোত করিবে

মিলমিলা অথবা স্কাল্‌টিনা বোগে অথবা কর্ণেব প্রদাহ জন্ম বধিরতা জন্মিলে কোন ঔষধে ইহাব উপকার দর্শে না

অবশ্যশক্তিসাধক স্নায়ুপক্ষ্যাত হেতু এই বোগ জন্মিলে, পর্যায়ক্রমে “বেগেডোনা” এবং “নক্সভমিকা” প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল দর্শে

কর্ণে পুঁথ পড়া। —কর্ণেব মধ্যে স্ফোটক জন্মে, অথবা শৈত্য হইতে এই পীড়া জন্মিলে বাজে এবং প্রাতে “হিপাব সল্ফার” এবং তাহাব পবে “মাকুবিয়াম্” দিবে

স্কাল্‌টিন, বসন্ত অথবা মিলমিলাব পবে এই বোগ হইলে কর্ণ-ভ্যন্তর হইতে পুঁথ ও বক্ত নির্গত হইয়া থাকে একপ স্তনে রাত্রি এবং প্রাতে “আর্শেনিক” ব্যবস্থা করিবে তাহাব পবে “ক্যাল্‌কেবিয়া” এবং কডলিবার অয়েল ২ তিদিন একবার করিয়া ব্যবস্থা করিবে

দিবসে দুইবার ঔষধ জলের পিচ্কাবী দ্বারা ধোত করিয়া দিবে

হাকিমীমতে কর্ণরোগ চিকিৎসা ।

লক্ষণ। —কর্ণে বেদনা, দুঃসহ যাতনা, কখন কখন কর্ণ ক্ষীভি, তাহাতে পুঁথ নিস্রাব, দুর্গন্ধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। সম্ভব অ বোগ্যলাভ না হইলে ক্রমশ ক্ষীর্ণ ও দুর্বল হয়, এবং নানা প্রকার বোগ উপস্থিত হইয় বোগীব প্রাণ পর্যন্ত নষ্ট করিতে পারে

চিকিৎসা। —প্রথমে গরমজলে বাবান গুলিয়া উত্তমরূপে পিচ্কাবি

দিয়া ধোত করিবে প্রতিদিন প্রাতে এইরূপে ধোত করিবাব পব
দোবাবা মদ ৩ ৪ বিন্দু করিয়া কর্ণের মধ্যে দিতে হইবে

তিসি জলে বাটিয়া তাহান পুন্টিশ কর্ণের উপর গবম গবম দেওয়া
কর্তব্য এইরূপে ক্রিয়া ১০ ১২ দিবস করিলে নিশ্চয়ই বোগ যুক্তি হইবে ।

চতুবিংশ অধ্যায় ।

য়্যালোপ্যাথিকে শিরঃপীড়া চিকিৎসা ।

নূতন এবং পুরাতন উভয়বিধ শিরঃপীড়াই দুই প্রকারে বিভক্ত
যথাঃ—একটার্গাল বা বাহু এং ইন্টারনাল বা অভ্যন্তরিক । আবার
বাহু শিরঃপীড়া ত্রিবিধ, যথা,—পেশীসম্বন্ধীয়, পেরিয়ষ্টিয়মসম্বন্ধীয় এবং
স্নায়ুসম্বন্ধীয় ।

১ । পেশীসম্বন্ধীয় শিরঃপীড়া ।—ইহাতে অক্সিপিতে ফুট লু
এবং টেম্পোরাল পেশীতে বেদনা হয় । ঐ বেদনা প্রায় সমুদয় মস্তকে
ও সাবিত হইয়া থাকে এবং জ্ব বা হ্রুদেশ চালনা করিলে বা অঙ্গুলি দ্বারা
টিপিলে বৃদ্ধি হয় মধ্যে মধ্যে বিবাম পাওয়া যায় এই রোগে মুখ-
মণ্ডলে, গ্রীবাৎ এবং পৃষ্ঠে বেদনা থাকে সীতলতাই ইহা প্রধান কারণ;
তাহাব প্রতিকার হেতু গ্রীবাব পশ্চাতে বেলেস্তানা ব্যবহার কর্তব্য ।

২ । পেরিয়ষ্টিয়ম-সম্বন্ধীয় শিরঃপীড়া ।—মস্তকের পেরি-
য়ষ্টিয়মে বেদনা হয়, এই বেদনা একস্থানব্যাপী, চাপিলে বৃদ্ধি হইয়া
থাকে, কিন্তু পেশীসম্বন্ধীয় বেদনা হয় ন, কখন কখন সেই স্থান ক্ষীণ
হয় কখন মুখে, নাসিকায় এবং দেহের অন্যান্য স্থানে বিস্তারিত হইতে
পারে । উপদংশ রোগের সহিতই প্রায় এই পীড়া হইতে দেখা যায় ।

চিকিৎসা ।—আইওডাইড অফ পটাশিয়ম প্রভৃতি উপদংশ
রোগের ঔষধ ব্যবহাবেই ইহা প্রশান্ত হইয়া থাকে ।

৩ । স্নায়বিক শিরঃপীড়া ।—ইহাকে সাময়িক শিরঃপীড়া
বলা যায় ইহাতে অক্সিকোটরে ও নাসিকায় স্নায়ুতে বেদন হয়,

ঐ বেদনা সূচী বেধনবৎ মস্তকেব বা মুখমণ্ডলেব অর্ধাংশে হইলে ইহাকে অর্ধ কপালীক বেদনা বলে পাঠ্যজবের আঘ ইহা দুই তিন দিবস বা ১০ ১৫ দিবস অন্তর, কখন বা ২ ৪ মাস, বৎসরের কাল অন্তর হইতে দেখা যায় পেশীর সঞ্চালনে বা পীড়নে ইহা বৃদ্ধি হয় না । শৈত্য, আর্দ্রতা, ম্যালেরিয়াই ইহার কারণ ।

চিকিৎসা —কুইনাইন এবং লাইকব আর্শেনিক ইহা ব প্রস্তুত ঔষধ কিন্তু ইহাদের সহিত অন্যান্য বলকারক ঔষধ দিতে হইবে । বলা বাহুল্য যে, বলকারক ঔষধের সহিত পুষ্টিকর পথ্যও দেওয়া কর্তব্য স্থলবিশেষে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহৃত হয় ।

টার্টার এমেটিক	...	৪ গ্রেন
চীং ওপিয়াই	...	৪০ বিন্দু ।

আভ্যন্তরিক শিরঃপীড়া । ইহা ত্রিবিধ, যথা,—রক্তাধিক্য-বশতঃ, অজীর্ণতা-বশতঃ এবং বাহ্যিক পাবিবর্তন-বশতঃ শিরঃপীড়া ।

রক্তাধিক্য বশতঃ শিরঃপীড়া ।—ক্ষীণদেহ, কক্ষমশ্যভাব, দুর্বলদেহ অথবা স্নেহাশ্রয়ান যাতু হইলে এইরূপ শিরঃপীড়া জন্মে । রক্তাধিক্য ব্যক্তিদিগেব এই বোগে মুখমণ্ডল স্ফীত, চক্ষু জলপূর্ণ ও রক্তবর্ণ, শিবা সকল প্রশস্ত ও নাড়ী পূর্ণ হইয়া থাকে ক্ষীণ ও কক্ষম-শ্যভাব ব্যক্তিদিগেব এই পীড়ায় দৃষ্টিপথে আলোক বা উজ্জ্বল চিত্র, কর্ণে শব্দ, হস্তপদাদি শীতল, নাড়ী ক্ষুদ্র, জড় ও বেগবতী, এবং স্বপ্নাবক্র ব্যক্তিদিগের ত্বক্, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও দন্তমাড়ী মলিন, হস্তপদাদি শীতল, হৃৎ-পন, এবং নাড়ী ক্ষুদ্র ও জড়গামী হইয়া থাকে

চিকিৎসা ।—কক্ষমশ্যভাব ব্যক্তিদিগেব মানসিক স্থিতিবতা, উপযুক্ত-রূপে পাকায়, আত্মিক ক্রিয়া সম্পাদন, এবং মধ্য মধ্য অবসাদক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য ; বাহ্যিকালে নিম্নোক্ত ঔষধটি খাইতে দিবে

পিলঃ বিয়াই কন্ ... ২ গ্রেন

এক্ট্রাক্ট কোনিয়াই .. ২ গ্রেন

একটি বাটিকা প্রস্তুত করিবে বাহ্যিকালে এই ঔষধ সেবনেব পন প্রাতে নীচের দিহিত ঔষধ দিবে

সোডিঃ এট্ঃ পটাশ টাট	..	..	১ আং
সোডিঃ বাই কার্ব	...	..	১০ গ্রেন
টীং জিঞ্জার	..	..	২ ড্রাম ।
ইন্ফিউজন্ কলম্বা	...	...	১০ ড্রাম ।

বমনকারক বা অজীর্ণজন্য শিরঃপীড়া ।—পাকায় ও অস্ত্রের ক্রিয়া বিরুদ্ধে জন্য এই পীড়া জন্মে বামদিকের কপালের অস্থি, দক্ষিণ চক্ষু, অথবা সম্মুখের কপালে বেদনা বোধ হয় এই বেদনা প্রায়ই প্রাতে গাত্রোত্তান করিবার পূর্বে আরম্ভ হয় উহার সহিত বমনোদ্বগ, বমন ও উদবাধুন হইয়া থাকে, এবং বেদনা সমস্ত মস্তক-ব্যাপী হয় কোন কোন স্থলে মানসিক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম, ক্ষীণদৃষ্টি এবং কণ্ঠে বাদ্যবৎ ধনি অনুভূত হইতে পারে । বমনের পূর্বে বেদনা, নিবারণ হয়

চিকিৎসা ।—মুহু বিবেচক ঔষধ, যথা :—কার্বো অয়েল প্রভৃতি প্রয়োগে কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইয়া কলম্বা, সোডা, ক্রবার্ব প্রভৃতি পাচক ঔষধ সেবন করাইবে আহ্বানের পূর্বে নিম্নোক্ত বস্তু খাইতে দিবে ।

কুইনি সল্ফ	..	..	১ গ্রেন ।
পল্ভ ইপিক্যাক্	..	..	১ গ্রেন ।
এক্সট্রাক্ট জেন্সমন্	..	...	২ গ্রেন ।

একটি বস্তু হইবে । ইহা দ্বারা অজীর্ণ ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়া শিরঃপীড়া নষ্ট করিয়া থাকে

সো ডা	..	...	১০ গ্রেন ।
হাইড্রাজ কসঃ ক্রিটা	...	...	৫ গ্রেন ।

এক এক মাত্রায় সেবন করাইবে

কেহ কেহ বলেন, বেদনা ধরিবার পূর্বে ৫ গ্রেন কার্বনেট ম্যাগ্নেশিয়া প্রয়োগে একবারেই উহার উপশম হয় ।

যান্ত্রিক শিরঃপীড়া ।—এই বেদনা সমস্ত মস্তকের বা উহার ভিতরের কোন স্থানে অনুভূত হয়, এবং সময়ান্তরে সে স্থান হইতে মস্তকের অন্য স্থানে অন্তরিত হইতে দেখা যায় । মধ্যে মধ্যে এই

বেদনার ক্রাস বৃদ্ধি হয়। বখন একেবারে নিরুত্তি পায় না। ক্রমে পাক্ষ্য-
খাত, আক্ষেপ বা স্থানিক পেশীব আকৃষ্টন দ্বারা স্তম্ভিকৈব নির্মাণেব
পরিবর্তন অবগত হওয়া যায়। এই শিবঃপীড়া মস্তিষ্ক বোগেব লক্ষণ-
বিশেষ বলিতে পারা যায়, তজ্জন্ত প্রকৃত বোগের চিহ্নসমূহ ইহাব
প্রধান চিকিৎসা বলিয়া জানিতে হইবে।

ভার্টিগো ব মস্তক ঘূর্ণন প্রকৃত ঘূর্ণন ব্যতীত নিজের বা
চতুঃপার্শ্ব পদার্থেব গমন বা ঘূর্ণনেব বোধ হয়।

লক্ষণ।—এই বোগ দুই প্রকার। বোগী মনে কবে তাহাব মস্তক
ঘূর্ণিতেছে, অন্য প্রকার মনে কবে বাহ্য পদার্থ সকল অসংস্থিত
থাকিয়া চতুর্দিকে ঘূর্ণিতেছে। শযন, এমন কি নিদ্রিতাবস্থাতেও এইরূপ
মনে হয়। উভয়বিধ পীড়াতেই ইন্দ্রিয়বিশেষেব বৈলক্ষণ্য ঘটিতে
দেখা যায়। কোন পদার্থেব অর্ধেকেব অধিক দৃষ্ট হয় না, অর্ধেক
বৃহৎ, অর্ধেক ক্ষুদ্র দেখিতে পায়, স্বাভাবিক অপেক্ষা সমস্ত বস্তুকে বড়
দেখায়, নীচু স্বর উচ্চ এবং উচ্চ স্বর নীচু বোধ হয়, এবং কখন কখন
বোগী একবারে বধিব হইয়া থাকে।

এই পীড়া পুৰাতন হইলে এপিগ্যাষ্ট্রিক প্রদেশে বেদনা, সমস্ত
মস্তক ভাব বোধ, আহাব কবিলে উপশম হয়। আহাবেব পূর্বে ও
পবে বমনোদ্বেগ এবং দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়েব ব্যতিক্রম ঘটে। অধিক
কাল মদ্য পান জন্ত এই পীড়া হইলে কিছুতেই প্রতিকার হয় ন।

বৃদ্ধাবস্থায় মস্তক ঘূর্ণন প্রায়ই রক্তেব অস্পতা বশতঃ হইয়া থাকে।
ইহা প্রায় স্তম্ভ হয় না।

এশেন্সিয়াল্ ভার্টিগো।—এই পীড়া যৌবনাবস্থাতেই প্রায়
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে স্থান্যেব কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে না,
শিবঃপীড়াব অন্যান্য লক্ষণও দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু বোগীর ক্ষুৎপিও
প্রায়ই দুর্বল এবং নাড়ী ক্ষুদ্র ও মৃদু হয়। অত্যন্ত স্তম্ভ এবং সর্ব-
তোভাবে উদ্বেগশূন্য না হইলে কেবল ঔষধ সেবনে ইহাব প্রতিকার
হয় না।

অতিরিক্ত শ্রমজন্য ভার্টিগো।—যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায়

এই রোগ হইতে দেখা যায় মস্তকধূর্ণন মচনাচব অস্পন্দ্য স্থায়ী ক্রয় ইহাব সহিত ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণ, বমণোদ্রেক, কোষ্ঠবদ্ধ ও জীলোকের রজোবোধ, বুদ্ধিরতির হ্রাস, মানসিক ত্রমবিমুক্ততা, মস্তকে ভারবেধ ও নিরঃপীড়াও হইয়া থাকে পীড়া কঠিন হইলে সম্ভাব্যেব কক্ষমতা, অস্থিরতা ও পীড়া আরোগ্য হইবে না বিনীতা ভাবনা হয় এবং ক্রমে নিজার ব্যতিক্রম ঘটতে পাবে

চিকিৎসা ।—এককালে উদব পুর্তিষ্করিয় আহাব না করিয়া অস্প পবিমাণে আহাব উত্তমরূপে চর্কণ করিবে শীতল জলে স্নান, অস্প বাজে নিদ্রা, ও তাতে গাএৎখান, অপেক্ষাকৃত কঠিন শয্যায় শয়ন, পরিষ্কৃত বায়ু সেবন ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করিবে। সাধারণতঃ আহারেব পবেই ঔষধ সেবন কর্তব্য

কার্বনেট অফ পাটাস	...	১০ গ্রোন।
বিস্মথ্	...	১০ গ্রোন

এক মাত্রা আহাবেব পব সেবনীয়।

টীং নক্সতমিকা	...	৫ বিন্দু
জল	...	১ অং

এক মাত্রা আহাবেব পব সেবন কবাইবে

লাইকব জীক্নিয়া	...	৫ বিন্দু
জল	...	১ অং

এক মাত্রা দিবসে ও বাজে আহাবেব পব সেবন বন ইবে

বুদ্ধাবস্থাব পীড়ায় নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে

ব ই ক্লোরাইড অফ মার্কিউরা	...	১ গ্রোন
টীং ফেরি মিউরিয়েটিস্	...	১৫ বিন্দু।
টীং ক্যান্থারাইডিচ্	...	১৫ বিন্দু।
জল	...	১ অং।

এক মাত্রা উপবোক্ত প্রকারে সেবন কবাইবে

পরিপুষ্ট ব্যক্তিদিগেব অতিবিক্ত পবিমগ জন্ম এই পীড়া হইলে ব্রোমাইড অফ স্যামোনিয়ম ব্যবস্থা করিবে অপরপুষ্ট ব্যক্তিদিগেব

পক্ষে অল্প মাত্রায় ত্রাণ, ক্রমে বাক, কুইনাইন ও লৌহযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে দেহেব পুষ্টি কবিত্তে পাবিলেই উপকার হইবে

এশেন্সিয়েন্স ভার্টিগোতে অধিক দিবস পর্য্যন্ত মাইট্রেট অফ আয়রন এবং ফিট্‌ক্‌নিয়া ব্যবহার কবিলে উপকার দর্শে ছৎপিওব অস্থখ থাকিলে অল্প মাত্রায় বেলেডোনা এবং ডিজিট্যালিস্ ব্যবহারে ফলাভ করা যায়

মিনিজাইটিস্ বা মস্তিষ্কাবরক বিবল্লীর প্রদাহ — সকল বয়সেই এই ব্যাধি হইতে পাবে শৈশবে দন্তোদগমকালে, যৌবন ও প্রৌঢ়ে কোন প্রকার প্রবল জ্বর, যান্ত্রিক আঘাত, এবং বার্ককে্য নূতন ও পুরাতন পীড়ায় এই বোগ দেখা যাব সাধারণতঃ অতিবিক্ত মদ্য পান, মানসিক চিন্তা, বার্ককে্য সূয়া কর্তৃক উদ্বুদ্ধতা, বাতরোগ ইহার সাধাবণ কারণ।

লক্ষণ — এই বোগেব দুই অবস্থায় বহুবিধ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়, বিস্তৃতিভয়ে সে সকল উল্লিখিত হইল না, ফলতঃ সাধাবণ লক্ষণ যাহা লিখিত হইল, বোগজ্ঞানেব পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

মস্তিষ্কাবরক বিবল্লীতে বক্তাধিক্য, মস্তকবেদনা, আলোকদর্শনে ব শব্দশ্রবণে অনিচ্ছা, নিজাহীনতা, প্রলাপ, মুখমণ্ডল আবদ্ধ, চক্ষু অগ্র-পূর্ণ ও বক্তবর্ণ, নাড়ী বেগবতী, হস্তপদাদির কম্পন ও আক্কেপ, ক্রমে নিদ্রেচ্ছা, অচৈতন্য, হস্তপদাদির সম্পূর্ণ শিথিলাবস্থা এবং প্রবল জ্বর ইত্যাদি

চিকিৎসা।—কোন পীড়ার উপসর্গরূপে এই পীড়া হইলে সেই পীড়ার চিকিৎসা ব্যতীত কোন বিশেষ ঔষধ দ্বারা ইহার প্রতিকার লাভ কবা যায় না। যান্ত্রিক আঘাত কর্তৃক ম্যাবাকুনাইটিস্ হইলে মস্তকে শৈত্য ক্রিয়া কববে ও বিবেচক ঔষধ দিবে শৈত্যক্রিয়াব জন্ত শীতল বা বরফমিশ্রিত জল ব্যবহার কববে। সবলশরীর ব্যক্তিদিকেব মস্তিকেব উত্তেজন এবং রক্তসঞ্চালনের আধিক্য হইলে, ক্যালোমেলা সেবন, রক্তমোক্ষণ, জলৌকা ব্যবহার অনেক উপযুক্ত বিবেচনা কবেন

অথগাবস্থায় কলসিম্বে বটী নিম্নোক্ত প্রকাৰে প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে

কলসিম্বে	...	...	১ আং
বার্বেডা স্যালামোজ চূর্ণ	..	..	২ আং ।
ক্যামনি চূর্ণ	..	..	২ আং ।
পটাস সল্ফ চূর্ণ	..	...	৩ আং ।
লবঙ্গ তৈল	..	...	২ ড্রাম ।
পরিণ্যস্ত জল	...	..	প্রয়োজন মত ।

৫ গ্রোণ মাত্রায় এক একটি বটী প্রস্তুত করিবে । অবস্থা বিশেষে ১ হইতে ২ টী বটী প্রয়োগ করা যায়

পাবে সোনাযুক্ত বা লবণাক্ত বিবেচকধাৰা কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে চূর্ণ, বিফলী, মাণ্ডনা, স্যাবোকট, ডিগ প্রভৃতি পথ্য ব্যবস্থা করিবে । রোগীকে অতি সুস্থিৰভাবে অঙ্গকারময় গৃহে রাখিবে ।

এবল লক্ষণাদিব উপশম হইতে আবৃত্ত হইলে যদি অট্টেতন্ত বা কোমার ভাব থাকে, তবে গ্রীবার পশ্চাত্তাগে বেলেস্তারা প্রয়োগ করিবে । বোগেব উপশমকালে যদি স্নায়বিক উত্তেজন থাকে, তবে নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে

টীং হায়েমায়েমস্	..	...	৫ ড্রাম ।
মর্ফিনা	..	..	৪ গ্রোণ ।
জল	...	..	১ আং ।

এক মাত্রা আবশ্যকমত ব্যবহার করিবে

প্রত্যহ কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবার ব্যবস্থা করিবে এবং মনউত্তেজক অথচ পুষ্টিকর খাদ্য দিবে ।

কঞ্জেশচন্ অফ দি ব্রেণ বা মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় ।—
বুদ্ধিবৃত্তি ও শ্রবণশক্তি হ্রাস, মস্তক ভারবোধ ও শীবঃশীড়া, নিদ্রার অস্পৃতা, ভয়ঙ্কর, সপ্নদর্শন, হস্তপদাদিতে স্থচীবেধনবৎ বেদনা, শ্বাসকষ্ট, গাতিশয় দৌৰ্বল্য, ঘূৰ্ছা, প্রলাপ, বমনোদেগ ও মস্তক ঘূৰ্ণন

চিকিৎসা ।—মস্তকে বৰফমিজিত শীতল জল প্রয়োগ, ব্রাডি,

চিকিৎসা।—বিবেচক ঔষধ, পাবদ, বেণেজা ইত্যাদি ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা কর্তব্য। মস্তক মুগুন করিয়া তাহাতে ২ ড্রাম পবিস নে পারদের নিম্নোক্ত মলম মাখাইয়া ক্লানেল দ্বারা মস্তক আবৃত রাখিবাব ব্যবস্থা করা যায়।

মার্কবি ১ আং।

* সিম্পল অয়েন্টেমেন্ট ২ আং।

যদি একমাস বা দেড় মাস মধ্যে উপযুক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা বোগী আরোগ্য লাভে সমর্থ না হয়, তবে ব্যাসিটেট অফ পটাস, স্কুইল, জুনিপার প্রভৃতি মূত্রকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রোগের উপশম হইতে আরম্ভ করিলে অল্প মাত্রায় কুইনাইন বড় উপকারী।

ডাক্তার ট্যানার য়ু বিবেচক ঔষধ, কডলিভাব অয়েল, আইওডাইড অফ পটাসিয়ম, এবং সহজে পবিপাক হয় এমন পথ্য দিয়া চিকিৎসা করেন। তাহাব মতে আইওডাইড অফ পটাসিয়ম অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। তিনি এক বৎসরের শিশুকে ১ গ্রেন পরিমাণে দিবসে ২-৩ বার সেবন করাইবার উপদেশ দেন।

কেহ ব্যাণ্ডেজ বা ফিকিন পলস্তাবা দ্বারা মস্তক বাঁধিয়া রাখিবাব আদেশ দেন। ফলতঃ প্রদাহেব লক্ষণাদি বিদ্যমান না থাকিলে ইহাতে উপকার দর্শিতে পাবে।

স্থানপরিবর্তন এবং গমুস্বাস সেবন এই বোগেব পক্ষে বিশেষ উপকারজনক।

* শুকবেয় চর্কি অর্ক আউন্স, পীত মোম অর্ক আং, ধূনা চূর্ণ ৬০ গ্রেন, একত্র উত্তমরূপে গর্দন করিয়া সিম্পল অয়েন্টেমেন্ট প্রস্তুত করিতে হয়।

বৈদ্যকে শিরোরোগ চিকিৎসা ।

শিরোরোগের প্রকারভেদ ।—কারণ ও লক্ষণভেদে শিরোরোগ একদশ প্রকার, যথাঃ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ-
নিত, ক্ষয়জনিত, ক্রিমিজনিত, সূর্য্যাবর্ত, অনন্তবাত, অর্দ্ধাবভেদক, শঙ্খক ।

বাতজ শিরোরোগের লক্ষণ ।—ইহাতে বিনা কাবণে অর্থাৎ
অদৃশ্য কারণে মস্তকে বেদনা হয় এবং রাজিতে রুদ্ধি পাইয়া থাকে ।
বস্ত্রাদিঘাবা শিরোবন্ধনে এবং মস্তকে স্নিগ্ধ বস্তুর স্বেদ প্রদানে বেদনাব
শান্তি হয় ।

• চিকিৎসা ।—তিল তৈল ১ সের, কাঁজি ১ সের, ভীমরাজেব রস ১
সের । কল্কদ্রব্য—কুঁচ ফল ২ পল

পিত্তজ শিরোরোগের লক্ষণ ।—ইহাতে মস্তক জলন্ত অঙ্গবা-
শ্রমেব ন্যায় বোধ হয়, নাসিকা ও চক্ষু হইতে মুম নির্গমের ন্যায় বোধ
হয়, নৈত্যক্রিয়ায় ও রাজে বেদনার উপশম হয় ।

চিকিৎসা ।—ভিট তৈল ৪ সের, ছাগছক ১৬ সের, ভীমবাজের
রস ১৬ সের । কল্কদ্রব্য—এরওমূল, তগরপাছকা, শুলফা জীবন্তি,
রাঙ্গা, দৈক্ষব, ওড়ুড়ক, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, ঞ্ঠী, মিলিত ১ সের, ইহার
নাম 'বড়বিস্কু তৈল ।'

ময়ূরাদ্য ঘৃত ।—ঘৃত ৪ সের । কাথ দ্রব্য—দশমূল প্রত্যেক
৩ পল, বেড়েলা, রাঙ্গ, যষ্টিমধু প্রত্যেক ৩ পল । তরুণ ময়ূর মাংস ৩
পল, ময়ূরের পক্ষ, পিত্ত, অজু, বিষ্ঠা, যকুৎ, চরণ ও মুখ পরিভাগ করিয়া
মাংস লইবে । পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । হৃৎ ৪ সের ;
কল্কদ্রব্য—জীরক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কঁকলা, ক্ষীৰ কঁকলা,
জীবন্তি, যষ্টিমধু, মুগানি, মাযানি, প্রত্যেক ২ তোলা এই ঘৃত প্রস্তুতের
নিয়মে ইন্দুর, কুকুট, হংস ও শশক ইহাদের মাংসেও ঘৃত পাক ব বা যায়
ততঃ ঘৃতও শিরোরোগাদি উর্দ্ধজরগত পীড়ার উপকার করে ।

কফজ শিরোরোগের লক্ষণ ।—ইহাতে মস্তক বেদনাবত, ভাব, শীতল, শুষ্কিত এবং মুখে ও কানিকোটরে শোথ হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—কটুতৈল ৪ সেব, কাথ জল্য দশমূল প্রত্যেক ৫ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের । আদাব বস ৪ সেব, নিমিন্দা পজেব রস ৪ সেব । কল্ক জল্য পিপ্পলী মূল, চই, চিতামূল, শুষ্ঠী, ত্রিকটু, জীরা, কুম্ব জীবা, শ্বেত সর্ষপ, মৈন্ধব, যবক্ষাব, তেউড়ী, হবিজা, দাক হবিজা, প্রত্যেক ১ তোলা, পাকজন্য জল ৮ সেব । এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও নস্যার্থে প্রয়োগ করিবে ইহার নাম “বৃহৎ দশমূল তৈল ”

শিরোবজ্জ রস ।—পা ১ পল, গন্ধক ১ পল, লৌহ ১ পল, তেউড়ী মূল ১ পল, গুগ্গল ৪ পল, ত্রিফলা চূর্ণ ২ পল, কুড়, যষ্টিমধু, পিপ্পলী, শুষ্ঠী, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ, দশমূল প্রত্যেক ১ তোলা । সমস্ত একত্র মাড়িয়া ১ মাসা প্রমাণ বটিক প্রস্তুত করিবে অল্পপান ছাগদুগ্ধ, জল বা মধু

১১ সান্নিপাতিক শিরোরোগের লক্ষণ ।—ইহাতে পূর্বের জ্বর, শিথ ও কফের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়

চিকিৎসা ।—সর্ষপ তৈল ৪ সেব নোয়াড়, সজিনা, ধুতুরা, বাসক, নিমিন্দা, আকন্দ, দশমূল, কবজ, বেড়েলা, প্রত্যেকে ব রস ৪ সেব কল্ক—পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, কটফল, ধুতুরা বীজ, চই, জীরা, শুলফা, পুনর্গবা, হরিজ, দেবদারু, কেশনাড়ল, শুক মূল, কুড়, ছবালতা, কুম্বজীরা, সিজ আটা, আকন্দ আটা, জয়পাল মূল, নাগাদনা, বিড়ঙ্গ, মৈন্ধব, যবক্ষাব, বক্তচন্দন সজিনামূল, উৎপল, মরিচ, যষ্টিমধু, রাশা, কঁকড়াশর্দী, কটকারী, বকগছাল প্রত্যেক ২ তোলা । ইহার নাম “তপ্তবাজ তৈল ।”

রক্তজ শিরোরোগের লক্ষণ ।—ইহাতে পিত্তজ শিরোরোগের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, অধিকন্তু, রে গী মস্তকস্পর্শে যাতনা বোধ করেন

চিকিৎসা ।—বটু তৈল ১৬ সের । জয়পাল, মলখসিয়া, ধুতুরা, সজিনা, সিদ্ধি, জড়জড়ে ও আকন্দ প্রত্যেকের রস ১৬ সের ও আদাব বস ১৬ সেব কল্ক—হবিজা, দাক হবিজা, যষ্টিমধু, কটফল, কুম্বজীরা,

জিকটু, পিপ্পলী মূল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, বিড়ঙ্গ, বাস্মা, দেবদারু, বেড়েলা, নিমছাল, মুখা, রক্তচন্দন, কোদালিয়া, কুড়ুলিয়া, সিজমূল, মুগুরা মূল, আপাঙ্গ মূল, শুক মূল, জয়গাল মূল, যলঘসিয়া, ধুতুরা পত্র, সজিনাছাল, সিদ্ধি, জড়জড়ে পত্র, আকন্দ পত্র, গৌড়াগেবু মূল ও শুষ্ঠী মিলিত ১ সের ইহার নাম “কঙ্ক তৈল ”

ক্ষয়জ শিরোরোগেব লক্ষণ —মস্তিষ্ক, বক্ত, বায়ু ও শেখাব ক্ষয় হইলে ক্ষয়জ শিরোরোগ জন্মে উষ্ণ প্রলেপাদি প্রয়োগ, বমন, নস্যগ্রহণ, ধূম পান এবং বক্তমোক্ষণ করিলে ইহা আবও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ইহা অত্যন্ত কষ্ট প্রদ ও কষ্টসাধ্য

চিকিৎসা ।—কটু তৈল ৪ সের । কাথার্থ কনক ধুতুরা, আকন্দ মূল, বেড়েলা, দুর্বা, বাসক ছাল, জয়ন্তী পত্র, নিসিন্দা পত্র, ডহর কবজ-বীজ, বায়ুনহাটী, আকৌড় ছাল, পুনর্নবা, কুলশীত্র, সিদ্ধিপত্র, বেলছাল, বৃহতী চিতামূল, সিজমূল, গণিয়ারী মূল, এরও মূল, ভাঁটী, বামবেওণ সৌদাল পত্র, প্রত্যেক ২ পল । পাকজন্য জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । ইহাব নাম “কনক তৈল ”

ক্রিমিজন্ম শিরোরোগের লক্ষণ ।—ইহাতে মস্তকে নানাপ্রকার বেদনা অর্থাৎ মস্তক কামড়ানি ও স্থচীবিদ্ধবৎ বেদনা কবে মস্তক-ভিতরে কীট সঞ্চরণ বোধ এবং নাসিকা হইতে বক্রমিশ্রিত পুঁয় নির্গত হয়, কখন কখন ইহার সহিত ক্রিমিও পতিত হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—কটু তৈল ৪ সের, ধুতুরা কাথ বা বস ১৬ সের কল্ক ত্রব্য—ধুতুরা পত্র ১ সের ।

সূর্য্যাবর্তের লক্ষণ —ইহাতে প্রাতঃকাল হইতে চক্ষু ও জন্মে অঙ্গ অঙ্গ বেদনা আবণ্ড হয়, ক্রমে সূর্য্যোত্তাপেব সঙ্গে সঙ্গে বেদনাও বৃদ্ধি হয় এবং দিবাবসান হইলে বেদনা কমিয়া যায় ইহা ত্রিদে বজ ও কষ্টসাধ্য ।

ক্ষুদ্র প্রয়োগ ।—অনন্তমূল, উৎপল, কুড়, যষ্টিমধু, কাঁজিতে বাটিয়া ঘৃত ও তি. তৈলেব সহিত প্রলেপ দিবে ।

জড়জড়েব বীজ সরসে পেয়ন করিয়া প্রলেপ দিবে ।

নম্যাদি প্রদান করিয়া ওড়ের সহিত ঘৃত ও ঘৃতযুক্ত পিষ্টক ভোজন করিবে

মৌদাল পাতের বস ৪ সের, নবনীত ১ সের, আপাঙ্গবীজ ২ পল, একত্র পাক করিয়া নম্য গ্রহণ করিবে

দশমূঃর কাথে ঘৃত ও সৈন্ধব প্রলেপ দিয়া ইহাব নম্য গ্রহণ ।

শিথীল ও মূলান বীজ, বা বচ ও পিঙ্গলীক নম্য গ্রহণ করিবে

ভৃঙ্গবাজের রস ২ তোলা, ছাগছক ২ তোলা মিশাইয়া বৌজে তণ্ডুল করিয়া নম্য-গ্রহণ করিবে

অনন্ত বাতের লক্ষণ ।—বায়ু পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়া মস্তাদয় অর্থাৎ ঐবাব পশ্চাৎভাগস্থিত শিবাদয় পীড়ন করিয়া ঘাড়ে অত্যন্ত বেদনা জন্মায় ; ঐ বেদন চক্ষু, জ্র এবং শঙ্খদেশের অর্থাৎ কপালের পার্শ্বদ্বয়ে অবস্থিতি করিয়া গণ্ড ও পার্শ্বের প্রকাম্পন, হস্তস্তম্ব এবং নীনা প্রকার চক্ষুরোগ উৎপাদন কবে ইহাতে বাতজনিত নানা প্রকার রোগ জন্মে বলিয়া ইহার নাম অনন্ত বাত ।

চিকিৎসা ।—বাতপিত্তর আহার এবং স্বর্ষ্যাবর্তেব ন্যায় চিকিৎসা করিবে ।

অর্দ্ধাবভেদকের লক্ষণ ।—কণ্ঠ জন্ম ভোজন, ভুক্ত জন্ম জীর্ণ হইতে না হইতেই পুনর্জন্ম ভোজন, পূর্বদিকের বায়ু ও হিম সেবন, অতিশয় জীর্নসর্গ, পরিঃম, ব্যায়াম অথবা মলমূত্রাদিব বেগ রোধ দ্বারা কুপিত বায়ু স্বয়ং অথবা ঐষ্যের সহিত মিশিয়া মস্তকের অর্দ্ধাংশ আশ্রয় করিয়া এক পার্শ্বের মস্তা, শঙ্খ, কর্ণ, চক্ষু ও কপালে যে শত্রুচ্ছেদনবৎ অথবা অগ্নিদাহনবৎ বেদনা উৎপাদন কবে, তাহাকে অর্দ্ধাবভেদক কহে ।

ক্ষুদ্র প্রয়োগ ।—সশর্কব ছক্ক, নারিকেল জল, নীতল পানীয় সগম্পানে উপকার দর্শে ; যতের নম্য বড় উপকারী

নিম্বফল কৃষ্ণ তিল ও জটাংগী পেয়ণ করিয়া মধু ও সৈন্ধব মিশ্রণেব সজিনহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে ।

রস ১ বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল একত্র বাটিয়া জলে গুলিয়া নম্য লইবে ।

মধু চুল্লীৰ স্বস্তিকা চূৰ্ণ ও মবিচ চূৰ্ণ সমভাগ মিশ ইয়া নস্য গ্ৰহণ কৰিব। এতদ্ব্যতীত সূৰ্য্যাবৰ্ত্তে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইতেছে, ইহাতে তাহা প্ৰয়োজ্য

বুদ্ধিপ্ৰাপ্তাৰ্দ্ধভেদকৰ কাৰ্য্য —ইহা অভিয যুদ্ধিপাণ্ডু হইলে ইন্দ্ৰিয়শক্তিব লোপ কৰে

শঙ্খকৈৰৱ চক্ষু —কুপিত মধু, পিণ্ড, কফ মিলিত হইয়া শঙ্খ-দেশে বেদনা জালায়ুক্ত যে বক্তবৰ্ণ শোথ জন্মায়, উহা নিষেব ত্ৰায় তীএ-বেগে মস্তকে যায়, তৎপৰে গলনালীৰ ছিদ্ৰ বন্ধ কৰে বলিয়া ইহাকে শঙ্খক কহে ইহা তিন ৰাত্ৰিৰ মধ্যে বোণীৰ প্ৰাণনাশ কৰে এবং তিন ৰাত্ৰি অতীত হইলে জীৱনেৰ আশঙ্কা থাকে না ইহা তিন ৰাজেৰ মধ্যে প্ৰাণনাশ কৰে বলিয়া ইহাৰ চিকিৎসা উদাসীন থাকা উচিত নহে, কাৰণ তিন ৰাজেৰ মধ্যেও বোণেৰ শাস্তি হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা ইহাতে স্বেদ ক্ৰিয়া ভিন্ন সূৰ্য্যাবৰ্ত্তেৰ সমস্ত ক্ৰিয়া এবং দুগ্ধোৎপাদন নস্য ও পান ব্যবস্থেয়

শতগূলী, নিস্তূৰ কুম্ভ তিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, পূৰ্ণৰ্বা বাটিয়া মস্তকে প্ৰলেপ দিব। মস্তকে দীতল জল দিব ও দুগ্ধ সেৱন কৰিব

বট অশ্বথ প্ৰভৃতি ক্ষীৰি বৃক্ষেৰ ছাল বাটিয়া মস্তকে প্ৰলেপ দিব।

বক, কলহংস, হংস, শনাই পক্ষী ও কচ্ছপমাংসেৰ যুষ পান কৰাইয়া শঙ্খসন্ধিব উৰ্দ্ধস্থ শিৰাজয় বিন্ধ কৰিব

হোমিওপ্যাথিকে শিরোরোগ চিকিৎসা।



ভুক্ত এবং পৰিপাক না হইলে মস্তিষ্ক বা শাৰীৰিক অংশ কে ন ক্ৰিয়াব
ব্যতিক্ৰম ঘটিলে এই পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—অতিরিক্ত মানসিক শ্রম, অধ্যয়ন, আলস্য ও পান-
দোষজনিত কোষ্ঠবদ্ধ, অশৰ্বে উপক্রম, প্রাতে কিম্বা আহ্নাবেৰ অবা-
বহিত পাবে অপাকজন্য এই বোগ উৎপন্ন হইলে—বিশেষতঃ অতিশয়
শিবোবেদনা, চক্ষুর উপরিভাগে ভারবোধ, কপাল টন্টন কবে, মনে হয়
যেন কপাল ফাটিয়া গেল,—এরূপ স্থলে “নক্সভমিকা” সেবনে উপকার
দর্শে

অজীর্ণতা বশতঃ শিবঃপীড়া থাকিলে; বিশেষতঃ শিবঃপীড়ায় বোনা
এক পার্শ্বে আবদ্ধ থাকিলে, মস্তিষ্কে চাপ এবং উহা শূন্য বোধ হইলে
“পল্‌সেটিল” প্রয়োগ কবিবে

সন্মুখ ললাটে ও চক্ষুর উপরিভাগে সম্পূর্ণ ভারবোধ থাকিলে,
আলোক দর্শনে, শব্দ শ্রবণে এবং শরীর সঞ্চালনে কষ্টবোধ হইলে, অথবা
মস্তক দপ্‌ দপ্‌ করিলে, মস্তক উষ্ণ ও মুখমণ্ডল আবদ্ধ হইলে “বেলে-
ডোনা” দিবে

বাহ্যভিভ শিবঃপীড়ায় সমস্ত মস্তকে বেদনা বিস্তৃত হইয়া পড়িলে,
মস্তকেব অন্তঃস্থ স্থানে সর্দি জন্ম বেদনা হইলে, “এইওনিয়া” দিতে
হইবে প্রায়ই আহ্নাবেব পৰ যতনাব সূচি হইয়া থাকে

অম্লপ্রধান ব্যক্তিদিগের মস্তক চাপ বোধ এবং বেদনা সূচি হইলে
“ইমেসিয়া” ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শে।

মস্তকেব উপবিভাগে নিরন্তর বেদনা, পার্শ্বে এবং সন্মুখে নত হইলে
সূচি অম্লভূত হইতে থাকে। এরূপ হইলে “কফিয়া” দ্ব বা ফলপ্রাপ্ত
হওয়া যায়।

শিরোগূর্ণন ।—অজীর্ণতা, অপরিমিত পবিত্রম, উপবাস, এবং রক্তনিঃসরণ ইত্যাদি কাৰণে এই বোগ জন্মে

লক্ষণ ।—মানসিক উদ্বেগ, পতনশঙ্কা, চিত্তবিকৃতি, কর্ণে ভেঁ ভেঁ শব্দ, বাহ্য পদার্থ সকল অব্যবহিত অবস্থায় শ্রুতিতে থাকা বোধ হয় ।

চিকিৎসা ।—অজীর্ণদোষে শিরঃ গূর্ণন হইলে অজীর্ণেব চিকিৎসা যেকপ ব্যবস্থা করা হইয়া হইয়াছে, সেইরূপ চিকিৎসা কর্তব্য অন্যান্য কাৰণ থাকিলে সেই সমুদায়েব ঐ তিকার আবশ্যক

মস্তকে বক্তাধিক্য, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও ক্ষীত, চক্ষু যেন বাহিব হইয়া পড়িতেছে এরূপ বোধ, কর্ণে অস্বাভাবিক শব্দ প্রবল হইলে এবং নানাবিধ দৃষ্টিবৈকল্য জন্মিলে “বেলেডোনা” প্রয়োগ করিবে

বহু রক্তপাত বা শাবীবিধ অব পদার্থের হ্রাসতা বশতঃ এই রোগের উৎপত্তি হইলে “সিনা” দিতে হইবে

এই পীড়া পুৰাতন হইলে প্রায়ই অতিশয় বমন, শিবোবেদনা, মস্তকে ক্ষত আছে এরূপ বোধ হয় এরূপ বোধ হইলে “কম্ফবসু” ব্যবহার করিবে

শূলকায় ব্যক্তিদিকেব ভয়জনক মস্তক গূর্ণন হইলে, তৎসহ এক প্রকাণ্ড শব্দ শুনা গেলে এবং শিবোবেদনা থাকিলে “ওঁপিয়ম” দিতে হইবে

মস্তকের প্রদাহ ।—সাধারণতঃ শিশুদিগেব এই পীড়া হইয়া থাকে দন্তোদ্যমসময়েই এই পীড়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে । বোগের আক্রমণ হইলে শিশু খিট্ খিটে হয়, সর্বদা অসন্তুষ্ট থাকে, কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না, মস্তক ভার বোধ করে, আলোক দেখিতে চাহে না, নাসিকায় বেদনা হয়, সর্বদা মস্তকে হাত দিতে থাকে চক্ষু অস্বাভাবিক ভাণ্ডলে দেখায় । প্রদাহ সত্ত্বেই বুদ্ধি পাইতে থাকে । এই বোগ যার পাব নাই ভয়ানক এবং বিপদজনক ।

চিকিৎসা ।—বমন ও বমনোদ্বেগ থাকিলে “ভেবেট্রম ডিরাইড” ব্যবস্থা করিবে মুখ বক্তবর্ণ এবং উত্তাপযুক্ত থাকিলে “বেলেডোনা” এবং আক্ষেপযুক্ত প্রলাপ শব্দে “হায়েমায়েমসু” দিবে

মস্তিষ্কের ত্রিম্যামান্দ্য —মানসিক চিন্তা, স্মর্যো ওপ, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, মস্তিষ্কে সামান্য বক্তমৎস্থানজন্য এই পীড় জন্মে

চিকিৎসা ।—অজীর্ণ এবং চিন্তাজন্য পীড়া হইলে দিবসে তিন বাব 'নক্সভমিনা' প্রয়োগ করিবে

স্মর্যোওপ জন্য হইলে 'গ্যাকোনাইট' থ ইতে দিবে

মূখেব আবদ্ধতা এবং মস্তকে বক্তমৎস্থান হইলে 'বেলেডোনা' দেওয়া যুক্তি যুক্ত

কোষ্ঠবদ্ধ এবং কণে ভন্ডন্ শব্দ হইতে থাকিলে 'ওপিথম্' প্রযোগে বিশেষ ফল দর্শে

উপবোক্ত ঔষধে উপকাব না দর্শিলে "ককিউ স", 'জেলুমিনিমাম্' দিবে ।

হাকিমীমতে শিরোরোগ চিকিৎসা ।

এই বোগে মাথা দপ্ দপ্ করে, শব্দবেধনবৎ যাতনা অল্পভূত হয়, স্মৃদামান্দ্য, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, কখন কখন জ্বাষুভব হইয় থাকে । ~~স্বাস্থ্য~~ সর্বদাই বিব্রতিত, উদ্বেগযুক্ত এবং কিছুতেই সুখাষুভব করিতে পারে না

চিকিৎসা ।—সর্বপ্রাণে কোষ্ঠ পবিকাব জন্য ভেবেণ্ডাব তৈল অর্ধ ছটাক সেবন করিতে দিবে , এইরূপ ৪৫ দিন অন্তর বিরেচক ঔষধ দেওয়া আবশ্যিক হইবে । তাহারূপ নিম্নোক্ত নস্য ব্যবস্থা করিবে ।

মুটেব ছাই ২ ছোলা ।
আকন্দ আটা আবশ্যিক মত ।

উত্তমরূপে মুটেব ছাই গুলিকে চূর্ণ করিয়া তাহাতে আকন্দ আটা মিশ্রিত করিয়া শুকাইবে যখন উহাতে কিছুমাত্র বস না থাকিবে, তখন ব্যবহার করিবে ।

য্যালোপ্যাথিকে সন্ন্যাসাদি মস্তিস্কীয় রোগ চিকিৎসা ৪৬১

পাতিলেবুকে গোববেব ঠুলীব মধ্যে রাখিয়া অগ্নিতে দধ্ব কবিয়া
সেই লেবুব সহিত ছাগলদুগ্ধ উত্তমরূপে মর্দিত কবিয়া মস্তকে দিবে ।

দাকচিনি চূর্ণ ... ১০ তোলা

শতধৌত ঘৃত . ১ তোলা

একত্র মিশ্রিত কবিয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে । *

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

য্যালোপ্যাথিকে সন্ন্যাসাদি মস্তিস্কীয় রোগ চিকিৎসা ।

য্যাপোপ্লেক্সি বা সন্ন্যাস ।—এই পীড়ায় করোটি মধ্যোক্ত
কারণে হঠাৎ মস্তিষ্ক পীড়িত হওয়ায় হঠাৎ অচেতন্য, স্পর্শানুভব ও ইচ্ছা-
মস্তিষ্ক অবস্থায় হয় বেগী যেন কে'ন অ'ঘ'ত প্র'প্ত হইয়া অকস্মাৎ
অজ্ঞান হইয়া পড়ে

লক্ষণ ।—বোঁগাক্রমের পূর্বে শিরঃপীড়, মস্তক ঘূর্ণন, মস্তকে ভাব
বোধ, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, মানসিক ক্রিয়াবৈকল্য, বাক্যকথনে অস-
মর্থতা, মুখমণ্ডল রক্তপূর্ণ, দৃষ্টিপথে উজ্জ্বল চিহ্নানুভব, নাগা হইতে
রক্তস্রাব, কর্ণে শব্দ, কখন কখন অস্পষ্টতা ও বধিরতা, নিশ্বাসব্য, বমনো-
দ্বেষ্ট, বমন, দৌর্বল্য ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় কখন কখন এই
সকল পূর্বলক্ষণ ব্যতীত বোঁগী অকস্মাৎ মুর্ছিত হইয়া পড়ে ।

মুর্ছাকালে বোঁগীর নিম্নোক্ত অবস্থা ঘটিয়া থাকে । সম্পূর্ণ অজ্ঞান,
মুহু এবং শব্দযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস, এইরূপ শ্বাসপ্রশ্বাসকালে ফুৎকারবৎ
শব্দ, গলাধঃকরণে কষ্ট, মুখমণ্ডল শ্বেত ও রক্তপূর্ণ, চক্ষু উজ্জ্বল এবং
স্পন্দনবহিত, চক্ষুর তারা আকৃষ্ট, হস্তপাদাদি স্পন্দনবহিত, কঠিন
বা আকোপযুক্ত, হস্তপাদাদির এই অবস্থা দেখেব এক পার্শ্বে অথবা কেন্দ্রে
একান্তে হইতে পারে । কোষ্ঠবদ্ধ অথবা ইচ্ছা অসম্ভবে মনস্তত্ত্ব ৩ গ,

কিন্তু মুত্ৰাশয়ে মুত্ৰ সঞ্চিত হইয়া বিন্দু বিন্দু মুত্ৰ নির্গম, নাড়ী পূর্ণ এবং কঠিন ও বেগবর্তী, কখন বা স্বাভাবিক অপেক্ষা অল্প বা অধিক জ্ঞাতগামী হয় কোন কোন স্থলে রোগী একবারে সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয় না, শব্দোচ্চ বণী পেলীষ আক্ষেপ হেতু কথা কহিতে অসমর্থ হইলেও সংক্লেতদ্বারা নিজেব অভিপ্রায় ব্যক্ত করে ।

চিকিৎসা —ইহাব চিকিৎসা দুই প্রকার প্রতিষেধক অর্থাৎ যে উপায় অবলম্বন করিলে পীড়া না হইতে পারে, আর পীড়া আক্রমণ করিলে যে যে উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—এই দুই প্রকার

প্রতিষেধক —অতিবিক্ত শারীরিক জগ, অধিক স্ত্রীসংসর্গ, অতিরিক্ত সুরাপান, মনসিক উদ্বেগ, অতিবিক্ত শৈত্য বা উষ্ণতা সেবন, মন-তাগে বেগ, উষ্ণ জলে স্নান, মস্তক অবনত করিয়া চিন্তা বা কার্য্যকরণ ইত্যাদি পরিহার করা উচিত এই বোণীক্রান্ত বোণীব সকল বিষয়েই পবিমিতাচাৰী হওয়া কর্তব্য শিবঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন, মস্তকের ধমনীর স্পন্দন, নামা হইতে রক্তস্রাব থাকিলে মধ্যে মধ্যে বিবেচক ঔষধ ও গ্রীবার পশ্চাতে বেলস্তারা প্রয়োগ করিবে দেহে রক্তাশ্পতা থাকিলে অল্প মাত্রায় লৌহখাটত ঔষধ, লুপ্ত, এবং ডিম্ব খাইতে দিবে

পীড়া আক্রমণকালীন চিকিৎসা ।—রক্তমোক্ষণ এই রোগে কেহ কেহ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন যদি নাড়ী পূর্ণ, গ্রীবার ধমনী স্ফীত ও স্পন্দনশীল, মুখমণ্ডল স্ফীত ও আরক্ত ইত্যাদি লক্ষণ স্বেচ্ছা অচেতন দ্বারা বোণীর মৃত্যু-সম্ভাবনা থাকে, কিয়ৎ পবিমাণে রক্তমোক্ষণে উপকার দর্শে, নতুবা নাড়ী দুর্বল, হৃক স্বর্ণাক্ত এবং সিনকোপি দ্বারা মৃত্যুর আশঙ্কা থাকিলে কোন মতে রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা নহে ।

উভয়বিধ বোণীকেই শীতল এবং বায়ুসঞ্চালিত স্থানে রাখিয়া মস্তক উন্নত করিয়া রাখিবে । শীতল বা বরফজল দ্বারা মস্তক শীতল রাখি-বাব চেষ্টা করিবে অতি বিবেচক ঔষধ ইহাতে বিশেষ ফলপ্রদ । পূর্ণ মাত্রায় জেলেফা ও ক্যালোমেল সেবন করাইয়া নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে

ম্যাগ্নেসি সলফ্	...	...	২ ড্রাম ।
ম্যানা	...	...	১ ড্রাম ।

য্যালোপ্যাবিকৈ সম্যাসাদি মস্তিস্কীয় রোগ চিকিৎসা । ৪৬৩

টীং জেলেকা ... ২ ড্রাম ।

য্যাকোয়া মেম্বঃ পিপঃ ... ১২ আং ।

এক মাত্রায় সেবন কবাইবে ।

রোগী ঔষধ গলাধঃকরণে অসমর্থ হইলে কিছু চিনিব সহিত ২ ও
বিন্দু ক্রোটন অয়েল (জয়পালের তৈল) জিহ্বাব নীচে রাখিয়া দিবে ।

এই অবস্থায় নিম্নলিখিত উত্তেজক ঔষধের পিচকারী দিবে

অয়েল আনিশা ... ১২ আং ।

অয়েল টিরিবিম্ব ... ৪ ড্রাম ।

টীং য্যাসাফটিডা ... ১২ ড্রাম ।

মাবানেব জল ... ২ আং ।

একত্র মিশ্রিত কবিয়া পিচকারী দিবে । অথবা—

অয়েল ক্রোটন ... ৬ বিন্দু ।

অয়েল রিনিসি ... ১ আং ।

অয়েল টিরিবিম্ব ... ২ ড্রাম ।

ডিকট্ট হোর্ডিয়াই ... ৮ আং ।

এই অবস্থায় কখন মস্তকে ও গ্রীবায পিচকারী দেওয়া আবশ্যক
হয়

রোগী চৈতন্যলাভ কবিলে আর পীড়া না হইতে পারে, এজন্য উত্তে-
জক ঔষধ, কোন প্রকারে শরীরের উত্তেজনা, মানসিক উদ্বেগ পবিহার
করা কর্তব্য হুঙ্ক, অণু প্রভৃতি পুষ্টিবব খাদ্য দিবে মদ্যপান এক-
ধাবে নিষিদ্ধ ।

কন্বকসন্ অফ দি ব্রেন বা মস্তিস্ক বিকল ।—মস্তকে
কোন প্রকার বাহ্য আঘাত কর্তৃক মুর্ছা, জড়তা, বমনোদ্বেগ, বমন, অটৈ-
ভন, পেশীসমূহের স্পন্দনশক্তির অভাব বা হ্রাস, শ্বাস প্রশ্বাস অনলুভাব্য,
দৌর্বল্য, কম্পানুভব, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় কিঞ্চিৎ চৈতন্য
হইলে চিত্তচঞ্চল্য, বাকোচ্চারণে অসমর্থতা, হস্তপদাদিব পক্ষাঘাত হইয়া
রোগী প্রাণত্যাগ করে

কখন কখন বেলগে-কর্দটনায় স্বাধমগুল নিকম্পিত হইয়া হঠাৎ

এই পীড়া হইতে পাবে এই বোগে শবীর শীতল, ন ডী স্নাত্তাবিক থাকে, এজন্য এই প্রকাবের অন্যান্য বোগ হইতে সহজে পৃথক করা যায় ।

চিকিৎসা - অতিসাবধানে বোগীৰ তত্ত্বাবধাৰ কৰিবে প্রাতি-ক্রিয়া অবস্থায় গাৰ উষ্ণ হইলে মস্তক সোজা কৰিয়া উছাতে শীতল বা বরফজল দিবে । দুই তিন বিন্দু জয়পালেৰ তৈল জিহ্বায় সংযোগ কৰিয়া দিলে উপকাৰ দৰ্শে, কিন্তু স্নায়বিক ক্রিয়া প্রায়ই এত দুৰ্বল হয় যে, কিয়ৎ পৰিমাণে জগেৰ সহিত অঙ্গ মদিৰা প্রয়োগ আবশ্যক হইয়া থাকে । গাত্র শীতল হইলে বাহ্য উষ্ণতা প্রযোগে নিবাবণে চেষ্টা কৰবে তাহাব পৰ মানসিক ও শাৰীৰিক শ্লথতা সম্পাদনের চেষ্টা কৰা এবং লঘু ও পুটিকৰ পথ্য দেওয়া কৰ্তব্য

মানুষ্ট্রোক বা স্নর্দিগরমি ।—গ্রীষ্মকালে প্রথমে স্বর্ষাক্রমণে মস্তক অনাবৃত কৰিয়া অধিক পরিমম কৰিলে এই পীড়া জন্মিতে পাবে । ইছাতে অকস্মাৎ বোগী ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হয়

লক্ষণ - ত্বক উষ্ণ, মস্তকধূৰ্ণন, চক্ষু বক্তবর্ণ, স্নাত্তিময় দৌৰ্কল্য, বমনোদ্বগ, বাবস্বাব মুজত্যাগেৰ ইচ্ছা, কখন কখন রোগী হাসিতে থাকে, দণ্ডায়মান হইয়া কাহাব সহিত যেন বিনাদ কবিত্তে উদ্যত, সমন শ্বাস পতন, চক্ষুৰ তাৰা আকৃষ্ণিত, চক্ষু বক্তবর্ণ ছংপিণ্ডের ক্রিয়া বৃদ্ধি, নাড়ী বেগবতী, আক্ষেপ প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া রোগীৰ মৃত্যু হয় এই বোগে শবীরের উষ্ণতা ১১২ ডিগ্রী পর্যন্ত হইতে দেখা যায়

চিকিৎসা ।—১৫।২০ ডিগ্রী শীতল একপ স্থানে রাখা আবশ্যক মস্তক মুগুন কৰিয়া তাহাতে, মুখমণ্ডলে, গ্রীবাদেশে এবং বক্ষঃস্থলে শীতল জল ব্যবহার কৰিবে এই সকল স্থানে উচ্চ হইতে জলধারা পাত অথবা জলের ছিটকা দেওয়া কৰ্তব্য বোগীকে আৰ্জ বস্ত্র দ্বাৰা আবৃত কৰিয়া পাখা দ্বাৰা বাতাস কৰিলে উপকার হইতে পারে । শীতল জল এবং সববত পান কৰিতে দিবে এরও তৈলে সেবন কিম্বা পিচকাবী দ্বাৰা কোষ্ঠ প বিষ্কার কৰাইবে এরও তৈশেব পিচকাবী দিয়া পবে তাপিণ তৈলেৰ উচ্চ ব্যবস্থা কৰিতে হইবে । চৈতন্য না হইলে মস্তকে অথবা

স্বাংলোপ্যাথিকে সন্ধ্যামাদি ৩ ত্তিকীয় বোঃ চিকিৎসা। ৪৬৫

প্রীবায লইকর লিটীব বোলাস্তাব দিবে নাচী নিস্তজ হইবে গবঃ
উষধ দেওয়া যুক্তিযুক্ত।

শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক না হইয় যদি গলা ঘডঘড় কবিত্তে
থাকে, তবে বোগীকে উপুড় করাষ্টবে ও পার্শ্ব সংস্থানে স্থাপিত কবিবে
কনুতগুম্ব বা আক্ষেপ হইলে ক্রোনফর্ম্ আমোন করাষ্টলে বিশেষ
উপকার দর্শে, কিন্তু বিশেষ সতর্কতাব সহিত ব্যবহার কবিত্তে হইবে
পূর্বেক্ত প্রকারে শীতল জলের সেকও ইহাতে সম্ভব নয় বরং
উষ্ণতা নিবারণ জন্ত বরফ দ্বারা গায় মার্জন করা কর্তব্য। যত্নকে
শীতল জ- এবং গাজে উষ্ণ জল ব্যবহার কবিবে কুক্ষিতলে বরফখণ্ড
স্থাপন কবিবে এই সকল পত্রিয়া ধান বোগী অ বোগ্য ল ড চাব
নেও পাবে নিঃশীড়া, যুগী, স্মৃতিশক্তি হানি হইতে পাবে তজ্জন্ত
শীতল প্রদেশে ব গ, শাবীবিক্রম, বেলেক্স প্রয়োগ, এবং আইওডাইড
অফ পটাসিয়ম্ ইত্যাদি ব্যবস্থা কবিলে উপকার দর্শে

কোরিয়া। অধঃশাখ, উর্ধ্বশাখা বা দেহের অন্য কোন অঙ্গে
পেশীর অটেনজিক স্পন্দনশতঃ বোগী স্থিতিভাবেন কোন বস্তু ধবিত্তে বা
মুখে তুলিত্তে পাবে না, এজন্ত এই বোগীকে পেশীবিকারও বলা গিয়া
থাকে বালকদিগের মধ্যে এই বোগ অধঃশাখ ন হইতে ও ১২ই
ছয় হইতে পনের বৎসরের বালকদিগের মধ্যে সাধাবাত্ত। এই বোগ
দেখিতে পাওয়া যায়

লক্ষণ।—ক্রনিক স্প্যাজম অর্থাৎ একবারেই বেননানিচীন এ
ক্রোধাবিষ্ট শিশুর অস্থিভাব মত নিজেব ইচ্ছ ব্যতীবেক এইকণ
স্পন্দন হইয়া থাকে অতি সমান্তরূপ হইলে গায় অনুভূত হয় না

বিকৃত স্পন্দন জন্ত বোগী সর্কদা.নাস্ত থাকে কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায়
এই স্পন্দন একবারেই থাকে না ইহা লায় ছই অদেই আক্রমণ
কবিত্তে দেখা যায়, কদাচ কেবল মাত্র একাধে স্পন্দন দেখিতে পাওয়া
যায়। একপ হইলে ছেমি বা অর্ধ-কোরিয়া কহে বোগীর সাধাবৎ
স্বাস্থ্য সচরাচর অনায়াসে থাকে কোন প্রকার উদ্দীপন হইলেই
স্পন্দনাদি লক্ষণমকল দৃষ্টিগোচর হয় বরং অস্পষ্ট হেতু পায়ই এই

বেগে ক্ষুৎপিণ্ডেব ক্রিয় বিষম হয় এবং কখন কখন উহাতে শঙ্গ ও ত ছড়া যায় কোন স্থানে বাতজ্বৰ ইহাব সমভিব্যাহাবে হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—পুষ্টিকৰ খাদ্য, সাধাবন স্নাত্তোৰ প্ৰতি যত্ন লাইলেই অনেক স্থলে পীড়া নিবৃতি পায় বোগী প্ৰাপ্তবয়স্ক হইলে পাক শয ও মূত্ৰাশয়েব ক্রিয়াব প্ৰতি দৃষ্টি বাখিতে হইবে, এবং নিম্নোক্ত ২ কাবে ঔষ-
ধেব ব্যবস্থা কবিবে

কাৰ্বনেট অফ আয়বন ৫ গ্ৰেণ ।

সিবপ. ফেবি আইওডাইড ১ ড্ৰাম ।

এক মাত্রা আবশ্যকমত ব্যবহাৰ কবিবে

ভাইনিং ফেবিং ৪ আং ।

লাইকবিস্ আর্শেনিকেলিস্ ২০ বিন্দু

সিবাপি জিজ্জিবেবিগ্ ১২ আং ।

ছয় মাত্রা বড় এক এক চামচ জলেব ৩ ছি ৩ এক এক মাত্রা ঔষধ

দিবসে তিন বাব

সোডি হাইপোফস্ফাইট ৪০ গ্ৰেণ

ইন্ফিউজন্ চিবাতা ৭১ আং

ছয় মাত্রা দিবসে তিন বাব

কডলিবাব অয়েলও ইহাব অন্ততম ঔষধ পুষ্টিকৰ খাদ্য, হৃদ্ধ, সমুদ্রজলে স্নান, নিৰ্গল বায়ু সেবন, পবিত্ৰিত ব্যায়াম ব্যবস্থা, মনসিক অগ একবারে নিষিদ্ধ ।

ছিষ্টিৰিয়া ।—এই পীড়া সচবাচৰ পৰিস্কৃত মূত্ৰ ভ্যাগ, অজ্ঞেব ক্রিয়াবিকাৰ, গলাব ভিতব যেন কোন গোংগাকাব বস্ত্ৰ উৰ্দ্ধদিকে উঠি-
তেছে, এইরূপ অসুভবেব সহিত বোগেব আক্রমণ হয় স্নায়ুগ্ৰধান দাতু-
বিশিষ্ট স্রীলোকদিগেব ঘোবনাবস্থায় এই পীড়াব প্ৰাক্কুৰ্ত্তাব দেখা যায়

লক্ষণ ।—বোগী ক্রমণকালে বোগী প্ৰায় সম্পূৰ্ণরূপে আত্মজ্ঞান শূন্য হয় না, মুগ্ধিত হইয়া ভূতলে পতিত হইবাব সময় আপনাকে আঘাত হইতে বন্ধা কবিবাব চেষ্টা কবে । তৎকালে মূৰ্গী মূৰ্ছাব স্নায়ু মুগ্ধ নিভান্ত বিকৃত, ভয়ানক এবং চক্ষেব তাবা নিভৃত হয় ন বিশেষ

য্যালোপ্যাথিকে সম্যাসাদি মস্তিস্কীয় রোগ চিকিৎসা ৪৬৭

পৰীক্ষা কবিয়া দেখিলে জানা যায়, বোগী যেন কোন বস্তুৰ প্রতি দৃষ্টি করিয়া আছে দন্ত দ্বাৰা জিহ্বা কর্তন কবেনা, এবং মুখ হইতে ফোঁটা বাহিবও হয় না প্রাণাশ্বাসে কষ্ট থাকিলেও কষ্ট হইবার ন্যায় কোন মতে বোধ হয় না লক্ষণ সমুদায় যে সকল স্থানেই এক প্রকার হইবে এমন কিছু নিশ্চয় নাই।

রোগী কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন উগ্রভাবে বাক্য প্রয়োগ করে, কখন বা ক্ষমা প্রার্থনা করে এই আক্রমণ কখন ২ ৩ মিনিট, কখন বা ২ ৩ ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে

চিকিৎসা।—পীড়ার আক্রমণ কালে পবিধেয বস্ত্র আঁচুগা কবিয়া দিবে। কোন বস্তুতে পড়িয়া গিয়া বা হাত পা আছড়াইয়া রোগীর সঙ্গে কে ন আঘাত না লাগে তাহার জন্য সাবধান থাইবে বোগীকে শীতল বাতাসে লইয়া যাইবে, অথবা যাহাতে তাহার গাত্রে শীতল বাতাস স্পর্শ হয় এমন ব্যবস্থা করিবে নামাণ্ডে য্যামোনিয়া ধাবন করিতে হইবে যদি রোগী গাধঃকরণে সমর্থ হয়, তবে 'য্যামোনিষেটেড টিংচার অফ ভেলেবিয়েন' খাইতে দিবে স্পষ্ট জ্ঞান থাকিলে মুখে এবং মস্তকে শীতল জল প্রয়োগ করিলে ফিট্‌দূর হইলে যাহাতে আর না হইতে পারে তজ্জন্য নিম্নোক্ত ঔষদ ব্যবস্থা করিবে।

মিস্চুবা ফেবি কম্পাঃ	...	৪ আং।
ডিক্টঃ য্যালোজ কম্পাঃ	...	৪ আং।
জিন্সি মল্ফ্যাটিস্	...	১২ গ্রোন।
ছয় মাত্রা দিবসে দুই বার	.	
ফেবি এট্‌ য্যামোনি সাইট্র্যাটিস্	...	৪০ গ্রোন।
লাইকবিস্ স্ট্রীকনিয়া	...	১ ড্রাম।
ইন্‌ফিউজি কোয়াসিয়া	...	৭১ আং।
আট মাত্রা দিবসে দুই বার	.	
জিন্সি মল্ফ্যাটিস্	.	২৪ গ্রো.
এন্‌ নিউমিস্ ভমিকা	.	৩ গ্রো.।

একটি বেয়াই	৩০ গ্রোন
১ বটী ১টি ২ ৩৩ নিচো	একটি কনিয়া বটী দিবসে দুই বাব
পটাসি ব্রোমাইডি	৩০—৯০ গ্রোন
পটাসি আইওডাইডি	১২ গ্রোন
পটাসি বাই কার্বনেটিস্	৪০ গ্রোন
টিং অব্যাক্সাই	৫২ ড্রাম
জল	৭২ আং

ছয় মাছ। খালি পেটে প্রাতে এবং রাতে এক এক বাব খাওয়াইবে।

কুইনাইন, আয়রন, কডি-বাব অথেন প্রভৃতি ইহার মহোপকারক ঔষধ

পুষ্টিকর খাদ্য, খোলা বাতাসে ভ্রমণ বা সামান্য ব্যায়াম, সমুদ্রজলে স্নান, বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ, মুত্রাশয়ের ক্রিয়াব প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য

এপিলেপ্সী বা মৃগী —এপিলেপ্সী শব্দের অর্থ আকস্মিক অ'ক্রমণ' অ'কস্মাৎ মনো বিকাব বা মূর্ছন' ও অ'অজ্ঞানবাহিত্য ইত্যাদি লক্ষণেব সহিত অনেক স্থলে স্থানিক বা মার্কজিক ব আক্কেপ বর্তমান থাকে, কিন্তু সকল স্থলে তাহ দেখিতে পাওয়া যায় না।

লক্ষণ —পীড়া উপস্থিত হইবার সময় নিম্নোক্ত লক্ষণ সমুদায় প্রকাশ পায় —আজ্ঞানান্যতা, স্পর্শমুতর শক্তিব অভাব, দেহেব পেশীব আকুঞ্জন, অক্ষিগোলক, মস্তক, বাহু এবং দেহ যেন মোড়া দেওয়া বোধ হয়, ক্রন্দনাৎ শব্দে সহিত শ্বাসকষ্ট বা শ্বাসানবোধ, কখন কখন নিশ্বাস একবারেই শুনিতে পাওয়া যায় না। মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হয়। ইহা পূর্ন্য অপেক্ষা জীজ্ঞাসিত্ব অধিক হয়। কখন মুখ উজ্জ্বল, শ্বেত ও রক্তবর্ণ দেখায়, চক্ষুেব তাবা বিজ্ঞত, নাড়ী আন্তাবিক অতি দুর্বল, শিবাসকল বিজ্ঞত অস্বভাব হয় দন্ত ঘর্ষণ, দন্ত দ্বারা জিহবা কূর্জন, অনৈচ্ছিক মল মুত্র বা শুক্রতাগ, অজ্ঞমধ্যে গড় গড় শব্দ, হিকা, বমন, অক্ষিগোলক ঘূর্ণন, সমস্ত শ্বাস পতন, বক্ষ বিজ্ঞত, নাগা ২ শব্দ এবং মুখ হইতে ফেনা বাহিব হইতে থাকে মুখমণ্ডল ও মস্তক দেহ মলিন,

য্যালোপ্যাতিকৈ সন্ন্যাসাদি গণ্ডিকীয় রোগ চিকিৎসা ৪৬৯

নীতন ও ঘর্ষণ, নাড়ীৰ স্পন্দন এবং হৃদেপন হইতে থাকে, এই অবস্থা কয়েক সেকেন্ড হইতে ৫ ১০ মিনিট পর্যন্ত থাকে

ক্রমে এই সকল লক্ষণ অপসৃত ও বোগীৰ চৈতন্যোদয় হয়। তখন রোগী ছুৰ্জন ও শান্তি বোধ করিয়া মোহবৎ নিজায় অভিভূত হয়। সে নিজা হইতে সহজে বোগীকে জাগ্রত করিতে পারা যায় না। কখন কখন স্বপ্নদর্শনে নিজা ভুজ হয়, এবং সকল বিষয়েই বিবর্তিত বোধ হয়

কারণ —মাতা পিতার এই পীড়া থাকা, মস্তকের বিকৃত নির্মাণ, স্নায়ুপ্রধানধাতুবিধিষ্ট ব্যক্তিদিয়েব দৌৰ্বল্য, অপরিমিত মদ্যপান, অধিক জীসংসর্গ, হস্তমৈথুন ইত্যাদি পূর্ববর্তী কারণ অকস্মাৎ ভয়, ক্রোধ বা মানসিক উদ্বেগ, হস্তমৈথুন, মস্তকে আঘাত, মস্তকে বক্তাদিকা, বক্তপ্রাব জন্ম মস্তিকে এবং কশেককা মজ্জায় বক্তাপ্পাত, ক্রিমি, দন্তোদ্যম, সাতিশায় বেদনা, পিত্ত, মূত্রের স্বপ্পাত, মস্তিকে কোন প্রকার টিউমার, আর্শেনিক বা সীসক দ্বারা বিষাক্ততা, বাত বোগ ইত্যাদি ইহার উদ্দীপক কারণ।

চিকিৎসা। — বোগী কম কালীন চিকিৎসা। — এই অবস্থায় রোগী আপনাব দেহেব কোন স্থানে আঘাত করিতে না পাইবে এবং শ্রীবাব বক্তবহা নাড়ী নিপীড়িত হয় এমন চেষ্টা করিবে। উত্তমরূপে বায়ুসঞ্চালিত গৃহে রোগীকে স্থাপিত করিয়া কোমল শয্যায় শয়ন কবাইবে। জিহ্বাব দংশন নিবারণ জন্ম উভয় দন্তপাতিব মধ্যে কাঠ খণ্ড, বেতলেব ক কবব বা নেকড়াব পুঁটুলী বাখিয়া দিবে। মুখমণ্ডল বক্তপূর্ণ হইলে শীতল জল ব্যবহাবে উপকার দর্শে। অক্রমণাবস্থায় ইলেক্ট্রিসিটি প্রাণাংগে উহার স্থিতিকাল অল্প হইতে পাবে।

আক্রমণের মধ্যবর্তী সময়ের চিকিৎসা। — সাধারণ স্নায়ু-বক্তা এবং স্নায়ুগুণ স্নায়ু রাখিতে চেষ্টা করিবে। আক্রমণের উদ্দীপক কারণ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসায় প্রয়ত্ত হইবে। কোষ্ঠবদ্ধ বা মস্তকে রক্ত দিক্য থাকিলে ক্লবার্গ, কম্পাউণ্ড কলসিন্থ পিল, য্যালো, এবং তৈল প্রভৃতি বিবেচক ওষধ দিবে। শ্রীলোকের বক্তোপ্রাব বদ্ধ হইলে তাহার

প্রতিকার কবিতে হইবে ত্রি মিব. সন্দেশ থাকিলে অর্ধ ড্রাম মায়ায
তাপিনিতৈল সেবন করাইবে ।

আজিক লি বিশেষ পৰীক্ষা দ্বারা স্থিৰীকৃত হইয়াছে যে, এই পীড়া
প্রবল ব্যক্তিদিগেব জীবনীশক্তির হ্রাস হইলেই রোগাক্রম হইয়া থাকে,
ওজ্ঞা কুইনাইন, জিঙ্ক, ফস্ফস্ প্রভৃতি বলকাবক ঔষধ ব্যবহর
কবিতে হইবে নিম্নোক্ত প্রকাৰে জিঙ্ক ব্যবহাব কবা যায় ।

ভ্যালিরিয়েনেট অফ জিঙ্ক ... ১২ গ্রোন ।

সল্ফেট অফ কুইনাইন ... ৬ গ্রোন

পিল্ বিয়াই কমঃ ... ৩০ গ্রোন ।

বাবটী বটী হইবে ; প্রতিদিন তিনটী প্রয়োগ কবিবে "

ভ্যালিরিয়েনেট অফ জিঙ্ক ... ১৮ গ্রোন ।

ফস্ফেট অফ জিঙ্ক ... ১৮ গ্রোন ।

এক্সট্রাক্ট রিয়াই ... ২৪ গ্রোন

বাবটী বটী হইবে প্রতিদিন ৩ টী কবিয়া সেবন করাইবে

ডাক্তার ট্যান'ব নিম্নোক্ত ঔষধ প্রয়োগ কবিতে উপদেশ দেন

সোডি হাইপো. ফস্ফাইটি ৮০—২৪০ গ্রোন

স্পিবিটাম্ ইথাবিস্ ... ২ আং ।

টীং সিল্কোনা ফ্লুভা ... ১২ আং

বড় এক গ্যাস জলে ছোট এক চামচ ঔষধ দিবসে তিনব ব খাইতে
দিবে

ড্যাং ব্রাউন সিকোয়ার্ড নিম্নলিখিত ঔষধের ব্যবস্থা কবেন ।

পটাসি আইওডিডাই ... ১ ড্রাম ।

" ব্রোমাইড ... ১ আং

" বাই কার্ব ... ৪০ গ্রোন

গ্যামোনি ব্রোমাইডাই ... ২২ ড্রাম ।

ইন্ফিউজন্ কলছা ... ৬ আং

ছোট একচামচ ঔষধ অল্প জলের সহিত আহার কবিবার পূর্বে দিবসে
তিনবার এবং বাত্রে শয়নের পূর্বে তিন চামচ পরিমাণে সেবন করাইবে

অনিষ্টাব জ্ঞাত ইতিমান হোম্পা, হুথ, কাঁচ ডিম, মাংস, বিয়াব
ইত্যাদি পথ্য ঈষৎ গরম হইলে গাএ মর্জনা, দন্তোদ্যোগেব সমথ
দন্তমূল বিদারণ ইত্যাদি ক্রিয়া করিবে

কন্‌ভল্‌সন্‌ বা আক্ষেপ —ইহা একটি অতন্ত্র পীড়া নহে, অন্যান্য পীড়ার উপসর্গরূপে প্রায়ই উপস্থিত হইয়া থাকে অধীনভাবের প্রাদুর্ভূত হইতে দেখা যায় অনেক স্থলে স্ফাংগন না আশ্রয় হইলে মৃত্যু হয়।

লক্ষণ — আক্রমণকালে দেহ শত্রু ও অচল হয়, মুখমণ্ডলেব পেনীব
আকৃষ্টন, ওষ্ঠের নানারূপ বক্রভাব, মস্তকেব ও মুখেব ত্বক প্রথমে আরক্ত,
পরে নীলবর্ণ, চক্ষু উজ্জ্বল, চক্ষুব তাবা আকৃষ্টিত ও বিজ্ঞত, শ্বাস প্রশ্বাস
বিষম এবং কষ্টকর, নাড়ী দ্রুতগতি এবং শূন্য, বদনমুষ্টি, কখন কখন
অনৈচ্ছিক মল মুত্র ত্যাগ, এই সকল লক্ষণের দুই এক মিনিটেব পর শান্তি
হইয়া বোগেব পুনরাক্রমণ বা এককালেই নিবারণ হয় পীড়া সাংঘাতিক
রূপ ধারণ করিলে সম্পূর্ণ অচেতন্য ও মৃত্যু হয় বাম ও দক্ষিণ উভয়
অঙ্গে সমান আক্ষেপ না হইলে বোগী বিকটাকার ধারণ কবে বোগ
যত সামান্য হয়, তত অধিক কাগ শ্রয়ী হয় এমত স্থলে ২ ওষট্টা
পর্যন্ত বোগ অবস্থিতি কবে কখন কখন দিবা বা ত্রিতে ৪ ৫ ৬ বা ৭
পর্যন্ত আক্রমণ করিতে দেখা যায়

শৈশবাবস্থায় স্কেটক জন্য পীড়া, মস্তিষ্কাববক শিথিলতা ও দাহ, ছপিং কফ, জুপ্, নিমোনিয়া, সম্প্রতিবামজ্বর ইত্যাদি রোগে কন্ডল্‌মন্ হইয়া থাকে। প্রৌঢ়াবস্থায় কোন কোন পীড়ায় যেমন প্রলাপ হয়, শৈশবে সেই সকল পীড়ায় এবং তজ্জপ অবস্থায় এই উপসর্গ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা — প্রচুর এ শীতল বায়ু সঞ্চালিত স্থানে বোগীকে স্থাপিত করিবে মস্তক ও মুখমণ্ডলে শীতল জল মেক, গাত্রে ও হস্তপাদাদিতে উষ্ণ জলে মেক এবং বোগী ঔষধ গাণ্ডঃকবণে সমর্থ হইলে বিবেচক ঔষধ সেবন, অসমর্থ পক্ষে বিবেচন ও আক্ষেপনিবানক ঔষধেব পিচকারী দিবে। রোগাক্রমণেব পূর্বক্ষণে দৃষ্ট হইলে গ্রীবাদেশেব পিচকারী দিবে। কপিল, ক্লোবোফনম আণ, ইত্যাদি সহিত ভ্যালিবিয়েন, এম ইড অফ

পটামিঃম হিং, যা মে নিম, ইং ব, কপূর্ব যুগনাতি প্রভৃতি আক্ষেপ
নিবানক ঔষধ দিবে

শিশুদিগেণ কনুভাসনু ত্তিকাব বাচ চিকিৎসায় লিখিত হইয়াছে

একটামি ব হর্ষে গাত্তত —কোন বিষয়ে অতিশয় মনঃ-
সংযোগ অথবা মানসিক উদ্যোগ বশতঃ স্পর্শ হ্রতব, দৈহিক গতিশক্তি,
তা ক্রমশঃ হ্রাস পায় কখন কখন পেশীময়াদি তা ক্রমশঃ ব ম্লিত্বিতা,
কিছু অভিনয়িত বিষয়ে গুরুত্বসহকারে বক্তৃত, অক্ষয় মন ইত্যাদি

লক্ষণ —কোন বিষয়ে অতিশয় মনোনিবেশ জন্য কেহ কেহ
স্পন্দনবহিত হইয়া যায়, কিছুমাত্র চৈতন্য থাকে না যুগ্ম ব্যক্তিব ন্যায়
অচল থাকে কিংকাল পানেই পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া
নিজকার্যে নিবিষ্ট হয় ঠাঁহাবা ধর্মবিষয়ে গোড়, ঈশ্বরবোধনা ব সংকী-
র্তনকালে ঠাঁহাদেব এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে

চিকিৎসা । —কখন কখন বোগীকে ভয় প্রদর্শন বা অঘাত কব ভে
পীড়ার উপশম হইয়া থাকে এই পীড়ায় পীড়িত ছই ব্যক্তিকে
একএ বাখা উচিত নয়, কেননা মহানুভূতি জন্য পীড়ার অধিক্য জগ্নিবাব
সম্ভাবনা

বৈদ্যকে শূচ্ছাদি রোগ চিকিৎসা ।

শূচ্ছার কারণ ত্রয়ং সংপ্রাপ্তি —ক্ষীণ সতত্ত্ববহিত ও প্রবল
দোষপ্রযুক্ত ব্যক্তিব বিকল্প অর্থাৎ সংযোগ দেশ, কাল, মালাদি অহিতকাবী
জব্য ভোজন, মল মুত্রাদিব বেগ ধারণ, যষ্টি প্রভৃতিব ধাবা আহত, এই
সকল কারণে দোষ যে কালে মনুষ্যেবচক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে এবং মনোবহ
স্রোত সকলে প্রবেশ কবে, সেই সময়ে শূচ্ছ বোগ উৎপন্ন হয়, অধিকন্তু
বাতাদি ধাবা সংজাবহ নাড়ী আচ্ছাদিত হইলে, শূচ্ছগ্নয়ন শক তমো-

৩৬ বর্জিত হইয়া বোগীকে সুখ দুঃখ বোধ বহিত কাঠের ন্যায় ভুতনে
প্লাতিত কবে ইহাব নাম মুচ্ছার মোহ ইহা ছয় প্রকার, যথা ;—
বাতজ, পিত্তজ, কফজ, শোণিতজ, মন্দ্যপানজ, নিমত্তক্ষণজ সমুদায়
মুচ্ছাতেই পিত্তের প্রাধান্য থাকে

মুচ্ছার পূর্বরূপ ।—হৃদয়ে বেদনা, হাই উঠা, শবীরের জড়তা
অঙ্গলানি, অসম্যক জ্ঞান এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়

বাতজ মুচ্ছার লক্ষণ —ইহাতে রোগী আকাশমণ্ডল নীল
বর্ণ, ক্রমবর্ণ অথবা বক্তবর্ণ দর্শন কবিত্তে কবিত্তে অজ্ঞান হয় এবং শীতাই
চেতনা প্রাপ্ত হয় কিন্তু চেতনা হইলে কন্ধ্যা, গাত্রবেদন, হৃদয়ে অত্যন্ত
বেদনা, শবীর কৃশা, শ্যাম ও বক্তবর্ণ চক্ষিত হয়

চিকিৎসা ।—গব্য স্ত ৪ সেব গোময় বস, অন্ন গব্য দধি
৪ সেব, গব্য দুগ্ধ ৪ সেব, গোমূত্র ৪ সেব, পাকি জল ১৬ সেব
এই স্ত ১ দিবসেব মধ্যে পাক কবিত্ত লইলে নিশেষ উপকার
দর্শায়

ক্ষুদ্র প্রয়োগ —কুল আঁটিব শস্ত, পিগলী, বেণার মূল, ন গে-
শ্বব, এই সমুদয় শীতল জলে মাড়িয়া সেবন কবিত্তে, অথবা পিগলী চূর্ণ
ও মধু একত্রিত কবিত্ত অবলোহ কবিত্তে

পিত্তজ মুচ্ছার লক্ষণ —ইহাতে বোগী আকাশমণ্ডল বক্তবর্ণ,
হবিতবর্ণ বা পীত বর্ণ দর্শন কবিত্তে কবিত্তে মুচ্ছিত হয়, এবং ধর্ম প্র হইয়া
জ্ঞানলাভ কবে বোগীর পিপাসা, সন্তাপ, চক্ষু বক্ত ও পীতবর্ণ হয় ও
তরল দাস্ত হয়

চিকিৎসা স্ত ৪ সেব কুশাও জল ৭২ সেব । কন্ধ্যা—যক্ষ্মগু
১ সেব । ইহাব নাম “কুশাও স্ত ”

ক্ষুদ্র প্রয়োগ ।—স্বতেব সহিত ছুরালতা কাথ অথবা বাজিতে
মধুসহিত ত্রিফলা চূর্ণ সেবন কবিত্তে দর্শ বৎসবেব পুর্বাভিন স্ত ও
শিলাজতু প্রভৃতি বাসায়নিক প্রয়োগ প্রশস্ত

কফজ মুচ্ছার লক্ষণ —ইহাতে বোগী আকাশমণ্ডলকে মেঘ
সদৃশ অথবা অন্ধকার ও মেঘ দ্বারা আবৃত দেখিতে দেখিতে মুচ্ছিত হয়,

এবং বিলম্বে জানাও কবে বোগীব শবীর অর্জ চর্ম্মাক্ত, ভাবযুক্ত, ও মুখ হইতে ঘালাজাব হয় এবং বমনেব ইচ্ছা হয়

চিকিৎসা —কাথ জবা —শণবীজ, তেউড়ী মূল, এবও মূল, দশমূল, শতমূল, বাঙ্গা, পিপ্পলী, মজিনা মূল, প্রত্যেক ২ পল পাঁকজন্তু জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের কল্ক—যষ্টিমধু, ভূমি কৃষ্ণাণ্ড, মেদ, মহা-মেদ, কাকোণী, ক্ষীৰ কাকোণী, চিনি, খেজুরমাতি বা পিণ্ডখেজুর জাফা, শতমূলী, তালের মাতী, গোক্ষুব, রাখাল শশাব মূল, জিফলা, বেগুন, দেবদারু, এলবালুকা, শালপানি, তগবপাতুক, হরিজা, দাঁকহরিজা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িম বীজ, ন গোধব, তালিশপত্র, রুহতী, মালতীব নব পুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, বক্রচন্দন, পদ্মকান্ঠ মিলিত ১ সের দ্ব্যতের দ্বিগুণ জল ও চতুর্গুণ দুগ্ধ দ্বার পাঁক কবিবে ইহান ন ম “মহা চৈতন্য দ্বত ”

ত্রিদোষজ শূচ্ছার লক্ষণ —ইহাতে বায়ু, পিণ্ড ও কফজ ছর্দিব লক্ষণ সমুদায় এক সময়েই প্রকাশিত হয় অপস্মাবেব ফেন বমন, দন্ত ঘর্ষণ প্রভৃতি ভয়ানক লক্ষণ ভিন্ন অন্য লক্ষণ দৃষ্ট হয়

চিকিৎসা —কাথ—দশমূল, জিফলা, হরিজা, দাঁক হরিজা, কুড়চি ছাল, ছাতিম ছাল, অ পাণ্ডেব মূল, নীলয়ক্ষ, কটুকী, সৌদাল ফল, ভূমুখ ফল, কুড়, হুবালাতা, প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । কল্ক—বামুনহাটী, আকনানি, জিকটু, তেউড়ী মূল, হিজর বীজ, গজ-পিপ্পলী, অড়ব ফল, মূর্খামূল, দন্তীমূল, চিনাতা, চিতামূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, রক্তরোড়া, গন্ধত্ব, ময়নাফল, প্রত্যেক ২ তোলা, গব্যদুগ ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের, গব্যদুগ্ধ ৭ সের, অন্ন গব্য দধি ৪ সের । ইহাব নাম ‘রুহৎ পঞ্চগব্য দ্বত ’

রক্তজ শূচ্ছার লক্ষণ —পৃথিবী এবং জলে তমে গুণ অধিক পরিমাণে আছে, অতএব পৃথিবী অর্থাৎ ভূমি ও জল হইতে উৎপন্ন রক্তে তমোগুণ অধিক আছে বলিয়া ভূমিগুণাধিক্য মূখ্য্য বক্তেব গন্ধে মুচ্ছিত হইয়া থাকে পবিত্র কেহ কেহ বলেন, বঙ্গদেবিতাই য শূচ্ছা হয়, বঙ্গর শক্তিই তাহাব কাবণ ।

চিকিৎসা ।—অশ্বগন্ধা ৫০ পল, তালমূলী ২০ পল, মঞ্জিষ্ঠা, হবি-
তুকী, হবিজা, দাকহবিজা, যষ্টিমধু, বাস্মা, ভূমি কুশ্মাণ্ড, অর্জুনছাল,
মুখ, তেউড়ী, প্রত্যেক ১০ পল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, শ্বেতচন্দন, বক্ত-
চন্দন, বচ, চিতামূল, প্রত্যেক ৮ পল, এই সমুদায় ৫১২ সেব জলে পাক
করিয়া ৬৪ সেব থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া ইহাতে ঘাই-
ফুল ১৬ পল, মধু ৩৭ ০ সেব, ত্রিকটু প্রত্যেক ২ পল, গুড়ক, তেজপত্র,
এলাইচ, প্রত্যেক ৪ পল, প্রিয়ঙ্গু ৪ পল, নাগেশ্বর ২ পল, সমুদায় প্রক্ষেপ
দিয়া আবৃত পাত্রে ১ মাস রাখিবে পবে ছাঁকিয়া লইবে । মাত্রা ১
তোলা হইতে ৪ তোলা ইহাব নাম ‘অশ্বগন্ধ বিষ্ট’

বিষজ ও মদ্যজ মুচ্ছার লক্ষণ বিশেষ কক্ষ, উষ্ণ তীক্ষ্ণ,
শূক্ষ্ম, আশু, বিকাশী, বিষদ, লঘু অপাকী এই কয়টি গুণ আছে এই
গুণ তৈলাদি পদার্থে থাকিলেও বিষ ও মদ্যে অধিক পরিমাণে আছে
বলিয়া বিষ ও মদ্যপানে মুচ্ছা জন্মে

চিকিৎসা —এলাইচ, যষ্টিমধু চিতামূল, হবিজা, দাকহবিজা,
ত্রিফলা, বক্তমূলী, ত্রিফলা, ত্রিফলা, ত্রিফলা, ত্রিফলা, ত্রিফলা, ত্রিফলা, ত্রিফলা,
গোক্ষুব বীজ তেউড়ী ও শতমূলী প্রত্যেক সমভাগ, সমষ্টিব দ্বিগুণ চিনি
যথানিধি মোদক পাক করিবে মাণা ০ তোলা হইতে ২ তোলা
অপ্প গবম দুগ্ধ বা মুদগায়ুযেব সহিত সেব্য ইহাব নাম ‘এলাদি মোদক’

ফলত্রিকতাদ্য চূর্ণ বিফলা, তেউড়ী, শ্যাম লতা, দেবদারু,
শুষ্ঠী, বনযমানী, যমানী, দাক হবিজা, পঞ্চলবৎ, শুষ্ক, বচ, কুড়, গুড়
ত্রক, তেজপত্র, এলাইচ, এলবালুকা প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত
করিবে মাত্রা ১ মাস হইতে ৪ মাস।

মহাকল্যান বটি —স্বর্ণ, অত্র, পাৰা, গন্ধক, লৌহ, মুক্তা সমভাগে
লইয়া আগলকীর রসে মড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে ।
অল্পপান তিলচূর্ণসংযুক্ত চিনি অথবা নবনীত ।

রক্তাদি জনিত মুচ্ছাত্রয়ের লক্ষণ —ইহাতে শরীরে
অবসন্নতা, দৃষ্টিব হীনতা এবং শ্বাস অতি মৃদুভাবে প্রবাহিত হয় মদ্য-
জনিত মুচ্ছায় বোগীর অন্তঃকরণেব শক্তি বিকৃত হয় এবং প্রাণমনা

হইয়া বিলাপ ও অঙ্গচারণা করিতে করিতে ধবান্বিত হয়, এবং যে পর্যন্ত মদ্য জীর্ণ না হয়, সে পর্যন্ত মৃতিকায় পতিত থাকে, মদ্য জীর্ণ হইলে এই সমস্ত লক্ষণ থাকে না।

বিষজ মূর্চ্চায় বিষপানীয় ব্যক্তি কল্প, নিদ্রা ও পিপাসা হয় ও অন্ধকার দর্শন ববে। বিশেষতঃ বিষমিকাবে বিষের জাতিভেদে অর্থাৎ মূলপীড়াদিভেদে যে যে লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে, ইহাতেও বিষভেদে সেই সেই লক্ষণ জন্মিয়া থাকে।

মূর্চ্ছাদির ভেদ নিরূপণ।—পিণ্ড ও তমোগুণের আধিক্য বশত মূর্চ্ছাবোগ জন্মে। বাতপিত্তের ও বজগুণের আধিক্য হেতু ভ্রম রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে রোগী চক্রেব গায় ঘূর্ণিত হইয়া ভূমিতে পতিত হয়, অর্থাৎ বোগী দাঁড়াইয়া শরীর স্থির রাখিতে পাবে না। বাত-শোথ ও তমোগুণ যদি প্রাপ্ত হইয়া তন্দ্রা এবং শোথ ও তমোগুণ যদি পাইয়া নিদ্রা জন্মায়।

তন্দ্রার লক্ষণ — ইহাতে বাহ্যজিয়ার কার্য বন্ধিত হয় এবং বোগী নিদ্রাভিভূতের গায় অলস হইয়া থাকে।

সন্ন্যাস ও মূর্চ্ছার ভেদ।—দোষের অর্থাৎ বায়ুপিত্তাদির প্রবলতাব হ্রাস হইলে মূর্চ্ছা আপনা আপনিই নিবৃতি পায়, পবস্ত্র ঔষধ প্রয়োগ ব্যতিবেকে বোগের শান্তি হয় না।

সন্ন্যাস রোগের লক্ষণ।—অত্যন্ত প্রবল দোষ বাতপিত্তাদি প্রাণস্থান অধিকার করিয়া চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তি লোপ করে, স্তবধা বোগী মৃত্যবস্থায় ধবান্বিত হয়। যদি এই অবস্থায় ফলপ্রদ ঔষধ না দেওয়া যায়, তাহা হইলে বোগী মৃত্যব প্ৰাণত্যাগ করে।

অপস্মার রোগের সাধারণ লক্ষণ ও প্রকারভেদ।—দোষের অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফের উদ্বেক হইলেই স্মৃতি লোপ পায় এবং মুখ হইতে জলস্রাব হয়, তৎপরে বোগী চেতনাশূন্য হইয়া হস্তপাদাদি বিক্ষিপন করে, মুখ হইতে ফেনা নির্গত হয়।

বাতজ অপস্মার রোগের লক্ষণ — ইহাতে কল্প, মুখ হইতে

ফেণা নির্গত হয়, বোগী দন্তে দন্তে খর্ষণ করে ও প্রবলবেগে শ্বাস পানি ভ্যাগ কবে এবং দৃশ্য বস্তু ক্রমবর্গ দর্শন করিয়া থাকে

চিকিৎসা ।—তিল তৈল ৪ সেব, অ গুলকী, শতমূল, ভূমিকুখাও, প্রত্যেকে বস ৪ সেব, দুধ ৪ সেব বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, কুলথ বলায়, যব, মাষকলাই, প্রত্যেকে বস ৩ সেব কল্ক—জীবক, স্বযভক, শেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীবকাকোলী, ক্ষুদ্রি, বৃদ্ধি, মুগানি, মাষা, জীবন্তী, যষ্টিমধু, জটামাংসী, মঞ্জিষ্ঠা, বাথাল শশার মূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, শৈলজ, শুল্ফা, পুনর্নবা, শ্বেত চন্দন, বক্ত চন্দন, এলাইচ, গুড়ক, পদ্ম-মূল, অপক কদলী ফল, বচ, অণ্ডক, হবীতকী ও আমলকী মিলিত ১ সেব ইহার নাম “বৃহদ্ধাত্রী তৈল”

পিণ্ডজ অপস্মারের লক্ষণ ।—ইহাতে রোগী শবীব, চক্ষু, মুখ, ফেণ হবিজ্ঞা বর্ণ হয়; বোগী দৃশ্য বস্তু সকল হবিজ্ঞাবর্ণ ও রক্তবর্ণ দেখিয়া থাকে । মল্লয়াদিগকে পিপাসা ও অগ্নিব ধাবা অভিজুত দেখে ।

চিকিৎসা ।—গুণ্ডুল, বচ, হবীতকী, বিছাটী মূল, আকন্দ মূল, সর্গপা, জটামাংসী, হবীতকী, ভূতাকেশী, ঈষালাঙ্গল, হিঙ্গু, চোবকাচকী, বসুন, আতাইচ, দস্তী, কুড়, গুণ্ডপ্রভৃতি মাংসাশী প্রাণী বর্জিত এই সমস্ত কল্ক দ্রব্য মিলিত ১ সেব, ছাগমূত্র ১৬ সেব, তৈল ৪ সেব

কফজ অপস্মার রোগের লক্ষণ ।—ইহাতে শরীরের শুষ্কতা ও শুষ্কবর্ণতা, রোমখর্ষণ, শীত এবং চক্ষু, মুখ ও ফেণ শ্বেতবর্ণ হয় রোগী দৃশ্য বস্তু সকলকে শ্বেতবর্ণ দেখিতে পায়, বোগেব বেগ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়, অর্থাৎ বায়ু ও পিত্তজনিত অপস্মার বোগী যক্ষণ অজ্ঞানাবস্থায় থাকে, এই বোগে তাহা অপেক্ষা অধিক বিলম্বে জ্ঞান লাভ করে ।

চিকিৎসা ।—পাৰা, তায়ু, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, মনছাল, বসাত-জন সমভাগে লইয়া গোমূত্রে মাড়িবে । ইহাব দ্বিগুণ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া ক্ষণকাল লৌহপাত্রে পাক করিবে । মাত্রা, ৫ বতি অল্পপান হিঙ্গু, সচল লবণ এবং কুড় চূর্ণের সহিত গোমূত্র ও যত । ইহাব নাম “চণ্ড ভৈবব ।”

মান্নিপাতিক অপস্মারের লক্ষণ ও অসাধ্য লক্ষণ ।—

ইহাতে বাতজ পিত্তজ এবং কফজ অপস্মার বোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, ইহা অসাধ্য পূর্বোক্ত চারি প্রকার অপস্মারের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি কোন একটি কর্তৃক আক্রান্ত হইলেও তাহা অসাধ্য, অধিক দিনেব হইলে অচিকিৎসনীয়। এতদ্ভিন্ন যাহার শরীর কম্পিত এবং চক্ষু বিকৃতি জন্মে, তাহাব সেই বোগও অসাধ্য।

চিকিৎসা বস সিংহ ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, স্নগ্ধ অর্দ্ধ তোলা, সমুদায় মৃতকুমারীর বসে মাড়িয়া এরূপে আনৃত করিয়া ধান্যবানি মধ্যে স্থাপন করিবে, তিন দিবস পরে উদ্ধৃত করিয়া ২ বতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অল্পপান মধু ও ত্রিফলাব জল ইহার নাম “চিষ্ঠামণি চতুর্গুণ”

অপস্মাররোগবৃদ্ধির সময়।—বাতজ অপস্মার বাব দিনেব দিন, পিত্তজ অপস্মার পনেব দিনেব দিন, কফজ অপস্মার ত্রিশ দিনেব দিন রোগীকে আক্রমণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ ১ দিবস বোগের বেগ উপস্থিত হয় বাতপিত্তাদি বলেব মূনাধিক্য হইলে সীমাব পূর্বে বা পবে রোগ বৃদ্ধি পায়

হোমিওপ্যাথিকে মূর্চ্ছাদি রোগ চিকিৎসা।

ম্যাপোপ্লেক্সী।—এই রোগে অকস্মাৎ রোগী অচেতন, আত্মজ্ঞান ও স্পন্দনবহিত হয় নাড়ীর গতি মন্দ, মথন শ্বাস পতন, মুখের বিকৃত ভাব, এক দিকে হস্ত পদ আক্ষেপযুক্ত হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—মুখ রক্তবর্ণ হইলে প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা বা পনের মিনিট অন্তর “বেলেডোনা” প্রয়োগ করিবে। রোগী ঐযথ গলাধঃকরণে অসমর্থ হইলে ক্ষুদ্র বটিকা জিহবার নিম্নে স্থাপিত করা অন্যায় সমাধ্য

মুখ মলিন হইলে উপবোক্ত প্রকারে “এপিয়ম” দিতে হইবে।

হোমিওপ্যাথিকে ঘূচ্ছাদি রোগ চিকিৎসা । ৪৭৯

মুখ অথবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আক্ষেপ থাকিলে “মক্সিমিকা” প্রয়োগে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

গ্রীবার পশ্চাতে সবিসার পলস্তাবা প্রয়োগ করিবেন এবং গরম জলে সর্ষপ চূর্ণ দিয়া তাহাতে বোগীর গ ডুব ইয়া রাখিবেন।

এপিলেপ্সী ।—এই বোগে আক্ষেপের সহিত অটৈতমুখ, মুখ নিষা ফেন নির্গম, কখন কখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভয়ানক আক্ষেপ উপস্থিত হয়। প্রায়ই বাত্মিকালে এই বোগ হইয়া থাকে। একপ কোণপ্রবণ বে গৌকে একাকী থাকিতে দেওয়া কর্তব্য নহে।

চিকিৎসা ।—এক সপ্তাহ কাল প্রতি রাতে “বেলেডোনা” দিবে। তাহার পর এক সপ্তাহ “ওপিয়াম”, উহার পরে দিবসে দুইবার কনিয়া “হাইড্রাগ্টিস্” প্রয়োগ করিবেন।

• পীড়ার আক্রমণ হইলে রোগীকে শয়ন করাইবেন। পরিমেয় বস্ত্র আলগা করিয়া দিবে এবং কজীব উপর হস্ত ঘর্ষণ করিতে থাকিবেন।

হিষ্টিরিয়া ।—এই পীড়ার আক্রমণ কঠিনভব হইলেও অনেকটা এপিলেপ্সীর সহিত সাদৃশ্য আছে। রোগীকে যাহা বলা যায়, সে তাহা জানিতে পাবে, কিন্তু বাক্যকথনে অসমর্থ হয়, চক্ষের পাতা কম্পিত হইতে থাকে। পীড়ার আক্রমণকালে পরিমেয় বস্ত্র আলগা করিয়া দিবে এবং চর্কে ও মুখে জলের কাপটা মানিবেন।

চিকিৎসা ।—দিবসে তিন বার “ইগ্নেসিয়া” দিবে, এবং তাহার পরে এক সপ্তাহ কাল “জেলুমিনিয়াম্” খাওয়াইবেন।

হাকিনীমতে শূষ্কাদি রোগ চিকিৎসা।

— ১৭৭ —

অপস্মার বা শূগী — অকস্মাৎ বোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। শিবাসমুদ য আক্ষেপপ্রণ হইয় চক্ষু মৃত মণ্ড্যেব ন্যায় উপরে উঠে কখন কখন বোগী দন্ত কিড়মিড় করে কখন কখন মুখ হইতে জিহ্ব বাহির হইয়া আইসে।

কারণ — পেট পবিকাব হইলে বা দুপ্পাচ্য জন্য আহাব কবিলে এই বোগেব উৎপত্তি হয়।

চিকিৎসা। — প্রথমতঃ পেট পবিকাব কবাব জন্য পাবদগিহিত জোপা দিবে পবে নিম্নোক্ত উপায় কবিবে।

গাঁজা	..	১০ গামা
পাবদ চূর্ণ	..	২০ বতি।
সাবান	..	১০ গামা।
একত্র গিহিত কবিয়া ১৫ বটি কবিবে প্রত্যহ দুইটি করিয় বটি খাওয়াইবে।		

যড়বিংশ অধ্যায়।

যত্নোপাত্তিক উন্মাদ রোগেব চিকিৎসা।

ম্যানিয়া — ইহাকে সাধাণতঃ প্রলাপমধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। ইহাতে নিনেকগতির একবাবে ধর্ম না হইলেও অনেক ব্যতিক্রম ঘটে ও মানামধ্যে অসংখ্য অযোগ্য, অমূলক ও অস্বাভাবিক ভাষেব উদয় হয় স্বভাব অত্যন্ত উত্তেজিত এবং অপকাবক হইয়া উঠে।

লক্ষণ — ইহাব লক্ষণ হঠাৎ প্রকাশিত হয় আত্মীয় স্বজনেব

এতি অবিশ্রাম, বিনা কাবণে ক্রোধ চিন্তা এবং নৈরাশ্য, ইত্যাদি পূর্ক-
লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত পীড় হইলে সর্বদা প্রলাপ বকে, উগ্রতাবাদি
হয়, নিজ অবস্থায় হতাশ হইয়া আত্মহত্যা কবে সর্বদা হাস্য, আশ্রয়, আশ্রয়
জ্ঞান গমন, এবং নিদ্রার অভাব হেতু নিঃশব্দ হয় । সুদেব বেগ ধাবণে
অসমর্থ হয় ও সুদেব সহিত কক্ষটের পরিমাণ অধিক থাকে

সূতিকোন্মাদ — প্রথম হইলে ৪ ৫ দিনমধ্যে অস্থিরতা,
অনিদ্রা, অত্যন্ত শিবঃপীড়া, অন্তর্ভুক্ত অঙ্গাঙ্গী, জ্বরভাব কখন বা
উষ্ণগাত্র, নাবী পূর্ণ এবং জিহ্বা লেপযুক্ত, নানা কাবণে বোগী শীত
হ্রস্বল হয়, প্রায়ই অত্যন্ত প্রলাপ, আত্মহত্যা বা আত্মহত্যার ইচ্ছা বড়
বলবতী হইয়া থাকে ইহাব চিকিৎসা য বিশেষ যত্নবান হইয়া পুষ্টিকর
পথ্য যথা,—ব্রাণ্ড, যামোনিয়া, ডিম্ব, বার্ক, কুইনাইন, বিক্টি, মাংসের
ঝোল ইত্যাদি দ্বারা রোগীর বল বৃদ্ধি করিবে এবং অহিফেন, গাঞ্জা,
মার্কিয়া, কোনায়ম ইত্যাদি অবসাদক ঔষধ দ্বারা স্নায়ুশুল্ল স্থির
বাঞ্ছিতে চেষ্টা করিবে

অনোম্যানিয়া বা একাংশোন্মাদ — ইহাতে বিবেকশক্তির
হ্রাস হইয়া থাকে, সচবাচর একই বিষয়ে উপবসনোনিবেশ হয় । মান-
সিক শক্তি তেজস্বিনী থাকে, মনোমীত বিষয়ে চিন্তা তেই সর্বদা অতি-
নিবিষ্ট হইতে দেখা যায় অলীক পদার্থ দর্শন, অলীক চিন্তা কবা এই
বোগের প্রধান লক্ষণ কখন কখন এই সকল লক্ষণ এত গোপন
থাকে যে, রোগীর বাহ্যিক দর্শনে পীড়ার সন্ধান জানিতে পারা
যায় না

অটকোম্যানিয়া বা আত্মহত্যোন্মাদ — ইহাতে বোগী
অনেক দিন হইতে আত্মহত্যার ইচ্ছা করিয়া স্বকল্পিত উপায় দ্বারা
আত্মহত্যা কবে, উপায়ে মধ্যে উদ্বুদ্ধই প্রধান । আত্মীয় স্বজনকে
তাহার অভিপ্রায় জানিতে পারিলে রোগী তাহাদের নিকট স্নান ব্যতির
ন্যায় ব্যবহার করিয়া বিশ্বাস জন্মায় যে স্নান হইয়াছে, এবং স্নান
পাইলেই আত্মহত্যা কবে

য্যাটোফোম্যানিয়া বা নবহত্যোন্মাদ, পাইফোম্যানিয়া বা গৃহদাহ

নোগ্রাদ, ক্রেপ্টে মা নি । ব চৌথোগ্রাদ, এই সকল উগ্রাদে বে গী
স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় ম নেন সর্বদাই তৎপর থাকে

অরটোম্যানিয় বা প্রেমোগ্রাদ নিজ স্ত্রী বা স্বামীৰ পতি
অতি প্রেমভিলাষী হয় ইহাতে প্রায় শবীর এবং মন নিস্তেজ হয় এবং
অনেক স্থলে জননেদ্রিয়ে কোন না কোন পীড়া জন্মাইতে দেখা যায়

মেলান্কেলিয় বা বিষমোগ্রাদ । ইহাতে ভয়, বিষাদ,
এবং নৈবাস্য, সমান্য কাৰণে জন্মন অস্বস্ত্যাবস্থা চেষ্টা, হাস্যজনক
বিষয় লিখিতে বা দেখিতে আগ্রহ, অশ্রুতিশক্তিৰ হ্রাস, অনিদ্র ও
স্বপ্নদর্শন, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশ, আত্মীয়স্বজনে মমতা হানি ইত্যাদি লক্ষণ
প্রকাশ পায়

রিলিজাস্ মেলান্কেলি । ইহাতে রোগী সর্বদা বিমর্ষভাবে
ধর্মচিন্তামুরক্ত থাকে স্বর্গপ্রচাবকদিগের বক্তৃতা শ্রবণে দুর্বলান্তঃকরণ
ব্যক্তিদিগকে ইহা দ্বারা আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়

হাইপোকণ্ড্রিক্যাল্ মেলান্কেলি — ইহাতে বহুবল্লব সহিত
নিজেব দেহ সম্বন্ধে যে কত প্রকাব ভ্রম জন্মিয়া থাকে তাহা বলিয়া শোয়
করা যায় না অনেক স্থলে বোগীৰ বোধ হয় যেন তাহার দেহ কোন
পদার্থে পবিত্র হইয়াছে, সে যেন সে ব্যক্তিই নছে কখন নিজেব
দেহকে মাথনে বচিও বা যা অগ্নিব উত্তাপে যাইলে গলিয় য ইবে এই
মনে কবিয়া অগ্নিব নিকট য ইতে চহে না কখন বা আপনাকে
ঈশ্বরোক বলিয়া ভ্রম হয় কখন কখন বোগী বিশ্বাস কবে যে, তাহার
আত্মা ন ই, দেহ নাই, অথবা তাহার মৃত্যু হইয়াছে

নস্ট্র্যাল্ মেলান্কেলিয়া । — দেশান্তরে গমন কবিয়া স্বদেশে
প্রত্যাগমন কবির বলাবতী ইচ্ছা হক এই নস্ট্র দেওয় যায় । ইহাতে যে
কেবল বাটী আসিবাব ইচ্ছা হয় এমন নছে, কখনই বাটী আসিতে পারিবে
না, এই মনে কবিয়া বোগী যাত্রাপরনাই ভীত হয় রোগীৰ অভিলাষ পূর্ণ

* ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ কবি “কাউপার” এইরূপ বিমর্ষাবস্থায় “জন্-
গিল্পিন্” নামে বহুসংজনক পদ্য রচন কবিয়াছিলেন

না হইলে শরীর দুর্বল হয় ও কখন কখন আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা করে ; কখন বা সার্বদিক পক্ষাঘাত দেখা যায়

ডিস্‌মেন্সিয়া বা বুদ্ধিহ্রাস।—বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তির হ্রাস হওয়াকে এই আখ্যা দেওয়া যায় ইহাতে স্মরণশক্তি, অভাব, ভ্রম ও দর্শনজ্ঞান নষ্ট, প্রজ্ঞাবে ফগফেটের ভাণ অধিক, অসংলগ্ন ও অর্থশূন্য বাক্য কখন, ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়

প্যারালিসিস্ অফ দি ইন্‌সেন্স বা স্ফিগ্‌নোমাদ —বুদ্ধির বিশৃঙ্খলতা স্মৃতিদৌর্বল্য, পৈশিক নিস্তেজকতা, সর্বদা বক্তব্য, কন্ডল্‌সন্, সাধাবণ পক্ষাঘাত, মস্তিষ্কেব অপকর্ষ বা হ্রাস ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়।

ইডিয়সি বা জড়তা —জন্মাবধি মস্তিষ্ক নির্গাণেব ব্যতিক্রম বশতঃ বুদ্ধিবৃত্তির হ্রাস বা অভাবকে জড়তা কহে জড়দিগেব মানসিক ক্রিয়া সকল সম্যক স্ফূর্তি পায় না, উহাবা নিতান্ত নির্বোধেব ন্যায় কার্য করে। মুখ ভাবহীন, উচ্চারণ অস্পষ্ট, চলিতে অস্থিরতা এবং কখন কখন উহাবা বধিও বোকা হয়

চিকিৎসা —পীড়ার পূর্বলক্ষণ প্রকাশিত হইলে যাহাতে স্নায়ু-মণ্ডল স্থিতি ভাবে থাকে এবং দ্রুত, যত্ন, দুঃখপিও ও অস্ত্রের ক্রিয়া সুন্দর-রূপে সম্পন্ন হয় এমন চেষ্টা করিবে মস্তিষ্কের লক্ষণ ও বল হইলে মর্ফিয়া বা অপিফেন সেবন কর্তব্য কিন্তু কিছু দীর্ঘকাল সেবন না করাইলে ফল জানিতে পাবা যায় না। গাঁজা হায়েসায়েরস, এবং ক্লোরফরমেও বিশেষ ফল পাওয়া যায় একফোঁট গাঁজা ১ গ্রোন মাত্রায় প্রয়োগ করিলে নানা প্রকার উপসর্গের শান্তি হয়

উদ্দীপন নিবারণ জন্য ৮ ১০ ঘণ্টা অন্তর ২০ ৩০ বিন্দু পবিমাণে ডিজিটালিস্ ব্যবহার করিতে অনেক যুক্তি দিয়া থাকেন

জীবনীশক্তির হ্রাসতা হইলে কুইনাইন, বার্ক, লৌহ, ফগফেট অথবা জিঙ্গ, কডলিভার অয়েল ইত্যাদি ব্যবস্থা করা গিয়া থাকে।

মস্তক মুগুন কবতঃ আইওডাইড তফ পটাশিয়মের মলমেব সহিত কিছু প্রীকনিয়া সহযোগে মস্তকে মর্দন করিলে উপকার দর্শে আইও

ডাইড অফ পটাসিয়ামেব সলিউশন্ উত্তরূপে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফলোভ হয়

তবে ভিত্তি নিম্নোক্ত জব্য সকলের পিচকাবী প্রয়োগ অনেকের মতে অত্যন্ত উপকারজনক

গ্যাশেটিক য় শিউ	...	৫ বিন্দু ।
গ্যাশেটিক অফ মর্ফিয়	...	৫ গ্রেন ।
উষ্ণ পবিষ্কৃত জল	..	১ ড্রাম ।

নিজাভাব নিবারণ জন্য হাইড্রেড অফ ক্লোর্যাল ব্যবহার করা যায় কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে বিরেকক ঔষধ ব্যবস্থা

জিহ্বা ধোতবর্ণ ও লেপমুক্ত থাকিলে—

সলফেট অফ ম্যাগনেসিয়া	...	...	৪ ড্রাম
টীং হায়েমাসেমস্	...	..	১ ড্রাম ।
জল	..	...	১ আং ।

এক মাত্রায় সেবন করাইবে । জিহ্বা পবিষ্কার থাকিলে হায়েমাসেমসেব পবিবর্ত্তে জেনুসন্ ব্যবহার করিবে বোগী ঔষধ সেবন করিতে না পাবিলে আহারে সহিত ১ । ২ বিন্দু জয়পাথে ব তৈল মিশ্রিত করিয়া দিবে

মণ্ডকে শীতল জল এবং গাএ উষ্ণ জল দিবে উদ্দীপন স্বত্তে প্রদাহনিবারণক ঔষধ নিষিদ্ধ বোগেব সকল অবস্থাতেই পুষ্টিকর খাদ্য, প্রচুর বজ্রাদি, কোষ্ঠ পবিষ্কার, অনিদ্রা, কদম্য অনরণের দুবীকরণে মনোযোগ হইবে নানা প্রকার অমোদ প্রমেদ দ্বারা বোগীকে অন্যমনা বাধিতে চেষ্টা করিবে জাগীয় স্বজন এবং চিকিৎসকেব স্নেহ এবং যত্ন দাব অনেক উপকার হয় ।

আপনাব বা অন্যের প্রতি অত্যাচারী না হইলে দ্বিগু. ব্যক্তিকে কাবাকদ্ধ বা দ্বিগুবামে অর্পণ করা উচিত নহে । কারাকদ্ধ করিয়াও উহাকে যত্ন এবং স্নেহেব ক্রীড়া করা অকর্তব্য ভয় প্রদর্শনে পীড়ন স্বষ্টি ভিন্ন দ্বাসেব সম্ভাবনা নাই ।

বন্ধনাদি উৎপীড়ন, অস্থকাব গৃহে স্থ পন, বওমোদক ও ভূতি উপাবে

শিশুগণ চিকিৎসাপদ্ধতি আজি কালি প্রচলিত নাই, তাহাতে কেবল কুফলই ফলিয়া থাকে। পীড়ার উৎস হইতে আবদ্ধ হইলেই কোন-রূপ পরিশ্রমেব কাজে নিযুক্ত করা বিধেয়। ইহাতে ক্ষুধা ও শাণীক বল হ্রাসিত সহিত আপনাব মনোমত্ত বিষয়ে চিন্তা হইতে মন অন্যদিকে নিয়োজিত থাকায় মস্তিষ্কেব ক্রিয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে। নৃত্যগীতাদি ও স্থান পরিবর্তন জন্ম মন প্রায়শ হইতে পারে। পীড়ার নিরুত্তি হইলেও অনেক দিন পর্যন্ত মন শিশুজ থাকে, এজন্য কিছু দিন বোগীকে সকল বিষয়ে বিশ্বাস করা কর্তব্য।

বৈদ্যকে উন্মাদ রোগ চিকিৎসা।

উন্মাদ রোগের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ।—বুদ্ধিপ্রাপ্ত বিপথগামী বায়ু, পিত্ত, কফ, মনোবহ ধমনীতে প্রবেশ করিয়া মনোব জ্ঞান জন্মায় বলিয়া আয়ুর্বেদবিদ পণ্ডিতগণ ইহাকে উন্মাদ বলিয়া নির্দেশ করেন।

উন্মাদ রোগের ভেদ —উন্মাদ বোগেব তরুণ বস্তাব নাম মদ-রোগ। উন্মাদ ছয় প্রকার, যথা; -বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাত পিত্ত ও কফজ, শোকজ এবং বিষজ।

উন্মাদের সামান্য কারণ।—সংযোগবিকল্প অর্থাৎ দুষ্ক ও মৎস্য মিশ্রণেব ন্যায় দ্রব্য, বিষযুক্ত দ্রব্য এবং অশুচি দ্রব্য ভোজন, দেবতা ও ঐক প্রভৃতিব অপমান, ভয়ে ও হর্ষে মনের আকুলিত ভাব, বলবান ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম, এই সকল কাৰণে উন্মাদ বোগ জন্মে।

উন্মাদ রোগের উপশান্তি — পূর্বেক্ত কাৰণে দূষিত বায়ু, পিত্ত, কফ অল্প সঙ্কটগণবিশিষ্ট ব্যক্তিব বুদ্ধিস্থান ও হৃদয়কে দূষিত করতঃ মনোবহ জ্ঞানসমূহে প্রবেশ করিয়া মনোব বিকৃতি সম্পাদন কবে।

উন্মাদের সামান্য লক্ষণ —ইহ তে ভ্রম, চিন্তাচঞ্চল্য, কাত

বতা, ইত্যন্ত দৃষ্টিগোচর এবং হৃদয়েব শূন্যতা জন্মে বোগী নিবর্তক কথা বলিয়া থাকে

বাতজ উন্মাদের কারণ, উৎপত্তি ও লক্ষণ ।—ইহাতে ক্রম, শীতল ও অল্প জ্বা ভোজন, দাঁড়, ধাতুক্ষয় ও উপবাসে বৃদ্ধি ও শ্রবণ-শক্তিব নাশ করিয়া উন্মাদ বোগ জন্মায় ইহাতে বোগী বিনা কাবনে সর্বদাই তপ্প তপ্প হুসিয়া থাকে অহর জীর্ণন হইলে রেগেব বন বৃদ্ধি এবং নৃত্য গীত, অধিক কথা বলা, অঙ্গ বিক্লেপন, বোদন, শবীবের কৰ্কশতা, ক্লেশতা ও বক্তের ন্যায বর্ণ এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়

চিকিৎসা ।—যুত ৪ সেব, কল্ক জ্বা বাখাল শশাব মূল, ত্রিফলা, বেগুন, দেবদারু, এলবালুকা, শালপানি, ভগব পাছকা, হবিজা, দাক হবিজা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িম্ববীজ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী, মানতীব নব পুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, বক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, প্রত্যেক ২ তোলা, পাকজল জল ৮ সেব, দুধ ১৬ সেব মাত্রা ২ তোলা । উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবনীয় ইহাব নাম “পানীয় কল্যানক যুত ”

ক্ষুদ্র প্রয়োগ ।—ব্রহ্মীশাক, কুমুড়া, বচ বা ডানকুনীশাক ইহাদের রসে কুড়চূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে

কোঁকিলের মাংস ভোজন করাইয়া বোগীকে নিব্বাত স্থানে শয়ন করাইয়া নিদ্রিত করিতে চেষ্টা করিবে, নিদ্রান্তে মনোবিকার দূরীভূত হয়

পিত্তজ উন্মাদের কারণ, উৎপত্তি ও লক্ষণ —অপাকী, কটু, অম, বিদগ্ধকাবী ও উষ্ণ জ্বা ভোজনে পিত্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অনায়াবান তর্ক অজ্ঞ ব্যক্তিব ধমনীতে প্রবেশ করিয়া মন দূষিত করিয়া উন্মাদ রোগ জন্মায় ইহাতে রোগীব সহিষ্ণুতা সংরক্ত অর্থাৎ মৌখিক জাঁক, উলঙ্গভাব, ভয়প্রদর্শন, পলায়নচেষ্টা, গাত্রেব উষ্ণতা ও ক্রোধ হইয়া থাকে রোগীব ছায়া, শীতল জল ও অগ্নে স্পৃহা হয়

চিকিৎসা ।—যুত ১৬ সেব গোমুত্র ১৬ সেব । কল্ক—হিঙ্গ, মচল লবণ, ত্রিকটু প্রত্যেকে ২ পল । ইহাব নাম “হিঙ্গাদা যুত ।”

ভুতাকুশ রস —পাৰা, লৌহ, বৌপা, মুক্তা প্রত্যেক ১ তোলা ;
হীবা ২ মাসা, হবিতাল, গন্ধক, মনছাল, তুঁতে, মৌবীবাঞ্জন, সমুজ ফেণ,
শোভোঞ্জন ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ তোলা এই সমস্ত ভূতবাজ,
দন্তী ও সিজ ব্রহ্মেব বসে মাড়িয় দিন ত্ত পিণ্ডাকাব কবিয়া যথানিয়মে
গজপুটে প ক কবিবে মাঞা ২ বতি, অনুপান আদাব বস যত
সেবনান্তে মহিয় হত, ছুন্ধ ও গুরুপাক অন্ন ভোজন এবং গাড়ে মর্ষপ
তৈল মাখিবে

কফজ উন্মাদের কারণ, উৎপত্তি ও লক্ষণ —প্ৰবিক্রম শূন্য
ব্যক্তি বিকৃত কফজনক বস্তু ভোজন কবিলে শ্লেষ্মা দূষিত হইয়া অনির্ব-
চনীয় প্রভাবে পিণ্ডেব সহিত মিশ্রিত হয় এই মিশ্র পিত্তশ্লেষ্ম মর্গস্থানে
য ইয়া বুদ্ধি ও স্ববর্ণশক্তি নষ্ট কবে এবং চিওকে বিকৃত কবিয়া উন্মাদ
বোগ জন্মায় । ইহাতে বোগী অন্যায় কার্য্য ও অন্যায় কথা কহে এবং
নির্জ্ঞান স্থান ও স্ত্রীতে অনুবক্ত হয়, অধিকন্তু পূর্বেও প্রকার আহাবের
পূর্ব রোগ বৃদ্ধ, নিদ্রা, বমন, লালাত্বাব এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়

চিকিৎসা যত ৪ সেব কল্ক—জটামাংসী, হবিতকী, ভুতকেনী,
শূলপদ্ম, আলকুশীবীজ, বচ, বলা ডুম্ব, জংজী, কাকোলী, চোবকাঁচকী,
ছোট এলাইচ, বাবাহীকন্দ অর্থাৎ চামাব আলু, মণ্ডবী, শুল্ফা, গুগ্গলু,
অপবাজিত —কাহাব মতে শতমূলী, বাঙ্গা, গন্ধবান্ধা, গন্ধভাটুলে,
বিছাটী, শাণপাণি, মিলিত ১ সের, পাকজন্ম জল ১৬ সেব ইহাবু নাম
“মহা পৈশাচিক যত ”

উন্মাদ গজাকুশ রস —২ তোলা পাৰাকে যথাক্রমে ধুতুবাব
রসে, গজপিপ্পলীব এক বিঘদড়ি শাকের বসে তিন দিন উর্দপ তন
কবিয়া ২ তোলা গন্ধক মিশ্রিত করিয়া স্বপ্না পুটে দিবে পূবে ইহাব
সহিত ধুতুবাবীজ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, এবং বিষ ২ তোলা মিশা-
ইয়া জলে মাড়িয়া ১ বতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত কবিবে

সান্নিপাতিক উন্মাদের কারণ ও লক্ষণ —পূর্বেও বাতা-
দিব সমস্ত কারণে সান্নিপাতিক উন্মাদের বোগ জন্মে ইহাতে ব তজ,
পিওজ ও কফজ উন্মাদেব লক্ষণ প্রকাশ পায়

চিকিৎসা —ঘৃত ৪ সেব কাথজবা—পুরুষ শগালেব মাংস ৬০ সেব জল ৩২ সেব, শেষ ৮ সেব দশমূল প্রত্যেক ৫ পল, জল ৩২ সেব, শেষ ৮ সেব ঋগবদ্ধ মাংস ও দশমূল প্রত্যেক ৬৪ সেব জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ ১৬ সেব ছাগ বা গায়া দুগ্ধ ৮ সেব কল্কজবা—যষ্টিমধু, ঋষ্টিষ্ঠা, কুড়, বক্তচন্দন, পদ্মকাঠ, বহেড়া, হবিতকী, আমলা, বৃহতী, ভগবপাছক, বিড়ঙ্গ দ ডিগবীজ, দেবদাক, দণ্ডীমূল, রেণুক তাম্রীশ পান ন গেশ্বর, শ্যামা তা, বাখাল শশ ব মূল শালপানি, পিষজু, মালতী ফুল, কাকোলী, ক্ষীর কাকে লী পদ্ম, নীলপদ্ম, হবিজা, দাক হবিজা, অনন্তমূল, মেদ, এলাইচ, এলবালুকা, চাকুলে প্রত্যেক ২ তোলা ইহাব নাম “শিবাঘৃত ”

শোকজ উন্মাদেব লক্ষণ ।—চোব, বাজা, শত্রু প্রভৃতিব দ্বাৰা অতি ক্রাসিত অথবা বাক্তি বিনাশে ও অভিশ্রুতিত কামিনীব অপ পিত্তে অশ্রুশয ছঃখিত ব্যক্তিব এই বোগ জন্মে, ইহাতে বোগী হতবুদ্ধি হইয়া নানা প্রকাৰ মনোগত ভাব প্রকাশ কবে এবং কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন ব গান কবে

চিকিৎসা —ঘৃত ৪ সেব কল্কজবা—ক্ষীর কল্যানক ঘৃতোক্ত কল্কব ঋয় পাবজন্য জল ১৬ সেব মাত্র ২ তোলা অল্পপান উষ্ণ দুগ্ধ ও চিনি । ইহাব নাম “পানীয় কল্যানক ঘৃত ।”

ক্ষুদ্র প্রয়োগ —৮টক পক্ষীশাবকেব শুষ্ক মংস চূর্ণ করিয়া দুগ্ধেব সহিত সেবনীয়

কুমুড়া বীজেব শস্য ও মামা মধুব সহিত বাটিয়া ৩ দিন সেবন করিলে প্রত্যহ প্রাতে পুনাতন ঘৃত পানে উপকারদর্শে

বাক্তিত জবোব বিনাশ ব অপ্রাপ্ত হেতু মনোবিকাৰ উপস্থিত হইলে, তৎসদৃশ কোন বস্তু দিয়া শাস্তনা করিবে

বিষজ উন্মাদেব লক্ষণ —ইহাতে চক্ষু রক্তবর্ণ, বল ও ইন্দ্রিয়-শক্তিব লোপ, মুখ শ্যামবর্ণ এবং বোগী জ্ঞানশূন্য ও কাতর হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—তিল তৈল ৪ সেব কাথ—শতমূলী, শালপানী, চাকুলে, শঠি, বচ, এবগুলমূল, কণ্টকাবীমূল, বৃহতীমূল, নাটাকবঞ্জমূল,

গোবক্ষচাকুলের মূল, বাঁটিমূল প্রত্যেক ১০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সেব, শৈব ১৬ সেব গব্যাহু ও ছাগহু প্রত্যেক ৮ সেব শতমূলীব রস ৪ সেব কল্কজব্য—পুনর্গবা, বচ, দেবদারু, শুণফ, বক্তচন্দন, অণ্ডক, শৈলজ, তণ্ডুলপাহুকা, কুড়, এলাইচ, জটামারী, ধানপানি, বেড়েলা, অশ্বগন্ধ মৈকব, বাস্মা প্রত্যেক ৪ তোলা । ইহার নাম “নাবায়ণ তৈল ।”

উন্মাদ রোগের অসাধ্য লক্ষণ —উন্মত্ত ব্যক্তি সর্বদাই নীচের দিকে অথবা উর্দ্ধ দিকে মুখ করিয়া থাকে, অতিশয় ক্রুদ্ধ এবং বলহীন হয়, আর যদি সর্বদাই জাগরিত থাকে, তাহা হইলে মেই বোগী নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবে

ভূতান্মাদ রোগের লক্ষণ ।—ইহাতে উন্মত্ত ব্যক্তি অমায়িক কথা, বল-বিক্রম, শাবীবিক ব্যাপার অর্থাৎ অদ্ভুত শাস্ত্র-জ্ঞান, শিষ্টাশ্রমপূণ্য, বুদ্ধিবল ও কার্যপটুতা এবং বোগ স্বক্ষিব স্থিরতা নাই বলিয়া ইহাকে ভৌতিক অর্থাৎ উপদেবতাসম্বন্ধীয় উন্মাদ বলে

দেবগ্রহজ উন্মাদের লক্ষণ ।—ইহাতে বোগী সন্তুষ্টচিত্ত, পবিত্র অগ্নীয় মালাব অর্থাৎ পারিজাত পুষ্পের মালাব গন্ধযুক্ত এবং নিদ্রাশূন্য হইয়া নিভূল সংস্কৃত পাঠ করে, তেজস্বী, স্থিমনয়ন, ব্রাহ্মণ্যবস্ত্র ও সকলকে এবদান করে

অসুরাক্রান্ত উন্মাদের লক্ষণ ।—ইহাতে বোগী ঘর্ষযুক্ত, ব্রাহ্মণ্য, ঐক, দেবতার দোষকথনশীল, কুটিলচক্ষু, উদ্বতসম্ভাব এবং ভোজন-পানাদিতে সন্তুষ্ট না হইয়া অত্যাচার করে

গন্ধর্বজনিত উন্মাদের লক্ষণ । ইহাতে রোগী সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া নদীতীরে ও গনে গনে ভ্রমণ করে, সদাচার, গীত, অগন্ধ ও মালা-প্রিয় হয়, সদা সর্বদা নৃত্য করে এবং অগ্নি হাঙ্গিয়া উঠে

যক্ষগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ ।—ইহাতে বোগী তেজস্বী, গুপ্তীব, উতগমনশীল, স্বপ্নবজ্রধারী, দানেচ্ছু চক্ষু তাম্রবর্ণ বিশিষ্ট এবং কথা সহ্য করিতে পাবে না

পিতৃগ্রহজনিত উন্মাদ রোগের লক্ষণ ।—ইহাতে বোগী শাস্ত্রপ্রকৃতি ও পিতৃভক্ত হয় বাম স্কন্ধে উত্তরীয় বসন স্থাপন করিয়া

শ্রীমৎ দেবপিতৃমুকুন্দমিত্তিকে পিতৃ ও জন্মদানকালে ভক্তি করে এবং মনোমাহংস, তিন ও পবিত্র পার্বণিক ভাষণাদি, এবং নিজ পিতৃ অথবা পিতৃ প্রাণ ন কবে।

মর্পগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ — ইহাতে বোগী বক্তৃতা দিয়া গমন করে জিহ্বাদান ওষ্ঠপোস্তদন ইত্যাদি যাবত এবং গুড়, মধু, দুধ ও পবিত্র ভোজনে অভিলষী হয়।

রাক্ষসগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ — বোগীব বক্তৃতা, মাংস ও স্ত্রীমিষ্ণু প্রভৃতি স্পৃহা জন্মে বোগিপতাবে বনবান ও পবিত্র শাস্ত্রীয় ইত্যাদি বাক্যে ভ্রমণ করে, অধিকন্তু বোগী বাগন্ধ ইত্যাদি কিছুই আচরণ ও অপবিত্র কার্য করে।

পিশাচাক্রান্ত উন্মাদের লক্ষণ — ইহাতে বোগী ক্রন্দন, কক্ষ্মা অর্থাৎ শব্দবৈব স্নিক্ততা হীন, অত্যন্ত শোণী এবং অধিক আশ্রয়ে সমর্থ হয়, ভুল কথা বলে অপবিত্র ও বনে থাকিতে ভাবাদি, অন্যায় কার্য ও বোদন করিতে করিতে উর্দ্ধদিকে হস্তোত্তোলন করিয়া ভ্রমণ করিতে থাকে।

উন্মাদ বোগের অসাধ্য লক্ষণ — যদি বোগী বিজ্ঞানমন, ক্রতগতিবিশিষ্ট, নিদ্রাশ্রিত, মুখস্থিত ফেনলেহী, কম্পিতশব্দ, হঠাৎ পতনশীল এবং পক্ষত, হস্তোত্তোলন ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি উন্মাদ বোগ প্রযোজন বসবে হয়, তাহা হইলে ইহা অসাধ্য, অর্থাৎ অচিকিৎসনীয় হয়।

দেবতা ও অমর প্রভৃতির আক্রমণের সময় — দেবগ্রহ পূর্ণিমা তিথিতে, অমরগ্রহ শুক্লাব সময়, ব্রহ্মগ্রহ অষ্টমী তিথিতে, যক্ষগ্রহ ৮ তিপদে, পিতৃগ্রহ অম বসুয়ায়, মর্পগ্রহ পঞ্চমী তিথিতে এবং বায়ুগ্রহ বায়ে আক্রমণ করে।

দেবাদিগ্রহ ৮ রোরে প্রবেশ করে, অথচ তাহাদিগকে দেখিতে না পাওয়াব কারণ — যদি দেবাদিগ্রহ মনুষ্য শব্দে প্রবেশ করিয়া উন্মাদ বোগ জন্মায়, তবে উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? ইহাব কারণ যখন দর্শনে ছায়া পড়েন কবিত্তে, শব্দে

নীতোক্ত প্রবেশ কবিতে, মণিতে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ কবিতে ও শবীবে
আগ্নী প্রবেশ কবিতে দেখা যায় না, সেই প্রকার দেবাদিকেও মানব-
শবীবে প্রবেশ কবিতে দেখা যায় না।

হোমিওপ্যাথিকে উন্মাদ রোগ চিকিৎসা।

ইন্স্যানিটী বা উন্মাদ এই বোগে মত্ততা, মনৈব বিকৃতি,
বুদ্ধিভ্রংশতা, বিহবকাভাব, এবং আত্মজ্ঞানবাহিত্য ইত্যাদিব বিশেষ
লক্ষণ দেখিতে পাওয যায়।

লক্ষণঃ মত্ততা জন্ত নানা উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে, যথা—
চীৎকার, হস্তপাদাদি সবলে সঞ্চালন, নিকটস্থ ব্যক্তিকে প্রহাবেব উদ্যম,
কটু বাক্য কথন, আপনাব প্রতি মেহগূন্যতা, এজন্য সময়ে সময়ে আত্ম-
হত্যাব চেষ্টা, হৃদয়েব গুপ্তকথা প্রকাশ, অসঙ্গত বাক্য কথন, সম্মানিত
ব্যক্তিকে অবজ্ঞা, নীচেব প্রতি সম্মানপ্রদর্শক বাক্য প্রয়োগ, অতিবিক্র
বাক্যব্যয়, সে সকল বাক্যেব পবম্পাব সম্বন্ধ থাকেনা, অথবা নীবব
নিম্পন্দভাবে জড়ৈব ন্যায় অবস্থিতি, মদমৎ জ্ঞান হানি, কার্য্য সকল
উদ্দেশ্যবিহীন, বাক্যলাপেও তজ্জপ, কখনবা কেহ না থাকিলে আপন-
মনে যদৃচ্ছা বকিতে থাকে

অকস্মাৎ হাস্য, হাস্যেব পবেই কোন কাৰণে ব তীত ক্রন্দন তৎক্ষণাৎ
আপন হইতেই নীবব হয়, নিজা প্রায়ই থাকেনা, যদিই কখন সামান্য
হয়, তাহা তদ্দ্রা মাত্র, সে অবস্থায় স্পষ্ট দর্শন কবে, মুখ চোখ দেখিলেই
চিনিতে পাৰা যায়, চক্ষু ভ্যালু ভেলে, মুখ বিষাদময়, যেন ঘোব চিন্তায়
নিমগ্ন, সৰ্ব্বদাই অন্যমনস্ক কখন কখন বিনা কাৰণে আপনমনে অশেষ-
বিধ ভয়েব চিন্তা কবিয়া চম্কিয়া উঠে, কাঁদিতে থাকে, তজ্জন্য কম্পন
হইতেও দেখা যায়, বিনা কাৰণে শোব, সেই কাম্পনিক শোকে অধীব
০১৮৩ন্যাবং হয়

কখন দেবতা ও ঈশ্বরবিষয়ে বড় অন্তরঙ্গ দেখা যায়, দেবাবাদনা, দৈব-চর্চায় সর্বদা ব্যস্ত থাকে, আপনাকে ঈশ্বরানুগৃহীত, এমন কি তৎপ্রেরিত বলিয়া পরিচয় দেয়। ঈশ্বরের চাক্ষুস প্রত্যক্ষতা লাভ ও তাঁহার সহিত কথোপকথনের কথা বলে, কখন বা আপন দেহকে কিছুই নয়, তাহাতে প্রাণ বা আত্মা অস্তিত্ব নাই, আপনি মরিয়া গিয়াছে, এইরূপ মনে কবে ।

কেহ কেহ বড় অনিষ্টকর হইয়া উঠে । পবিত্রতা, অপহরণ, গৃহদাহ, পরপ্রাণনাশ ইত্যাদি কার্যে সর্বদাই উদ্যুক্ত থাকে ।

চিকিৎসা ।—নিম্নোক্তরূপে এই রোগেব প্রধান উপসর্গ জানিতে হইবে, এজন্য অগ্রে ইহার প্রতিকারের বিশেষ চেষ্টা পাইতে হইবে । দিবসে তিনবার “নক্সভগিকাব” বড় বটী দুইটী প্রত্যেক বারে জিহ্বায় স্থাপন করিবে ।

রাত্রি শয়ন করিবাব সময় “জেলুমিসিমিনাম্” প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর প্রয়োগ করিতে হইবে ।

দ্বিগুণ বাতাসে সামান্য ভ্রমণ বড় উপকারী, সামান্য ভ্রম নিতান্ত আবশ্যিক, কিন্তু বোগী সকল সময় তাহাতে সক্ষম না হইতে পারে । ফলতঃ দ্বিগুণ বাতাস কোন মতে শরীরে লাগাইলে উপকার দর্শিতে পারে ।

মাগ্নেটিকাল, ভয় প্রভৃতির জন্য “ইগ্নেসিয়া” এবং “ম্যাগনেট্রিস্” প্রয়োগ করিবে ।

আফিম কোন মতে প্রয়োগ করিবে না । উন্মাদ বোগমধ্যে বিস্তারিত জানিবাব পরোজন হইলে “লবী” বা “বডক” প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঔষধ-কাবদিগের গ্রন্থ পাঠ করা আবশ্যিক ।

হাকিমীমতে উন্মাদ রোগ চিকিৎসা ।



পাগল হইবাব নানা কাবণ থাকে এজন্য সে সকল বিষয়েই সবিশেষ বর্ণনে প্রবৃত্ত নহইয়া পাগলের লক্ষণ ও চিকিৎসা সাধাবণতঃ যাহা প্রচলিত আছে, তাহাই লিখিত হইতেছে । তবে কাবণসম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে সকল ব্যক্তির মায়ু সম্ভাবতঃ বা কোন কাবণতঃ অত্যন্ত দুর্বল, সেই সকল লোকের কোন প্রকারে মর্গবেদনা জন্মি এই পীড়া হইয়া থাকে ।

লক্ষণ ।—য্যালোপ্যাথিকে, বৈদ্যকে ও হোমিওপ্যাথিকে যে সকল লক্ষণের বিস্তারিত বর্ণনা হইয়াছে, হাকিমীমতে আর কোন নূতন লক্ষণ বা ঐ সকল লক্ষণের প্রকারান্তর দেখিতে পাওয়া যায় না, এজন্য পুনরুক্তি অনাবশ্যক বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইল ; তবে চিকিৎসাপ্রণালীতে পার্থক্য থাকা প্রযুক্ত তাহা লিখিত হইতেছে

চিকিৎসা ।—রোগীর মনঃক্ষেপ কাবণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিকারে প্রবৃত্ত থাকিবে সর্বত্র এরূপ প্রতিকার সহজসাধ্য নহে । আত্মীয় স্বজনের শোক জন্ম পীড়া জন্মিলে তাহার চিকিৎসার্থ অন্য উপায় অবশ্য অবলম্বনীয় এইরূপ ও অন্তরূপ অনেক প্রকার অসম্ভব কারণে যে বোগের উৎপত্তি হয়, বলা বাহুল্য যে, সে সকল প্রায় অসাধ্য ।

বিবেচক ঔষধ প্রয়োগ নিভান্ত প্রয়োজন বলিয়া হাকিমী চিকিৎসকেবাং ব্যবস্থা দেন, তজ্জন্ম মধ্যে মধ্যে ভেরেণ্ডার তৈল বড় উপকারী তাহার পরে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে

পারদ চূর্ণ ৬ বতি ।

আফিম ৪ মাসা ।

এই দুই অব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া দিবসেব মধ্যে তিন সন্ধ্যায় তিনবার খাওয়াইবে উপবোক্ত ঔষধে তিনটি বটা প্রস্তুত হইবে

অন্য উপায়

প্রথমে জোকাপ দিবে, তাহার পরে নীচেব লিখিত ঔষধ প্রয়োগ কবিবে ।

গাঁজা	...	...	৪ মাসা
চিনি	...	...	৪ মাসা

একত্র মিশ্রিত কবির ২টী বটী প্রস্তুত কবির দুইবেলা দুইটী খাইতে দিবে । বোগীব যদি গাঁজা খ ওয়া অভ্যাগ থাকে, তবে অধিক মাত্রায় গাঁজা এবং সেই পরিমাণে চিনি মিশ্রিত কবতঃ বটী প্রস্তুত কবিবে

কোন মোটা মল্লযোব ঐ বোগ অম্প দিনেব হইলে তাহাব স্তন মুজাব প্রস্থান নাড়ীতে বক্তমোক্ষণ করিবে বিবেচক ঔষধ খাওয়াইয়া পোট উত্তমরূপে পবিষ্কাব হইলে খাড়ে বাঁচিজা অথবা সর্ষপেব পলস্তাবা দিবে, এবং বোগীকে নিয়মিত ভ্রম কবাইবে, অম্প আহাব দিবে, মুখ না আসা পর্য্যন্ত পাবা চূর্ণ খাওয়াইবে ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

স্ত্র্যানোপ্যাথিকে বাত পক্ষ্যাবাতাদি রোগ চিকিৎসা ।

যাহাকে কশেককা মজ্জা বলে, উহা ধূসব এবং ক্ষেতবর্ণ পদার্থে নির্মিত ঐ দুই পদার্থের মধ্যে যাহা ধূসব বর্ণ, তাহা স্নায়ুসূত্র বা স্নায়ু-কাষ দ্বারা নির্মিত এবং অর্ধচক্রাকারে মজ্জার মধ্যস্থলে অবস্থিত এই প্রকাব প্রত্যেক পার্শ্ববর্তী অর্ধাংশে ধূসব বর্ণ পদার্থ আছে । এই পদার্থেব অগ্র এবং পশ্চাৎ ভাগ অগ্র-পশ্চাৎ শৃঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত

প্রত্যেক পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুর দুই মূল আছে,—অগ্রমূল এবং পশ্চাৎ মূল । অগ্রমূল দ্বারা মোটের বা স্পন্দনকর শক্তি ও পশ্চাৎ মূল দ্বারা

স্বাণালোপ্যাথিকৈ বাত পক্ষ্যাঘাতাদিরোগ চিকিৎসা । ৪৯৫

সেম্ববী বা স্পর্শানুভাবক স্নায়ুৰ উৎপত্তি অত্রমূল সকল অত্রশৃঙ্গৈব স্নায়ুকোষ হইতে উৎপন্ন হয় এবং ইচ্ছাশক্তি অত্র মজ্জা সূত্র দ্বারা মস্তিষ্ক হইতে এই ধূমব বর্ণ পদার্থে গমন কবিয়া থাকে পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুর পশ্চাৎ মূল দুইটা সূত্রে বিভক্ত উহার একাংশ উর্দ্ধে উঠিয়া মস্তিষ্কেব শ্বেতবর্ণ পদার্থের সহিত মিলিত হয় এবং উহা দ্বারাই স্পর্শানুভব শক্তি ক্রম হইতে মস্তিষ্কে গমন করে এবং উহার অন্যাংশ পশ্চাৎ শৃঙ্গৈব মধ্যে প্রবেশ কবিয়া তথায় অদৃশ্য হইয়া থাকে ।

কশেককা মজ্জাব পীড়া উত্তমরূপে জ্ঞান করিবার জন্য নিম্নলিখিত কথেকটী বিষয় স্মরণ রাখা কর্তব্য

১ এই কশেককা মজ্জাব পশ্চাৎভাগেব শুভ্রদ্বয় সর্বতোভাবে অনুপ্রস্থে ছিন্ন হইলে, ঐ ছিন্নাংশেব নীচে স্পন্দনশক্তি থাকে না, এবং উহাব অসম্পূর্ণ আঘাত দ্বারা কিম্বৎ পৰিণামেহ্রাস হইয় থাকে এই দুই অবস্থাতেই ছিন্নাংশেব নিম্নে স্পর্শানুভাবক শক্তি বৃদ্ধি হয় ।

২ । সমুখ এবং অনুপার্শ্ব স্তম্ভেব অনুপ্রস্থে কর্তন হইলে ছিন্নাংশের নিম্নভাগে সেইদিকেব স্পন্দন শক্তি নষ্ট হয়

৩ মজ্জামধ্যস্থ সমুদায় ধূমব বর্ণ পদার্থ ছেদন ববিলে ছিন্নাংশেব নিম্নে কেবলমাত্র স্পর্শানুভব শক্তির ধ্বংস হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ পদার্থেব এক পার্শ্ব অনুপ্রস্থে ছেদন কবিলে ছিন্নাংশেব নিম্নভাগে অপার দিকেব স্পর্শানুভব শক্তিব ধ্বংস এবং ছিন্ন দিকেব স্পর্শানুভব শক্তিব অদিক্য হয় ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে,—

৪ । মজ্জাব অর্দ্ধাংশ অনুপ্রস্থে ছেদন ববিলে, ছিন্নাংশেব নিম্নে সেই দিকে স্পন্দনশক্তিব নাশ ও স্পর্শানুভব শক্তিব আদিক্য হয়, আব অন্যদিকেব কেবল মাত্র স্পর্শানুভব শক্তিব অভাব হইয়া থাকে

৫ । মজ্জার ভিত্তবস্থিত পীড়িত স্থানে যদি পদাঙ্কিক উত্তেজন বর্তমান থাকে, তাহা হইলে পক্ষ্যাঘাতবিশিষ্ট অঙ্গেব আকুঞ্চন এবং পেশীর কাঠিন্য জন্মে ; কিন্তু অঙ্গদ্বিত পীড়ার বা প্রদাহেব শেষে উক্ত পেশী সকল শিথিল হয় ।

স্পাইনাল্ সিনিন্জাইটিস্ ।—এই বিশেষ পদাহ প্রায়ই

মজ্জাব প্রদ হেব সহিত দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু কখন কখন তাহা ব্যতীতও হইতে দেখা গিয়া থাকে

লক্ষণ ।—অতিশয় জ্বর, অনঙ্গা পৃষ্ঠদেশে দাহনবৎ কষ্টকর বেদনা ইহাব সম্ভাব বাতজ্বর বেদনাব মত, অনেক স্থলে গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশেব পেশী অবস্থিত ও দৃঢ় হইয়া থাকে, এবং হস্তপাদাদি দুর্বল ও কখন কখন অধঃশাখার পক্ষাঘাত হয় উৎসৃষ্ট দ্রবমেব পরিমাণ যত বৃদ্ধি হয়, দেহেব উপবিভাগেব স্পন্দনশক্তিব ততই হ্রাস হইয়া থাকে গ্রীবা, পৃষ্ঠ, এবং উদবে টানবোধ, শ্বাসকষ্ট, মূত্রাববোধ, লিফোড্রেক, একবাবে কোষ্ঠবদ্ধ, কখন বা উদবাসময় প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয় পীড়াব শেষাবস্থাতে শরীর নিতান্ত বলহীন হয়, রোগী কখন কখন প্রলাপ বকে ও অচেতন হইয়া থাকে

চিকিৎসা ।—বোম্বীকে অতি সুস্থিভাবে একপার্শ্বে শয়ন কবা-ইয়া বাথিবে অন্যান্য পোকাব প্রদ হে যেরূপ চিকিৎসা কবা যায়, ইহাতেও তদ্রূপ করিতে হইবে স্থানিক শৈত্যেব জন্য বরফ এবং বেলেন্স্টা বা ব্যবহার কবা বিধেয় ঔষধেব মধ্যে ক্যালোমেলু প্রয়োগ কবা অযুক্তি আইওডাইড অফ পটাশিয়াম ব্যবহার্য এবং বেদনাব জন্য আফিড দেওয়া যায়

মাইলাইটিস বা কশেরুকা ২ উজার প্রদাহ — ২ জীবক ঝিল্লী ব্যতীত কেবল ২ এ মজ্জাব প্রদ হ হইতে দেখা গিয়াছে, আব ঝিল্লী প্রদাহের লক্ষণাদি অপেক্ষা ইহাব লক্ষণ দি অধিকতর নির্দিষ্ট । ইহা প্রবল ও পুরাতন, এবং স্থানিক ও সাধ বৎ হইতে পাবে

লক্ষণ ।—আক্রান্ত স্থানে অল্প অল্প বেদন, নিপীড়নে বেদনার বৃদ্ধি, ইচ্ছামত গমনে অসমর্থ, এবং স্পন্দনশক্তিব অস্পষ্টতা অথবা একেবাবে অভাব, এবং হস্তপাদাদি বদৌর্ষ্য জন্মিয়া থাকে আক্ষেপ-যুক্ত অঙ্গ সকল নীর্ণ হয়, পেশী সমুদায় শিথিল, আকুঞ্চিত এবং আপেক্ষ-যুক্ত হইয়া থাকে মস্তিষ্কে প্রদাহ বিস্তারিত না হইলে বিবেক-শক্তি হানি হয় না পীড়ন অবস্থানুসারে শীত বা বিন্ধে মূত্রাববোধ অথবা মূত্রের বেগধাবনে অসমতা, অথবা অনৈচ্ছিক অর্থাৎ কষ্ট

য্যালোপ্যাথিকে বাত পক্ষ্যাযাতাদি রোগ চিকিৎসা ৩৯৭

যাতীত মলমূত্র নিঃসৃত হয় ক্রমে মস্তিষ্কেও প্রদাহ বিস্তার জন্ম বোগী
অজ্ঞানাবস্থায় প্রাণত্যাগ কবে

চিকিৎসা। — বোগীৰ গাত্র সৰ্বদা শুষ্ক ও পদিকৃত রাখিতে হইবে।
মূত্রাববোধ থাকিলে শলাকা দ্বারা প্রস্রাবক্রিয়ায় সাহায্য করিবে।
বিবেচনামত অন্যান্য উপসর্গেও চিকিৎসা কবা কর্তব্য নিম্নোক্ত ঔষধ
গুলি এই বোগে ব্যবহৃত কবা যায়।

ম্যাগ্নেসিয়া সল্ফেটিস্	..	১২০ গ্রো।
ম্যানা	...	৬০ গ্রো।
টীং জেলাপ	...	১৫ ড্রাম
ম্যাকোয়া ক্যাকই	.	১৫ অং.

একবারে সেবন কবাইবে। অথবা —

*ক্যালোমেলেনস্	..	২ গ্রো।
এক্সঃ জেলাপ	..	৮ গ্রো.

দুইটি বটী প্রস্তুত করিয়া বাত্রিতে রাখন কবিরূপে সময় সেবনীয়

হাইড্রার্জিনাই কবোসিভি সল্লুম্যাটি	.	১ গ্রো।
ম্যাগ্নেসিয়া হাইড্রোক্লোরাটিসি	.	৫ গ্রো।
এক্সঃ সাবস লিকুইড	...	১১৫ ড্রাম।
ডিক্টি সাবমা কম্পঃ	..	১১৫ অং.

দুই চামচ পরিমাণে দিবসে দুইবার সেবন কবিত্তে দিবে

ডাক্তার ট্যানার উপবোক্তরূপে চিকিৎসা কবিয়া থাকেন। পীড়া
পুৰাতন হইলে কডলিবার অয়েল, লৌহ, ফস্ফরাস, আর্শেনিক প্রভৃতি
ঔষধ বিশেষ উপকারী

স্পাইনাল্ কঙ্ক্লেস্চন্ বা কশেরুক। মজ্জায় রক্তাতিশয্য।—

অনেকে ইহাকে একটা পৃথক পীড়া বলিয়া গণ্য করেন ন মজ্জাবক
ঝিল্লীর প্রদাহের প্রথমাবস্থা হইতে ইহাকে প্রভেদ করা কঠিন ব্যাপার

লক্ষণঃ — হস্তপদাদির অঙ্গুলীর অগ্রভাগ চিন্ চিন্ কবে এবং পৃষ্ঠ-
বংশে ও হস্তপদাদিতে মন্দ মন্দ বেদন ও জ্বাতি বোধ হয় স্পর্শাদি

ভাবকাতা শক্তি ব'আধিয়া, নিপীড়নে পৃষ্ঠবংশের কোন স্থানে বেদনা জানা যায় না । পদতলে এক একাধিক কণ্ডু বন অল্পভূত হইয়া থাকে । জ্বরা থাকিলেও নিভান্ত দৌর্জল্য, নাড়ী ক্রতগামী, চঞ্চল ও অতিশয় নিপীড়্য ও মধো মধো দীর্ঘ নিশ্বাস দ্বারা ষা সকট হয়

চিকিৎসা । —মজ্জা প্রদাহেব চিকিৎসার সহিত ইহাও কোমর উত্তেজনা নাই কেবল বজ্রবেদন জন্য এই পীড়া হইলে জলোকা সংযোগে জ্বরাধুনা মুখ হইতে এং অর্শ-জন্য হইলে গুহাবাদ হইতে বক্ত ব'হিব কবা কর্তব্য

স্পাইনাল্ হিমারেজ বা কশেরুকা মজ্জায় রক্তপ্রাব।—
অনেক স্থলে পীড়াব কোন লক্ষণ দেখা যায় না । বক্তপ্রাবের স্থান-
বিশেষে লক্ষণাদিও ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে দুই বিশ্লীষ মধ্যস্থলে পৃষ্ঠ-
দেশে প্রবল বেদনা, কখন বা মস্তক বেদনা এবং কষ্টদায়ক আশ্বেপ
হইতে পারে মজ্জাব উপবিভাগে বক্তপ্রাব হইলে ষা সকট ও ছত্রপিণ্ডেব
ক্রিয়াব হ্রাস হয় এবং এক রক্তবিহীন ও নীতল হইয়া থাকে, কিন্তু মান-
সিকট লক্ষণ দেখা যায় না মজ্জাব মধ্য বক্তপ্রাব হইলে ঐ স্থানস্থ স্নায়ু-
দ্বারা দেহেব যে সকল স্থান পুষ্ট হয়, তাহাদেব অকস্মাৎ পক্ষাঘাত হয় ।

চিকিৎসা । —বোগীকে স্থিতিভাবে রাখা এবং বক্তপ্রাব নিবারণ
করিবার চেষ্টা কবা কর্তব্য

স্পাইনাল্ ইরিটেশন্ বা কশেরুকা মজ্জাব উত্তেজনা —
এই বোগীকেও অনেক পৃথক পীড়া বর্ণননা, বস্তুতঃ এমন কোন বিশেষ
লক্ষণ নাই, যদ্বাং ইহাকে অন্যান্য বোগ হইতে পৃথক কবা যায় । তবে
ডাক্তার হার্জি এবং গাই যে কণ বলেন, তাহাই নিম্নে লিপিবদ্ধ হইতেছে।

লক্ষণ —পৃষ্ঠবংশে বেদনা, নিপীড়ন ও উষ্মতা দ্বারা বেদনান বৃদ্ধি,
ব'ম্পার্শ্বে অ'ব'ম্পার্শ্বে ক্রিয়া প'ম্পার্শ্বে ক'ব'ম্পার্শ্বে, ব'ম্পার্শ্বে প'ম্পার্শ্বে, কখন কখন
সমস্ত উদবে বেদনা জানিতে. পাওয়া যায় শ্বাসকষ্ট, হৃদ্পন, হিষ্টিবিয়,
কে ঠবদ্র, আদ্যুনি, গ্রীধোকেব ষতুপরিবর্তন, মায়ুধিক উত্তেজনা,
গ্রীবা হইতে কটিদেশ পর্যন্ত পৃষ্ঠবংশ টিপিলে উহা কোন না কোন
স্থানে বেদনা বেধ হয়, কশেরুকা নিপীড়নে পার্শ্বেব ব'ম্পার্শ্বে এবং

ম্যালোপ্যাথিকে বাত পক্ষ্যাঘাতাদি রোগ চিকিৎসা। ৪৯৯

উদবেব বেদনা বৃদ্ধি হয়, এবং কখন কখন এই সকল বেদনাব সহিত সমস্ত পেশীমণ্ডলেব আক্ষেপ হইতে দেখা যায়

চিকিৎসা।—বোগীকে শ্রুতিবভাবে বাথিতে হইবে বেলডো-
নাব পলস্তাবা দেওয়া কর্তব্য হস্তপদাদি তলে জ্বালা থাকিলে বেল-
ডোনা খাইতে দিবে ম্যালোবিয়া জন্য এই পীড়া হইলে কুইনাইন
বিশেষ উপকারক, তন্ত্রিন সাধারণতঃ পুষ্টিকর পথ্য, কডলিভা অয়েল,
বার্ক, কুইনাইন ও লোহস্ফটিত ঔষধ ইহাব পক্ষে বিশেষ উপকারজনক

টিউমার —কোনরূপ টিউমার দ্বাবা দীর্ঘকাল নিপীড়নজন্য মজ্জাব
স্থানিক অস্পতা প্রযুক্ত পক্ষ্যাঘাত হইতে পারে

লক্ষণ —স্পর্শ ক্ষুভাবকতা শক্তি নষ্ট হইবার পূর্বে গতিশক্তি
থাকে না, টিউমাবেব স্থানে প্রায়ই বেদনা থাকে, কখন কখন আক্ষেপ
হয় উপদংশ পীড়া জন্য এই ব্যাধি হইলে লক্ষণ সমস্ত সর্বাঙ্গিক হইয়া
থাকে

চিকিৎসা।—আইওডাইড অফ পটাশিয়াম, কডলিভা অয়েল
এবং পুষ্টিকর পথ্য দ্বাবা চিকিৎসা করিবে।

হাইড্রোরিকিস্ —পৃষ্ঠবংশেব মধ্যে জল সঞ্চয়কে হাইড্রোবে-
কিস্ বলে। কিছুদিন পরে কশেকক মজ্জাব হ্রাস হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ।—গ্রীবাদেশে, পৃষ্ঠে ব কটিতে জল পদার্থে পবিপূর্ণ অর্ধ-
স্ফট টিউমার দেখিতে পাওয়া যায় এবং মজ্জাব সহিত তাহাব সংযোগ
থাকে

চিকিৎসা।—সাধারণ স্বাস্থ্যেব উন্নতিকল্পে মনোযোগ দেওয়াই
ইহাব ও কৃত চিকিৎসা

কক্ষন বা কশেকক মজ্জাব বিকল্পন, কোন উচ্চ স্থান হইতে
পতন, পৃষ্ঠদেশে আঘাত এবং অন্যান্য কারণে এই বোগ জন্মিতে
পারে

লক্ষণ - হঠাৎ পক্ষ্যাঘাত ও স্পর্শ ক্ষুভাবশক্তিব অভাব, মলত্যাগে
অসমর্থতা, উদর আধ্রান, বক্রসঞ্চালন ও শ্বাস প্রশ্বাসেব কষ্টজন্য মুখমণ্ডল
মর্চিন, তৃষ্ণা, শীতল, নাড়ী দুর্বল এবং শাবীবিক আঘাতেব অন্যান্য লক্ষণ

প্রকাশ পায় এইকপ নিরুদ্বেগ হেতু সবলাজ্জেন পক্ষাঘাত বা অন্ত্রভব শক্তির হ্রাস হইলে বোগী ব যুত্ব হইবাব সম্ভাবন

চিকিৎসা ।—অনবধান জনাই এই পীড়া সাংখ্যাতিকী হইয়া উঠে যে পর্য্যন্ত ন লক্ষণ সকল তিবোহিত হয়, সে পর্য্যন্ত বোগীকে স্থিতিবভাবে শযায় শয়ন কনাইয়া রাখিবে, পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা করিবে এবং পাকস্থলী ও মূত্রাজ্জেন ক্রিয়ার প্রাতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া তদনু-সাবে চিকিৎসা কবে

টেট্টেনস্ বা ধনুফেষ্কার ।—প্রায়ই এই বোগী অকস্মাৎ আক্র-মণ করিয়া থাকে, পূর্বলক্ষণ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না প্রথমতঃ হঠাৎ এবং কঠিন পেশী সমুদায় আক্রান্ত হয়, বোগী গদগদ ভিতব বেদনা অনুভব কবে, শীত বোধ হয় অস্থির সত্তর স্বন্ধি হইতে থাকে, গলাধঃ-করণে কষ্ট হয়, মস্তক পশ্চাদিকে আকৃষ্ট বোধ হয়, বক্ষে বেদনা, ক্রমে দস্তে দস্তে সংস্পর্শ হওয়া প্রায় মুখমধ্যে কোন বস্তু প্রবেশ করান যায় না, ইহাকে হ্রুৎস্ত কহে ।

ক্রমশঃ দেহেব পৃষ্ঠবংশেব পেশী সকল আক্রান্ত হওয়াতে শবীর পৃষ্ঠদিকে বক্র হইলে উহাতে পৃষ্ঠবক্র, সম্মুখদিকে বক্র হইলে সম্মুখ বক্র, এবং পার্শ্ব বক্র হইলে পার্শ্ববক্র কহা যায় । উদবেব পেশীসকল আকৃষ্ট উত্তর হ্রুৎস্ত এবং মুখেব বিকৃতি হয় পেশী সকলেব প্রবল আকৃষ্টন হেতু সান্তিশয় যাতনা হইতে থাকে, নাড়ী দ্রুতগামী, শ্বাসকষ্ট, বক্র উন্ন, এবং দেহ ঋণাত্মিক হয় । দশ পনর মিনিট অন্তর লক্ষণাদির কিঞ্চিৎ উপশম হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাহা অধিক-ক্ষণ থাকে না, পুনরায় উহা আবির্ভূত হইতে থাকে । বোগী নিদ্রিত হইলে পেশী সকল শিথিল হয় ।

এই পীড়া কঠিন হইয়া উঠিলে শ্বাসকষ্ট, শীতল ও নির্যাসনয় শর্শ, নাড়ী দ্রুত, মুখে ফেণায়ুক্ত বা বক্রসংযুক্ত মিউকস, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ, প্রলাপ, দৌর্বল্য বা শ্বাসবোধ জনা যুত্ব হইয়া থাকে ; কিন্তু চর্ম্ম অবস্থা পর্য্যন্ত কোন প্রকার মানসিক বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না । সাধারণতঃ চতুর্থ হইতে অষ্টম দিবস মধ্যে বোগীর যুত্ব হইতে পারিবে, কিন্তু শ্বাস-
—

র্যালোপ্যাথিকে বাত পক্ষাঘাতাদি রোগ চিকিৎসা। ৫০১

লাভ করিতে দুই তিন মাস সময় লাগে এই পীড়া কখন কখন অভিশ্রুত জন্ম হইয়া থাকে।

এই বোগেব ভাবীফল অত্যন্ত অশুভ কোন আঘাত জন্ম এই ব্যাধি হইলে সকল অপেক্ষা সাংঘাতিক হয় বোগাক্রমণেব পব ৪।৫ দিন অতীত হইলে অনেকটা আশা জন্মে

চিকিৎসা — অনেক স্থলে কোন প্রকার চিকিৎসা দ্বাবাই পীড়ার উপশম হয় না অহিফেণ, ক্লোরফরম, গাঞ্জা বেলডোনা, কুইনাইন, মদিবা, বরফ প্রভৃতি ঔষধ দ্বাবা এই বোগের চিকিৎসা করা যায় অহিফেণেব গুলি প্রস্তুত করিয়া তাহাব ধূম পান করাইলে এই বোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ডাক্তার ফেবাব নিম্নোক্ত ঔষধ উক্তরূপে ধূমপানের সহিত ব্যবস্থা করিয়া থাকেন

ক্লোরফরম	...	..	...	১০ বিন্দু।
টিং ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা	...	..	..	২০ বিন্দু
মিউসিলেজ	...	...	..	১ আং।

দুই তিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার্য।

পৃষ্ঠবংশের উপর বেলডোনার বাহ্য প্রয়োগ উপকারজনক বলিয়া অনেকস্থলে উহা ব্যবহার হইয়া থাকে বেলডোনার একফ্রাক্ট অর্ধ হইতে দুই গ্রেণ মাত্রায় ৪ ৬ ঘণ্টা অন্তর সেবন করান যায় অনেকে ক্লোরফরমের আণগ্রহণ করাইয়া বোগীকে অচেতন অবস্থায় রাখিবার উপদেশ দেন, কিন্তু ক্লোরফরমের ক্রিয়া নিরুত্তি হইলেই আবার বোগেব লক্ষণ সমুদায় প্রকাশিত হয় শ্বাসকষ্ট এবং দৌর্বল্য থাকিলে উহা একবারে নিষিদ্ধ কেহ কেহ বলেন ৪ ৫ ঘণ্টা অন্তর ৪ ৫ গ্রেণ মাত্রায় কুইনাইন ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে ডাক্তার ট্যানার নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহারেব উপদেশ দেন

সোডি সল্ফ্যাটিস্	...	...	৩০—৬০ গ্রেণ
ইনফিউজি কোয়াসিয়	...	.	১৫ আং।

একমাত্রা দিবসে তিনবার খাওয়াইবে

পূর্ণ মাত্রায় ক্যালোমেন্ ও জেলাপ দেওয়া যাইবে পৃষ্ঠবংশে

দীর্ঘক্ষণ বরফ মর্দন কর্তব্য আজিকালি অনেকে ২ ৩ ঘণ্টা অন্তর অর্ধ হইতে ১ গ্রোঁ মাত্রায় ক্রমাগতবাবিনেব এক্ষুণ্টীক্ট সেবন করাইয়া বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন

অহিফেন নিষিদ্ধ,—ইহাতে উপকার না হইয়া অপকার দর্শে

প্যাথালিসিস্ বা পক্ষ্যাঘাত —দেহস্থ কোন স্থানেব স্পর্শ স্পর্শ বা স্পন্দনশক্তির হ্রাসব একবারে অভাবকে প্যাথালিসিস্, পলুমি বা পক্ষ্যাঘাত বলে এই উভয়বিধ শক্তিব অভাবকে সম্পূর্ণ এবং এক শক্তিব অভাবকে অসম্পূর্ণ পক্ষ্যাঘাত কহা যায় স্পন্দনশক্তিব অভাবকে য়াসিনিয়া এবং স্পর্শস্পর্শ শক্তিব অভাবকে য়ানিস্থিসিয়া বলে অঙ্গবিশেষে পক্ষ্যাঘাত হইলে তাহাকে স্থানিক এবং সর্বোচ্চ ব্যাপিয়া হইলে তাহাকে সার্বোচ্চ পক্ষ্যাঘাত কহা যায় বাম বা দক্ষিণ পার্শ্বের পক্ষ্যাঘাতকে হেমিপ্লিজিয়া এবং অধঃশাখাব পক্ষ্যাঘাতকে প্যাথালিজিয়া কহে কোন দূর্বর্তী স্থান হইতে উত্তেজন আবৃত্ত হইয়া কশেকক মজ্জায় আগিলে যে পক্ষ্যাঘাত জন্মে তাহাকে রিফ্লেক্স বা প্রত্যাবৃত্ত পক্ষ্যাঘাত কহা গিয়া থাকে পেশীর অক্ষুণ্ণতা এবং হ্রাস জন্য যে পক্ষ্যাঘাত হয়, তাকে ওশেফিৎ পলুমী বা ক্ষয়কারক পক্ষ্যাঘাত বলা যায়

দেহেব ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পক্ষ্যাঘাতেব ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং চিকিৎসা নির্দিষ্ট থাকায় নিম্নে তাহাদের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে

১। জেনারল্ স্পাইনাল্ প্যাথালিসিস্ বা সাধারণ কশেরুক পক্ষ্যাঘাত । সর্বোচ্চ পক্ষ্যাঘাত সম্পূর্ণরূপে অর্থাৎ সমস্ত দেহেব স্পর্শস্পর্শ ও স্পন্দনশক্তিব অভাব হইলে বোগী প্রাণ ধারণে অসমর্থ হয় হস্তপদাদি উভয়েবই পক্ষ্যাঘাতকে সাধারণ পক্ষ্যাঘাত বলা যায়

লক্ষণ বাক্যের জড়তা, ওষ্ঠ ও জিহ্বাব কম্পন, হস্তপদাদিব স্পন্দনেব বৈপর্কিত্য, অনৈচ্ছিক মল মুত্র ত্যাগ, জড়বৎ অবস্থিতি এই অবস্থা ২ ৩ সপ্তাহ, ৩ ৬ মাস, ২ ৩ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে জেনেবাল্ প্যাথালিসিস্ অফ দি ইন্সেন্ বোগেব সহিত ইহাব পার্থক্য এই যে,

য্যালোপ্যাথিকে বাত পক্ষ্যাঘাতাদি রোগ চিকিৎসা । ৫০৩

ইহাতে মানসিক শক্তির কিছুমাত্র বিকৃতি হয় না, স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে

চিকিৎসা ।—অন্যান্য পক্ষ্যাঘাতেব ন্যায় ইহান চিকিৎসা করা যায়

২ হেমিপ্লীজিয়া।—এই বোগে কেবল স্পন্দনশক্তি, অথবা স্পন্দন ও স্পর্শানুভব উভয় শক্তিবই অভাব হয়

লক্ষণ ।—ক্যাসিয়েগ স্নায়ু প্রায়ই আক্রান্ত হয় না, আক্রান্ত হস্তপাদাদি উত্তোজন করিলে পড়িয়া যায়, মুখমণ্ডল শিথিল, জিহ্বা বহুদূর ও আক্রান্তদিকে বক্র হয় বাক্যাভাব বা বাক্যের জড়তা জন্মে, পাক যন্ত্রের বিকৃতি, স্পন্দনশক্তির সহিত প্রায়ই স্পর্শানুভব শক্তির হ্রাস হয়, স্মৃতি, চিন্তা ও অভিনিবেশ শক্তি দুর্বল হয়, স্বভাব ক্রম, নাড়ী ও শ্বাস-প্রশ্বাস স্বস্থ হইয়া থাকে, অশ্রুস্রাব, মূত্র আদ্যোগ্য না হইলে হস্তপাদাদি শীর্ণ ও কোমল হয়

ভাবী ফল ।—নূতন এবং অসম্পূর্ণ পীড়া, মস্তিষ্কের অবিকৃতি, বোগীর যৌবনাবস্থা, স্পর্শানুভবেব হ্রাস বা অভাবের পুনরাগমন, সম্ভাব্য আধিক্য এবং উৎকর্ষানুভব সুলক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে

দীর্ঘকাল স্থায়ী, সম্পূর্ণ পীড়া, স্পন্দনশক্তির সম্পূর্ণ অভাব, এবং বোগীর অধিক বয়স হইলে তাহাদিগকে কুলক্ষণ বলিতে হইবে

চিকিৎসা ।—কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে জেনেফ, স্কাগেনি, অথবা এবং তৈল দ্বারা উদর পবিত্র করান কৰ্তব্য

হস্তপাদাদির পেশী সকল সম্পূর্ণ শিথিল এবং মস্তিষ্কে বক্রাস্থিত হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে

স্পিবিট স্ ইথাবিস্ . . . ২১ ড্রাম।

স্পিবিটাস্ ভাইনি গ্যালিনীই . . . ১১ ড্রাম।

ইনফিউজি সিল্কোনা ফ্লুভাঃ . . . ৭১ আং।

ছয় মাত্রা চাৰি অথবা ছয় ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে

পেশীর দৃঢ়তা ও মস্তিষ্কে বক্রসংস্থান হইলে বিবেচক ঔষধ, বেনেজা এবং আইডাইড অফ পোটাসিয়াম প্রয়োগ করিতে হইবে

স্পাইনাল্ কর্ডেব কণ্ঠেশচন্ নিবারণার্থ ৩ ৪ গ্রোণ্ড মাজায় আর্গটি অফ বাই দিবসে দুই বার ব্যবহার কবিলে বিশেষ উপকার দর্শে এবং পৃষ্ঠবংশেব উপর ৪ ছইতে ৬ ইঞ্চ বেলডে ন পলঙ্গা দিব, তাহাতে উপকার মা দর্শিলে ১ বা ৩ গ্রোণ্ড পবিমাণে একফ্র্যাক্ট সেবন কবাইবে। ইহাতেও ফল প্রাপ্ত না ছইলে নিম্নোক্ত ঔষধ দিব

ডাং ব্রাউন্ সিকোয়ার্ড কর্তৃক প্রস্তুত বেলডোনা ... ৪ গ্রোণ্ড

আইওডাইড অফ পোটাসিয়ম্ ... ৬ গ্রোণ্ড।

এক একটা বটা প্রস্তুত কবিয়া দিবসে দুইবার সেবন কবাইবে

নিজান্তার বশতঃ অবসাদক ঔষধেব পয়োজন ছইলে অহিফেনেব পবিবর্তে হায়েমায়েমস্, কোনাযম, অথবা গাঞ্জা প্রয়োগ কবিবে কেহ কেহ নিম্নোক্ত ঔষধেব কোন একটা ব্যবহার কবিতে আদেশ দেন

একফ্র্যাক্ট কোনাই ... ৩ গ্রোণ্ড।

একফ্র্যাক্ট হায়েমায়েমস্ ... ৩ গ্রোণ্ড

পিলিউলা রেয়াই ... ৩ গ্রোণ্ড

দুইটি বটা প্রস্তুত কবিবে শায়নেব পূর্বে এক একটা সেবন কবাইবে

এক্স ক্যানাবিস ইণ্ডিকা ... ১—১ গ্রোণ্ড।

এক্স হায়েমায়েমস্ ... ৪ গ্রোণ্ড

একটা বটা প্রস্তুত কবিবে ২৪ ঘণ্টা বা ১২ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ কবিতে ছইবে

এই পীড়া পুৰাতন ছইলে কোন প্রকার উত্তেজক লিনিমেন্ট দ্বারা উপকার পাইবার সম্ভাবনা। নিম্নেব লিখিত উত্তেজক লিনিমেন্টে ব্যবহৃত ছইতে পারে

স্পিরিটাস্ ম্যাগনোনিয়া ম্যারোম্যাটিস্ ... ১ আং

স্পিরিটাস্ বোজ ম্যারিনি ... ১ আং

গ্লসবিং ... ১ আং

টীং ক্যান্থারাইডিস্ ... ২১—৬ ড্রাম

ম্যাকোয়া বোজ ... ৭১ আং

প্যারালিপ্যাথিক বাত পক্ষ্যাদিতাদি রোগ চিকিৎসা ৫০৫

মস্তকেব কেশ মুণ্ডম কবিত্বা ব্যবহার করিবে।

৩। প্যারাপিজিয়া।—নিম্নার্দ্ধ অথবা অধঃশাখার পক্ষ্যাদিতকে প্যারাপিজিয়া বলে

অন্যান্য পক্ষ্যাদিতেব মত ইহাও হঠাৎ বা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, কোন কোন স্থলে মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণাদি প্রকাশ পাইলেও সাধারণতঃ মানসিক শক্তির বৈলক্ষণ্য ঘটে না। মাজ্জাব নিম্নভাগ আক্রান্ত এবং তাছাতে সম্পূর্ণরূপে পক্ষ্যাদিত হইলে অধঃশাখার স্পর্শভূতবের ও স্পন্দনশক্তির সম্পূর্ণ অভাব হয়। সেক্রমে বা ত্রিকাহির উপর ক্ষত হইতে পারে। প্রজ্ঞাবে যামোনিধার গন্ধ থাকে এবং মূত্রত্যাগে আতিশয় কষ্ট ও সহজে মূত্রজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত ক্যাথিটার আবশ্যক হয়।

অসম্পূর্ণ পীড়ায় অধঃশাখা দুর্বল ও কঠিন হয় এবং উছাতে ভাববোধ ও শুভ্ৰশুভি অনুভূত হইয়া থাকে এবং বোগী চলিতে সমর্থ হয় না। এই সকল ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া মূত্রাশয় ও মরাতন্ত্রের পক্ষ্যাদিত হইতে পারে, এমন দেখা যায় যে, অনেক স্থলে উর্দ্ধশাখা ও দেহ আক্রান্ত হইয়া শ্বাসপ্রশ্বাস পেশীর ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য ন হইলে বোগী বৃত্তা হয় না, কোন কোন স্থলে ফেলিক স্নায়ুর মূলদেশ পর্যন্ত পীড়া বিস্তৃত হইয়া প্রাণবিরোধ হয়। অনেক স্থলে স্নায়ুর রিক্লুজ অর্থাৎ ওত্যাহত ক্রিয়াবধন না হওয়া পর্যন্ত পদতলে হত বুলাইলে অনৈচ্ছিক স্পন্দন হইতে পারে, কিন্তু মাজ্জাব কম্পনহেতু প্যারাপিজিয়া হইলে ওত্যাহত ক্রিয়া হয় না।

এই বোগ দুই প্রকারে হইয়া থাকে। কশেককা মজ্জা বা তাছাব আনরক স্নায়ুর কোন প্রকার পবিনর্ভরজন্ত প্যারাপিজিয়া এবং বিক্লুজ বা ওত্যাহত প্যারাপিজিয়া।

চিকিৎসা।—অত্র বোগের কাবণ অবধাবিত করা কর্তব্য, কাবণ কশেকক মজ্জার ওদাহ বা উছার বক্তাদিক্য জন্য যে পীড়া হয়, তাছাব সহিত রক্তের অস্পতা জন্ত পীড়ার চিকিৎসা সম্পূর্ণ পৃথক মজ্জাব উত্তেজকতা বশতঃ এই পীড়া জন্মিলে পেশীর আক্ষেপ, কম্পা ও লিধে।

এক প্ৰভৃতি লক্ষ্য দেখা যায় । পদাঙ্কেব উৰ্দ্ধ মাংস তে বোদনা পুৰ্ণ হইয়া, তাহাব নিমিত্ত গৰম জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া পৃষ্ঠবংশের উপর বুল হইলে উপকাৰ দর্শে । উত্তরপে বৰফ প্রয়োগেও বিশেষ ফল পাওয়া যায় বহু ষিক্য কমানাইবাব জন্য দিবসে ৪ হইতে ৬ গ্ৰেণ্ড মাংস আর্গট গফ বাই চূর্ণ ২ ৩ বাব খাইতে দিবে এবং পৃষ্ঠবংশের উপর স্নহৎ বনো-ডোনাৰ পলস্তাবা প্রয়োগ কবিবে । ইহাতে উপদ্রব ন হইলে নিম্ন লিখিত ঔষধ ব্যবহার কৰিলে বিশেষ ফল দর্শিবে ,

পোট্রাফি আইওডাইডি	..	..	৩ ৫ গ্ৰেণ
টিং বেলডোনা	.	.	৫—১৫ বিন্দু ।
স্পিবিটাস্ ব্যাণোনিয়া য়াণোম্যাটিসি	...	...	৩০ বিন্দু
টীং সিল্কোনা কম্প	.	.	১ ড্রাম
য়াকোয়া মেম্ব পিপাবেটা	.	..	১২ ড্রাম

এক মাত্রা দিবসে তিনবাব খাওয়াইবে

অস্থিবদ্ধা বা অনিদ্ৰা নিবারণ জন্য হায়েমায়েমস্, কোনায়েম এবং গাণ্ডা পূর্বে যে পকাবে ব্যবহার কবিবাব উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তদ্রূপে ব্যবহার করিতে হইবে । ইহাব জন্য কোনমতে আফিড ব্যবহার কবিবে না ।

গতকৈব বাম্পাভিমেত এই বোগে বিশেষ উপকাৰজনক ভিট্রিগ কুই । ইন এবং পোহুখটিও ঔষধ নমোক্ত প্রদানে ব্যবহার কবিবে

কুইনি সল্ফ্যাটিস্	..	..	২০ গ্ৰেণ
ফেনি সল্ফ্যাটিস্ একাকটে	..	..	২০ গ্ৰেণ
এক্স হায়েমায়েমস্	.	..	৩০ গ্ৰেণ ।

বাবটী বটী প্রস্তুত কবিবে . দিবসে ২টী সেবন করাইবে । এই সকল ঔষধের সহিত কোন প্রকাৰ লিনিমেন্ট আফেপায়ুও হানে মর্দন কবিবে

পুষ্টিকর পণ্য এবং কিয়ৎ পবিমাণে মদিরা সেবন কবিতে দিবে ।

কেহ কেহ ২. বা ৩. গ্ৰেণ মাত্রায় হিট্‌কুনিয়া প্রয়োগ কবিবাব উপদেশ দিয় থাকেন

ম্যালোপ্যাথিকে বাত পক্ষাঘাতাদি রোগ চিকিৎসা । ৫০৭

উপদংশ জন্য মজ্জাব পরিবর্তন হেতু প্যাবাথিসিয়া হইলে কিয়ৎ পরিমাণে পাবদঘটিত ওষধ বা পাবদ ভিত্তিক ব্যতীত উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই

৪ স্থানিক পক্ষাঘাত - ক্যান্সিয়েল প্যাবালিসিম্ বা মুখ-মণ্ডলেব পক্ষাঘাত। ইহাতে মুখমণ্ডলেব একদিকেব, কখন কখন বা উভয় দিকেব পেশীর পক্ষাঘাত হয় এবং তদ্বারা পক্ষাঘাতযুক্ত পেশীর আকৃষ্টন বা টনিক স্প্যাজম হইতে পারে। পৌশ্চিকভিত্তির কিম্বা সপ্তম শ্রায়ুব ক্যান্সিয়েল অংশে অঘাত অথবা পীড়ন শৈত্য সেবা এবং দৌর্বল্য জন্য প্রায়ই এই পীড়া জন্মিয়া থাকে। ভয়দণ্ডেব উত্তেজনা হেতুও জগিতে পারে।

লক্ষণ। এই বোগেব লক্ষণ সকল স্পষ্ট মুখ দেখিলেই জানিতে পারা যায়। উহার এক বা উভয় পার্শ্ব পক্ষাঘাত জন্ত বিকৃত হয়। পক্ষাঘাতযুক্ত পার্শ্ব ভাবশূন্য, অবিচিউলাব পেশী ক্রিযাবহিত ও তজ্জন্ত চক্ষের পাতা পতিত হয় না। বোগী কোন প্রকার মুখভঙ্গি প্রদর্শনে অসমর্থ, নামারঙ্গ আকৃষ্টিত বা প্রসবিত হইতে পারে না। মুখমণ্ডল স্থিতিভাবে বাথিলে আক্রান্তদিক অন্তঃস্থদিক অপেক্ষা চাপাট, মিথিল এবং বোলা হয়, মুখমণ্ডলেব পঞ্চম শ্রায়ু কোনকপ বিকৃত হয় ন, স্নাত্ত-বিক জ্ঞান থাকে। এই বোগেব সহিত আক্রান্তদিকে হেমিষ্ট্রিজিয় হইয়া থাকে, এবং ইহাকে সেবিবাল ক্যান্সিয়েল হেমিষ্ট্রিজিয়া বলে। কেহ কেহ বলেন পঞ্চম শ্রায়ুব পক্ষাঘাতও হইতে পারে।

চিকিৎসা - পুষ্টিকর খাদ্য, উষ্ণোদকে গাঃ মার্জনা, বা অবস্থা বিশেষে স্থান পক্ষাঘাতযুক্ত স্থানে হস্ত দ্বারা ঘর্ষণ, বৈদ্যুতিক প্রয়োগ এবং ঔষধেব মধ্যে বাতস্নেহ নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া কথিত। *

পোটাসি বাই কার্বনেটিস্	...	২ ড্রাম
টীং চিবাতা	...	১২ অং।
ডিক্টো ম্যালোজ কম্পাঃ	..	৭২ অং।

ছয় মাত্রা, প্রতিদিন প্রাতে এক এক মাত্রা হইতে দিবে।

ম্যালোপ্যাথি এবং জগ পক্ষাঘাতে -

টীং কুমিনি কম্পাঃ	...	১ আং।
ল ই টা নিগ্ আর্শেনিকেলিগ্		১৭২ বিল্ল
ফে'বরে টে য়ামোনিয়া গাইট্ টাটিগ্ .	..	৩০ গ্রোন
য়াকোয়া অনামিসিগ ই	.	৭১ আং।

ছয় মাত্র ২৮ ঘটা মগ্যে আহ নেব পন তিন বাব মেবন করাইবে

উপদংশেব লক্ষণ থাকিবে দিবসে ৫ প্রে মাত্রায় ২ ৩ বাব আইও-
ডাইড অফ পোটাশিয়াম্ বাবহার কবিত্তে দিলে উপকার দর্শিবে এই
ঔষঃ আহানেব পূর্বে প্রয়োগ কবা কর্তব্য

বোগী স্ত্র মাধাতুনি শিফ্ট হইলে -

কডলিভাব অথঃ . ২—৪ ড্রাম

পোটাশি আওডাইডি . ২১ গ্রোন।

এক মাত্রা দিবসে ৩ ৭ ৪ বাব প্রয়োগ কবিত্তে।

এই সবল উপায়ে বোগোপশয় ন হইলে ১০ গ্রোন মাত্রায় ফ্রিক্‌নিয়া
মেবনে উপকার দর্শে

আনন্ত স্থানে ফে'মেটেশন্, জলেক' ব বেলেস্স প্রযোগে বিশেষ
ফল দর্শে বেলেস্সাব ফো'দা কাটিয়া তাহাতে ১০ গ্রোন সলফেট্
অফ ফ্রিক্‌নিয়া ৫ ৬ গ্রোন পবিত্রিত চিনিব সহিত মিশ্রিত করিয়া ছড়া-
ইয়া দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় বহুদিনেব প্রবাতন পীড়ায় ইলে-
ক্টিমিটী ব্যবহার ববা কর্তব্য

কোন প্রকাশ্য কানন ব্যতীত যদি পীড়া হয় এবং আনন্ত
দিকে পীড়িত দন্ত থাকে, তবে তাহা উত্তোলন কবিলে উপকারেব
সম্ভাবনা।

ওয়েস্ট্রিং পল্‌মি বা ক্ষয়কর পক্ষ্যান্নাত।—ইহাকে প্রোপ্রো-
সিত লকোমোটর য়াটাজিও কহা যায় এই বোগে পেনী পদার্থের
প্রাণেব সহিত উহ ব এত প্রকার বিশেষ ক্ষয় ও পক্ষাঘাত জন্মে বাত-
বোগ, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় ও নৈতা মেবা ইত্যাদি কাবে ইহান উপশান্তি।
প্রীলোক অপেক্ষা পুরুষেবই যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় ইহা হইতে দেখা

স্যাঁলোপ্যাথিকে বাত পক্ষ্যাঘাতাদি রোগ চিকিৎসা। ৫০৯

লক্ষণঃ—এই পীড়া প্রায়ই অপ্পে অপ্পে প্রকাশ পায় স্বচীজীবী কুমারঃ স্বচী ধাবণে অসমর্থ, পাছুকানির্গিত পাছুকা নির্মানে অসমর্থ, স্বত্রধর তাহাব যন্ত্র ধারণে অসমর্থ, লেখক লেখনী ধাবণে অসমর্থ হইতে থাকে, তখন পীড়ার প্রতি মনোযোগ পড়ে ক্রমে ক্রমে আক্রান্ত পেশী সকল ক্ষয়প্রাপ্ত ও নিষ্ক্রিয় হয়, তখন পবীক কবিতা দেখিলে অনাক্রান্ত অংশ অপেক্ষা আক্রান্ত অংশ সৰু বণিয়া বোধ হয়। তাহার অক্ষুণ্ণভব শক্তি হ্রাসক, কখন বা হ্রাসক নী অন্য অন্য স্বাভাবিক লক্ষণের মধ্যে বেদনায়ই সর্বপ্রধান কোন কোন স্থলে বেদনা সান্তিশয় তীব্র হয়। সাধারণ স্বাস্থ্যের প্রায় বৈলক্ষণ্য হয় না। দেহেব যত্র সকল স্বাভাবিক অবস্থাব ন্যায় কার্য্য কবিতা থাকে অনেক স্থলে গন্ধিস্থানগুলি বেদনায়ুক্ত হয় এইরূপ পক্ষ্যাঘাত প্রায় আবেগ্য হয় না।

• চিকিৎসা।—পুষ্টিকর পথ্য, মাংস, অপক ডিম্ব, বগ, এবং ছুষ্ক উপযুক্ত পথ্য। ভ্রমধেব মধ্যে নিয়োক্ত প্রকরণ বিশেষ কলোপায়ক।

আর্জেন্টী নাইট্রাটিম্	...	...	১ গ্রো।
এন্ড হায়েমায়েমি	..	...	৩ গ্রো।

একটী বটী প্রস্তুত কবিতবে এবং বাব ঘণ্টা অন্তর এক একটী খালি-পোটে খাইতে দিবে।

ফেবি ফস্ফ্যাটিম্	...	...	৪০ গ্রো।
স্যাঁশিডি ফস্ফরাসাই ডিল্	...	...	১২ ড্রাম।
সিবাপি আরাটি ক্লোবিম্	..	...	২ আং।
মিউসিল্যাজিনিস্ ট্রাগ কান্ধ	..	...	৭২ আং।

ছয় মাত্রা। দিবসে তিন বাব সেবনীয়।

স্যাঁশিডি ফস্ফরাসাই ডিল্	..	...	১২ ড্রাম।
টীং স্যাঁকোনাইটী	...	...	২ ড্রাম।
টীং সিল্কোনি কম্পঃ	...	...	২ আং।
ইন্ফিউজন্ অ্যান্টিসিয়াই	..	...	৭২ আং।

ছয় মাত্রা। দিবসে তিন বাব খাওয়াইবে।

গোডি হাইপোফস্ফ্যাটি	..	...	৩০-৮০ গ্রো।

ইন্ফিউজন্ চিবাতা	...	৭১ আং ।
আর্জেন্ট নাইট টিস্	..	৬ গ্রোণ ।
এক্স হায়েস যেমি		১৮ গ্রোণ ।
ছয় ম এ দিবসে তিনবার প্রয়োগ করিবে		
য়্যানিডি কম্ফবিসাই ডিল্	..	১১ ড্রাম
টিং য়াকোনাইটি	.	১ ড্রাম
টিং সিল্কোন কম্পাঃ	..	১ আং ।
ইন্ফিউজন্ অর্যামিসিয়াই	..	৭১ আং ।
ছয় মাত্র দিবসে ২ ও ব ব খালি পেটে খাইতে দিবে		
পোটাসি আইওড ইডি	...	১২ গ্রোণ ।
ফেব্রিয়েট কুইনি সাইট্ টীস্	.	৩০ গ্রোণ ।
টিং য়াকোন ইটি	.	২৫ বিন্দু
ইন্ফিউজন্ চিবাতা	.	৫১ আং

ছয় মাত্রা দিবসে তিন মাত্রা প্রয়োগ করিবে

পক্ষাঘাত আবও অনেক প্রকার আছে, কিন্তু তাহাদের চিকিৎসা সম্বন্ধে কোন বিশেষ ব্যবস্থা নাই। যে সকল পক্ষাঘাতেই চিকিৎসা লিখিত হইল, অবস্থা বিশেষ এবং বিবেচন মত ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে তদ্বার ই উপকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা, এজন্ত অন্যান্য পক্ষাঘাতের পৃথক চিকিৎসা উল্লিখিত হইল না।

নিউরাইটিস্ বা স্নায়ুপ্রদাহ —এই বোগ প্রায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে বাতপ্রস্র বোগীর কোন প্রকারে কখন ব্যতীত স্নায়ুপ্রদাহ হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ —প্রদাহিত স্নায়ু ও তাহার শাখার দ্বারা বেদনা, জ্বর, অস্থি-বতা, এবং অনিদ্রা ইহার প্রধান লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে।

চিকিৎসা। —বাতবোগের আত্মসজ্জিকরূপে এই বোগ হইলে আইওডাইড অফ পোটাসিয়ম্ ও কল্‌চিকম্ দ্বারা উপকার প্রাপ্তি যায়। প্রদাহিত স্থানে বেলেডোনা ও অহিফেনের পুর্ল টিস্ প্রয়োগে বেদনা দূরিত হইয়া থাকে।

স্যানোপ্যাথিকে বাত পক্ষ্যাদিতাদি বোগ চিকিৎসা ৫১১

নিউরোমা বা স্নায়ু টিউমার -- স্নায়ুসমূহে যুক্ত টিউমারকে নিউরোমা কহে ।

লক্ষণ । প্রায়ই কোন প্রকাশ্য কারণ ব্যতিরেকে ইহার উদ্ভব হইয়া থাকে । এক স্নায়ুতে একটা টিউমার হইলে যন্ত্রণাদায়ক হয় বটে, কিন্তু অনেক হইলে তত যাতনা হয় না । অর্থাৎ যে নিউরোমা হয়, তাহা ধাতুগত ন্যায় ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ তমূর্জেব ন্যায় হইতে পারে । স্নায়ু কর্তন হেতু এই বোগ ক্রমিতে পারে ।

চিকিৎসা ।—কাটিয়া দেওয়া ভিন্ন উহার আর ভাল চিকিৎসা কিছুই নাই ।

নিউর্যাল্জিয়া বা স্নায়ুশূল ।—স্পর্শস্থানক স্নায়ুতে বেদনাব নাম নিউর্যাল্জিয়া বা স্নায়ুশূল । এই বোগ প্রায়ই দেহের এক পার্শ্বে হয়, বেদনা রোগীকে হঠাৎ আক্রমণ করে, এবং তদ্বারা বোগী আক্রান্ত স্থানে শব্দবেদন, ছুব বা দাহনবৎ বেদনা অনুভব করে । এই বেদনাব প্রায়ই বিবাক থাকে, এবং দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায় । এই ব্যাধি নানা প্রকার

১। শীঘ্র প্রকাশের পূর্বে স্থানিক বা সাধারণ দৌর্ভাগ্যের লক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে । বোগী মবল থাকিলেও বিশেষ অসুস্থতায় ভাঙ্গার সম্ভাবনিক দুর্বলতা নিশ্চয় কর যায় ।

২। আক্রান্ত স্নায়ু কোন গভীর স্থান হইতে উর্ধ্বে উঠিলে সমস্ত ঐ স্থানে বেদনা অনুভব হয় । অস্থিময় মণী হইতে বাহির হইবার বা ফ ইলাস্ ক্রিয়ায় ভেদ করিবাব সময় এইরূপ বেদনা হইতে পারে ।

৩। শীঘ্রই মবল অন্তর্ভুক্ত হইবে বেদনা বিবাকযুক্ত বা সম্প্রবিরাম-বিশিষ্ট হইয়া থাকে ।

৪। শান্তি বোধ বা অল্প কোন প্রকার দৌর্ভাগ্যবশতঃ শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়ে ।

৫। যে সকল স্থানে ম্যালেরিয়াব জন্য জ্বর অধিক হয়, সেই সকল স্থানে অনেকেই শিথিলবেদনা হইতে দেখা যায়, সেই শিথিল বেদনা

প্রায়ই কপালেব অর্ধাংশে হইয়া থাকে ত হাও এক প্রকার নিউ
র লুজিয়া

৬ যৌবনাস্থায় ২৫ ২৬ বৎসর বয়সেব সমগ দৈহিক যন্ত্রাদিয
সমবর্দ্ধন সময়ে শায়ম ওলের উদ্দীপন হেতু এই ব্যাধি জন্মিতে পাবে ।

৭ যৌবনেব পাবে ও ধনীলোকদিগেব আনন্দপ্রিয়তা ও শারী-
রিক অত্যাচাৰ, মদ্যবিশ্ৰেয় ধনচিন্তা, দবিমেব অনকষ্ট হেতু নানা চিন্তায
এই পীড়া হইয় থাকে ।

৮ শায়মদোর্বল্যহেতু বার্ককোও এই পীড়াব হস্ত হইতে অব্যাহত
থাকা সহজ নহে

৯ কোন কাবনে শরীবে বক্তাপ্পতা হইলে এই পীড় হওয়া
বিচিহ্ন নহে এই অবস্থায় শরীবেব সম্পূর্ণ পৰিপোষন হইতে পায় না,
এজন্য নিউব লুজিয়া হইতে দেখা যায়

এইরূপ নান কাবনে এই ব্যাধি মানবগণেব শরীরে আবির্ভূত হইয়া
থাকে ; এজন্য চিকিৎসক বোগেব কাবন প্রকৃতকপে অন্বেষণ কবিয়া
তবে চিকিৎসায় ভ্রমী হইবেন যথার্থ কাবন নিশ্চয় কবিয়া চিকিৎসা
কবিলে বোগোপশম ববিতে বিশেষ কষ্ট হয় না

চিকিৎসা — উত্তমরূপে বোগেব কাবন অন্বেষণ কবিয়া তদমু-
সারে নিম্নে ক ঔষধগুলির কোন একটী প্রয়োগ কবিতে বিশেষ ফল-
লব্ধ হইবে

ডিকষ্ট য়ালোজ কম্পাঃ	...	৪ আং
লাইকরিস্ পোটাশি	...	১১ ড্রাম
ইন্ফিউজি জেসিয়েন্ কম্পাঃ		৪ আং ।
ছয় মাত্রা । প্রতিদিন প্রাতে একবার		
টীং কুইনি কম্পাঃ	...	১ আং ।
লাইকরিস্ আর্শেনিক্	...	১৭১ বিন্দু
ফেবিরেট য়ামনি সাইট্রাটিস্	...	৩০ গ্রাণ
য়াকোয়া অর্যাসিয়াই	...	৭১ আং

ছয় মাত্রা । দিবসে তিনবার ; আহাবেব পব তিনবার সেবনীয়

যাংলোপ্যাথিক বাত পক্ষ্যাত দি রোগ চিকিৎসা । ৫১৩

ফেবি বেডাঙ্কি	...	৩৬—৬০ গ্রোণ ।
পেপ্সিন্ পে মি	...	৩৬ গ্রোণ ।
জিঙ্গি ফস্ফ্যাটিস্	...	১৮ গ্রোণ ।
গিসবিন্	উপযুক্ত পবিমাণে	
২৪টি বটী কবিরে প্রতিদিন অ হাবেন পাবে এক একটা প্রয়োগ কবিতে হইবে		
ফেবি ফস্ফ্যাটিস্		৪০ গ্রোণ ।
য়াশিডি ফস্ফ্যাটিস্ ডাইলিটমি		১২ ড্রাম ।
গিবাপি অব্যাণ্ডি ক্রোবিস্		২ আং ।
ছয় মাত্রা দিবসে তিনবার		
ফেবিঘেট য্যাংমোনিয় মাইট্রাটিস্		৪০ গ্রোণ ।
লাইকবিস্ ক্রীকনিয়া		২ ড্রাম ।
ইন্ফিউজি কোয়ামি		৭২ আং ।
আট মাত্রা দিবসে দুইবার		
মোডি হাইপোফস্ফাইটি		৮০—২৭০ গ্রোণ
স্পিবিটাস্ ইথাবিস্		২ আং ।
টিং সিন্ধে না ফ্লুভ		১২ আং ।

উহার ছোট এক চামচ ঔষধ বড় ১ সেব এক ১/২ জলেব সহিত
এক মাত্রা একপা তিন মাত্রা দিবসের মধ্যে সেবন কবাইবে

এতব্যতীত বেদনা নিবারণ জন্ত ১ ২ গ্রোণ মাত্রায় এক্স্ট্রাক্ট নেলে-
ডোনা দেওয়া য ইতে পারে কেহ কেহ এই বোগে ১—২ গ্রোণ মাত্রায়
ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকাৰ এক্স্ট্রাক্ট প্রয়োগ করিবার উপদেশ দেন, তাহ তে
অর্দ্ধ কাপালিক বেদনাব উপশম হইতে পারে ।

পার্থ্য ।—অধিক পবিমাণে দুগ্ধ, মাখন, হৃত, মব, কর্ডলিভার অয়েল,
অলিভ অয়েল, জঃ পাইব তৈল, নাবিকেল তৈল, মেদযুক্ত মাংস ।

প্রচুর বস্ত্রাদিতে দেহ আবৃত করিয়া রাখিবে শীত ও বর্ষাকালে
ফ্লানেল ব্যবহার নিতান্ত আবশ্যক । অল্প পবিমাণে শাবীষিক শ্রমও
কর্তব্য, কিন্তু তদ্বারা কোন মতে শরীর দুর্বল হইতে ন পায়

লোক্যাম্ স্য য়াঞ্জম্ বা স্থানিক অঙ্গগ্রহ — ইহ পেশীমুদ্রেন
 ব পেশীব অ কামিক ব আনচ্ছিক আকুঞ্চন মাত্র একপ পেশী
 আকুঞ্চনেব সহিত বেদনা য় কিলে তাহাকে ক্র্যাম্প বলা য় য় । হস্ত
 পদাদি, পাচাশয়, অস্ত্র ও হৃৎপিণ্ডেব পেশীব যঞ্জনাদ্যক আকুঞ্চনকে
 ক্র্যাম্প কহে

চিকিৎসা - চিকিৎসা কবিঃ ব পূর্বে ইহং লক্ষণ নিম্নে কব
 বর্তব্য ব্রোমাইড অফ পোটাশিয়ম্ ইহাব প্রধান ঐষদ কোন প্রকা
 লিনিমেণ্টেব সহিত ক্রোনোফর্ম মিশ্রিত করিয়া মালিশ কবিলে বিশেষ
 ফল দর্শে

বৈদ্যকে বাতব্যাধি রোগ চিকিৎসা ।

বাতব্যাধির কারণ ও উৎপত্তি ।—কন্দম, শীতল, অম্পা পরিমাণ
 ও লঘুপাকী অন্য ভোজনে, অতিশয় জীসৎসর্গ ও জাগরণে, অবিধি বক্র-
 আব, বমন ও বিবেচনে, অতিশয় লক্ষ প্রদানে, উদ্রস্থান হইতে পতনে,
 অতি সন্তবণে, অতিশয় পঞ্চভ্রমণ ও ব্যাধামে, অবিধি অঙ্গ সঞ্চালনে,
 যমাদি ধাতু ক্ষয়ে, চিন্তা, শোক, বেগ ধ বা শবীর অতিশয় ক্ষয় প্রাপ্ত
 হইলে, মল মুত্রের বেগ বোধ কবিলে, অপক বস অথবা উপবাসে, শবীরেব
 কোন স্থান আহত হইলে, সর্গস্থান আহত হেতু ও হস্তী ও অশ্ব হইতে
 পতিত হইলে, বায়ু বৃদ্ধি হইয়া শূন্যগর্ভ স্রোত সমূহে অর্থাৎ শিশু
 ও ধমনী সমূহে প্রবেশ কবিয়া বিবিধ প্রকার সর্ষ জন্যাপী কিম্বা একাধ
 ব্যাপী বোগ উৎপাদন কবে ।

বাতব্যাধিব পূর্বরূপ ও লক্ষণ ।—বাতব্যাধির অম্পু প্রকা-
 শিত লক্ষণকে ইহার পূর্বরূপ, অর্থাৎ পূর্ব লক্ষণগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রকা-
 শিত হইলে ইহার রূপ অর্থাৎ আকৃতি বল যায়, এবং নোপ পাইলে

রোগেব সাম্যাবস্থা হয়,—যেমন অপতন্ত্রক, অপতানক প্রভৃতিব প্রকাশিত লক্ষণেব বিনাশে বোগী অনেকটা সুস্থভাব প্রাপ্ত হয় ।

দূষিত বায়ুজনিত রোগের লক্ষণ —সন্ধিস্থান সঙ্কোচন, সন্ধিচালনশক্তি লোপ, অস্থি ও সন্ধি স্থান ভগ্ন, বোমহর্ষ, প্রলাপ অর্থাৎ অনর্থক বাক্যবায়, হস্তে, পৃষ্ঠে, মস্তকে বেদনা, খণ্ডতা, পঙ্গুতা, কুণ্ঠাৎ, অঙ্গ শুষ্কতা অর্থাৎ বাহু মুখ প্রভৃতিব শুষ্কতা, অনিদ্রা, অল্পানিদ্রা, গর্ভবিকৃতি ও গর্ভশক্তির লোপ, শরীর কম্পন, শরীরের অসাড়তা অর্থাৎ স্পর্শজ্ঞানহীনতা, মস্তক বসিয়া যায়, নাসিকা চেপ্টা হয়, কণ্ঠ ও বক্ষের সন্ধিস্থান, গ্রীবা ও বক্ষ গহ্বরে এবং চক্ষু কোটেবে প্রবেশ কবে, ওষ্ঠ ও চর্মাদিব বিদারণ, *বীবেব ব্যথা ও যাতনা, হস্তপদাদি বিক্ষেপ ও পরি-ওম, দূষিত বায়ু, এই সকল লক্ষণ জন্মায় । এ ভিন্ন বায়ু ও পিত্তের সহিত মিলিয়া স্থানবিশেষে বিশেষ বিশেষ রোগ উৎপাদন করে, ক্রমে তাহা লিখিত হইতেছে ।

কোষ্ঠস্থিত ও সর্বাস্থিত বায়ুর কার্য ।—কোষ্ঠস্থিত দূষিত বায়ু মল মুত্র বোধ করে, এবং বাধি, হ্রোগ, গুল্ম, অর্শ ও পার্শ্ববেদনা জন্মায় । সর্বাস্থিত দূষিত বায়ু কম্প, শরীরে বেদনা এবং সন্ধিস্থান ভেদী বেদনা জন্মায় ।

পাক্কাশস্থিত বায়ুর কার্য ।—ইহাতে স্থিত দূষিত বায়ু মল, মুত্র ও বায়ুনিঃসরণ বোধ করে, অশ্রাবী ও শর্করা বোগ, বেদনা, আগ্রান, জজ্ব, উরুতে, পাদে ও মেরুদণ্ডেব নিম্নপ্রদেশে বেদনা ও শুষ্কতা জন্মে ।

আগাশস্থিত বায়ুর কার্য —ইহাতে স্থিত দূষিত বায়ু পার্শ্বদেশে, হৃদয়ে, নাভিতে ও পেটে বেদনা, পিপাসা, উদ্গার, বিসৃটিকা বোগ, কাস, কণ্ঠ ও মুখশোষ এবং শ্বাস জন্মাইয় থাকে ।

পাক্কাশস্থিত বায়ুর অপর কার্য ।—ইহাতে স্থিত দূষিত বায়ু পূর্বেক্ত কার্য ব্যতীত আরও অনেক কার্য কবে যথা,—অস্ত্রে কখন গুড়গুড় শব্দ, কখন বা অন্য প্রকার শব্দ, অতিক্রমে বাহ্যে এ প্রকাশ হয়, এবং কণ, ত্বক, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের শক্তি নষ্ট কবে ।

চর্মস্থিত বায়ুর কার্য —ইহাতে স্থিত দূষিত বায়ু চর্ম কণ

অর্থাৎ শ্লিষ্ণু শূন্য, বিদীর্ণ, কৃশ, কৃমিবর্ণ, বিকৃত এবং কখন বক্তবণ হয় । এতদ্ব্যতীত বোগীর সন্ধিস্থানে বেদনা হয়

রক্তস্থিত বায়ুর কার্য্য ।—ইহাতে স্থিত দূষিত বায়ু শরীরে বেদনা, সন্তাপ, বিবর্ণতা, কৃশতা, অকচি, ত্রণ ও আছানান্তে শরীরে ঔকতা জন্মায়

মাংস ও মেদস্থিত বায়ুর কার্য্য ।—ইহাতে স্থিত দূষিত বায়ু শরীরে ঔকতা, বিনা পদার্থে শ্রমজ্ঞান, যষ্টি ও মুঠাঘাতের স্থায় শরীরে বেদনা জন্মায়

মজ্জা ও অস্থিস্থিত বায়ুর কার্য্য ।—ইহাতে স্থিত বায়ু অস্থি ও সন্ধিস্থানে বেদনা, কৃশতা, হ্রস্বলতা, অনিদ্রা এবং বিরামশূন্য বেদন জন্মায়

শুক্লস্থিত বায়ুর কার্য্য । ইহাতে স্থিত দূষিত বায়ু শুক্র ও গর্ভ নীত্র আব কবে এবং শুক্র কবিতা ফেলে, অথবা শুক্র ও গর্ভ বিকৃত কবে ।

শিয়ামস্থিত বায়ুর কার্য্য ।—ইহাতে স্থিত দূষিত বায়ু শরীরে বেদনা, বিরামশ্রোচন, শিবার শূলভ, ধলুফল্লার, কুজভ ও খাইলধর উৎপাদন করে ।

স্নায়ুস্থিত ও সন্ধিস্থিত বায়ুর কার্য্য ।—স্নায়ুস্থিত দূষিত বায়ু সর্কান্নব্যাপী ও একাঙ্গব্যাপী বোগ জন্মায় । সন্ধিস্থিত বায়ু সন্ধিস্থান শিথিল, শুষ্কিত ও বেদনা এবং ওড়ুড় শব্দ কবে

পিত্তমিশ্রিত ও কফমিশ্রিত প্রাণবায়ুর কার্য্য ।—পিত্ত মিশ্রিত প্রাণবায়ু বমন ও জ্বালা এবং কফমিশ্রিত প্রাণবায়ু হ্রস্বলতা, তন্দ্রা, বিষণ্ণতা ও মুখেব বিবসতা জন্মায়

পিত্তমিশ্রিত ও কফমিশ্রিত উদানবায়ুর কার্য্য ।—পিত্ত-মিশ্রিত উদানবায়ু জ্বালা, মূর্ছা, জ্বাস্তি, ক্রান্ততা, এবং কফমিশ্রিত উদান-বায়ু ধর্মবোধ, হর্ব, শন্দাগ্নি এবং শীত উৎপন্ন কবে

পিত্ত ও কফমিশ্রিত সমানবায়ুর কার্য্য ।—পিত্তমিশ্রিত

সমান বায়ু ঘর্ষ, জ্বালা, শবীরেব উষ্ণতা ও মূর্ছা বোগ জন্মায়, এবং কফ-
মিশ্রিত সমান বায়ু মলবদ্ধ করে ও বোমর্ষ অর্থাৎ বোমাঞ্চ জন্মায়

পিত্ত ও কফমিশ্রিত আপানবায়ুর কার্য্য ।—পিত্তমিশ্রিত
আপান বায়ু জ্বালা শবীর উষ্ণ ও রক্তজ্বর, এবং কফমিশ্রিত আপান
বায়ু আপান শরীরের নীচেব অংশে গুরুতা শীত জন্মায় ।

পিত্ত ও কফমিশ্রিত ব্যানবায়ুর কার্য্য —পিত্তমিশ্রিত
ব্যানবায়ু কর্তৃক জ্বালা, অঙ্গবিক্ষেপণ, ক্রান্ততা, এবং কফমিশ্রিত কর্তৃক
স্তম্ভন অর্থাৎ হস্তস্তম্ভাদি দণ্ডপতানক, শবীরবেদন এবং শোথ উৎপা-
দন করে

চিকিৎসা ।—বায়ুবোগাক্রান্ত ব্যক্তিব পক্ষে স্নান ও লবণ
রসযুক্ত স্নিগ্ধ আহার, তৈলাদি মর্দন ও স্নেহ বস্তি ক্রিয়া কর্তব্য

• কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুতে বোগীকে ছুঙ্কপান করাইবে । আমাশয়স্থ বায়ুতে
বোগীর বমন ও বিবেচনাদি ক্রিয়া দ্বাবা কক্ষ স্বেদ, লঙ্ঘন ও অগ্নিকারক
ঔষধ ব্যবহেয় । পকাশয়স্থ বায়ুতে তৈলাদিব দ্বাবা বিবেচন করাইবে

বস্তিগত বায়ুতে বস্তিশুদ্ধি, এবং রক্ত মাংস ছক ও শিরাত্তিত বায়ুতে
রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা কর্তব্য । শ্বাস, গন্ধিহল এবং অস্থিতে বাতাত্তিত
হইলে, স্নেহ প্রলেপ, অগ্নিকর্ম, বন্ধন ও মর্দনাদি কথিবে । ভ্রগগত
বায়ুতে স্বেদ, তৈলাদি মর্দন, অবগাহন ও স্নমিক্ত অন্ন ভোজন কথিবে ।

বায়ু রক্তগত হইলে শীতল প্রলেপ, বিবেচন, রক্তমোক্ষণ এবং মাংস
ও মেদগতে বিবেচন পিচকাবী দেওয়া এবং প্রশমন ঔষধ ব্যবস্থ । অস্থি
বা মজ্জাগত হইলে স্নেহপান ও স্নেহাভ্যঙ্গ ব্যবস্থা

বায়ু শরগতে স্ফুটাদি, বলকাব, শুক্রজনক অন্ন ভোজন করিবে ।
শুক্রের মার্গ রোধ হইলে বিরেচক ঔষধ দিবে । ইহা দ্বারা বায়ু সরল
হওয়াতে শুক্রনির্গমনের পথ উন্মুক্ত হয় ।

আক্ষেপক রোগের সাধারণ লক্ষণ ও ব্যুৎপত্তিগত
অর্থ ।—গতিশীল বুদ্ধিপ্রাপ্ত বায়ু শবীরেব সমস্ত ধমনীতে প্রবেশ করিলে
শবীর পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হয়, ইহাই সাধারণ লক্ষণ । পুনঃ পুনঃ শবীর
আগ্নি প্রাণ অর্থাৎ সঞ্চালিত হয় বলিয়া ইহাব নাম আক্ষেপক ।

চিকিৎসা —পাৰা গন্ধক লৌহ, অল্ৰ প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ২
মাস। এই সমুদায় স্ততবৃগাবীব বগে মাড়িয়া এবও পএ দ্বাবা বেফটন ও
বন্ধন কবিয়া ধান্নবানিব মধ্যে ৩ দিবস বাখিবে । উদ্ধৃত কবিয়া ২ বতি
ওমাণ বটী প্রস্তুত কবিলে অল্পপান মধু ও জিফলাব জণ অগ্নি বিবে-
চনায মাত্রা ব্যবস্থা কবিলে ইহাব নাম “চতুৰ্মুখ বস ”

মহা স্নগন্ধি তৈল ।—তিল তৈল ৪ সেব মঞ্জিষ্ঠা, চোব কাচকী,
দেবদাক, সুবল কাষ্ঠ, ব্যাঙ্গী, বচ, ওবাক স্বশ্বেব ছাল ওড়ক, তেজপত্র,
গন্ধ তু, শঠি, হরিতকী, বহেড়া, আমলা, মুখা, মিলিত ২ পল এই
কল্ক প্রথম পাক কবিলে । জটাশাংসী, সুবামাংসী, দনা, চম্পক পুপা,
প্রিয়ঙ্গু, ওড়ক, গেঁটেলা, বালা, কুড়, মকরক পুপা, পিড়িং শাক, মিলিত
২ পল, গন্ধবিবজী, কুন্দব খোণি, নখী, নালুকা শুষ্ক প্রত্যেক ১ পল ।
এই সমস্ত দ্রব্য দ্বাবা দ্বিতীয় কল্ক পাক কবিলে । এলাইচ, লবণ, শিলা-
রস, শ্বেত চন্দন, জাতী পুপা, খটাসী, কঁাকলা, অণ্ডক, লত কস্তুরি, কুম্-
কুম, প্রত্যেক ৪ তোলা, যুগ্ননতি ২ তোলা, কপূৰ ১ তোলা, এই সমু-
দায় দ্রব্য তৃতীয় কল্ক পাক কবিলে পাকান্তে তৈল হইতে খাটাসী
উদ্ধৃত কবিয়াই শিলাপেখিত কবিয়া তৈলে মিলাইবে বিল্বাদি পঞ্চ
পলবেব কাথে প্রথম বন্ধ পাক কবিলে । গন্ধাষু দ্বাবা দ্বিতীয় কল্ক ও
অণ্ডক গন্ধাবিতে তৃতীয় কল্ক পাক কবিলে

অপতন্ত্রক রোগের লক্ষণ ।—পূৰ্ণোক্ত কৰ্ম্মাদি কাবণে কুপিত
অৰ্থাৎ ও বৃদ্ধ বায়ু স্থান হইতে শরীরেব উর্দ্ধদেশে গমন কবিয়া প্রথমতঃ
হৃদয়ে প্রবেশ কবে এবং ঐ হৃদয়স্থানকে বিকৃত কবিয়া মস্তকে ও শাঙ্গে
অৰ্থাৎ কপালের পার্শ্বদ্রয়ে যাতনা প্ৰদান কবিয়া ধম্বকের দ্বায় বোগীব
শবীব আকর্ষণ কবিত্তে কবিত্তে উহাকে মোহিত কবে বোগী অতি
কষ্টে শ্বাস ত্যাগ কবে মুদ্রিত চক্ষু প্রকাশিত কবিয়া স্থির রাখে এবং
বাক্যহীন হইয়া পায়রাব ন্যায় শব্দ কবিত্তে থাকে

চিকিৎসা ।—হবিজা, বচ, কুড়, পিপ্পলী, শুঠী, জীবা, বনযমানী,
যষ্টিধু, সৈন্ধব লবণ সমভাগে চূর্ণ কবিয়া স্তত যিগ্নিত করতঃ অবলোহ

প্রাপ্ত করিবে মাত্রা ১ মাস। ২১ দিন সেবন করিবে ইহার নাম
“কল্যান লেহ ”

স্বল্প রসোন পিণ্ড —উপবিহিত ভকণ্য পেষিত বহু ১২
তোলা, হিঙ্গু, জীবা, মৈক্ক লবণ, মচল লবণ, ত্রিকটু প্রত্যেক চূর্ণ ১ মাসা,
সমুদায় একত্র মাজিয়া ১০ তোলা মাত্রায় এবং মূলের কাথেব সহিত এক
মাস সেব্য .

বহু পঞ্চমূল এবং বেড়েলাব সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিবে।

অপতানকের লক্ষণ ।—পূর্বেকৃত কক্ষাদি কাবনে কুপিত বায়ু
বোগীব দর্শনশক্তি বোধ করিয়া চেতনা লোপ কবে এবং কঠে নানা
প্রকার শব্দ জন্মায় কিছুকাল পবে বে গী চেতনা প্রাপ্ত হইলে স্তম্ভ হয়,
কিন্তু পুনর্বার অজ্ঞান হয়।

চিকিৎসা —তিল তৈল ১৬ সেব কাথ জব্য নিম্মূলের ছাল,
গনিয়ারী মূলের ছাল, সোণা মূলের ছাল, পাকল মূলের ছাল, পানিধা
মূলের ছাল, গন্ধভাঙ্গণে, অশ্বগন্ধ, বহুতী, কটকাবী, বেড়েলা, গোবক্ষ
চাকু, গোক্ষুব, পুনর্গবা প্রত্যেক ১০ পল, জল ২৫৬ সেব, শেষ ৬৪ সেব।
কল্ক—শুল্কা, দেবদাক, জটামাংসী, শৈলজ, বচ, বজ্রচন্দন, তগবপাছকা,
কুড়, এলাইচ, শাণ্ড পানি, চাকুলে, মুগানি, মাঝানি, বায়, অশ্বগন্ধ, মৈক্কব,
পুনর্গবা মূল, প্রত্যেক ২ পল, * তগুনীব বস ১৬ সেব, গব্য বা ছাগ দুগ্ধ
৬৪ সেব ইহার নাম ‘মধ্যম নাবায়ন তৈল’

যোগেন্দ্র বস ।—বসসিদ্ধ ১ তোলা, সর্গ, লৌহ, অভ্র, মুক্তা, বগ
প্রত্যেক ০ তোলা, যতকুমাৰী বসে ভ বনা দিয় ধ ন্যবাসিব মধ্য
৩ দিন রাখিবে, ২ বতি প্রায় ৮ বটী প্রাপ্ত করিয়া ত্রিফলাব জল ব চিনিব
সহিত সেবনীয় বাত্রিতে গব্য দুগ্ধ পান করিবে।

সপ্তাপতানকের লক্ষণ ।—কক্ষমুক্ত বায়ু শবীরেব সমস্ত ধমনীতে
প্রবেশ করিয় শবীরকে দণ্ড অর্থাৎ যষ্টিব ন্যায় শুষ্কিত ও দৃঢ়
কবে

চিকিৎসা ।— তিল তৈল ৪ সেব। বাথার্থ ম যকলাই ৪ সেব, দশ-
মূল ৬০ সেব, বেড়েলা মূল ২৫ পল কেতবী মূল ২৫ পলী, কক্কট মাংস ৩০

পান,কাঁচা মূল ২৫ পল, পাক জল ১২৮ সেব, শেষ ৩২ সেব দুধ ১৬ সেব, কল্ক জীবকাদি অষ্টবর্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চই, কটফল, নিকটু, বাগ্গা, পিপ্পলী মূল যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলাই, আলকুশীবীজ,এবওমূল, শুল্ফা, বিট, মৈস্কব ও মচল লবণ, পিপ্পলী, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, যমানী, ইন্দ্রযব, শতমূলী, শঠী, শুষ্ঠী, পিপ্পলী, মুখ, পুনর্নবা, হবিজা, দাকহরিজা, বৃহতী, কণ্টকারী, প্রত্যেক ২ তোলা ইহাব নাম “মহা কুকুট মাংস ঠোলা .”

নকুলাদ্য ঘৃত ।—ঘৃত ৪ সেব কাথ জব্য—নকুল মাংস ২ সেব, পাকজল ১৬ সেব, শেষ ৪ সেব দশমূল ২ সেব, জল ১৬ সেব, শেষ ৪ সেব মাষকলাই ২ সেব, জল ১৬ সেব, শেষ ৪ সেব বেডেলা ২ সেব, জল ১৬ সেব,শেষ ৪ সেব শতমূলীব রস ৪ সেব, দুধ ৪ সেব কল্কজব্য জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, ঋদ্ধি বৃদ্ধি,মেদ, মহামেদ, জীবন্তী, যষ্টিমধু, এলাইচ, গুড়ক, তেজপত্র, ত্রিকট, ত্রিফলা, মুখ, অনন্তমূল প্রত্যেক ২ তোলা

ধনুস্তম্ভ অর্থাৎ ধনুর্ফল্লারেব সাংগান্য লক্ষণ ।—দুশিত বায়ু স্রাব সঙ্কোচ কবিলে শরীর ধনুকেব ন্যায় বক্র হয়

ধনুস্তম্ভের বিশেষ লক্ষণ —ইহা দুই প্রকার, প্রথম পকারে বায়ু, অঙ্গুলী, শুল্ফা অর্থাৎ পাদগ্রন্থি, উদর, হৃদয়, বক্ষ ও গলদেশেব বায়ুকে আকর্ষণ কবিলে বোগীব দৃষ্টি শুভিত, ইহু অর্থাৎ গণ্ডস্থলেব উপরিভাগ বোগ, পার্শ্ব ভগ্ন এবং কক্ষ বমন হয় ও বোগী ধনুকেব ন্যায় সমুখদিকে বক্র হয় দ্বিতীয় প্রকারে বায়ু শরীরকে পশ্চাৎ দিকে আকর্ষণ কবিয়া বিপবীত ভাবে ধনুকের ন্যায় শরীর বক্র কবে,ইহাতে বক্ষস্থল, কটীদেশ এবং উরু ভাঙ্গিয়া যায় । ইহা অসাধ্য

চিকিৎসা ।—ঘৃত ৪ সেব ছাগমাংস ৫০ পল, দশমূল ৫০ পল, পাকজন্য জল ৬৪ সেব, শেষ ১৬ সেব, দুধ ৪ সেব, শতমূলীব রস ৪ সেব। কল্ক—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ,কাকোলী,ক্ষীর কাকোলী, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী যষ্টিমধু মিলি ৩ ১ সেব ইহাব নাম “ছাগাদ্য ঘৃত ”

রসরাজ রস ।—রসগন্ধুর ৪ তোলা,অত্র ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, ঘৃতকুমাবীব রসে মাড়িয়া ইহাব সহিত লৌহ, কপা, বঙ্গ, অশ্বগন্ধা,লবঙ্গ,

জয়ন্তী, ক্ষীর কঁকলা প্রত্যেক ৥০ তোলা মিশ্রিত করিয়া কঁকমাটীব
রসে মাড়িয়া ৫ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অল্পপান কর্তব্য ও চিনিব জল।

অভিঘাতজ আক্ষেপকেব কারণ ও লক্ষণ। আক্ষেপক
চ বি প্রকার; প্রথম দণ্ডাপাতনক, দ্বিতীয়—প্রথম প্রকার মলমুক্ত,
তৃতীয়—দ্বিতীয়প্রকার মলমুক্ত চতুর্থ—অভিঘাতজ আক্ষেপক। শেষোক্ত
ব্যতিবেকে সকলেবই লক্ষণ, ঐষদ চিকিৎসে পূর্বে উক্ত হইয়াছে।
তজ্জন্ম শেষোক্তেব লক্ষণই লিখিত হইতেছে। কফ ও পিত্তমিশ্রিত বায়ু
অথবা কেবল বায়ু যদি প্রভৃতি দ্বারা অভিঘাত লাগে হইয়া অভিঘাতজ
আক্ষেপক জন্মায়। ইহাতে সামান্য আক্ষেপকেব লক্ষণ লক্ষিত হয়।

চিকিৎসা। পূর্বেক্ত আক্ষেপকেব মতিত অভিঘাতজ আক্ষেপ
কেব লক্ষণেব বৈক্য আছে, সুতরাং চিকিৎসাও পূর্বেক্ত প্রকার
জানিতে হইবে।

অপতানকের অসাধ্য লক্ষণ — গর্ভপাতজ, অতিশয় বক্ত-
প্রবজ ও অভিঘাতজ অপতানক অসাধ্য।

পক্ষ্যঘাতের লক্ষণ।— বায়ু শব্দী বর্জ্যেব শিবা ও শায়ু শুষ্ক করিয়া
শব্দীবেব অর্ধাংশ লম্বাড করে স্নাতবাং অকণ্ঠ্য হইয়া পড়ে, সাধ বনে
ইহাকেই পক্ষ্যঘাত কহে। অপরদর্শিন্দগে ইহাকে একাংশ বোগ এবং
পক্ষ্যবধ বলেন। সমস্ত শব্দী অস ড হইলে সর্বদা বোগ বন যায়।

চিকিৎসা — তিল তৈল ৪ মেব কাগজের দণ্ডমূল ৮ মেব, জাম
৬৪ মেব, শেষ ১৬ মেব, মাকলাই ৮ মেব, জা ১৩ মেব শেষ ১৩
মেব। কল্ক—অশ্বগন্ধা, মঠী দেবদার, বেড়েলা বায়া, যাক্ত হুমে,
কুড়, পুরুষফল, বায়ুনহাটি, কুম্ভাণ্ড, ভূমিকুম্ভাণ্ড পুনর্গনা, ছোট-ফল,
জীবা, কুম্ভজীবা, চিঙ্গ, শুণ্ঠা, পুতুল, গোম্মুব মিশ্রিত ১০, চিতামূল,
জীবক, ঋষভক, মেদ, মহ মেদ, কঁকলা, ক্ষীর কঁকলা, যুগলি মাথানী,
জীবন্তী, বর্ষিমধু, মৈন্ধব, মিলিত ১ মেব। এষ্ট তৈল পান ও নস্যার্থে
প্রয়োজ্য। ইহার নাম “নিবামিন তৈল”।

হিঙ্গমাগব তৈল — শতমূল ১০ মেব, ভূমিকুম্ভাণ্ডেব ৮ মেব
৪ মেব, কুম্ভাণ্ড জল ৪ মেব, আম কী ৮ মেব, শিমূল মূল ৮ মেব

৪ সেব, গো ক্ষুব বস ৪ সেব, ন বিকেবা জল ৭ সেব, বদলী মুলেব বস
৪ সেব ছন্ধ ১৬ সেব তিল তৈল ৪ সেব কঙ্ক—বক্তচন্দন, তগবপী ছন্ধা,
কুড, মঞ্জিষ্ঠা, সবলকাঠ, অঙ্কু, জটামাংসী, মুবামাংসী, শৈলজ, যষ্টিমধু,
দেবদাক, নখী, হবিতকী, খটামী, পিড়িং শাক, কুন্দর খোটি নালুকা,
শতমূলী, লোধ কাঠ, মুখা, ওডডক, এলাইচ, ভেজপত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ,
জয়ন্তী মল্লবী শঠা শ্বেতচন্দন, গোটেলী, কপূর্ব প্রত্যেক ২ তোলা
যথালভ গন্ধজব্য প্রদান করিবে ।

বাতপিত্ত ও বাতশোথ পক্ষ্যাঘাতে র লক্ষণ বাতপিও
জনিও পক্ষ্যাঘাতে জ্বালা, উষ্ণতা ও মুচ্ছা হয় । বাতশোথের শরীরে
শীতগতা ও শোথ হয়

চিকিৎসা তিল তৈল ৫৪ সেব কাথার্থ—মূল—পত্র, শাখা,
সহিত গন্ধভালিষা ৩০ পল শতমূলী, অশগন্ধ কেয়াব মূল, দশমূল
প্রত্যেক, বেড়েলী বাঁটিমূল প্রত্যেক ১০০ পল, পানজল জল ৬০০
সেব, শেষ ৬৪ সেব কাঁজি ১২৮ সেব, দধিব গাত ১৬ সেব, ছন্ধ ১৬ সেব,
শুক্র ১৬ সেব, ইক্ষুবস ১৬ সেব, ছ গমাংসেব ক থ ১৬ সেব, অর্থাৎ মাংস
৮মের জল ৬৪ সেব, শেষ ১৬ সেব কঙ্ক—ভেলী, মুটী, তগবপী ছন্ধা, শুষ্ঠী,
পিপ্পলী, চিত্রীমূল, শঠী, বচ, পিড়িংশাক, গন্ধভালি মূল, পিপ্পলীমূল,
দেবদাক, শু ফ , ছে ট এলাইচ, ওডডক, বালা, কুম্ভক, কল্পবী, মঞ্জিষ্ঠা,
শিলানস, নখী, অঙ্কু, বপূর্ব, কুন্দরখোটি, হবিজ , লবঙ্গ, গন্ধত্ব, বক্ত-
চন্দন কঁকলা, নালুকা, মুখা, কুম্ভক, সূদি, ভেজপত্র, শঠী, রেণু, ক,
শৈলজ, সবলকাঠ, কেতকী, ত্রিফলা, আলকন্দীমূল, শতমূলী, সবলকাঠ,
গন্ধ, নাগেশ্বর, ত্রিযঙ্গু, বেণাব মূল, জটামাংসী, জীবক, শ্মশ্রুতক মেদ, মহামেদ,
কাকোলী, ক্ষীব কঁকোলী, মুগান্বি, মায় নি, জীবন্তী, যষ্টিমধু, পুনর্নবা,
দশমূল, অশগন্ধা, নাগেশ্বর, বসাক্ষন, লতাকপ্তাণী ফল, জায়ফল, সূপান্বি,
গন্ধরস, ইহাদেব প্রত্যেক ৩ পল এই তৈল ৬ প্রকারে প্রয়োগ করিবে ।
মর্দনে ভগ্নগত, পানে কোষ্ঠগত, ভোজনে ক্ষুধা নাড়ীস্থ নমো ঔষ্ণগত,
নিরুহ জিহায মূর্ধদেহস্থ এবং চিকিৎসায় পক্ষাঘাত বাতবোগ নষ্ট হয় ।
ইহাব নাম “অষ্ট দশ শতিকা ও স বিণী তৈল”

বৃহদ্রাত চিন্তামনি ।—স্বর্ণ ৩ ভাগ রূপা ২ ভাগ, তাম্র ২ ভাগ, লৌহ ৫ ভাগ, প্রবাল ৩ ভাগ, মুক্ত ৩ ভাগ, বসমিসুন্দর ৭ ভাগ, ঘৃতকুমারী ৭ বসে মাড়িয়া ২ বতি ও মাংস বটীকা প্রস্তুত করিবে। ব্যাধি বিশেষে অল্পাংশ ব্যবস্থেয় ।

পক্ষাঘাতের সাধা ও অসাধা লক্ষণ । বাত প্রক্ষাঘাত অসাধা বাতপিত্তজ ও বতশ্লেষ্মজ পক্ষাঘাত অসাধা ধাতুক্ষয়জ পক্ষাঘাত ও অসাধা

অর্দ্ধিত রোগের কারণ ও লক্ষণ । উচ্চৈশ্বরে কথা বলা, কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ, উচ্চ হাসি, জ্বন্তন অর্থাৎ হাই, ভাববহন অবিধিপূর্বক শয়ন, এই সকল কাবণে বর্ধিত বায়ু মুখে মাতনা দিয়া অর্দ্ধিত বোগ জন্মায় ইহাতে রোগী বায়ু মুখে বতর্ক ২শ ও ৭ দেশ বক, মস্তক কম্পান, ব্যাক্যবোধ, এবং চক্ষু, জ্ঞান প্রভৃতি বক্র হয়,—অধিকন্তু যে পার্শ্বে বক্রতা রূপবিকৃতি জন্মে, সেই পার্শ্বে বেদনা জন্মায়

চিকিৎসা ।—তিল তৈল ৪ সেব, বেডেলামূলের কাথ ৩২ সেব, মিলিত দর্শামূলের কাথ ৩২ সেব, যব, কুলশুঠ ও কুলশ কলায়ের কাথ মিলিত ৩২ সেব ছক ৩২ সেব । কল্ক জীবক, ধ্বজক, মেদ, মহামেদ, ককড়া কীটকীলা, মুগাণ্ডি, মাংসানি, জীবন্তী, মর্টিমধু, মৈসন, অণ্ডক, শ্বেত ধূন সবলকাঠ, দেবদারু, মজিষ্ঠা, বজ্রচন্দন, কুড়, এয়াইচ, পীত চন্দন, জটামাংসী, শৈবজ, তেজপত্র, ভগ্নর পাছকা, অনন্তমূল, বচ, শত মূলী, অশ্বগন্ধা, শুষ্ক, পুষ্কর্ণা মিলিত ১ সেব ইহা বলা “মহা বচ তৈল ”

ক্ষুদ্র প্রয়োগ —বস্ত্র ছেঁচি মবনীভেব সহিত ভক্ষণ করিবে। মবনীভেব সহিত মাংসকলা য়েব পিষ্টক ভক্ষণ ছক এবং মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন ও মাংসকালে দর্শামূলের কাথ পান করিবে অর্দ্ধিত বোগ ভাল হয় তিল তৈল বা কাঁজিপবিপূর্ণ টেব অবগাহন করিবে ।

মস্তাস্ত্রের লক্ষণ ।- জিহ্বানিলেখনে অর্থাৎ পরিষ্কার করণে, শুষ্ক দ্রব্য ভক্ষণে, হস্তস্থানে কোন প্রকার আঘাত না গিলে, হস্তস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া মুখ বিস্তার করিয়া অথবা আত্মত কথিয়া বাখে বোগী

তত্ত্বি কষ্টে চরণ কবিত্তে ও কথ্য বহিত্তে পাবে । দিঃ নিত্র, অসমান
জ্ঞানে উপবেশন ও বিকৃতভাবে উদ্ধৃদিকে দর্শন দাবা কুপিও বায়ু
শ্বেদ্যঃ সহিত মিশ্রিত হইয়া মত্তা স্তম্ভিত করে

চিকিৎসা । তিল তৈল ৪ সেব । কথার্থ গণ্ডাভুলে ১০০ পল,
জল ৬৪ সেব, শ্বেদ ১৬ সেব, অশ্বগণ্ডা মূত্র ৫০ পল, জল ৬৪ সেব, শ্বেদ ১৬
সেব গণ্ডা ব মহিষ দুগ্ধ ১৬ সেব । পদ্ম ও শতমূলী প্রত্যেক ৪ সেব
রস কল্কজব্য - শুষ্ক পিপ্পলী, এলাইচ, বুদ্ধ, কণ্টক বী, শুষ্ঠী, যষ্টি-
মধু দেবদারু, পালপানি, পুনর্গণ্ডা, মজ্জিষ্ঠা, তেজপত্র, বাঙ্গা, বচ কুড়,
যমানী, গন্ধ তুল, জটামাংসী, নিম্বী বোড়ল, চিতামূল গোম্মুব, মৃণাল,
শতমূলী, প্রত্যেক ২ তোলা ইহ ব নাম “পুষ্পবাজী প্রসাবিনী টী”

ক্ষুদ্র প্রয়োগ । - বৃহৎপাকমূল অথবা দশমূল্যেব কাথ প্রান কবিত্তে ।

জিহ্বা স্তম্ভিত লক্ষণ — বায়ু শতমূলী নিবা সমুদয়কে বণ্ড
কবিত্তা জিহ্বাকে স্তম্ভিত কবে বোগী পান ভোজন দিতে অসক্ত হয়

চিকিৎসা । — বেড়ে ১১ ১২ ০ সেব, অশ্বগণ্ডা ১২ ০ সেব, পাকজন্ত
জল ২৫৬ সেব, শ্বেদ ৩৪ সেব, শুভ্র ৩ ০ সেব, ধ ইক্ষুলা ২ সেব, ক্ষীণ
কাঁকড়া ২ পল, এল ও মূত্র ২ পল বাঙ্গা এলাইচ, গণ্ডা ভুলে, লবঙ্গ,
বেণাব মূল, গোম্মুব, প্রত্যেক ১ পল একত্র ১ মাম আত্মত পাণে
বাধিনে ইহা ব নাম ‘বলাবিষ্ট’

ক্ষুদ্র প্রয়োগ । - যত তৈলাদিব গণ্ডায় উপকান দর্শে

নিরাগ্রহেয় লক্ষণ — বায়ু বহিত্তে সহিত মিশ্রিত হইয়া গলদেশ
স্থিত পাবাসমূহকে কক্ষ বেদনামুক্ত ও স্বকবর্ণ কবে এই বোগ অসাম্য

গুণ্ডমী রোগের লক্ষণ — ইহাতে কটি, পৃষ্ঠ, জাহ্নু, জঙ্ঘা ও
পাদদেশে বেদন ও জড়তা জন্মে অথং পবে পুনঃ পুনঃ কম্পিত হয়
গুণ্ডমী বায়ু কর্তৃক উৎপন্ন হয়, ইহাতে বায়ু ও কফজ তন্দ্রা, শুকতা ও
অকটি জন্মিয়া থাকে

চিকিৎসা । — বাবণাব ছাল, অশ্বগণ্ডা, হরুগ, গুলঞ্চ, শতমূলী,
গোম্মুব, বিদ্ধক, বঙ্গ, শুল্ফা, শাঠী, যমানী, শুষ্ঠী, প্রত্যেক চূর্ণ ১
তোলা, গুণ্ডমূল ১২ তোলা যত ৬ তোলা এগমে যতে গুণ্ডগুণ্ড

মাড়িয়া পবে সমুদায় একত্রে মাড়িবে মাজ ০ তোলা অল্পপান
মুদ্র, মাংস দিব যয, দুগ্ধ বা উষ্ণ জল .

মৃষ্টিযোগ —গোমূত্রএব সহিত ১ মাস এনও তৈল পান করিলে
গৃধ্রমৌ বোগ প্রশমিত হয়

যুগ্ম অগ্নিতে শেষ িকা পত্রের কাণ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে
পোষিত এবও কলে দুগ্ধএব সহিত পায়স প্রস্তুত করিয়া শুষ্ঠী চূর্ণএব
সহিত ভক্ষণীয় .

বিশ্বচীর লক্ষণ —যে কণ্ডবা ব হু পৃষ্ঠ হইতে হস্তেব উপব দিয়া
আসিয়া অঙ্গুলীপ্রান্তে শেষ হইয়াছে, ইহাতে সেই কণ্ডবা দূষিত হইয়া
হস্তেব কার্য অর্থাৎ অ কৃষ্ণনু প্রসারণাদি লোপ হয়

ক্রোচ্ছুক শীর্ষেব ব্যাপ্তিগত অর্থ ও লক্ষণ —বায়ু ও
শোণিত কর্তৃক উষ্ণ ও জজ্বার সন্ধিস্থ নে অর্থাৎ জাহ্নতে শোথ হয়, ইহা
ক্রোচ্ছুকের অর্থাৎ শৃগালের মস্তকেব ন্যায় বড হয় বলিয়া ইহাকে
ক্রোচ্ছুকশীর্ষ কহে

খঞ্জ ও পঙ্গুর লক্ষণ ইহাতে কটীস্থিত বায়ু কোন এক
জন্তেব কণ্ডবা আকর্ষণ করিয়া জজ্বার শক্তি লোপ করে। যে জজ্বাদ-
য়েব শক্তি লোপ হয়, তাহ কে পঙ্গু বো বো যে বোগে বোগী গমন
করিবার সময় কম্পিত হইয়া নিবৃত্ত বে গমন হবে এবং বোগীব পদ-
সন্ধিবন্ধন শিথিল হয়, তাহাকে খঞ্জ বলে

চিকিৎসা —তিল তৈল ১৬ মেব কাথার্থ—গন্ধতালুলে ১২ ০
মেব, জল ৬৪ মেব, মেঘ ১৬ মেব, দগিব মাত ১৬ মেব, কাঁজি ১৬ মেব
দুগ্ধ ৩২ মেব কল্ক —চিতামূল, পিপ্পলী মূল, যষ্টিমধু, মৈন্ধব, বেড়েলা,
শুণ্ফ, দেবদাক, রান্না, গজপিপ্পলী, গন্ধতালুলের মূল, জটামাংসী,
ভেলাব মুটী, প্রত্যেক ১ পল ইহার নাম “কুজ প্রসারিণী তৈল ”

মগ্নশক্তিকা প্রসারিণী তৈল । —তিল তৈল ১৬ মেব কাথার্থ
মূল ও পত্রসহিত শবৎকালে উজ্জ্বত গন্ধতালুলে ১২ ০ মেব, কাঁজি মূল,
শতমূলী, বেড়েলা, আলকুশী মূল, অশ্বগন্ধা কেমাব মূল, প্রত্যেক ১২ ০
মেব। চারি ও জলে পাক করিয়া পৃথক পৃথক বাণ প্রস্তুত করিবে

দধিব মাত, ছাগ মংগোব ক থ, চু ক, ছক, দধি প্রত্যেক ১৬ সেব । কল্ক
 জব্য—তগব পাছকা, মদন ফল, কড় নাগেশ্বর, মুখা, শুড়ক, বাগা, টেম, ব,
 পিপ্পলী জটামাংসী, মঞ্জিষ্ঠা যক্ষীমধু মেদ, মহামেদ, জীবক, স্বয়ংক,
 শূলফ, নখী, শুঠী, দেবদাক, কাঁকলা, ফাঁকলা বচ, ভেলাব মুঠী,
 প্রত্যেক ৪ তোলা

বাতকণ্টক রোগের লক্ষণ —অবৈধ পাদস্থাপনে অথবা পথ-
 ভ্রমে কুপিত বায়ু শূলফ অর্থাৎ গোতালিতে বেদনা জন্মায় ইহাব নাম
 বাতকণ্টক ।

ক্ষুদ্র প্রয়োগ ।—ইহাতে পাদদেশের বক্তমোক্ষ, উষ্ণ সূচী দ্বারা
 দাহ বা এবণ্ড তৈল পান ব্যবস্থায় ।

পাদদাহের লক্ষণ — ইহাতে বায়ু পিত্ত ও বক্তক্—হিত মিলিত
 হইয়া পাদে জ্বালা উৎপাদন করে এবং চলিয়া বেড়াইলে জ্বালা কম পড়ে

চিকিৎসা ।—তিল তৈল ৪ সেব । কাথার্থ গুলঞ্চ ১০০ পল, জল
 ৬৪ সের, শেষ ১৬ সেব কল্ক—গুলঞ্চ ১ সেব ইহাব নাম “গুলুচী তৈল ”

পাদহর্ষের লক্ষণ — ইহাতে বায়ু ও শ্লেষ্মা দূষিত হইয়া পাদ-
 ঘষকে অসাড় করে অর্থাৎ পাদস্পর্শ করিলে রোগী জানিতে পাবে না,
 নখ দিয়া চর্মকাটিলেও বেদনা প্রাপ্ত হয় না বোম দ্বিত হইলে নখী ব
 যেক্রপ কটকিত হয়, পাদ ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—তিল তৈল ৪ সেব কাথার্থ শাবকল য, মমিন,
 যব, ঝাঁটিমূল, কণ্টকানী, গোক্ষুব, সোণাছাল, জটামাংসী জালুকশী
 বীজ, প্রত্যেক ৮ পল, পাঁকার জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, কাপাস বীজ,
 শণ বীজ, কুলথ কলায় কুলশুঠ প্রত্যেক ১৬ পল, জল ৬৪ সের, শেষ
 ১৬ সের কল্ক—শুঠী, পিপ্পলী, শূলফ, ভেবেন্দ মূল, পুনর্গন, গন্ধভূতলে,
 রান্না, বেড়েয়া, গুলঞ্চ, কটুকী মিলিত ১ সেব ইহাব নাম “মায়তৈল ।”

অংশ শোষ ও আববাহক রোগের লক্ষণ —অংশ শোষে
 বায়ু ক্ষয়স্থিত শ্লেষ্মা শুষ্ক করে যে বোগে ক্ষয়স্থিত বায়ু ক্ষয়দে শোষ
 শিগ্রা সকল সঞ্চিত করে, তাহাব নাম আববাহক

চিকিৎসা । পূর্বোক্ত মহাকুট্ট মাংস, তৈল এবং নিবামি
মুহাম য তৈল ইহাতেও প্রয়োগ করিতে পারা যায় ।

মূকত্ব, মিম্বিনত্ব ও গদগদত্বের লক্ষণ বায়ু কফের সহিত
মিলিত হইয়া শব্দবাহী নিব বোম কবিতা মূকত্ব অর্থাৎ ব কশিত্বহীনতা,
মিম্বিনত্ব অর্থাৎ সান্নাসিক বচন ও গদগদত্ব অর্থাৎ অস্পষ্ট বচন জন্মায়

তুণী রোগের লক্ষণ —যে বোগে মূত্রাশয় অথবা পকাশয়
হইতে বেদন উৎপন্ন হইয়া অতি প্রবলকণে মলদ্বাবে অথবা উপস্থে
অর্থাৎ লিঙ্গনালে ও যোনিতে প্রবেশ করে, সেই বোগেব নাম তুণী ।

প্রতিতুণীর লক্ষণ —যে বোগে মলদ্বাবে অথবা উপস্থে হইতে
বেদনা উৎপন্ন হইয়া অতি প্রবলকণে পকাশয়ে প্রবেশ করে, সেই বোগেব
নাম প্রতিতুণী

• আধ্বানের লক্ষণ । - ইহাতে বায়ু কর্তৃক পকাশয় স্ফীত হয়
এবং উহাতে ওড়ওড় শব্দযুক্ত ও বেদনা হইয়া থাকে

প্রত্যাধ্বানের লক্ষণ —ইহাতে বায়ু ও কফ কর্তৃক আকাশয়
স্ফীত হয় এবং উহাতে ওড়ওড় শব্দ ও বেদনা হয়

বাতষ্ঠীলা ও প্রত্যষ্ঠীলার লক্ষণ ।—বাতষ্ঠীলায় বায়ু কর্তৃক
ন ভীম নীচে গতিশীল অথবা স্থির গোল বাব একটা গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁ ইট
জন্মে এবং মল মূত্র বোম হয় । উপরোক্ত গ্রন্থি যদি জঠরে অর্থাৎ
নাভির উপরে হয় এবং বেদনামুক্ত ও ম মূত্র বোম করে, তাহ হইলে
ইহাকে প্রাতিষ্ঠীলা কহে ।

চিকিৎসা —ওলোব ন্যায় চিকিৎসা করিবে

মূত্রাশয়স্থিত দূষিত বায়ুর কার্য্য - ইহা হিত বায়ু দূষিত
না হইলে আভাবিক রূপ হইবা প্রকাশ হইয়া থাকে, কিন্তু দূষিত হইলে
নান প্রকার অর্থাৎ অশব্দী, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি বোগ উৎপন্ন হয় ।

বেপথু ও খল্লীর লক্ষণ ।—যাহাতে বোগীব সমস্ত শব্দ
কম্পিত হয় তাহার নাম বেপথু এবং যাহাতে পান, জল, উরু ও কব-
মূলের অবমোচন অর্থাৎ মে চড়ান জন্মে তাহাকে খল্লী বুলে

অনুক্রম বাত বোগ নির্ণয়ের নিয়ম পূর্বনির্দিষ্ট বত বোগ

ব্যতীত অ বহু অনেক প্রকার বাত বেগ আছে, তাহান ন ম নির্ণয়
কবিতে হইলে হ ন ও বপ প্রমাণে কবিতে হয় যেমন কৃমিতে শূল
হইলে কৃমিশূল ইত্যাদি

দোষের ভারতম্য - বাতজনিত যতগুলি বোগ বিত হইল,
সে সমস্তই পিও ও কফের সহায়ক হইতে পারে। এই সকল বোগে পদ ন-
বপে এবং পিও ও কফ প্রদানকপে অবশ্যিত আছে।

সাধ্য লক্ষণ । হৃৎকৃত, আদিভ, অশ্বপ, পক্ষাঘাত ও অশ্ব
তানব বোগ অশ্ব দিনেব এবং ঘনী ব্যক্তিব হইলে অনেক সময়ে এবং
অতি যত্নে দূরীভূত হই। কিনা সন্দেহ কিন্তু অশ্ব দিন জাত ও উৎসব
বহিত উপবোত বোগ সমূহ বলবান ব্যক্তিব হইলে চিকিৎসা দ্বারা শাস্তি
হয়

অস্বাধ্য লক্ষণ । নিম্ন দাহ মল নর বোগ, শূল, অকটি
ও মনোগ্নি এই সমস্ত উপদবুত বাত বেগ ক্রম ও দুর্বল ব্যক্তিকে ন শ
কবে বাত বোগীব শোণ, স্নানজনহীনত, কৃষ্ণ, অধ্বান ঘর্ষণ
পেট ফাপ, বেদনা এবং কৈন স্ত ন ওয় থাকিবার বোগ অসাধ্য

প্রকৃতস্থ বায়ুব কার্য ।—যাহ ব শরীরস্থিত বায়ু দুগ্ধিত হয়
নাই, যথাহানে অবস্থিত ও গতিবোধশূন্য, সেই বক্তি নিবোগী হইয়া
একশত বর্ষ জীবিত থাকিব

হোমিওপ্যাথিকে বাতব্যাপি চিকিৎসা ।

— ৩২৫ —

প্যারালিসিস্ বা পক্ষাঘাত । অকস্মাৎ জানেব ধ্বংসজনক-
শক্তি হীনতা, অনুভবশক্তির হানি, নাড়িব মন্দ গতি, শূল শিথিল
ইত্যাদি পক্ষাঘাতেব লক্ষণ

কারণ ।—গুস্তিকে আঘাত অথবা অন্য কোন কারণে পীড়া কিস্তি
আন্তরিক কোন যন্ত্রেব অকর্ষণ্যতা প্রযুক্ত এই পীড়া জন্মে

উপরি উক্ত লক্ষণ সকল দুইটাই হইবার সঙ্গে সঙ্গে হস্তপাদ অথবা অন্য কোন আক্রান্ত স্থানে আক্ষেপ হইতে থাকে স্বামপদ্যাসো কঠোর পাবিশেষে যত্ন হইতে পারে

চিকিৎসা — মুখ আবণ্ড হইলে “বেলেডোনা” দিতে হইবে মুখমণ্ডল পাংশুটে বর্ণ ও যদি হইলে “সুপিমন” প্রয়োগ করা প্রত্যয় হয়

আক্রান্ত স্থানে অত্যন্ত আক্ষেপ হইতে থাকিলে “নক্সভমিকা” প্রয়োগ করিবে ।

সর্বপূর্ণ মিশ্রিত উষ্মোদকে পদদ্বয় ময় করিয়া রাখিবে, এবং স্বল্প দেশে সর্বপূর্ব বেলেডোনা দিবে

সায়াটিকা ইহা এক প্রকার বাত ইহাতে বেদনান সহিত অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকে

চিকিৎসা — দিবসে তিনবার “এ ইওনিয়া” এবং রাতে ও প্রাতে “মার্কু'রিয়াম্” প্রয়োগ করিবে ।

বাতিকালে গীড়াব আধিক্য হইলে “মিমিমিফিউগা” দিবসে তিন বার খাওয়াইবে শয়নকালে “জেলুমিনিয়াম্” দিতে হইবে এবং অনিদ্র থা কিলে শয়নের পূর্বে প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিবে ।

খঞ্জর দ্বয় কবিরাজ জন্য দিবসে তিনবার “নক্সভমিকা” খাইতে দিবে মর্কিবা ইন্জেক্সন অথবা অন্য কোন প্রকার বাত প্রয়োগ এক কারো নিষিদ্ধ

বাত — ইহাতে কোন সন্ধিস্থানে অথবা কোন জঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেদনা হয় বেদনায়ুক্ত স্থান ফুটিয়া উঠে ও কখন কখন তাহান সহিত জ্বর হয়

চিকিৎসা — বেদনায়ুক্ত স্থানে ফুটিয়া বাধা কর্তব্য । অর্জুন দোষ থাকিলে দিবসে “নক্সভমিকা” এবং রাতে ও প্রাতে “রস্” খাইতে দিবে । বেদনায়ুক্ত স্থানে “রস্ অগোডেন্ডাক” বিশ “লিনিমেন্ট” মর্দন করিবে । গীড়া পুতান হইলে বাতিকালে “সংক্কাব” খাইতে দিবে

আব এক প্রকার বাত আছে, তাহ কেবল অঙ্গুলিৰ বড় বড় মণি-
স্থানেই হইয়া থাকে ইহতে ক্রমশঃ স্থান হ্রাস হইতে ও বেদনা-
যুক্ত হইয়া উঠে ইহাব সহিত অজীর্ণ বোগও দেখিতে পাওয়া যায় ।

চিকিৎসা — প্রদাহিত স্থানে তুলামিশ্রিত পানীয় কাপড় দিয়া
র দিবে অজীর্ণ দোষ থাকিলে প্রথম দুই দিন দিবসে ৮ বিঘাব কবিয়া
“নকুভিকা” দিয়া পাবে “লেডম্” লেখ্যে গ কবিতো অনিষ্ট নিবরণ
জন্ত র এ ম মনেব পূর্বে “যী কোনাইট” দিতে হইবে

হাকিমীমতে পক্ষাঘাত চিকিৎসা ।

এই বেগ দুই প্রকার, এক প্রকার অতি দুর্বল ও বৃদ্ধদিগেব হয়,
তাহার পতিকারের উপায় নাই, অন্য প্রকার — অঙ্গ হ্রাস, মেটা অথবা
যাহাবা অমিত ভোজন কবে জ্বাহাদেব হইয়া থাকে

লক্ষণ — অনেক দিন ধবিয় মস্তক ভাব থাকে এবং বেদনা করে
বোগী কখন কখন আঁ। কেবল জাতি দুটি কথিতে পাবে না কখন কখন
অঙ্গ অবশ্য হয় । কখন বা এক পা এক হাত, কখন বা দুই হাত কিম্বা
দুই পা অবশ্য হয় ও চলৎশক্তি থাকে না

কারণ — মন্দি এবং অতিবিক্ত ভোজনজন্য এই ব্যাধি হইতে
পাবে

চিকিৎসা । — প্রথমে বক্তমোক্ষণ কবাংবে, অঙ্গ আহার দিবে,
বিবেচক দ্বারা উদব প বিষ্কার করিবে অচেতনতা থাকিলে মস্তক মুণ্ডন
কবিয়া ক্ষুদ্রে বেলেস্তাবা দিবে পরে নিম্নোক্ত ঔষধ প্রয়োগ কবিতবে ।

পাৰ্বা চূৰ্ণ

...

...

১০ গামা ।

মসকর

১০ গামা

হাকিমীমতে পক্ষ্যাঘাত চিকিৎসা ।

৫৩১

একত্রে মর্দন করিয়া দুইটী বটী প্রস্তুত করিবে প্রথম দিঃস মন্যায়
সমুদয় দুইটী বটীই খাওয়াইবে পবদিবঃ প্রাতঃকালে—

বেউচিনি ১ মাস ।

মাতগুড় ১ মাস ।

একত্র বটী প্রস্তুত করিয়া আবেগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত সেবন করিতে
দিবে

অধিক কালেব, পুণাতন পীড়া হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে ।

কুচিলা ফল চূর্ণ ১ বতি ।

সাঝান ২০ মাস ।

একত্র মিশ্রিত করিয়া ১৪ টী বটী প্রস্তুত করিবে এবং প্রাতঃ প্রাতে
এবং সন্ধ্যায় এক একটী করিয়া খাইতে দিবে বহুদিন সেবনে ইচ্ছাতে
নিশ্চয়ই বোগোপশম হইবে ।

বাতরোগ ।—সন্ধিস্থলে বেদনা হয়, কখন কখন ফুলিয়া উঠে এবং
লালবর্ণ হয় চলিবাব সময় অত্যন্ত যাতনা হয় ।

কারণ ।—সন্ধি, কিস ভিজা মাটিতে শয়ন, ইত্যাদি ইহার প্রকৃত
কারণ

চিকিৎসা ।—সন্ধিস্থলে বেদনা ও ফুলা থাকিলে—

আফিম ১ মাস ।

পাণা চূর্ণ ০ বতি ।

ফুল খড় ৪ বতি ।

একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ টী বটী প্রস্তুত করিবে, এবং প্রাতে ও
সন্ধ্যায় এক একটী করিয়া খাইতে দিবে

সন্ধিস্থানে বেদনা হইলে সবিমা বটীয়া তাহাব উপর দিবে তাহাতে
উপকণব না দর্শিলে নিম্নোক্ত উপায় করিবে ।

আফিম ১ বতি ।

পাণা চূর্ণ ১০ বতি ।

একত্রে মিশ্রিত করিয়া বাজিকালে ভক্ষণ করিবে

তাপিণ তৈল অর্ধ ছটাক ।

সবাব	..	..	৩ ছটাক
আখিগ	..	...	৮০ জন
সবিসাব তৈয়া	.	..	১ ছটাক

একত্র মিত্রিত কবিয় বেদনান উপর মাদন করিবে ।

অষ্টবিংশ অধ্যায় ।

ম্যালোপ্যাথিকে ডুপ্লী বা শোথের চিকিৎসা ।

স্বাস্থ্যবস্থায় দেহের সকল স্থান হইতে এক প্রকার জলায় পদার্থ নিবৃত্ত গলিত ও শোষিত হইয়া থাকে, একত্র ঐ পদার্থ সংকীর্ণ হইতে পারে না কেবল যে স্থানে উহা উদ্ভব হয়, তাহা আজ থাকে মাত্র যে কাবণে হউক, স্বাভাবিক অবস্থাপেক্ষা এই গলিত পদার্থের পরিমাণ অধিক অথবা তাহা শোষণ কবিবার শক্তি অস্পষ্ট হইবে । ঐ পদার্থ সংকীর্ণ হইয়া ডুপ্লী বা শোথ বোগ উৎপন্ন করে যে স্থানে শোথ হয় তাহা শুষ্ক ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে

চিকিৎসা — কোষ্ঠ পাবক্য জন্ম নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা কবিবে

ম্যালোমেলনম্	..	..	৫ গ্রোন ।
পাল্ভাবিস্ জ্যালাপ	...	...	১৫ গ্রোন ।

একত্র মিত্রিত কবিয়া নিম্নোক্ত ঔষধের তিন ঘণ্টা পরে সেবন কবিতে দিবে ।

ম্যাগ্নেসিয়া মলফ্যাটিম্	...	...	১২০ গ্রোন ।
ম্যাগ্না	...	...	৬০ গ্রোন ।
জিং জ্যালাপ	.	.	১৫ ড্রাম ।
ম্যাংকোয়া কাকই	..	..	১৫ আং ।

এক মাজায় সেবনে কবাইবে ।

য্যালোপ্যাথিকে ডুপ্লী বা শোথের চিকিৎসা । ৫৩৩

প্রত্যাব পবিদ্ধাব বাথিবাব জন্ম নীচেব লিখিত ঔষধটী দিবে

টিং সিনি	.	* ..	১১ ড্রাম
টীং ক্যাম্ফর কম ওপিয়াই	...	..	৪ ড্রাম
লিকাভিস্ য়ামোনিয়া য়াসিট্যাটিস্	...	...	১ ড্রাম ।
ডিকটিক্ট স্কোপাবিয়াই	...		৮ আং

ছয় মাত্রা দিনমে তিন মাত্রা খাইতে দিবে

ঘর্ম কবাইবার জন্ম গরম জলে পা ডুবাইয়া বাথিবে ও নিম্নোক্ত ঔষধ প্রয়োগ কবিবে

ভিন্ য়াটিমোনিযেল্	.		১—১১ ড্রাম
লাইকবিস্ য়ামোনিয়া য়াসিট্যাটিস্	...	..	৪ ড্রাম
এক্সট্রাক্ট ওপিয়াই লিকুইডি	...		৩০ বিন্দু
• য়াকোয়া ক্যাম্ফর	..	•	৬ আং

ছয়মাত্রা দিনমে তিনবার প্রয়োগ কবিবে

বমন করান আবশ্যক বোধ কবিলে নিম্নোক্ত ঔষধ দিতে হইবে

পাল্ডারিস্ সিনাপিস্	...	...	১ আং ।
য়াকোয়া	.	...	২১ আং

একজে সেধন করাইবে

জিঙ্গি সল্ফেটিস্	...	...	২০—৪০ গ্রোণ ।
জল	.	..	২১ আং ।

একজে খাইতে দিবে

পবিত্তক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক বোধ কবিলে নিচেব লিখিত •

ঔষধ ব্যবস্থা কবিবে

হাইড্রোজিন ই কবেসিডি, সাল্ফিউরিক	...		১ গ্রোণ ।
এক্সট্রাক্ট ওপিয়াই	..	..	৩—৬ গ্রোণ ।
গোয়ামি বেজিনা	...	.	১০০ গ্রোণ ।
গ্লিসারিন	.	..	বটী প্রস্তুতের উপযুক্ত

২৪টি বটিকা হইবে দিনমে তিনটি সেবনীয়

বৎসান জন্ম নীচেব লিখিত ঔষধ ব্যবস্থা ।

যাশিডি নাইফ্ট সি ডাই	১১ ড্রাম ।
স্পিরিটাম্ ইথাবিম্ নাইটোসি .	১১ ড্রাম .
সাক্সি ট্যাবাক্সাসি ...	১১ আং ।
টীং সেনা .	৪ আং ।
ইন্ফিউজন্ জেসিয়াসি কম্পঃ .	৭১ আং ।

ছয় মাত্রা দিবসে তিনবার প্রয়োগ করিবে ।

বৈদ্যকে শোথ রোগ চিকিৎসা ।

শোথোৎপত্তির নিয়ম —দুয়িত্ত বায়ু বক্ত পিত্ত ও কফ বহিস্থ শিবাতে নিয়া উছাদের কর্তৃক বন্ধগতি হইয়া চর্ম ও মাংসকে আশ্রয় করিয়া বক্ত পিত্ত ও কফের সহিত উন্নত হইয়া উঠে এইরূপে যত প্রকাবই উন্নত হউক, সকলকেই শোথ বনে

শোথের প্রকারভেদ ।—কাবণ এবং লক্ষণভেদে শোথ নয় প্রকাব যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতপিত্তজ, বাতকফজ, পিত্তকফজ, ত্রিদোষজ, অভিঘাতজ ও বিষজ

শোথের পূর্বরূপ ।—শোথ হইবার পূর্বে শরীরের উত্তাপ ও শিয়াম অর্থাৎ শিরাপ্রসারণবৎ গীড়া হইয়া থাকে

শোথরোগের কারণ* ।—শুষ্কি অর্থাৎ বমন বিরেচনাদি বোগ কিম্বা অনাহারে কৃশ ও দুর্বল ব্যক্তির ক্ষাব, অন্ন, তৃষ্ণ, উষ্ম ও শুষ্ক বস্ত্র এবং দধী, শাক ও বিকট দ্রব্য অর্থাৎ সংযোগ দেশ কাল ও মাত্রাদি বিকট এবং বিষাক্ত দ্রব্য সেবনে শোথ জন্মে । অর্শ, পবিত্রাস, বমন, বিবেচনাদি বিরত, মর্গদেশে আঘাত, আমগর্ভ, নিপাত, বমনক্রাবক অথবা বিরেচক ঔষধ সেবনে সম্যকরূপে বমন বিরেচনাদি না হইলেও শোথ জন্মিয়া থাকে

শোথের সামান্য লক্ষণ — শবীরেব শুকতা, শোথ বখন বৃদ্ধি কখন হাস, উষ্ণতা, শিবাসমূহেব সূক্ষ্মতা, বোমর্ষ, শবীরেব বিবর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ সকল প্রকার শোথ বোগেই জন্মিয়া থাকে ।

বাতজ শোথের লক্ষণ — ইহাতে শোথেব চঞ্চলতা, চর্ম বর্ণ-বর্ণ, ক্রমবর্ণ, পীতলা ও বে মর্ষ হয়, কখন শোথেব বৃদ্ধি কখন বা চিকিৎসা ব্যতীত শোথেব শান্তি, অল্পি দ্বারা পীড়ন কবিলে নিম্ন হয় এবং দিবসে শোথ বৃদ্ধি হয়

চিকিৎসা — পুনর্গবা, দেবদাক, হবিতকী, আকনাদি, বিবমূল, গোম্মুর, বৃহতী, কণ্টকাবী, হবিজ, দাকহরিজ, পিপ্পলী, গজ পিপ্পলী, চিতামূল, বাসকছাঁন, সমুদায় চূর্ণ সমভাগ মাত্রা ২ মাসা । গোম্মুজেব সহিত সেবনীয় ইহাব নাম “পুনর্গবাদি চূর্ণ”

পুনর্গবাটিক । — শ্বেত পুনর্গবা, নিম্বমূলেব ছাল, পরটোলপত্র, শুষ্ঠী, কটুকী গুলঞ্চ, দাকহরিজ, হবিতকী সমুদায়ে ২ তোলা, জল ০ সেব, শেষ অর্দ্ধ পোয়া ।

পিত্তজ শোথের লক্ষণ — ইহাতে শোথেব পাকতা, বৃহতা, দুর্গন্ধ, ক্রম পীত অথবা বক্তবর্ণতা, বেদনা চক্ষুব বক্তবর্ণতা ও অতিশয় জ্বালা হয় এবং বোগী অম, অব, ঘর্ম পিপাসা ও মত্ততায়ুক্ত হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা — ত্রিকটু ত্রিফলা, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, কটুকী, চিতামূল, দেবদাক, তেউড়ী, গজপিপ্পলী, প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ চূর্ণসমষ্টিব দ্বিগুণ লৌহ, একটন মিশ্রিত কবিবে । মাত্রা ১ মাসা, অল্পান দুগ্ধ । ইহাব নাম ‘ত্রিকটাদি লৌহ’

পুনর্গবাদি তৈল — তৈল ৪ সেব । বাথার্থ — পুনর্গবা ১২।০ সেব, জল ৩৪ সেব, শেষ ১৬ সেব । বন্ধুদ্রব্য — ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাকড়াশৃঙ্গী, ধন্তা ; কটফল, শঠী, দাকহরিজ, ত্রিগাজু, পদ্মকাষ্ঠ, বেধূক, কুড়, পুনর্গবা, যমানী, ক্রমজীরা, এ ইচ, শুড়ঙ্গক, বোধ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বচ, পিপ্পলী-মূল, চুই, চিতামূল, শুণফা, বালা, মঞ্জিষ্ঠ, রাশ্মা, ছবালতা প্রত্যেক ২ তোলা ।

কফজ শোথেব কারণ । — ইহাতে শোথেব ভাববোধ, পাণ্ডুবর্ণ, শ্বশ্বচি, নামাস্রাব, অতি নিদ্রা, বমি, ও গ্লিমান্দ্য, অধিক সময়ে বৃদ্ধি পায়

এবং অনেককালে সম্মিত হয় ও অঙ্গুলি দ্বারা পীড়ন করিলে নিম্ন হয়
ন, বাজিতে বৃদ্ধি পায়

চিকিৎসা পান, গন্ধক, অল, প্রত্যেক ৭ তোলা শোধিত
মণ্ডু বচুর্ণ ২ পল, হরিতকী চূর্ণ ২ পল, নিলাজতু ২ তোলা, কাণ্ড লৌহ
১ তোলা, একত্র মাড়িয় ভীষ্মবাজেব বস ৪ মেন, কেশুবিধাবাস ৩ মেন,
এবং নিমিন্দ মাং, ওষ, আদা এই সমুদায়েন আত্মকরণে পায়োগী বসে
ভাবনা দিয়া বোজে শুকাইয়া কিঞ্চিৎ অর্জক স্থায় প্রকটু, ত্রিফল, চই,
মুখা প্রত্যেকে বচুর্ণ ২ তোলা মিশাইয়া ৩ তোলা পমাৎ বটিক করিলে
অল্পপান মধু ও ঘৃত । ঔষধ সেবনান্তে পুনর্নবাব কাথে যাক্ষার দিয়া
পান করিবে ইহাব নাম “বগাজ মণ্ডু ব ”

ক্ষীর বটিকা — হিঙ্গুল ২ তোলা, লবঙ্গ, অহিফেণ, বিষ, জামফল,
ধুতুবানীজ প্রত্যেক ১ তোলা সমুদায় মিদ্ধিব বসে মাড়িয় মূর্ণ প্রমাণ
বটিকা করিবে . অল্পপান দুগ্ধ

বাতপিত্তজ শোথের লক্ষণ ।— ইহাতে বাতজ এবং পিত্তজ
শোথের লক্ষণ লক্ষিত হয়

চিকিৎসা ।— কটু তৈল ৮ মেন, কাথস্রব্য — শুক মূলা ২ মেন, দশ
মূল মিহিত ২ মেন, পিপ্পলীমূল ২ মেন, পুনর্নবা ২ মেন, পাকজাত জল
৬৪ মেন, শেষ ১৬ মেন গোমূত্র ৮ মেন কল্ক শুক মূলা ৩০ দা,
শুঠী, পটোল পত্র, পিপ্পলীমূল, বেড়েলা, আবনাদি মূলা বাণ, বেণ বমূল,
সজোনা বীজ, নিমিন্দ, মিজ, অনন্তমু, ডহব কবজবীজ, বাসক মূলেব
ছাল, পিপ্পলী, হরিতকী, বচ, কুড়, বাস্মা, বিড়ঙ্গ, চই, হরিদ্র, দাকহরিদ্রা,
ঘন্থা, যবক্ষার, মাচিকার, মৈনব, দৈবদাক, পদ্মবীজ, লঠী, গজপিপ্পা,
বেলছাল, মঞ্জিষ্ঠা প্রত্যেক ৪ তোলা পাকের জল ৩২ মেন ইহাব
নাম “বৃহৎ শুক মূলদি তৈল ”

ক্ষেত্রপাল রস ।— হিঙ্গুল, বিষ, ভাষ, লৌহ, হরিতাল, মোহাঙ্গা,
জীরা, আফিণ প্রত্যেক সমভাগে মাড়িয়া অর্জক পনিমিত্ত বটিকা প্রস্তুত
করিবে । পথ্য দুগ্ধ ও অন্ন লবণজল ভাষা ববিবে

বাতশ্লেষ্মাজ শোথের লক্ষণ ।—ইহাতে বাতজ ও কফজ শোথের লক্ষণ একাশ পায

চিকিৎসা ।—মুর্চ্ছিত তিল তৈল ৪ সের বন্ধকায় শুক মুলা, পুনর্নবা, দেবদাক, বাঙ্গা, শুষ্ঠী, মিলিত ১ সের পাকজন্ম জল ১৬ সের ইহাব নাম “শুক মুলাদ্য তৈল ”

শোথাক্ষু রস ।—পাণ্ডা, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসা, তাম্র সমভাগে মিশ্রিত করিয়া নিমিন্দা, হাপাবমালী, কষেউবেলেব ছাল, তেঁতুলছাল, পুনর্নবা, বেলছাল ও কেশুবিষার বসে যথাক্রমে ভ বনা দিয়া কুলের জায় বজী প্রস্তুত করিবে ।

পিত্তশ্লেষ্মাজ শোথের লক্ষণ ।—ইহাতে পিত্ত ও কফজ শোথের লক্ষণ সমস্ত দেখা যায়

• চিকিৎসা ।—গোমূত্রে মণ্ডম বাব শোষিত মধু ৭ পাল, নিমিন্দা, মাণমূল, আদা ও বনগুলেব রসে যথাক্রমে তিনবার ভাবন দিয়া ৭ সের গোমূত্রে পাক করিবে ত্রিফলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ৪ তোলা, চই ৪ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে শীতল হইলে মধু ২ পাল মিশাইয়া লইবে ইহাব নাম “শোথাবি মণ্ডুর ”

ব্রহ্ম শুক মুলাদ্য তৈল ।—তৈল ৪ সের শুক মুলার কাণ ৪ সের, মজিনা বস ৪ সের, ধুতুরা বস ৪ সের, নিমিন্দা বস ৪ সের দশমূলেব কাণ ৪ সের, পাল্লিয়াব রস ৪ সের, করঞ্জরস ৪ সের, বকগছানোব বস ৪ সের কল্ক—শুষ্ঠী গনিচ, মৈন্ধন, পুনর্নবা কাকআটা, বজ্রধাব ছাল, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, কটকগ, কুড়, সঁবাড়া শূঙ্গী, বাঙ্গা, ছবালড, কুম্বাজীবা, হবিদ্রা, দাক হবিদ্রা, কবজ নাটান বজ্র, শামালডা, অনন্তমূল প্রত্যেক ৩ তোলা

ত্রিদোষজ শোথের লক্ষণ ।—ত্রিদোষজ বা সান্নিপাতিক শোথে বাতজ, পিত্তজ ও কফজ শোথের লক্ষণ একাশ পায

চিকিৎসা ।—কট্টী, ত্রিকটু দণ্ডীমূল, নিড়ঙ্গ, চিতামূল, দেবদাক, তেঁতুলী, গজপিপ্পলী প্রত্যেক সমভাগ, মর্দন দ্বিগুণ লৌহ দুধেব সহিত সেবন করিবে ইহাব নাম “কট্টকাদ্য লৌহ ।”

কংস হস্তিতকী —দশমূল মিত্তি ১২ ০ সেব, আশুয়া কংস
বালা হস্তিতকী ১০০ টা,পাকজাত জল ৬৪ সেব,শেষ ১৬ সেব এই কাথে
১২১ ০ সেব পুরাতন গুড় মিনাইবে পুনর্বার এই কাথে ১০০ টা হস্তি-
তকী পাক করিবে গ ক মিল্ক হইবে ত্রিকটু,গুড়ক, ভেজপত্র, এলা-
ইচ ও যবক্ষার প্রত্যেক ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে শীতল হইলে মধু ২
সেব মিনাইবে প্রত্যহ একটা হস্তিতকী ৪ তোলা ৫০ হ সেবা

অভিযাতজ শোথের লক্ষণ — অঙ্গশব্দাদির আঘাত, শীতল
বায়ু, সমুদ্রের বাতাস,ভোষলাব বস,শুকশিথিব বোম্পার্ম প্রভৃতি কাবণে
গমনশীল শোথ জন্মায় ইহাতে শোথস্থান অতি উষ্ণ ও শে হিত
আত্মাশুষ্ক হয় এবং পিণ্ডজ শোথের লক্ষণ, প্রকাশ পায়

চিকিৎসা —১৩ ৪ সেব কাথার্থ পুনর্বার ১২ ০ সেব, জল ৬৪
সেব, শেষ ১৬ সেব। কল্ক চিরাৎ জয়ন্তী শুষ্ঠী, পুনঃ যা, দেবদারু,
মিলিত ১ সেব পাবেব জল ১৬ সেব ইহাব মাঘ “পুনর্বারাদ্য হৃত ”

ত্রিনেত্রোথ্যো বস পাবা, গন্ধক, মোহ গান খই, তাম্র, নৌহ,
এই সমুদায় দ্রব্য আদ্য বসে মাড়িয়া লঘুপুটে পাক করিবে মাত্রা ২
বতি, অল্প ন অ পাশবস ও এবও

বিষজ শোথের লক্ষণ —বিষযুক্ত প্রাণী কোন অঙ্গের উপর
দিয়ে চলিয়া গেলে অথবা কোন অঙ্গে প্রজাব করিলে কিম্ব দন্ত ও নখ
দ্বারা আঘাত করিলে শো থ জন্মে এ ভিন্ন বিষহীন প্রাণীর মল, মূত্র ও
শুত্র যুক্ত বস্ত্র পরিধান করিলে এবং বিষযুক্ত বস্ত্র শবাদের লেপন করিলে ও
শোথ জন্মিয়া থাকে ইহা কোমল, চলনশীল এবং শরীরের নিয়মেশ-
নামী হয়

চিকিৎসা —ত্রিকটু, ত্রিফলা, জুগা, কুড়, বালা, পাঠী, বচ, লবঙ্গ,
কাঁকড়াশঙ্গী, গুড়ক, শুল্ফা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, ধাইফুল, প্রত্যেক চূর্ণ
সমভাগ, সর্জসমান শোধিত মধু ব এই সমস্ত কুড়চিছালেব বসে
মাড়িয়া জামপত্রে বেটন ও পল্ললেপ দিয়া যথাবিধি গজপুটি পাক
করিবে, শীতল হইলে তুলিয়া লইবে মাত্রা ২ মাসা ইহাব মাঘ
শোথ “ভস্মলোহ ”

শোথশার্দ্দূল তৈল কটু তৈল ৪ সের ; কাথার্থ—ধূতুবা, দশ-
মূল, নিসিন্দা, জয়ন্তী, পুনর্নবা, কবজ, প্রাত্যক ৬ পল, পাকের জল ৬৪
সের, শেষ ১৬ সের কল্ক—বাস্মা, পুনঃব, দেবদাক, শুক মূলা, শুষ্ঠী,
পিপ্পলী, সমুদায়ে ১ সের

দোষের স্থানভেদে শোথের কৃচ্ছ্র সাধ্যাদি নির্ণয় । আমা-
শাস্থিত দোষ শরীরের উর্ধ্বদেশে অর্থাৎ আমাশয় ও বক্ষ প্রভৃতি স্থানে,
পাকশাস্থিত দোষ শরীরের মধ্যদেশে অর্থাৎ বক্ষস্থল অর্থাৎ পাকশয়েন
মধ্যস্থলে, এবং সর্বশরীরস্থ দোষ পাকশয়েন নিম্নপ্রদেশে, এবং সর্বশরী-
রস্থ দোষ সমস্ত শরীরে শোথ জন্মায়

শোথের কৃচ্ছ্র সাধ্যাদি দোষ নির্ণয় ।—শরীরের মধ্যভাগজাত
এবং সর্বশরীরজাত শোথ কৃচ্ছ্র সাধ্য পুরুষের শরীরের নিম্নপ্রদেশে-
স্থিত শোথ যদি উর্ধ্বগমনশীল হয় এবং স্রীলোকের শরীরের উর্ধ্বভাগস্থ
শোথ যদি নিম্নগামী হয়, তবে তাহা অসাধ্য

শোথের উপদ্রব ।—ইহাতে শ্বাস, পিপাসা, বমি, হৃৎকোষত, জ্বর,
অকৃতি প্রভৃতি উপদ্রব দুই হয় এবং উপবোহ উপদ্রবাক্রান্ত বোগী
অচিরে কালক্রমে পতিত হয়

শোথের অসাধ্য লক্ষণ —পূর্বেক্ত উপদ্রবজ্বনিত শোথ,
পাদস্থিত শোথ সর্বদা সঞ্চালিত হইয়া পুরুষকে, মুগস্থিত শোথ স্রীকে,
এবং যুজাশয়ে জাত শোথ উভয়কেই বিনাশ করে । উপদ্রবস্থিত অঙ্গ
দিনেব শোথ সাধ্য, অর্থাৎ চিকিৎসান দ্বারা প্রশমিত হয় কুণ্ডি, উদর,
গণ্ডা ও মর্গস্থানেব শোথ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হইয়াও যদি তত্তৎ
স্থানস্থিত চর্ম বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে অসাধ্য ; এতদ্ভিন্ন বালক, বৃদ্ধ,
হৃৎকোষ ব্যক্তির শোথও অসাধ্য

ছোনিওপ্যাথিকে শোথ রোগের চিকিৎসা ।

শোথ কথাকে বগে ভাঙা ব্যাধিপ্যাথিক চিকিৎসার সময় বলা হইয়াছে শোথ বোগ ত্রিবিধ ১মঃ—শরীরের কোন এক অংশে উৎপন্ন হয় ; ২য়ঃ—প্রথমতঃ শরীরের কোন অংশে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া পড়ে । ৩য়ঃ—প্রথম হইতেই সর্বশরীর ব্যাপিয়া বোগের উৎপত্তি হয় । মস্তিষ্কের শোথকে হাইড্রোকেফেলুস, ফুগুফুসেব শোথকে হাইড্রোথোরাক্স, • পেপিকার্ভিমের শোথকে হাইড্রোপেপিকার্ভিম, অস্ত্রের শোথকে য়াসাইটিস্ জয়েন্টেব শোথকে হাইড্রপস্ আর্টিকিউলেশন্স এবং অঙ্কোয়েব শোথকে হাইড্রগিলু কহে

রোগ নিরূপণ —শোথের ফলা স্বভাবতঃ নবম হয়,— এমন কি তাত্ক্ষণিক স্থান টিপিলে অনেকক্ষণ জ্বলিয়া পায় ঐ স্থান মনে দেখা যায় পুরাতন বেগে যখন ফলা অতিরিক্ত হয়, তখন তৎসমান এবং চিক্‌চিক্‌ করে এবং তখন বর্ণ কতকটা লাল এবং বেগনে বহুএব বোধ হয়, অবশেষে সকল শোথ কুটিয়া যাও হইতে দেখা যায়

চিকিৎসা ।—

১। সর্বশরীরের শোথে (General Dropsy) “ডিজিটেলিস্,” “এপিস্,” “আর্শিনিক্,” “ট্রাইওনিয়া,” “সেনেগ,” “এপোপ্।”

২। উদরের শোথে (Abdominal Dropsy) “এপোপ্,” “আবস্,” “চায়না,” “কট-টিণ ”

৩। পায়ের গাঁটের শোথে (Dropsy of the ankles) “ফেনগ্,” “চায়না,” “আর্শিনিক ”

৪। মস্তিষ্ক শোথে (Hydrocephalus) “হেল্,” “গারিকিউ,” “হেল্,” “এপিস্”

৫। হাট্টেব শোথে (Hydropocandum) “ভাই,” “ভিজি,”
“আবস্,” “হেল্,” “এম্পাইজ ”

৬ অওকোয়েব শোথে (Hydrocolo) “আইয়ড্,” “বড্,”
“পল্‌স্,” “গ্রাফ্ ”

৭। সমস্ত গাঁটেব শোথে “একোন্,” “পলস্,” “আইয়ড্” দিবে
অব্যাহত উপযুক্ত ঔষধি প্রয়োগ করিবার সময় আছে, তাহা অতি
সাবধানতার সহিত সময় বুঝিয়া ঔষধি সেবন করাইবে। এখানে ঔষ-
ধির নাম গাঁটে দেওয়া হইল, যথা,—গ্যাকোন ইটস্থানে একোন, আর-
সনিক স্থানে আরস্ ইত্যাদি ইত্যাদি

হাকিনীমতে শোথের চিকিৎসা ।

প্রায়ই উদররোগেব গায়, এজন্য বিশেষ কবিয়া লিখিবার আব-
শ্যকতা বিবেচনা করা যায় না।

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

গ্যালোপ্যাথিক চর্মরোগ চিকিৎসা

লেপ্‌রা বা কুষ্ঠ ।—এইবোগ সংক্রামক তাহার সন্দেহ নাই
প্ৰাচীন হইলে ইহান হস্ত হইতে পবিত্রাণ পাওয়া সহজ নহে

লক্ষণ ।—প্রথমে ছোট বড় লালবর্ণ চাকা চাকা দাগ শব্দেব

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহির্গত হয় । সাধারণতঃ প্রথমে সন্নিহিত নদীতে চলে
হয়, যথা,—কয়লা ও অঁট্র এন্থ তাহার নিকটে এই স্থান সকলে দ্রুত
হয় ক্রমশঃ তাহার শব্দেবন সর্বত্র ব্যাপিতা উঠে সেই সকল
লালবর্ণ চাকা চাকা দাগ হইতে রস পড়িতে থাকে, তন্মধ্যে ক্ষত হইয়া
পড়িতে আরম্ভ করে ও তাহা হইতে দুর্গন্ধ বহিন হয় এতদ্ব্যতীত
ক্ষতজ্ঞ যে দাকন হুঁমাহ যজ্ঞণী তাহাও দেখা যায় । এবং হইলে
বোগ ছন্ডিকিৎসায় বিবেচনা করিতে হইবে

আর এক প্রকার কুষ্ঠ আছে তদ্বারা পেতবর্ণ চাকা চাকা
দাগ হয়, সেই দাগও ক্রমশঃ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়, উহা সর্বদা চুনকা-
ইতে থাকে, ক্ষত না হইলে তাহাতেও নান প্রকার যজ্ঞণী
বোধ হয়

চিকিৎসা —এবম জ্বলে সর্বত্র দৌতকন অন্তর্নিমিত্ত
প্রকারে আনুকালাইন বাথ ব্যবস্থা

মেডি কার্বনেটিস্	..	১ ০ টি
যাটকোয়া কার্বনেটিস্	..	০XXV
তাহার পব নিম্নোক্ত ঔষদ ব্যবস্থায়		
ডিক্ট্রি ম্যালোজ কম্পাঃ	...	৪ আঃ
ইন্ডিউজন্ জেমসন্ কম্পাঃ	...	৪ আঃ
লাইকর পোটাস্	...	১১ ড্রাম
ছয় মাত্রা । দিনে তিনবার ব্যবহার্য		
পেপ্সিন্ পোশি	..	৩২ গ্রাম
একট্রাক্ট ম্যালোজ বার্বেন্ডেলিস্	..	৮ গ্রাম
মিসরিন	..	বলী প্রস্তুত উপযুক্ত ।
৮টী বলী প্রস্তুত করবে । প্রতিদিন তাহারেব সময় এক একটী খাইতে দিবে ।		
লাইকর আর্শেনিকেলিস্	..	৩০ গ্রাম
টীং ক্যাছা বাইডিস্	...	১ ড্রাম
টীং অর্যামিস ই	...	৪১ ড্রাম

পোটা সি আইওডাইড . . . ১৮—৩০ গ্রোন।
 ইন্ফিউজন্ অক্সিজাইন . . . ৫১ আং।
 ছয় মাত্রা দুই বাব আছাবেব অব্যাহিত পাবে দিবসে দুই মাত্রা
 সেবন করাষ্টতে হইবে

হাইড্রার্জ বাই আইওডাইড কব্রি . . . ৩ গ্রোন
 পোটা সি আইওডাইড . . . ৬০—১২০ গ্রোন
 স্পিরিটাস্ ভাইনি বেক্টিফিক্যাটি . . . ১ ড্রাম
 মিবাপি জিঞ্জিবাৰিস্ . . . ৪ ড্রাম।
 পবিত্র জল . . . ১১ আং

বড় এক গ্লাস জলে ৩০ বিন্দু ঔষধ এক এক বাবে, এইরূপ দিবসে
 তিনবার প্রয়োগ কবিবে

হাইড্রার্জ বাই আইওডাইড কব্রি . . . ১ গ্রোন
 পোটা সি আইওডাইড . . . ১২০ গ্রোন।
 লাইকবিম্ আর্শেনিকেলিস্ . . . ১১ ড্রাম
 টিং ল্যাভেন্ডুলি কাম্পাঃ . . . ১১ আং।
 স্পিরিটাস্ ক্লোরোফর্মিস্ . . . ৪ ড্রাম
 জল . . . ১১১ আং।

মান বড় চামচেব এক চামচ আছাবেব পাব প্রতিবারে এক এক
 মাত্রা সেবনীয়

স্ফেবিস্ বা কচু রোগ —হাতেব অঙ্গুলিব ভিত্তব, সন্ধিস্থলে,
 ও মে মুখমণ্ডল ভিন্ন সর্বাঙ্গে স্ফোটক রূপে ইহা প্রকাশিত হয়।

লক্ষণ - স্ফোটক দেখা দিল্লার ২ ও দিবস পূর্বে গাভ চুলকান
 আরম্ভ হয় তাহাব পৰ জ্বৰ লাল ব ঘূসর বর্ণ স্ফোটক গুলি দেখা
 যায় বলা বাহুল্য যে, চুলকাইবার সময় অধাতুভূতি হয়

চিকিৎসা।—গরম সাবানজনে স্ফোটকগুলি ধোত কবিবে,
 তাহাব পৰ গন্ধকেব মলম দিবে গন্ধকেব মলমেব সহিত কার্বনেট
 অফ পটাশ্ ১ ড্রাম মিশ্র ইলে শীঘ্র উপশব দর্শে

গন্ধকের মলম ।—লাড' ও নাবিকেল তৈল মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত হয়

কঠিন পীড়ায় গন্ধকাভিষেক ও প্রতিদিন অল্প পরিমাণে গন্ধক সেবনে উপকার দর্শিতে পারে

য়্যাফেরাস্ ফলিকিউলোরস্ । খর্ষবুদবুদ মধ্যে ইহাদেব উৎপত্তি, এজন্ত বিশেষ কোন অস্থি হইতে দেখা যায় ন তবে কখন কখন অতি কঠিন ক্ষুদ্র ব্রণ প্রকাশ পায় ও শীঘ্র আবোগ্য না হইলে গন্ধকের মলম অথবা তাপিণের পৃষ্ঠে গন্ধক ও কপূর্ব জ্বব করিয়া তাহা লাগাইলে উপকার দর্শে

থিরায়েসিম্ বা লাউস্ অর্থাৎ উৎকৃণ বা কেশকীট ।—দেহের অপরিচ্ছন্নতা, চর্মবোগ জন্ত তাকে দূষিত সিক্রিসন-সঞ্চয় হেতু ইহাদেব জন্ম হয় উৎকৃণ নানাবিধ । মস্তক ব্যতীত দেহেব অন্যান্য স্থানে উৎকৃণ জন্মিলে গন্ধক ও পাবদ দ্বারা তাহাদেব বিনাশসাধন করা যাইতে পারে মস্তকে হইলে কেশ ছেদন করিয়া বাইক্লোবাইড অফ মার্কিউবীভ লোশন ব্যবহারে উপকার দর্শে

ট্রিকিনা স্পাইরোলিস্ —এই বোগেও দেহ মধ্যে এক প্রকার কীট জন্মে তদ্বারা দেহেব দৌর্বল্য, নিজাতাব, ক্ষুধামান্দ্য, জ্বব, পেশীব বেদন, কখন বা সন্ধিস্থান ফুলিয়া উঠে, উদবাসন, প্রায়ই নিমোনিয়া জন্মে, কোন কোন স্থানে টাইফাসেব লক্ষণ উপস্থিত হইয়া রোগীব প্রাণনষ্ট করে

চিকিৎসা ।—এই কীট অতি আশ্চর্য্য দ্রুত গমনে দেহের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে, এজন্ত সেটোনাইনেব* দ্বায ঔষধ ব্যতীত অন্য ঔষধে উপকারেব সম্ভাবনা নাই

কিলেরিয়া মেডিনেন্সিস্ ড্রেকানকিউলাস্ —অশ্রণবীবে কোন কোন ইতর জন্তুদিগেব কনেক্টিভ্ টিস্স মধ্যে এই কীট দেখিতে পাওয়া যায় কোন কোন স্থানে ইহা দেহাব্যাপকরূপে আবির্ভূত হয় এই কীট ২ ৪ ইঞ্চি হইতে ১২ ফিট লম্বা হইয়া থাকে ।

লক্ষণ —সচবাচৰ ইছাদিগকে যন্ত্ৰযাদেহেৰ অধঃশাখাতেই দেখিতে পাওয়া যায় কখন কখন মুক্ৰ, লিঙ্গ, পৃষ্ঠ ও উদর ২ ভূতি স্থানেও দেখা গিয়াছে প্রথমে এই কীট দেশস্থ সেলুণাব টিঙ্গ যন্ত্ৰে জন্মিয়া বৰ্দ্ধিত হইলে তৎকালে কবিয়া বহির্গত হইতে চেষ্টা করিলে সেই স্থানে চুলকনা, ক্রমে উষ্ণতা ও বেদন হয় . তাহাব পৰ ঐ স্থানে একটী ফোঙ্গা হয় ফোঙ্গা কাটিয়া কখন কীটেৰ মূখ বাহিৰ হয়, কখন বা ৭ ৮ দিবস পৰে উহা দেখিতে পাওয়া যায় ।

চিকিৎসা —কতমধ্যে কীট সহসা দেখিতে না পাইলে জনদাবা দ্বাৰা উত্তমরূপে ক্ৰেদ পৰিষ্কাৰ কৰিব . তৎপৰে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বাহিৰ হইবে . সম্ভবতঃ তাহাবই মধ্য দিয়া কীট বহিৰ হইয়া থাকে , কিন্তু সহজে উহা বাহিৰ না হইলে এক কাটিয়া বাহিৰ কৰা যাইতে পাবে । যেকোন উপায়ে কীটেৰ অগ্রভাগ বাহিৰ হইলে ফবশেপ (চিম্টা) দ্বাৰা সাবধানে টানিয়া আনিবে ।

ম্যার্লোপেশিয়া বা টাক . ইহাও এক প্রকাৰ কীট জন্তু হইয়া থাকে

লক্ষণ —কেশ লীন ও বিবৰ্ণ হইয়া পড়িয় যায় . কেশ নৈ স্থান পৰিকৃত, উজ্জ্বল ও আভাবিক ত্ৰকেব গায় হইয়া উঠে .

চিকিৎসা । —নিম্নোক্ত লিনিমেণ্ট ব্যবহৃত্তে বিশেষ উপকৰ দৰ্শিত হইব সম্ভাবনা

লাইকৰ ম্যাংগেনি	...	১ ড্রাম
জলপাই তৈল		২ ড্রাম
স্পিৰিট বোজ মেবিনাই	...	৪ ড্রাম ।
গোলাপ জল	...	৫ আং ।

অন্য উপায় ।

স্পিৰিট ম্যাংগেটিক ম্যাংগেনিয়া	...	২ আং ।
স্পিৰিট বোজ মেবি	...	২ আং ।
গিসবিন	...	১ আং

টীং ক্যান্থাবাইডিস্	:	২৬ ইইতে ৫৬ ড্রাম ।
গোলাপ জল	..	৭৬ আং ।
উত্তমরূপে মর্দন করিতে হইবে		
টীং ক্যান্থাবাইডিস্	...	২ আং ।
ইউডিকলোন	..	২ অং ।
একত্র মিশাইয়া উত্তমরূপে মর্দন করিতে হইবে		

কেশদ্রব — কেশগুলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ হয় সেই স্থানেব স্থগ্নম
ত্বক্ উঠিতে থকে পীড়া বৃদ্ধি হইলে তাহা হইতে ছোট ছোট স্ফোটক
হয়

চিকিৎসা। — নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা

সল্ফিউবিক্ য়াশিড	...	..	১ আং
জল	..	..	৮ আং
পীড়ায়ুগ স্থানে আবশ্যকমত লাগাইবে	অথবা —		
বাই ক্লোবাইড অফ মার্কিউবী	.	.	৬ গ্রেন ।
জল	...	...	২ আং

উক্ত একাবে ব্যবহার করিবে

টিনিয়া সার্মিনেটা বা দাদ্ । একেব উপবিভাগে চক্রাকাংবে
দৃষ্টিগোচর হয়, এজন্ত ইহাকে বিৎওয়াবম বলে

দ্রব্ আমাদেব নিকট একরূপে পবিচিত যে, ইহাব লক্ষণাদি নির্দেশ
আবশ্যক বোধ হয় ন এজন্ত এই বোগেব চিকিৎসা মাত্র নিম্নে লিখিত
হইতেছে

গন্ধকেব মলম	..	..	১ ড্রাম ।
ক্রিয়োসোট	..	..	১ ড্রাম
ক্যালোমেল্	...	...	১ ড্রাম ।

একত্র গিঞ্জিত করিয়া মর্দন করিবে

গন্ধক চূর্ণ	...	..	৪ ড্রাম ।
সোহাগা	..	..	৬ ড্রাম ।
হ ইড্রোক্লোবেট অফ য়ামোনিয়া	..	..	৬ ড্রাম ।

ভাবপিণ তৈল

১ ড় ম।

বসা (চর্মী)

২ আং

একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিবে

ভারতবর্ষীয় পদ ফাঙ্গাস বা ঘুরঘুরে ।—এই রোগে প্রথমে পদতলের ত্বক অল্প ক্ষীণ হয়, পবে ত্বকেব পাতল অংশ ছিন্ন হইয়া শ্বেতবর্ণ অংশ বাহির হইয়া থাকে এই সাদা বর্ণের মাংসের উপর গোলাপী বর্ণের ছোট ছোট চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় পবে সমস্ত পদ ফুলিতে থাকে এবং স্থানে স্থানে ধূলবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর দেখা যায় । ক্রমে সেই সকল ছিদ্র পদের চতুর্দিকে বিস্তৃত হয় এবং তাহাদেব আর তন বৃদ্ধি হইতে থাকে বোগী ক্রমশঃ লীন ও দুর্বল হয় । অধিক থাকিলে ইহা দ্বারা প্রাণনষ্ট হইতে পারে

• চিকিৎসা ।—প্রথমাবস্থায় হাইপো মল্ফাইড অফ মোডা, কিস্তা বাই ক্লোবাইড, অফ মর্কিউবিব লোশন ব্যবহার করা কর্তব্য কেহ কেহ প্রথমাবধি কার্বলিক য়াসিড ব্যবহারে বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন সীড অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে এবং পদের ভিতর পর্যন্ত আক্রমণ করিলে অঙ্গচ্ছেদন ভিন্ন আর উপায় থাকে না

• কচ্ছপিক বা এঞ্জাস্থিয়েট ।—ইহা এক প্রকার ঐযৎ নালবর্ণ তালিব আয় স্ফোটক । ইহাকে চাপিলে অদৃশ্য হয়, এবং পাতলা চর্ম উঠিয়া অব্যবস্থায় হইয়া যায় ফুসফুস, মস্তিষ্কেব পীড়া এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রের উত্তেজন বা প্রদাহ প্রভৃতির সহিত এই বোগী হইতে দেখা যায়

চিকিৎসা ।—গাঢ়কৈব মলম দিলেই সাবিয়া যায় ।

• ভিটিলিগো বা শুক্লচর্মিক ।—এই বোগ প্রায় দেখা যায় না । ইহাতে ত্বকেব উপর কখন কখন পবিকৃত সাদাবর্ণ উজ্জ্বল টিউমার বহির্গত হয় ইহা প্রায়ই কর্ণ, গণ্ড ও মুখমণ্ডলে হইয়া থাকে আক্রান্ত স্থলে প্রায় কেশ জন্মে না, কিন্তু প্রায়ই ক্ষত হইতে দেখা যায় না ।

চিকিৎসা । এই বোগেব প্রকৃত ঔষধ কি তাহা এ পর্য্যন্ত অব-
ধানিত হয় নাই । অনেকে ধবংস সহিত ইহাব কোন প্রভেদ স্বীকার
করেন না, কিন্তু বাস্তবিক অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়
কেহ কেহ অভ্যঙ্গ পরিমাণে চাউলমুগবাব তৈল দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সেবন
কিবিবাব উপদেশ দেন । ফলতঃ উদ্ভাব্য সর্বত্র সমান ফল লাভ হয় না ।

লিউকোডার্মা বা ধবল ।—ত্বকেব নির্মাণেব কিছুমাত্র পরি-
বর্তন নাই ইহা কেবল মাত্র শ্বেতবর্ণই এই বোগেব প্রধান লক্ষণ ।
ত্বকেব স্নায়ুদোষের প্রযুক্ত এই ব্যাধি জন্মিয়া থাকে । হস্তপদাদিতে
প্রথমতঃ ইহাব আক্রমণ হইতে দেখা যায় । পরে বাহুমূলে, উরুদেশে,
ললাটে, মুক এবং নিদেও হইয়া থাকে । কেহ কেহ বলেন, জীজাতি
অপেক্ষা পুরুষেব অধিক হয় ।

চিকিৎসা । সচবাচর ইহা কোন একাবে অনিষ্টজনক নহে
কেহ কেহ বিন চিকিৎসায় আবেগ্য লাভ করিয়াছেন । একপা দেখিতে
পাওয়া যায়, কিন্তু চিকিৎসা দ্বারা প্রতিবাব বড় সহজ নহে । ঔষধেব
মধ্যে কোহেব সহিত আর্শেনিক, বাই ফ্লাব ইড অফ মর্কিউরী লোশন,
য্যামিটাম লিটারে শন টিং অ ইওড ইন, গন্ধকেব মলম, চাউলমুগবাব
তৈল ই প্রসিদ্ধ ।

বেদ্যকে কুষ্ঠাদি রোগ চিকিৎসা ।

— — — — —

কুষ্ঠ বোগেব কারণ —বিনোদী অর্থাৎ সংযোগ, দেশ, কাল ও
মাত্রা প্রভৃতি নিকট অন্ন পানীয়, স্নিগ্ধ ও গুরুপাক জবা সেবন, রুমন মল
ও মূত্রের বেগবোধ, ভেদ জনের অবাবস্থিত পবে ব্যায়াম, সূর্য্য বা অগ্নিব
সম্মুখি গ্রহণ, স্বর্ণাঙ্ক, পরিশ্রান্ত ও ভয়াবস্ত হইয়া শীতল জলপান,
অজীর্ণ জবা ভোজন, ভুক্ত জবা পনিপাকেব পূর্বে পুনরায় ভোজন,

অবিধি পঞ্চকর্মে অর্থাৎ বমন, বিবেচন, অগ্নিবাসন, নিকহন ও নস্য-
ক্রিয়ায় নবান্ন, দধি, মৎস্য লবণ অন্ন, মাষকলাশ, মলক, মিষ্টান্ন, তিল,
ক্ষীর ও গুড় অতিশয় ভোজন, ভুক্ত জব্য পিষ্টাক হইতে না হইতে
শ্রী সংসর্গ, দিবানিদ্ৰা ব্রাহ্মণ ও গুরুব্যক্তির অপমান, ব্রাহ্মহত্যা, স্ত্রী-
পান, গুরুপত্নীগমন এবং মহাপাপজনক কার্য্য কবিলে বায়ুপিত্ত কফ
দূষিত হইয়া ত্বক, বক্ত, মাংস ও জলীয় ধাতুকে দূষিত করতঃ অষ্টাদশ
প্রকার কুষ্ঠ বোগ উৎপাদন করে ।

কুষ্ঠের প্রকারভেদ —দোষভেদে কুষ্ঠ সাত প্রকার যথা,—
বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতপিত্তজ বাতশ্লেষজ, পিত্তশ্লেষজ ও ত্রিদোষজ

কুষ্ঠের পূর্ব লক্ষণ —শবীবের চর্ম্ম অতি কুম্ম ও খবম্পর্শ, ঘর্ম্ম-
বোধ বা ত্বম্প পরিমাণে ঘর্ম্ম, শবীবের বিবর্ণতা, জ্বালা ও কণ্ডু চর্ম্মের
স্পর্শশক্তি লোপ, শবীব বেদনা, কোঠোৎপত্তি, ভ্রম, ভ্রণ সমূহের শীতোৎপ-
ত্তি, বেশীক্ষণ স্থায়ীত্ব, ভ্রণে অতিশয় বেদন, দোষের অস্পৃতা হইলেও
রক্তদোষে ভ্রণের বৃদ্ধি, বোমাঞ্চ এবং কুম্মবর্ণতা, কুষ্ঠ বোগ জন্মিব ব পূর্বে
এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়

কাপাল ।—যে কুষ্ঠে চর্ম্ম কুম্ম, বক্ত বা কপালবর্ণ অর্থাৎ বালুকা-
কণাঘর্ষ, খবম্পর্শ অর্থাৎ স্পর্শে কর্কশ বোধ হয়, তাহাকে কাপাল কুষ্ঠ
বলে । ইহা কষ্টসাধ্য

উড়ুম্বর —যে ভ্রণ বেদনা, জ্বালা ও কণ্ডুযুক্ত, বক্তপীতবর্ণ,
বোমারুত ও উড়ুম্বর ফল সদৃশ বর্ণ যুক্ত হয়, তাহাকে উড়ুম্বর কহে

মণ্ডল —যে ভ্রণ শ্বেত অথবা বক্তবর্ণ, কঠিন, জার, স্নিগ্ধ গোলা-
কৃতি ও উন্নত এবং ভ্রণ সকল পবন সংলগ্ন, তাহাকে কুষ্ঠমণ্ডল কহে ।
ইহা কষ্টসাধ্য

খাম্যজিহ্ব ।—যে কুষ্ঠের চতুর্দিক বক্তবর্ণ, মধ্যস্থান শ্যামাবর্ণ এবং
বেদনায়ুক্ত ও হরিণেব জিহ্ব সদৃশ, তাহাকে খাম্য জিহ্বা বলে

পুণ্ডরীক —যে কুষ্ঠ উন্নত, বক্তপদোব পত্র অর্থাৎ পাপড়ী সদৃশ,
এবং যাহার মধ্যস্থান শ্বেত লোহিতবর্ণযুক্ত তাহাকে পুণ্ডরীক বলে

সিধা ।—যে কুষ্ঠ অগ্নানু কুম্ম সদৃশ শ্বেতবর্ণ এবং তাহাকে ঘর্ম্ম

করিলে শ্বেত ও ভাস্কর্য সূক্ষ্ম ধূলি নির্গত হইয়া থাকে, তাহাকে সিঞ্চু কুষ্ঠ কহে ইহা প্রায়ই বক্ষস্থলে জন্মিয়া থাকে

কাক —যে কুষ্ঠ পাকৈ এবং কুঁচৈ বর্ণবিশিষ্ট ও অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয়, তাহাকে কাক কুষ্ঠ কহে । ইহা অসাধ্য ।

উপবৌল্লিখিত মাত্ৰ একাব কুষ্ঠকে মহাকুষ্ঠ কহে

এক কুষ্ঠ ।—যে কুষ্ঠ বৈশিষ্ট্য বর্ণবিশিষ্ট উঠে এবং মস্তক ছাড়া সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহাকে এক কুষ্ঠ বলে ইহাতে রোগীব মর্গ হয় না

চর্ম্মাখ্য ।—ইহাতে চর্ম্ম হস্তীচর্ম্মের স্থায় স্থূল ও মোটা হয় সাধারণে ইহাকে গজচর্ম্ম বলে

কিটিম ।—ইহাতে বর্ণস্থান খবম্পর্শ, ক্রম, শ্যামবর্ণ হয়

বৈপাদিক —যে কুষ্ঠে হস্ত ও পায়েব চর্ম্ম বিদীর্ণ হয় এবং বিদীর্ণ স্থানে বেদনা জন্মে, তাহাকে বৈপাদিক কুষ্ঠ কহে

অলসক । যে কুষ্ঠে শরীরে রক্তবর্ণ পীড়কাব্যাণ্ড হয় এবং উষ্ণ পীড়কায় কণ্ড থাকে, তাহাকে অলসক কুষ্ঠ কহে

দক্রমণ্ডল ।—শরীরে যে কণ্ড সমূহ গোলাকাব হইয়া উঠে, তাহাকে দক্রমণ্ডল কহে

চর্ম্মদল ।—যে কুষ্ঠে শরীরেব কোন স্থানে বেদনা ও কণ্ডযুক্ত ক্ষেপটক জন্মে এবং উহা পাকিয়া পুঁষ নির্গত হয় এবং কোন কোন সময় উহাতে একপ বেদনা হয় যে, অঙ্গুলিস্পর্শও সহ হয় না, তাহাকে চর্ম্মদল কহে

পামা ।—গায়ে আবদ্ধ ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক পীড়কা হইলে, ইহাতে চুলকনা ও জ্বালা থাকিলে উহাকে পামা কহে

কচ্ছু ।—পূর্বোক্ত পামা জ্বালা ও ক্ষেপটকযুক্ত হইয়া হস্তদ্বয়ে বা নিতম্বদেশে উপন্ন হইলে তাহাকে কচ্ছু কহে

বিস্ফোট ।—ইহাতে শরীরে শ্যাব ও রক্তবর্ণ ক্ষেপটক জন্মে, এবং ক্ষেপটকস্থিত চর্ম্ম সূক্ষ্ম হয়

শতাব্দী । বক্ত বা শ্যামবর্ণ, জ্বালা ও বেদনায়ুক্ত বহুসংখ্যক ব্রণকে শতাব্দী কহে

বিচর্চিকা — শবীবে কণ্ডু ও অতিজাবযুক্ত যে পীড়কা জন্মে, তাহাকে বিচর্চিকা কহে ইহা পদবধেই উৎপন্ন হয়

দোষভেদে কুষ্ঠের লক্ষণ বাতজ কুষ্ঠ খবম্পর্শ, কণ্ডম, শ্যাব বা বক্তবর্ণ এবং বেদনায়ুক্ত হয় কপাল কুষ্ঠ এই লক্ষণযুক্ত

চিকিৎসা । কটু তৈল ৪ সেব কাতার্থ—ছাতিম ছাল কাগি-
যাকিড়া, গুলঞ্চ, নিমছাল, শিবিসছাল, তিত্ত পলতা বা ঘোড়ানিম, জয়ন্তী
পত্র, তিত্ত লাউ, গোবক্ষ চাকুলে, হরিজা, প্রত্যেক ১০ পল, পাকজন্ম
জল ৬৪ সেব, শেষ ১৬ সেব গোমূত্র ১৬ সেব, সৈদাল পত্র বস, ভৃঙ্গ-
বাজ বস জয়ন্তী পত্র বস, ধুতুবা পত্র বস, হরিজা বস, সিন্ধি পত্র বস,
চিতাব বস, খেজুর পত্র বস, গোময় বস, আকন্দপত্র বস, সিজপত্র বস,
প্রত্যেক ৪ সেব কল্ক দ্রব্য—মাকাল, বচ, ত্রক্ষী, তিত্ত লাউ, চিতামূল, যত-
কুমারী, কুঁচিলা, পটোল পত্র, হরিজা মূত্র, পিপ্পলী মূল, সৌন্দল ফলেব
গজ্জা, আকন্দেব কালকামন্দা মূল, ঈশুমূল, আচমূল, মঞ্জিষ্ঠা, তিত্ত পলতা
বা ঘোড়ানিম, বাখাল শশাব মূল, বিছাটী পত্র, করঞ্জ মূল, হাপাবমালী,
মুগবা মূল, ছাতিমছাল, শিবীষছাল, কুড়চিছাল, নিমছাল, ঘোড়ানিমছাল,
গুলঞ্চ, হাফুবীজ, সৌমরাজী বীজ, (সৌমবাজ বীজ ২ ভাগ) চাকুন্দাব জ,
ধত্বা, ভীমবাজ, যক্ষিগন্ধু, বনগুল, কটুকী, শঠী, দারুহরিজা, তেউড়ী মূল,
পদ্মকান্ঠ, গাঁঠিঘালা, অণ্ডক, কুড়, কপূর, কটফল, জটাংসী, যুবামাংসী,
এলাইচ, বাসকছাল, বেণাব মূল, প্রত্যেক ২ তোলা ইহার নাম
“কন্দর্পসাব তৈল ”

পঞ্চতিক্ত যত ।—যত ৪ গের কাতার্থ নিমছাল, পটোল পত্র,
কটকাবী, গুলঞ্চ, বাসকছাল প্রত্যেক ১০ পল পাকজন্য জল ৬৪
সেব; শেষ ১৬ সেব কল্ক—ত্রিফলা মিলিত ১ সেব

পিত্তজ কুষ্ঠের লক্ষণ ।—বেদনা, জ্বালা, বক্তবর্ণ ও পৃথক পৃথক
হয় উভয় কুষ্ঠ এই লক্ষণযুক্ত

চিকিৎসা —কটুতৈল ৪ সেব, ঘৃত ০ সেব, আকন্দেব বস ১৬ সেব, গোমূত্র ১৬ সেব কল্ক—মেটে সিদ্ধব, বিষ, হবিতাল, গেবীমাটী, ঐশলাঙ্গলা, কুম্ভজিবা, কুড়, ত্রিকটু, মনছাল, বসুন, শবপুণ্ডা, চিডামূল, সিজেব আটা, আকন্দেব অ টা, হবিদ্র বাই মর্ষপ, গন্ধক, হিঙ্গু, প্রত্যেক ৪ তোলা ইহার নাম ‘ষডনিদ্ধ তৈল’

অমৃত গুণ্ণ্ডুল ।—গুলঞ্চ ১২৥০ সেব, দশমূল ১২ ০ সেব, আক নাদি, মুর্খামূল, বেড়েল কটুফী, দাকহুবিদ্রা এব গুল, প্রত্যেক ১০ পল, শথবদ্ধ বহেড়া ১০০টা, হবিতকী ২০০টা, আমলকী ১০০টা, দোল্লাস্থ পোউলীবদ্ধ গুণ্ণ্ডুল ২ সেব সমুদায় একত্রে ১৯২ সেব জলে পাক কবিয়া ২৪ সেব থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিবে এবং ইহার সহিত গুণ্ণ্ডুল ২ সেব গুলিয়া দিবে ও ঘৃত ২ সেব মিশাইয়া পূর্বেকৃত হবিতকী, আম- লকী ও বহেড়া বীজ ত্যাগ কবিয়া ঘৃতে ভাজিয়া ঐ কাথে দিয়া পাক কবিবে পাক সিদ্ধ হইলে গুলঞ্চের রস, গুঠীচূর্ণ, পিপ্পলী চূর্ণ প্রত্যেক ২ পল প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত কবিয়া ইবে

কফজ কুষ্ঠের লক্ষণ ।—বোগীব শবীব শীতল ও ভার হইয়া থাকে কুষ্ঠ মিশ্র, গাঢ় ক্লেদযুক্ত এবং কণু বিশিষ্ট হয় মণ্ডল ও বিচর্চি কায় উপবোক্ত লক্ষণ দেখা যায়

চিকিৎসা —কটু তৈল ৪ সেব । গোমূত্র ১৬ সেব কল্ক—মবিচ, হবিতাল, মনছাল, মুখ, আকন্দেব আটা, কববী মূল, তেউড়ী মূল, গোময় বস, বাখাল শশার মূল, কুড়, হরিদ্রা, দাক হবিদ্র, বক্তচন্দন, প্রত্যেক ৪ তোলা, বিষ ৮ তোলা ইহার নাম ‘মবিচাদিতৈল’

অমৃতাকুর লৌহ ।—অগ্নিশোধিত পাবা ১ পল, গন্ধক ১ পল, কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া প্রস্তুতপাত্রে পিণ্ডাকার কবিয়া রাখিবে এই পিণ্ডোপরি তণ্ড তাম্রপাত্রে চাপ দিয়া পর্পটিব দ্বা য কবিবে ইহার সহিত মোহাংগা ১ তোলা মিশ্রাইয়া সূয়ামধ্যে স্থাপন কবিয়া অগ্নিতাপ প্রদান কবিবে । তৎপরে এই কজ্জলীব সহিত লৌহ ১ পল, তাম্র ১ পল, ভেলাব আট ১ পল, অত্র ১ পল, গুণ্ণ্ডুল ১ পল ও ১৬ পল ঘৃত সংযুক্ত কবিয়া ৪ সেব ত্রিফলাব কাথে (ত্রিফলা মিশ্রিত ২ সেব, জল ১৬ সেব,

শেষ ৪ সেব) পাক করিবে শেষ পাক হুবিডকী ৪ তোলা, বহেড়া চূর্ণ ৪ তোলা, আমলকী চূর্ণ ১২ তোলা ৮ মাসা প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধি পাক সমাপ্ত করিবে মাত্রা প্রথমতঃ ১ বাতি, পরে বৃদ্ধি করিবে দুই ও তিন দিয়া বাড়িয়া নাবিকেল জল বা ছফেব সহিত আতঃকানো-সেব্য । লৌহপাণ্ডে ও লৌহদণ্ড দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত ও সেবন বিধি

বাতপিত্তজ কুষ্ঠের লক্ষণ —ইহাতে বায়ু ও পিত্তজ কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশিত হয় ২ যাজিহ্ন কুষ্ঠ এই লক্ষণ ক্রান্ত

চিকিৎসা । কটু তৈল ৪ সেব কল্ক জব্য—সোমবাজী বীজ, হুবিজ, দাকহুনিজা, শ্বেত সর্ষপ, কুড়, ওহব করঞ্জমূলের ছাল, চাকুফে বীজ, সোঁদাল পত্র মিলিত ১ সেব পাকজন্ত জল ১৬ সেব । ইহা নাম “সোমবাজী-তৈল” ..

• উদয় ভাস্কর —গন্ধকসহ জাবিত তাম্র ১০ তোলা, পিপ্পলী মূল ৫ তোলা, বিষ ২ তোলা, একত্রে বাড়িয়া ২ বাতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে

• বাতশ্লেষ্মাজ কুষ্ঠের লক্ষণ —বায়ু ও কফজনিত কুষ্ঠের সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয় চর্ম্মাখ্য, এক গুঠ, কটিম, মিম্ব, অগমক, বিগাঁদিকা গুঠে এই লক্ষণ লক্ষিত হয়

চিকিৎসা ।—কটু তৈল ১ সেব কল্ক—পা রা, গন্ধক উভয়ে কজ্জলী করিবে কুড়, ছাতিম ছাল, চিতামূল, মেটে সিদ্ধ, বস্ত্রন, হরি-তাম, হাকুচ বীজ, সোঁদাল বীজ, জাবিত তাম, মনছাণ প্রত্যেক ২ তোলা বোজে পাক করিতে হয় ইহা নাম “কুষ্ঠবান্ধন তৈল ।”

কুষ্ঠকালানল তৈল ।—পাবদ,গন্ধক,মনছাল,হরিভাণ্ড প্রত্যেক ১ তোলা সমুদায় জব্য কাজি ১ তোলায় উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ইহা ব ঘাঁরা বজ্রখণ্ড লিপ্তকবতঃ শুকাইয়া বাতি প্রস্তুত করতঃ তিন তৈল মাখাইবে সাঁড়াশি বদ বা বাতি-খনিয়া জ্বলিত করিবে এবং এক পোয়া তিল তৈল এক্রে একে একে জ্বলিত বাতি উপর দিবে বাতির নিম্নে একটা পাত্র রাখিবে,এই পাণ্ডে বাতি জ্বলিত হইলে তৈল বিন্দু পড়িবে, তাঁহা কুষ্ঠস্থানে দিবে ।*

পিত্তগোস্ত্রজ কুষ্ঠের দাক্ষণ — ইহ ৩০ কফ ও পিত্তজ কুষ্ঠের
লক্ষণ জ্ঞানিয়া থাকে দক্ষ, শতাক, পুণ্ডরীক, বিক্ষেপ, পামা ও চর্ম্মদল
বৃষ্ঠ এই দোষ ও লক্ষণযুক্ত হয়

চিকিৎসা — হবিতাল ২ মাসা, কুমড়াব বস, ত্রিফলাব জল, তিল
তৈল, ঘৃতকুমারীব বস ও কাঁজিতে ভাবনা দিবে গন্ধক ২ মাস, পামা ২
মাসা, কঙ্কণ প্রাপ্ত কবিয়া পূর্বোক্ত ২ মাসা হবিতাল মিলাইয়া ছাগ-
ছথে, লেবুর বসে ও ঘৃতকুমারীব বসে তিন দিন ভাবনা দিয়া চক্রাক ব
কবিয়া শুকাইবে হাড়িব ভিতর পলাশাকার স্থাপন কবিয়া তাহাতে উক্ত
চাক্রি সকল বাখিয়া ১২ গ্রাহব পাক কবিবে নীতন হইলে তুলিয়া
লইবে মাত্রা ২ বতি ইহার নাম “তালকেশ্বর ”

বৃহৎ সোমরাজী তৈল — সর্ষপ তৈল ৪ সেব, কুথার্থ সোম
বাজ বীজ ১২ ০ সেব, জল ৬৪ সেব, শেষ ১৬ সেব চাকুন্দে বীজ ১২ ০
সেব, জল ৬৪ সেব, শেষ ১৬ সেব গোমূত্র ১৬ সেব কল্কজব্য—চিতা-
মূল, ঈশলাঙ্গলা, শুষ্ঠী, কুড়, হবিদ্ভা, ডহব কবঞ্জ বীজ, হবিতাল, মনছাগ,
ছাপবসাণী, তালন্দ মূল, কববী মূল, ছাতিম মূলের ছাল, গোময়, খদিব,
বাষ্ঠ নিমকাষ্ঠ, মরিচ, কালকাসন্দা প্রত্যেক ২ তোলা

ক্ষুদ্র প্রয়োগ — দুর্ধা, হবিতকী, মৈদাব লবণ, চাকুন্দে বীজ,
তুলসী পত্র, এই সমুদায় বাজি ও তক্তে পেষণ কবিয়া প্রলেপ দিলে কণ্ডু,
ও দক্ষ ভাল হয় ।

গুনা, তুষ, চাকুন্দবীজ, হবিতকী, বাজি তলস্থ অন্ন একত্রে বাটিয়া
দক্ততে লেপ দিবে

নিউজ, চাকুন্দেবীজ, কুড়, হবিদ্ভা, মৈদাবলবণ ও সর্ষপ বাজিতে
বাটিয়া দক্ততে প্রলেপ দিবে

ববক্ষাব ও গন্ধক কটুতলেব সহিত বা কালকাসন্দাব বীজ, মূল্যব
বীজ ও গন্ধক এই সমুদায় চূর্ণ কাঁজিব সহিত পেষণ কবিয়া সিদ্ধাবোধে
অর্থাৎ ছুলিতে প্রলেপ দিবে

বুড়, মূল্যব বীজ, গিহজু, শ্বেত সর্ষপ, হবিজ, নাগেশ্বর মাড়িয়া
প্রলেপ দিলে বহুকালোৎপন্ন সিদ্ধা ভাল হয়

গন্ধক ১ ভাগ, যবক্ষার ১ ভাগ, কটুতৈলে মাড়িয়া প্রলেপ দিলে মিথু
ডাল হয়

ত্রিদোষজ কুষ্ঠের লক্ষণ ।—ইহাতে বায়ু, পিত্ত ও কফজ কুষ্ঠের
লক্ষণ সমুদায় লক্ষিত হয় কাকনক কুষ্ঠ ত্রিদোষোৎপন্ন

চিকিৎসা ।—কবজ তৈল ১ মেব কল্ক চিতাঘূল, নিমিন্দাধূনা,
কববীৰ মূল নানীতা বীজ, বিষ প্রত্যেক ১ পল কল্কদ্রব্য সকল কাঁজিতে
বাটিয়া তৈলে দিবে, এবং কাঁজি ১ পল মিশ্রিত কবিয়া বৈজ্যাপক
করিবে ইহাৰ নাম ‘পৃথীসাব তৈল’

রসস্থ কুষ্ঠের লক্ষণ —কুষ্ঠ রস আশ্রয় কবিয়া উৎপন্ন হইলে
শরীরেব বিবর্ণতা কম্পতা জন্মে এবং বোমাক্ষ হয় । অতি ঘর্ষ ও চর্মেণ
স্পর্শশক্তিব লোপ হয়

• রক্তাশ্রিত কুষ্ঠের লক্ষণ —কুষ্ঠ, বক্ত আশ্রয় কবিয়া উৎপন্ন
হইলে ত্রণে কণ্ডু এবং অধিক পরিমাণে পুষ্ণজাব হয়

মাংসাশ্রিত কুষ্ঠের লক্ষণ ।—কুষ্ঠ, মাংস অবলম্বন কবিলে যুগ্ম
শোষ, শরীরেব কৰ্কশতা, জড়তা, অঙ্গবেদনা, গাত্রে পীড়কা ও ক্ষোড়ক
জন্মে ।

মেদাশ্রিত কুষ্ঠের লক্ষণ ।—কুষ্ঠ মেদ আশ্রয় কবিলে অম ও
হস্ত ভঙ্গ, অঙ্গুলি মল্লোচন ও ক্ষত বৃদ্ধি হয়, বোগী চর্মিতে অক্ষম হয়,
অধিকন্তু ইহাতে রস, রক্ত ও মাংসাশ্রিত কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পায়

অস্থি ও মজ্জাশ্রিত কুষ্ঠের লক্ষণ বৃদ্ধ, অস্থি ও মজ্জা
আশ্রয় করিলে বোগীব ন সিকা বসিয়া যায়, চক্ষু বতবর্ণ ও শ্ববভঙ্গ হয়,
এবং ক্ষতস্থানে কীট জন্মে

শুক্রাশ্রিত কুষ্ঠের লক্ষণ ।—ইহাতে পূর্বে ও বসাস্থিত প্রভৃতি
কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পায়, পবন্ত বোগীব মস্তান মন্ততি পর্যন্ত কুষ্ঠবোগী-
প্রাপ্ত হয়

কুষ্ঠের সূচ্যাসাধ্যাদি ভেদ ।—বসাস্থিত, বক্তাশ্রিত ও মাংসা-
শ্রিত কুষ্ঠ এবং বাতশ্লেষজ এককুষ্ঠ সাধ্য মেদাশ্রিত ত্রিদোষজ কুষ্ঠ
মাধ্য মজ্জা ও অস্থি আশ্রিত ত্রিদোষজ কুষ্ঠে কীট ও জাণা থাকিলে,

গির্পাসা ও সন্নিমান্দ্য থাকিলে উহা অসাধ্য যে কুষ্ঠে কুষ্ঠস্থান বিদীর্ণ হয় ও কোন অঙ্গ খসিয়া পড়ে এবং চক্ষু বক্তবর্ণ ও স্ববৃদ্ধ হয়, যে কুষ্ঠ পক্ষ কৰ্ম্মেব অর্থাৎ বসাদি ধাতুচতুষ্টয়েব ক্রিয়া সমূহের ওণ অতিক্রম কবে, সেই কুষ্ঠ বোগীকে বিনাশ কবে ।

কিলাসের কারণ । কুষ্ঠ যে কাৰণে উৎপন্ন হয়, কিলাসও সেই কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে

অবস্থাভেদে কিলাসের নামভেদ —রস অবলম্বন কবিয়া উৎপন্ন হইলে কিলাস, মাংস আশ্রয় কবিয়া উৎপন্ন হইলে অকণ, মেদ আশ্রয়ে উৎপন্ন হইলে স্থিত কছে

কিলাসের অসাধ্য লক্ষণ —মনদ্বাব, হস্ততল ও ওষ্ঠেজাত কিলাস অধিক দিনেব হইলে অসাধ্য

সংক্রামক রোগ নির্ণয় —কুষ্ঠ, জ্ব, শোথ, ক্ষয়, নেত্রভিষ্মন্দ এবং ঔপসর্গিক বোগাত্মক ব্যক্তিব গাত্রস্পর্শ, নিশ্বাস গ্রহণ, একস ভোজন এক শয্যাশয়ন, একাসনে উপবেশনাদি কবিলে পূর্বেজাত বোগ সকল আক্রমণ করিয়া পড়িলে

হোমিওপ্যাথিকে কুষ্ঠাদি চর্ম্মরোগ চিকিৎসা ।

কুষ্ঠ —সাধাবৎ ক্ষতমাজেবই প্রায় নিম্নোক্ত প্রকারে চিকিৎসা হইয়া থাকে

চিকিৎসা —এক সপ্তাহকাল প্রাতে এবং বাত্রিকালে “আর্শেনিকাম্” প্রয়োগ কবিলে যন্ত্রণাব আধিক্য হইলে “হাইড্রাস্টিস্” খাইতে দিবে “পাদম্ফোর্ট প্রভৃতির ঞ্চায় ক্ষত হইলে “হোমামিলিস্” ব্যবস্থা কবিতে হইবে প্রাতে এবং বাত্রিকালে “সিলিসিনিয়া” নামক বিশেষ ঝল দিহিলে

পাঁচড়া ।—ইহাব লক্ষণাদি সাধাবণেব এত উত্তমকপে পৰিভ্ৰাত
যে, তজ্জন্ম তাহাদেব পুনৰুক্তি অনাবশ্যক ।

চিকিৎসা ।—সল্ফাৰ অয়েটেমেন্টেব বাহু প্রায়ে গ কৰিবে এবং
বাত্ৰিকালে “সল্ফাৰ” খাইতে দিবে

বিং ওয়ারম বা দক্ষ ।—বাত্ৰিকালে “সিপিয়া” খাওয়াইতে
হইবে প্রাতে “আর্শেনিক” খাওয়াইবে, এবং সিপিয়া অয়েটেমেন্টেব
বাহুপ্রয়োগ কৰিবে

স্ফোটক ।—ফোড়া পাকাইব জন্ম বাএ এবং প্রাতে গবম পল্ফ-
টিশ দিবে । তাহাব পবে বাটিয়া পুঁষ বাহিব কৰিবে অগ্ন্যান্ত উপ-
সর্গেব জন্ম নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যৱস্থায় ।

অতিবিক্ত বেদনা থাকিলে “আর্নিকা” খাইতে দিবে । বেদনাধিকা
হইলে “গ্যাকোনাইট” ব্যবস্থা কৰিবে স্ফোটকে পুঁষ হইলে কিন্তু
মুখ বেষা প্রস্তু না হইলে “হেপাৰসল্ফাৰ” দিবে ।

স্ফোটক একবাবে নিবাবণ কৰিতে হইলে “সল্ফাৰ” খাওয়াইবে ।

চুলকানি ।—চুলকানি নিবাবণ জন্ম “সল্ফাৰ,” শবীৰুব আর্দ্রতা
থাকিলে “মার্কেটবিয়স্” দিতে হইবে । চুলকানিব সঙ্গে জ্বৰ ও বম
পড়িতে থাকিলে “আর্শেনিক” দেওয়া কৰ্ত্তব্য ।

কাটা ঘা ।—শীতল জল দিয়া অথবা ববফদ্বাৰা বন্ধ বন্ধ কৰিবে
“আর্নিকা” গোশনে লিটে বা তুলুা ভিজাইয়া ক্ষতস্থানে বসাইয়া দিবে ।

পোড়া ঘা ।—তিসিব তৈল চূর্ণেব জলেব সহিত সমানভাগে
একত্র মিশ্রিত কৰিয়া দক্ষস্থানে প্রয়োগ দিবে বেদনা উপস্থিত হইলে
উপবোক্ত উপায় কৰিবে

জ্বৰ এবং প্রদাহ উপস্থিত হইবাব সম্ভাবনা থাকিলে “গ্যাকোনাইট”
দিবে

বেদনা নিবাবণ ও সাধাবণ চিকিৎসা জন্ম চাবি খটা অন্তৰ
“আর্নিকা” খাওয়াইবে

বিস্ফোড়া । এই ফোড়াব মাতনা সাধাবণতঃ অধিক এজন্ম
অন্তৰ চিকিৎসা সম্বন্ধে কিত বিশেষ কথা নোখা অধ্যক্ষ

চিকিৎসা . ক্ষীণতা, কাঠিগ্র এবং উত্তাপ থাকিলে প্রাতি তিন ঘণ্টা অন্তর পর্যায়ক্রমে “বেলেডোনা” এবং “মাকু’বিয়াস্ সিভাস্” খাওয়াইবে। শীতান্নভব থাকিলে ‘হিপাব’ দিতে হইবে। পাকিয়া উঠিলে দিবসে তিনবার “হাইড্রাস্টিস্” এবং প্রাতে ও রাত্রে “মিলিনিয়া” খাওয়াইবে। এইরূপ ফোটক ক্রমাগত হইতে থাকিলে দিবসে দুইবার ‘মাজুইনাবিয়া’ এবং বাএ ও প্রাতে “আর্শেনিক” খাইতে দিবে।

” —————

হৃদযন্ত্রাঘাতে কুষ্ঠাদি চর্মরোগ চিকিৎসা।

কুষ্ঠ ।—দেহের চর্মের উপর স্থানে স্থানে চাকা চাকা হইয়া মলিন হয়, কখন কখন কিঞ্চিৎ ঘোটা হয়, কতক দিবসেব পর সেই সকল স্থানে ঘা হয়, ভিতরের হাড় ও মাংস ক্ষয় হইয়া যায়, অঙ্গুলি সকল বসিয়া গিয়া থাকে, ক্রমশঃ হস্তপদাদি পর্যন্ত খসিয়া যায়।

চিকিৎসা । বোগের সূত্রপাত হইলেই জোলাপ দিয়া কোষ্ঠ পবিত্র করাইবে। পরে বক্তমে গণ ব্যবস্থা। তাহাব পর নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে

সফেদ সম্বল ... ১ মাস।

গোলমবিচ চূর্ণ ... ৪ মাস।

সাবান ... ৪ মাস।

একত্র মিশ্রিত করিয়া ১৬টি বটী করিবে এবং প্রতিদিন সম্ভাব্য সময় এক একটা বটী খাইতে দিবে। যদি ইহাতে উপকার না দর্শে, তবে পুনরায় জোলাপ দিয়া পুনরায় ১৬ দিন ঐরূপে এক একটা বটী খাওয়াইবে। অধিক দিনেব পুৰাতন ব্যাধি হইলে প্রতিকার পাইবার কোন আশা থাকে না।

চুল্কান —দ্বীপ চুল্কাইতে চুল্কাইতে চর্মের উপর কণ্ডুঘন

হাকিমীমতে কুষ্ঠাদি চর্মরোগ চিকিৎসা । ৫৫৯

অর্থাৎ ফুলুড়ী বাহিব হয়, ফলতঃ চুলকাইবার সময় তাহার মূখ ছিঁড়িয়া
বুম নির্গত হয়, পবে আপন ইচ্ছায় শুকাইয়া যায় ।

চিকিৎসা — উত্তমরূপে চর্ম পবিকার কবিয় নিম্নোক্ত ঔষধ তুলি
দিবে

গন্ধক ... ১ ছটাক
সর্বপ তৈল ... ১ ছটাক ।

গন্ধক উত্তমরূপে চূর্ণ কবিয়া তৈলেব সহিত মিশ্রিত কবিবে এবং
আবাম না হওয়া পর্য্যন্ত দিবসে দুইবার প্রয়োগ কবিবে ,

গন্ধক অর্দ্ধ ছটাক উত্তমরূপে চূর্ণ কবিয়া ছয়ভাগ কবিবে যে
দিন উপবি লিখিত মালিশ ব্যবহার কবিতে থাকিবে সেই দিন ছইতে
এক এক ভাগ মাত গুড়ের সহিত মিশ্রিত কবিয়া প্রতিদিন খাইতে
দিবে

পাঁচড়া — প্রথমে চামড়ার উপর এক একটী কবিয়া বাহিব হয়,
পবে একত্র লিগু হইয়া যায়

কারণ । ক্ষুধামান্দ্য হেতু ময়লাব সংশ্রবে এই পীড়া জন্মে

চিকিৎসা । গরম জলে উত্তমরূপে ময়লা পবিকার কবিয়া পবে
নিম্নোক্ত ঔষধ তুলি ব্যবহার কবিবে

নারিকেল তৈল ... ১ ছটাক
গাঞ্জা ... ১ তে লা

নারিকেল তৈল উত্তমরূপে গরম হইয়া ফুটিবান মত হইলে, তাহাতে
গাঞ্জা দিয়া নামাইয়া লইবে , সেই তৈল প্রতিদিন ব্যবহার কবিলে

দ্রুত — চর্মের উপর স্থানে স্থানে অথবা সকল শরীরে চ কা চাকা
হইয়া চুলকায় ।

চিকিৎসা । — দাদমারীর পাণ্ডাকে উত্তমরূপে ব টিয প্রলেপ
দিলে দীঘ্র সাবিয়া যায়

অন্য উপায়

গর্জন তৈল ... ১ ছটাক
গন্ধক চূর্ণ ... ১ ছটাক ।

উত্তমরূপে মিশ্রিত কবির প্রত্যাহ প্রলেপ দিবে

পূর্বাতন ঘৃত	...	১ ছটাক
সোহাগাব খই	..	০ ছটাক।

একতম ম প্রস্তুত কবিয়া দিবসে ২ * বাব উত্তমরূপে মর্দন কবিবে

ত্রিংশ অধ্যায়।

১) লোপ্যাথিকে বসন্তাদি সংক্রামক রোগ চিকিৎসা।

স্মল্পক্স বা বসন্ত—একপ স্পর্শসংক্রামক রোগ আন দ্বিতীয় নাই। এক প্রকার বিষ * বীবে প্রবেশ করিলে এই ব্যাধি জন্মিয়া থাকে, কিন্তু একবার টীকা হইলে আর সংক্রামকের ভয় প্রায় থাকে না। এজন্য সকলের টীকা লওয়া কর্তব্য।

এই রোগের চারিটি অবস্থা—(১) স্লেটেজী বা গুপ্তাবস্থা, (২) প্রাই-মানী ফিবার বা প্রথম জ্বরবস্থা, (৩) মেচিউরেশন্ বা পক্ষাবস্থা, (৪) সেকেন্ডারী ফিবার বা দ্বিতীয় জ্বরবস্থা।

গুপ্তাবস্থা—এই অবস্থা ১২ দিন পর্যন্ত থাকে। ইহাতে রোগীর শারীরিক বা মানসিক ক্রিয়া কিছু মাত্র বৈলক্ষ্য্য ঘটে না।

প্রাইমারী ফিবার বা প্রথম জ্বরের অবস্থা—এয়োদশ বা চতুর্দশ দিবসে ঘোবতব জ্বরের সহিত শিরোবেদন, বমন, পিপাসা, পৃষ্ঠ-বেদনা, ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইবার ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে বসন্তের গুটী বাহির হইয়া থাকে। এই সকল গুটীর উপর হাত বুলাইলে উচ্চ বেদন হয়। এই সকল গুটী প্রথমে মুখে, ফ্রন্টে, হস্তের মণিবন্ধে, তাহার পূর্ব পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, বক্ষ ও ভ্রুতি স্থানে, অবশেষে দেহের নিম্নাঙ্গে প্রকাশ পায়। গুটী বাহির হইলেই জ্বর কমিয়া য়।

মেচিউরেশন্ বা পক্ষাবস্থা—নবম দিবসে এই সকল গুটীতে

শ্যালোপ্যাথিক বম্বাদি সংক্রামক রোগ চিকিৎসা। ৫৬১

পুঁথ জন্মে এবং পাকিয়া উঠে। এই অবস্থায় বোগীব মুখমণ্ডল ও চক্ষুব-
পাতা ক্ষীত, লাল নিঃসরণ এবং গাত্রে এতাদিক বেদনা হয় যে, নাড়ী-
পরীক্ষাকালেও কষ্ট বোধ করে। এই সমুদায় লক্ষণ মঙ্গলজনক বলিয়া
স্বীকৃতি হইবে।

চতুর্থাবস্থায় বোগীব মৃত্যু না হইলে ৭টীক সকল শুষ্ক হইয়া আইসে
এবং বোগী ক্রমশঃ শব্দহীন হইতে থাকে।

যে সকল বোগীব প্রথমাবস্থায় রক্তের পবিবর্তন এবং উচ্ছাতে এক-
কালেই ফাইব্রীনের অভাব হয় ও শিবিরে আধিক্য থাকে, চক্ষু বসিয়া
যায়, শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন বহে, মুখগন্ধবৎ, নাসাবন্ধ, অস্ত্র প্রভৃতি স্থান
হইতে রক্তস্রাব, জীজাতীক জরায়ু হইতে রক্তস্রাব গর্ভস্থান, অথবা
জ্বরকালে প্লুরাইটিস্ বোগীব প্রাণনাশের কারণ হয়। এই রোগের মধ্যে
ব্রুসাইটিস্, জিহ্বাপ্রদাহ, কণ্ঠপ্রদাহ, ইভিসিউপেলাস্, পাঠমিথ গ্যাং-
গ্রীণ ইত্যাদি রোগ উপসর্গরূপে উপস্থিত হইতে পারে।

চিকিৎসা।—সামান্য পীড়ায় যত অল্প ঔষধ ব্যবহার করা যায়
ততই ভাল। বোগীকে স্থিতিভাবে পরিকৃত-বায়ুসঞ্চালিত গৃহে শয়ন
করাইয়া রাখিবে। মশারি খাটাইবার কোন প্রয়োজন নাই।

পথ্য।—স্যাবোৰ্ণট, দুগ্ধের সহিত চা, পক্ক ফল, ক্রোমনেড্ বার্লি-
ওয়াটার, সোডা-ওয়াটার, বরফ, ইত্যাদি।

গরম জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া গাত্র ধৌত কর ও দিবসের মধ্যে অন্ততঃ
দুইবার বস্ত্র পবিবর্তন নিত্য আবশ্যক।

ঔষধ।—ঔষধের মধ্যে নীচেব লিখিত ঔষধ দ্বারা উপকার দর্শি-
বার সম্ভাবনা।

টীং আইওডাইন্	...	...	৫২ ড্রাম।
পরিষ্কৃত জল	...	...	৮ আং
একত্র মিশাইয়া উহা দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিবে।			
ম্যাগ্নেসিয়া সাল্ফ্যাটস্	..	..	১২০ গ্রাম।
ম্যানা	.	...	১৬০ গ্রাম।
টীং মেনা	.	...	১২ ড্রাম

ইন্ফিউজি মেন

১১ ৩ ৭

প্রাতে একবারে সেবন কবাইবে

একাইতে ৫৫ আ সঞ্চিত হইবাব আশঙ্কা, স্বাস্থ্যবোধবৎ কষ্ট প্রভৃতি
উপসর্গ থাকিলে নিম্নোক্ত কোন ঔষধ প্রয়োগ কবা যাইতে পাবে

লাইকবিস্ মার্কিয়া হাইডো ক্লোরাটিস্

৩০ বিন্দু

সিবপি ৫০ মনিস্

২ ড্রাম

গ্যাকোয় ক্যাম্ফর

২ অ ২

বাত্রে শয়নকালে খাওয়াইবে

মিস্চুবা স্পিরিটাস্ ভাইনি গ্যালিশাই

২ আ ২

এক্টার্কট ওপিযাই লিকুইডি

৫—১০ বিন্দু

স্পিরিটাস্ ক্লোবোফনমি

১১ বিন্দু

একমাত্রা প্রত্যেক চাবি দাঁটা অন্তর প্রয়োগ কবিবে

ক্ষত গভীর ও যন্ত্রণাদায়ক হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ প্রয়োগ কবিলে
উপকার দর্শিবে

ফ্যান্ডি ফস্ফরিসাই ডাঃ

১২ ড্রাম।

লিঃ গ্যাকোনাইট

২ ড্রাম

লিঃ সিলেক্সা কাম্পা

২ অ ১

ইন্ফিউজন্ অ্যান্ডিসাই

৭ অ ২

দ্বয় মাত্রা দিনসে তিনবার খাওয়াইবে।

দাগ মিনাইবাব জগ্গ অনিভ অয়েল, গ্লিসেরিন ও গৌ লাপ জল মিশ্রণ,
লাইগ লিনিমেন্ট, নাইট্রেট অফ সিল্ভার গৌলাপ জগ্গেব সহিত ব্যব
হাব করিবে

চিকেন্ পক্স বা পানীয় বসন্ত — ইহা এক প্রকার স্ফোটক-
জনক পীড । ইহাতে স্ফোটক সমুদায় অষ্টাহকাল স্থায়ী জ্ববেব সহিত
বকে, পৃষ্ঠে, মুখে ও শাখাচতুর্দিকে বহিঃস্থ হয় ইহা ও এক প্রকার বিষ-
জগ্গ হইয়া থাকে এই বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইবাব এক সপ্তাহ হইতে
দুই সপ্তাহ পর্যন্ত গুণ্ডভাবে থাকে কখন কখন শিরোবেদনা, সামান্য
জ্বর ও কানি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়

জ্যালোপ্যাথিকে বসন্তাদি সংক্রমক রোগ চিকিৎসা । ৫৬৩।

জ্ববেব দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসে গুটি বাহির হয় গুটিগুলি গাল বর্ণ, ইহা বা প্রথমে গায়ে পের মুখে প্রকাশিত হয় তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসেই এই সকল গুটি সমুচিত হইতে থাকে জ্ববেব অস্পাতা দাবাই বসন্ত হইতে ইহাকে পৃথক করা যায়

চিকিৎসা ।—ইহার চিকিৎসা অতি সহজ উষ্ণ ও বলকণ দ্রব্য খাইতে না দিয়া লঘু আহারে বোগীকে বন্ধা করিবে যাহাতে গুটী ব মুখ ছিন্ন না হয়, এমত চেষ্টা করিবে , উপশমকালে অস্পা অস্পা কুইনাইন দেওয়া বাইতে পাবে ।

মিশেলস্ বা হাম । ইহাও সংক্রামকরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে কখন কখন ইহা বহুব্যাপকও হইতে পারে এইরূপ হইলে শীতাব পূর্বে বা পবে ছপিংকফ প্রায়ই হইয়া থাকে

লক্ষণ —জ্বর, শরীর দুর্বল, সকল বিষয়ে বিরক্ত বোধ, মুখ ত্রিহীন, ত্বক শুষ্ক, জিহ্বা আর্দ্র ও লেপযুক্ত, বাত্রিকালে প্রলাপ, ক্ষুধামান্দ্য, প্রবল শিপিমা, পীড়া কঠিন হইলে বমন বা বমনেচ্ছা, চক্ষু রক্তবর্ণ ও জলপূর্ণ, আলোক দর্শনে অনিচ্ছা, চক্ষু ব পাতা ক্ষীত ও বেদনায়ুক্ত, কখন কখন ইটি ও নাসিকা দিয়া জলবৎ ক্রন্দ নির্গম, নাসা হইতে বস্ত্র-প্রাব, কখন কখন গলায় মধ্যে ক্ষত, সম্মুখ কপালগহবর ভার্য বোধ, গর্ভদ শুষ্ক কাশি, বক্ষঃস্থলে বেদনা, শ্বসভঙ্গ, ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস, নাড়ী নিস্তেজ ও ক্রতগামী, ও প্রাব পরিমাণে অস্পা, এবং কখন কখন উদরে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়

উপসর্গ ।—এই বোগেব সহিত নিমোনিয়া বা আক্কাইটিস্ হইলে প্রায়ই সাংঘাতিক হইয়া উঠে

চিকিৎসা ।—বোগীকে প্রশস্ত ও পবিত্রিত এবং বায়ুসঞ্চারিত গৃহে রাখিবে । কোনরূপে তাহার গায়ে আলোক বা শীতল বায়ু না লাগে ইহার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে । ত্বক অত্যন্ত শুষ্ক হইলে গরম জলে গা মুছাইয়া দিবে গাত্র কক্ষমতার ধারণ করিলে মাখমদা বা গাত্র মার্জনা করিবে যাহাতে স্ননিদ্রা হয় তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে

দুষ্ক, যাবোকাট, অণু জেলি, ত্রথ প্রভৃতি খাইতে দিবে দৌর্বল্য নিবারণার্থ ত্রাণ্ডিব সহিত ডিম্বেব স্বেতাংশ ও বিফ্টি খাওয়াইবে পিপাসা নিবারণ জন্য লেমনেড ও অম্প পবিমাণে মীতল জল দিতে পাবা যায়

কণ্ঠনালীর প্রদাহ থাকিলে গরম জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া তাহাব তাপ দিবে স্বাসকষ্ট থাকিলে গরম জলে সর্ষপ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তদ্বা-
স্থান করাইলে উপকার দর্শিতে পাবে পীড়া আবেগ্য হইলে দুর্বল্য বহুয় কুইনাইন ও লৌহযটিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে একপ অবস্থায় কডলিভাব অয়েলদ্রাব্যও বোগীব বল হইতে পাবে

ডিপ্‌থিরিয়া —এক প্রকার বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে এই পীড়া জন্মিয়া থাকে

লক্ষণ —গ্রীবাদেশে কঠিন, গলাব ভিতর বেদনা, গলাধঃকরণে ক্রেশ, দৌর্বল্য, শারীরিক ও মানসিক শ্রমে অনিচ্ছা, বমনোদ্বগ, উদরা-
ময়, চিত্তচাঞ্চল্য মুখগহববেব পশ্চাদ্‌দিকে ফসেস্ ও টন্‌সিলেব সকল বা
কোন কোন স্থান ক্ষীণ ও বক্তবর্ণ দেখায় পীড়া আক্রমণ কবিবাব ১২
হইতে ৪৮ ঘণ্টা পবে উহা পবিকৃত উজ্জ্বল, হবিজ্জাত হয়। ক্রমে স্বর-
ভঙ্গ, স্বববোধ ও স্বব কৰ্কশ হইয়া থাকে স্বাসকষ্ট, মুখমণ্ডলের আব-
ক্ততা, চক্ষু বক্তবর্ণ, এবং বহির্গত হইয়া হঠাৎ মৃত্যু হইতে পাবে
শেষাবস্থায় মুখ দিয়া পুঁথ নির্গত হইতে দেখা যায়

প্রায়ই দুই হইতে চতুর্দশ দিবস পর্য্যন্ত এই পীড়া অবস্থিতি
করে। কণ্ঠনালী আক্রান্ত হইলে এক সপ্তাহ মধ্যেই বোগীব মৃত্যু
হয়

চিকিৎসা এই রোগে বজমোক্ষ, ফোমেণ্টেশন্‌ বা পুল্‌টীন্‌
দ্রাব্য কোন ফল দর্শে না পীড়া প্রকাশ হইবাব পবেই নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া
করিলে উপকার দর্শিতে পাবে

গরম জল	.	.	...	পুসের
ভিনেগার	.	..	...	অর্ধ ছটাক

মিশ্রিত কবিয়া তীব্র আত্মাণ লইতে হইবে কৃত্রিম ঝিল্লী প্রস্তুত

য়্যালোপ্যাথিকে বসন্তাদি সংক্রামক রোগ চিকিৎসা। ৫৬৫

হইতে থাকিলে উপরে টিং ফেরি পারক্লোবাইড বা তাপিং তৈয়া মাখাইলে উপকার দর্শে

* টিং ফেরি পার ক্লোবাইড

১ ড্রাম

গরম জল

৮ আং

একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার কুলকুচা করিতে দিবে অথবা —

লাইকব পোটাসি পারমেডানেটিস্

২ ড্রাম

জল

৮ আং

একত্রে কুল্লি করিতে দিবে

বোবাসিস্

১৬০ গ্রেন

গ্লিসেরিন

১ আং

একত্র মিশ্রিত করিয়া উফ্রেইকেশ নির্গিত তুঁ দ্বা বা দস্তমাদি ও জিহ্বায় লাগাইয়া দিবে।

লাইকবিস্ মোডি ক্লোবেটি

৫১ ড্রাম

জল

৭১ আং

একত্র করিয়া কুল্লি করাইবে।

ক্রিথোমোট

২০ বিন্দু

মিউসিল্যাংজেনিস্ ট্রাগাক্যান্ধি

২১ আং

একত্র মিশ্রিত করিয়া কুলকুচা করিতে দিবে

প্রথমাবস্থায় নিম্নোক্ত ঔষধ দিতে হইবে

পলত্ ইপিক্যাক্

২০ গ্রেন

কার্বনেট অফ য়ামোনিয়া

২০ গ্রেন

টিং ল্যাভেণ্ডিউলা কম্পঃ

১ ড্রাম

জল

১১ আং

একবারে খাওয়াইবে তাহার পরে এক গ্রাশ ইন্ফিউজন্ ক্যামোমাইন্ খাইতে দিবে।

নিশ্চেষ্টকতা, রক্তপ্রাব প্রভৃতি থাকিলে নিম্নোক্ত ঔষধ কোন একটি ব্যবহার করিবে।

কুইনি সল্ফ্যাটিস্

৯ গ্রেন

খ্যাশিডাই হাইড্রোকোবিআই ড্রাং	.	২ ড্রাম
টীং আর্গিকা	.	৩০ বিন্দু
টীং ফেবি পাবকোবাইড	..	১২ ড্রাম
ইন্ফিউজন্ ল্যাভিওফিলাই	..	৭২ আং
ছয় মাত্রা দিবসে তিনবার		
টীং ফেবি পাবকোবাইডাই	.	১২—৪ ড্রাম।
গ্লিসিবিগ (তবল)	..	৪ ড্রাম
জল	...	৭২ আং।

সাত মাত্রা দিবসে চারি বার

রক্তের ফাইব্রিন সংঘত হইবার আশঙ্ক থাকিলে নিম্নোক্ত কোন
একটি ঔষধ প্রয়োগ করিবে

কার্বনেট অফ ম্যাগনেসিয়া	..	৩০ গ্রেন।
এক্সট্রাক্ট ওপিয়াই লিকুইড	.	৩০ বিন্দু
স্পিবিট ইথাব	.	২২ ড্রাম
ডিকষ্ট মিস্কোনা ফ্লুও	..	৭২ আং।

ছয় মাত্রা দিবসে ৩ ৪ বার

পোটাসি অ্যুইওডাইডাই	.	৪০ গ্রেন।
টীং বেয়াই	.	২ আং
এক্সট্রাক্ট সারসা লিকুইডি	.	১২ আং

বড় এক গ্লাস জলে এক চামচ ঔষধ মিশাইয়া ২ ৩ ৪ খণ্টা অন্তর
খাওয়াইবে এই সকল ঔষধের সহিত পুষ্টিকর অথচ সহজে পরিপাক
হয় এরূপ খাদ্য—ডিম্ব, পোর্টওয়াইন, স্যাম্পেন, ছন্ধ, বরফ, ত্রাণ্ডি
প্রভৃতি খাইতে দিবে

বোগীকে গরম ঘবে, গরম কাপড়ে অঙ্গ আবৃত করিয়া রাখিতে
হইবে পীড়া প্রশমিত হইয়া আসিলে কডলিভাব অয়েল্ এবং কুইনা-
ইন সেবনে শারীরিক দৌর্ভাগ্য বিনষ্ট হইবে

বৈদ্যকে বসন্ত রোগ চিকিৎসা ।



মসূরিক অর্থাৎ বসন্ত রোগের লক্ষণ ও আকার ।—কটু, অম্ল, লবণাক্ত, ক্ষারবিকৃদ্ধ অর্থাৎ সংযোগ দেশ কাল ও মাত্রাদি বিকৃদ্ধ দ্রব্যভোজন, ভুজ্য দ্রব্য পবিপাক হইতে না হইতেই পুনরাধি ভোজন, দুগ্ধ, শিমবীজ ও শাক প্রভৃতি ভোজনে, দূষিত জল ও বায়ু সেবন এবং প্রতিবুল গ্রহেব দৃষ্টি, এই সমস্ত ক বৎ দূষিত বায়ু, পিও ও কফ দূষিত বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া শরীরে মসূব কলায়েব জ্বাষ পীড়কা উৎপাদন কবে । ইহাতে মসূব কলায়েব জ্বাষ পীড়কা হয় বলিয়া ইহাকে মসূবিকা কহে

মসূরিকার পূর্বলক্ষণ ।—মসূবিকা অর্থাৎ বসন্ত উৎপন্ন হইলে পূর্বে জ্বর, কণ্ঠ, শরীরে বেদনা অকচি, দেহ, শরীরেব বিবর্ণতা, চর্ম্মেব ক্ষীণতা ও চক্ষু বক্তবর্ণ হইয়া থাকে

বাতজ মসূরিকার লক্ষণ ইহাতে শরীরে বেদনা, শ্বাসবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ পীত মিশ্রবর্ণ ও কঠিন পীড়কা জন্মে এবং এই পীড়কা বিলম্বে পাকে শোণীর অস্থিসন্ধিতে বেদনা, কাস কম্প চিত্তচঞ্চল্য, ক্রান্তি, জিহ্বা ও তালুশোষ, পিপাসা এবং অকচি হয়

পিত্তজ মসূরিকার লক্ষণ —ইহাতে রক্ত পীত অথবা কৃষ্ণবর্ণ ও জ্বালাযুক্ত পীড়কা জন্মে, এই পীড়কা শীঘ্র পাকে । রোগীৰ মল পাতলা, শরীরে বেদনা, জ্বালা, পিপাসা, মুখ পাকে, চক্ষু বক্তবর্ণ এবং দুঃসহ জ্বর উৎপন্ন হইয়া রোগীকে যাতনা প্রদ নু কবে

রক্তজ মসূরিকার লক্ষণ —ইহাতে পিওজ মসূবিকার লক্ষণ লক্ষিত হয়

কফজ মসূরিকার লক্ষণ —ইহাতে মুখ হঠাৎ কফজান, শ্বাস

বেব গুরুতা, স্তিমিতত অর্থাৎ আর্দ্রতা, মস্তক বেদন, বমনোদ্বেষ্টা, অকুচি, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্য জন্মে, শিথ ও শ্বেতবর্ণ কণ্ডু, অস্পষ্ট বেদনা-যুক্ত শূলকায় পীড়কা উৎপন্ন হয় এবং উহা বিলম্বে পাকে

ত্রিদোষজ মসূরিকার লক্ষণ —ইহাতে চিঁড়াব ঞ্চায় চেপ্টা, মধ্যস্থান নিম্ন এবং অতি বেদনায়ুক্ত পীড়কা জন্মে, ইহা বিলম্বে পাকে ও অধিক পবিমাণে দুর্গন্ধ পুষ্পাব হয়

চর্মদল মসূরিকার লক্ষণ —ইহাতে কঠবোধ, অকুচি, তন্দ্রা, অবতি অর্থাৎ চিত্তাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং পীড়কা জন্মে

রোমাঞ্চিকার অর্থাৎ হামের লক্ষণ —রোমাঞ্চ হইলে লোমকূপ সকল যেকপ স্বেদ উন্নত হয়, সেই প্রকার অস্পষ্ট উন্নত ও বক্ত-বর্ণ পীড়কা জন্মিলে এবং তাহাতে জ্বর, কাস, অকুচি থাকিলে তাহাকে হাম বা লুপ্তি কহে

ত্বগ্গত মসূরিকার অর্থাৎ জলবসন্তের লক্ষণ —ইহাতে জলবুদ্ধি সদৃশ শ্বেতবর্ণ পীড়কা জন্মে, ইহা বিদীর্ণ হইলে জলস্রাব হইয়া থাকে অধিকন্তু ইহাতে বায়ু পিত্ত ও কফের প্রাকোপ অতি অস্পষ্ট লক্ষিত হয়

রক্তগত বসন্তের লক্ষণ —ইহাতে বসন্ত রক্তবর্ণ হয়, শীঘ্র পাকে ও উহার চর্মা সূক্ষ্ম হয় এবং বিদীর্ণ হইলে রক্তস্রাব হয় এই বসন্ত সূক্ষমাধ্য

মাংসগত বসন্তের লক্ষণ ।—মাংসাস্ত্রিত বসন্ত কঠিন ও শিথ হয় এবং অনেক বিলম্বে পাকে, উহার চর্মা শূল হয় বোগীর শবীৰ বেদনা, কণ্ডু, পিপাসা ও জ্বর হইয়া থাকে এই বসন্ত কষ্টমাধ্য

মেদগত বসন্তের লক্ষণ —বসন্ত মেদাশ্রয়ে উৎপন্ন হইলে গোলাকার, অস্পষ্টত, শূল ও বেদনায়ুক্ত হয় এবং বোগীর অতি ব বান জ্বর, চিত্তাঞ্চল্য, চিত্তবিএম এবং শরীরের উষ্ণতা জন্মে । অতি অস্পষ্ট ব্যক্তিই এই বোগ হইতে মুক্তিলাভ কবে

—অস্থি ও মজ্জাগত বসন্তের লক্ষণ ।—এই বসন্ত ক্ষুদ্র, শবী-

যেব বসন্ত প্রযুক্ত বসন্তও কম, চিড়ার ঞায় কিঞ্চিৎ উন্নত হয়
বোগীব মোহ, চিত্তচাঞ্চল্য, মর্গস্থানে ছিন্নবৎ বেদনা জন্মে ; অধিকন্তু
এমবদিক কাঠেব ঞায় অস্থি বহুছিদ্রবিশিষ্ট হয় ।

শুক্ৰাশ্রিত বসন্তের লক্ষণ ।—এই বসন্ত শিথল, অতি বেদনায়ুক্ত,
পাক ব্রণেব ঞায় বর্ণবিশিষ্ট, অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ হয়, বোগীব শরীর আর্দ্র,
মোহ, শরীর জ্বালা, চিত্তচাঞ্চল্য ও ক্ষিপ্ত উৎপন্ন হয় । এই বোগী-
ক্রান্ত ব্যক্তি অতিবে কালগ্রাসে পতিত হয় । অপব রসরক্তাদি সপ্ত-
ধাতুগত মর্শুরিকাতে বায়ু পিত্ত ও কফেব লক্ষণও জন্মিয়া থাকে ।

ক্ষুদ্র প্রয়োগ ।—পুরুষেব দক্ষিণ পার্শ্বে এবং স্ত্রীলোকেব বাম
পার্শ্বে হবিতকিবীজ ধারণে বসন্ত হয় না ।

কড়াক্ষ ও মবিচু চূর্ণ বাসি জলে মিশ্রিত কবিয়া পান কবিলে তিন
দিনে বসন্ত উপশম প্রাপ্ত হয় ।

পটোল পত্র, নিম্বপত্র, ইন্দ্রযব মিলিত ২ তোলা, জল ০ সের, শেষ
১/০ পোয়া । বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু, মদন ফল বাটিয়া ঐ কাথে প্রক্ষেপ
দিবে । ইহা পান করিলে বমন হইয়া বসন্ত প্রশমিত হয় ।

বোগীব জ্বর থাকিলে জলপান পবিত্যাগ, নির্বাত গৃহে অবস্থান,
গাত্রে জযন্তী পত্র চূর্ণ মর্দন, এবং বস্ত্র দ্বাৰা গাত্র বন্ধন কর্তব্য ।

গোক্ষুরী মূল ও অনন্ত মূল তণ্ডুলোদকে বাটিয়া সেব্য । ইহাতে
বসন্ত উপশমিত হয় ।

হলুদেব ওঁড়াব সহিত উচ্ছেপাতার রস পান করিলে হার্মজর ও
বসন্ত ভাল হয় ।

বাসি জলে মধু মিশাইয়া পান করিলে গুটি ও তজ্জন্য গাত্রদাহ
নিবারণ হয় ।

নির্গত বসন্তের সংখ্যানুসারে বহুবার বৃক্ষের পত্র রোগীব নামো-
চ্চারণ পূর্বক ছিন্ন করিলে গাত্রে অধিক বসন্ত নির্গত হয় না ।

পটোল পত্র, গুলঞ্চ, মুখা, বাসকছাল, ছুরালভা, চিবাতা, নিম্বছাল,
কটুকী, ক্ষেতপাপড়া মিলিত ২ তোলা । জল ১০ সের, শেষ ১/০ পোয়া,
ইহা পান করিলে অপক বসন্ত প্রশমিত এবং পাক বসন্ত শুক হয় ।

টাবা লেবু'র কে'ব কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে বসন্ত পাকিয়া উঠে ও দাহ প্রশমিত হয় ।

পায়ে বসন্ত হইয়া দাহ উপস্থিত করিলে পায়ে তুলোদক সেচন করিবে ।

বসন্ত পাকিবাব উপক্রমে গুলঞ্চ, যক্ষ্মিধু, জাফা, ইক্ষুমূল, দাড়িম, গুড় সংযুক্ত কবিয়া সেবন কবাইবে ইহা সেবনে বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া উঠে এবং বায়ু কুপিত হয় না ।

বসন্তে শূল, উদরাধ্যান ও কম্প উপস্থিত হইলে সৈন্ধব লবণের সহিত মাংসেব যুগ্ম পান করিবে ।

কুল চূর্ণ গুড়ের সহিত ভক্ষণ কবিলে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মজ বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া উঠে ।

বসন্তে অধিক পু'ষ হইলে বট, যজ্ঞডুম্বর, অশ্বথ, পাকুড় ও বেত ইহাদের ছাল চূর্ণ করিয়া তাহা বসন্তের উপর ছড়াইবে । বিনযুঁটা ডম্ব ছড়াইয়া দিবে, বসন্তে ক্রিমিতয় নিবারণ জন্য সরল কাঠ, ধুনা, দেবদারু, চন্দন ও অণ্ডক প্রভৃতি'র ধূপ পোদান করিবে ।

ত্রিফলাব কাথে গুণ্ণুল দিয়া পান করিলে পু'ষ নির্গত হইয়া দাহ ও বেদনা ভাল হয় ।

ঘণ্টাকর্ণ, শিব, দুর্গা, বিষ্ণু এবং ব্রাহ্মণের পূজা, জপ হোমাদি অর্চন ও রোগের আত্যাচরণ করিবে

বিষয় সিদ্ধ মন্ত্র প্রয়োগ এবং ভক্তিতঃ শীতলাব স্তব পাঠন ও পাঠন করিবে ।

বসন্তের স্থখসাধ্য লক্ষণ ।—বসপ্রাণ্ড, রক্তপ্রাণ্ড, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, পিত্তশ্লেষ্মজ মন্থবিকা স্থখসাধ্য অর্থাৎ অল্প যত্নে প্রশমিত হয় ।

কূটস্থ সাধ্য লক্ষণ ।—বাতজ, পিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ মন্থবিকা যত্নে প্রশমিত হয় ।

সামান্য অসাধ্য লক্ষণ ।—যে বসন্তবোগী সজোবে নিশ্বাস ত্যাগ কবে, সে তৃক্ষাত্ত্ব হইয়া প্রাণত্যাগ কবে

অসাধ্য লক্ষণ ।—ত্রিদোষজ মন্থবিকার বর্ণ প্রবাল, তমাল, জাম

হোমিওপ্যাথিকে বসন্তাদি সংক্রামক রোগ চিকিৎসা । ৫৭২

ও লোহেব আঁর্য হইলে অসাধ্য ; এতদ্বিষয় বাতাদিভেদে মসুরিকাৰ নানা প্রকাৰ বর্ণ হয় । রোগী কাস, হিকা, মোহ, প্রবল জ্বর, অতিশয় প্রলাপ, চিত্তচাঞ্চল্য, মূৰ্ছা, পিপাসা, শরীর জ্বালা, মস্তক ঘূর্ণন, চক্ষু, মুখ ও নাসিকা হইতে বক্তপ্রাব, কঠে ঘড় ঘড় শব্দ ও বেদনাব সহিত শ্বাসভ্যাগ করিলে শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয় ।

বসন্তের উপদ্রব ।—হাতের কজী, কনুই ও ঝকদেশে শোথ হয় । উক্ত শোথাক্রান্ত বোগী অত্যন্ত ক্লেশ পায় এবং কোনক্রমেই রোগমুক্ত হইতে পারে না ।

হোমিওপ্যাথিকে বসন্তাদি সংক্রামক রোগ চিকিৎসা ।

বসন্ত ।—এই রোগ যে বিশেষরূপে সংক্রামক, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন ।

লক্ষণ ।—জ্বর, শিথোবেদনা, পাকস্থলীতে অত্যন্ত যন্ত্রণা, বমন, পৃষ্ঠদেশে প্রবল বেদনা, ইত্যাদি লক্ষণেব সহিত তৃতীয় দিবসে মুখমণ্ডলে, ঝক্কে, হস্তের মনিষক্কে, ক্রমে দেহের অপরাপব স্থানে, এবং পবিশেষে পদে লালবর্ণ দাগ সকল বাহির হইয়া থাকে । এই সকল দাগ বাহির হইবার পরেই জ্বর কমিয়া আইসে । তাহার পবে ঐ সকল দাগ জদাহযুক্ত হয় এবং তাহাতে জলবৎ পদার্থ সঞ্চিত হইয়া পুঁথ জন্মে । ইহাতে এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধ বাহির হইয়া থাকে । আক্ষেপ এই রোগেব কুলক্ষণ জানিতে হইবে । বসন্তেব ওটীকা গুলি যখন শুকাইতে থাকে, সে সময় জ্বরের প্রাবল্যও একটী বিশেষ অমঙ্গলের কারণ বলিয়া জান করা কৰ্ত্তব্য ।

ওটীকা গুলি গভীর হইলে শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত হওয়া সম্ভব ;

এজ্ঞা পরিষ্কৃত বস্ত্রখণ্ডে “টিং হাইড্রাস্টিস্” মাখাইয়া তাহা দ্বারা মুখ আরুত রাখা কর্তব্য ।

জ্ববেব এতিকাৰ জ্ঞা প্রতি এক ঘণ্টা অন্তৰ “ম্যাকোনাইট” ব্যবহীৰ করিবে বমন বা বমনোদ্ভেক থাকিলে “ভেবেট্রাম্ ভিৰাইড্” তাহাব পর “ম্যাক্টিমটার্ট” দিবে আক্ষেপ থাকিলে “বেলেডোনা” দিতে হইবে । মুখে এবৎ গলাব ভিতৰ ক্ষত হইলে ‘মাকু’রিষাম্’ প্রয়োগ কবিবে । গুটীর দাগ নিবারণ জ্ঞা “থুজা” এবং “হাইড্রাস্টিসেব” আভ্যন্তরিক প্রয়োগ উপকারজনক

রোগীর বাসগৃহ উত্তমরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে, এবং যাহাঁতে উপযুক্ত পরিমাণে বায়ু সঞ্চালিত হয়, তাহাব উপায়বিধান কবিত্তে হইবে গৃহমধ্যে মশারি বা কাপেটাদির বিছানাব কোন প্রয়োজন নাই । ঘাবেব সম্মুখভাগে কণ্ঠভিজান চাদৰ ঝুলাইয়া রাখা কর্তব্য । জ্বরকালে শীতল পানীয়, চা এবং সহজপাচ্য ভ্রথ দিবে জ্বর কমিয়া আসিলে সাধারণতঃ চলিৎ খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে ।

চিকেন্ পক্কা বা পানীয় বসন্ত ।—ইহাতে সামান্য জ্বরাভূতব হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্লিষ্টাবের আকারে শরীরেব সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হয় ; ইহাবা কখন পীতবর্ণ ধাবণ কবে না, এবং তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসেই অদৃশ্য হয় । কোন প্রকাৰ দাগ থাকে না । ইহাও সংক্রামক এবং পরিবারস্থ একজনেব হইলে প্রায় সকলেবই হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—জ্ববেব এতিকাৰ জ্ঞা দুই ঘণ্টা অন্তৰ “ম্যাকোনাইট” এবং “বেলেডোনা” দিবে ।

মস্তকবেদনা, মুখেব আরুততা এবং ভ্রকের উষ্ণতাজ্ঞা রাত্রে এবং প্রাতে “মাকু’রিষাম্” খাইতে দিবে । গুটিকাগুলি স্পর্শ দ্বাবা কঠিন বোধ এবং পীতবর্ণ হইলে দিবসে তিনবার ক’বিয় “হাইড্রাস্টিস্” দিবে ।

মিশেলস্ বা হাঁম ।—সাধাবনতঃ বসন্তকালে এই পীড়া হইয়া থাকে । প্রথমতঃ জ্বরভূতব, চক্ষু এবং নাসা দিয়া ক্লেদ নিঃসৰণ, কাশি এবং তাহাদের সহিত মুখে লালবর্ণ দাগ বাহির হয় । তাহার পবে শরীরেব প্রায় সকল স্থানেই ঐ সকল দাগ দৃষ্টিগোচর হয়

হোমিওপ্যাথিকে বসন্তাদি সংক্রামক রোগ চিকিৎসা ৫৭৩

চিকিৎসা —জ্বরকালে প্রতিষেড়ায় “স্যাকোনাইট” দিতে হইবে হাম বাহিব হইলে প্রুতি দুই ঘণ্টা অন্তর “পলুম্যাটিল” প্রয়োগ করিবে ইহাতে উপকার না দর্শিলে “জেলুমিনিয়াম” দিবে শ্বাসকষ্ট নিবারণ জন্ত “ফস্ফরাস” দেওয়া কর্তব্য এই ঔষধ ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে

যতক্ষণ জ্বর থাকিবে, বোঁগীকে শয্যায স্থিতিভাবে রাখিবে। উদবাস্য না থাকিলে শীতল জল, চা, ও ক ফল দেওয়া যাইতে পারে বীফটী, মাটন এবং চিকেন ব্রথও উপযুক্ত পথ্য বলিয়া জানিতে হইবে জ্বর অধিক হইলে গরম জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া তদ্বারা বাবস্বাব গাত্র মুছাইয়া দেওয়া উচিত

উপস্থিরিয়া —ইহাও এক প্রকার বিষক্রমে মনুষ্যদেহে প্রবেশ করে। কদর্য পানীয় জল, বহুজনাকীর্ণ স্থানে বাস, ময়লাযুক্ত বাষ্প আগ, ইত্যাদি ইহার প্রধান কারণ মধ্যে গণ্য।

লক্ষণ ।—জ্বর, তরেক উষ্ণতা, নাড়ীর দ্রুতগতি, মঘন শ্বাস প্রশ্বাস, চিবুকেব গ্লান্ড স্ফীত, গলায় ঘা, গলাধঃকরণে কষ্ট, নাশা হইতে রক্তস্রাব, ইত্যাদি প্রধান লক্ষণমধ্যে পরিগণিত।

চিকিৎসা ।—জ্বর নিবারণেব জন্ত “স্যাকোনাইট” এবং তাহার পরে “ব্যাপ্টিসিয়া” প্রয়োগ করিবে ইহাতে রোগীর অবস্থা মন্দ হইতে থাকিলে দুই ঘণ্টা অন্তর “মিউরিয়েটিক্ স্যাসিড” এবং “মার্কুবিয়াস্ প্রটোইড” দিবে। দৌর্বল্য নিবারণার্থ দিবসে দুইবার “ব্যাপ্টিসিয়া” এবং “অর্শেনিক” খাওয়াইবে।

পথ্য ।—বীফটীর সহিত ব্রাডি কিম্বা পোর্টওয়াইন দিবে। ববফ-খণ্ড চুসিতে দিবে। গরম জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া গাত্র মুছাইবে। বাস-গৃহে পরিষ্কার বায়ু সঞ্চালনের উপায় করিবে

হাকিমীমতে বসন্তাদি সংক্রামক রোগের চিকিৎসা ।

বসন্ত ।—প্রথমে অঙ্গ জ্বর হয়, মস্তক বেদনা কবে, কখন কখন বমন হয়, টুটিতে বেদনা থাকে, আর দুই কিম্বা তিন দিবসের পাবে মুখে, গলায় এবং বক্ষঃস্থলে মক্ষিকা কামড়াইলে যে প্রকার ফুলিয়া উঠে, সেই প্রকার ফুস্কুড়ির ঞায় দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে হস্ত বুলাইলে ছোট ছোট ছিটা গুলিব ঞায় শক্তি বোধ হয়। ৪।৫ দিবস পরে ঐ ফুস্কুড়িগুলি বর্ণেব আকার ধারণ কবে ; পবে তাহাদেব উপকি-
ভাগ চেপ্টা হয়, এবং ভিতরে জলবৎ পদার্থ সঞ্চিত হয় ৬।৭ দিবস পবে তাহাতে পুঁথ হয়, আর প্রত্যেক ফোঙ্কাব চতুর্দিকে লালবর্ণ চক্র দেখিতে পাওয়া যায়। ১১।১২ দিন মধ্যে পুঁথ শুকাইতে থাকে। তাহার তিন চাবি দিবস পরে ছাল উঠিয়া যায়। কখন কখন বসন্ত মুখেব উপরে অধিক হয় এবং মিলিয়া যায়। এ প্রকার হইলে জ্বরের এবং বোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

কারণ ।—স্পর্শসংক্রামক।

চিকিৎসা ।—প্রত্যহ জোলাপ ঘ্রাবা পেট পবিকাব করাইবে। জলবৎ তরল দ্রব্য খাইতে দিবে। প্রত্যহ রোগীর কাপড় বদলাইবে। জ্বর ও ফোঙ্কাদি অঙ্গ হইলে সহজে আরাম হইতে পাবে, আর যদি অধিক হইয়া শরীরে মিলাইয়া যায়, তবে সাবধান পূর্বক চিকিৎসা করিতে হইবে। জ্বর অধিক থাকিলে বোগী পাগলের ঞায় হইয়া উঠে এবং জলে প্রবেশ করিতে চাহে। এ সময় অতি সাবধানে রাখিবে।

বসন্ত অধিক হইলে মুখে এবং শরীরে অতিশয় দাগ হইয়া থাকে। তাহাতে মন্থ্যাকে বিলী কবে তজ্জন্য নিম্নোক্ত উপায় করিতে হইবে। নাবিকেলের জলকর্মে লেপন করিলে ঐ দাগ নষ্ট হইয়া থাকে।

হাঁস ।—এই বোগ বালকের অধিক হইয়া থাকে

লক্ষণ ।—প্রথমে ২ ও দিবস জ্বর হয়, পরে দেহের সর্বত্র সর্ষাব
আয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁসা দেখা যায় এই ফোঁস মুখে ও বক্ষে অধিক হয়
কারণ ।—স্পর্শসংক্রমণ

চিকিৎসা ।—ভেবেণ্ডার তৈল খাওয়াইয়া উদর পরিষ্কার বাখিবো
তবল দ্রব্য পথা দিবে । এতদ্ভিন্ন অন্য উপায় প্রয়োজন কবে না

একত্রিংশ অধ্যায় ।

ম্যালোপ্যাথিকে স্ত্রীরোগ চিকিৎসা ।

প্রেরাইটাস্ বা যোনিকগাট স্ককণ্ড ।—এই ব্যাধি এক
প্রকার চুল্কানি ।

লক্ষণ ।—আক্রান্ত স্থান অভ্যন্ত চুল্কাইতে থাকে, শুড় শুড় কবে,
স্ফীবেধনবৎ বেদনা, এবং গবম বোধ হয় . যন্ত্রণার অধিক্য প্রযুক্ত
বোগী শীতল জল ব্যবহার করিতে চাহে । নিদ্রাভাব, ক্ষুধামান্দ্য, শারীর-
বিক ও মানসিক দুর্দৈর্ঘ্য ইহা প্রধান লক্ষণ ।

চিকিৎসা ।—অপ্পমাত্রায় কুইনাইন ব্যবহারে উপকার দর্শে কিনা
নিম্নলিখিত বটিকা খাইতে দিলে বিশেষ প্রতিকার লাভ কবা যায় । .

কুইনি সলফ্	..	...	২ গ্রেন ।
একট্রাক্ট বেলডোনা	• ...	...	৩ গ্রেন
একট্রাক্ট ওপিয়াই	• ...	• ...	৪ গ্রেন
একট্রাক্ট হায়েমায়েমাই	.. • • •	•	২ গ্রেন ।

এক একটা ধর্টা হইবে ।

নিম্নোক্ত লোশন ওলি দ্বারা যোনি দৌত করিলে উপকার নির্দিষ্ট
পাবে

য্যাশিড হাইড্রোশিয়েনিক ডিন্	...	৩ ড্রাম
প্লাস্‌মাই য্যাশিনেস্	..	১ ড্রাম
স্পিবিট্‌ বেক্টিফিকেটাই	...	১ আং।
য্যাকোয়া	...	৮ আং।

অথবা—

ল ইকব মফি হাইড্রোফ্লোঃ	..	১১ আং।
লাইকব পোটাসি	...	২ ড্রাম
গ্লিসবীণ	..	১ আং।
ইউডিকলোন্	..	১ আং
য্যাকোয়া	...	৮ আং

যোনিপার্শ্বে টিউমার —এই টিউমার নানা প্রকার

কোষ গর্ভ বা য্যান্‌সিফেড্‌ টিউমার —যোনি কপাটেব

গ্রন্থি উপখণ্ড হইতে এইরূপ টিউমার উৎপন্ন হয় প্রথমে কোন যাতনা থাকে না, কিন্তু উহা যত বড় হইতে থাকে, ততই চলিবাব সময় এবং রতিক্রিয়াব পৰ ঐ স্থান বেদনা বোধ হয় মূত্রাশয়ের উত্তেজন ও সাময়িক ঋতুকালে অত্যন্ত বেদনা হইতে থাকে প্রদাহ হইলে ইহাতে পুঁয় সঞ্চিত হইতে পাবে .

চিকিৎসা ।—টিউমার একবারে কৰ্ত্তন করিয়া দিতে পারিলে অন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না তদভাবে নাইটেট অফ সিল্‌ভার অথবা আইওডাইন্‌ অফেটেগেট ব্যবহারেও বিশেষ ফল নর্শে

অন্তান্ত যত প্রকার টিউমার যোনিদেশে উৎপন্ন হয়, সকলেব চিকিৎসা প্রায় একইরূপ, এজ্য পৃথকরূপে লিখিত হইল না

যোনিদ্বারের সামান্য প্রদাহ ।—অতিবিক্ত বতিক্রিয়া, যোনিদেশে অপবিকার বাধা, জবায়ুর উত্তেজব জন্য এই পীড়া জন্মে ।

লক্ষণ ।—স্থানিক বেদন, অসুখ, মিউকাস্‌সংযুক্ত ক্লেদ নিঃসরণ, মূত্রত্যাগকালীন জ্বালা, কটি ও উরুদেশে বেদনা, আক্রান্তস্থান ক্ষীণ, প্রদাহযুক্ত, লালবর্ণ এবং মিউকাস্‌ দ্বারা আবৃত ইত্যাদি লক্ষণ দ্বারা এই রোগ জ্ঞান করা যায়

চিকিৎসা ।—লাবণিক বিবেচক প্রয়োগ, রোগীকে সুস্থিভাবে বস্তু কবা, যাশিটেট অফ লেড বা ফটকিবিসংযুক্ত লোশন ব্যবহারে স্পীড়া সম্পূর্ণ আধোগ্য হয় ।

যোনিকপাটের গ্যাংগ্রীনস্ প্রদাহ ।—প্রসনের পরেই এই স্পীড়া হইয়া থাকে

লক্ষণ ।—বমন, উদরাময়, জ্বর, পেটবেদনা, রক্তস্রাব, ক্রমে দৌর্বল্য, মানসিক উত্তেজন, যোনিকপাট ক্ষীণ ও রক্তবর্ণ, কোন কোন স্থলে জ্বরের প্রাবল্য, যোনিবৈশিষ্ট্যিক বিশ্রীতে সবেদন্যায় মিউকাস্ সংস্থান ইত্যাদি ইহাব প্রধান লক্ষণ

চিকিৎসা ।—হাইড্রোক্লোরিক যাশিড্ এবং বিবেচনামতে অন্যান্য সক্ষোচক ঔষধেব বাহু প্রয়োগে এবং তৎসহ বলকক ও পুষ্তিকক পথ্য দ্বাৰা চিকিৎসা করা কর্তব্য ।

শৈশব শ্বেতপ্রদর ।—শৈশবাবস্থায় যোনিকপাটের বৈশিষ্ট্যিক প্রস্টি হইতে ক্লেদ নিঃসরণ হইলে এই স্পীড়া জন্মে

লক্ষণ ।—চুলকানি, অস্থবোধ, যোনিতে বেদনা, তাহা হইতে দুৰ্গন্ধময় ক্লেদ নিঃসরণ, যোনিমধ্যে ক্ষত, সাধাবণতঃ ক্ষুধামান্দ্য, দৌর্বল্য, নিদ্রাভাব, গ্রীবাস্থ প্রস্টিসকল ক্ষীণ ও ক্ষতযুক্ত হওয়াই প্রধান লক্ষণ বলিয়া পবিগণিত ।

চিকিৎসা ।—ফটকিবির লোশন দ্বাৰা উপকার হইবাব সম্ভাবনা । যুহু বিবেচক ঔষধ প্রয়োগ করা নিতান্ত কর্তব্য স্থানিক বেদনা প্রবল হইলে সক্ষোচক ঔষধেব লোশন ব্যবহার্য । এইরূপে লোশন ব্যবহারেব ২ ৩ দিন পূর্বে গবম জলে পোস্ত চেঁড়ি সিদ্ধ কুরিয়া তাহার ফোমেণ্টেশন কবিত্তে হইবে ঔষধের মধ্যে কুইনাইন, কডলিভাব অয়েল, লৌহ ব্যবহার করা কর্তব্য । যাহাতে উত্তেজনা হইয়া বল করিত্তে পাবে, এরূপ পথ্য দিতে হইবে । এ বিষয়ে দুগ্ধ বিশেষ উপকারী । স্পীড়া অধিক কাল স্থায়ী হইলে সমুদ্রতীরে বাস এবং সমুদ্রজলে স্নান কবিলে উপকার দর্শে

গুত্রোশয়ের পাথরী ।—পুচ্ছের গুত্রশিলার ন্যায় ইহাব লক্ষণাদি

প্রায় তুল্য, অধিকন্তু জ্বীলোকেন্দ্র যজ্ঞণা অভ্যাসিক হইয়া থাকে । মূত্র-
মার্গ, পৃষ্ঠদেশ, এবং উরুদেশের উপরিভাগে বেদনা, চলিবার বা রক্তি-
ক্রিয়া করিবার সময় ঐ যজ্ঞণাব আধিক্য, কখন কখন মূত্রত্যাগকালে
অতিবিক্রমিত হইয়া যায় । প্রজ্ঞাযের সহিত প্রায়ই মূত্রময় মিউকাস্ বিদ্যমান
থাকে ।

চিকিৎসা ।—এই বোগ প্রতিকারের জন্ত অস্ত্রচিকিৎসা নিতান্ত
আবশ্যিক ; এজন্য এস্থলে তাহা লিখিত হইল না ।

ওরুসন্ অফ দি ভ্যাজাইনা বা যোনিদ্বার বোধ ।—এই
রোগ প্রতিকারের জন্ত অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন হয় । ঔষধ সেবনে
বিশেষ ফলদাত্ত হয় না ।

ম্যাকিউট্ ভ্যাজাইনাইটিস্ বা প্রবল যোনিপ্রদাহ ।—
এই ব্যাধিকে প্রদব বলা যাইতে পারে ।

লক্ষণ ।—যোনি কণ্ডুয়ন, মূত্রাশয়ের উত্তেজন, যোনিমধ্যে বেদনা,
উত্তাপ এবং তজ্জন্য অসুখ বোধ, প্রথমতঃ যোনিমধ্যস্থ মিউকাস্ সিক্রি-
সনের সম্প্রভা, এ অবস্থায় পরীক্ষা করিলে যোনি উষ্ণ, শুষ্ক, ক্ষীণ বোধ
হয় ; কখন বা উহা লালবর্ণ বক্তচিহ্নযুক্ত দেখা যায় । কিছু পবে
গবেষক ঋষ পুংস সংযত মিউকাস্ নির্গত হয়, এবং ঐ ক্রমে যতই বৃদ্ধি
হইতে থাকে, ততই বেদনা এবং অন্যান্য অসুখের হ্রাস হইতে দেখা যায় ।

চিকিৎসা ।—প্রথমতঃ গরম জলে কটি পর্যন্ত গম্ন করিয়া
রাখিবে । গরম জলে যোনি ইঞ্জেক্সন্ দিবে । কোষ্ঠ পবিত্কার জন্য
ক্যাষ্টর অয়েল খাওয়াইবে । রোগীকে স্থিতিভাবে শয়ান শয়ন
করাইয়া রাখিবে ।

পথ্য ।—শোত গম্য, অম্প সিদ্ধ তিস্ত, চা, এবং দুগ্ধ প্রভৃতি লঘু
আহার দিবে । নিম্নলিখিত ঔষধ যোনিমধ্যে প্রয়োগ করিতে হইবে ।

প্লাস্টি আই ওডাইডাই	...	৮০ গ্রোণ ।
এক্ট্রাক্ট বেলভোনা	...	২৪—৪০ গ্রোণ ।
বিউটিবাই ক্যাকাও	...	১ আং ।
ওলিয়াই ওলিভ	...	১১ ড্রাম ।

অল্প উত্তাপে দ্রব করিবে, তাহাব পরে একটী নল কিম্বা কাগিজ জড়াইয়া ৮ ইঞ্চ লম্বা এবং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেব ন্যায় মোটা করিয়া তাহাব মধ্যে ঔষধ দিয়া ৮টী পলিতা (পেসাবী) প্রস্তুত করিবে । ঐরূপ এক একটী পেসাবি রাত্রিকালে যোনিমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া রাখিবে ।

পুযোৎপত্তিব লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার করা কর্তব্য

য্যামোনিয়া কার্বনেটিস্	...	...	৩০ গ্রেণ ।
টীং য্যাকোনিটাই	...	...	৪০ বিন্দু ।
টীং সিল্কোনা কম্পাঃ	...	...	৫৫ ড্রাম ।
য্যাকোয়া মেম্ব পিপাবিটা	...	...	৭৫ আং ।
ছয় মাত্রা দিবসে তিনবারম			
এক্ট্রাক্ট ওপিঘাই	...	...	১—৩ গ্রেণ ।
ক্ট্রাক্ট হায়েসায়েরমাই	...	...	৩ গ্রেণ ।

এক একটী বটী প্রস্তুত করিয়া শয়নকালে প্রয়োগ করিবে ।

লিউকোরিয়া বা শ্বেতপ্রদর ।—লিউকোরিয়াব অর্থ শ্বেত-প্রদর । এই বোগে শ্বেতবর্ণ ক্লেদ নির্গত হওয়াই প্রকৃত লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

লক্ষণ — প্রায়ই ঐ ক্লেদেব পবিমান অধিক হয় পৃষ্ঠদেশ বেদনা, অল্প পবিগ্রমে প্রাপ্তি বোধ, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি আন্তঃসঙ্গিক লক্ষণ মধ্যে জানিতে হইবে ।

চিকিৎসা ।—শীতল এবং লবণাক্ত জলে কটি পর্যন্ত গগ্ন করিয়া রাখা কর্তব্য । তাহাব পরে নিম্নোক্ত দ্রব্যের পিচ্কাবী দিবে এজন্য সাইফন্ পিচ্কারী ব্যবহার করা কর্তব্য, নতুবা কাচের পিচ্কাবী দ্বারা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা পিচ্কারী দিবাব সময় এককালে অর্ধসেরের অধিক জল প্রবেশ না হইতে পায়, এবং অতিশয় ধীরে ধীরে উহা ব্যবহার করিতে হইবে

জীন্সি সল্ফ্যাটিস্	...	...	১ আং
য্যালিউমিনিস্ এক্সিক্কেটা	...	...	৫ আং

একত্রী মিশ্রিত কবিয়া উহ ব ছোট ১ চামচ এক পাইন্ট ঔষধের জলে মিশাইয়া ব্যবহার করিবে ।

পিচকারীদ্বারা উপকার না দর্শিলে নিম্নোক্ত পেসারী ব্যবহার করিতে দিবে (পেসাবি প্রস্রাবের নিয়ম উপবে বর্ণনা করা হইয়াছে ।)•

জিল্লি অক্সিডাই	...	...	৬০ গ্রোণ
এক্সট্রাক্ট বেলেডোনা	...	...	৪০ গ্রোণ ।
বিউটিবাই ক্যাকোয়া	...	...	১ আং
ওলিয়াই ওলিভ	...	...	১২ ডাম

আটটি পেসাবী প্রস্রাব কবিয়া রাত্রিকালে ব্যবহার করিতে দিবে ।

ভক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার করিবে

কুইনি সল্ফ্যাটস্	...	...	১২ গ্রোণ ।
ফেরি বেডাক্টাই	...	...	৩০ গ্রোণ ।
এক্সট্রাক্টাই স্যাকো নিটাই	...	...	১২ গ্রোণ ।
মিশ্রবিন	...	...	বটী প্রস্রাবের উপযুক্ত ।

বাবটী বটী প্রস্রাব কবিয়া মধ্যাহ্ন এবং রাত্রিকালীন ভোজনের এক ঘণ্টা পরে এক একটী খাইতে দিবে ।

পৃষ্ঠদেশে বেদনা থাকিলে বেলেডোনার পলস্ত্রাবা প্রয়োগ করিবে ।

পথ্য ।—পোর্ট, বিয়াব, অনমিশ্রিত ত্রাণ্ডি, লঘু বলকাবক খাদ্য ।
অন্যান্য উপায়ের মধ্যে বায়ুপরিবর্তন, সমুদ্রতীরে বাস ইত্যাদি কর্তব্য ।

স্যাংমেনোরিয়া বা রজস্রাব ।—এই রোগ তিন প্রকার যথা,—
এক প্রকার এই যে, তাহাতে একবারে বজঃনিঃসরণ হয় না । দ্বিতীয় প্রকার—রজঃনিঃসৃত হয় কিন্তু বহির্গত হইতে পারে না । তৃতীয় প্রকার—
প্রাভাবিক অবস্থায় ন্যায় বজঃনিঃসৃত হইয়া উহার অববোধ বা একবারে অভাব হয় ।

প্রথম প্রকার পীড়া প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না । স্ত্রীলোকের কোন পীড়া ক্রান্তি অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি হৃষ্ট পুষ্ট ও বর্জিত হইলেও যদি রজঃস্রাব না হয়, তবে তাহার কারণ অনুসন্ধান করা কর্তব্য ।

* দ্বিতীয় প্রকার পীড়া ।—ইহাতে রজঃ নিঃসৃত হইয়াও বহির্গত

হয় না। যোনি সম্পূর্ণ অস্থাবস্থায় থাকিলেও জরায়ুব মুখ বদ্ধ হওয়া প্রযুক্ত বজ্রোবজ্র উহার মধ্যে সঞ্চিত হইয়া গর্ভাবস্থার স্থায় জরায়ুব আয়তন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। একপা অবস্থায় বোগী প্রকৃত গর্ভবতী কি না তাহা সাবধানতার সহিত পরীক্ষা করিয়া তবে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য; কাবণ, কোন কোন স্থলে প্রদাহ এবং ক্ষতজন্ত জরায়ুব মুখ বদ্ধ হইতে পারে।

চিকিৎসা।—রোগের প্রকৃত কারণ অবধারিত হইলে জরায়ুব মধ্যস্থ রক্ত বাহিব করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য ইহাব জন্ত অস্ত্রচিকিৎসা আবশ্যিক।

তৃতীয় প্রকার পীড়া।—এই বোগ অতি সাধারণ প্রথমতঃ স্নাতাবিক অবস্থার স্থায় রজঃস্রাব হইয়া তাহাব পবে একবাবে বদ্ধ হইয়া যায়

কারণ।—গানসিক উদ্বেগ, স্নায়বিক আঘাত, জ্বর, অন্যান্য প্রবল পীড়া, নীতলতা, আর্দ্রতা এবং কোন প্রকাশ্য কারণ ব্যতীতও এককালে রজ বদ্ধ হইতে দেখা গিয়াছে। ক্ষয়কাশ বোগ জন্মিলে বজঃস্রাবের নানা প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে। অধিক দিবস স্রাবীসহবাস না থাকিলে, তাহার পব উহা ঘটিলেও ২।৩ মাস রজঃ বদ্ধ হইয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে।

চিকিৎসা।—নিভাবে রক্তাধিক্য হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য।

‘স্যাঁসিডাই নাইটি সাই ডিল্	...	...	১৫ ড্রাম।
স্পিরিটাস্ ইথারিস্ নাইট্রেট্‌সি	...	...	১৫ ড্রাম।
সাক্সি টেরাক্সিলাই	...	...	১৫ আং।
টীং সেনা	...	...	৪ আং।
ইন্ফিউজি জেন্সিয়ান কম্পঃ	...	...	৭৫ আং

ছয় মাত্রা দিবসে ২।৩ বার প্রয়োগ করা যাইতে পারে যত্নেব ক্রিয়ামান্য থাকিলে—

পডোফিলাই বেজিনা।	...	...	৬ গ্রোন।

একফোঁটী হায়েশায়েমাই .. ২৪ গ্রেণ ।
 পিলিউলি য্যালোজ এট মরঃ ... ৩০ গ্রেণ ।
 বাবটী বটী প্রস্তুত করিবে রানিকালে শয়নেব পূর্বে একটী বটী ৩ ৪
 দিন উপযুক্তপরি সেবন করাইবে ।

কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে—

ফেবি সল্ফ .. ২ গ্রেণ ।
 পিল্ য্যালো এট মরঃ ... ৩ গ্রেণ ।
 এক একটী বটী এইরূপ তিনটী বটী দিবসে সেবন করাইবে
 একফোঁটী আর্গট লিকুইডাই ... ৩ ডাম ।
 টীং সার্পেটেবি ... ৬ ডাম
 ডিকট্ট য্যালো কম্পাঃ ... ৬ আং ।
 প্রত্যহ প্রাতে ১ আং পরিমাণে সেবন করাইবে ।

ইলেক্ট্রিসিটি প্রয়োগে উপকার দর্শিতে পাবে । গব্য জলে কটি
 এরূপ পদাভিষেক কর্তব্য । লঘু এবং অন্ত্রভেজক পথ্য ব্যবস্থা করিবে

ডিস্মেনোরিয়া বা রজঃক্লহ ।—স্ত্রীলোকদিগের ঋতুকালে
 যে কষ্ট হয়, সেই কষ্টজনক রক্তস্রাবকে রজঃক্লহ বা ডিস্মেনোরিয়া
 কহে ডিস্মেনোবিয়া তিনপ্রকার যথা ;—স্নায়ুশূল, রক্তাধিক্য বা প্রদা-
 হিকা, এবং যান্ত্রিক ।

১। স্নায়ুশূল বা নিউর্যালজিক্ —যে সকল স্ত্রীলোক
 দুর্বলশরীরী বা তাহাদের এই পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, অথবা স্ত্রীলোক
 কখন গর্ভবতী না হইলে ১০ ১২ বৎসর বিনা ক্রমশে রক্তস্রাব হইবাব
 পরে এই পীড়া জন্মিতে পাবে ।

লক্ষণঃ ।—মাসিক রক্তস্রাবকালের ২১ দিন পূর্বে যাতনা আবর্ত
 হয় । উহার সহিত আলস্য, শিবঃপীড়া, ত্রিকান্ধি এবং উদরের নিম্ন-
 দেশে বেদনা উক্ত অত্যন্তবে ও উপবে বেদনামুভব, উদরপ্রাচীর বেদনা-
 যুক্ত এবং বস্তুদেশ ভার ও টান বোধ হয় । তাহাতে বেদনার সন্মান্য
 হ্রাস হইলেও পুনরায় বৃদ্ধি হইয়া কষ্ট অত্যধিক বৃদ্ধি হয় কোন কোন

স্থলে ইহার সহিত হিষ্টিবিয়া, শিবঃপীড়, কোষ্ঠবদ্ধ উদবাপ্তান এবং
মানসিক নিস্তেজকতা প্রকাশিত হইতে দেখা যায়

চিকিৎসা।—বেদনা নিবারণ জন্য অর্দ্ধঘণ্টাকাল বোগীব কটি-
দেশ পর্য্যন্ত গবম জলে মগ্ন করিয়া বাখা কর্তব্য। ঐ জলেব সহিত ১
আউন্স পবিমাণে কার্বনেট অফ সোডা এবং পোস্ত চেঁড়িব একফ্রাক্ট
মিশ্রিত কবিলে অধিক উপকার দর্শে। উহার পবে অক্সাইড অফ জিঙ্ক *
এবং বেলেডোনার পেসারী ব্যবহারে বিশেষ ফললাভ করা যায়।
অতিশয় বেদনা বৃদ্ধি হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে

টীং ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা	...	২০ বিন্দু।
স্পিবিট জুনিপাব	...	৩০ বিন্দু।
স্পিবিট ইথাব	...	৩০ বিন্দু।
• টিং য়াকোনাইট	...	১০ বিন্দু।
গিউসিলেজ্	...	১৫ আং।

একমাত্র। আবশ্যকমত প্রয়োগ করিবে

ছই ঋতুকালের মধ্যে সাধাবঃ স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনার্থ নিম্নোক্ত ঔষধ
প্রয়োগ করা কর্তব্য

য়ানি ডাই ফস্ফ বিসাই ডাঃ	...	১৫ ড্রাম।
টিং য়াকোনাইটাই	.	১ ড্রাম
টিং সিল্কোনা কম্পঃ	.	১ আং।
ইন্ফিউজি অর্যান্সিয়াই	..	৭১ আং।

ছয় মাত্রা দিবসে তিনবার অথবা—

বিবিবিয়া সল্ফ্যাটিস্	...	৩০ গ্রেন।
য়ানি ডাই সল্ফিউবিসাই য়াঃম্যাটিসাই	...	৪০ বিন্দু।
সিরাপি অব্যান্সিয়াই	...	৭১ আং

ছয় মাত্রা দিবসে তিন বার

* জিঙ্ক ৬০ গ্রেন, ৪০ গ্রেন বেলেডে না, অলিভ অয়েলেব সহিত
মিশাইয়া রটী প্রস্তুত করিবে। প্রস্তুত করিবাব প্রণালী পূর্বে নিখিত
হইয়াছে।

কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এবণ তৈল দিবে । কফি, চাঁ, মদিবা একবাবে নিষিদ্ধ দুগ্ধ, ডিম্ব, মৎস্য, মাখন, মাংস, কটী প্রভৃতি ব্যবস্থা কবু আইতে পাবে বিবাহিতা জীলোকেরা স্বামীসহবাস পবিত্যাগ কবিবেন

রক্তাধিক বা প্রদাহজন্য ডিস্‌মেনোরিয়া —এই বোগ প্রোঢ়াবস্থায় অধিক দেখিতে পাওয়া যায়

লক্ষণ ।—কতুকালীন প্রবেশ নির্দিষ্ট সময়ে ৪, ৫ দিবস পূর্বে পৃষ্ঠদেশে বেদনা, আলস্যবোধ, অস্থিরতা, বস্তিদেশ ভাববোধ, ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশের পর বক্তৃত্তাব হইতে থাকে দুই তিন দিবস উহাব পরিমাণ অল্প থাকায় কষ্টের ততট হ্রাস হয় না, তাহাব পবে অধিক হইলে যজ্ঞণাব সম্পূর্ণ হ্রাস হইয়া আইসে । গাণ্ড্যে মধ্য সূত্র্যত বক্তৃত্তাও ও জবাযুব অভ্যন্তবস্থ বিলীখণ্ডবাহিব হইতে থাকে তৎকালে বেদনাব আরও আধিক্য হয় যোনিমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ কবতঃ পরীক্ষা কবিলে জবাযুব প্রীবাদেশ বেদনায়ুক্ত, বক্তৃত্তাধিক্য এবং ক্ষীত বোধ হয় । সচবাচব শ্বেতপ্রদবের গ্ৰায অধিক পরিমাণে নির্ঘাসবৎ ক্লদ দেখিতে পাওয়া যায় ।

চিকিৎসা ।—স্রায়ুশূল ডিস্‌মেনোবিয়ায যজ্ঞণা নিবাবণ জন্ত যে সকল ঔষধ লিখিত হইয়াছে, ইহাতেও সেই সকল ঔষধ প্রয়োগে উপকার দর্শে যদি তাহাতে উপশম না হয়, তবে জবাযুব মুখে ২ ৩ টা জেঁক বসাইয়া দিলে নিশ্চয় উপকার দর্শিবে দুই ঋতুব মধ্যবর্তী সময়ে যাছাতে একবাবে বোগের হস্ত হইতে বোগীকে মুক্ত কবিতে পারা যায়, তাছার ব্যবস্থা কবা কর্তব্য তজ্জন্ত উত্তেজক আছাব পবিত্যাগ কবাইয়া লঘু আছাব দিবে নৃত্য, পঞ্চভ্রমণ, অশ্বাবোহণ এককালে পবিত্যাগ কবিতে হইবে । নির্মলবাযুসঞ্চালিত গৃহে বোগীকে বস কবিবাব উপদেশ দিবে এবং নিম্নোক্ত প্রকাবে পেসাবী প্রস্তুত কবিয প্রতি রাত্রে এক একটি ব্যবহাব করাইবে

প্লাসাই আইওডিডাই

একটীক্ট বেল্লোডোনা

... ৮০ গ্রো

... ৩০ গ্রো ।

স্বাণোলোপ্যাথিকে জ্বরোগ চিকিৎসা। ৫৮৫

অলিভ অয়েল এবং কোকা ... উপযুক্ত পাবিমাণ।
আটটি পোশাবী প্রস্তুত করিবে

যান্ত্রিক ডিস্‌মেনোরিয়ান—জ্বরায়ুব গ্রীবার উর্দ্ধদেশের সংকোচ, সমস্ত গ্রীবাব নলী অপ্রশস্ততা, বায়ু বাহ্যমুখেরও ঐ অবস্থা, বা জ্বরায়ুব কোন কোন টিউমার পশ্চাৎ বা সম্মুখদিকে উহার স্থানজটতা প্রভৃতি কাবণে প্রায়ই এই পীড়া হইতে দেখা যায়

লক্ষণ—জ্বরায়ুব বাহ্য ও আভ্যন্তরিক মুখের সংকোচ ও গ্রীবা-দেশের অপ্রশস্ততা জন্ম যে পীড়া, তাহাই অধিক কষ্টকর, জ্বীলোকেরা বক্ষী। হইবাব ইহাই প্রধান কাবণ—কিন্তু এই বোগ চিকিৎসা দ্বারা সহজে এবং শীঘ্র আরাম হইয়া থাকে জ্বরায়ুব গ্রীবানলী প্রশস্ত হইলে বজোরক্ত নির্গত হইয়াও উৎকৃষ্টরূপে বহির্গত হইতে পাবে না; এজন্য রক্তের পাবিমাণ অত্যুচ্চ, কিন্তু কোন কোন স্থানে জ্বরায়ুব মুখ দিয়া বিন্দু বিন্দু বক্ত নির্গত না হইয়া প্রসববেদনাব ন্যায় অতি যন্ত্রণার সহিত জলপ্রপাতেব ন্যায় অধিক বক্তপ্রাব হইয়া কিছুকাল উহা বন্ধ থাকে। তাহাব সঙ্গে পৃষ্ঠদেশে দুঃস্থ বেদনা মুত্রমূষের উত্তেজন, অণ্ডাধবের উপর বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়

চিকিৎসা।—ডাক্তার সিংসন ১৮৪৭ সালে হিফ্টেরোটম নামে এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া উহা দ্বারা গ্রীবানলীব অভ্যন্তর প্রদেশে দুই ধাব কর্ত্তন করিবার আদেশ করেন ইহা দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায় এরূপ অনেকের বিশ্বাস অন্য প্রকার অস্ত্রচিকিৎসাও এই রোগে যুক্তিযুক্ত, কিন্তু অনেকে তাহাব বিবোধী।

মিনরেজিয়া বা রক্তমাধিক্য।—বজোরক্তেব আধিক্য হইলেই উহাকে মিনরেজিয়া কহা যায়।

কারণ।—যন যন সন্তানোৎপাদন, অধিক কাল সন্তানকে স্তনপান করান, অতিশয় এবং অসম্পূর্ণ বতক্রিয়া, এবং প্রসব হইবার পর অধিক রক্তপ্রাব।

লক্ষণ—দৌর্বল্য, আলস্য, উদ্যমরাহিত্য, আশ্রিবোধ, কটী এবং

উৰ্দ্ধদেশে বেদনা, মুখমণ্ডল বিবর্ণ, শিরঃশীতা, কর্ণে শব্দ, এবং কখন কখন মূচ্ছা । বলা বাহুল্য যে, অধিক রক্তস্রাবই ইহাৰ প্রধান লক্ষণ ।

চিকিৎসা — আভ্যন্তরিক প্রয়োগ, —

ক্যালসিডাই গ্যালিসাই	...	...	১৫—২৫ গ্রেন ।
ক্যালসিডাই সল্‌ফিউরিসাই ক্যালবোঃ	...	...	১৫—২০ বিস্ক ।
টীং সিনেমোনাই	...	...	১৫ ড্রাম ।
পবিত্র জল	...	...	১৫ আং ।

এক মাট্রা । প্রতি ৪ ঘণ্টান্তর রক্তবন্ধ না হওয়া পর্যন্ত খাওয়াইবে ।

বাহ্য প্রয়োগ — যোনিমধ্যে ববফখণ্ড স্থাপন, ট্যানিক ক্যালসি-ডের পিচকাবী, বৈদ্যুতিক প্রয়োগ, ইত্যাদি ।

বৈদ্যকে স্ত্রীরোগ চিকিৎসা ।

প্রদর রোগের কারণ ।—বিক্রম অর্থাৎ দেশকালমাত্রাদিবিক্রম দ্রব্য ভোজন, ভুক্তদ্রব্য পবিপাক হইতে না হইতে পুনঃ ভোজন, অজীর্ণ বোগ, মদ্যপান, গর্ভপাত, অতি মৈথুন, পদভ্রজে ব অশয়ানাতিতে অতি-শয় ভ্রমণ, শোক, অভিধাত, ভাববহন, উপবাসান্নিজনিত ধাতুক্ষয়, দিবানিত্রা প্রভৃতি কারণে প্রদর উৎপন্ন হয় ।

প্রদরের আকার ।—শরীর বেদনা, রক্তস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ প্রায় সকল প্রকার প্রদর বোগেই লক্ষিত হয় ।

প্রদরের উপদ্রব ।—অতি রুদ্ধি প্রাপ্ত প্রদর দুর্বলতা, ভ্রম, মূচ্ছা, মোহ, তন্দ্রা, প্রলাপ ভ্রম, জ্বালা ও শরীর পাণ্ডুবর্ণ হয় ।

বাতজ প্রদরের লক্ষণ ।—ইহাতে রক্তবর্ণ, ফেণাযুক্ত, কখন এবং মাংসদৌত জলেব ত্রায় বক্ত অল্প পবিমাণে পুনঃ পুনঃ নিসৃত হয় এবং নির্গত হইবার সময় সূচীবোধনবৎ বেদনা হয় ।

চিকিৎসা ।—দাওহবিজা, রসোত, বাসক মূলেব ছাল, মুখা, চিরাতা, বেলশুঠ, ভেলার মুঠী মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ, সেব, শেষ ৮ পোয়া । প্রক্ষেপ—মধু । ইহার নাম “দার্ক্যাদি পাচন” ।

অশোকযুত ।—গব্য যুত ৪ সেব । কাথ জবা—অশোকমূলের ছাল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের জীরা ২ সেব, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের । তুলোলদক ৪ সের, ছাগছক ৪ সেব, কেশুরিয়াব রস ৪ সের কল্ক—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী, যষ্টিমধু, পিয়ালসাব বীজ, পাণ্ডফল, বসোত, যষ্টিমধু, অশোকমূল, জাফা, শতমূলী, খুদে নটেব মূল, প্রত্যেক ৪ তোলা । পাকান্তে শীতল হইলে ১ সেব চিনি মিশাইবে

পিত্তজ প্রদরের লক্ষণ । ইহাতে পীত, নীল অথবা কৃষ্ণবর্ণ উষ্ণ রক্ত নিঃসৃত হয় এবং অঙ্গ অঙ্গ বেদনা থাকে

চিকিৎসা ।—রক্তচন্দন, জটাশংসী, লোধ, বেণার মূল, পদ্মকেশব, নাগেশ্বর, বেলশুঠ, মুখা, চিনি, বালা, আকনাতি, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, শুষ্ঠী, আতইচ, ধাইফুল, বসোত, আঁকেশী, জামেব আঁটি, মোচরস, নীলোৎপল, ববাকান্তা, ছোট এলাইচ, দাড়িমফলের ছাল, প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, একত্র মাড়িবে মাত্রা ৪ মাসা অনুপান মধু ও তুলোলদক । ইহার নাম “চন্দনাদি চূর্ণ”

সিত কল্যানক যুত ।—যুত ৪ সেব গব্যছক ১৬ সেব কল্ক—কুমুদ পুষ্প, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, গোধূম, দাউদখানি, মুগানি, ক্ষীরকাঁকলা, গাভাবী ফল, যষ্টিমধু, বেড়েলামূল, গোকুর চাকুল্যামূল, উৎপল, তালের মাতি, ভুগিকুম্বাও, শতমূলী, শালপ নী, জীবা, জিফলা, গোসক বা কাঁকড় বীজ, কাঁচাকলা, প্রত্যেক ৪ তোলা । পাকজন্য জল ৮ সের ।

কফজ প্রদরের লক্ষণ ।—ইহাতে পিচ্ছিল আমগন্ধি পাণ্ডুবর্ণ অথবা মাংসর্ধোজলের ন্যায় ভাব হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—পাবা, গন্ধক, বঙ্গ, রূপা, খর্ব, কড়ি ভস্ম প্রত্যেক ১০ তোলা, রৌহ ৩ তোলা, সমুদায় এক দিন যতকুমাবীর রসে মাড়িয়া ১ রতি ও মগন বঁটা প্রস্তুত করিবে ইহার নাম “প্রাকরাস্তক বসু”

শিলাজতু বটী —পাবা ১ পল, গন্ধক ১ পল, বক্তোৎপল পাত্রেব ও কুড়চিছালেব রসে ২ দিন মাড়িয়া তাহার সহিত শিলাজতু ৮ পল, চিনি ৮ পল, বংশলোচন, পিপ্পলী, আমলা, কঁকড়াশুঙ্গী, কণ্টকারী ফল, কণ্টকারী ব মূল, গুড়ত্বক, ভেজপত্র, এলাইচ, প্রত্যেক ১ পল । মধু ১ পলেব সহিত মাড়িয়া বটী প্রস্তুত কবিবে । মাত্রা ১ গামা । অল্পপান দাড়িমের রস

সান্নিপাত্তিক প্রদবেব লক্ষণ ।—ইহাতে যত, মধু, হরিতাল প্রভৃতি মিশ্রিত বর্ণের ন্যায়, দুর্গন্ধ, মেহযুক্ত রক্তস্রাব ইয়; ইহা অসাধ্য ।

চিকিৎসা ।—যত ৪ সেব কাথদ্রব্য—বট, অশ্বখ, অজুর্ন, গুলঞ্চ, বাস্ক, কটুকী, পাকুড়, জাম, পিয়ার, সোণা, যজ্ঞদ্রুম, মউগ, বেড়েলা, বেত, গাব, কদম, বক্তবোড়া, শাল, ওত্যোকেশ ছাল ২ পল, জল ৬৪ সেব, শেষ ১৬ সেব । শ নিধানা ২ সেব, জল ১৬ সেব, শেষ ৪ সেব ; আমলকী রস ৪ সেব কল্ক—যষ্টিমধু, মউলপুষ্প, পিও খজুর্ন, দাকহুবিদ্রা, জীবন্তী ফল, গাভাদী ফল, কঁকলা, ক্ষীর কঁকলা, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, বসোত, অনন্ত মূল, প্রত্যেক ৬ তোলা । ইহাব নাম “ন্যাগ্রোধাদা যত ”

প্রদরারি লৌহ ।—কুড়চিছাল ১২ ০ সেব, পাকার্থ জল ৬৪ সেব, শেষ ৮ সেব । এই কাথ ছাঁকিয়া পুনরায় পাকজন্য চাপাইবে ; ঘনীভূত হইলে বারাক্রান্ত, মোচরস, আকনাদি, বেগুণ, মুখা, ধাইফুল, আতাইচ, অত্র, মোহ, প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল । মাত্রা ১ তোলা । অল্পপান কুশমূল বাটিয়া জলে গুলিয়া সেই জল ।

প্রদরের অসাধ্য লক্ষণ ।—সর্বদা রক্তস্রাব, ক্ষুধা, জ্বালা, দুর্বলতা ও রক্তের অপ্ততা, এই সকল লক্ষণাক্রান্ত প্রদর অসাধ্য ।

বৈদ্যকে গভিনী চিকিৎসা ।

গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের যে সমস্ত পীড়া হয়, তাহা চিকিৎসা নিম্নে লিখিত হইল

জ্বরচিকিৎসা ।—গর্ভাবস্থায় জ্বর হইলে, এবণ্ডমূল, গুলঞ্চ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, দেবদারু, পদ্মকান্ত ইহাদেব কাথ পান করিতে দিবে ।

বাসকছাল, গুলঞ্চ, কণ্টকারী, মিলিত ২ তোলা । পাকজন্য জল ১০
সের, শেষ ৮০ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু এই কাথ পান করিলে, গর্ভিণীর
জ্বর ভাল হয়

শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুব, মিলিত ২ তোলা ।
জল দেড় পোয়া, দুগ্ধ ৮০ পোয়া মিশাইয়া ইহাতে পাক করিবে, শেষ ৮০
পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিতে দিবে ইহা গর্ভিণীর জ্বরে
প্রয়োজ্য ।

গর্ভবিনাস রস ।—পারা, গন্ধক ও তুঁতে প্রত্যেক সমভাগ
গোড়ালেবু বসে ৩ দিন মাড়িয়া ত্রিকটুব কাথে ৩ বার ভাবনা দিয়া ২
রতি প্রমাণ বটী করিবে ইহা সেবনে গর্ভিণীর জ্বর প্রশমিত হয় ।

গর্ভগীষ্মবল্লী রস ।—পারা, গন্ধক, স্বর্ণ, লৌহ, বোপ্যামাক্ষিক,
হরিতাল, বঙ্গ, অত্র প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ব্রহ্মী, বাসক, ভৃঙ্গরাজ,
ক্ষেতপাপড়া ও দশমূলের বসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ
বটী করিবে ।

জ্বরাস্তিসার চিকিৎসা ।—লবঙ্গ, সোহাগার খই, মুখা, ধাইফুল,
বেণুগুঠ, ধাত্রা, জামফল, শ্বেত মুনা, শুল্ফা, দাড়িম ফলের ছাল, জীবা,
সৈন্দব, মোচবস, নীলমুদিমূল, রমোত, অত্র, বঙ্গ, ববাকান্তা, রক্তচন্দন
শুঠী, আতইচ, কঁকড়াশুঙ্গী, খদির, বালা, প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ মিশ্রিত
করিবে । অম্লপান ছাগদুগ্ধ ইহাব নাম “লবঙ্গাদি চূর্ণ ।”

ইন্দুশেখর ।—শিলাজতু, অত্র, রসমিন্দুব, প্রবাল, লৌহ, স্বর্ণ-
মাক্ষিক, হরিতাল, প্রত্যেক সমভাগ একত্রে মাড়িয়া ভৃঙ্গরাজ, অর্জুনছাল,
নিসিন্দা, বাসক, স্থলপদ্ম ও কুড়িচিছালেব বসে ভাবনা দিয়া মটবপ্রমাণ
বটী করিবে

গর্ভশূল চিকিৎসা ।—তৃতীর মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে,
কঁকলা, ক্ষবী কঁকলা, আমলকী, একত্রে পেষণ করিয়া উষ্ণ জলের
সহিত গর্ভিণীকে পান করিতে দিবে ; অথবা পীপা, কুড়, শালুক, চিনির
জলে পেষণ করিয়া পান করিতে দিবে । ক্ষুধিত হইলে দুগ্ধের সহিত
শালি ধাত্রেব তুণ্ডল ভোজন করিতে দিবে

উৎপল, শালুক, কণ্টকারী, গোস্কুব, অথবা গোস্কুব, কণ্টকারী, বালা, নীলোৎপল ছন্ধেব সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে চতুর্থমাসোৎপন্ন গর্ভশূল প্রশমিত হয় ।

পঞ্চমমাসোৎপন্ন বেদনায় নীলোৎপল ও ক্ষীবকাকলা পেষণ করিয়া ছন্ধ, ঘৃত ও মধুব সহিত পান করিতে দিবে, বা নীলোৎপল এবং ক্ষীবকাকলা সমভাগে লইয়া পেষণ করতঃ শীতল জলে আলোড়ন করিয়া পান করাইবে।

টাবা লেবুব বীজ, প্রয়ঙ্গু, চন্দন এবং উৎপল ছন্ধেব সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে, কিম্বা পিষালবীজ, জাফা, খই চূর্ণ, স্নানীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে । ইহাতে ষষ্ঠমাসোৎপন্ন বেদনা নিবারণ হয় ।

শতমূলী ও পদ্মমূল বাটিয়া ছন্ধেব সহিত পান করাইবে বা কয়েতবেল, স্পারিমূল, খই ও চিনি শীতল জলের সহিত সেবন করিলে সপ্তমমাসোৎপন্ন বেদনা প্রশমিত হয় ।

• তুলসীদলের সহিত ধাত্রী বাটিয়া স্নানীতল জলে পলাশ পত্র বাটিয়া পান করিলে অষ্টম মাসেব বেদনা ভাল হয় ।

বৈদ্যকে সূতিকারোগ চিকিৎসা ।

সূতিকারোগের লক্ষণ ।—এসবেব পাবে দুঃখিত বায়ু প্রসূতমান রক্ত রোধ করিয়ে প্রসূতির মস্তক, হৃদয় ও বস্তি স্থানে যে বেদনা উৎপাদন কবে, তাহাকে মকন্দশূল কহে ।

সূতিকারোগের সামান্য লক্ষণ ।—শরীরবেদনা, জ্বর, কম্প, পিপাসা, শরীরের ওকর্তা, শোথ, উদরে বেদন, অতিসার এই সমস্ত লক্ষণগুলি সকল একাবস্থিতিকারোগেই ঘটয়া থাকে ।

সূতিকার কারণ ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ।—বিকৃষ্টাচারে দুঃখিতার ভোজন, অল্প বা অধিক পরিমাণে আহারীয় দ্রব্য ভক্ষণ ও অজীর্ণ

অব্য ভোজনে স্মৃতিকা বোগ জন্মিয়া থাকে স্মৃতিকাব অর্থাৎ প্রসূতিব যে সমস্ত বোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে স্মৃতিকা বোগ বলে ।

চিকিৎসা —শালপা নিচাকুলে বৃহতী কণ্টকাবী, গোক্ষুব, নীল-ঝাঁটী মূল, গন্ধভাঙ্গলে মূল, শুষ্ঠী, গুলঞ্চ, মুখা, মিলিত ২ তোলা, জল ০ সেব, শেষ ৮০ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু ০ তোলা এই পান করিলে প্রসূতিব দাহযুক্ত জ্বর নিবারণ হয় ইহাব নাম “স্মৃতিকা দশমূল ”

ক্ষুদ্রপ্রয়োগ ।—ঝাঁটীমূল, মুখা, গুলঞ্চ, গন্ধভাঙ্গলে, শুষ্ঠী, বালা, মিলিত ২ তোলা, জল ০ সেব, শেষ ৮০ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু ০ তোলা এই কাথ পান করিলে প্রসূতিব বেদনা ও জ্বর প্রশমিত হয়

ঝাঁটী ২ তোলা, জল ০ সেব, শেষ ৮০ পোয়া প্রক্ষেপ পিপ্পলী চূর্ণ ১ মাসা ইহা পান করিলে প্রসূতিব অগ্নি বৃদ্ধি ও জ্বাদি নষ্ট হয়

• সৌভাগ্য: শুষ্ঠী —কেশুব, পানিকল, পদ্মবীজ, মুখা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, জায়ফল, জয়ন্তী, লবঙ্গ, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, গুড়ত্বক, ঞ্ঠী, ধাইফুল, এলাইচ, শুল্কা, ধন্য, গজপিপ্পলী, মরিচ, শতমূলী, প্রত্যেক ৪ তোলা, শুষ্ঠী চূর্ণ ১ সেব, মিছবী ৩০ পল, যত ১ সেব, গব্যদুগ্ধ ৮ সেব । যথানিয়মে পাক করিবে । মাত্রা ১ তোলা ইহা সেবনে প্রসূতির অবসংযুক্ত অতিসার এবং গ্রহণী নষ্ট হয়

জীরকাদ্য ঘোদক —জীরা ৮ পল, শুষ্ঠী ৩ পল, ধন্য ৩ পল, শুল্কা, যমানী, কৃষ্ণজীবা, প্রত্যেক ১ পল, দুগ্ধ ৮ সেব, চিনি ৬ ০ সেব, যত ৮ পল, যত্ন অগ্নিতে পাক করিবে প্রক্ষেপ ত্রিকটু, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, চই, মুখা, চিতামূল, লবঙ্গ, প্রত্যেক ১ পল মাত্রা ৫ মাসা ইহা সেবনে স্মৃতিকা ও গ্রহণী রোগ নষ্ট হইয়া অগ্নি বৃদ্ধি করে।

স্মৃতিকাহর রস ।—হিঙ্গুল, হংবিতাল, শঙ্খভস্ম, লৌহ, নৃপর, ধুতুবাবীজ, যবক্ষার, সোহাগাঁর খই, সমুদায় সমানভাগে লইয়া বহেড়াব কাথে ভাবনা দিয়া মটরপ্রমাণ বটী করিবে যথাযোগ্য অম্লপানের সহিত সেব্য । ইহা সেবনে সমস্ত স্মৃতিকা রোগ নষ্ট হয়

স্মৃতিকারি রস ।—পাবা, গন্ধক, অত্র, তাম্র, সমুভাগে থুলকুড়ির

বগে মাড়িয়া ছায়াশুক করিয়া ষট্‌প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবন করিলে স্ফটিকারোগ, জ্বর, তৃষ্ণা, অকচি, শোণ নষ্ট হয় ।

বায়ুনহাটী, দেবদাক, বচ, আকনাদি ও আতাইচ গিলিত ২ তোলা, জল ০ সেব, শেষ ৮০ পোয় । ইহা পান করিলে স্তন্য বৃদ্ধি হয় ।

স্তন্য বৃদ্ধিজন্মা হরিদা বা বচের কাথ পান করিতে দিবে

বাখাল শশাব মূল বা হবিজ ও ধুতুবা বাটিয়া প্রলেপ দিলে স্তনের শোথ শুক হয় ।

কুচ্ছ সাধ্য লক্ষণ — দুর্বল প্রস্থিতিব কফ ও নাসুজনিত রোগ সত্ত্বে তন্দ্রা, অকচি, কফজ্বর, জ্বর, অতীসার, শোথ, শূলবোগ, মল মূত্র বোধ ও দুর্বলতা জন্মিলে ঐ সমস্ত বোগ বহু যত্নে প্রশমিত হইয়া থাকে

হোমিওপ্যাথিকে স্ত্রীরোগ চিকিৎসা ।

স্ত্রীলোকদিগের প্রদব উপদংশ সমস্ত নহে । স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ে মৈথুনিক ঝিল্লী অধিক পবিমাণে অবস্থিতি কবে, এজন্য তাহাদিগের সাধারণতঃ অধিক পবিমাণে প্রমেহ-প্রাব হয় তাহাদিগের মূত্রপ্রণালী খর্ব ও প্রশস্ত, এজন্য ইহা পুরুষদিগের ন্যায় তত কষ্টকর নহে । মূত্রপ্রণালী মেহপ্রাবে মূল হইলে, মূত্রদ্বাবে চুলকানিয়ুক্ত বেদনা ও ফোলা থাকে, প্রস্তাবকালীন দন্ধবৎ জ্বালা কবে ; ইহাব প্রদাহে বাহুজমনে-ন্দ্রিয় ও তৎ ওষ্ঠদ্বয় পর্য্যন্ত দাহযুক্ত কর্বে । মূত্রদ্বাবে কয়েক ফোটা পুঁয় এবং কাপড়ে জর্দাব আভাযুক্ত সবুজ দাগ দেখা যায় । জননেন্দ্রিয়ে অঙ্গুলি প্রবেশ এবং উপরের দিক হইতে সম্মুখের দিকে হাত দিয়া চাপিলেও ঐ প্রকার পুঁয় নির্গত হয় । জননেন্দ্রিয়ের ওষ্ঠদ্বয় আক্রান্ত হইলে পুরুষদিগের নির্দাববর্কিব প্রদাহেব ন্যায় প্রদাহিত হয় ; ইহাব মধ্যবর্তী দিক আটা নীচাভাযুক্ত লাল উজ্জ্বল ক্ষত দ্বারা আবৃত ও ফুলিয়া কদাকার হয় । রক্ত ওষ্ঠ, অত্যন্ত অধিক ভাবি, কাশ আভাযুক্ত, লাল দুই

হয় প্রদাহ অধিক হইলে শয্যাও উষ্ণতা অসহনীয় হইয়া উঠে জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়, বাত্রিতে নিদ্রা হয় না।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় প্রদাহ। যদিও লেবিয়া আক্রান্ত হইয়াই সাধারণতঃ বাহ্য প্রমেহ উপস্থিত হয়, তথাপি বাহ্য প্রমেহ অপেক্ষা স্ত্রী-লোকদিগেব জননেন্দ্রিয়প্রদাহ সচরাচর অধিক হইতে দেখা যায় যখন ইহা প্রবল হয়, তখন জননেন্দ্রিয়ে অত্যন্ত উত্তাপ অনুভূত হয় যদি জননেন্দ্রিয়েব বীৰ্য্যধাবণাবরণ আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে অঙ্গুলি দ্বারা পরীক্ষা করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটীবৎ অনুভূত হয়, লৈঙ্গিক ঝিল্লী স্বাভাবিক হইতে অধিকতর বোধ হইয়া লেগ্নাশূন্য হয় এবং ক্ষুদ্র গুটীবৎ লাল মাংস-বদ্ধ অনুভূত হয় রক্তমিশ্রিত পুঁষ কটুতা প্রযুক্ত কাপড়ে জরদ দাগ লাগে এবং জবাযু পর্য্যন্ত প্রদাহ বৃদ্ধি হইলে রোগ দুর্দম্য হইয়া পড়ে; তৎপরে ঋতুক্রীড়াব বৈলক্ষণ্য হইয়া অতিশয় রক্তস্রাব হইতে থাকে। গর্ভবতী স্ত্রীলোকেব গর্ভপাত হইবার সম্ভাবনা।

চিকিৎসা।—মুণ্ডমার্গ প্রদাহে “কেনাবিস্” এবং “থুজ” উৎকৃষ্ট ঔষধ। বহির্গোনি প্রদাহে “ব্রাইওনিয়া,” “মার্ক,” “সেবাইন,” ও “থুজা” যোনিপ্রদাহে “বেলে,” “ক্রিয়োজোট,” “পলস্” ও “সেবাইনা” জবাযু প্রদাহে “একোনাইট,” “ক্যান্থ,” “ইগ্নি,” “ফস্” ও গ্লিটিনা।

এ আবকালীন জ্বালা ও অতিশয় উত্তাপযুক্ত প্রদাহেব লক্ষণ থাকিলে “একোনাইট” ব্যবহার করিবে।

জ্বালাযুক্ত স্রাব, দাঁড়াইলে স্রাব পড়া ও দুর্গন্ধময় পদার্থ নির্গত হইলে কিম্বা আক্রান্তভাগ আবৃত্তিম থাকিলে “আর্শেনিক” দিতে হইবে

আক্রান্ত স্থানে গুটী উৎপন্ন কিম্বা প্রসবকালীন বেদনা উপস্থিত হইলে “অরমে” ব্যবহার করিবে

যোনি হইতে শ্বেত স্রাব নিসৃত হইলে ও তৎসঙ্গে যোনিমধ্যে, যোনিব দ্বাবে, উপরি ভাগে শীঘ্র স্ফটিকবৎ কিম্বা তলপেট হইতে সমস্ত পদার্থ বহির্গত হইবে একপা ভাবে প্রবল বেগে টেনে ধরা বেদনা উপস্থিত হইলে “বেলেডোনা” ব্যবস্থের

স্রাব ক্রাস হইয়া পুনরায় বৃদ্ধি হইলে ও তৎসঙ্গে লেবিয়া দীত ও

কখন কখন ক্ষীত স্থানে কৃষ্ণবর্ণ শক্ত গুটিকা উৎপন্ন হইলে “ব্রাইওনিয়া”
উৎকৃষ্ট ঔষধ

প্রজ্বাবকালীন গণবিষাব মধ্যে বেদনা, পুষ্ণদ্রাণা মুত্রমার্গ বদ্ধ, যোনি
ক্ষীত ও প্রবল বমনেচ্ছা থাকিলে “কেনাবিস্” বিশেষ উপকার কবে ।

প্রচুব ক্ষীণকাবী অ ব, মুত্রগ্রস্থিতে বেদনা, পেলবিসে কষ্টকর যাতনা
অমুভব, অবসন্নতা, মুত্রী পীত ও মলিন হইলে “ফ্যান্সাবিস্” বিশেষ
ফলদায়ক

যোনি হইতে হরিতবর্ণ জালাযুক্ত আব কিম্বা যেন ক্ষতযুক্ত হইয়াছে
একপ বাঁজাল টন্টনে বেদনাযুক্ত জলীয় আব থাকিলে “ক্যামোমিলা”
বিশেষ উপকারী ।

জবাযুতে অতিশয় খিলধবা বেদনা, বমণীদিগেব জননেদ্রিয়ে িগেব
আয় যে ক্রিটরিস্, ামক গ্রন্থী অ ছে, তাহা ক্ষীত হইয়া বিমুক্ত পুষ্ণশাক
হইলে “ইগ্নেসিয়া” ব্যবহার কবিবে

রক্ত ঔষৎ লাল, সবুজ বা সবুজযুক্ত সাদা দুর্গন্ধময় আব, বিশেষ প্রাতে
দুর্গন্ধ থাকিলে অথবা চুলকানি এবং বেদনা সহকারে আব, এবং পায়েব
দুর্বলতা থাকিলে “ক্রিয়োজোটাম্” ব্যবহার কবিবে ।

পুষ্ণ, ক্লেদ, শ্লেষ্মা অথবা সবুজ বর্ণ পুষ্ণবৎ আব যাহা সহজে নির্গত
না হইয়া জননেদ্রিয় মধ্যে অতিশয় বট্ কট বেদনা অনুভূত হইলে
“মাকুরিয়স্” ব্যবহেয়

জননেদ্রিয় স্থইতে বেদনাবিহীন জবাযু শ্লেষ্মাআব অথবা জ্বালা-
সহকারে পাচা শ্লেষ্মা আব, রতিইচ্ছা অতি প্রবল, জননেদ্রিয়ের চুলকানি,
কাগড়ানি, ফুলা ও তৎসঙ্গে জ্বালা থাকিলে “নক্সডমিকা” বিশেষ
উপকারী

মাংসেব আয় বঙবিশিষ্ট শ্লেষ্মা, জননেদ্রিয়েব অর্ধভাগে ফুলা, ভিতবে
যা, উপরে পুষ্ণ ঢাকিয়া আছে, তজ্জন্যে জ্বালা ও চুলকনাযুক্ত বেদনা
থাকিলে “এসিড্ মাইটিক্” ব্যবহার কবিবে

লম্বাভাবে সমস্ত জননেদ্রিয়ে মিলাইবাব মতন বেদনা সহকারে
শ্লেষ্মা বা দুগ্ধবৎ জাবে “ফস্ফোবাস্” বিশেষ উপকারী দুগ্ধবৎ যা,

বেদনাবিহীন, শৈথিল্যকর অবস্থা, বিশেষতঃ যাহা শয়ন করিয়া থাকিলেই অনুভূত হয়, জ্বালা, ত্বলফুটান বেদনা থাকিলে “পল্‌সেটিল” উপকাৰী

৩ বক্ত এবং শ্লেষ্মা আব, জ্বর, পাতলা, কটু, উগ্রকৃত হইতে আব হইলে “সেবাইনা” দেওয়া যাইতে পারে ।

বেড়ানব সময় রক্তাব হইলে সল্‌ফার লিঙ্ক সদৃশ জীলোকদিগেব ক্লিটবিস্‌ নামক যন্ত্র চুলকান সঙ্গে সঙ্গে ক্লিষ্টাব দ্বারা দক্ষবৎ কামড়ানি, জ্বালা এবং পাতলা আব, বিশেষতঃ সন্ধ্যাব সময়ই অধিক হওয়ায় “সিপিয়া” ব্যবস্থের ।

জননেদ্রিযের উভয় গুঠ ক্ষীণ এবং ঘা দ্বারা আৱত হইয়া উহা হইতে জ্বর বা সবুজ শ্লেষ্মা বা পুঁষাব, যাহাতে কাপড়ে দাগ লাগে, কামড়ান, চুলকনা বেদনা সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান থাকে জননেদ্রিযে সুকোচন এবং চাপা বেদনা অনুভূত হইলে ‘খুজা’ ব্যবহার করিবে ।

আনুসঙ্গিক উপায় ।—জীলোকদিগের এই প্রমেহ বোগেব অবস্থায় চিকিৎসাব সময় এবং আবোগ্যাবস্থায়ও কিছুদিনেব জন্ত কাম-বিপ্লব চবিতার্থ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ পথ্যাসম্বন্ধেও বিশেষ সাবধান হইবে পুরুষদিগের প্রমেহ আবোগ্য করিতে আহারাদিসম্বন্ধে যেরূপ সাবধান হওয়া আবশ্যিক, জীলোকদিগের পক্ষেও সেইরূপ ; এজন্য শাবীরিক পরিশ্রম, ঠাণ্ডা লাগান, ইজিয় উত্তেজনা, নানা প্রকার স্বেচ্ছাচ্ছাদ্য ও উত্তেজক পানীয় একবারে নিষিদ্ধ প্রথমাবস্থায় “একোনাইট” আবশ্যিক, তাহার পাব “কেনাবিস্‌” কিম্বা অল্প কোন লক্ষণ সংমিলিত ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয় পুৰাতন প্রমেহ অবস্থায় যাহা প্রবণ বোগের সদৃশ, তাহাতে “সিপিয়া” প্রয়োজন যদি শবীরে উপদংশ আছে এরূপ সন্দেহ হয়, তাহা হইলে “মার্কু'বিস্‌” বা তদোপযোগী অন্য ঔষধ বিধেয় যদি মার্কুরিব অপব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা হইলে “নাইট্রিক য়াসিডের” প্রতিবিশেষ মনোযোগ করিতে হইবে ।

স্বাস্থ্যবন্ধের কারণ ।—গর্ভসঞ্চাব হইতে ঋতু বক্ত হইয়া থাকে ; কিন্তু সচবাচব্‌ অতিবিক্ত রক্তাব, পুৰাতন ও নূতন বোগ অপরিমিত সঙ্গম দ্বারা হইয়া থাকে । ঋতুকালীন ভিজা বস্ত্র পরিধান করিয়া শবীর

শীতল কিম্বা বরফ ভক্ষণ দ্বারা শরীর শীতল করিলেও এই ব্যাধিবাম উপস্থিত হইয়া থাকে ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি মানসিক উত্তেজনা অথবা তদ্রূপ কোন কাৰণে ঋতু বন্ধ হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা । ঋতুকালীন অকস্মাৎ উহা বন্ধ হইলে রোগীকে গরমজলে স্নান ও গরম শয্যায় শয়ন করাইবে “যাকোনাইট” সেবন এবং মধ্যে মধ্যে শীতল জল পানদ্বারা তাহার চর্মেব কার্য স্বাধীনভাবে সংস্থাপিত করিয়া দিবে ঐষধ “পলুম্বেটিনা,” “ডাল্‌কামবা,” “সিমিসি ফিউগা” । যদি আর্দ্রতা বশতঃ ঋতু বন্ধ হইয়া যায় এবং তাহার জন্ম স্ফোটক হয়, তাহা হইলে “ডাল্‌কামবা” ব্যবহার করিবে

ভয়জনিত হইলে । “একোনাইট,” “ওপিয়ম,” “ভেবাত্রুম্” ব্যবহার করিবে

মানসিক উত্তেজনাজাত হইলে ।—“কেমোগিলা” ।

শোকজ হইলে —“ইগ্নিসিয়া”

আদর্শজনিত হইলে ।—“কফিয়া,” “ওপিয়ম ”

পুরাতন রোগে ।—“কফিয়ম,” “কেমিসিয়া,” “সিপিয়া”

ক্রমশঃ বন্ধ হইলে ইহার উপস্থিতি কাৰণ প্রায়ই কোন পুরাতন বোগ ইহার চিকিৎসা নিম্নলিখিত মতে করিতে হইবে ।

ঋতু বন্ধ হইয়া মস্তকে বক্তসঞ্চার এবং তৎপ্রযুক্ত অতিশয় বেদনা থাকিলে মুখজী-মলিন, দুর্বলতা, কঁকালে বেদনা থাকিলে “একোনাইট” দিবে

মস্তকে অত্যন্ত বেদন, চক্ষুর পাতায়, পৃষ্ঠে, মগস্ত অঙ্গে, বিশেষতঃ বামাঙ্গে বেদনা থাকিলে, হৃৎকম্প, অনুৎসাহ ও শিবঃপীড়া থাকিলে “সিমিসিফিউগা” বিশেষ উপকারী ।

নয়, ভীক, অভিমানী এবং কোমলস্বভাবা জীলোকের অবসন্নতা, পৃষ্ঠে ও তলপেটে বেদনা থাকিলে “পলুম্বেটিনা” মহৌষধ ।

পরিগ্রাম দ্বারা কষ্টের হ্রাস ও নিশাম স্বপ্নি হইলে তলপেটে এবং কক্ষাগ্রে অত্যন্ত লোদনা, বিষণ্ণতা এবং প্রাতঃকালে মস্তক বেদনা থাকি-

লেও “পলুসিটিল” দ্বারা উপকার না দর্শিলে “সিপিয়াব” প্রয়োগ আবশ্যিক।

১ চক্ষুতে ব্যথা, মাথাধরা, মস্তকের পীড়া, চক্ষু পাতা এবং অভ্যন্তরে বেদনা, জননেদ্রিয়েব উত্তাপ এবং শুষ্কতা থাকিলে “বেলেডোনা” ব্যবহার করিবে।

মস্তক ঘূর্ণন, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, পার্শ্বে ও বক্ষে বেদনা, নীরস সর্দি, কোষ্ঠবদ্ধ, পাকস্থলীর কামড়ানি থাকিলে “ব্রাইএনিয়া” বিশেষ উপকারী।

মস্তক ভাব, মস্তক ঘূর্ণন, নিত্রাকর্ষণ, ওদ্রা, কোষ্ঠবদ্ধ, এবং প্রস্রাব বদ্ধ হইলে “ওপিয়াম” ব্যবস্থেয়।

বহুদিনেব জ্বর ঋতু বদ্ধ থাকিলে এবং পীড়ার সার্বসাদিক কারণ উপস্থিত না থাকিলে “কোলিয়াম” ব্যবহার করিবে।

প্রয়োগ।—প্রথমতঃ দিবসে তিনবার কিছু উপকার হইলে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাব সময় এই দুইবার মাত্র সেবন করিবে। যদি উপকার দর্শে তবে ১০ ১৫ দিন ব্যবহার করিবে।

অনিয়মিত রক্তস্রাব।—কখন কখন দুই বা তিনবার রক্তস্রাব হইয়া এক বা ততোধিক দিনেব জ্বর উহা বদ্ধ থাকে।

কারণ।—সার্বসাদিক দৌর্বল্য, গৃহগধ্যে আবদ্ধ থাকা, অলম্প্রভাব, শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সমুদায়েব চালনা না করা।

চিকিৎসা।—অগ্রাণু লক্ষণে গৌণঋতুৰ স্থায় চিকিৎসা করিবে। যদি অনিয়ম কাজ হইয়া থাকে, “চায়না” বা “ফুইনাইন” ব্যবহার করিলে উপকার দর্শিতে পাইবে। প্রথমে তিন দিবস “পলুসিটিল” সেবন করিয়া তদনন্তর তিন দিবসেব জ্বর “চায়না” সেবন করিবে। যত দিন না বোঁগ আবোঁগ্য হয়, ততদিন পর্য্যায়ক্রমে “পলুসিটিল” ও “চায়না” সেবন করিবে।

ঋতুশূল।—অত্যপ্প বা প্রচুর পরিমাণে বজঃস্রাব হইয়া বজঃকষ্ট প্রযোজ্য।

লক্ষণ।—জ্বরপ্রদোষে প্রসববেদনার স্থায়ী অত্যন্ত অসহ

চিকিৎসা। —লালাব সহিত রক্ত নির্গমন হইলে “ব্রাইওনিয়া” ব্যবহার করিবে

১ রক্তবমন এবং বমনেচ্ছা থাকিলে “ইপিকাকু” দিবে।

কর্ণ ও নাসিকা হইতে রক্তোদগীরণ হইলে “পল্‌সেটিল্লা” দিবে।

অন্য কোন ঔষধে রক্তোদগীরণ বন্ধ না হইলে “হোমামিলিস্” দিবে।

কষ্টদায়ক সর্দি, দৌর্বল্য, মলিন মুখ, কৃষ্ণাজ, অস্পষ্ট বা ঋতুব বন্ধ হইলে “সিলিসিও” ব্যবস্থেয়

সাধারণ চিকিৎসা। —“সিলিসিও,” “ক্যামোমিলা” “সিকেল,” “পল্‌সেটিল্লা,” “বেলেডোনা,” “সিমিসিফিউগা,” “হোমামিলিস্,” “সেবাইনা,” “ককিউটাস্,” “জেল্‌সিমিনাম্,” “নক্সভমিকা,” “কফিয়া,” “ভেবেটম্,” “ইগ্লেমিয়া,” “পেটিনা,” ইত্যাদি ঔষধ ব্যবস্থা

• লক্ষণ অনুসারে ঔষধ ব্যবস্থা। জ্বায়ু ক্রিয়া সম্বন্ধীয় কষ্টকব বজঃপ্রাব ও বজঃকষ্ট প্রভৃতি থাকিলে ‘সিলিসিও’ দিবে

গর্ভবেদনাব ন্যায় অতিশয় বেদনা, পৃষ্ঠদেশেব সমুখে উপবিতে চাপ শূলবেদনা, কাল ও জমাট রক্তপ্রাব হইলে, বিশেষতঃ শ্বাসপ্রবল ও খিটখিটস্রভাবা জ্বাদিগেব পক্ষে “ক্যামোমিলা” উৎকৃষ্ট ঔষধ

অতিশয় প্রবল বেদনা থাকিলে, কাল ওটী ওটী বজঃপ্রাব, মূত্রাশয়ে এবং মলাশয়ে কর্তনুবৎ বেদনা, মুখজ্বী মলিন, বওপ্রাব না হইয়া অতি কষ্টকব বেদনা থাকিলে ‘সিকেল্’ অতিশয় উপকর্যবী

বজঃকষ্ট, জ্বায়ু ও ভূতিতে বেদনা থাকিলে “পল্‌সেটিল্লা” ব্যবহার করিবে

জ্বায়ুতে রক্তমধ্য এবং প্রদাহ অল্পমিত হইলে অতিশয় ধর্প্‌ধর্প্‌ বেদনা, মস্তকে রক্তাধিক্য, দৃষ্টিব ভ্রম, বক্রিম মুখজ্বী বা অধিক প্রাব থাকিলে “একোনাইটেব” সঙ্গে পর্যায়ক্রমে “সিমিসিফিউগা” দিবে। শ্বাসপ্রধান জ্বীলোকদিগের অতিশয় শিরঃপীড়া, হস্তপদ দি কামড়ান, বমন ও বক্তপ্রাব থাকিলে “বেলেডোনা” দিবে

ঋতু আবৃত্ত হইবাব প্রাকালে বেদনা থাকিলে “সেবাইনা” ব্যবহার করিবে

শ্বেতপ্রদর ।—জীলোক প্রায়ই এই বোগাক্রান্ত হইয়া থাকে
ঋতু বর্তমানে কিম্বা প্রথম বজ্রদর্শন হইতে রজঃবন্ধ পর্য্যন্ত প্রায় এই
বোগ আবির্ভাব হইয়া থাকে জননেত্রিয়েব প্রদাহ বা ক্ষীণতা
নিবন্ধন উহাবৈশিষ্ট্যিক ঝিল্লী হইতে এক প্রকার শুভ্রবর্ণ ক্লেদ নির্গত হয়,
তাহাকেই শ্বেতপ্রদর বলে

লক্ষণ — জী জননেত্রিয়. হইতে শ্বেত, পীত বা হবিৎ জলবৎ
পাতলা অথবা আটাবৎ গাঢ় বা অত্যন্ত দুর্গন্ধবিশিষ্ট, একপ্রকার ক্লেদ
নির্গত হয় তন্নিষ্টিও সমস্ত শবীর দুর্বল হইয়া পড়ে, মুখ মলিন,
অজীর্ণতা, পৃষ্ঠ, কোমর এবং তলপেট বেদনা কবে

কাবণ — শৈত্য বক্তাধিক্য, স্বাস্থ্যভঙ্গ, গুণমালা বোগ, ক্রিমিজন্ম
কামড়ান ও অপবিচ্ছন্নতা জন্ম ইহা জন্মায়

চিকিৎসা — গর্ভাবস্থায় শুভ্রবর্ণ গাঢ় অথবা নির্গত এবং তন্নিবন্ধন
চুলকানি থাকিলে ঋতু হয় না একপা বালিকাদিগেব শ্বেতপ্রদর হইলে,
তলপেট কামড়াইলে “পল্‌মেটিল” অধিক কার্য্যকাৰী

পীত, হবিৎ এবং দুর্গন্ধ ক্লেদ নির্গত, ঋতুকালীন যন্ত্রণাধিক্য, অল্প
মাত্রায় বক্তাধিক্য, তলপেটে ছিন্নবৎ যন্ত্রণাভাব, কোষ্ঠবন্ধ, শীতানুভব
থাকিলে, “সিঙ্গিয়া” দিবে

পীতবর্ণ গেষ্মাব সহিত পূঁয় নির্গত ও জননেত্রিয়ে ঋতু এবং চুল-
কানি থাকিলে, অতিরিক্ত ঋতুপ্রাব, পাতলা অস্বাস্থ্যকর ক্লেদ নির্গমন,
দৌর্বল্য, শীতানুভব এবং মুখের বর্ণ মলিন হইলে “গীকুরিয়াম্” দিবে ।

অধিক লক্ষণ বা অতিরিক্ত ঋতুপ্রাব বশতঃ শবীর দুর্বল কিম্বা কোন
দুর্বল্যকাবক বোগ কর্তৃক শ্বেতপ্রদর রোগেব উৎপত্তি হইলে “চায়না”
ব্যবহার কবিবে

* প্রয়োগ প্রণালী — এক সপ্তাহ বা দশ দিন দিবসে তিনবার
করিয়া সেবন কবিবে, স্থায়ী বোগে তদপেক্ষা অধিক দিন প্রাতে
এবং মায়ংকালে সেবন কবিলে

আনুমানিক উপায় ।—নির্ঘল বায়ুতে ব্যায়াম, বিশ্রামপূর্ণ জব্য
ভোজন, পঞ্চমসি, উত্তেজক দৃশ্য, কুচিন্তা, অধিক লোকেব সহিত বাস,

ইত্যাদি পরিভাষা করিবে সর্বদা শীতল জলের পিচকারী গ্রহণ, প্রত্যহ স্নান এবং জননেত্রিয় পবিত্রাচরণ বাখিবে ।

গর্ভাবস্থা ও সেই সময়ের সমুদায় পীড়া ।

গর্ভের লক্ষণ ।—সুস্থ বন্ধ, প্রাতঃকালে শাবীক অশ্রু বোধ, স্তনদ্বয়ের ক্ষীণতা, কুচাগ্রের ক্রমবর্ধতা, স্তনে দুগ্ধের আবির্ভাব, তলপেটের ক্ষীণতা, জ্বায়ুর আকস্মিক ক্ষীণতা, উদরের অস্থিরতা, জ্বায়ু কোষ, এই সমস্ত গর্ভলক্ষণ ।

গর্ভাবস্থায় স্বাস্থ্যবিধান ।—লঘুপাক, পুষ্টিকর, বিলাসশূন্য জব্য আহাব করা গর্ভবতী জীদিগের অবশ্য কর্তব্য আহার কবিরান, সময় জলপান কবিও না কাপড় খুব আঁটিয়া পরা কর্তব্য নহে ।

ব্যায়াম ।—গর্ভাবস্থায় নিষমিত ব্যায়াম করিলে শাবীক স্বাস্থ্য সম্পাদিত হয় এবং বিনা ক্রেশে সন্তান প্রসূত হয় । বালক বিলক্ষণ বলবান ও সুস্থ হয় যত প্রকারে অঙ্গ চালনা হয়, উদ্যমে গর্ভবতী নারীদিগের পক্ষে নির্মলবায়ুপূর্ণ স্থানে পদভ্রমে ভ্রমণ করা সর্বাপেক্ষা উপকারী । ভ্রমণ কবিত্তে হইলে আহায়েব পূর্বে অর্থাৎ প্রত্যয়ে করাই ভাল ; আব ফাঙ্কিতে শবীক ও মন ক্লান্ত হইয়া না পড়ে, সুসই প্রবিমাণে ভ্রমণ কবিত্তে হইবে । শকট বা অশ্বাবোহে ভ্রমণ কবিত্তে না বায়ু আর্জ হইলে গৃহমধ্যে ভ্রমণ করা কর্তব্য । যাহাতে মন সর্বদা সুখী থাকে, তদ্বিষয়ে সর্বদা চেষ্টা কবিত্তে ।

লক্ষণ ।—শয্যা পরিভাষা কবিরান অব্যবহিত পবেই অশ্রু অশ্রু-ভূত হইয়া থাকে শয়নাবস্থায় হয়ত কিছু মাত্র অশ্রু থাকে না, কিন্তু শয্যা হইতে গুলোস্থান কবিরান মাত্রই বমনোদ্বেক, উদ্যাব এবং গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিতে না আসিতেই ভয়ানক বমি হইতে থাকে

কেহ'ব' অনিচ্ছা পূৰ্বক আঁহাব কবিয়া থাকে, আঁহাব কবিয়া ন উঠিতে উঠিতেই সমুদয় বমি হইয়া যায় কাঁহাবও কাঁহাবও সমস্ত দিন অস্থির হয় গৰ্ভসঞ্চারের পবেই বমণীগ' প্রায়ই এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং ইহা ৩।৪ সপ্তাহ থাকিয়া আপনা হইতেই অন্তর্হিত হইয়া যায়

রোগোৎপত্তির কারণ —পাকশয্যেব শিবাপবাস্যাব কার্য-ক'বিত' শক্তিব ত'দিক্য হেতু পুষ্টিক বিভ' শক্তির সমতা বন্ধ' হয় ন' ।

চিকিৎসা ।—বমন, শিবঃঘূৰ্ণন, অস্থিরতা, উগ্রস্বভাব, অন্নবমন, হিকা,পাকস্থলীতে চাপবোধ,মুখে জল ঊঠা ও অগ্নিমান্দ্য থাকিলে “নক্স-ভগিকা” দিবে ।

উদবেব গানি,সর্বদা বগনোত্তেক ও উদ্দাব বা অজীর্ণ ত্রব্য পিত্তবমন হইলে “ইপিকাকোহ ন' দিবে

‘ক্রিয়োসোঠাম্’ ইহা স্থায়ী বোগেব মহৌষধ

অতিশয় বমন,দৌৰ্বল্য এবং মদ্যো মদ্যো অবসন্নতা বা মোহ থাকিলে ‘আশেনিকাম্’ দিবে

যে লক্ষণে “নক্সভগিকা” দেওয়া যায়, সেই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইলে এবং বোগ আবেগ' হইবাব উপক্রম হইলে “পলুমেটীলা” সেবন কবিবে

আলুসঙ্গিক উপায় ।—খাদ্যেব বন্দোবস্ত কবিয়া দেওয়া আব-শ্যক যে সময় উদব ভাব অ'বা আঁহাবে অনিচ্ছা থ'কিবে, সে সময়ে আঁহাব না কবিয়া অপার কোন সময়ে আঁহাব কবিবে । বৌগবিবেচনায় সর্বদা ছুফ ২ ১/৩ কাঁচা পবিমাণে সেবন কবিবে যদি ইহাতেও বমন হয়, তবে ববফ খাইবাব ব্যবস্থা করিবে যদি পূৰ্বোক্ত কোন উপ'যই ফলপ্রস' না হয়,তান দিনাস দুই তিন রাব মলদ্রাব দিয়া খাদ্য ত্রব্য প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া আবশ্যক

বক্ষ্যাত্ত —সস্তানোৎ' ভ্রুব বয়স অন্তীত হইলে যুবতীদিগেব আব' সস্তান হইবাব আশা নাই, একপ' সন্দেহ প্রায় সকলেরই হইয়া থাকে, এবং এই সময় সকলেই কাব' অলুসঙ্গান কবিয়া থাকেন ।

কারণ —কারণ প্রায়ই দুই প্রকাব,স্থানিক ও মার্কাসিক স্থানিক

কাবণেব মধ্যে জ্বরযোনী, জ্বরায় বিষকোষ ইত্যাদির অসম্পূর্ণ গঠনই প্রধান, কিন্তু তদুপা স্থল অতি অল্প বলিতে হইবে জ্বরায় কোষে ফোঁটক বা মাংস বৃদ্ধি অথবা তাহাব অস্বাভাবিক স্থানে অবস্থান, অস্বাভাবিক দুষ্ক্রিয়া, অসাময়িক বা অতিবিক্ত পুরুষসঙ্গ, শ্বেতপ্রদর ইত্যাদি ইহার প্রবল কাবণেব মধ্যে গণ্য। মার্ক্সাজিক কাবণের মধ্যে কোন প্রবল বা স্থায়ী রোগ দ্বারা শারীরিক ক্ষমতাব হ্রাসই প্রধান কাবণ ইহা ব্যতিত অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ, অতিবিক্ত পবিশ্রুগণ বক্ষ্যাত্তের কাবণ

চিকিৎসা।—কাবণ দেখিয়া চিকিৎসা কর্তব্য। নিম্নলিখিত কয়েকটি ঔষধ দ্বারা উপকার হইতে পারে। ‘মিগ্লিয়া’, ‘এগস্কেটস্’, ‘নেবা-ইট’, ‘কার্বনিকা’, ‘কোপিয়ম্’, ‘প্লেটীনা’, ‘ফেরম্’, ‘ফস্ফরস্’।

গর্ভপাত বা গর্ভনষ্ট।—গর্ভপাত একবার হইলে প্রায়ই পুনঃ পুনঃ যতবার গর্ভ সঞ্চার হইয়া থাকে, ততবারই গর্ভপাত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা।

লক্ষণ।—সকল প্রকার কাজকর্মে অসুখবোধ, নিশ্বেজভাব, পৃষ্ঠের নীচের ভাগ দুর্বল বোধ, অল্প অল্প করিয়া ক্রমে অতিরিক্ত বক্তৃত্তাদিতে আরম্ভ হয়। কোমবে কর্তন গদূশ বেদনা হইতে থাকে। প্রথমতঃ অনিয়মিত বেদনা অতি অল্প অল্প অনুভূত হয়, পূবে নির্দিষ্ট সময়ের পর অসহনীয় নিয়গামী বেদনা আবৃত্ত হয়, তাহার পবে জল ভ্রাজিতে আরম্ভ হইয়া গর্ভপাত হয়।

কারণ।—কোন বিষয়ে বঞ্চিত হওয়া, পড়িয়া যাওয়া, আঘাত প্রাপ্ত, পাঁ সবিয়া যাওয়া, ভাবি বস্ত্র উত্তোলন, অনেক দূব পবিশ্রুগণ, অশ্রাবোহন, নৃত্য, অতিশয় দুপ্পাচ্য বস্ত্র আহাব, বেচক ঔষধ সেবন, অতিশয় গানসিক উচ্ছাস, শারীরিক দুর্বলতা, গর্ভসঞ্চালনেব অব্যবহিত পরে দার্তাশয় অতিশয় নিশ্বেজতবে রাখা, প্রচুর রজস্রাব ও দীর্ঘস্থায়ী শ্বেতপ্রদর গর্ভপাতের কারণ।

চিকিৎসা।—অতিশয় কষ্টদায়ক বেদনা এবং প্রত্যেক বেদনাতে কাল জমাই বক্ত নিগমন হইলে বিশেষতঃ অসম্পূর্ণ প্রসব বেদনা থাকিলে ‘সিকেল্’ দিবে।

গর্ভাশয়ে টাটানি ও উত্তাপ এবং অতিরিক্ত রক্তাশ্রাব হইলে “সেবা-ইনা” দিবে।

রক্তাধিক্য হইলে “একোনাইটম্” দিবে।

স্নায়ুপ্রধান এবং চিহ্নটিবেশ্বভাষা স্ত্রীগণ, যাহারা প্রায় সহজে বেদনা অনুভব করে, তাহাদিগকে “ক্যামোমিল” ব্যবহার কবিতে দিবে।

পতন, আঘাত বা অতিরিক্ত পনিশ্রম জন্ম পীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে “আর্নিকা” দিবে।

“ইপিকাক্”, “পল্‌মেটীলা”, “বের্‌লডোনা”, “ক্রোন্‌স্” ব্যবহারে উপকার দর্শে।

প্রয়োগ —বোগের লক্ষণের আবশ্যকতামুসাবে প্রত্যেক ২০ ৩০ এবং ৬০ মিনিট অন্তর ১ মাত্রা সেব্য। রোগের ক্রাস হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক সময়ে সেবন করিবে।

আনুসঙ্গিক উপায়। গর্ভপাতেব বিন্দুমাত্র লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া মাত্র বায়ুসঞ্চালিত শীতল গৃহে খাটেব উপর কোমল শয্যায যে পর্যন্ত না আশঙ্কা দূর হয়, সে পর্যন্ত শয়ান বাধিবে। কিন্তু অধিকক্ষণ বিশ্রাম কবিতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ তাহা হইলে অনিষ্ট হই-লেও হইতে পারে।

গৌণস্বাস্থ্য —যত দিন পর্যন্ত এই কারণবশতঃ স্ত্রীলোকের অস্থখ না হয়, ততদিন চিকিৎসা করা ততদূর যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু যখন বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া মস্তকভার, বেদনা, নাটিকী হইতে রক্ত-আব, কংকম্প, অস্পষ্ট পরিশ্রমে ও নিশ্বাস ত্যাগে কষ্ট, শারীরিক ক্লান্তি, পৃষ্ঠদেশে, উরুদেশে, তলপেটে বেদনা হইলে চিকিৎসা প্রয়োজন।

রোগোৎপত্তির কারণ।—বিলক্ষণ বগবতী ও স্নানকায়া স্ত্রীলোকদিগের প্রায়ই ইহা হয় না। যাহা বা স্বাভাবিক দুর্বল এবং কোন স্থায়ী রোগে আক্রান্ত, তাহাদিগেরই প্রায় ইহা হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—তলপেটে ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা, কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন ইত্যাদি মুচ্ছা বোগের লক্ষণ, উদগার ও বমন থাকিলে “পল্‌মেটীলা” দিবে।

জরায়ু কোষস্থ শিবা সমূহেব দুর্বলতা, মস্তক বেদনা, মূর্ছা থাকিলে “সিমিসিফিউগা” দিবে ।

কোমলস্বভাবান্বিত অথচ ফুস্ফুস যন্ত্রেব কোন পীড়া জন্মিবাব পূর্ব-
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে “ফস্ফোবস্” ব্যবহার কবিবে

ক্ষুধামান্দ্য, অবসন্নতা, উদ্বেগ, মুখ প্রভৃতির ক্ষীণতা থাকিলে “আর্শে-
নিকা” দিবে


আনুসঙ্গিক লক্ষণের চিকিৎসা ৭—মস্তকবেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ,
অত্যন্ত ক্ষুধামান্দ্য থাকিলে “নকাতমিকা” দিবে

শ্রুত বন্ধ হইয়া জননেন্দ্রিয় এবং নাসিকা হঠতে রক্তস্রাব হইলে
“ট্রাইওনিয়া,” ব্যবহার কবিবে

হস্তপদ শীতল, মূর্ছা, অবসন্নতা, বমনেচ্ছা ও বমন হইলে “ভেরা-
ট্রাম্” দিবে ।

প্রয়োগপ্রণালী ।—প্রাতঃকালে শয্যা পরিত্যাগ এবং রাত্রে
শয়ন করিবার পূর্বে ঔষধ সেবন কবিত্তে হইবে লক্ষণ সমুদয় প্রবল
থাকিলে প্রত্যেক ঘণ্টায় অথবা ৩৪ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ ব্যবহার করিবে ।
সর্বদা হস্ত পদ গরম রাখা এবং আরামজনক পরিচ্ছদ পরিধান করা
কর্তব্য

হাকিমীমতে স্ত্রীরোগ চিকিৎসা ৭



বৈদ্যক, য্যালোগ্যাথিকমুতে এই রোগেব যেরূপ বিস্তৃত বর্ণনা করা
হইয়াছে, লক্ষণাদিসম্বন্ধে হাকিমীমতে আর সে সকলের অতি বর্ণনাব
প্রয়োজন নাই ; এজন্য কয়েকটি ঔষধ মাত্র নিয়ে লিখিত হইল ।

বজোবন্ধে নিম্নোক্ত ঔষধ ১১ দিন সেবন কবাইলে নিয়মিতরূপে
রজোস্রাব হইবে ।

কমলা গুড়ি	...	...	...	৬৩ বতি
জাঙ্গি হ্রিওকী চূর্ণ	.	...	...	৬৩ বতি ।
একত্র মিশ্রিত করিয়া ২১ মোড়া প্রস্তুত করিবে এবং প্রতিদিন				
প্রাতে এক একটী মোড়ক নীতল জলের সহিত সেবন করাইবে				
অতিবিক্ত রজোপ্রাব হইলে ৭ দিন নিমোক্ত প্রক্রিয়া করিবে ।				
গিলা বীজের মাস্য	..	...	...	১ ছটাক ।
মৃত	...	...	...	১ ছটাক
উভয়ে একত্র মিশ্রিত করিয়া ৭ টি বটী প্রস্তুত করিবে এবং প্রতিদিন				
প্রাতে অর্ধ পোয়া গবম দুগ্ধের সহিত খাইতে দিবে ।				

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ।

১ য্যালোপ্যাথিকে শিশুচিকিৎসা ।

রূপ ।—শিশুদিগেব কঠনালী, টেকিয়া ও ব্রহ্মাইয়েব প্রদাহ জন্ম
এই বোগ জন্মিয়া থাকে

লক্ষণ ।—এই পীড়ার লক্ষণ সকলকে তিন ভাগে বিভক্ত করা
যাইতে পারে। প্রথমে শরীরে জ্বরবোধ, ডুকেব অল্প উষ্ণতা, পিপাসা, কামি,
স্বভঙ্গ, তন্দ্রা, চক্ষু জলপূর্ণ, নাসা হইতে জলবৎ ক্লেদনিঃসরণ, কঠনালীতে
বেদনা, তাঁর ৩০ ঘণ্টার পর রাত্তিকালে শ্বাসকষ্ট, হঠাৎ নিদ্রান্তঙ্গ, সঘন
শ্বাস পতন, মুখমণ্ডল শ্বেত ও রক্তবর্ণ, চক্ষু লালবর্ণ ও জলপূর্ণ, শ্বাসপতন-
কালে কুকুটবৎ শব্দ, রাত্তিতে নিদ্রাভাব, প্রাতে নিদ্রা, কিন্তু একটু বেলা
হইলেই জ্বর, স্বভঙ্গ, শ্বাসকষ্ট ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে এই সকল
লক্ষণের সহিত পিপাসা, জিহ্বা শ্বেতবর্ণ ও লেপযুক্ত, নাড়ী দ্রুতগামী,
স্বভাবের চাঞ্চল্য হয় । এই অবস্থায় বোগী বাবদার হস্ত দ্বারা কঠনালী

ধরিয়া যেন তাহার অভ্যন্তরস্থ কোন পদার্থ বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা
কবে অত্যন্ত কান্না ও শ্বাসকষ্ট প্রবল হইলে বক্ষ প্রসারিত করিবার
জন্ত শিশু পশ্চাদিকে মস্তক লইয়া যায়, কান্না সহিত প্রায় শোষা
নির্গত হয় না, কথা কহিতে কষ্ট হয়, ক্রমে পীড়া বৃদ্ধি পাইয়া তৃতীয়া-
বস্থায় উপনীত হইয়া থাকে অবিবাক্য শ্বাসপ্রশ্বাস হয়, দেখিলে কষ্ট
বোধ হয় এতদ্বিক্রম অবলম্বন হয় যে, এককালে বক্ষ উচ্চারণের ক্ষমতা
থাকে না এ অবস্থায় নিশ্বাস বন্ধ হইয়া হঠাৎ মৃত্যু হইতে পারে
যাব পূর নাই শ্বাসকষ্ট হেতু নিকটবর্তী বস্তু ধবিত্তে চেষ্টা কবে, যেন
তাঁহাকে ধরিয়া আসন্ন মৃত্যু হইতে বক্ষা পাইবে এইরূপ চেষ্টা য
যদি শোষা বা কৃত্রিম ঝিল্লী নির্গত না হয়, তবে গাত্র শীতল ও ঘর্ষিত,
নাড়ী দুর্বল অথচ ক্রতগামী, শ্বাসপ্রশ্বাসেব সহিত হিম্ হিম্ শব্দ
কণ্ঠনাড়ীর প্রবল গতি, মস্তক পশ্চাদিকে স্থাপন, নামাপুটেব ঘন ঘন
সঞ্চালন ও আকুঞ্চন, চক্ষু কোটবর্তী, বক্ষ রক্তবিহীন, মুখমণ্ডলেব ভাবে
উৎকট যাতনা বোধ, ইত্যাদি লক্ষণেব পব ১২ হইতে ১৮ ঘণ্টারপরে
আক্ষেপ ও শ্বাস বন্ধ হইয়া কিছুক্ষণ অচেতন থাকিবার পব মৃত্যু উপ-
স্থিত হয়

চিকিৎসা - পাঁচ বৎসব বয়স পর্যন্ত প্রায় এই পীড়া হইয়া
থাকে এবং কতক অশোক্ষা পুত্রের অধিক হয় শয্যায় শয়ান রাখিবে
গাত্র ফ্রেনেল দ্বাৰায় আবৃত করিবে, বাসগৃহেব উত্তাপ ৭০ ডিগ্রী বক্ষা
করিবে, কণ্ঠায় ২০ ৩০ মিনিট কাল ক্রমাগত ফোমেন্টে করিবে, নিম্নোক্ত
ঔষধ খাইতে দিবে

ভাইনাম্ ইপিক্যাক্

১ ড্রাম

শিশু জন

১ স্পাং।

এক বাবে।

বয়নাভে, শ্বাসকষ্ট দূর না হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে ভাইনাম্ ইপি-
ক্যাক, লুইকব. যাযোনিয়া য্যানিট্যাটিস্, স্পিবিট ইথাব নাইট্রিক। এক
মালা, আবশ্যকমত সেবন করাইবে

শবীর দুর্বল থাকিলে ইপিক্যাক দ্বারা বমন করাইয়া ১ ড্রামফট-

কিরি বা অর্ধ গ্রোণ তুঁতে দ্বাৰা উক্ত কার্যসম্পন্ন করিবে এবং মধ্যে মধ্যে নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে ।

য়্যামোনিয়া কর্বনেটীস্	...	...	১২ গ্রোণ ।
ভাইনি ইপিক্যাকুয়ানহা	...	...	৪০ বিন্দু ।
টীং সেনেগা	...	...	১২ ড্রাম
সিবার্ণি বিডাম্	...	...	২২ ড্রাম ।
জল	...	...	২২ আং ।

২ । ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক ছোট চামচ সেবন করাইবে

বোগের উপশম না হইলে যদি বোগী তৃতীয়াবস্থায় উপস্থিত হয়, তবে নিম্নোক্ত ঔষধ খাওয়াইবে

আইওডাইড অফ পোটাসিয়াম্	...	...	৮ গ্রোণ ।
টীং হায়েমাসেমস্	...	...	১২ বিন্দু ।
টীং য়াসাফটিডা	...	...	১—২ আং ।
ডিক্ট সেনেগা	...	...	১২ আং

২ ড্রাম পবিমানে ৩ ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে

এই ঔষধের সহিত কঠিনালীষ উপবে কম্পাউণ্ড টীকাব অফ আইওডাইন্ ব্যবহার করাইবে

পথ্য ।—এই সকল ঔষধের সহিত পোর্ট, বিফ্টি, তথ, হুগ, ডিম্ব, ইত্যাদি আহার দিবে

উপবোক্ত চিকিৎসায় বোগের উপশম না হইলে ক্যাডিটী অফ দি মটিস্ এবং কিসেমের পশ্চাদিকে কঠিক লোশন্ দেওয়া যাইতে পারে ।

হুপিং কফ্ —ইহা এক প্রকার আক্ষেপযুক্ত কাশি ।

লক্ষণ —প্রথমাবস্থায় অস্পষ্টরূপে সহিত কাশি, নাশা দিয়া জলবৎ র্দেদ নির্গম, ব্রহ্মাই হইতে জাবৎ বা ফেণাযুক্ত শ্বেতা নিঃসরণ, আলস্য, অস্থিবতা, ক্ষুধামান্দ্য, দীর্ঘকাল স্থায়ী ক্ষুধা ও আক্ষেপযুক্ত কাশি, কাশিতে কাশিতে মুখমণ্ডলের আবদ্ধতা, বোধ হয় যেন মৃত্যু উপস্থিত, এই বোগে শ্বাসগ্রহণকালে কুর্কুটধ্বনির এক প্রকার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় । পুনঃপুনঃ বোগী সহিত শ্বাসপ্রবাহ ক্রমশঃ হইতে গমদায়ক বায়ু বাহ্যিক

হইয়া বায় এবং আকৃষ্টিত শ্বাস দ্বাব অধিকক্ষণ স্থায়ী শ্বাস গ্রহণ করিলে নির্দিষ্ট ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ হয় এই শব্দ উপকাবজ্ঞানিত বলিয়া অনেকের জ্ঞান কবিয়া থাকেন। এই প্রকাব বেগে কাশিতে কাশিতে মুখমণ্ডল আবদ্ধ ও স্ফীত, অগ্নিগোলক বহিষ্কৃত, নাসারন্ধ্র হইতে বক্তপ্রাব, এবং অনৈচ্ছিক মল মূত্র ভাগ হইয়া থাকে। কাশি নিবৃত্তি পাইলে অধিক পরিমাণে নির্ধূ সবৎ মিউকাস্ মুখ দিয়া বহির্গত হয়

ব্রকাইটিস্, নিমোনিয়া, আক্ষেপ্, ও ড্‌ডি বোগ ইহাব উপসর্গরূপে থাকিতে পারে।

কাশির সহিত ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ দ্বাবা ইহাকে অল্প পীড়া হইতে প্রথক করা যাইতে পারে যেখানে এই শব্দ অস্পষ্ট থাকে, সেখানে সাময়িক কাশির আক্রমণ, মধ্যে মধ্যে সম্পূর্ণ স্থ্রাবস্থা, অধিক পরিমাণে শ্বেতা নিঃসরণ, এবং কাশিতে কাশিতে মস্তিষ্কে স্বস্তাববোধ ইত্যাদি লক্ষণ দ্বাবা বোগজ্ঞান কবিতে হইবে

চিকিৎসা।—পীড়াব সামান্যাক্ষায় গবম কাপড়, ফ্যালেন অথবা শামস চর্ম দ্বাবা গাত্র আবৃত করা, লঘু এবং পুষ্টিকর তবল হুড়হুড়ে খাদ্য দেওয়া, ঘবেব কপাট বন্ধ কবিয়া রাখা, এবং বেলডোনা ও সোপ লিনিমেন্ট দ্বাবা মেরুদণ্ড ঘর্ষণ কবা কর্তব্য

পীড়া কঠিন হইলে প্রথমে বমনকাবক ঔষধ দিবে—জুপেবোগে যেকপ ব্যনস্থা কবা হইয়াছে। তাহাব পর নিমোক্ত ঔষধ দিবে

ম্যালিডাই নাইটিশ ই ডিল্	...	...	১১২ ড্রাম।
টীং কার্ডেমস্ কম্পাঃ	...	...	১২ ড্রাম।
সিবপ	...	...	৩২ আং।
জল	...	...	২ পুং।

প্রতি ২। ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক ছোট চামচ অথবা—

সল্‌ফেট্ অফ জিঙ্ক	...	...	৮ গ্রো।
একফ্রাক্ট বেলডোনা	...	...	২ গ্রো।
জল	...	...	৮ আং।

চাবি ঘণ্টা অন্তর ৪ ড্রাম পরিমাণে খাওয়াইবে। অথবা—

নাইটি ক য্যাণ্ডি ডিল	..	১২ ড্রাম ।
টীং কার্ডেমম্ ক ল্পাঃ	..	৩ ড্রাম
সিবপ সিপ্লেজ	...	৪ আঁ
জল	..	১ আঁ

১ হইতে ২ ড্রাম পবিমানে ২ । ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে

পথ্য — নীচ জ্বা, সহজ চা অথচ পুষ্টিকর খাদ্য দিবে

কন্ডল্‌সন্ । শিশুদেব এই পীড় হইলে তাহাকে তড়কা বলে ।
উদবাধান এবং অজীর্ণতাই ইহা ব কারণ

লক্ষণ ।—বোগেব আক্রমণকালে দেহ কঠিন ও অচল হয়, মুখ
মণ্ডলেব পেশীব আকুঞ্চন বশতঃ অধব, ওষ্ঠও মুখের বিকৃতি ভাব হয়
মস্তক ও মুখমণ্ডলেব এক বক্রবর্ণ, পবে নীলাভ, চক্ষু উজ্জ্বল, কণীনিকা
আকুঞ্চিত ও বিস্তৃত, শ্বাস শ্বাস বিষম এবং কষ্টকর, নাড়ী ক্রতগামী,
হস্ত বদ্ধমুষ্টি, অঙ্গুলি কবলে প্রবিষ্ট, কখন কখন অনৈচ্ছিক মল মূত্র
ত্যাগ, এই সকল লক্ষণ ২ ১ মিনিটেব মধ্যে থামিয়া যায় ইহা ব পব
পীড় পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইতে পাবে, অথবা একবারে প্রকাশ পায়
ন শিশু ভীত হয়, ক্রন্দন করে, পবে নিদ্রিত হইয়া প্রভূত ঘর্গা ভিষিত
হয় পীড়া শাশ্বাতিক হইলে সম্পূর্ণ অচৈতন্য হইয়া মৃত্যু উপস্থিত
হইতে দেখা যায় ক্রিমি জন্ম এই পীড়া হইতে পাবে

চিকিৎসা । পীড়াব স্তাব এ ২ কাবাগাল্লমাবে ভিন্ন প্রকারে
চিকিৎসা করা যায় ক্ষণস্থায়ী আক্রমণে গাত্রবস্ত্র অলগ্না কবিয়া
দেওয়া, শীতল স্থানে স্থাপন, মুখে, বক্ষে এবং নস্তকে শীতল জলপান
ধান উপবাসের সন্তানন আক্রমণ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে গাত্র
উষ্ণ এবং মস্তকে শীতল জল ব্যবহার করা কর্তব্য । মস্তকে বরফ ব্যব-
হাবেও উপকাব দর্শে । আহ বের পব আক্রমণ হইলে বিবেচক ঔষধ
যথা—জিহ্বাব উপব ১ বিদ্ধ ক্রোটন অম্লেন দিবে দন্তোদ্যম হেতু পীড়া
হইলে দন্তমূল বিদীর্ণ কবিতে হইবে নিদ্রাভাব, কন্ডল্‌সন্ হইলে
৩ মাসের সন্তানকে সিকি গ্রেণ, এক বৎসরেব শিশুকে অর্ধগ্রেণ মাত্রায়
ডোজার্শ পাউডার দিলে উপকাবে দর্শিবে আক্ষেপ নিবারণ ঔষধেব

প্রয়োজন হইলে ১ আউন্স দুগ্ধেব সহিত ২০। ৩০ বিদ্ধ.টিং হিঙ্গু মিশ্র।—
ইয়া পিচকাবী দিবে

মস্তিষ্কেব যাত্ত্রিক পীড়া জন্ত পীড়া না হইলে ক্লোবোফর্ম আত্মগকে
অনেকে উপকাব জন্ত মনে করেন কখন কখন এই সকল ঔষধে
বোগের আক্রমণ নিবাবণ কবিত্তে না পারিলে ব্রোম ইড পে টাসিয়ম্
ব্যবহাবে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। উছাব মাত্রা দেড়মাসের সন্তানকে
সিকি গ্রেন, ৩ মাসেধ সন্তানকে অর্ধ গ্রেন, এবং এক বৎসবেব শিশুকে
১ গ্রেন মাত্রায দেওয়া যায়।

পৃষ্ঠবংশেব উপব উত্তেজক নিনিমেণ্ট ব্যবস্থা কবা যায় এবং সর্ষপ,
পলস্তারা দ্বাবাও বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

ক্রিমিজন্ত পীড়া হইলে স্ট্রীণ্টনাইন দেওয়া কর্তব্য

অন্যান্য কাবণে কেহ কেহ নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার কবেন।

ক্যাম্ফর	...	৫ গ্রেন
একফ্রাক্ট বেগেডোনা	...	৩ গ্রেন।
একফ্রাক্ট কনাই	...	৪ গ্রেন।

স্পিবিটাম্ বেক্ট্রিফিকেটাই . চাবটি বটি ২ স্তরেব উপযুক্ত।

প্রতি বাত্রে শয়নকালে এক একটি বটি খাওয়াইবে উপবোক্ত ঔষধে
৩টি বটি হইবে

বৈদ্যকে শিশুরোগ চিকিৎসা ।



বাতজ. শিশুরোগের লক্ষণ।—ব যুদ্ধিত স্তনদুগ্ধ প নে
শিশুর মল মুত্র ঋণ বন্ধ হয় এবং শাধীবিক ক্রমভ, শ্ববেব ক্ষীণতা ও
বাতজ নানা প্রকাব বোগ উপপন্ন হইয়া থাকে

চিকিৎসা ।—স্বত ৪ সের ছুন্ধ ৪০ সেব কল্ক—অশ্বগন্ধা ১ সের ইহাব নাম “অশ্বগন্ধা স্বত ।”

শিবাংমোদক ।—হবিতকী, ভূঁই আমলা, মূর্খামূল, শুল্ফা, হরিদ্রা, দাধিহবিদ্রা, আলবুশী বীজ, বেড়েলা, বেলশুঠ, লবঙ্গ, শতমূলী, মুবা-মাংসী, মোবী, জটামাংসী, ভূমিকুশ্মাণ্ড, শুষ্ঠী, অনন্তমূল, আমলা, শ্যামালতা, বামুনহাটী, গজপিপ্পলী, পিপ্পলী, গুড়ধরু, তেজপত্র, এগাইচ, নাগেশ্বর, মেথী, হালিম, কৃষ্ণজীরা, যমুনী, শোভচন্দন, রক্তচন্দন, তালমূলী, অশ্বগন্ধা, গোকুপ বীজ, প্রত্যেক সমভাগ ; সর্বসমান দ্রাক্ষা, দ্রাক্ষার সমান চিনি । এই সমস্ত উপযুক্ত পরিমাণ মধুব সহিত মাড়িয়া ১ মাসা পরিমিত মোদক প্রস্তুত করিবে । প্রাতে, দুগ্ধে সহিত সেবা ।

পিত্তজ শিশুরোগের লক্ষণ ।—পিত্তদূষিত শিশু পান করিলে শিশুর শবীরের উষ্ণতা পিপাসা, ঘর্ম, মলের তরলতা, কামলা রোগ, এতদ্বিত্তি নানা প্রকার পিত্তজ রোগ জন্মে ।

চিকিৎসা । ধাইফুল, বেলশুঠ, ঘন্যা, লোধ, ইন্দ্রযব, বাল্য, সমুদায় চূর্ণ সমভাগ মধুর সহিত মিশাইয়া সেবা ।

দাড়িম বীজ, জীরা, নাগেশ্বর চূর্ণ সমভাগ মিশাইয়া চিনি ও মধুব সহিত লেহন করিতে দিবে ।

কফজ শিশুরোগের লক্ষণ —শ্বাসদূষিত শিশু পান করিলে শিশুর লালাজীব, শবীরেব জড়তা, অতিশ্রী, শোণ, ঘর্ম, চক্ষু রক্তবর্ণ, শ্বাসপ্রাণিত অন্যান্য প্রকার রোগ জন্মিতে পারে ।

চিকিৎসা ।—পাৰা, গন্ধক, প্রত্যেক ৩ তোলা স্বর্ণমাস্কিক ২ মাসা ; কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া লৌহপাত্রে ভৃঙ্গবাজ, কেশুরিয়া, নিসিন্দা, কাকমাটী, গিমাশাক, ছড়ছড়ে, শালিঞ্চ, থুলকুড়ি, এই সমুদায়ের রসে ভাবনা দিয়া সর্ষপাকৃতি বটী করিবে । ইহার নাম “বালরোগান্তক রস ।”

রামেশ্বর রস ।—পাৰা, গন্ধক, স্বর্ণমাস্কিক প্রত্যেক ১ তোলা, কেশুরিয়া, ভৃঙ্গবাজ, গুড়ফাউনি, গিমাশাক, ছড়ছড়ে, শালিঞ্চ, থুলকুড়ি, ইহাদের প্রত্যেকের রসে ১ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ইহাতে মবিচ ।

তোলা, শ্বেত অপবাজিতা মূল ০ তোলা মিণাইয়া সর্ষপাকৃতিষটীকা প্রস্তুত করিবে।

৩ বাতপিত্তজ শিশুরোগের লক্ষণ।—বাতপিত্তজ দূষিত স্তনের দুগ্ধ পান করিলে শিশুর যে বোগ হয়, তাহাতে বাত ও পিত্তজ শিশু-বোগেব সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।—ঘৃত ৪ সেব।—কল্কার্থ বচ, কুড়, ব্রহ্মী, শ্বেত সর্ষপ, অনন্তমূল, সৈন্ধব, পিপ্পলী, মিলিত ১ সের। ইহার নাম “অষ্টমঙ্গল ঘৃত।”

শঙ্খপুষ্পী তৈল।—তিল তৈল ৪ সের চোর কাঁচকী, ঘোড়া-নিম, বাসক, অর্জুন, ইহাদের রস বা কাথ প্রত্যেক ৪ সের, কাঁজি ৪ সের, লাঙ্গাব জল ৪ সের। কল্ক দ্রব্য—দাড়িম ফলের খোলা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হবিডকী, আমসা, বহেড়া, রক্তচন্দন, বেণাব মূল, বালা, শ্বেত-চন্দন, যষ্টিমধু, সুখা, শ্যামালতা, শৈবাল, শেফালী ছাল, রক্তোৎপল মূল ও রসোত মিলিত ১ সের কল্ক পাক হইলে পর যথাবিধি গন্ধ পাক করিবে।

বাতশ্লেষ্মজ শিশুরোগের লক্ষণ।—বাতশ্লেষ্মদূষিত স্তন-পানে শিশুর যে রোগ হয়, তাহাতে বাত ও কফজ শিশুরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।—রসসিদ্ধর, মুক্তা, স্বর্ণ, অভ্র, লৌহ এবং স্বর্ণমাস্কিক সমানভাগে ঘৃতকুমারীর বসে মাড়িয়া মুগের ন্যায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। অন্নপান দুগ্ধ ও চিনি ইহার নাম “কুমার কল্যাণ রস।”

শিশুদিগের আভ্যন্তরিক বেদনা জ্ঞানের উপায়।—স্তন-পায়ী শিশু কথা কহিয়া মনোভাব প্রকাশ করিতে পারে না, অতএব চিকিৎসকগণ শিশুদিগের বেদনার ন্যূনাধিক্যমুসারে যাতনার ন্যূনাধিক্য বুঝিয়া লইবেন।

কন্থনক রোগের লক্ষণ।—দূষিত স্তনদুগ্ধ পানে শিশুদিগেব অক্ষিপুটে অর্থাৎ নেত্রাবরণে কণ্ডু ও আবযুক্ত যে ফুস্ফুড়ি জন্মে, তাহাতে শিশুরা ললাটে, অক্ষি ও নাসিকা পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ কবে এবং চক্ষু উন্মীলন ও বোজের দিকে নিবীক্ষণ করিতে পাবে না।

গারিগর্ভিক রোগের লক্ষণ — স্তনদুগ্ধ অতিরিক্ত পান করিলে বা পান না কুবিলেও শিশুর কাস, অগ্নিমান্দ্য, অকচি, বমি, তন্দ্রা, শবী-বেব ক্লান্ততা ও ভ্রম জন্মে, তাহাকে পাবিগর্ভিক কহে সাধাবশে ইহাকে ঐডেলাগা বলে । ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধিকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।

তালুকণ্টকের লক্ষণ । তালুমাংসস্থিত কফ দূষিত হইয়া তালু-মাংস উন্নত করে, তজ্জন্য শিশু অনায়াসে স্তনপান করিতে পাবে না, এবং গুল্মে অকচি, বমি, ভবল মল, বিরেচন, চক্ষু, কণ্ঠ ও মুখে বেদনা হয় ; বোগী গ্রীবা অতি কষ্টে ধারণ কবে ।

মহাপদ্য বিসর্পের লক্ষণ ।—শিশুর মস্তকে এবং বস্তিস্থানে অর্থাৎ মূত্রাশয়ের উপরে ত্রিদোষ রক্তপদ্যবর্ণ প্রাণনাশক বিসর্প উৎপন্ন হয় । মস্তকজাত বিসর্প কপালেব প্রান্তদেশে ও হৃদয়ে চলিয়া যায় এবং বস্তিজাত বিসর্প মলদ্বার পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া থাকে । ইহাকে মহাপদ্য বিসর্প কহে । পবন্ত ক্ষুদ্র বোগে বর্ণিত অজগন্ধা ও অহিপুতনা নামক রোগদ্বয়ও বালকের হইয়া থাকে ।

অপর শিশুরোগ ।—পূর্বেোক্ত বোগ ভিন্ন জ্বর, অতিসার, গ্রহণী প্রভৃতি রোগও শিশুদিগেব জন্মিয়া থাকে ।

গ্রহপীড়িত শিশুর সামান্য লক্ষণ ।—প্রমুত্তিব অশুচি আচ-রনে সখাদি গ্রহগণ নবওষ্মত শিশুদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে । ইহাতে সাধাবশতঃ শিশু কখন উদ্বিগ্ধচিত্ত, কখন ভীত, কখন বা রোদন করিয়া থাকে । নখ ও দন্ত দ্বারা স্বীয় বা ধাত্রীর অঙ্গ বিদ্বারণ, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, মুখনির্গত নিরন্তর ফেনোদ্বমনও করে । অধিকর্ষ হাই, উর্দ্ধদৃষ্টি, কঠে শব্দ, জমজ্বালন, পাতলা দান্ত, অনিদ্রা, শবীরের ক্লান্ততা, চক্ষুতে শোথ, স্বরভঙ্গ, শরীরের মাংস ও পেশীনিতে শব্দ, আহাবে অপটুতা জন্মে ।

গ্রহপীড়িতের বিশেষ লক্ষণ ।—বোগীর এক চক্ষু হইতে জলজাব, শরীর ঘর্গাক্ত, বোগী স্পন্দিত, কন্পিভ, মুখ বক্র, শবীর রক্তের গন্ধযুক্ত, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ও স্তনপানে অনিচ্ছুক হইয়া থাকে ।

স্কন্দাপস্মারের লক্ষণ ।—ইহাতে শিশু অজ্ঞান হইয়া ফেলা

নির্গত কাবু অথবা সজ্ঞানে থাকিয়া অতিশয় বোদন কবে শব্দীবে বক্র ও পুষ্ট্যেব আয় গন হইয়া থাকে

শকুনি পীড়িতের লক্ষণ ।—এই বোগাক্রান্ত বালকেব শব্দীবে শিথিল, বেদনায়ুক্ত, মাংসভোজী পক্ষিব আয় দুর্গন্ধবিশিষ্ট হয় ও শব্দীবে জ্বালাযুক্ত ফোঁটক জন্মে এবং ইহা পাকিয়া পুষ্ট্যাব হয় শিশু এই বোগে ভয়ে চমকিয়া উঠে

রেবতীগ্রহ পীড়িতের লক্ষণ ।—ইহাতে শিশুব শব্দীবে পক্ষিব গন্ধ, ফোঁটক ও ব্রণ জন্মে এবং ইহা হইতে বক্র্যাব হয়, এতদ্ভিন্ন পাতলা দান্ত, জ্বর ও জ্বালা হয় ।

পূতনাগ্রস্তের লক্ষণ ।—ইহা কর্তৃক অভিভূত বালকেব অতি সর্ব, জ্বর, তৃষ্ণা, বক্রদৃষ্টি, বোদন, নিদ্রাব অস্পতা ও চিত্তের উদ্বিগ্নতা জন্মে

গন্ধপূতনাগ্রস্তের লক্ষণ —এই বোগগ্রস্ত বালকেব কাস, জ্বর, তৃষ্ণা, দুগ্ধপানে বিতৃষ্ণ, বমন, অতীসাব, অতিবোদন, এবং গায়ে চর্কিব, গন্ধ অন্ত্রভূত হয়

শীতপূতনাগ্রস্তের লক্ষণ —এই বোগাক্রান্ত বালকের কাস, কাস, দুর্বলতা, বমন, অতীসাব, শব্দীবে দুর্গন্ধ ও নেত্রবোগ উৎপন্ন হয়

মুখমুণ্ডতিকাগ্রস্তের লক্ষণ —এই বোগে শিশুব বদন প্রসন্ন বর্ণ ও শিবার্ভূত, গারীবে মুত্রব গন্ধ ও আত্মাব বৃদ্ধি হয়

নৈগমেয় পীড়িতের লক্ষণ ।—ইহা কর্তৃক পীড়িত বালকের কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক, উর্ধ্বদৃষ্টি, বমন, এবং কাস, মুচ্ছা ও শব্দীবে দুর্গন্ধ হয় এবং বোগী দন্ত কিড়মিড় করে

চিকিৎসা —শিশুব অতীসাব হইলে শুষ্ঠী, আতইচ, মুখা, কালা, ইন্দ্রযব, ইহাদেব কাথ প্রস্তুত করিয়া শিশুকে পান করিতে দিবে

অতীসারপীড়িত শিশুকে মুখা, আতইচ, শুষ্ঠী, কালা, ইন্দ্রযব মিলিত ২ তোলা, জল ১০ সেব, শেষ ৮০ পোয়া, এই কাথ পান করিতে দিবে । আমড়াছাল, আমছাল, জামছাল, সমুদায় চূর্ণ সমভাগ মধুব সহিত

গিলাইয়া অবলেহ প্রস্তুত করিবে এই অবলেহ সেবনে বালকের অতী-
সার ভাল হয় ।

বরাকান্তা, ধাইফুল, লোধ, অনন্তমূল প্রত্যেক ১০ তোলা, জল ০ সের,
শেষ ৮০ পোয়া মধু ০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া ধাত্রী ও শিশু উভয়কে
পান করাইলে অতীসার প্রশমিত হয়

শ্বেতজীরা, শ্বেতধূনা উভয়কে চূর্ণ করিয়া বিষ্ণুপত্রের রসেব সহিত
কিষ্টা শ্বেতধূনা গুড়ের সহিত সেবনে বালকেব আমরক্ত এবং তজ্জনিত
কামড়ানি নষ্ট হয়

বালকেব রক্তাতীসারে মোচবস, ধাইফুল, বরাকান্তা, পদ্মকেশর
পেষণ করিয়া যবাগু প্রস্তুত করতঃ পান করাইবে ।

খই, যষ্টিমধু, চিনি, মধু, সমুদায় তুলেদিকে পেষণ করিয়া সেবন
করাইলে বালকেব আগাশায় নষ্ট হয় ।

বেলশুঠ, বালা, ইন্দ্রযব, মোচবস, মুখা মিলিত ২ তোলা, ছক্ক ১০
পোয়া, জল ১/১ সেব, শেষ ১ পোয়া । ইহা পান করিলে বালকেব গ্রহিণী
প্রশমিত হয়

গ্রহিণীবোগাক্রান্ত বালকে ছাগছক্ক ও জামছালেব বস সমভাগে
পান করাইবে

পূর্কোক্ত 'কুমারকণ্ঠ্যাম রস' পাবিগর্ভিক বোগেও ব্যবহৃত হয় ।

বালচাক্ষেরী ঘৃত ।—ঘৃত ৪ সেব আগকলেব বস ৪ সেব ।
ছাগছক্ক ৪ সের । কল্কার্থ—কয়েতবেল, ত্রিকটু, সৈন্ধব, বরাকান্তা, উৎ-
পুল, বালা, বেলশুঠ, ধাইফুল, মোচবস মিলিত ১/১ সেব, ইহা স্বন্দা-
পান্যাবে প্রয়োগ করিবে

লাক্ষাদি তৈল ।—তিলতৈল ৪ সেব, লাক্ষার কাথ ৪ সেব, দধিব
গাত ১৬ সেব । কল্কার্থ—বটনা, বটচন্দন, কুড়, মুখা, অশ্বগন্ধা, হবিজ,
দাকহবিজা, গুলফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, মুগক মূল, কটুকী, রেণুক, মিলিত
১/১ সের । ইহা স্বন্দাপান্যারে প্রয়োগ করিবে ।

পিপ্পলাদ্য ঘৃত ।—ঘৃত ৪ সের । কল্কার্থ পিপ্পলী, ধাইফুল,
জামলা, কেশব, বট, মুর্কীমূল, গুলঞ্চ, আকমাদি, কটুকী, আতাইচ, মুখা,

মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, কঁকলা, ক্ষীবকঁকল, ঋদ্রি, ঝুদ্রি, জীবন্তী ও যষ্টিষধু মিলিত ১ সেব, যথাবিধানে পাকক্রিয়া করিবে ।
ঈষদুষ্ণ জলেব সহিত যথায়োগ্য মাত্রায় ব্যবস্থেয় । শিশুব দন্তোদ্যামেব সময় এই স্নাত সেবনে দন্তোদ্যামকালীন সমস্ত পীড়া নষ্ট হয়

হোগিওপ্যাথিকে শিশুচিকিৎসা ।

ওলাউঠা ।—চিকিৎসা আবস্তে শবীর উষ্ণ, জ্বতনাড়ী, অনিদ্রা, মল সবুজ, জলবৎ অথবা আঠাবৎ স্লেষ্মা, মলত্যাগেব সময় ও পূর্বে কর্তনবৎ বেদনা এবং কোঁৎপাড়া থাকিলে “য্যাকোনাইট” দিবে

অবস্থা অতি মন্দ হইয়া ঈষৎ পীত অথবা তবল সবুজ মলত্যাগ করিলে এবং মলত্যাগেব পূর্বে উদবে চিম্টিকাটার স্থায় বেদনা ও জমাট দুগ্ধ বমন হইলে “এথুসাসিম্” ব্যবহার করিবে

জিহ্বা সাদা আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত, মুখ ও ওষ্ঠ অভিশয় শুষ্ক, তৃষ্ণা-বহিত, আঠাবৎ স্লেষ্মা অথচ চাপ, দধি বমন এবং প্রচুব পরিমাণে জলবৎ মলত্যাগ করিলে “এন্টিমন ক্রুড্” দিবে

জিহ্বা শুষ্ক এবং উজ্জ্বল, ক্ষুধা তৃষ্ণা-বহিত, মল ঈষৎ সবুজ পীত, আঠাবৎ স্লেষ্মা, মলত্যাগেব সময়ে কামড়ানি ও কোঁৎপাড়া থাকিলে “এপিস্‌মেল্” ব্যবহার করিবে

মৃতবৎ মুখগ্রী, চর্ম শুষ্ক এবং সঙ্কোচিত, মল ঘন, ঘোব অথবা ঘোব জলবৎ, দুর্গন্ধবিশিষ্ট ও মলত্যাগেব পূর্বে কর্তনবৎ বেদনা থাকিলে “আর্শেনিক” বিশেষ উপকারী ।

মুখমণ্ডল আবতিম, মুখ এবং ওষ্ঠ উভয়েই শুষ্ক, জিহ্বাব মধ্যভাগ সাদা আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত, পার্শ্ব লাল, মল তবল, সবুজ শৈথিল্য বা বক্রমিশ্রিত শৈথিল্য হইলে “বেলোডোনা” দিবে

উদযাময় এবং বমন উভয়ই আছে কিন্তু বমন অধিক, যাহা আহার কবে এবং পান কবে সমস্তই উঠিয়া যায়, উদর স্ফীত এবং চক্ষু চাবিদিকে নীলবেখা থাকিলে “বিসমণ্” দিবে

মুখমণ্ডল অতিশয় ফিকা অথবা সাদা পীতবর্ণ মল অল্প বহু-বিশিষ্ট, আচ্ছাদিত মলভাগ ও দুর্গন্ধ, শব্দেব্রায়ায় গন্ধ থাকিলে “কার্ব-ভেজ্” দিবে

মুখমণ্ডল লাল এবং গবমূলসহ সবুজ জলবৎ ক্ষয়কারী মলভাগ এবং উচ্চ ডিম্বেব্রায়ায় সাদা পীত শ্বেতা মিশ্রিত হইলে “কেমোমিনা” দিবে

নিম্নোদবেব্রায়ায় স্ফীততা, মল পীতবর্ণ জলবৎ অজীর্ণকণ বহির্গত হইলে “চায়না” দিবে

নাসিক চুলকানি এবং খুঁতুক্ষেপ কবা, ঠোঁটের গায়েব্রায়ায় সাদা মল ও নিম্নোদবেব্রায়ায় দস্ত ঘর্ষণ করিলে “সিনা” দিবে

শুক্ল দস্তবৎ ওষ্ঠ, বমনোদবেব্রায়ায় জল পীতজলবৎ, ঘোর সবুজ আভাযুক্ত, পীত মল দৃষ্ট হইলে “ক্রোটন” ব্যবহার করিবে

শব্দেব্রায়ায় শুষ্ক ও উত্তপ্ত, পীতল জলপানেচ্ছা, মল পীত অ’ভ’যুক্ত, সবুজ জলবৎ বা দস্তবৎ সাদা, মলভাগেব্রায়ায় সময়ে ও তৎপূর্বে বেদনা থাকিলে “ডাল্‌কামারা” দিবে

মুখ ফিক, চক্ষু নীলবেখাবেষ্টিত, পীতআভাযুক্ত, জিহ্বা সাদা আবরণে আচ্ছাদিত, প্রায় সর্বদা বমনোদবেব্রায়ায় ও বমন, ভুক্ত দ্রব্য ও শ্বেতা অধিক পরিমাণে বমন এবং মল ঠিক যোগেব্রায়ায় সবুজ হইলে “ইপিক’কু” ব্যবহার করিবে

ওষ্ঠ শুষ্ক, মুখগহ্বরেব্রায়ায় কোণে ক্ষত, জিহ্বা যেন পীলকে আচ্ছাদিত, মল গন্ধকেব্রায়ায় মত পীত-বহু-বিশিষ্ট এবং কখন আঠাবৎ, কখন বা অল্প লাল হইলে “মাকু’বিয়স্” দিবে

জিহ্বা যেন পীতভিত্তি, সাদা আচ্ছাদনযুক্ত, মাড়ী স্ফীত, মুখে দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত, মল অল্পাধিকবিশিষ্ট এবং শ্বেতা বমন করিলে “নক্সভমিকা” দিবে

চক্ষু ফিকা এবং কোঠবেব্রায়ায় প্রবিষ্ট, নীল-বেখা দ্রব্য প্লবিবেষ্টিত, মল সাদা জলবৎ ও দুর্গন্ধযুক্তব্রায়ায় চাপ হইলে “কস্‌ফাস্” দিবে

জিহ্বা আটাবৎ শ্লেষ্মা দ্বাৰা আবৃত, তৃষ্ণাবহিত, মল পরিবর্তনশীল, হুই মলে বর্ণগত পার্থক্য, বাত্রিতে বৃদ্ধি, মলত্যাগের পূর্বে মলশায়ে গভীর শব্দ ও মলত্যাগের সময় শীতানুভব হইলে “পল্‌মেটিল” ব্যবহার করিবে

বৃহৎ মস্তকবিশিষ্ট শিশু শরীরের বস নির্গত হওয়ার উপযোগী কাটা খা, মল তবল আটাবৎ ফেণ্ডুক্ত অথবা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা, বেদন এবং উদর স্ফীত থাকিলে “সিলিসিয়া” দিবে

শিশু দিনে নিদ্রিত; বাত্রিতে জাগবিত, মল অতিশয় পরিবর্তনশীল, হাত ও পায়ের তালুয়া অতিশয় গরম হইলে “সল্‌ফার” দিবে

শীতল জলপানেচ্ছা, শীত শীত অবসন্নতা, নিশ্বাস অববোধ, অতিশয় দুর্বল এবং পীতবর্ণ জলবৎ মল প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইলে “থুজা” ব্যবহার করিবে

কপালে শীতল ঘর্ম, ওষ্ঠ শুষ্ক এবং কাল অত্যন্ত তবল বস্তু পানে বমন বৃদ্ধি, অল্প চালনাতে বমন বৃদ্ধি, মল সবুজ জলবৎ এবং মলত্যাগের সময়ে কপালে শীতল ঘর্ম হইলে “ভেরাটম এল্বম” বিশেষ উপকারী।

জন্মের পর চিকিৎসা। জন্ম হইবার অব্যবহিত পরেই শিশুকে এক খণ্ড ফ্ল্যানেল দ্বাৰা জড়াইয়া বাঁধা কর্তব্য, কারণ, ব্যবহার দ্বাৰাই শিশু বায়ুর দোষ গুণ সহ্য করিতে শিক্ষণ করে। গরম জল দ্বাৰা শবীর ধৌত করা কর্তব্য, কিন্তু অধিকক্ষণ ধৌত করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ঘবটী নির্জন এবং অন্ধকারায় হওয়া উচিত। গন্ধদ্রব্য, দুধে বাঁধা উচিত। বালককে প্রত্যহ দুইবার স্নান করান উচিত। ইহা দ্বাৰা ~~ত্বক~~ বাৰ্ষ্য পবিলক্ষিত হয়; প্রাতঃকালেই শিশুকে স্নান করান কর্তব্য। যখন বিছানা ছইতে উঠান যায়, তখন স্নান করান কর্তব্য এবং বাত্রিতে শুইবার পূর্বে স্নান করান বিধি। মস্তক ভিন্ন মৃদুদ্রব্য শবীর জলে ডুবাইয়া স্নান করানই বিধিযুক্ত

অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, জননী শিশুর সর্বদেহ বস্ত্র দিয়া বাঁধেন, কিন্তু একপা করা কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ একপা কবিলে শিশুর কে ন হৃদয় বিকৃত হইয়া মাইতে পাবে এবং শিশু চিরকাল ক্রম

হইয়া থাকিতে পাবে জন্মের পবই প্রায় দুই তিন ঘণ্টা শিশু নিদ্রিতা-বস্থায় থাকে, তাহার পব তাহার আপন ইচ্ছায় নিদ্রা ভঙ্গ হইলে মাতার বুকের নিকট দেওয়া উচিত এবং সেই সময়ের মধ্যে মাতাও বেশ ভল্লি হইয়া উঠেন । যদি সন্তানদিগের মল মুত্রত্যাগ না হয়, তাহা হইলে তাদৃশ ব্যস্ত হইবার কোন আবশ্যক নাই দুই এক চামচা সরবত গবম করিয়া দিলে এই কার্য হইতে পাবে তাহাতেও যদি বালক স্নেহতা বোধ না করিব, তাহা হইলে প্রত্যেক ছয় ঘণ্টা অন্তর “ওপিয়ুম,” “নক্সডমিকা,” “ব্রাইওনিয়া” লক্ষণানুসারে দেওয়া উচিত ।

বালকদিগের চক্ষুর উত্তেজনা ।—অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় শিশুগণ চক্ষুব ব্যাধিবাম হইয়া জন্মগ্রহণ করে ইহার কারণ প্রায় এই যে, যে মাতার শ্বেতপ্রদর বহির্গত হইতে থাকে, যদি তাহা শিশুর চক্ষে লাগে, তাহা হইলে এই বোগ জন্মে ।

চিকিৎসা ।—যদি চাণাবশত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর “একোনাইট” এবং “ক্যামোমিলা” পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা উচিত তাহার পব তিন দিবস দিবা রাত্র “আর্জেন্টাম নাইটিকাম” ব্যবহার করিবে অনেক সময় “ইউফ্রসিয়াব” বহু প্রয়োগে এবং সেবনে উপকার পাওয়া যায় ।

মাথা ঠাণ্ডা —বালদিগের প্রায়ই এই ব্যাধিবাম হইয়া থাকে নাসিকা বন্ধ হইয়া যায় এবং নিশ্বাস ফেলিতে ও চুষি থাইতে যতনা পাইয়া থাকে আহারকালীন বন্ধ হইতে একরূপ শব্দ উদ্ভিত হয় ; ভিজা গামছা রাখিলে দুই দিনের মধ্যে আঁবাম

চিকিৎসা ।—যদি চর্মগরম থাকে, জ্বরবোধ হয় এবং অস্থিবতা থাকে, তাহা হইলে “একোনাইট” প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে

যদি জ্বরভাব বা চলিয়া গেলেও বাধ বৃদ্ধি বোধ হয়, বিশেষত যদি কাশি থাকে, এবং বুকে শব্দ হয়, মুখ লাল এবং বিকৃত পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায় ও সবুজ বর্ণের মল থাকিলে “ইপিকাকিউয়েনহা” প্রত্যেক চারি ঘণ্টা অন্তর দিবে ।

ঠাণ্ডা, অস্থিমধ্যে ক্ষত, চক্ষুর উত্তেজনা, নাসিকা হইতে পাতলা এবং জলবৎ শ্লেষ্মা নির্গত হইলে “জেলুমিনিয়া” দিবে ।

কঠ পর্ষ্যস্ত যখন বিস্তৃত অল্পভব হয় এবং নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিলে “কালিবিচ” ব্যবহার করিবে

মাত্রা । প্রত্যেক ঘণ্টা অন্তর ।

চীৎকার এবং জাগ্রত হওন বালকগণ যে প্রায়ই চীৎকার করিয়া কাদিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের একটা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের যন্ত্র পীড়িত এবং বন্ধস্থল বিস্তৃত হয় যখন চীৎকার করিয়া কাদটা খুব ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে এবং অতিবিক্ত বলিয়া বোধ হয়, তখনই তাহার উপশমজন্ত চেষ্টা পাওয়া কর্তব্য, বিশেষতঃ যদি কোন বাহ্য কারণ থাকে অর্থাৎ অযথা বস্ত্র স্থাপন বা কোন পিন্ গায়ে ক্ষুটিলে তাহার প্রতিকার কর্তব্য

চিকিৎসা ।—যখন বালকটী অত্যন্ত কোমল, অজীর্ণতাবশতঃ চীৎকার করিতে আরম্ভ কবে, সমস্ত শবীর বেননায় সঙ্কুচিত কবিতে আরম্ভ কবিলে, গাদা সবুজবর্ণের জলীয় মল নির্গত হইতে থাকিলে “ক্যামো-মিনা” দিবে

মাত্রা ।—এক ঘণ্টা অন্তর

যখন বিশেষ কারণ দেখা যায় না, এবং শিশু অত্যন্ত খিট্ খিটে এবং রাগী হইয়া উঠে, প্রায়ই মুহুমুহু জাগিয়া উঠে এবং অশেষক্ষণ ধরিয়া কাদিতে থাকিলে, “বেলেডোনা” ব্যবস্থেয় ।

মাত্রা ।—এক ঘণ্টা অন্তর

হঠাৎ বিশ্রাম ভঙ্গ হইলে কিম্বা বালক ঘুমাইতে ইচ্ছা কবিতেছে, অথচ ঘুমাইতে পারিতেছে না, এই সমস্ত কাবৎ বশতঃ যদি চীৎকার করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ কবে, তাহা হইলে “কফিয়া” বিশেষ উপকারী

মাত্রা ।—অর্ধ ঘণ্টা অন্তর

যখন চক্ষু উন্ম বোধ হয়, অস্থিরতা থাকে, তখন “একোনাইট” দিবে মাত্রা প্রত্যেক অর্ধ ঘণ্টা অন্তর

হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিলে, কোষ্ঠবদ্ধ এবং হাত পা টানিয়া দাইলে “নক্সা-ভমিকা” দিবে মাত্রা প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর

উদর পরিপূর্ণ থাকিলে, কুদ্রব্য ভোজন করিলে, কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরাময় থাকিলে “পল্‌সেটিলা” দিবে মাত্রা প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর

আহাৰ পৰিবৰ্ত্তন হওয়া আবশ্যিক । বালকেবা অনেক সময় দুগ্ধ সেবন ক'বিয়া উদর পূর্ণ করে এবং অব্যব তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি ক'বিয়া ফেলে; এই বমি জমিয়া ঠিক দধির মত জ্বাৰুতি ধাবন করে যখন প্রায়ই এইরূপ হইতে আবদ্ধ হয়, তখন শিশু ক্ষীণ ও দুৰ্বল হইয়া পড়ে ।

চিকিৎসা ।—অধিক বয়স্ক বালকের ঐ ব্যাঘবাম হইলে, কিম্বা যদি বোগ অতিবিক্ত আহাৰ জন্ম হয়, তাহা হইলে “ইপিকার্কিউয়েনহা” দ্বারা বিশেষ উপকার লাভ কবা যায় মাত্রা প্রত্যেক ঘণ্টা অন্তর ।

বমি ও উদরাময় থাকিলে এবং পূৰ্ব্বোক্ত ঔষধ ব্যবহার ক'বিয়া ফল না পাইলে “পল্‌সেটিলা” ব্যবহার ক'রিবে মাত্রা প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর

অতিরিক্ত উদর পূর্ণতা জন্ম খুব বেশী বমি হইলে “এণ্ডিমোনিয়াম্‌ জুডাম্‌” দিবে । মাত্রা প্রত্যেক তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর

দুৰ্গন্ধময় উদগীরণ এবং এক গাও লাল ও এক গাও পাণ্ডুবর্ণ হইলে “ক্যামোমিলা” দিবে মাত্রা প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর

কোষ্ঠবদ্ধ ।—এই ব্যাঘবাম বা কদিগেব প্রায় সচরাচর হইয়া থাকে, মাত্রা ব্যাঘবাম থাকিলে সম্ভানের প্রায়ই হইয়া থাকে আহাৰ কিম্বা শরীর পরিচালনার অভাবে যদি ব্যাঘবাম উপস্থিত হয়, তবে সামান্য যত্ন লইলেই প্রকৃতিস্থ হয়

চিকিৎসা ।—“ওপিয়াম্‌,” “লুইওনিয়া,” “মার্কিউরিয়াম্‌,” “নক্সা-ভমিকা” বা “সল্‌ফার দিবেল্‌”

পেটের অস্থিরতা কাৰু ।—অনেক সময় শিশুবালকদিগকে জোলাপ দেওয়া হইয়া থাকে কুদ্রব্য ভোজন হইতে অজীর্ণতা হইয়া এই ব্যাঘবাম উপস্থিত হয়

চিকিৎসা ।—কুদ্রব্য, অল্প ভোজন, শীতলতা লাগা, কিম্বা দুগ্ধ উঠি-

বার সময় মুখ লাল বর্ণ হইয়া গেলে ও পেটের ভিতর শক্ত বোধ হইলে “ক্যামোমিলা” দিবে । মাত্রা প্রত্যেক তিন চারি ঘণ্টা অন্তর ।

“ যদি বালক যন্ত্রণাবশতঃ অত্যন্ত চিৎকার কবে ও তাহার শব্দ হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ বহির্গত হয়, তাহা হইলে “বিয়াম” বিশেষ উপকারী মাত্রা প্রত্যেক তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর ।

অজীর্ণতা বশতঃ পেটের অম্লত্ব হইলে, ক্ষুধার অভাব ও বিটখিটে স্বভাব হইলে “পল্‌সেটিলা” দিবে । মাত্রা তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর ।

হঠাৎ কোন খাদ্য দ্রব্য পরিবর্তন হওয়াতে যদি পেটের অম্লত্ব হয় এবং বমি হয়, তাহা হইলে “ইপিকাকিউয়নহা” দিবে । মাত্রা প্রত্যেক তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর ।

রক্তযুক্ত জলের মত কিম্বা ডিমের ছায়া দাস্ত হইলে “মার্কিউরিয়াম” দিবে । মাত্রা প্রত্যেক চারি ঘণ্টা অন্তর ।

দাঁত উঠিবার সময় — শিশুদিগের এই সময় নানা প্রকার ব্যাধি জন্মিয়া অত্যন্ত যাতনা দিয়া থাকে । পাঁচ কি ছয় মাস হইতেই শিশুর দাঁত উঠিতে আরম্ভ হয় । যদি বিশুদ্ধ বায়ু এবং আহারের প্রতি বিশেষ যত্ন থাকে, তাহা হইলে দাঁত উঠিবার সময় তত কষ্ট হয় না ।

চিকিৎসা ।— জ্বর বোধ হইলে, উষ্ণতা অস্থিরতা থাকিলে “একো-নাইট” দিবে । মাত্রা প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর ।

সামান্য গোলমালে জাগিয়া উঠা, অত্যন্ত শ্লিপাসা, নিদ্রার সময় হাত পা খেঁচা, সর্দির ও পেটের অম্লত্ব থাকিলে “ক্যামোমিলা” দিবে । মাত্রা প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর ।

পেটের ব্যায়বাস আরাম না হইলে, “মার্কিউরিয়াম” দিবে । মাত্রা প্রত্যেক তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর ।

মুখ দেখিয়া বালক যাতনা পাইতেছে বোধ হইলে এবং বালক যদি আলো ও গোলমাল ভয় বরৈ, তাহা হইলে “বেনেডোনা” দিবে । মাত্রা প্রত্যেক দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর ।

বালক কঁপ হইয়া পড়িলে, দাঁত উঠিতে কষ্ট বোধ হইলে “ক্যালক-রিয়া” দিবে । মাত্রা প্রত্যহ সকালে ও বিকালে ।

জিহ্বা স্বাদশূন্য ও * ও বোধ হইলে এবং দুর্বলতা থাকিলে, “নক্স-ভমিকা” দিবে । মাত্রা ও তাহ প্রাতে ও বিকালে

মূর্ছার কারণ পিতা মাতার ব্যায়বাম থাকিলে শিশুতে তাহা বর্তিয়া থাকে ; বিশেষ দাঁত উঠিবার সময় ঐ ব্যায়বাম প্রবল হইয়া উঠে কোনরূপ স্ফোটক ইত্যাদি শবীরে উঠিতে আবস্ত করিলে তাহা বলপূর্ব্বক দমন করা, কীট আঘাত বা ভ্রম প্রভৃতি কাবনে মূর্ছা রোগ উৎপন্ন হয় ।

লক্ষণ ।—প্রায়ই বলশালী বালিকাবালিকাদিগেবই এই ব্যায়বাম হইয়া থাকে হাত প খেঁচাও বক্রকবণ, চক্ষু ব তাবা যেন ডুবিয়া গিয়াছে বোধ হয় ইহা কখন ক্ষণস্থায়ী এবং কখন বা অধিকক্ষণ থাকিয়া বোগীকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দেয়

আনুসঙ্গিক উপায় । যখন কোন ডাক্তার বা বৈদ্য নিকটে থাকে না, সে সময়ে এই ব্যায়বাম আবস্ত হইলে এইরূপ করা উচিত,—যতদূর উষ্ণ জল সহ্য হইতে পারে, সেই পরিমাণে জল গবম করিয় বালকেব জালু পর্য্যন্ত প্রায় দশ মিনিট কাল ডুবাইয়া রাখা উচিত প্রথম-বার এইরূপ করায় যদি উপশম না হয়, তাহ হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ভাল হয়, ততক্ষণ ঐরূপ করিবে যদি ঐ ব্যায়বামেব কাবণ জানা যায়, তাহ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহ দূর করিতে চেষ্টা করিবে

চিকিৎসা ।—ভয়ভিত্তি মূর্ছা হইলে “ওপিয়াম,” “একোনাইট” কিম্বা “বেলেডোনা” দিবে ।

কোনরূপ আঘাত হইতে হইলে ‘আর্ণিকা’, ‘সিমিকিউটা’ কিম্বা “বেলেডোনা” দিবে

অমৃজাত মূর্ছা হইলে “ক্যামোমিলা”, “নক্সভমিকা”, “বেলেডোনা” ; অনিবিষ্ট ভোজন কিম্বা খাবাপ আক খাওয়ার জন্য হইলে “ইপিকাক,” “নক্সভমিকা,” “পল্‌মেটীলা” দিবে

রাগ কিম্বা অন্য কোন মানসিক বৃত্তি হইতে উৎপন্ন হইলে “ক্যামোমিলা” দিবে

কীটদংশন জন্য হইলে “সিনা” “সিমিকিউটা দিবে ”

চক্ষুপ্রদাহের কারণ ।—অত্যন্ত আলো কিম্বা অগ্নব উত্তাপ চক্ষু লাগিলে ইহা জন্মে

চিকিৎসা ।—জ্বর থাকিলে এবং নাড়ী দ্রুতগতিবিশিষ্ট হইলে “একোনাইট” বিশেষ উপকাৰী মাত্রা প্রত্যেক দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর ।

চক্ষু লালবর্ণ হইলে “বেলেডোনা” দিবে মাত্রা তিনবার কবিয়া প্ৰথম সেবন করিতে হইবে

আঁধার আঁধার বোধ হওয়া, চক্ষুব দুর্বলতা এবং লালবর্ণ হইলে “ক্যাকটাস্” দিবে । মাত্রা প্রত্যহ তিনবার

আঁধার বোধ হইলে এবং চক্ষু নাড়ীতে কষ্ট বোধ হইলে “স্পিজি-লিয়া” দিবে । মাত্রা প্রত্যহ তিনবার ।

সমুদয় অম্পষ্ট দেখিলে, চক্ষু শুষ্ক বোধ হইলে এবং পাত খুব ভারি বোধ হইলে “জেলুমিনিয়াম্” দিবে মাত্রা প্রত্যহ তিনবার ।

চক্ষু অস্বাভাবিক যাতনা বোধ হইলে “হেমামেলিস্” দিবে মাত্রা প্রত্যহ তিনবার ।

কোনরূপ আঘাত হইতে উপন্ন হইলে “আর্গিকাব” লোমন ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকাৰ হয় মাত্রা প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবে

চক্ষু দিয়া জল পড়া কোনরূপ বিশেষ কারণ হইতে উপন্ন হইলে “ইউফ্রেসিয়া,” “স্পিজি-লিয়া” দিবে মাত্রা সকালে ও বিকালে

পূর্ববর্তী কোন কারণ না থাকিলে “সিপিগা” ও “সল্ফার” ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকাৰ হয় প্রত্যহ সকালে ও বিকালে এইরূপে, প্রয়োগ করিতে হইবে ।

হাকিমীমতে শিশুচিকিৎসা ।

শিশুদিগের অতি সহজেই সর্দি, অজীর্ণ, উদগার ও বমনাদি রোগ জন্মিয়া থাকে

সন্ধি ব ঘুংড়ি হইলে হ কিমীমতে কামবোগ চিকিৎসায় বেঁটমন্ডব-
নবঃ ভাষ্যনিখিত হইয়াছে, তাহা অর্দ্ধাধ ন পবিমানেন প্রাণে ও সন্ধ্যায়
অর্দ্ধ তোলা জলেব সহিত খাওয়াইলে সন্ধি ওবল হইয়া উঠিতে প'কে
এবং সন্ধ্যা ঘুংড়িব উপশম হয়

উপায়ান্তর ।

ময়ূরপুচ্ছ ভক্ষ্য কবিত মধুর সহিত মিত্তিত কবিতঃ দিবসে ও ব নি-
কালে ২। ৩ ঘট অনুব জিহ্বায় লাগুইয়া রাখিলেও নিলক্ষণ উপকাব
দর্শে

শিও অনেক সময় অনববত বাদিতে থাকে, সে' কান্না কিছুতেই
নিবৃত্তি পায় না, কোষ্ঠবদ্ধই এই বেগেব প্রশ্নান কাবঃ বলিয়া জানিতে
হইবে যদি তাহাই হয় তবে উচ্ছেপাতার বস ১ তোলা খাওয়াইয়
দিগেই দাত্ত পবিদ্ধাব হইবে ও কান্নাব নিবৃত্তি পাইবে

কেহ কেহ শি এদিগেব দাস্ত কবাইবাব জন্ত নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন
ক'বন পুস্তকতন ত্রিভিভীব শস্য সঙ্গায় পবিমানেন পানেনব নোট চ ব
মল্লাবে প্রবিষ্ট কবাইয়া রাখিলে কিছু পবে দাস্ত হয়

যুক্তাবর্মী নামক উদ্ভিদেব পাও কে মাটিয়া উত্তমকণো গুচ্ছব বে
প্রযোগ কবিলেও কোষ্ঠ ব বিদ্ধ ব হয়

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায় ।



বিষ-চিকিৎসা ।

যে কোন প্রকার বিষই হউক, স্থি শবীবেব অভ্যস্তবস্থ হইলে
নানা প্রকার অমঙ্গলেব সম্ভাবন বিষকর্ষক যত সূত্রব আশাদ-
গেব জীবন নষ্ট হইতে পাবে, তেমন আব কিছুতেই নহে। এজন্য বিষ-
চিকিৎসা অবগত থাকিলে আমাদিগকে উপায়ে পতিত হইতে হইবে

না। বিষ বাহ্যতে আঘাদিগেব শব্দীস্থ না ছইতে পাবে, তৎপক্ষে সাবধান লওয়া কর্তব্য। কিন্তু সর্বত্র সকলকে সামান সাবধান দেখা যাম্ ন, সর্পাঘাত, বৃশ্চিকদংশন, উগ্ৰও কুকুব শৃগাল দংশন ইত্যাদি কর্তৃক সময়ে সময়ে বহুবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হয়—এমন কি অমূল্য জীবনকেও বিসর্জন দিতে দেখা গিয়াছে। এই আশুগুণশীলী অত্যা-পাতের প্রতিকারার্থে নিম্নে কতকগুলি ব্যবস্থা প্রদত্ত ছইতেছে, তদনুসারে কার্য্য কবিলে চিকিৎসককে প্রায়ই নিষ্ফল ছইতে দেখা যায় না।

সর্পাঘাত চিকিৎসা।

য্যালোপ্যাথিকে।—সর্পাঘাত ছইবামাত্র আহত স্থানের উপরিভাগে দড়ি দ্বাৰায় বাঁধিয়া লোহা গবম কবিয়া ক্ষতস্থানের চতু-র্দিকে পোড়াইয়া দিবে, তাহার পবে তুলসী দ্বাৰা নাইট্রিক য়্যানিড দ্বা মুখে প্রয়োগ কবিলে, অথবা লাইকব য়্যামেনিয়া ১০ বিস্ক ১ আউন্স জলের সঙ্গে নির্বিষ না। হওয়া পর্য্যন্ত খাইতে দিবে।

হোমিওপ্যাথিকে।—আহত স্থান অর্থাৎ ঘায়েব উপরে মুখ রাখিয়া চুমকুড়ি দিয়া চুমিয়া বিষ উঠাইয়া লইবে। পবে মুখ ধুইয়া ফেলিবে। উগ্ৰ লৌহশলাকা দ্বাৰা ক্ষতস্থানে উত্তমরূপে ভাগ দিবে। যদি এরূপ স্থানে আঘাত হয় যে, তাহার উপবিভাগে বন্ধনী দেওয়া যাইতে পাবে, তবে সেখানে উত্তমরূপে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে; তাহার পবে ক্ষত স্থানে “ভেবেটম ভিবাইডেব” গোলন প্রয়োগ কবিলে এবং প্রতি ৫ বা ১০ মিনিট অন্তর উহা খাইতে দিবে।

বৈদ্যকে।—তুলসী, হবিজা, ত্রিকটু, যমানী, দেবদারু, নিম্বছ ল, সমানভাগে জলে বাটিয়া ক্ষত স্থানে পলপ দিবে।

“ওঁ নমো ভগবতে জুগ্রীবায় সকল বিষোপজব শমনায়, উগ্ৰ কান্ধ-কুট বিষকবলিনে বিষং বন্ধ বন্ধী হব হব ভগবতো নীলকণ্ঠ্যায় ” (ইতি-হারীভ সংহিতা)

টোটকাশ—রঙ্গনাফুলেব শিকড় তৎক্ষণাৎ তুলিয়া ০ আনা আদ্রাজ ওজনে ২০ টা মবিচেব সহিত বাটিয়া ক্ষতস্থানে দিবে।

ক্ষতস্থানের উপবিভাগ চিবিয়া যদি জলের মত সামগ্রী বাহিব হয়, তবে আরুণ্ড দুবে কোন স্থান চিবিয়া দেখিলে, যেখানে রক্ত পাইবে, সেই স্থান চিবিয়া এই শিকড় বাটিয়া বসাইয়া দিবে যদি এমন হয় যে, বোগী ঔষধ গলাধঃকরণে সমর্থ নহে, তবে কচি কলাপাতার নল গলাবর্তিতব দিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া দিবে ।

মগধসীপাতাব বস ১ ছটাক আন্দাজ খাওয়াইয়া দিবে, এবং উক্ত পাতা বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে ।

সর্পাঘাত হইবামাত্র গবম গব্যামৃত অর্দ্ধ পেয়া আন্দাজ খাওয়াইয়া দিবে । তাহা হইলে বিষ পাকস্থলীগত হইয়া আপন কার্য্য করিতে অসমর্থ হইবে ।

শ্বেত করবীর শিকড় ০ আনা ২ ০ টান মরিচ দিয়া বাটিয়া খাইতে দিবে

আবধৌতিক । সর্পাঘাত হইবামাত্র ক্ষতস্থানের উপর খুব জোবে বন্ধনী দিবে, তাহাব পব একটা আটশাওড়া গাছ মূলসমেত উপড়াইয়া ত'হ'ব মূলটী চিবাইয়া তা'হ'ব রস খাইতে দিবে রোগী যতক্ষণ আটশাওড়ার প্রকৃত স্বাদ বোধ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ তাহাব দেহে বিষ আছে বলিয় জনিতে হইবে একটা শিকড় শেষ হইলেও যদি রোগী তাহার প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করিতে না পাবে, তবে আব একটা শিকড় ঐরূপে চিবাইয়া তাহার রস খাইতে দিবে ইহাতে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে অতি উত্তমরূপে এই ঔষধের ফল দেখা গিয়াছে দেখা গিয়াছে নকুলগণ সর্পদষ্ট হইয়া এই গাছের মূল চিবাইয়া তাহার রস খাইয়া থাকে ভগণী, হাওড়া ও বর্ধমান জেলার স্বর্ষত্র ও এই গাছ দেখিতে পাওয়া যায় ইহা এক প্রকার গুল্ম, উর্দ্ধে এক বা দেড় ফুটের অধিক হয় না, ইহাব ফল পক হইলে গেলাপী বজ্রের মুলার আয় দেখায়, ইহাতে অনেকেই দাঁতন করিয়া থাকেন ।

কুকুর বা শৃগাল দংশন চিকিৎসা ।

য্যামোপাধিক ।—ক্ষতস্থান অত্যাশ গোহ শলাকা ঘাবা

পোড়াইয়া দিবে, তারপর যা মুখে নাইট্রিক য়াসিডে তুলি ভিজাইয়া বসাইয়া রাখিবে ।

৩ নিশাদল ও গুড় কলিচূর্ণ একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া খারু উপর ১৫ দিন মর্দন করিবে

হোমিওপ্যাথিকে ।—ক্ষতস্থান দধি করতঃ তাহাতে “ভেরে-ট্রুম ভিরাইডেব” লোশন প্রয়োগ করিবে ও দিবসে তিনবার উহা এক এক বিন্দু ১°আউন্স জলের সহিত খাইতে দিবে

বৈদ্যকে ।—গৃহধূম, বচ, শুষ্ঠী, সর্ষপ, য়মানি, নিম্ব, ত্রিফলা, ইহাদের দ্বারা তৈল পাক করতঃ ক্ষতস্থানে মালিশ করিলে উপকার দর্শিবে

টোটকা ।—স্থলতানী বনাভের পশমী সূতা অত্যুৎপ পরিমাণে লইয়া তিন দিন পাকা কলার ভিতবে রাখিয়া খাইতে দিবে

আবধৌতিক ।—কুড়, মুখা, মরিচ, গুঞ্জাগুল, বিড়ঙ্গ, এবং যষ্টি-মধু, সমভাগে শীতল জলে বাটিয়া প্রলেপ দিবে

দংশনমাত্র ক্ষদিরমূল, নিম্বফল, অশ্বগন্ধা সমভাগে গব্য জলে বাটিয়া খাওয়াইবে ।

অন্যান্য বিষ চিকিৎসা ।

সর্প ও কুকুর শৃগাল প্রভৃতি বিষাব জঁস্ত দংশনে জীবননাশের যেক্রপ সম্ভাবনা, অন্যান্য স্থাবর (কার্টরা) বিষভঁদবস্থ হইলেও জীবন-নাশের তক্রপ সম্ভাবনা ; এজন্য তাহাব প্রতিকারপক্ষে জ্ঞানোযোগী হওয়া কোন মতে বিধেয় নহে

য়্যালোপ্যাথিক ।—প্রাসিঙি বিষ পাকস্থলীতে যাহাতে জব হইতে না পায়, তজ্জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, অর্থাৎ মলফেট অফ জিঙ্গ ১ স্কুপল ১°আউন্স বা ভ্রাহা অপেক্ষা কিছু অধিক জঁক্লেব সহিত খাওয়াইয়া দিবে, কিম্বা গলাব মধ্যে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া রোগী যাহাতে বমন কবে এমন চেষ্টা করিবে ১ য়ম-

নার্থ ইপিক্যাকুয়ানা অথবা সর্ষপ চূর্ণ জলেব সহিত সেবন কবান
যাইতে পাবে টাটার এমেটিক উগ্র বমনকাবক হইলেও উহার ঐ
গ্ৰেণ-পরিমাণ সেবন কবাইতে পারা যায় ।

বমনের পব রোগীকে স্থিতিভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে বা নিদ্রা
যাইতে দিবে ন এজ্ঞ একজন তাহাকে ধবিয়া সর্বদা বেড়া-
ইতে থাকিবে

হোমিওপ্যাথিকে ।—হোমিওপ্যাথিকেও বিষ ভোজনমাত্র
উপবি উক্ত প্রকারে বমন করাইবার ব্যবস্থা কবা যায় । যদি পাক-
স্থলীতে বিষ দ্রব হইয়া যাইবাব অবস্থা হয়, তাহা হইলে খড়ি, অথবা
মঘদা ও জল মিশ্রিত ববিয়া খাইতে দেওয়া কর্তব্য । তদনন্তর
“ম্যাকোনাইটেব” আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ব্যৱস্থা

বৈদ্যকে । টাপানটেশাকেব মূল ০ তোলি জলে বাটিয়া বম-
নার্থ সেবন করাইবে কেওবিজা, বিটিব মূল, চাকুন্দেব মূল, শ্বেত
ক্ষদিব ত্রক, ও মহানিষ ছাল দ্বাৰা উষ্ণ জলে একএ বাটিয়া সেবনে বিষ
নষ্ট হইবে ।

টোটকা ।—ক্ষদিবমূল, কুটজ, অশ্বগন্ধা উষোদকে বাটিয়া সেবন
করাইলে বমন হইয়া সর্ববিষদোষ নষ্ট হইবে

আবধৌতিক ।—‘ওঁ হব হব নীলকণ্ঠ অমৃতং প্লাবয হুঙ্কা-
রেণ বিযং এস এস ক্লীঙ্কারেণ হর হব হোঙ্কারেণ অমৃতং প্লাবয হব
হর নাস্তি বিষ উচ্ছিবে উচ্ছিবে ।’ এই মন্ত্র দ্বাৰা প্লুত জল বোণীর
মুখে সিঞ্চন কবিবে ।

পরিশিষ্ট ।

মিড্‌ওয়াইফারী বা প্রাক্তীবিদ্যা ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের বিবরণ ।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয় দুই ভাগে বিভক্ত—বাহ্য ও আভ্যন্তরিক । উহাব
মে অংশ দ্বাৰা সঙ্গমক্রিয়া সমাধা হয়, তাহাকে বাহ্য এবং যদ্বারা
সন্তানোৎপাদিত হয়, তাহাকে আভ্যন্তরিক জননেন্দ্রিয় বলা যায়
বাহ্য জননেন্দ্রিয় ছয় ভাগে বিভক্ত যথা,—(১) যোনি (ভ্যাজাইনা),
(২) কামাত্রি (মণ্ড ভেনেরিস), (৩) বৃহৎ ওষ্ঠাকৃতি (লেবিয়া মেজর),
(৪) খর্ব্ব ওষ্ঠাকৃতি (লেবিয়া মাইনর), (৫) ভগ্নাক্ষুব (ক্লাইটোবিস্),
(৬) সতীদেবী (হাইমেন) পার্শ্বস্থ চিত্রে স্পষ্টরূপে
প্রদর্শিত হইয়াছে আবার (১) জবায়ু (ইউট্রে
বাস্), (২) ডিম্ববাহী নলি (ফেলোপিথেন
টিউব) ও (৩) ডিম্বকোষ (ওভেবি)
এই তিনটি আভ্যন্তরিক জননেন্দ্রিয়



বহির্যোগ্য যন্ত্র

১। যোনি বা ভ্যাজাইনা — জবায়ুর গ্রীবা অর্থাৎ নিম্নদেশ
হইতে বাহ্য জননেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত প্রায় ৫ ইঞ্চি দীর্ঘ একটি

নলীবিশেষ ইহা নৈঋতিক ঝিল্লী দ্বারা মণ্ডিত যোনিতে অনেক শিবা, ধমনী, শ্মায়ু এবং চোষক নাড়ী আছে

২। কামাদ্রি বা মন্য ভেনেরিস্ — যোনি ও সিম্ফিসিস্ পিউবিসেব উপবে এবং তলপেটেব নিম্নে, লোমারূত ত্রিকোণ মেদপূর্ণ স্থল ও কোমল স্থানকে কামাদ্রি বলে। উহাব মধ্যে গোল বন্ধনী বিলীন হইয়া আছে উহাতে ক্লেন্ডেম্পাস্ নামক অনেক গ্রন্থি থাকে

৩। বৃহৎ ওষ্ঠাকৃতি বা লেবিয়া মেজরা ।—কামাদ্রি হইতে প্রথমে স্থলপবে ক্রমশঃ সূক্ষ্মাকারে ভগদ্বাবেব পশ্চাতেব কোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অভ্যন্তর নৈঋতিক ঝিল্লী ও বাহ্যভাগ চর্মারূত ভগদ্বাবেব উভয় পার্শ্ববর্তী ওষ্ঠাকার স্থানকে বৃহৎ ওষ্ঠাকৃতি বলা যায় ইহাতে ধমনী, শিবা, শ্মায়ু, মেদ, এবং অল্পপ্রমাণ কোষময় ও সূত্রময় পদার্থ আছে।

৪। ক্ষুদ্র ওষ্ঠাকৃতি বা লেবিয়া মাইনরা ।—বৃহৎ ওষ্ঠাকৃতিব ভিতর দিকে, যোনিব উভয় পার্শ্ব ও উপবর্দ্ধ পর্য্যন্ত, কামোদ্দীপক শ্মায়ু, নাড়ী, শিবা, প্রভৃতি পুরিত এবং নৈঋতিক ঝিল্লী দ্বারা আবৃত স্থানকে খর্ব ওষ্ঠাকৃতি লেবিয়া মাইনর বা ভগদেবী বলে

৫। ভয়াক্কুর বা ক্লাইটেরিস্ ।—খর্ব ওষ্ঠাকৃতি দ্বারা উপবে ও দুই পার্শ্বে বেষ্টিত হইয়া মূত্রদ্বাবেব উপবিভাগে ভয়াক্কুর অবস্থিতি করে ইহাকে কামোদ্দীপক ইন্দ্রিয় বলা যায় অনেক বলেন ইহাই সমস্মুখের আধাবস্থান অধিক সঙ্গম জন্য ভয়াক্কুর বড় হয় এবং কামপ্রযুক্তিও অনিবার্য হইয়া উঠে


৬। সতীদেবী বা হাইমেন ।—শৈশব হইতে কৌমার্যাবস্থা পর্য্যন্ত যোনিমধ্যে নৈঋতিক ঝিল্লী দুই ভাঁজ ও অর্ধচন্দ্রাকারে যোনিব নিমর্দ্ধ হইতে কুজভাবে একটী যমনিকার আয় যোনিকে দুই ভাগে বিভক্ত কবে সাধারণতঃ প্রথম ঋতু বা পুরুষসঙ্গমেব পর এই যবনিকা বমশঃ অদৃশ্য হয় ইহাই সতীদেবী বা হাইমেন নামে প্রসিদ্ধ

অভ্যন্তরিক জননেত্রিয় ।

১। জরায়ু বা ইউটেরাস্ ।—এই যন্ত্রটি ত্রিকোণ, উপবে

৩। পাপা, নিম্নভাগ ঈষৎ গোলা এবং তিন ভাগে বিভক্ত, যথা,—উপবি-
ভাগ (ফণ্ডম্), মধ্যভাগ (বতি), অধোভাগ বা উল্লী (মার্ভিকম) অগুর্ভা-
বস্থায় জ্বায়ু প্রায় ৩ ইঞ্চ লম্বা, উপবংশ ২ ইঞ্চ এবং নিম্নবংশ প্রায় আধ
ইঞ্চ। জ্বায়ুব তিনটি আবরণ আছে,—সিবম, ফাইব্রন, ও পৈশিক
এবং শৈথিক ইহার গুজন প্রায় ৮ ড্রাম বা ২২ তোলা, কিন্তু একবার গর্ভ
হইলে ৩০ তোলাব কম হয় না। গর্ভাবস্থায় পেশী সকল অত্যন্ত
বিস্তারিত হয় অগর্ভাবস্থায় জ্বায়ুব ৩৬০ ব শূন্যস্থান প্রায় থাকে না
ইহার শৈথিক ঝিল্লির পার্শ্বসকল পাবম্পবেব সহিত সংলগ্ন এবং ইহাতে
অত্যুপ্প মান দেখা থাকে

২। ডিম্ববাহী নলী বা ফেলোপিয়েন্ টিউব।—এইরূপ নলী
দুইটি প্রত্যেক প্রায় ৪ ইঞ্চ লম্বা জ্বায়ুব উপবিভাগ যাহাকে ফণ্ডাম্
বলে, তাহার উত্তরপার্শ্বে সংযুক্ত এবং ডিম্বাধার পর্যন্ত বিস্তৃত উহাব।
যে দুই স্থলে জ্বায়ুব সহিত সংযুক্ত
হইয়াছে, সেই দুই স্থলে অতিশয় সূক্ষ্ম,
এবং ডিম্বাধাবেব দিকে যতই অগ্রসর
হইয়াছে, ততই বিস্তৃত আকার ধারণ
করিয়াছে। উহাদেব অগ্রভাগ কাঁটার
গত এই বিস্তৃত অংশগুলির মধ্যে
উত্তরদিকে একটি করিয়া দুইটি অংশ
দুইটি ডিম্বাধাবে আবদ্ধ। পার্শ্বস্থ চিত্র
দেখুন।



অন্তর্যোণী যন্ত্র।

৩. ডিম্বাধার বন ওভেবি —ডিম্বাধার দুইটি জ্বায়ুব উত্তর
পার্শ্বে অবস্থিত উহাদেব প্রত্যেক ১২ ইঞ্চ লম্বা ২ ইঞ্চ চওড়া এবং

জায ই ইঞ্চ পুরু ইছাব জব যুব উভয় পার্শ্বে মক ফাটলগু কর্তৃ দাব
অ নুপ এবং ফেনো পিষে টিউন ব ডিম্বদাহী • লোব মহিত ও সংযুক্ত
ডিম্ব ধ বেব ভিতর কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেসিকেল অর্থাৎ ঝিলিঃ য
থলি আছে, সে গুলিকে গ্রাফিয়ন ভিসিকেল কহে জীলোক
নয়ঃ প্রাপ্ত না হইলে ডিম্বকোষ মধ্যে এবং থলি দেখিতে পাওয়া যায়
না । যখন এই থলিগুলি প্রথম উৎপন্ন হয়, তখন উছাব ডিম্বাধাবেব
ভিতর থ কে, যত বর্ধিত হইতে থাকে, তত উপবির্তীণে উঠিতে থাকে,
যখন উছাব পবিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন উছাদিগকে ওভারিব গাণে
উচ্চ উচ্চ স্থান বলিয়া বোধ হয় এই উচ্চ স্থানগুলি একটী পাতলা
আবরণে আবৃত এই আবরণ ব মেম্ব্রেনেব ভিতবে এক স্তর থাকে,
প্রত্যেক ভেসিকেলের ভিতর এ-বুমেনযুক্ত তবল পদার্থে পবিপূর্ণ
এই তবল পদার্থ মধ্যে ওভুস বা ডিম্ব অবস্থিতি করে

ডিম্ব বা ওভম ।— ইছা অতি ক্ষুদ্র ও গোলাকার পদার্থ ইছ
ডিম্বাধাবেব গাণে, গ্রাফিয়ান ভেসিকেলের ভিতবে অবস্থিতি করে
অনুসাবে ওভমেব আয়তন ২. ইঞ্চ

ঋতু

প্রতি ২৭ ২৮ দিন অন্তর জীলোকদিগের যে নিঃস্রব হইতে যে
শোণিতস্রাব হয়, তাহাকে ঋতুস্রাব কহে ঋতুস্রাবালে জীলোককে
ঋতুমতী বলে জীলোক ঋতুমতী হইলে ক্রমাগত তিন দিন বক্তস্রাব
হইয়া তাহার পব বন্ধ হয় । কাহার কাহার ছয় দিন বা ততোধিক কাল
শোণিত নিঃস্রব হইয় থাকে, প্রত্যেক ঋতুকালে স্রবকায়া জীলোকেব
অর্দ্ধ পোয়া হইতে একপেদয়া পর্যন্ত শোণিতস্রাব হইয় থাকে এই
শোণিত দেখিতে বিবর্ণ, গম্বিহীন যা ঈষৎ স্নায়ুত এবং নিতান্ত
তবল আমাদিগের দেশেব জীলে কেব মচবিচব ১২ ১২ বৎসর
বয়সে ঋতুমতী হয় এবং এই সময় হইতে ৫৫ বৎসর পর্যন্ত মাসিক
বক্তোস্রাব হইয়া ধীরে প্রথম বক্তোস্রাবেব আদিত হইতে জীলোকে

যোবনেৰ আৰম্ভ হয় এই সময়ে দেহ লাভন্যময় ও মন ক্ষুৰ্তিবিশিষ্ট হইয়া থাকে

ঋতুব কাৰণ ।—ভিষকোষ ও জবাযুই যে ঋতুব কাৰণ তাহাতে আৰম্ভ নহই কোন কাৰণে ভিষকোষেৰ আৰম্ভ হইলে কোন মতে ঋতুৰ আৰম্ভ হৈতে পাবে না। প্রত্যেক ঋতুকালে এক দুই বা ততোধিক প্রাক্ষিণ্যেৰ ভিসিক্যাল 'বিদীৰ্ণ' কৰিয়া এক, দুই বা ততোধিক ভিষ বাহিব হয় এবং ফেনোপিয়নেৰ টিউবেৰ ভিতৰ দিয়া জবাযুতে প্রবেশ কৰে। নানাবিধ উপায়ে পৰীক্ষা কৰা হইয়াছে যে, ঋতুকালে উক্তবিধ ঘটনা প্রায়ই সংঘটিত হইতে থাকে। ঋতুকালে জবাযুতে বক্তাবিকা হয়, এজন্য এই সময়ে স্ত্রীলোকেৰ ধমনী ও শিৰা বক্তে ক্ষীত হইয়া থাকে। জবাযুৰ মিউকস্ মেম্ব্ৰেণ বক্তবৰ্ণ হয় ও উহাৰ স্থানে স্থানে বিন্দু বিন্দু বক্ত উৎপন্ন হয়। ক্রমশঃ ঋতুশোণিতে জবাযু প্লাবিত হইয়া উঠে। নকল স্ত্রীলোকেৰ নিয়মিত সময়ে বা নিয়মিত পৰিমাণে অথবা উপযুক্ত বিধানে বক্তোজাব হয় না। তত্তৎ কাৰণ বৰ্ণনা নানা প্রকাৰ কৰি আছে, তাহা দিগেৰ বিবৰণ ইতিপূৰ্বে বিস্তাৰিতৰূপে লিপিবদ্ধ কৰা হইয়াছে। এ কাৰণ পুনৰায় উল্লেখ কৰা হইল না।

গৰ্ভ ।

পূৰ্ণৰূপেৰ জন্মেন্দ্রিয়নিঃসৃত যে তৰল পদার্থ দ্বারা ওভম গৰ্ভধাৰণ-ক্ষম হয়, তাহাৰ নাম শুক্র বা সিমেন্। ইহা পূৰ্ণৰূপেৰ অণুকোষ হইতে পূৰ্ণজন্মেন্দ্রিয়েৰ মুখ দিয়া নিৰ্গত হয়। শুক্র যন, শ্বেতবৰ্ণ তৰল পদার্থ বিশেষ। ইহাৰ দুইটা প্রধান অংশ এই, লাইকব সেমিনিস্ বা শুক্রবস, এবং স্পাৰ্মাটোজোয়া বা শুক্রকীটানু। শুক্রাংশে ফাইলিন আছে। পূৰ্ণৰূপেৰ কীটানুগুলি দেখিতে বেঙ্গাচিৰ মত। ইহাদেৰ এক দিক মেট অল্প দিগ ক্রমশঃ সৰ। যে দিক দীৰ্ঘমোট সেই দিকটী

ইহাদেয় মস্তক । শুক্রাণীটানুগুলি অণুকোষ হইতে বহির্গত হইয়া
শ্বেচ্ছামত ইহাদিগেব পুচ্ছ সৰ্বদাই সংকালিত কৰিতে থাকে । ওতম ও
স্পামাটোজোয়াব সন্নিধানই যথার্থ গৰ্ভোৎপত্তি । ত্রীপুৰুষেব সফল
সঙ্গম হইলেই গৰ্ভোৎপত্তি হয় । কি অন্য ও কি একাবে কীটানুসঙ্গিত
শুক্র ওতমকে গৰ্ভধাবক্ষম করে, এবং কিরূপেইবা জবাযুষ্ঞ জন
পিতা মাতাৰ আকৃতি প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহা আদ্যাপি অবধারিত হয়
নাই, তবে অনুসন্ধান দ্বাৰা মতদূৰ অনগত হওয়া গিয়াছে, তাহাই
নিম্নে প্রকাশ কৰা যাইতেছে

ঋতুকালে পুৰুষসঙ্গম হইলে পুংজননেদ্রিয়নিঃসৃত শুক্র যোনিমধ্যে
নিষ্কিপ্ত হয় । ঐ শুক্রস্থ স্পামাটোজোয়া জবাযু মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া
ডিম্ববাহী নলীৰ মধ্য দিয়া ডিম্বকোষের উপরিভাগে তথ্য প্রাফিয়েন
ভেসিকেলের ভিতবে ডিম্বক নিষিক্ত বনে । সেই নিষিক্ত ডিম্ব-
ডিম্ববাহী নলীৰ ভিতৰ আসিবাষাএ একটী আচ্ছাদনী প্রাপ্ত হয়,
এবং ১৪। ১৫ দিন মধ্যে জবাযুকোটেবে প্রবেশ ববে । তথ্য প্রাণ সৃষ্ট
হয় এবং ২৮০ দিন পর্যন্ত পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া পূৰ্ণকালে এক স্বাধীন
জীববপে ভূমিতে হইয়া থাকে ।

ডিম্ব জবাযুকোটেবে প্রবিষ্ট হইয়া মাএ জল নাম ধাবন কৰে ; তখন
উহাতে দুইটী আচ্ছাদনী ঝিল্লী দুইটে হয়, যথা (১) এমনিয়ন্ ঝিল্লী,
(২) তদ্বহির্দিকে কোরিমন ঝিল্লী । এণ ও এমনিয়ন্ ঝিল্লীৰ জলবৎ
তবল পদার্থ অনেক থাকে । উহাকে এমনিয়োটিক্ ফ্লুইড বা লাইকর
এমনিয়াই বলে । ক্রমে দশমাসকাল ইহাৰ মধ্যে ক্রমিতে থাকে ।
কোবিয়ন্ ও এমনিয়ন্ ঝিল্লী মধ্যে টিউনিকা মিডিয়া নামক এক নূতন
ঝিল্লী জন্মে, উহাতেই ভেসিকিউলা এলবা বা অসিনিকেল ভেসিকেল
তথাং ডিম্বকুম্ভাধাব জন্মে ।

জবাযুকুম্ভ বা প্লাসেন্টা — জবাযুৰ অভ্যন্তর ভাগে যে
মৌলিক ঝিল্লী আছে, তাহ শুভ্রাকৃত এপিথিলিয়াম দ্বাৰা মণ্ডিত । এই
মৌলিকঝিল্লী মধ্যে অনেক গুলি গ্রন্থি আছে । অগভ্রাংশীয় ইহারা
ক্ষুদ্র থাকে, গৰ্ভোৎপত্তিব পবেই বর্দ্ধিত হয় । এই গ্রন্থিগুলিৰ মুখ

জ্বায়ুमध्ये আসিয়া উন্মুক্ত হইয়াছে গর্ভোৎপত্তিব সঙ্গে সঙ্গে
শৈল্পিক ঝিল্লীর গঠন সম্বন্ধে পবি-
বর্তন ঘটিয়া থাকে ; ৩২সহ এপি
থিলিয়ম ও গ্রন্থি সকল বর্দ্ধিত
হইতে থাকে শৈল্পিক ঝিল্লি
অধিকতর রক্তপূর্ণ এবং উহা
বক্তবহা নাড়ী সকল আকারে ও
সংখ্যায় বর্দ্ধিত হয় এইকপ পকি-
বর্তিত শৈল্পিক ঝিল্লীর উপবিস্তৃত
স্তবেব নামই ডেসিডুয়েল মেম্ব্রেন ।



জরায়ুকুস্থলের চিত্র ।

ওভমেব পবিপোষণোপযোগী পদার্থ উৎপাদন কবাই উপবোক্ত
পরিবর্তনের উদ্দেশ্য । ওভম যখন প্রথমে জ্বায়ুमध्ये প্রবেশ কবে,
তখন উহা ডেসিডুয়ার ভিতরে আবদ্ধ হয় এই ডেসিডুয়া হইতে
ক্রমের অম্বাংশ উৎপন্ন হইয়া থাকে কোরিয়েনেব গাত্রে যেমন
ভিলাইরপ অবর্দ্ধন সকল থাকে, জ্বায়ুব ডেসিডুয়াল শৈল্পিক ঝিল্লি
मध्येও তক্রপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত উৎপন্ন হয় । এইকপে উপবোক্ত অবর্দ্ধন
সকল গর্তमध्ये প্রবিষ্ট হওয়ায় কোরিয়নের ভিলাই সকল মাতার
জ্বায়ুগাত্রে নিহিত হইয়া থাকে ।

এই সমস্ত পরিবর্তন ঘটবার সময় জ্বায়ুব শৈল্পিক ঝিল্লির গভীরতর
স্থানে সাইনস সকল উদ্ভূত হয় । এই গুলি এক দিকে জরায়ুর ধমনী,
অন্য দিকে শিবার সহিত মিলিত সাইনসের মধ্যে কোরিয়নেব ভিলাই
সকল প্রবেশ কবে ক্রম ও মাতার রক্তবহা নাড়ীর সহিত ঠিক সংযোগ
নাই; জরায়ু পূর্ণ কোরিয়নেব ভিলাই সকল জ্বায়ু মধ্যস্থিত সাইনস
গুলিব মধ্যে মাত্র বক্তে অভিস্রুত থাকে মানুষের জরায়ুকুস্থল ব
অম্বা দুই অংশে প্রস্তুত একাংশ ক্রমেব, অপরাংশ মাতার কোবি-

স্নেহে ভিলাই হইতে আগ্নেয় বক্স মাঠান দেহে এবং জবাযুগ্ম
সাইনস হইতে মাঠাব বক্স আগ্নেয় দেহে যাত যাত কবিয়া থাকে
ইহাতেই জন জীবিত থাকে ও বর্দ্ধিত হয়


নাভিবক্স বা অম্বিলাইকাল্ কর্ড - ইহা ২০ হইতে ২১ ইঞ্চ
দীর্ঘ এবং এমনিয়ন হইতে একটি আবরণে আবৃত ইহাতে দুইটি পেশী
নির্মিত ধমনী এবং একটি শিৰ থাকে এই বক্সবহু নাড়ীগুলি নভি
বক্স মধ্যে পাক দিয়া জড়ান থাকে ইহা দ্বারা আগ্নেয় স্নেপিওব স্নেপি-
চিকা ও প্রসাবিকা প্রিয়াব সঙ্গে সঙ্গে নীড়ীৰ গতি হয়

কোবিয়ন ও জার্ম মেম্ব্রো মধ্যে ব্যাচোডার্মা অর্থাৎ জন্ম দেহোৎ-
পাদক মেদ ও বস উৎপন্ন হয় এই বসেব নকিউমিউলশ নামক অংশে
শিবম মিউকস ও ভাকিউলাব নামক তিনটি স্তর লেয়ার বা পর্দা
জন্মে এই তিন পর্দায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমুদায়
সৃষ্ট হইয়া থাকে শিবম লেয়ারেব উপরে মস্তিষ্ক, মেরুমজ্জা, জ্ঞানে-
প্রিয়, মাংসপেশী, প্রস্থিবশন, ত্বষ্টি ও উপস্থিতি প্রভৃতি বস্তু বৈজ্ঞানিক
যন্ত্র, মিউকাস লেয়ারেব যন্ত্র, যক্ষ্ম, যক্ষ্ম, প্লীহা ও অন্যান্য দৈহিক
যন্ত্র,—এবং ভাকিউলাব পেশ্যারে স্নেপিও, ধমনী, শিরা প্রভৃতি
শোণিতচালক যন্ত্র জন্মে

অধ্যাপক ওয়েগনার নবীক কবিয়া দেখাইয়াছেন, ২১ দিন বয়স
একটি জন্ম এক বুকলেব স্ফাংশেব একংশ মাত্র দীর্ঘ তিনি বলেন,
খুব সাবধানে দেখিলে উহাতে কয়েকটি যন্ত্রের ছায়া মাত্র লক্ষিত হয়
যথা,—মস্তিষ্কেব কোন স্ক্রু অংশ বিশেষ, স্ক্রু, কর্ণ ও মুখেব চিহ্ন,
বক্ষঃস্থল ও উদবেব আবরণ থাকে না, স্নেপিওব একটি স্ক্রু অংশ,
যক্ষ্মযন্ত্রেব চিহ্ন ও দেখা যায় পঞ্চম স্তম্ভেব বক্ষঃ ও উদবেব আবরণ
মিলিত হয় কিন্তু নাভিস্থান ফাঁক থাকে

দ্বিতীয় মাসে হস্ত পাদেব মূল উচ্চ হইয়া উঠে নবীক বক্স হয়
মস্তিষ্ক কিছু বড় ও অবনত ভাবে থাকে এই সময় মুখ ও নাগাবক্স
প্রভৃতি অঙ্গ অঙ্গুত হয় এইকাল জবাযুগ্মে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত

থাকে এবং যষ্ঠ
ইতেই প্রগদেহ
অধোমুখে সুজভাবে
অবস্থিতি কবে কাল
পূর্ণ হইলেই তদবস্থায়
ভূমিষ্ঠ হয়



গর্ভস্থ শিশুর চিত্র ।

গর্ভের লক্ষণ ও পরীক্ষা ।

১ সাধারণতঃ ধাতুবন্ধই গর্ভের প্রধান লক্ষণ বলিয়া উপলব্ধি
হইয় থাকে । গর্ভাবস্থাতেও অনেক স্ত্রীলোকের ক্ষতু হইতে দেখা
যায় আবার ধাতুবন্ধ হইয়াও অনেকের গর্ভ হয় ন এমনও দেখা যায় ।
থাকে এক্ষণে হইলেও ঋতুবোধই যে গর্ভের প্রধান লক্ষণ, তৎপক্ষে
সন্দেহ নাই

২ বমন ও বমনেচ্ছা — সাধারণতঃ গর্ভস্ফুরের ৫ ও ৬ সপ্তাহের
পরে এই লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং উহা তৃতীয় মাস পর্য্যন্ত থাকিতে দেখা
যায়

৩ শিশিকাপাণ্ড গর্ভস্ফুরের আর একটা লক্ষণ বলিয়া অনুমিত
হইয়া থাকে । চীন প্রসূকারেবা ইহাকেও গর্ভের একটা লক্ষণ মধ্যে

গগন কিবিতেন, অ জি কালি আন এই লক্ষণের ডতট গোবন নাই।
যে সকল স্ত্রীলোকের এই লক্ষণ দেখা যায়, তাহাদের দন্তমূল স্ফীত
ও ব্যর্থিত হইতে দেখা যায় ন ৪ ৬৮ মাস পাবে আপনা হইতেই
সূনিকাপাত কব হয়

৪ স্তনের বৃদ্ধি ও দুগ্ধসঞ্চাব হওয়া গর্ভের লক্ষণমধ্যে পরিগণিত
তৃতীয় মাসেই প্রথম স্তনায় স্থূল, স্বদৃঢ় হয়, গুড়গুড় কবে, চুচুকেব
চতুঃপার্শ্বস্থ মলিন চর্ম কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত কবে আবও কিছুদিন পাবে স্তনে
দুগ্ধ সঞ্চাব হয়

এই সকল লক্ষণের মধ্যে কোন একটির বিদ্যমানতায় যে গর্ভ হওয়া
অবধাবিত কবিত হইবে এমন নহে, তিন চাবিটি লক্ষণ একত্র দৃষ্ট
হইলে তবে গর্ভ হওয়া নিশ্চয় কবিত পাবী যায় নিম্নোক্ত লক্ষণ-
গুলি সমধিক নিশ্চয়ার্থক

৫ উদববৃদ্ধি বোংবিশেষের লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত হইলেও
গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ হইতে অনায়াসে পৃথক কবিয়া লইতে পাবা যায়
সমস্তাবস্থায় উদব চাপিলে স্থিতিস্থাপক ও দৃঢ় বোধ হয় এবং গর্ভিনী
শায়িত, উপবিষ্ট ও দীণায়মান সকল অবস্থাতেই জ্বায়ুব আঁকাব সম-
ভাবে থাকে উদববোং তাহা হয় ন কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুবোং
অঙ্গুলি দ্বারা উদবে আঘাত কবিলে ঢোলেব মত ফাঁপা শব্দ হয়,
কিন্তু গর্ভাবস্থায় ঐরূপ আঘাতে নিবেট পদার্থে আঘাতেব স্থায় বোধ
হইয়া থাকে জ্বায়ুব কোন কোন বোং তন্মধ্যে বায়ু বা জল সঞ্চিত
হইলেও ঐরূপ স্ফীত হয়, কিন্তু গর্ভের অন্যান্য লক্ষণ তাহার সহিত
দৃষ্টিগোচর হয় না

৬ গর্ভিনী জঠরস্থ সঞ্জননবোং একটি প্রথম লক্ষণ মধ্যে
গণনীয় সচবাচব চাবি মাস বা তদূর্ধ্ব সময়ে গর্ভিনী জঠরস্থ বর্ণের
সঞ্জনন ক্রিয়া অস্বাভব কবিত পাবে

৭ গর্ভ বস্তায় জ্বায়ুব সঞ্জন উদব জঠরস্থ কালব যদিও গর্ভিনী
তাহা অনুমান কবিত পাবে ন, কিন্তু যখন উদর বিচলিত হয়, তখন
তাহাব উপর চাপিয়া মনিলে ঐরূপ সঞ্জনন ভাব মে উপলব্ধি হয়

৮। ষ্ঠৈথস্কোপ নামক যজ্ঞ জবাযুব উপব স্থাপন কবিয়া গীর্ভক ভ্রণের স্থাপিওব শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় একপ পবীক্ষণ করিবাব সময় পবীক্ষক নিজ আপন মন্তক হইতে নিম্ন স্থানে বাথিবেন না, তাহাতে নিজ শবীবস্থ ধমনীব তব তব শব্দ ভ্রণের স্থাপিওব বা নাড়ীব শব্দ বলিয়া এম জগিতে পাবে

যমজ গর্ভের লক্ষণ — গর্ভের যে মাসে উদব যে পবিমাণে বড় হওয়া উচিত, যমজ সন্তান জন্মিলে তাহার দ্বিগুণ বড় দেখায় উদবেব সম্মুখ চেটাল থাকে, উহার উপব হইতে নীচ পর্য্যন্ত মধ্যভাগ ঈষৎ চাপা হইয়া উদবটীবে সমদ্বিভাগে বিভক্ত নোধ হয় ষ্ঠৈথস্কোপ যজ্ঞ বা কর্ণদ্বারা জবাযুব দুই দুবভাগে দুই স্থাপিওব সঙ্কোচিকা ও প্রসারিকা ক্রিয়াব শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়

• গর্ভের স্থায়িত্ব — জ্রীমোকেব শৌক্য ঋতুব পক্ষান্তব হইতে গর্ভের গণনা আবশ্য কবা যায় ; কিন্তু এই গণনা সর্বত্র ঠিক হয় না একবাব শৃঙ্গাবেব পব গর্ভ হইলে সময় নিরূপণেব কোন সন্দেহ থাকে না তাহাতে ইহা অবধাবিত হইয়াছে যে, ১০ চান্দ্র মাস, সৌব ৯ মাস ৭ দিন, ৪০ সপ্তাহ গর্ভের স্থায়িত্বক ল তাহাব পবেই গর্ভিনী প্রসব কবিয়া থাকে

গর্ভিনী চিকিৎসা ।

গর্ভাবস্থায় সচবাচব যে সকল পীড়া হইব থাকে, নিম্নে তাহাদেবই বিবরণ লিখিত হইতেছে, কিন্তু চিকিৎসাসম্বন্ধে এই কমণী কথা নিতান্ত মনে কবিয়া রাখা কর্তব্য

১. ঔষধেব মাত্রা উপযুক্ত অপেক্ষা অল্প হওয়া আবশ্যক

২। বর্মনাকারক ও অতিবিরেচক ঔষধ একবাবে নিষিদ্ধ, কোন মতে ব্যবহার্য কবিবে ন

৬ পাবদঘটিত ঔষধও অব্যবহার্য, কিন্তু যদি গর্ভাবস্থায় উপ-
দংশ্য বোলা জন্মে, তবে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে

আইওডাইড অফ পটাশিয়াম	...	১ গ্রেন।
লাইকরু হাইড্রাজ	..	৮—১০ বিন্দু
জল	...	১ আউন্স

এক মাত্রা, দিবসে তিনবার এইরূপে একমাস পর্যন্ত ব্যবহার করিতে
দেওয়া যায়

বসন্ত প্রভৃতি স্পর্শশংক্রামক পীড় বা ওলাওঠা বোগ হইলে
প্রায়ই গর্ভপাত হইতে দেখা যায় গর্ভাবস্থায় আবশ্যিকমতে অহি-
ফেন সেবন করাইতে পারা যায়

বমনোদ্বেক ও বম্বন ।—সাধারণতঃ সকল গর্ভবতীবই এায
এই দুই বোগ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাদেব প্রায় ভুল জবোব অধিকাংশ
পরিপাক পায়, আবার কাহাব কাহাব উদবে ভুল জবোব কিছুই থাকে
না সেরূপ গভিণীবা ক্রমশঃ নিতান্ত দুর্বল হইয়া পড়ে একপ স্থলে
চিকিৎসার প্রয়োজন হয় ।

চিকিৎসা —কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে একাবভেসিং ড্রাফ্টের সঙ্গে
রোসেল সল্ট ১ ২ ডাঃ ২ ঘণ্টান্তর খাওয়াইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবে
তৎপরে ২৫ গ্রেন বিসমথ ও পেপসিনের বটী ওস্তুত করিয় পাত্যহ
২ ৩ টী খাইতে দিবে ইহাতেও উপকার না দর্শিলে,—

পেপসিন	...	৩৫ গ্রেন।
অহিফেন	...	১ গ্রেন।

একএ বটী পাকাইয়া প্রত্যু ২ ৫ ৩ বার খাওয়াইবে ইহাতে কোষ্ঠ
বদ্ধ হইলে প্রত্যেক বটীর সঙ্গে ১ গ্রেন এক্সঃ বেলডোনা দিতে
হইবে ক্ষুধাহীন, বক্ষোজ্বালা, উদবাধ্যান, কোষ্ঠবদ্ধ, এই সকল বোগে
বিশেষ কোন হানি করে না । ডাইলিউটেড নাইট্রোমিউরিয়েটিক
স্যালামিডি ১০ ১৫ বিন্দু, চিবাতা বা হবিজুর সফ্টেব সহিত প্রত্যহ তিন-
বার খাওয়াইলে উপকার দর্শে

বিস্মথেব সঙ্গে সোডা ও পেপ্সিন ৫ গ্রেন মাত্রায প্রয়োগ করিলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় ।

কম্পাউণ্ড সলবার পিল ৮ ১০ গ্রেন বা অর্ধছটাক কার্যের অয়েল খাওয়াইলে কোষ্ঠ পবিষ্কার হয় এজন্য দেশীয় হবিতকী সুরোংকুফ প্রাতঃকালে হবিতকী ১ টা কাটিয়া একটু লবণের সহিত খাইতে দিলে বিশেষ উপকার দর্শে

গ্রহণী ।—আমায় প্রভৃতি বোগে নিম্নোক্ত ঔষধ গুলিতে প্রশমিত হয় ।

ডোভার্স পাউডার ... ৫ গ্রেন

সিক্কোনা পাউডার ... ৫ গ্রেন ।

একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ এইরূপে এক ঘণ্টায় দুইবার খাওয়াইবে

• টিং সিক্কোনা • • • • • ১৫ বিন্দু

লডেলম্ • • • • • ১৫ বিন্দু

ভাইনম ইপিক্যাক • • • • • ৫ বিন্দু

মিউসিলেজ ব্যাকেসিয়া • • • • • ১ আউন্স ।

প্রত্যহ দুই তিনবার খাওয়াইবে

যদি পেটের মধ্যে তবল মল বায়ুর সহযোগে ক্ষণে ক্ষণে ছড় ছড় শব্দ হয় তবে —

কার্যের অয়েল • • • • • ১ বিন্দু

স্পিরিট অফ ওয়াইন • • • • • ২০ বিন্দু

উত্তমরূপে মিশাইয়া তাহার ৩ ৪ বিন্দু অর্ধছটাক জলের সহিত ৩ ৪

ঘণ্টা অন্তর দিবসে ২ । ৩ বার সেবন করাইলে উপকার দর্শিবে

আমায় হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ খাইতে দিবে

টিং সিক্কোনা • • • • • ১৫ বিন্দু

টিং ওপিয়াই • • • • • ১৫ বিন্দু

ভাইনম ইপিক্যাক • • • • • ৫ বিন্দু ।

মিউসিলেজ ব্যাকেসিয়া • • • • • ১ আউন্স ।

হাইড্রার্ক রাই • • • • • ৭ ৮ বিন্দু

প্রত্যহ্ন ২ ও বাব খাওয়াইবে ইহাতে আবগ্য না হইলে—

কুচিরুকাথ	...	...	...	১ আউন্স
লিডেলম	...	...	...	১০ বিন্দু ।
জায়ফল চূর্ণের কাথ	...	...	...	১ আউন্স

এক মাাত্রা দিবসে একবার, বা আবশ্যকমত দুইবার খাওয়ান যাইতে পারে

পথ্য ।—জলমাণ্ড, পুষ্করী, বেলেব সববৎ, পুষ্করী তেঁতুলের ও ছোট মৎস্যের অম্ল ইত্যাদি

অর্শ ।—বিষক জবায়ু সিমবইডেল ভেইনের উপর চাপিয়া আসা প্রযুক্ত অর্শবোগ জন্মে ।

গ্যালোজ	...	...	...	১ গ্রেন
একঃ নক্সটমিকা	...	...	...	১ গ্রেন
একঃ বেলেডোনা	...	...	...	১ গ্রেন

একজ বটী কবিয়া প্রতিদিন ২ ও বাব খাইতে দিবে গ্যালোনের পবিতর্কে ২ ও গ্রেন হবিতকী চূর্ণ দেওয়া যাইতে পারে

অগ্নিকা পিত্তম —সল্ফেট অফ জিফ, ফটকিবি, ট্যানিল, ব্রাণ্ডি ইত্যাদি কুল্য ব্যবহার্য ।

দন্তশূল ।—বেদনায়ুক্ত স্থানের উপর ২ ও বিন্দু ক্লোরোফর্ম লাগাইয়া দিলে তৎক্ষণাত্বে বেদনা বন্ধ হয় ।

দন্তের মধ্যে গর্ত হইলে,—

মর্ফিন	...	...	...	১ গ্রেন ।
আর্শেনিয়াম য়্যানিড চূর্ণ	...	...	...	১ গ্রেন ।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ঐ অংশ পরিমাণ একটু ভিজা তুলায় লাগাইয়া ঐ তুল্য দস্তের গর্তমধ্যে ১২ ১৪ ঘণ্টা বাধিলে যন্ত্রণা একবারে নিবাবিত হয়

কাশী ।—নাসকট, আর্সেনপয়ু কুশীকৃত নীচের লিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য

একঃ বেলেডোনা	...	...	...	১ গ্রেন

পলুত ইপিক্যাক

...

...

২—১ গ্রোন

একত্র বটা পাকাইয়া প্রতিদিন তিনটি খাওয়াইবে

হৃদেপন গর্ভাবস্থায় রক্তব যে পরিবর্তন জনিত হৃৎপিণ্ডেব ক্রিয়ার যে ব্যাঘাত ঘটে, তাহাই হৃদেপনের প্রকৃত কারণ

গর্ভবতী দুর্বল ও ক্লান্ত হইলে সিবপ অফ ফসফেট অফ আয়বণেব সহিত কডলিবাব অয়েল প্রত্যহ ২ ১ ৩ বাব খাওয়াইতে হইবে । সকল অবস্থায় অতি অল্পমাত্রায় কার্ডিয়াক টনিক অর্থাৎ টিংচার অফ য়াকোনাইট বা টিংচার ডিজিটেলিস্ ৩ বিন্দু মাত্রায় ৪ ড্রাম জলেব সহিত প্রত্যহ ২ ৩ বার খাওয়াইলে বিশেষ উপকার করে

মূর্ছা বা সিন্কোপি ।—দুর্বল প্রাকৃতিক স্ত্রীলোকদিগেব গর্ভাবস্থায় এই পীড়া হইতে দেখা যায়

চিকিৎসা ।—মূর্ছাকালে নাসাবন্ধের নিকটে কপূর রাখিয়া চক্ষে জলেব ছিটা দিলে সহজে এবং শীঘ্র চৈতন্য সম্পাদন হয় মূর্ছাবিধায় অবস্থায় টিংচার বেলেডোনা, য়াকোনাইট বা ডিজিটেলিস্ অল্প মাত্রায় দিবসে ২ ৩ বার ব্যবহার করিলে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

রক্তাশ্রিত বা এনিমিয়া এবং হরিৎ পীড়া বা ক্লোরোসিস্ ।—এই পীড়া সহজে আবেগ্য হয় না, এবং প্রায়ই সাংঘাতিক হইয়া উঠে । সচরাচর গর্ভেব পূর্বে এই পীড়া হইতে দেখা যায়

চিকিৎসা ।—সিবপ অফ ফসফেট অফ আইরন, কড সিবাব অয়েলেব সঙ্গে প্রত্যহ ২ ৩ বাব খাওয়াইবে শৈত্যসেবন, বাত্রিজাগরণ, অজীর্ণকর খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ

শোথ বা ইডিম ।—গর্ভাবস্থায় বক্তেব পরিবর্তন হেতু এই পীড়া জন্মিয়া থাকে

চিকিৎসা ।—মূত্রকবৃত্তেব প্রয়োগ করা কর্তব্য যথা,—

টিং ডিজিটেলিস্	...	৩ ৪ বিন্দু
টিং ফকি পাথ স্লেস্বাইড	...	১০—১৫ বিন্দু
যল্লিটেট অফ পটাশ	...	১০—১৫ গ্রোন

জল

...

...

১ আউন্স

একমাত্রা, এইকপ তিন মাত্রা ও তিদিন প্রয়োগ কবিতে হইবে

এপিমা মেলিকিকা বা মধুমক্ষির বিষ ১ বিন্দু ১ আউন্স জলে উত্তম-
রূপে মিশাইয়া তাহাব আধ ড্রাম এক কাচ জলের সহিত প্রতিদিন
২ ৩ বাব খাওয়াইবে ইহা শোথের মহৌষধ

এলবিউমিনিউনিয়া।—গর্ভাবস্থায় যুজে এলবিউমেন থাকা
পীড়ার চিহ্ন বলিয়া জানিতে হইবে যুজের এলবিউমেন পরীক্ষা
কবিতে হইলে একটা ফোক টিউব নামক কাচের নলেক মধ্যে একটু
প্রস্রাব লইয়া যতক্ষণ উথলিয়া না উঠে, ততক্ষণ অগ্নিব উত্তাপ লাগা-
ইতে হইবে, তাহাব পর উহাতে ফ্রুং নাইট্রিক য়্যানিড তাহাব সঙ্গে
মিলাইবে, যুজে এলবিউমেন থাকিলে চুঙ্গীৰ গীচে উহা গাঁদের মত
পতিত হয়

চিকিৎসা। শরীরে স্ক্যানেল ব্যবহার করাইবে এবং টিং
ফেবি.পার ক্লোবাইড, টিং ডিজিটেলিস, ক্রিসটেট অফ পটাশ মিশ্র ঔষধ
ও যে গ কবিবে

অনিষ্টা বা ইন্সমনিয়া —কোন কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোকের
প্রসবত্তর এতাদিক জন্মে যে, আহার নিষ্টা পবিত্যাগ কবিয়া শীত্র ইহাব
প্রতিকার না হইলে উহা উন্নততায় পবিত হইয়া থাকে

চিকিৎসা।—নিম্নোক্ত ঔষধের মধ্যে অত্র প্রথমটি ব্যবহার
করিতে দিবে, তাহাতে উপকার না দিলে সেযোক্ত ঔষধ প্রয়োগ
কবিবে।

হাইড্রেট অফ ক্লোবেল ... ৩০ গ্রো

ক্রোমাইড অফ পটাসিয়ম ... ২০ গ্রো

জল ... ১ আউন্স

শয্যেব পুর্ক খাইতে দিবে

নতুবা অহিকে ২ গ্রো কিনা মর্ফিয়া ১ গ্রো খাওয়াইবে।

শিরঃপীড়া, তলপেট ব উকতে সন্নিবন্ধন প্রায় সকল
গর্ভবতী স্ত্রীলোককেই প্রাপ্ত না যদিও পবিমানে এই সকল রোগ হইতে

কষ্টবোধ কবিত্তে দেখা যায় কুইনাইন্, আর্শেনিক ও লৌহঘটিত ঔষধ প্রয়োগ কবিলে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়

তাণ্ডব রোগ বা কোরিয়া।—গর্ভাবস্থায় এই পীড়া হইলে অনেকেরই প্রায় গর্ভপ্রাব, অকাল প্রসব, এবং যুতজাত সন্তান ভূমিষ্ট হয় ।

লাইকর আর্শেনিক	...	...	৫ বিন্দু ।
ছাইড্রেট অফ ক্রোবের	...	...	১০—১৫ গ্রো
ব্রোমাইড অফ পটাশিয়াম	...	...	১৫—২০ গ্রো
জগ	...	...	১ আং ।

একত্রে ব্যবহার কবিলে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু এই ঔষধগুলি পৃথক পৃথক প্রয়োগ কবিলে অধিক ফললাভ হয়

মূত্রাবরোধ —যতবার মূত্রাবরোধ হইবে, ততবার শলা দ্বারা প্রস্রাব করাইবে মূত্র বাহির হওয়ার পর হস্ত দ্বারা বস্তি কোর্টর হইতে জবাব উত্তোলন করিয়া দিবে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর একপ হইবে না

মূত্রমূৎ মূত্রত্যাগ ।—লৌহঘটিত বলকারক ঔষধ ফলোপধায়ক যথা,—

কডলিবাব অয়েল	...	...	১ ড্রাম
পোর্ট ওয়াইন	...	...	১ আং
প্রত্যহ এইরূপে ২ ৩ বার খাওয়াইবে	...	...	...
টীং ফেবি মিউবিয়েটিক	...	...	১৫ বিন্দু ।
ডিকট্ট সিঙ্কোনা	...	...	১ আং

এক মাত্রা । ঐরূপ মাত্রায় দিবসে ২ | ৩ বার প্রয়োগ কবিবে ।

কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে,—	...	...	...
টীং সেনোকো	...	...	২০ বিন্দু
নাজিকীর ফাণ্ট	...	...	১ আং

একত্রিশদিনে ৩ বার খাওয়াইবে

শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিয়া । এক ড্রাম কার্বলিক য়া শিউ ৪ আউন্স জলেব সহিত মিশাইয়া যোনি ধৌত কবিত্তে দিবে ।

স্ককণ্ডু বা প্রুটাইটিস্ ।—কবোসিড সল্লিমেট ২ গ্রেন ১ আউন্স জলে মিশাইয়া দিন বাত্রে এক একবার নেকড়ায় কবিয়া যোনিতে লাগাইবার ব্যবস্থা করিগা দিবে । যোনিব কঙ্কেশন থাকিলে তন্নি-
বারণার্থ বোমাইড অফ পটাশিয়ম জলের সাজ খাওয়াইবে ।

জরায়ু ভ্রংশ ।—য হাদেব জবায়ু প্রসব সময়ে কিছু নিম্নগামী হইয়া যোনি মধ্যে থাকিয়া যায়, তাহাদেব আবার গর্ভ হইলে অচ ইউটেরাই যোনিব বাহিরে ঝুলিয়া পড়ে কিন্তু চতুর্থ ও পঞ্চম মাসে যখন জরায়ু ক্রমে বিবদ্ধ হয়, তখন স্থানান্তাবে উহা যোনি হইতে উদবে উদ্ধিত হয়, যখন জবায়ু মার্ভিক বৃদ্ধি পাইয়া গর্ভেব শেষ পর্য্যন্ত বাহিরে ঝুলিয়া থাকিতে দেয় যায়, একপা খটিলে গর্ভবতী মলমূত্র ত্যাগে সক্ষম হয় না, তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট হয় ও পৰিশোধে গর্ভপাত হয় ।

চিকিৎসা ।—গর্ভিনী ছয়মাস পর্য্যন্ত শয়ান থাকিবে, এবং উত্থানাবস্থাতে হর্জ সাহেবেব প্রস্তুত লম্বা পেসাবী ব্যবহার কবিবে ।

সম্মুখাবর্তন বা এণ্টিভার্সন ।—এই পীড়া তত গুরুতব নহে যাহাদেব জবায়ু উর্দ্ধভাগ একপে সম্মুখদিকে চাপিয়া পড়ে, তাহাদেবই গর্ভেব প্রথম কয়েক মাস মুহুমুহু প্রসব হয়, কেহ কেহ বলেন ইহা-
তেই অজস্র বমন হয়, সে বমন কিছুতেই নিবাবিত হয় না ।

চিকিৎসা ।—গর্ভিনী সর্বদা চিৎভাবে শয়ন কবিয়া থাকিবে । ইহাতে জবায়ু সোজা না হইলে পেটীবদন দাবী জবায়ুর ফণ্ড উত্তোলন কবিয়া বাখিবে

পশ্চাদাবর্তন বা রিট্রোভার্সন ।—গর্ভবতী জীলোক আছাড় খাইয়া পড়িলে এই বোগ জন্মিতে পাবে । গর্ভেব বৃদ্ধি সহকায়ে প্রাণই ইহা মারিয়া যায়, তাহা না হইলে গর্ভপ্রসব হক যদি তাহা না হয়, তবে মল মূত্র ত্যাগে ব্যাঘাত, হস্তে পদে শোথ, মূত্রকোষেব প্রদাহ ও ইউরিগিদাদি বোগ জন্মে ।

চিকিৎসা ।—যত সম্ভব সম্ভব জ্বাযুকে প্রকৃতভাবে বাধিতে চেষ্টা করা কর্তব্য । তজ্জন্য প্রথমতঃ একটা সৰু মেল-কাঁথিটাব দ্বারা অশ্রো প্রজ্জ্বাব করাইবে যদি কোনমতে কাঁথিটব প্রবিষ্ট কবান সাধ্যায়ত্ত না হয়, তবে পিউবিস অস্থিৰ এক অথবা দেড়ইঞ্চি উপরে এম্পিবেটব যন্ত্রেব সৰু চুঙ্গি দ্বারা বিধিয়া মূত্র বাহিব কবিয়া দিবে পিচকারী দ্বারায় সরল অস্ত্র হইতে মলও বাহিব করিবে পরে দক্ষিণ হস্তেব দুইটি অঙ্গুলি বা সমুদায় হস্তে তৈল মাখাইয়া আন্তে আন্তে মল-দ্বার দিয়া প্রবেশ করাইবে এবং কামহস্তেব অঙ্গুলি যোনিমধ্যে প্রবেশ করাইবে যখন উহা দ্বারা অচ্-ইউটেরাইনিয়দিকে চাপিবে, তখন সৰল অস্ত্র বা রেক্টাম মধ্যে যে হাত আছে, তদ্বারা জ্বাযুব উপবিভাগ বা ফণাসু এক পার্শ্বেব সেকোইলিয়েক সিংকণ্ড্রাসিস্ সন্ধিব নিকট দিয়া উপবিভাগে ঠেলিয়া তুলিয়া দিতে হইবে • এইরূপ প্রক্রিয়া করিবাব পূর্বে খাট্ বা তক্তপোষেব একদিকে শোয়াইবে ও ক্লোরোফর্ম দ্বারা অচেতন কবিবে । পশ্চাদাবর্তন একবার শুধাইলে হজ সাহেবেব আবি-কৃত পেসাবী ব্যবহাৰ করাইলে উক্ত পীড়া জন্মিবাব আশ সম্ভাবনা থাকে না ।

কোনমতেই যদি জ্বাযুব ফণসু উখিত করা না যায়, তবে গর্ভপ্রাব আবশ্যক হয় নতুবা গর্ভিনীৰ প্রাণবক্ষা হয় না ।

জ্বরবিকার বা একজ্বর ।—এই বোগ কঠিন হইলে গর্ভপাত হইবাব বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে । এই জ্ববে গর্ভিনীৰ শরীরেব উত্তাপ ১০৪ ১০৫ ডিগ্রী হইলে জ্ঞান কোনমতেই বক্ষা পায় না । টাইফয়েড ফিবাৰ গ্রহণী বোগের সহিত যুক্ত থাকিলে হাইড্রাজিবাই ১ কিঙ্ক পবিমাণে জলেব সঙ্গে চাৰি ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে অতি আশ্চর্য ফললাভ করা যায় কুচিব কাথ ১ আউন্স দিবসে ২ ৩ বার বিশেষ উপকাৰক ।

ফুস্ ফুস্ প্রদাহ বা নিউমোনিয়া ।—এই পীড়া সাধাবগতই বড় সংঘাতিক, বিশেষতঃ গর্ভবতীৰ পক্ষে বড়ই মারাত্মক । ম্যালেরিয়া জ্ববে কুইনাইন-ফেন উপকাৰক, নিউমোনিয়াতে ১০০ গ্রেণ মাত্রায় ফুস্-রাসও ভূজপ ৮ চ ডায় ইথাৰে এক গ্রেণ ফুস্-ফবাস অক কবিয়া

তাহারি ২ বিহু একত্বে উক্ত মিউশিলেজেব সঙ্গে দিনে তিনবার খাওয়া-
ইবু, সঙ্গ ন্যাতঃ কার্বনেট অফ স্যামোনিয় ৫ গ্রোণ এক আউন্স
ডিক্কাইন মিঙ্গে নাব সঙ্গে ৪ ঘটা অন্তর খাওয়াইলে দীর্ঘ উপকার
দর্শে

ক্ষয়রোগ বা থাইসিস্।—ডাক্তার প্লেকোয়াবেব মতে ক্ষয়বোগ-
গ্রন্থ বোগীদেব ক্ষয়বোগ জন্মিলে ৯। ১০ বৎসর কালও বাঁচে ন। এই
বোগে নিম্নোক্ত ঔষধ মহান উপকারী

এমঃ কডলিভার ৪ গ্রোণ

এম ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা ৪ গ্রোণ

এক একটা বটা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ তিনবারে তিনটা ২। ১ বৎসর
কাল ক্রমাগত সেবন করাইলে বিশেষ ফললাভ হয়

উপদংশ বা সিস্টিস্ —পাবদমটিত ঔষধে বিশেষ উপ-
কার দর্শে ইহা ঘাবা কণশবীবেও এই বোগ আক্রমণ করিতে
পারে না কিন্তু যে ঔষধে মুখ না আইসে, সেজন্য ঔষধ ব্যবহারই
কর্তব্য, এজন্য বাস্ট কে বাইড অফ মার্কবী ২ গ্রোণ মাত্রায় প্রত্যহ
লাইকব ওয়াইড জিবিই ১৫ ২০ বিহু ২ গ্রোণ অ ইওডাইড অফ পট শিয-
মেব সঙ্গে প্রত্যহ তিনবার খাওয়ান মাইতে পাবে

৩ মুগী বণ এপিলেপ্সী । —অর্ধ গ্রোণ অথবা ১ গ্রোণ মাত্রায়
ওয়াইড অফ পটাসিয়াম ইহতে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হয় ।

পাণ্ডুরোগ না জড়িস্ । কম্পাউন্ড কঁবারপিলি, কানাইটে-
মিউবিইটিক য়ানিডো সঙ্গে হবিডুকীব ফাট্ট, একটাক্ট বেনে-
ডোনা ও পডফিলমেব বটা, কিম্বা টিং নক্সডমিকা ও টিং বেনেডোনার
সঙ্গে হবিডুকী বা চিবাতীরু ফাট্ট দিয়া খাওয়াইলে বিশেষ উপকারক
হয়

কর্কট বোগ বা ক্যান্সার ।—এই পীড়া জন্মিলে মাহাতে গর্ভ
মা হয় তাহারি চেফা কব কর্তব্য গর্ভ হইলে তাহা পাত কবান
কর্তব্য, নতুবা পূর্ণকাল অতীতে প্রসূতি ও শিশু উভয়েই মৃত্যু বিলক্ষণ
আশঙ্কা থাকে যদি গর্ভের ৬। ৭ মাস অতীত হয়, আর ক্যান্সার

অতি অল্প স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তাহা হইলেও অকাল প্রসব অত্যাবশ্যক

• ডিম্বাধারাবরুদ —এই পীড়া সাতিশয় সাংঘাতিক এই পীড়া স্তন্য প্রসূত হওয়া পক্ষে অত্যন্ত ঐতিবন্ধকতা জন্মায় • শতকবা ৫০ জন বোগী ইহাতে মারা যায়

চিকিৎসা। কেহ কেহ টিউমার বিদ্ধ করিয়া জল বাহির করিয়া দিয়া থাকেন, কেহ বা টিউমার বাহির করিয়া দেন, কেহ বা অকাল প্রসব করাইয়া থাকেন

• সূত্রাবরুদ বা ফাইব্রিস টিউমার। জবাযুকে টব মধ্যে কখন কখন এই বোগ জন্মে ভ্রূণস্থায় আসিলে জবাযুব বিবদ্ধি সহকাবে টিউমার ৩ ৪ মাসে এত বড় হয় যে, গর্ভ না হইলে ৫ ৭ বৎসবেও • তত বড় হইতে পারে না।

চিকিৎসা। —যদি জবাযুব নিম্নভাগ বা গ্রীবার নিকট এ প্রকার অবরুদ জন্মে, তবে গর্ভপাত করান আবশ্যক হয়। ফণ্ডসেব দিকে হইলে উক্তকপা চিকিৎসা বিদ্যেয় নহে একপা অবস্থায় প্রসব হইলে জবাযু হইতে অধিক রক্তপাতের সম্ভব না থাকে রক্তপাত ঘটিলে পার্বক্লোরাইড অফ আয়রন সলিউশন্ বা দেশী গাবভেবেণ্ডাব আটু জবাযুকোট্রন মধ্যে লাগাইলে শোণিতপ্রাব বন্ধ হয়

ভ্রূণ ।

নানা কারণে ভ্রূণদেহে বহুবিধ বোগ সংঘটন হয়। সেই পীড়া অনুমান করা বড় সহজ নহে; কিন্তু গর্ভে উহা বৃত্ত হইলে অনায়াসে তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে

গর্ভে ভ্রূণের মৃত্যু হইলে উহা অচলভাবে অবস্থিতি করে, গর্ভিনীর উদর শিথিল হইয়া পড়ে, জবাযুব পেশী সমুদায় শিথিল হওয়াতে ইতস্ততঃ গাড়াইয়া বেড়াই, গর্ভিনী উদরে ভাব ও মৈত্রেয় বোধ করে, শুনদ্রয় ইচ্ছা নবম হইয়া পড়ে, তাহা ত অল্প জন্মে না, • বীর

অল্পখ^১ ক্ষুধামান্দ্য, মুখ দিয়া দুর্গন্ধময় প্রাশাস পতিত হইতে থাকে, পুনঃ পুনঃ কক্ষী উপস্থিত হয়, এই সকল দ্বাবাই যে সহজে ভ্রণেব যত্ন অবধাবিত করা যায় তাহা নহে, তবে যদি জন্মদয় একবার শুল, উচ্চ ও দৃঢ় হইয়া হঠাৎ আলগা ও নবম হইয়া পড়ে, তবে ভ্রণেব যত্ন হইয়াছে নিশ্চয় জানিতে হয়

গর্ভপাতেব উদ্যমকালে চিকিৎসা কবিত্তে হইলে প্রথমতঃ তাহা নিবাবণেব উপায় কবা কর্তব্য। ভ্রণেব যত্ন নিশ্চয় অবগত হইতে পাবিলে গর্ভপাত হইতে দেওয়াই শ্রেয়ঃ, নতুবা গর্ভিনীবি বিলক্ষণ অনিষ্টেব আশঙ্কা জ্ঞান কবিত্তে হইবে। কিন্তু এসবেব পূর্বে ভ্রণেব যত্ন নির্ণয় করা সহজ নহে, এ কারণ উহা সজীব আছে এই অনুমানে গর্ভপাত নিবাবণেব উপায় অবলম্বন কবিত্তে হইবে। জবাযু হইতে রক্তপাত হইয়া অম্প অম্প রেদনা উপস্থিত হইলে গর্ভপাত নিবারণে অনায়াসে কৃতকার্য হওয়া যায়। ব্যথা অধিকক্ষণ থাকিলে এবং অধিক রক্তপাত হইলে, বিশেষতঃ গর্ভিনী স্বাভাবিক বেগ দিতে আবস্ত করিলে তাহা নিবাবণেব কোন প্রত্যাশাই কবা যাইতে পাবে না।

চিকিৎসা ৭-গর্ভিনীকে কঠিন শয্যা শয়ন কবাইবে। শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়াব বিবাম লইবার উপদেশ দিবে। ভ্রণেব পূর্ণ মাত্রায় ২০ গ্রেন আফিজ, অথবা ৪০ | ৫০ বিস্কুল লডেলাম খাওয়াইতে হইবে। ডাক্তার চার্চিল বলেন ১০ বিস্কুল পবিমাণে সিঙ্কিওরামসব প্রত্যহ তিনবার খাইবার যুক্তি দিবে।

গর্ভপাতেব পাব প্রসূতিকে অতি সাবধানে রাখা কর্তব্য। কেননা এ অবস্থায় নানা প্রকার পীড়া হইবার সম্ভাবনা থাকে। যে সকল স্ত্রীবি গর্ভপ্রাব ও অকাল প্রসব প্রকৃতিসিদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহাদিগের জরায়ুর কিছুদিন বিশ্রাম দেওয়া কর্তব্য। অজন্ম ভ্রণসদৃশ হইতে দেওয়া বিধেয় নহে।

বারম্বার গর্ভপাত নিবাবণ করা কর্তব্য, ইহা উপায় নানা প্রকার স্ত্রী বা পুরুষ অথবা উভয়েই উপদেশ বোধ থাকিলে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা।

আইওডাইড অফ পটাশিয়াম	...	• ...	১—১ গ্রোন।
লাইকব হাইড্রাজিবাই পাবক্লোবাইড	:	•	১০ বিদ্র
ক্লোরোট অফ পটাশ	.	•	২ গ্রোন
অনন্তমূলেব কাথ	...	•	১ আং

এই মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার ঔষধ খাওয়াইবে

জ্বর বিজ্ঞী বা প্লাশেটাব ডিজেনারেশন বা অপকৃষ্টতা অকাল প্রসবেব কাবণ হইলে গর্ভপাতেব নির্দিষ্ট সময়েব পূর্ব হইতে ক্লোবেট অফ পটাশ ১০। ১৫ গ্রোন মাত্রাব জলেব সঙ্গে প্রত্যহ তিন বার খাওয়াইবে। যাহাদেব ৭ ৮ মাসে গর্ভপাত হওয়াতে বাবদ্যাব যত সন্তান প্রসব কবে, তাহাদেব গর্ভ হইলে নিয়মিত সময়েব ২ ১ পক্ষ পূর্বে প্রসব কবাইলে জীবিত পুত্র প্রসব হয়

- **কৃত্রিম গর্ভ** — ইংরাজীতে এই পীড়ার নাম সিউডো সাইমিস এই বোগে উদর ক্ষীত হইলেও বুদ্ধি পায় না, হস্ত দ্বাৰা চাপিয়া দেখিলে দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক বোধ হয়, অঙ্গুলি দ্বাৰায় আঘাত করিলে স্পষ্ট শব্দ অনুভূত হয় অজাতগর্ভ জীব কটিদেশে মাত্র ক্ষীত হয়; কিন্তু যে সকল জীব পূর্বে সন্তান জন্মিয়াছে, তাহাদেব উদর প্রকৃত গর্ভের ন্যায় বোধ হয় ধতু কাহার হ্রাস, কাহার বা এককালে বৃদ্ধি হয় স্তনদ্বয় ক্ষীত এবং আশাশয়ে অশুখ উপস্থিত হইয়া বমনোদ্রেক ও বমন হইয়া থাকে প্রসবকাল উপস্থিত হইলেও তাহার কোন লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় না

রোগনির্ণয়।—ইহাতে গর্ভের ক্ষে কয়েকটি মাত্র লক্ষণ দৃষ্ট হয়, সে গুলি সম্পূর্ণ নহে। প্রকৃত গর্ভ হইতে ইহাকে পৃথক করিবার উপায় এই যে, গর্ভ হইলে প্রতিমাসে লক্ষণ সকল যেমন পর পর দেখা যায়, তাহার পববর্তী মাসে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, জবাযু বুদ্ধি ও তৎ গ্রীবা ক্রমিক হ্রাস পায় না, জবাযু কুক্ষম ও ভ্রণশবীরে রক্ত সঞ্চালনের শব্দ শুভ্রত হয় না। সর্বাঙ্গপেক্ষা পবীক্ষা করিবার আব একটি উপায় এই যে, বোগীকে কোবোফবমেব আত্মাণ গ্রহণ কবাইলে উদবেব পেশী সমুদায় শিথিল হইয়া প্রকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ক্রমশঃ কোবো-

ফবমেব ক্রিয়া হ্রাস হইলে বোগী যেমন চৈতন্য প্রাপ্ত হয়, তাহাব উদরও তেমনি পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে

চিকিৎসা।—জ্বায়ু ও ডিম্বকোষেব অবস্থা সংশোধন জট নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার্য

ব্রোমাইড অফ পটাশিয়াম ৫ গ্রেন ।

অসাইড অফ পটাশিয়াম ৪ গ্রেন

জন ১ অং

এক মাত্রা দিবসে একবার প্রয়োগ কর্তব্য উপবি লিখিত দুই জব্য পৃথক ব্যবহারেও বিলক্ষণ ফল দর্শে

বমননিবারণার্থে অফিফে, সুগার অফ লেড, হাড্রোশিয়েনিক য়া-
মিড, বরফ প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পারে বায়ুজন্ত উদর স্ফীতি
ঘটিলে হিঙ্গ, তাপিন, তৈল কপূর চূর্ণ প্রভৃতিতে উপকার দর্শে
বলকারক ও লঘু আহাব দেওয়া বিধেয়

প্রসব ।

প্রসব দুই প্রকার,—প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক । যে প্রসবে জঃ
অগ্রগন্তক বাহির কবিয়া প্রসব বেদনা আবন্তের ২৪ ঘণ্টা মধ্যে নির্মিমে
জননিজঠর হইতে নির্গত হয়, তদ্রাব আগনার বা প্রসূতির কোন বিপন্ন
বিপত্তি উপস্থিত না কবে, তাহাকে প্রাকৃতিক প্রসব বলা যায় ইহাব
বিপরীত ঘটনা হইলেই তাহাকে অপ্রাকৃতিক প্রসব বলা গিয়া থাকে

প্রসবের পূর্বলক্ষণ ।—পুনঃপুনঃ প্রস্রাব ও ববস্রাব মণ-
ভাগেব ইচ্ছা, উদরেব অধোভাগে প্রাক্রিয়া থাকিয়া এক মোচড়া দেওয়াব
চেষ্টা বেদন, যে'নি হইতে পুনঃ পুনঃ, জলে পানীয় হ্রাস কবিলে
তাহাতে স্ফীততা, উষ্ণ ও জুজ্বায় অঁ কঁড়ানি, মনের প্রফুলতা,
পাহস, ক্ষুধারক্তি, শ্বাসকষ্টের হ্রাস, গমনাগমনে স্ফূর্তি ও অগত্যতা
অমৃভব ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়

অভিশ্রম, ক্রান্তি, অজীর্ণতা, মন্দাগ্নি, কোঠবধ, ইত্যাদি, দ্বার কখন

কখন কৃত্রিম প্রসব বেদনা (ফলস পেন্) উপস্থিত হইয়া থাকে • কিন্তু ইহাকে প্রকৃত বেদনা হইতে অনায়াসে চিনিয়া লওয়া যায় কৃত্রিম বেদনা জ্বাযুব ফণ্ডস্ হইতে আবস্ত হইয় উহাব অস্পষ্ট স্থানে ব্যাণ্ড হয়, ও অনিয়মিত বিবামের পর পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইয় থাকে, যোনি হইতে ক্লদ নিঃসরণ ও অচ ইউটেব ই প্রসারিত হয় না • আর প্রকৃত প্রসব বেদনা সার্ভিক্স ইউটেবাই হইতে আরম্ভ হইয়া ফণ্ডসেব দিকে উঠিয়া ক্রমে সম্মুখ দিকে সমস্ত উদর ব্যাপিয়া পড়ে ; ইহাতে নিয়মিত বিবাম কালান্তর বেদনা ক্রমিক শীঘ্র ও প্রবলরূপে পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইয়া থাকে • কখন কখন কৃত্রিম ব্যাণ্ড প্রকৃত ব্যাণ্ডায় পবিণত হয় এ কাবে কৃত্রিম ব্যাণ্ড নিবাব জন্য বোগীকে বিগ্রামাবস্থায় রাখিও রাখ কর্তব্য ও অল্প বিবেচক ঔষধ প্রয়োগে পব আফিগ প্রভৃতি বেদনা নাশক ঔষধ ব্যবহার কবা উচিত •

প্রাকৃতিক প্রসবে কিছু মাত্র সাহায্যেব আবশ্যক কবে না, এজন্ত সে বিষয়ে অপ্রসব হওয়া নিতান্ত অপয়োজনীয় যিনি প্রসব কবাইবেন, তাহার নিকট নিম্নোক্ত দ্রব্য ওলি রাখা নিতান্ত আবশ্যক যথা,—একটা ইলাস্টিক গম ক্য গিটার, অস্প পবিমাণ লডেলম, অর্গটচূর্ণ, ক্লোবোফবম, একখানি কাঁচি, কয়েকটা আল্পিন্, কয়েক গা ছি বেসমের সূতা, একখণ্ড স্পঞ্জ, এবং একটা পেটীবন্ধনী

স্বাভাবিক প্রসবকালে প্রসবিনীকে কুন্ডন বেগ দিতে নিষেধ করা উচিত এক্ষণস্থলী হস্ত দ্বাবা ইউটেবাই বা যোনিদেশ প্রসারিত কবা কর্তব্য নহে; তাহাতে বিপরীত ফল ফলিতে পারে • প্রসবাবস্তুর কালে প্রসবোপযোগী শয্যা প্রস্তুত কবা কর্তব্য একখানি তোষক, তোষকেব উপর এক খানি মসৃণ চূর্ণ বা তক্ষপ জিনিষ, তাহার উপর এক খানি কস্ক, কস্কের উপর এক খানি ভাঁজ কব কপড় প্রসবকাল অতি নিকট হইলে প্রসবিনীকে শয্যায় শয়ন কবাইবে বাম-পার্শ্বে শয়ন কবাই কর্তব্য • প্রসবস্তক প্রদেশে চাপিয়া ধরিব পূর্বে প্রসবিনীকে মধ্যে মধ্যে উঠিয়া বসিতে দিবাব কোন হানি নাই • এ প্রজন্য প্রভৃতি গ্রীষ্ম বোধ হইলে শয্যাব কদলু মরাইয়া

লওয়া আবশ্যক এবং সচ্ছন্দরূপে বায়ু সেবন করাইবে। ক্ষুধা হইলে
চুপ, আনোকাট, চা ও গিফ্ট পানীয় জব্যাদি দেওয়া যায়। জনমস্তক
যে নিম্নে চাপিয়া পড়িলে উক্ত স্থান হঠাৎ বিদীর্ণ না হয়, অথচ উহা
সম্মুখদিকে চলিত হয়, এজন্য প্রমোতা একখান কমাল ৪ ৫ ভাঁজ
করিয়া তদ্বাচা ব্যথার সময় গুহদেশে চাপিয়া না বাধিয়া জনমস্তক সম্মুখ-
দিকে অস্পন্দ অস্পন্দ চেলিয়া দিবে। জনেব মস্তক বাহির হইবার পূর্বে
কখন বহির্গত হইতে বিলম্ব দেখিলে প্রমোতা একটা কিসা দুইটা অঙ্গুলি
শিশুর কক্ষদ্বয়ে লাগাইয়া আকর্ষণ করিবে, এবং নিকটস্থ কাছাকেও
প্রস্থতির উদ্বোধন হাত লাগাইয়া তদ্বারা জব্যাককে চাপিয়া ধরিবে
ইহাতে জন নীত্র ভূমিষ্ট হয়, নীত্র ফুল পড়ে, এবং জব্যাক হইতে অধিক
বক্তব্যও হয় না।

শিশু ভূমিষ্ট হইবামাত্র অঙ্গুলি দিয়া তাহার মুখে বক্র বাহির করিয়া
ফেলিবে। সন্তান নীবেগ হইলে ভূমিষ্ট হইবামাত্র জনন করিয়া উঠে।
শ্রাম প্রস্থান উত্তমরূপে বহিতে দেখিলে নাড়ি ছেদ করিবে। তাহার
পরে ফ্লানেল অথবা পশমী কাপড়ে জড়াইয়া বন্ধ করিবে। প্রমোতা
প্রস্থতির উদ্বোধন দিয়া পেটে আর সন্তান আছে কি না পরীক্ষা
করিয়া যখন না থাকা জানা যাইবে, তখন পেটবন্ধনী দিয়া বস্ত্রদেশ
আঁটিয়া বাধিবে। কিন্তু আজিকালিকার সুবিজ্ঞ প্রমোতাগণ বলেন,
অধিক বক্তব্য না হইলে পেটবন্ধনের আবশ্যকতা নাই। ফুল পড়িতে
গেলি হইলে তাহা টানিয়া বাহির করা অকর্তব্য। ফুল বাহির হওয়ার
পরে উদবেগ নিয়ন্ত্রণ বস্ত্রদেশ কিছু আঁটিয়া পেটবন্ধনী দ্বারা বাধিবে
ইহা দ্বারা জব্যাককে সঙ্কচিত ও অচলভাবে এক স্থানে রাখা যায়
উদবেগ লনিত চর্মা ও পেশী নীত্রেই পূর্ববৎ স্বাভাবিক মতান অবস্থা প্রাপ্ত
হয়। ফুল বাহির হইবার পূর্বে ১০ মিনিট পর্যন্ত পূর্বমত জব্যাক
কাঁপুনি আঁপুনি মর্দন করিবে। প্রমোতা একখান কমাল পাট
করিয়া যোনির উপর বাধিবে।

অধুনা তন বিজ্ঞ চিকিৎসকে বা প্রমোতা নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহার্য
নির্দেশ করিয়াছেন।

আর্গট অফ বাই	...	...	১৫—২০ গ্রেণ ।
বোবাক্স	...	...	৮ গ্রেণ ।

একত্র মিশ্রিত কবিয়া একবার কবিয়া প্রতিদিন খাইতে দিবে ।

প্রসব হইবার কিছুক্ষণ পূর্বে যখন নাড়ি দিয়া ধমনী বহন করিবে, সেই সময়ে শিশুর নাড়িতে সংলগ্ন স্থান হইতে দুই ইঞ্চি উপরে এক লিগেচার (দৃঢ় স্বত্রেব বন্ধন) এবং তাহার ২ ও ইঞ্চি উপরে আর এক বন্ধন দিয়া উভয় বন্ধনের মধ্যে কাঁচি দিয়া নাড়িচ্ছেদ কবিবে ।

সংকীর্ণ বস্তিকোটের মধ্যে জন্মস্রুত দীর্ঘকাল যদি চাপা থাকে, অথবা জন্মের মস্তক বাহির হইবার পূর্বে শরীরের অবশিষ্ট আবদ্ধ হইয়া গলদেশে ফাঁস লাগে, তাহা হইলে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মস্তকে রক্তাধিক্য বশতঃ সন্ধ্যাসন্ধি বোঁগ জন্মে ও শিশু মৃতবৎ পতিত থাকে । এরূপ স্থলে অগ্রে নাড়ি কাটিয়া তথা হইতে ১।২ তোলা পবিশাগে রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া কর্তব্য ।

প্রস্থতির চুচুকে ক্ষত জমিলে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়াব প্রয়োজন ।

বোবাক্স (সোহাগা)	...	...	২ ড্রাম
ক্রিটা প্রিসিপিটেটা (খড়িমাটিচূর্ণ)	...	...	১ আং ।
স্পিরিট	...	...	৩ আং ।
গোলাপ জল	...	...	৩ আং ।

এই চাবি দ্রব্য একত্র কবিয়া লোশন প্রস্তুত কবিয়া তদ্বারা চুচুক ধৌত করিতে দিবে ।

সাঁদা মলম	...	...	৪ ড্রাম
বাদামের তৈল	...	...	১ আং ।

এই দুই দ্রব্য মিশ্রিত কবিয়া ১ আউন্স মধুস সহজে মिलाইবে । শোষে বালসম অফ পিক ২৫ ড্রাম তাহাতে অপ্পে ফাপ্পে ঢালিয়া দিয়া মলম প্রস্তুত করিবে ।

স্তন ফোর্টিক ।—প্রসবান্তে শিশুকে স্তন পান করাইবার প্রথম তিন দিবস মধ্যে, অথবা গর্ভাবস্থায় প্রসূতিদিগের স্তনের কোন অংশ ইনফ্যামেশন অর্থাৎ প্রদাহ জন্মিয়া তাহাতে পুঁথ হয় ।

চিকিৎসা ।—রোগেব প্রথমাবস্থায় ববফ প্রয়োগ ব্যবস্থা । তাহাতে উপকার প্রদর্শিলে পুন্টিসু ; পুন্টিশে ফোটক পরিপাক হইলে তাহা কাটিয়া দেওয়া যাইতে পারে । কোন কোন স্থলে ফোটকে পুঁয়া-ধিক্য হওয়ায় আপনাহইতেও কাটিয়া যায় । তাহাব পব ক্ষত গুলু না হওয়া পর্যন্ত নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া করিবে

কাচ আঁটিবাব পড়িৎ একটু নইয়া তাহাতে কিছু কার্বলিক য়্যানিড মিলাইবে ; পবে ৬ ইঞ্চ সমচতুর্কোণী এক খানা বাঁতা পাতার উপব ৪ ইঞ্চ পুর করিয়া পুর্কোক্ত পড়িৎ মাখাইবে উহান পড়িৎ লাগান পার্শ্ব ফোটকেব উপব লাগাইয়া ফিকিং প্লাষ্টাব ও ব্যাণ্ডেজ দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে । প্রতিদিন এই পটী একবাব বদলাইতে হয় কিন্তু যদি পুঁয় অধিক হয়, তবে দুইবাব বদলাইতে হইবে । পটী পরিবর্তন করিবাব সময় ক্ষতমধ্যে লায়ু এবিষ্ট নী হইতে পারে এমনত চেষ্টা করিবে ।

অপ্রাকৃতিক প্রসব ।—প্রসবে কোন না কোন প্রকাব প্রতি-বন্ধক জন্মিলেই তাহাকে অপ্রাকৃতিক প্রসব বলে । এইরূপ প্রসবে যে সকল বিঘ্ন বিস্তৃতি হয়, সংক্ষেপে তাহা চিকিৎসাসহ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে

১ । ক্ষুদ্র রক্ত যুক্ত অচ্ ইউটেরাই ।—প্রসবেব পুর্বে এমন কি প্রসবসময়েও কোন কোন ঔী অচ্ ইউটেরাই ঠিক করা যায় না কাহাব কাহান ক্রমাগত প্রসববেদনার পর অচ্ ইউটেরাই ক্ষুদ্র বস্ত্রাব আয় দেখায ।

চিকিৎসা ।—সভাব কর্তৃক প্রসব হইতে পারে কি না, অগ্রে দেখা উচিত তাহা নী হইলে হাইড্রেটেড ক্লোবেল, অহিফে, ক্লোবোফবম্ ইত্যাদি ব্যবহার্য ইহাতেও কোন ফল না দর্শিলে অচ্ ইউটেরাইয়েব চতুর্দিক অ্প্প অ্প্প চিবিয়া দেওয়া কর্তব্য ।

২ । অচ্ ইউটেরাইতে অর্ধরূ দেহ সৃষ্টি ।—এই বোণাক্রান্ত ক্রীলীকদিগেব প্রসব হওয়া অসম্ভব । আপনা হইতে প্রসব হইতে পারে কি না অগ্রে নিচুক্ষ তাহাই দেখা উচিত, তাহা না হইলে ক্লোবো-

ফরম, হাইড্রোটেড ক্লোবেল পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করিবে তাহাতে ফল না দর্শিলে ফর্শেপ ব্যবহার কবিতে হইবে। গর্ভস্থ জ্ঞান যত জ্ঞানিতে পারিলে ক্রকেট যন্ত্র দ্বারা উহাব মস্তক বিদ্ধ, কখন বা খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রসব কবাইবে। জ্ঞান জীবিত থাকিলে অস্ত্র দ্বারা অচ ইউটে-রাই প্রসারিত করিয়া প্রসব করান যায়।

৩। সংকীর্ণ ও অপ্রসারিত, যোনিরুদ্ধ ।—অধিক বয়সে প্রথম গর্ভ হইলে বা স্বভাবতঃ যোনি সংকীর্ণ হইলে প্রসব হইতে বড় কষ্ট হয়

চিকিৎসা ।—যাহাদিগের যোনিবৃদ্ধ স্বাভাবিক ক্ষুদ্র, তাহাদের ঐ স্থানে মেক ও উষ্ণ জলের পিচ্কাবী দিলে উহাব রক্ত বিস্তারিত হইয়া প্রসবক্রিয়া সমাধা হয়। তদনন্তর ক্লোরোফর্ম, ক্লোবেল, টাটাং এমেটিক ব্যবহার করিবে; তাহাতে সফল প্রাপ্ত না হইলে অচ ইউটে-বাই কাটিয়া প্রশস্ত কবাইতে হইবে

৪। ভ্যাজাইনাল্‌ সিস্টোসিস্‌ ।—প্রসববেদনাব সময়ে যে ক্ষণেক্ষণে প্রস্রাবের বেগ হয়, সেই বেগ সম্বরণ কবিয়া মুত্র ত্যাগ না করিলে জ্ঞানমস্তক বস্তিকোটরে প্রবেশ কবিবার সময় মুত্রসহ মুত্রাধারকে যোনিব উপর চেলিয়া নামায়, তাহাতে যোনিব উপরিভাগ ভিতর দিকে ফুলিয়া উঠে ইহাকেই ভ্যাজাইনাল্‌ সিস্টোসিস্‌ কহে।

চিকিৎসা ।—যদি জ্ঞানমস্তক বস্তিকোটরে অধিক প্রবেশ না করিয়া থাকে, তবে মেন-ক্যাথিটার অর্থাৎ পুরুষকে যে শলাকা দ্বারা প্রস্রাব কবান যায়, কিংবা গম ইলাস্টিক ক্যাথিটার নীচের দিকে বাঁক ফিরাইয়া মুত্রধারে চলিয়া শূন্যক প্রস্রাব কবাইবে যদি শলাকা প্রবিষ্ট না হয়, তবে ব্যাথাব বিবাসকালে এক হস্ত দ্বারা জ্ঞানমস্তক উপবদিকে চেলিয়া রাখিয়া, অপব হস্তে ক্যাথিটার ঢালাইবার চেষ্টা করিবে। ইহাতেও কৃতকার্য না হইলে এস্পি্রেটর যন্ত্রেব স্ফটিকাবৎ টোকার দ্বারা যোনির ভিতর দিয়া মুত্রাধার বিদ্ধ ক্রিয়া মুত্র বাহির করিবে। উহাতে কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই

৫। মুত্রাধারে পাথরী ।—মূত্রাধারে পাথরী হইতে

বিন্ন উপস্থিত হয়, জগমস্তক বস্তিকোটবে যতক্ষণ প্রবেশ না কবে, ততক্ষণ অঙ্গুলি বা অন্য কোন উপায় দ্বারা প্রস্রবসহ মূত্রাধার বস্তিকোটবে উপবে চৈনিয়া রাখিবে । কিন্তু এই বোগেব পূর্বে অবগত না হইলে এবং প্রস্রব বড় হওয়া প্রযুক্ত জগমস্তক দ্বাৰা নিষে চাপা পড়িলে, লিথটাইট নামক যন্ত্রদ্বাৰা নিষ্পেষিত কবিয়া খণ্ড খণ্ড করিবে, অথবা উচিত যন্ত্র দ্বারা মূত্রনালী বা ইউব্রিখা প্রশাবিত কবিয়া পাথরী বাহিব কবিবে ।

৬ । ভ্যাজাইনাল্ হানিয়া ।—কখন কখন অন্ত্রেব কিস-দংশ যোনিব পশ্চাত্তাগেব ও মূবলান্ত্রেব সম্মুখে সবিয়া পড়ে, এবং তাহার ভিতব মল থাকিলে যোনিব পশ্চাত্তাগ ভিতব দিকে উচ্চ হইয়া উঠে, ইহাকেই ভ্যাজাইনাল্ হানিয়া বলা যায় ।

চিকিৎসা ।—প্রথমতঃ নিমগামী অত্র অঙ্গুলি দ্বাৰা তুলিয়া দিবার চেষ্টা কবিবে । তাহাতে কৃতকার্য হইতে না পাবিলে ফর্মেস যন্ত্র দ্বাৰা সম্ভান প্রসব করাইবে ।

৭ । সরল অন্ত্রে কঠিন মল সঞ্চয় ।—অঙ্গুলি দ্বাব্য পরীক্ষা করিলে যোনিব পশ্চাত্তাগ উচ্চ বোধ হয়, এবং তন্মধ্যে অঙ্গুলিব অগ্র-ভাগ দিয়া পশ্চাদিক চাপিলে গর্ভাকার হইয়া পড়ে ও নিম্নদিক চাপিলে কিছু মল নির্গত হয় ।

চিকিৎসা ।—ওষধাব দিয়া গবম জলেব পিচকাবী দিবে । তাহাতে মবলান্ত্র পবিস্থার না হইলে একখানা ছোট ফোড় (প্যাচুলা) অথবা ওখুড়ি (পুপ) দিয়া কুপিত মল টানিয়া বাহির কবিবে ।

৮ । ক্ষীত ও বেদনায়ুক্ত যোনি ।—জগমস্তক অধিককাল বস্তিকোটবে আবদ্ধ থাকিলে তাহার শিবায উপযুক্ত সঞ্চালিত হইতে না পাবায় যোনি প্রভৃতি কোর্মলাজ ক্ষীত ও বেদনায়ুক্ত হয় । বাবস্থার যোনিমধ্যে হস্ত প্রবিষ্ট কবিয়া পরীক্ষা করিলে এইরূপ হয়, এবং সর্ব্ব ইহার প্রতিকার না ক্রিবির্নে বিলক্ষণ বিপদেব সম্ভাবনা ।

চিকিৎসা ।—ববফ বা শীতল জলেব পীটী দিবে, মটুবা উষা-জলেব সেক দিবে । তাহাতে ব্যথাব কিছু সম্ভা দেখিলে ফর্মেস

যন্ত্রদ্বারা প্রসব কবাইবে কিন্তু প্রসববেদনা কাপনা হইতে আবৃত্ত হইলে উক্ত যন্ত্র ব্যবহার কবা অনাবশ্যক

৯ । অবিক্র হাইমেন ।—অনেকের গর্ভ হইলেও হাইমেন থাকে । সেই সকল স্ত্রীলোকের প্রসবসময়ে উক্ত দৈহিক যবনিকা সচবাচব বিদ্যাবিত হইয়া যায়, কিন্তু কখন কখন তদ্বারা জগমস্তক বহির্গত হইতে না পাবায় প্রসবে বিলম্ব হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—অস্ত্রদ্বারা হাইমেন দ্বিভাগ করিয়া দিলে জগমস্তক সহজেই বহির্গত হয় ইহাতে জগমস্তক বাহির হইবার সময় গুহদেশ বিদীর্ণ হওয়াব বিলম্বন সম্ভাবনা, এজন্য হস্ত দ্বারা উক্ত স্থান বক্ষা কবা আবশ্যক

১০ । সূদৃঢ় গুহদেশ ।—অধিক বয়সে প্রথম গর্ভ হইলে, অথবা গুহদেশে ক্ষত ও ক্ষত স্থল চিহ্ন থাকিলে ঐ স্থান অনেক বিলম্বে প্রসাবিত হয়

চিকিৎসা । টার্টার এমেটিক ৩ গ্রেণ জলের সঙ্গে, গরম জলের সেক ইত্যাদি ব্যবহার কবিলে প্রতিকার হয় যত, শুকবেব চর্কি ইত্যাদি স্নিগ্ধ দ্রব্য উক্ত স্থানে বিমর্দন কবিলে উপকার দর্শে, ইহাতেও কৃতকার্য না হইলে কেহ কেহ গুহদেশের অন্তস্তলের কিয়দংশ চিবিয়া দিতে বলেন

প্রসবের ব্যাপাবর্তী সহজ নহে, অতি গুরুতর কার্য এজন্য বিশেষ পারদর্শী না হইয়া ইহাতে কাহারও হস্তক্ষেপ কবা কর্তব্য নহে সাধারণতঃ সকলেবুই নিম্নলিখিত কয়েকটি কথায় যত্নসহকারে সন্ধান করিয়া রাখা কর্তব্য ।

১ যথাসময়ে—স্বভাব কর্তৃক, যদি কোন বিঘ্ন অপসাবিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহাতে চিকিৎসকেব হস্তার্পন কবা কর্তব্য নহে

২ সহজ উপায়ে প্রসব কবাইতে পাবিলে গুরুতর উপায় অবলম্বন কবা কর্তব্য নহে ।

৩ জন্মায়ুব সংশোধন ক্রিয়া সমভাবে থাকিলে প্রতিশ্রুত দূর কবাব পব স্বভাবের ক্রমানুসারে প্রসব হইতে দেওয়া বিধেয়

৪ "কখন কখন পতিবন্ধক দূব হইলেও প্রসব হয় না, এরূপ স্থলে যজ্ঞদ্বারা প্রসব কৰাইতে হয়


৫। "কোন যাজ্ঞিক প্রসবে কত কালবিলম্ব হয় তাহাও বিবেচনা করা কর্তব্য

৬ ফসেপ দিয়া প্রসব করান অসাধ্য বোধ হইলে প্রসবিনীকে রক্ষা কবিবাব জন্য জঠরস্থ জ্ঞান নষ্ট কবিয়া প্রসব কবান যুক্তিযুক্ত। তাহা না হইলে ভ্রণসহ গর্ভিনীকেও কালক্রমে পতিত হইতে হয়।

শারীর-তত্ত্ব । (Physiology)

সাধারণ বিষয় ।

জীবদেহে যে সমস্ত পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহা বা দুই ভাগে বিভক্ত, যথা শরীর বা অর্গানিক, এবং (যবক্ষারমানবিশিষ্ট ও যবক্ষার



মনুষ্য-কঙ্কালের চিত্র ।

যানশূন্য) যবক্ষাবয়ানশূন্য বিভাগ অর্থাৎ ইহাতে জলযান, অগ্নযান ও অঙ্গাব আছে, কিন্তু যবক্ষাব যান নাই এই শ্রেণীস্থ নিম্নলিখিত পদার্থগুলিই প্রধান

১। চর্বি ও তৈল —জীবিত দেহে চর্বি তবলাবস্থায় কোষ মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এই চর্বিকণায়ুক্ত কোষ সকল সংযোজক তন্তু। বক্তবহা নাড়ী ইত্যাদি সুকলেব সহিত জড়িত হইয়া কঠিন ও দৃঢ় মেদ-তন্তু (এডিপোজ টিস্সু) উৎপন্ন করে। এই চর্বি আহারীয় পদার্থেব চর্বি হইতে প্রস্তুত হয়, কিন্তু অগ্নাশু ভুক্ত দ্রব্যেব (শ্বেতসাব, অণুনাশ জাতীয় পদার্থ ইত্যাদি) বাসায়নিক পবিবর্তনেও চর্বি উৎপত্তি হয়

২। কোলেস্টারিন —এই পদার্থ জীবদেহে চর্বির স্থায় তরঙ্গ থাকে না, ইহা কঠিন অকাবে বক্ত, পিত্ত ও স্নায়িব পদার্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৩। এমিলয়েড।—এই জাতীয় দ্রব্যে চর্বিব স্থায় অঙ্গাব, উদযান ও অগ্নযান আছে বটে, কিন্তু অগ্নযান বাষ্পেব পবিমাণ অধিক, এবং যে পবিয়ণ অগ্নযান ও উদযান বাষ্পেব সংমিলনে জলের উৎপত্তি হয়, ইহাতেও ঐ দুই বস্তু ঠিক সেই পরিমাণে আছে।

দ্বিতীয় যবক্ষাবয়ানযুক্ত বিভাগ —এই বিভাগস্থ পদার্থে অঙ্গাব, উদযান ও অগ্নযান ব্যতীত যবক্ষাবয়ান এবং কোন কোন সময়ে গন্ধক ও দীপক (ফস্ফরাস) থাকে। এই শ্রেণীস্থ বিভিন্ন পদার্থ কর্তৃক দেহেব তন্তু সমুদায় প্রধানতঃ গঠিত হইয়া থাকে। ইহাদিগেব শ্রেণী নিম্নোক্ত একাধারে বিভক্ত হইয়াছে।

১। প্রোটিন বা এলবুমিনাইড পদার্থ।—যবক্ষাবয়ানযুক্ত বিভাগেব মধ্যে প্রোটিনই সর্বাপেক্ষা প্রধান। ইহা দ্বাবাই জীবিত তন্তু সকল নির্মিত ইহা অণুনাশ জাতীয় পদার্থ ইহা লিম্ব, ফাইল, বক্ত ইত্যাদিতে বক্ত পবিমাণে পাওয়া যায়। রক্তেব ফাইব্রিন, মাংসেব মাংসোসিন, অণ্ডেব অণুনাশ এবং দুগ্ধেব ফেজিন এই জাতীয় পদার্থ।

২। ফার্মেন্টে সমুদায় —ইহা মুখেব লালনা, পাকায়িক, আক্লিক, এবং ক্লোমবসে অবস্থিত ইহাব প্রধান গুণ এই যে, ইহা যাহাব সহিত মিশ্রিত হয়, তাহাতেই রাসায়নিক পরিবর্তন উৎপন্ন কবে এই পদার্থেব অস্তিত্ব হেতু বিভিন্ন বসেব ভুক্ত পদার্থ ভুক্ত পদার্থকে পরিপাকের ক্ষমতা জন্মে

লালনাস্থিত ফার্মেন্টেব নাম টায়ালিন পাকায়িক বসেব ফার্মেন্টেব নাম পেপ্সিন, ক্লোমবসেব ফার্মেন্টেব নাম প্যানক্রিয়েটিন। টায়ালিন শ্বেতবসেব উপব, পেপ্সিন মাংসজাতীয় পদার্থেব উপব, এবং প্যানক্রিয়েটিন উভয়বিধ সামগ্রীেব উপব ক্রিয়া প্রকাশ কবে।

৩। বর্ণোৎপাদক পদার্থ।—বর্ণোৎপাদক পদার্থেব মধ্যে বক্তস্থিত লালবর্ণ হিমোগ্লোবিন নামক পদার্থই প্রধান, কাবন ইহা হইতেই অন্যান্য বর্ণসকল উৎপন্ন হয় বর্ণোৎপাদক পদার্থ—পিত্ত, প্রস্রাব, চর্ম, অক্ষিগোলক, এবং অন্যান্য ঐন্দ্রিক যন্ত্রে অবস্থিতি করে।

নরদেহস্থ ইন্ডার্গানিক পদার্থ —ইহাদের অধিকাংশই খাদ্য ও পানীয় হইতে উৎপন্ন খাদ্যস্থিত ইন্ডার্গানিক পদার্থেব কিয়দংশ দেহমধ্যে তন্তু নির্মাণে নিযুক্ত হয়, কতকংশ মল, মূত্র, ও ঘর্মাদিরূপে নির্গত হইয়া যায়। দেহস্থিত ইন্ডার্গানিক পদার্থেব মধ্যে নিম্নোক্তগুলি প্রধান,

১ নানাঐ কাব বাষ্প যথা,—অগ্নিবান, উদমান, যবকাবযান, গন্ধক, অগ্নাবযুক্ত উদমান, ঘর্ম, অগ্নারক ইত্যাদি গন্ধক ও অগ্নাবযুক্ত উদমান অস্ত্রে এবং ঘর্মগন্ধক বাষ্প বক্ত প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

২ জলেব পরিমাণই জীবদেহে অত্যধিক সামগ্রী দেহেব ভাবেব ২ ভাগ জল, অবশিষ্ট ৩ ভাগ অন্যান্য পদার্থ। শরীরেব প্রধান প্রধান রস এবং অস্থিমাংসাদিতে জলেব পরিমাণ নিম্নলিখিত একাবে প্রদর্শিত হইবে উপবোক্ত রস ও অস্থিমাংসাদিকে সহজ ভাগ করিলে তাহাতে তাহাদের পার্থক্য লিখিত কল্প জলীয় ভাগ জানিতে হইবে

দন্ত

...

১০০

অস্থি

১০০

উপাঙ্গি	...	৫৫০
মাংসপেশী	...	৭৫০
বিক্রী (লিগামেন্ট)	...	৭৬৮
মস্তিষ্ক	...	৭৮৯
শোণিত	...	৭৯৫
সাইনডিয়া	...	৮০৫
পিও (বাইল)	...	৮৮০
হৃৎ	...	৮৮৭
ক্লোমবস	...	৯০০
পেপ্সিন	...	৯৩৬
লিম্ব	...	৯৬০
পাকশায়িক বস	...	৯৭৫
ধর্ম	...	৯৮৬
লালা	...	৯৯৫

ময়ূরাদেহেব উপাদানেব মধ্যে জলের আয়োজনীয়তা উপবিলিখিত তালিকাধূমে বিশেষ বৃত্তিতে পাবা যাইবে জল ন থাকিলে তন্তু-সকল সবস, পুষ্ট ও ক্রিয়াক্ষম থাকে না জলীয়ভাগী শুকাটলেই তাহাবা শুষ্ক, কঠিন ও নষ্ট হইয়া যায়

৩ লবণ—সোডিয়াম ক্লোরাইড ও পটাশিয়াম ক্লোরাইড এই দুই লবণ প্রায় শবীরেব সর্বত্রই বর্তমান আছে

৪ বজ্রবিগ ফস্ফেট—ক্যালসিয়াম্, পটাশিয়াম্, সোডিয়াম্, ও ম্যাগনেসিয়াম্ ফস্ফেট এই ফস্ফেট প্রায় সকল তন্তু ও বসে দেখা যায়

৫ ক্যালসিয়াম কার্বনেট অস্থিতে এবং পটাশিয়াম ও সোডিয়াম কার্বনেট বক্ত প্রভৃতি বসে আছে

৬ সিলিকা—প্রভাব ও শোণিতে অল্প পরিমাণে সিলিকা পাওয়া যায় এ ছাড়া গুপ্তি, কেশ ও অন্যান্য স্থানেও ইহাব অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় ।

৭ লৌহ—বস্তুর মধ্যস্থিত হিমোগ্রবিন্ ন্যূনক পদার্থে লৌহ আছে এ ছাড়া অস্থি, মাংসপেশী এবং অন্যান্য তন্তুতেও এবং স্নায়ু, কাইল, ফাইব্রিন, পিত্ত প্রভৃতি রসেও লৌহের চিহ্ন পাওয়া যায়

মানবদেহের আণুবীক্ষণিক সংগঠন ।—বস্তুর কবিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্যদেহ নানা প্রকার ভাগে বিভক্ত, যথা,— অস্থি, পেশী, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুস্ফুস, অন্ত্র ইত্যাদি। অভিশয় স্বল্পম দৃষ্টিসহকাৰে দেখিলে জন্মিতে প্ৰ'ব' য'য যে, ঐ ভিন্ন ভিন্ন অংশ নানাবিধ তন্তুনির্মিত, যথা সংযোজক (কনেক্টিভ), কোষিক (এপি-থিমিয়ান), স্নায়বিক (নার্ভাস), পৈশিক (মাস্কুলার) প্রভৃতি জনতঃ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই সমস্ত তন্তুগণ নবদেহ চক্ষু-অগোচর একমাত্র আণুবীক্ষণিক পদার্থ (ওভম বা ডিম্ব) হইতে উৎপন্ন। আণুবীক্ষণ যন্ত্রেব সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্যদেহেব তন্তু প্রভৃতি ওভমের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র ও নানা আকার বিশিষ্ট কোষ নির্মিত।

প্রোটোপ্লাজম ইহা অণুজাল জাতীয় পদার্থ, আঠাবৎ ঘন ও অর্ধতবল, জলের সহিত মিশ্রিত হয় না, উত্তাপে জুমিয়া কুঠিন হইয়া যায়, একারণে কোন জন্তুই আপন দেহের উত্তাপের অত্যধিক উত্তাপ-যুক্ত হইলে বাচিতে পাবে না। প্রাণী সমূহেব জীবনধারণক্রিয়া কর্তৃক দেহ হইতে প্রতিদিন বহুসংখ্যক কোষ নষ্ট হইতেছে, এবং তাহাদের স্থানে নূতন কোষ নিমেষমধ্যে উৎপন্ন হইয়া তাহাদের ক্ষতি পূরণ করিতেছে। স্থান, অবস্থা এবং ক্রিয়াভেদে কোষ সকলেব ভিন্ন ভিন্ন আকার দৃষ্ট হয়। কোষ সকলে একত্র সংযুক্ত হইয় তন্তু, এবং তন্তুগুচ্ছ একত্র মিলিত হইয়া দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও যন্ত্রাদি নির্মাণ করিয়া থাকে। কখন কখন কোষসকল আপন গায়েব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবর্তন দ্বারা এবং কখন বড়ই বা বহুসংখ্যক কোষ-মধ্যস্থ সংযোজক পদার্থ দ্বারা সংযুক্ত হইয় থাকে। এইরূপে সংযুক্ত হইলে এক একটা টিসু বা তন্তু প্রস্তুত হয়। অনেকগুলি তন্তু একত্রিত হইলে শরীরের এক একটা যন্ত্র বা অংশ নির্মিত হয়। নবদেহ ব্যব-

চ্ছেদ করিলে মস্তিষ্ক, ধমনী, স্বংপিণ্ড, মাংশপেশী, ফুস্ ফুস্ ইত্যাদি যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু অণুবীক্ষণ দ্বারা পৰীক্ষা করিলে জানিতে পারা যায় যে, উহাদের সকলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ বিনির্মিত একত্র জানিতে হইবে যে, কোষ সকলই দেহের ভিত্তি ।

তত্ত্বসকলের সংগঠন —টিসু বা তন্তু নানা প্রকার যথা,—
এপিথিলিয়াম্, কনেক্টিভ, পৈশিক, স্নায়বিক প্রভৃতি

এপিথিলিয়াম্ টিসু ।—সংযোজক পদার্থযুক্ত, কোষ সকলের যোজনা দ্বারা এপিথিলিয়াম্ উৎপন্ন হইয়া থাকে উহা চর্ম ও তৎসংসৃষ্ট নখ ও কেশকপে মনুষ্যদেহের বহির্ভাগে আরুত করিয়া বহিয়াছে

এপিথিলিয়াম্ কোষ সকল চারি ভাগে বিভক্ত —

- (১) শল্ক বা আঁইসবৎ (স্কোয়েমস্), (২) গোলাকার বা গ্রন্থি স্থিত (স্ক্রিবইডাল বা গ্লান্ডিউলার), (৩) শুভ্রাকার (কলমনার) এবং (৪) কেশযুক্ত (সিলিয়েটেড)

কনেক্টিভ টিসু , এই জাতীয় তন্তু সকল মনুষ্যদেহের কাঠামে প্রস্তুত করে। ইহা বা স্নায়ব, পৈশিক ও অন্যান্য তন্তু নির্মিত শরীরের নানা প্রকার যন্ত্রে আবশ্যনীয় ভিত্তি ও আচ্ছাদন সম্পাদন করিতেছে এবং শরীরের অপর সমস্ত তন্তুর সহিত জটিলভাবে জড়িত আছে

কনেক্টিভ টিসু নিম্নোক্ত কয়েক শ্রেণিতে বিভক্ত—

১। ফাইব্রাস্ কনেক্টিভ টিসু,

ক . এবিওনার

খ। ছোয়াইট ফাইব্রাস

গ। ইওলো ফাইব্রাস্।

ঘ। এ'ডপোজ।

২। উপাস্থি বা কার্টিলেজ।

৩। অস্থি বা বোন্।

উপাস্থি —নবদেহে নানা প্রকার উপাস্থি আছে। ইহা বা ঐহা-নতঃই ভাগে বিভক্ত, আস্থায়ী ও হার্যী উপাস্থি। প্রাণ ও শিশুশরীরে

যে উপাঙ্গি সকল বয়োবৃদ্ধিসহকাৰে অস্থিতে পৰিণত হয়, উহাদিগকে আস্থায়ী উপাঙ্গি কহে স্থায়ী উপাঙ্গিগুলি কখন অস্থিতে পৰিণত হয় না। উপাঙ্গি সকলকে তিন ভাগে বিভক্ত কৰা যাইতে পাৰে। যথা,—স্বচ্ছ বা হায়ালাইন, পীত, স্থিতিস্থাপক বা ইণ্ডুলো ইলাষ্টিক এবং শ্বেততন্তুগয় বা হোয়াইট ফাইব্রাস্ এই তিন প্রকাৰ অস্থিতে বিশেষ কোন প্রার্থক্য দৃষ্ট হয় না, কেবল সন্ধিস্থিত উপাঙ্গি গুলি একটা পাতলা অথচ শক্ত একটা ঝিল্লি দ্বাৰা আবৃত ইহাকে পোবিকণ্ড্রয়ম্ বা উপাঙ্গিআববক ঝিল্লি বসে কোন প্রকাৰ উপাঙ্গিতেই স্থায়ী প্ৰস্থিতে পাওয়া যায় না।

১। হায়ালাইন্ বা স্বচ্ছ উপাঙ্গি। এই উপাঙ্গি সন্ধিস্থিত অস্থি সীমা আবরণ কৰিয় আছে এতদ্ব্যতীত খাসনগী (ট্ৰেকিয়া), ও ক্ষুদ্র বায়ুনলী সমৃদ্ধ (ব্রঙ্কাই) এই প্রকাৰ উপাঙ্গি গঠিত।

২। পীত বা স্থিতিস্থাপক উপাঙ্গি।—(ইয়োমোইলাষ্টিক কাৰ্টিলেজ), কর্ণ, এপিগ্লটিশ, ইয়ুটেকিয়ান নলী প্রভৃতি এই উপাঙ্গি নির্গিত।

৩। শ্বেতবর্ণ ফাইব্রোকাৰ্টিলেজ।—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি হেতু ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কৰা যায়, যথা,—

(ক) সন্ধিমধ্যস্থ (ইণ্টাৰ আৰ্টিকিউলাৰ) হাঁটুসন্ধিব অর্ধচন্দ্রাকৃত উপাঙ্গি

(খ) পৰিধি বা সীমাস্থিত (মাক্‌ফাৰেল) এমিটাবুলম ও মিনইড গহবর সীমাস্থিত উপাঙ্গি

(গ) সংযোজক (কনেক্টিং) কমে ককা মধ্যস্থ উপাঙ্গি

(ঘ) টেণ্ডন মধ্যস্থ উপাঙ্গি এই উপাঙ্গিকে সেমামইড ফাইব্রো কাৰ্টিলেজ কহে

পূৰ্বলিখিত দুই প্রকাৰ অস্থি অপেক্ষা এই জাতীয় উপাঙ্গি মনুষ্য-দেহে অধিক

উপাঙ্গির ব্যবহার ও আবশ্যিকতা —

১। উপাঙ্গি দ্বাৰা সন্ধি সকল সমুদায় হওয়ায় সংযৰ্জন সম্পন্ন হয়।

২। কঠিন থাকানাগিলে সেই আঘাত উপাধি দ্বারা কতকটা বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় অস্থিতে সম্পূর্ণ জীব লাগে না।

৩। উপাধি অস্থিধারকে সংযুক্ত কবে এই সংযোগ একবারে দৃঢ় ও কঠিন হয় না।

৪। উপাধি শক্ত কাঠাম ও আবরণ প্রস্তুত করে, অথচ উহাতে অযথা ভাব কিম্বা কঠিন থাকে না, যং কর্ণ, কঠনালী ও বক্ষ্য প্রাচীর

৫। উপাধি সন্ধিস্থিত গহ্বরবসকলকে গভীরত্ব কবে, অথচ উহাতে সবিসঞ্চালনের কোন বাধা জ্ঞায না, তজ্জন্য জুড়িয়া ও স্কন্ধ-সন্ধিব-গহ্বরবসীমা উপাধি দ্বারা নির্মিত।

৬। জীবদেহে উপাধি অস্থিব প্রতিনিধিস্বরূপ

অস্থি।—ইহা জীবদেহের কাঠামস্বরূপ। ইহা কঠিন, নিরৈক এবং অপেক্ষাকৃত লঘু বলিয়া এ পক্ষে বিশেষ উপযোগী অস্থি, মস্তক, বক্ষ্যগহ্বরস্থিত আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকলকে আঘাত হইতে বক্ষ্য কবে। মাংসপেশী দ্বারা পরিচালিত হইয়া অস্থি ভারী জিনিষ উত্তোলন কবিতে পারে। অস্থি সকল কঠিন হইলেও স্থিতিস্থাপক, এজন্ত সামান্য আঘাতে ভগ্ন হয় না।

দন্ত।—ইহার গঠনপ্রণালী সাধারণ অস্থি হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। ইহা এক প্রকার কঠিন ও নিরৈক ডেন্টিন নামক পদার্থে নির্মিত

রক্ত ।

রক্তই জীবদেহের জীবনস্বরূপ বক্তব্রোত সমস্ত শরীর বিধৌত কবিয়া সর্বত্র জীবনীশক্তি বিস্তার কবিয়া থাকে। রক্তের উপায়ই আমাদের শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি, জীবন ও শারিরিক ক্রিয়া সকল সম্পূর্ণ নির্ভর কবে। রক্তের জন্য মাংসপেশী সংকুচিত হয়, মস্তিষ্ক অমৃত্যব ও চিন্তা কবিয়া থাকে, শাণ্ডকল উত্তেজিত হয়, বৃন্তের জন্যই হৃৎপিণ্ড সঞ্চালিত শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত, এবং গ্রন্থিময়দ্বায় স্ব স্ব বর্ধন সম্বন্ধে

জীবগণ যেমন বহিঃ বায়ু ও খাদ্য গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করে, জীবিত জন্তুর দেহাভ্যন্তরস্থিত তন্তুসকল তদ্রূপ বক্তের নিকট হইতে বায়ু ও খাদ্য গ্রাপ্ত হইয়া সজীব ও সতেজ থাকে বক্ত দৈর্ঘ্যেতে তবল ও ধমণী হইতে নির্গমনকালে লোহিত বর্ণ দেহে ইহা জল অপেক্ষা গাঢ় ও ভাবী ইহা লবণাক্ত ও লেপংগন্ধযুক্ত দেহাভ্যন্তরে বক্তের তাপ ১০০ ডিগ্রী, কিন্তু দেহের সর্বত্র সমান নহে। অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে জানা যায়, যে, বক্তের তবলাংশ বর্ণহীন। এই বর্ণহীন তবল পদার্থে বাঁলুকাকর্ণাব শায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালবর্ণ গোলা কণিক পদার্থ ভাসিতে থাকে এই বর্ণহীন তবলাংশকে বক্তের জলীয় অংশ বা প্লাজমা কহে, এবং বর্ণবিশিষ্ট কোষগুলিকে বক্তকণিকা বা কবপ্মসকেল বলে।

জীবিত শবীর হইতে বক্ত বাহির হইলেই অতি সত্বরে জমিয়া যায় এবং তাহা হইতে এক প্রকার স্ফুট স্ফুট পীতবর্ণাভ জলীয় পদার্থ নির্গত হয় এই জলীয় পদার্থকে রক্তবস বা মিরম বলে। উপবোক্ত প্রকারে বক্ত জমাট হওয়াকে বক্ত স্কন্দন বা কোয়াগুলেশন বলে। বক্তের যে বর্ণহীন তবলাংশের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে দুইটি পদার্থ আছে, যথা—বক্তবস ও ফাইব্রীণ এই ফাইব্রীণ দেহাভ্যন্তরস্থ সঞ্চয়মান বক্ত থাকে না, শবীর হইতে বক্ত বহির্গত হইলেই স্কন্দন-কালে জলবৎ স্ফুট স্ফুট ন্যায় হইতে থাকে এই জলের মধ্যে লোহিত কণিক জীবদ্ধ হওয়ায় রক্ত জমাট হয়।

নিম্নোক্ত অঙ্কনা সকলে বক্তস্কন্দনের সুায়ায় কবে,—

১। ১০০ হইতে ১২০ ডিগ্রী পর্যন্ত উত্তাপ।

২। বক্ত না নাড়িয়া স্থির ভাবে রাখিলে শীঘ্র জমাট হয়

৩। অন্য পদার্থের সহিত সংযোগ।

৪। প্রচুর বায়ু সঞ্চালন ও সংবলন

৫। দ্রবণ অপেক্ষা কিছু অল্প পরিমাণ জল মিশ্রণ

রক্তের রাসায়নিক সংগঠন।—এক সহস্র ভাগ নবশোণিতে নিম্নোক্ত পদার্থ সকল ভাঙ্গিদিগেব পর্বে লিখিত ভাণ্ডে অবস্থিতি কবে

জল

...

...

৭৫০

কঠিন পদার্থ থাকা,—

কণিকা

১৩৪

সিবম এলুমিনি ও

পানামা বিউলিন

৭০

বক্তজমাটেব (কটেব) কাইট্রীণ

২২

২২০

অশবীৰী (ইন্থার্গানিক) লবণ

৬০

এক্টো কৃষ্ণ

৬৪

চৰ্ম্মি জাতীয় পদার্থ

১৪

গাণ, যথা, —অক্সিজেন, কার্বনিক ঘ্যানিড ও নাইট্রোজিন বক্তেব
নানা প্রকাৰ উপাদানের কৰ্য্য কবে বক্ত য়ে যে সামগ্রীতে প্রস্তুত
তাহাদিগেব ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া নির্দিষ্ট আছে । নিম্নে তাহা সংক্ষেপে
লিপিবদ্ধ হইতেছে

এলুমেন —ইহা রক্ত মধ্যে অধিক পরিমাণে থাকে এলুমেন
যে তক্তসকলেব উপাদান, সেই তক্তকে পরিপোষণ কবাই ইহাব কার্য্য

ফাইট্রীণ —ইহা আপনাব আকাৰে বক্ত মধ্যে থাকেনা, রক্ত-
স্পন্দন কালে ইহাব উদ্ভব হয়

মেদাক্ত পদার্থ —এই বস্ত্ত কৰ্ত্তৃক মেদ সংশ্লিষ্ট ও মেদাক্ত তক্ত
বল এডিপোজ টিস্সু পরিপুষ্ট হয় । অন্নজান সহকারে মেদ দত্ত হইয়া
গায়েব উত্তাপ বিন্ধা কবে । এতদ্ব্যতীত গায়েব কোন কোন অংশ
যথা—হৃদয় ও পিত্ত এবং মেদ আছে

লবণজাতীয় পদার্থ । —শবীবের যে যে তক্ত ও নিম্নবের ইহা
প্রয়োজন তাহাদেব অভাব পূরণার্থ ইহা বক্তে অবস্থিতি কবে

স্যালোপ্যাথিকে ঔষধের ওজন ।

ইংরাজী চিকিৎসা গ্রন্থে যেকণে ওজন লিখিত কইয়া থাকে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল শুধু ঔষ্য ওজনেব জন্ত এই তৌল ব্যবহৃত হয়

২০ গ্রোনে	...	...	...	১ স্কুপল ।
৩ স্কুপলে	...	...	...	১ ড্রাম ।
৮ ড্রামে	...	...	...	১ আউন্স ।
১২ আউন্সে	...	...	...	১ পাউণ্ড ।

ডাক্তাবেবা নিম্নোক্ত সান্কেতিক ব্যবহার কবিয়া থাকেন, এই গ্রন্থে সেইরূপ সান্কেতিক ব্যবহৃত হইল

গ্রোনে	gr.	...	...	গ্রো.
স্কুপল	℥	...	...	স্কু.
আউন্স	℥	...	...	আ.
পাউণ্ড	lb	...	...	পৌ.

তবল ঔষ্য পরিমাপের জন্য নিম্নোক্ত প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে

৬০ মিনিমে	...	...	১ ড্রাম ।
৮ ড্রামে	...	...	১ আউন্স ।
২০ আউন্সে	...	...	১ পাউন্ড
৮ পাউন্ডে	...	...	১ গ্যালন ।

ডাক্তাবেবা নিম্নোক্ত সান্কেতিক ব্যবহার কবিয়া থাকেন

মিনিম	...	...	an	মি.
ড্রাম	...	...	fl	ড্র.
আউন্স	...	...	fl	অ.
পাউন্ড	...	...	lb	প.
গ্যালন	...	...	g	গ.

তবল ঔষ্য মাপেবই ওজন একরূপ নহে কোন ঔষ্য গাঢ়, কোন ঔষ্য খুব তকল, এজন্য তাহার তাবতম্য নিম্নে পদত্ব হইল

পানিস্ত জলেশ	...	৪৫ বিন্দুতে	...	১ ড্রাম হয়

লবণ জাবক	...	৪৪	বিন্দুতে	...	১ ড্রাম হয়।
গন্ধক জাবক	..	৯০	ঐ	...	ঐ
সুঁবা	...	১৩৮	ঐ	...	ঐ
ইথর	...	১৫০	ঐ	..	ঐ
লডেনম	.	১২০	ঐ	...	ঐ
হাইড্রো সিলিকেনিয়াসিড	.	৪৫	ঐ	.	ঐ

অতএব চিকিৎসকগণের কর্তব্য যে, উপবোধিত তাবতগ্যাহুমাংবে
বিবেচনা পূর্বক ঔষধেব মাত্রাবধাবর্ণন কবেন

মেটেরিয়া মেডিকা বা দ্রব্যগুণ ।

গ্যাষ্ট্রিজেন্ট বা মক্ষোচক ।

লাতিন নাম । ইংরাজী নাম । মাত্রা । মন্তব্য ।

গ্যালি ... গলুম বা গলনাট . . ১০—২০ গ্রো . . . বুলকারক ।

টীংচুবাগ্যালি টীং অফ গলুম ২—২ ড্রাম ... ঐ

গ্যাষ্ট্রোয়েন্টাম গ্যালি . . . অয়েন্টমেন্টে অফ গলুম . . . আবশ্যিকমত . . . ঐ

গ্যাষ্ট্রোয়েন্টাম . . . অয়েন্টমেন্টে অফ ঐ

গ্যালিকম্ ওপিয়াই গলুম্ এণ্ড ওপিয়াম ঐ

গ্যাসিড ট্যানিক . . . ট্যানিক গ্যাসিড . . ২—১০ গ্রো . .

সপোজিটেরিয়া গ্যাসি- . . .

ডাই ট্যানিসাই . . . ট্যানিক গ্যাসিড সপোজিটেরী ।

টোচিসাই গ্যাসি- . . . ট্যানিক গ্যাসিড . .

ডাই ট্যানিসাই . . . লোজজেন্স . . . ৫—৬ গ্রা . .

গ্লাইসবাইগ্ গ্যাসি- . . . গ্লিসবীণ অফ . . .

ডাই ট্যানিসাই . . . ট্যানিক গ্যাসিড . .

লাটিন নাম । ইংরাজী নাম । মাত্রা । মন্তব্য ।

সপোজিটবিয়া য্যাসিডাই ট্যানিক য্যাসিড সপো-

ট্যানিসাই কম সেপোনি ... জিটরিজ ইডুথ সোপ ... ক্রিমিনাশক ।

য্যাসিডম্ গ্যালিকম্ . . . গ্যালিক য্যাসিড . . ২—১০ গ্রেণ . . . বিগুন্ধ
সঙ্কোচক ।

কেম্বার্কস্ কটেক্স . . . ওকব'র্ক . . . ৩০—৬০ গ্রেণ .

কাইনো . . . কাইনো . . . ১০—৩০ গ্রেণ . . . ক্ষাব, জাবক,
হীবাকস, নাইটেট অফ সিল্ভার, টার্টার
এশেটিক ঔ রসকপূর্বসহিত অসম্মিলন ।

পল্‌বিস্ কাইনো-

বস্পাউণ্ড পাউডার

কম্পজিটম্

অফ কাইনো . . . ৫—২০ গ্রেণ . . . ঐ

টীংচুবা কাইনো

টীং অফ কাইনো . . . ১—২ ড্রাম . . . ঐ

হিমেটক্সিলাই

লিগ্নম্

লগ উড . . . বিগুন্ধ সঙ্কোচক ।

ডিকটম্ হিমে-

ডিকঅন অফ

টক্সিলাই

লগ উড . . . ১—২ আং . . . ঐ

এক্সট্রাক্টম্ হিমে-

এক্সট্রাক্ট অফ

টক্সিলাই

লগ উড . . . ৫—২০ গ্রেণ . . . ঐ

ক্রামিরি রেডিকস্

র্যাটানি রুট

. . . ১০—৩০ গ্রেণ . . . জাবক,

চুণের জল, লৌহঘটিত লবণ, সীস শর্করা, আইওডিন,

জাবক এবং জেলেটিনযুক্ত লবণের সহিত অসম্মিলন ।

এক্সট্রাক্টম্ ক্রামারি

এক্সট্রাক্ট অফ

র্যাটানি

. . . ৫—১০ গ্রেণ . . . ঐ

ইন্‌ফিউজন্‌ ক্রামারি

ইন্‌ফিউজন্‌

অফ ব্যাটানি

. . . ১—২ আং . . . ঐ

টীংচুবা ক্রামারি

টীং অফ ব্যাটানি

. . . ১—২ ড্রাম . . . ঐ

ইউবি জার্সাই

বেয়ারবেলী—

লার্টিস নাম। , ইংরাজী নাম। , গাত্রা। , মন্তব্য।

ফেল্লিয়া নিভস . . . ১০—২০ গ্রোন . . . অল্প
বলকাবী, লৌহ ও মীমাংষাতিত ঔষধ, টার্টার এসেটিক, সিলিকা-
নাব, ফাথ ও নাইট্রেট অফ সিল্ভাবেব সহিত অসম্মিলন।

ইন্ফিউজন্ , ইন্ফিউজন্
ইউবি আর্সাই . . . অফ বেয়াববেবী . . . ১—২ আং . . . ঐ

ক্যাটিকিউ প্যালিডন্ পোল ক্যাটিকিউ . . . ১০—১০ গ্রোন . . . উৎ-
কৃষ্ট সল্ফোচক। চূর্ণেব জল, যবক্ষার, ফটকিরি,
মর্ফিয়া এং ইপিক্যা কুয়ানার সহিত অসম্মিলন।

ইন্ফিউজন্ ইন্ফিউজন্
অফ ক্যাটিকিউ অফ ক্যাটিকিউ . . . ১—২ আং . . . ঐ

পল্‌বিস ক্যাটিকিউ কম্পাউণ্ড ক্যাটিকিউ . . .
কম্পজিটন্ . . . পাউডার . . . ২০—৪০ গ্রোন . . . ঐ

টিংচুবা ক্যাটিকিউ টীং অফ ক্যাটিকিউ . . . ১—২ ড্রাম . . . ঐ

টোচিসাই, ক্যাটিকিউ
ক্যাটিকিউ . . . লোজেঞ্জন্ . . . ১—৫ চাউ . . . ঐ

টেরো কার্পাইলিগনন্ . . . বেড্‌ ম্যাওন্ উড্

বেডো বোজ শৈত্যকাবক এবং
বলকাবক। অন্যান্য ঔষধের সহিত সৌগন্ধের জন্য ব্যবহৃত হয়।

কন্ফেক্সিসিও কন্ফেক্সন্
বোজি কেনাইন্ . . . অফ হিপস্ ঐ

কন্ফেক্সিসিও কন্ফেক্সন্
বোজি গ্যালিসি . . . অফ বোজেন্ . . . ১—২ আং . . . ঐ

স্যাংকোয়া বোজি . . . বোজ ওয়াটার . . . ১—২ আং . . . ঐ

ইন্ফিউজন্ বোজি . . . যামিড ইন্ফিউজন্
স্যাংসিডন্ . . . অফ বোজেন্ . . . ১—৪ ড্রাম . . . ঐ

স্যাংলুয়েন্ স্যাংলাম ১০—২০ গ্রোন . . . উদবাসয়

লাটিন নাম । ইংরাজী নাম । মাত্রা । অন্তব্য ।

বোগে ৮—১০ গ্রেন কাইনোব সহিত দেওয়া যায় । টাইফইড্ জবে
২—৫ গ্রেন মাত্রায় উদরাময় নিবাবণ কবিয়া অশেষ উপকার কবে

য়্যালাম এক্সিকেকটম্ ... বাণ্ট'য়্যালাম্ ... এ

প্লম্ব লেড ... লেড ... প্রকৃতিতে ব্যয়হত হয় নাই

প্লম্বাই য়্যাসিটান্ ... স্ফাব অফ লেড ... ১—৪ গ্রেন ... অম্প
মাত্রায় অধিক দিন ব্যবহারে অন্ত পীড়া উৎপাদনের সম্ভাবনা ।

পাইলুনা প্লম্বাই ... লেড এণ্ড ...
কম্ ওপিও ... জপিয়ম পিল্ ... ৪—৮ গ্রেন ... এ

সপোজিটোবিয়া ... কম্পাউণ্ড লেড্
প্লম্বাই কম্পজিটো ... টিপোজিটারী ... এ

য়্যাড্‌য়েণ্ট প্লম্বাই ... অয়েণ্টমেন্ট
য়্যাসিটেটিস্ ... অফ লেড ... এ

লাইকর প্লম্বাই সব ... সোল্ল্যাসন্ অফ সব
এসিটেটিস্ ... এসিটেট অফ লেড ... ইহার

আন্ত্যন্তরিক ব্যবহার হয় না । ইহা সঙ্কোচক এবং অবসাদক

লাইকর প্লম্বাই ... ডাইলুটেড সোল্ল্যাস-
সব এসিটেটিস্ ... সন্ অফ সব এসি-
ডাইলিউটস্ ... টেট অফ লেড ... এ

প্লম্বাই অক্সাইডম্ ... অক্সাইড অফ লেড ।

এম্প্লাষ্টম্ প্লম্বাই ... লেড প্লাষ্টর

প্লম্বাই কার্বনাস্ ... কার্বনেট
অফ লেড ... আন্ত্যন্তরিক ব্যবহার হয় না ।

অয়েণ্টমেন্ট প্লম্বাই ... অয়েণ্টমেন্ট অফ
কার্বনেটিস্ ... কার্বনেট অফ লেড ... এ

প্লম্বাই অক্সাইড ... অক্সাইড
অফ লেড ... ১—২ গ্রেন ... পুষ্কিন

লাটিন নাম । ইংরাজী নাম । মাত্রা । সম্ভব্য ।

প্লীহা বোগে কখন কখন ১—২ গ্রোন বা তিন গ্রোন মাত্রায় ব্যবহার হয় নানা প্রকার চর্মবোগে ও সন্ধিবোগে ইহার মলম ব্যবহার হয় ইহা গণ্ডকোচক এবং শোষক ।

অক্সুয়েটেম প্লম্বাই অক্সুয়েটেম অফ আইও-
আইওডিডাই ... ড্রাইড অফ লেড ...
এম্প্লাস্টাম প্লম্বাই আইওডিডাইড অফ
আইওডিডাই ... লেড প্লাস্টার ...
প্লম্বাই নাইট্রাস ... নাইট্রেট অফ লেড ... আভ্যাস্তবিক
ব্যবহার হয় না পাচননিবারক, দুর্গন্ধহারক, সঙ্কোচক ।
প্লম্বাই ট্যানাস্ ... ট্যানেন্ট অফ লেড ।

আর্টারিয়েল সিডেটিভ বা ধামনিক অবসাদক ।

ক্যাটিমোনিয়ম্ টার্টারেটেড
টার্টারেটম্ ... এটিমনি ... বমন কৰণার্থ ১—২ গ্রোন,
অবসাদকার্থ ১—২ গ্রোন, স্বেদজনন এবং কফ নিঃসরণার্থ
১—২ গ্রোন ... শৈত্যকারক, স্বেদজনক,
কফনিঃসারক, মূত্রকারক, বমনকারক ও চিবেচক ।

অক্সুয়েটেম ক্যাটি- অক্সুয়েটেম অফ
মোনিয়াই টার্টারেটেড
টার্টারেটাই ... এটিমনি ...
বাইনস এটিমো- এটিমোনিয়ল
নিয়ল ... ওয়াখিন ...

আর্টিফিচিয়েল সিউটেড বা ধামনিক অবসাদক । ৬৭৯

লাটিন নাম । ইংরাজী নাম । মাত্রা । শব্দব্য ।

গ্যাণ্টিমোনিয়াম্ সল্ফিউবেটেড্ পাবিবর্তক ১—৪০ গ্রেঃ,
সল্ফিউবেটস্ ... গ্যাণ্টিমনি ... বমন কাবক ৫—২০ গ্রেঃ ।

পুৰাতন যক্ষ্ম বোগে ও পুৰাতন উপদংশে কখন
কখন ব্যবহৃত হয় । পাবিবর্তকরূপে সেকে-

ওবী সিকসিস্ বাত বোগে ব্যবহৃত হয় ।

গ্যাণ্টিমোনিয়াই অক্সাইড অফ
অক্সাইডস্ ... গ্যাণ্টিমনি ... ১—৪ গ্রেঃ ... অক্সাই
টাটাৰ এমেটিকেব জায় । জবাঙ্গি বোগে ব্যবহৃত হয় নিউ-
মোনিয়া ও ক্যাটরুতে ঘর্ষকাবক বলিয়া কখন কখন ব্যবহৃত হয় ।

পল্‌বিস্ গ্যাণ্টিমো- গ্যাণ্টিমোনিয়েল
নিয়েলিস্ ... পাউডার ৩—১০ গ্রেঃ ...

লাইকব গ্যাণ্টিমো- সোলুমন অফ ক্রোবাইড
নিয়াই ক্রোরিডাই অফ গ্যাণ্টিমনি .. দাহক বলিয়া বাহ
প্রয়োগ হয়, কিন্তু আন্ত্যস্তুরিক ব্যবহার হয় না ।

গ্যাণ্টিমোনিয়াম্ নাইট্রাম্ .. ব্ল্যাক্ গ্যাণ্টিমনি

পটাসি নাইট্রাম্ ... নাইট্রেট
অফ পটাস .. কারক ৫—২০ গ্রেঃ, ধামনিক
অবসাদক ২০—৬০ গ্রেঃ .. মূনকাবক, ক্ষেদজনক ।
অধিক মাত্রায় ব্যবহৃতবে বিষ লক্ষণ উপস্থিত হয়

গ্যাগিডিস্
গাইট্রিকস্ ... সাইট্রিক গ্যাগিডিস্
কাব কার্বনেট, সল্ফেটেব সহিত ইহা সম্মিলিত হয় না ।

গকসু লিমোনিস্ ... জেমন্ জুম্ ... ২—৮ ড্রাম .. শৈত্যকাবক

সিবপ্স লিমেনিস্ ... সিবপ্স অফ লেমপ্স ... ১—৪ ড্রাম

গ্যাগিডিস্ টার্টারিকস্ ... টার্টারিক গ্যাগিডিস্ ... ১০—২০ গ্রেঃ ... কাব,
কাব কার্বনেট, কাবক, চূর্ণেব জল ও বোপ-
খটিত ওষধেব সহিত ইহা সম্মিলিত হয় না ।

৬৮০

চিকিৎসা-তত্ত্ব-ব'লিধি ।

লাটিন নাম । ইংরাজী নাম । মাত্রা । গন্তব্য ।

যাসিডম্
যাসিটিকম্
যাসিমেটিক
যাসিড . . ৩—১৫ মিঃ . জ্বরাদি
বোগে শৈত্য পানীয়ার্থে বহু বহু ।

যাসিডম্ যাসি
টিকম্ ডাইলুটম্
ডাইলুটেড
যাসিটিক যাসিড ১—২ ড্রাম . .
অকজিমেল . অকজিমেল . ১—৮ ড্রাম ।

যাসিডম্ অকজালিকম্ . অকজালিক যাসিড . ১—১১ গ্রেঃ .
স্বাঘবীষ উত্তেজক, ত্যাকাবক এবং মূত্রকাবক ।

নার্স সিডেটিভ বা স্নায়বীয় অবসাদক ।

ডিজিটেলিস্ ফে
পিণ্ডেব সৈর্যকারক, বলকাবক, বক্তবোধক এবং মূত্রকারক
রক্ত সঞ্চালনের আধিক্য বা ন্যূনতা হইবে ইহা স্বপিণ্ডেব
স্থিরা সম্পাদন ক্রিয়া উৎসাহ ক্রিয়া বলবতী করে

ইনফিউজম্ . ইনফিউজন্
ডিজিটেলিস্
অফ ডিজিটেলিস্ . . ২—৪ ড্রাম . .

টিংচুৰা
ডিজিটেলিস্
ডিজিটেলিস্
১০ মিঃ—২ ড্রাম

ডিজিটেলাইন্
ডিজিটেলাইন্
৩—৫ গ্রেণ

ক্লোরফরমম্
ক্লোরফরমম্
১—১০ মিঃ
আত্ম-
ভরিক প্রয়োগে ইহা অবসাদক ও অক্সিজেন নিষ্কা-
বক কখন কখন পর্যায়নিবারক বহু প্রয়োগে
বেদনা নিবারক, উত্তেজক, কোষাকারক ।

ন বস্ সি ডোট্ বা গায়বায় অবসাদক । ৬৮২

লাটিন নাম । ইংরাজী নাম । মাত্রা । মন্তব্য ।

লিনিমেন্ট ক্রোব- লিনিমেন্ট অফ
ফরমাই .. ক্রোবফরম .. ১—৩০ গ্রৈ

স্পিবিটম্ স্পিবিট অফ
ক্রোবফরমাই .. ক্রোবফরম ... ১০—৩০ মিঃ গ্রৈ

টিংচুবা ক্রোবফব- কম্পোউণ্ড টিং
মাই কম্পজিট .. অফ ক্রোবফরম ... ১০—৬০ মিঃ গ্রৈ

যাকোয়া ..
ক্রোবোফরমাই ... ক্রোবোফরম ওয়াটার ১—২ আং .. গ্রৈ

টোবাগাই ফোলিয়া লীফ টোব্যাকো .. মূত্র-
ক বক, ক্ষুৎকানক, বলকানক, লাল-
নিঃসারক ও স্থানিক উত্তেজক ।

এনিমা টোবেগাই টোব্যাকো এনিমা .. গ্রৈ

একোনাইটম্ .. একোনাইট .. ১—৫ গ্রৈণ . দ্ব্য-
বীম অবসাদক, বেদনানিবারক, বলকানক, মূত্রকানক ।

টিংচুবা টিং অফ
একোনাইটাই ... একোনাইট . ৫—১৫ মিঃ ... গ্রৈ

লিনিমেন্টম্ একোমিটাই লিনিমেন্ট অফ একোনাইট .. গ্রৈ

একক্টাষ্টম একক্টাষ্ট অফ
একোন্টিটাই ... একোনাইট ... ১—৩২ গ্রৈণ .. গ্রৈ

অক্সয়েন্টম্ একোনাইমি অক্সয়েন্টেমেন্ট অফ একোনাইমিয়া .. গ্রৈ

গ্যাসিডম্ হাইড্রা- ডাইলুটেড হাইড্রোসিয়ানিক
সিয়ানিকম্ ডাইলুটম্ .. গ্যাসিড ২—৮ মিঃ পার্শ্বিক আবক,
.. লৌহঘটিত লবণ, নাইট্রেট অফ সিলভার মুহিত ইছাব অসম্মিলন ।

ভেপার গ্যাসিডাই ইন্ডুহলেসন্ অফ
হাইড্রোসিয়ানিগাই .. হাইড্রোসিয়ানিক গ্যাসিড ... গ্রৈ

কোনাথম .. ফেনলিক . ২—১০ গ্রৈণ . আক্কেপ

ল্যাটিন নাম । ইংরাজী নাম । মাত্রা । মন্তব্য ।

নিবাবক, অল্প কক্ষ নিঃসারক ও পবিবর্তক বাহ্য
ব্যবহারে উত্তেজক, অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া করে

ক্যাটেপ্লাজমা কোনিয়াই হেমলক্স পুলটিগ্ ... ঐ

সকস্ কোনিয়াই - ... জন্ম অফ হেমলক্স ১ ২ ড্রাম . ঐ

একফ্রাক্টম্ কোনিয়াই . একফ্রাক্ট অফ হেমলক্স ২—৩ গ্রো . ঐ

পাইলুলা কোনিয়াই . কম্পোণ্ড অফ . . . ঐ

হেমলক্স পিল . ৫ ১০ গ্রো . ঐ

ইন্থেলেসন্ . ইন্থেলেসন্ . . . ঐ

অফ কোনিয়া . . . ঐ

টিংচুবা কোনিয়াই . টীং অফ হেমলক্স . ১০ মিঃ—১ ড্রাম . ঐ

ফাইজটিগ্

মেটিস্কেবা . . . কালোবাববীন . ১ গ্রো ও তদধিক . ভেদ ও

বগনকাবক, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহা মস্তিষ্কে উপবর্তন ক্রিয়

ক্ষম্য না চক্ষুতে লাগাইলে কণীণিকা আকৃষ্ট হয়

একফ্রাক্টম্ ফাই . একফ্রাক্ট অফ . . . ঐ

জটিগ্ মেটিস্ . . . কালোবাববীন . . . ১—২ গ্রো . ঐ

লে বিলিয় . লোবিলিয় . ২—৫ গ্রো . . . অল্প

মাত্রায় স্বর্গাবক ও কক্ষনিঃসারক, অধিক

মাত্রায় বগনকাবক বা বিরেকক, আক্ষেপ নিবাবক।

টিংচুবা লোবিলি . টীং অফ লোবিলিকা . ১০—৩০ মিঃ . ঐ

টিংচুবা লোবিলি . ইণ্ডিবিয়ল টীং . . . ঐ

ইণ্ডিবিয়া . . . অফ লোবিলিকা . ১০ মিঃ—১ ড্রাম . ঐ

ম্যাথেডিনা . মৈন্যাডিনা . ১—২ গ্রো . . . কখন

কখন ক্রিমা বোগে ব্যবহার হয়।

অস্কেট্রম্ বিবাট্রায়ি . বিবাট্রায়ি অস্কেট্রমেট . . . ঐ

ল্যাংকট্রিকা . . . লেট্রিউস্ . ৫—৩০ গ্রো . . . অব-

ফিউলেন্ট বা উত্তেজক ।

৬৮৩

লাটিন নাম । ইংরাজী নাম । মাত্রা । গুণাবলি ।

সাদক, নিজাকাবক, কফ দমনকাবক, নিজাকবণ তুর্থ, শুষ্মন-
সময় ব্যবহৃত হয় অহিফেণু ব্যবস্থা নিষিদ্ধ হইলে ইহা
একফ্রাক্ট দেওয়া হয় কাসেব উগ্রতা দমনার্থে ব্যবহৃত হয় ।

একফ্রাক্টম্	একফ্রাক্ট অফ		
ল্যাক্টিউসি	... লেটিউম্	৫-১৫	গ্রোণ
কোবাল হাইড্রোজেন	হাইড্রেট অফ		
	কোবাল	৫-৩০	গ্রোণ
	কাবক, আক্ষেপ নিবারণক, গাচন নিবারণক, বেদনাহারক ।		
সিবাম্ কোবাল	সিবপ অফ		
	কোবাল	১-২	ড্রাম

ফিউলেন্ট বা উত্তেজক ।

য়্যাসাফেটিডা ... য্যাস ফেটিডা . ৫-২০ গ্রোণ . . আক্ষেপ-
নিবারণক, কফনিঃসারক, কিছু বিরেচক ।

এনিমা য্যাসাফেটিডী . এনিমা অফ য্যাসাফেটিজ

পাইলুলো য্যাসাফেটিডী কম্পোউপিন্ অফ

কম্পজিটা য্যাসাফেটিডা . ৫-২০ গ্রোণ

টিংচুবা য্যাসাফেটিডী . টিং অফ য্যাসাফেটিডা . ১-২ ড্রাম

স্পিবিটম্ এমোনি ফেটিড স্পিবিট

ফেটিডম্ অফ এমোনিয়া . ২-২ ড্রাম

গ্যালবেনম গ্যালবেনম . ১-২০ গ্রোণ

য়্যাসাফেটিডাব স্যাব, কিন্তু ভজপ গ্রহণ নহে জরায়ুর

উপকৃতিয়া দর্শায় যনিয় এমিনোবিয়াতে ব্যবহৃত হয়

কফনিঃসারক বলিয়া গ্রাম বাম প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়

লার্টিন নাম । ইংরাজী নাম । মাত্রা । মন্তব্য ।

এমপ্ল্যাক্টম গ্যাণ্বেনাই . গ্যাণ্বেনম্ প্ল্যাফ্টব ... ঐ

ক্যাঙ্কোবা ক্যাঙ্কব . ১—১০ গ্রো . . . আক্ষেপ-

নিবাবক, কফনিঃসারক, বেদনা নিবাবক, উত্তেজক,

নিম্ন কাবক, জননেদ্রিয়েব উগ্রতা হাবক, অত্যন্ত

অধিক মাত্রায় ভাবাবহ লক্ষণ সমস্ত উপস্থিত কবে

য়্যাকোয়া ক্যাঙ্করি . . . ক্যাঙ্কব এণ্ণাটাব . . ১—২ আং . . ঐ

লিনিমেণ্টম্ ক্যাঙ্কবি . . লিনিমেণ্ট অফ ক্যাঙ্কব . . . ঐ

লিনিমেণ্ট ক্যাঙ্কবি . . কম্পোণ্ড লিনিমেণ্ট

কম্পজিটম্ . . . অফ ক্যাঙ্কব . . . ঐ

স্পিরিটস্ ক্যাঙ্কবি . . স্পিরিট অফ ক্যাঙ্কব . . ১০ মিঃ—১ ড্রাম . . ঐ

টীংচুবা ক্যাঙ্কবী . . কম্পোণ্ড টীং

কম্পজিটা . . . অফ ক্যাঙ্কব . . ১—২ ড্রাম . . ঐ

বেলাডনা বেলাডনা . . . ১—২ গ্রো . . . বেদনা-

নিবাবক, স্নায়বিক ও মস্তিষ্ক উত্তেজক, নিদ্রাকাবক, মাদক,

আক্ষেপনিবাবক, বিবচক। কহ ব্যবহারে বেদনানিবাবক,

চক্ষুতে লাগাইলে কলীনিকা প্রসাবিত হয়। ক্ষার অর্থাৎ মোড়া,

পাটশা, লাইকব পাটশি ইত্যাদিব সহিত কখনই প্রয়োগ কবিবে না।

একক্টাষ্টম বেণ্ডনি . . একক্টাষ্ট অফ বেলাডনা . . ১—২ গ্রো . . ঐ

এমপ্ল্যাক্টম বেলাডনি . . বেলাডনা প্ল্যাফ্টব ঐ

টিংচুবা বেলাডনি . . টীং অফ বেলাডনা . . ৫—৩০ মিঃ . . ঐ

অম্মুয়েণ্টম্ বেলাডনি . . বেলাডনা অম্মুয়েণ্টমেণ্ট ঐ

লিনিমেণ্ট বেলাডনি . . লিনিমেণ্ট অফ বেলাডনা ঐ

সক্স বেলেডোনি . . জুস্ অফ বেলেডোনি . . ৫—১৫ মিঃ . . ঐ

এট্রোপি এট্রোপিয়া ইহার বিধি এই

প্রবল যে, প্রায় আভ্যন্তরিক ব্যবহৃত হয় না। ব্যবহৃত

ল্যাটিন নাম । ইংরাজী নাম । মাত্রা । ভূমি ।

কবিত্তে হইলে অর্দ্ধ গ্রোঃ হইতে আবন্ত কবিয়া কম্পঃ পুষ্টি
কবিবে হাইপোডোমিক্ রূপেঃ গ্রোঃ মাত্রায় ব্যবহার হয়

ওলিয়ম্ অয়েল অফ
টেব্রিবিট্রিনি ... টার্পেণ্টাইন ... বক্তব্যার্থ ৫—৩০ মিঃ
উদ্ভেজনার্থ ১ ড্রাম, বিরচনার্থ ২ ৪ ড্রাম উদ্ভেজক, কফ
ও রজোনিঃসারক, আক্ষেপনিবাবক, বেদনা নিবাবক,
বায়ুনাশক, বক্তব্যোধক, বিবচক, ক্রিমিনাশক
ও মুত্রকাবক, পুচন নিবাবক, ছর্গকহারিক ।

কন্ফেক্‌সিযো কন্ফেক্‌সন অফ
টেব্রিবিট্রিনি টার্পেণ্টাইন ... ৬০ গ্রোঃ—৪ ড্রাম ... ঐ

এনিমা টেব্রিবিট্রিনি ... এনিমা অফ টার্পেণ্টাইন ... ঐ

লিনিমেন্টম্ টেব্রিবিট্রিনি লিনিমেন্ট অফ টার্পেণ্টাইন ... ঐ

লিনিমেন্ট টেব্রিবিট্রিনি লিনিমেন্ট অফ টার্পেণ্টাইন
বিট্রিনি য্যাসেটিকম্ ... এণ্ড য্যাসেটিক য্যাসিড ... ঐ

অক্সিডেন্টম্ অক্সিডেন্ট অফ
টেব্রিবিট্রিনি টার্পেণ্টাইন ... ঐ

ক্যাপ্‌সিগাই ফুটম্ ক্যাপসিকম্ ফুট ... ১—২ গ্রোঃ ... অল্প
মাত্রায় উদ্ভেজক ও আশ্রয় অধিক মাত্রায়
প্রদাহকারক, বাহি প্রযোগে উত্তেজক

টিংচুয়া ক্যাপ্‌সিগাই টিং অফ ক্যাপ্‌সিকম্ ... ৫—১৫ মিঃ ... ঐ

ল ইকব এমোনি স্ট্রং সোলুশন
ফর্মিয়ার অফ এমোনিয়া ৩—১০ মিঃ ... প্রধান

উদ্ভেজক স্বপ্নাশ্রয় ক্রিয়া কবে, উদবে য্যাসিড গ্যাস
উৎপন্ন হইলে উপকার কবে মুর্ছায় চৈতন্য সম্পাদক,
চর্মের ক্রিয়ার সময় ঠাণ্ডা কবিলে মুত্রকাবক, অধিক মাত্রায়
বিষক্রিয়া কবে । কফনিঃসারক, অল্প মাত্রায় অগ্নিনাশক
পুষ্টি উত্তেজক আবক, অন্ন, লবণ, চূর্ণ এবং
বোইটা ভিন্ন কবেব সহিত ইহা মিলিত হয় না ।

লাটিন নাম । ইংরাজী নাম । মাত্রা । মন্তব্য ।

লাইকুব্ এমোনি . সোণাসন অফ
এমোনিয়া . ১০—৩০ গিঃ . ঐ

লিনিমেণ্টম্ এমোনি . লিনিমেণ্ট অফ এমোনিয়া . ঐ

এমোনি কার্বনাস্ . কার্বনেট অফ এমোনিয় . উত্তেজক ৫—১৫ গ্রোণ্ড,
বমনকাবক ৩০ গ্রোণ্ড . উত্তেজক, অগ্ননাশক,
বমনকাবক, আক্ষেপনিবারক, শ্বেদজনক, কফনিষেদক, কিছু কাল
সেবনে বড় ঘনীভূত হইয়া কাইট্রিণ ও গাট স্লেথাদি ও বলা কবে

স্পিবিটম্ এমোনি . এবোমেটিক্ স্পিবিট
এবোমেটিক্স . অফ এমোনিয়া . ২—১ ড্রাম . ঐ

হাইয়োমাইয়োমাই ফোলিয়া . হাইয়োমাইয়েম্ লীবস্ . উত্তেজক,
ঘর্মকাবক, আক্ষেপনিবারক, কফনিষেদক, নিদ্রাকাবক ।

একফ্রাক্টম্ . একফ্রাক্ট
হাইয়োমাইয়েমাই . অফ হেন্বেন্ . ৫—১০ গ্রোণ্ড . ঐ

টিংচুবা হাইয়ো-
মাইয়েমাই . টিং অফ হেন্বেন্ . ২—১ ড্রাম . ঐ

সক্সম্ হাইয়ো-
মাইয়েমাই . জুস্ অফ হাইয়ো-
মাইয়েমাই . ২—১ ড্রাম . ঐ

মক্সস্ . মক্স . ৫—২০ গ্রোণ্ড . হিষ্টিবিয়া,
এপিলেপ্সি, কোবিয়া এবং কোন কোন টীটেনস্ বেগে
আক্ষেপনিবারক নিবারণ জন্য ব্যবহৃত হয় . হিকা
নিবারণে ইহার তুল্য আব উপদ্রব নাই । ফুস্ ফুস্ প্রদাহেও
কেহ কেহ ব্যাতিব্যু কবিয়া আশ্চর্য ফল পাইয়াছেন

ক্যাফেয়াশিম্ . ক্যাফে . ১০—৬০ গ্রোণ্ড . উত্তেজক,
আক্ষেপ নিবারক, কেহ কেহ বলেন
জ্বাযুতে স্নেহ সক্রিয়া প্রকাশ পায় .

টিংচুবা ক্যাফেয়াশিমাই . টিং অফ ক্যাফে . ২—১ ড্রাম . ঐ

মোডি বেলিবিয়েনাম্ . বেলিবিয়েনেট .

ট্রিগ্লোবট বা উত্তেজক ।

৬৮৭

লার্চিন নাম । ইংরাজী নাম । মাত্রা । মন্তব্য ।

অফ সোডা . ১-৫ গ্রেন . উত্তে-
জক, আক্ষেপ নিবাবক

সম্মল বেডিক্স . সম্মল ক্রট . ১০-২০ গ্রেন . বেলি-
বিয়নের মত সায়বীয় উত্তেজক, ও আক্ষেপ
নিবাবক লেট টাইমাইউ অব, কোবিয়া হিফি রিয়
ও পুবাভন শ্বাসনাণীব প্রদাহে ব্যবহাব হয়,

টীংচুবা সম্মল . টীং অফ সম্মল . ১০-৩০ . মিঃ . এ

মোবেবাইসি ফর্মেন্টম্ . ইয়েফট্রিয়াম্ . ২-১ আং . উত্তেজক

ক্যাটাগজম ফর্মেন্টেই . ইয়েফট পুজ্টিম্ এ

এলিমাই এলিমাই প্রায়ই তাপিঃ তৈলেব
ন্যায় আভ্যন্তরিক ব্যবহাব হয় না মলম পুবাভন ক্ষতে উপকারী,

অজুয়েটম্ এলিমাই . অয়েটমেন্ট অফ এলিমাই এ

মাফিক মাফিক দস্তবোগ চিকিৎ-

সকেবা ইহা সুবা ও ইথব ক্রোরিফবমে সুব করিয়া

দস্তছিজে পোকা লাগিলে দস্তগহবে দিয় থাকেন

এমোনাভেক্স এমোনাযাক . ১০-২০ গ্রেন ইহাব

ক্রিয়া হিঙ্গুর ন্যায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ, কার্য ইহাতে এক জীবাব
বায়ি তৈল অছে । পূর্ণ মাত্রা ব্যবহারে গোলযোগ উপস্থিত করে ।

এমপ্লাস্টম্ এমোনায়েমাই . এমোনাযাক এণ্ড এ
কম্ হাইড্রাজাইবো মাকুবিপ্লাস্টম্ এ

মিশ্চুবা এমোনিয়েসাই . এমোনাযাক এ

মিক্শটাইব ২-২ আং এ

কক্ষবম্ কক্ষবম্ উত্তেজক, মূনকীরক,
কামোদীপক, ধর্মকাবক ।

ওলিয়ম কক্ষবেটেস্ . কক্ষবেটেড্ অয়েল ৫-১০ মিঃ এ

পাইলিউসো কক্ষবাই . কক্ষবম্ পিল ৩-৬ গ্রেন এ

ল্যাটিন নাম । ইংরাজী নাম । মাত্রা । মন্তব্য ।

আর্গিস্ বেডিক্স অর্গিকা কট ... প্রধান ক্রিয়া
মস্তিষ্ক উত্তেজক, ঘর্ষকাবক ও মাদক
অধিক মাত্রায় ব্যবহারে বিষক্রিয়া কবে

টিংচুবা আর্গিস্ . . . টীং অফ, আর্গিকা . . . ১—২ ড্রাম . . . ঐ

ইথর . . . ইথর . . . ২০—৬০ গিঃ . . . উত্তেজক,
আক্ষেপ নিবারণক, মাদক, স্পর্শহ্রাসক, বাহ্য ব্যবহারে শৈত্য-
কাবক, অস্ত্রাগ্রাত সাধক, অধিক মাত্রায় ব্যবহারে বিষক্রিয়া
কবে ইহাও ধূম-আক্রাণে হতচৈতন্য উপস্থিত হয়।

স্পিরিটস্ ইথরিস্ . . . স্পিরিট অফ ইথর . . . ১—২ ড্রাম . . . ঐ

বিয়াডস্ পেটালগা বেডু পপি পেটালস . . . মাদক ও মস্তিষ্ক
উত্তেজক ।

সিরপস্ বিয়াডস্ . . . সিরপ অফ রেড পপি . . . ১ ড্রাম . . . ঐ

ল্যানেবিস্ ইথিকা . . . ইথিয়ান হেম্প . . . মস্তিষ্ক উত্তেজক,
অক্ষেপ নিবারণক, স্ক্রুৎকাবক, মাদক, কামোদ্দীপক, নিদ্রা-
করক, অবসাদক, বেদনা নিবারণক, জরায়ু সঙ্কোচক, অল্পমাত্রা
সেবনে মনে ক্ষুভি হয়, অধিক মাত্রায় মাদক ক্রিয়া প্রকাশ
পায়, বিষক্রিয়া কবে এবং হঠাৎ মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা ।

একস্ট্রাক্টস্ ক্যান-
বিস্ ইথিসি . . . একস্ট্রাক্ট অফ হেম্প . . . ১—২ ড্রোপ . . . ঐ

টিংচুবা

ল্যানেবিস্ ইথিসি . . . টীং অফ হেম্প . . . ৫—৩০ গিঃ . . . ঐ

ওপিয়াম . . . ওপিয়াম . . . ১ ২ গ্রোঃ . . . নবজব,
মস্তিষ্ক বা মস্তিষ্কাববর্ণের আদাহ, রক্তাধিক্য, তরুণ যান্ত্রিক আদাহ,
কোষ্ঠবদ্ধ, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি ;—অপূর্ণ পূর্ণ গর্ভাবস্থায় এবং
স্তনদায়িনী স্ত্রীদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ বিবিধ অনিবার্য অবস্থা, প্রলাপ,
অস্থিরতা, অনিদ্রা, উদরাময়াদি নিবারণার্থে ইহা বিশেষ উপযোগী ।

এম্ফ্রাক্টস্ ওপিয়াই . . . ওপিয়াম প্লাস্টিক ঐ

লাটিন নাম । ইংরাজী নাম । মাত্রা । মন্তব্য ।

এনিমা ওপিয়াই . . . এনিমা অফ ওপিয়ম . . . ১—২ গ্রোঃ . . . ঐ

এক্সট্রাক্টম্ ওপিয়াই . . . এক্সট্রাক্ট অফ ওপিয়ম . . . ১—২ গ্রোঃ . . . ঐ

এক্সট্রাক্টম্ ওপি- লিকুইড
য়াই লিকুইডম্ . . . এক্সট্রাক্ট অফ ওপিয়ম . . . ৫—৮ গ্রোঃ . . . ঐ

লিনিমেণ্টম লিনিমেণ্ট অফ
ওপিয়াই . . . ওপিয়ম . . . ১—২ গ্রোঃ . . . ঐ

পাইলুলা সেপনিম্ কম্পোণ্ডপিল
কম্পজিটা . . . অফ সোপ . . . ২—৫ গ্রোঃ . . . ঐ

পাইলিউলা হায়াই লেড এণ্ড
কম্ ওপিযো . . . ওপিয়ম পিল . . . ৪—৮ গ্রোঃ . . . ঐ

পাইলিউলা পিল অফ ইপোকুয়ানা
ইপোকুয়ানি কম্ সিল . . . উইথ স্কুইন্ . . . ৫—১০ গ্রোঃ . . . ঐ

পল্‌বিস্ ক্রিটি এবো- এবোমেটিক পাউডার
মাটিঙ্গ কম্ ওপিযো . . . অফ চাক্ এণ্ড ওপিযো . . . ৫—১০ গ্রোঃ . . . ঐ

পল্‌বিস্ কাইনো কম্পোণ্ড পাউডার
কম্পজিটম্ . . . অফ কাইনো . . . ১০—২০ গ্রোঃ . . . ঐ

পল্‌বিস্ ওপিয়াই কম্পোণ্ড পৌডার
কম্পজিটম্ . . . অফ ওপিয়ম . . . ৫—১০ গ্রোঃ . . . ঐ

কন্‌ফেক্সিয়ো ওপিয়াই . . . কন্‌ফেক্সান্ অফ ওপিয়ম . . . ৫—২০ গ্রোঃ . . . ঐ

টিংচুয়া ওপিয়াই টিং অফ ওপিয়ম . . . ৫—৮ মিঃ . . . ঐ

টিংচুয়া ক্যাম্‌ফরি কম্প জিটা . . . কম্পোণ্ড টিং অফ ক্যাম্‌ফন . . . ঐ

টিংচুয়া ওপিয়াই এমোনিয়টেড টিং

এমোনিয়াজ . . . অফ ওপিয়ম . . . ২—৬ মিঃ . . . ঐ

বাইবীম ওপিয়াই . . . ওয়াইন অফ ওপিয়ম . . . ৫—৮ মিঃ . . . ঐ

টোপিকাই ওপিয়াই . . . টোপিকাই লোঅজেক্টম্ . . . ১—৪ টোপিক . . . ঐ

লাটিন নাম ইংলীজ নাম মানে মন্তব্য।

অজলুসল্গ গ্যালিকম্ অয়েটেমটে অফ
ওপিয়ে . . . গাম্ এণ্ড ওপিয়ম . . .

সপজিটে বিথ ই
কল জিটা . . . লেড গাম্প সি টেবীজ . . .

মর্ফি হাইড্রোকে বাস্ হাইড্রোকোবেট
অফ্ মর্ফিয় . . . মর্ফিকাবক,
ত মর্ফি নিবাবক ইত্যাদি ক্রিয়াব জন্ম
ব্যবহার হয় . . . যেখানে অহিফেন ও মর্ফিয়া উভয়েই
ব্যবহার করা যায়, তথায় অহিফেন ব্যবহার করা
উচিত অহিফেন উত্তেজকরূপে ব্যবহার করা যায়

লাইকব্ মর্ফি সোলুসন অফ্ হাইড্রো
হাইড্রোকে বেটিস্ . . . ক্রো'বেট অফ্ মর্ফিয়া . . . ১০ . ৩ . মিঃ . . .

গাম্পোজিটোবিথ মর্ফি . . . মর্ফিয়া গাম্পোজিটেবি . . .

ট্রোচিসাই মর্ফি মর্ফিয় লোজেঞ্জস্ . . . ১ ৪ চার্জ . . .

ট্রোচিসাই মর্ফিএটি মর্ফিয়া এণ্ড ইপেকা-
ইপেকাকুয়ানি . . . ক্যাবা লোজেঞ্জস্ . . . ১ ৮ চার্জ . . .

ইঞ্জিও মর্ফি হাইপডমিক ইঞ্জিও মন্
হাইপডমিক অফ্ মর্ফিয়া . . .

মর্ফি য়া সিটাস্ . . . য়া সিটেট অফ্ মর্ফিয়া . . . ১—১ গ্রেন . . .

লাইকব্ মর্ফি সোলুসিন্ অফ্ মর্ফিয়া
য়ামিটেটিস্ . . . টেট অফ্ মর্ফিয় . . . ১০ মিঃ ১ ড্রাম . . .

নক্সবমিকা নক্সবমিকা . . . ১—৩—৫ গ্রোঃ . . . অতি অল্প
অত্রায তিক্ত বর্ণকাবক মাদক . . . অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায়
কশেকক মজ্জার উত্তেজক . . . ক্রমে ধীরে মাত্রায় প্রবল বিষ।
ইহা চূর্ণ অর্ধ ও মর্ফি নির্মা . . . গ্রোঃ ১০ মর্ফিয় . . . হাইড্রো

একুইব্টিস্ একুইব্টিস্ অফ্ . . .
নেউমিস্ রমিসি . . . নক্সবমিকা . . . ১—১ গ্রোঃ . . .

লাটিন নাম । ইংরাজী নাম । মাত্রা । মন্তব্য ।

টিংচুবা নিউমিগ্ বমিমি ... টিং অফ নক্সবমিকা ২—১০ মিঃ ১০০ গি
ফি বনী . ফি কনিয়া ... ২৫ গ্রো : এই
লাইকব ফি কনী মো-গু-সন অফ ফি কনিয়া ২—১০ মিঃ . . .

টনিক বা বলকারক]

ক্যাল সি বেডিং ক্যালস কট . . . ২০ গ্রো : তিঙ্ক,
বলকারক, আশ্রয়, কিক্রিং বমন নিষবক ।

একফোষ্টম্ ক্যালসী . . . একফোষ্টম্ ক্যালসী ২—১০ গ্রো : এই
ইন্সিউজম্ ক্যালসী ইন্সিউজম্ অফ
ক্যালসী . . . ১—২ আঙ্ক . . .

কোয়ামি লিগনম্ কোয়ামিয়া উড ১০ ২০ গ্রো : তিঙ্ক,
বলকারক, অশ্রয়, ক্রিমিনাশন, পর্যায়স্ব ।

একফোষ্টম্ কোয়ামি একফোষ্টম্ অব কোয়ামিয় . . . ৩ ৫ গ্রো : এই
ইন্সিউজম্ কোয়ামি ইন্সিউজম্ অফ
কোয়ামিয়া . . . ১—২ আঙ্ক . . .

টিংচুবা কোয়ামি টিং অফ কোয়ামিয়া . . . ২—২ ড্রাম . . .

জেন্সিয়েনি রেডিগ জেন্সিয়েন . . . ১০—৩০ গ্রো : তিঙ্ক,
বলকারক, আশ্রয়, অধিক মাত্রায় বমন বিব-
মিয়া ও ভেদ হয় . . . অল্প ক্রিমিনাশন ।

একফোষ্টম্ জেন্সিয়েনি একফোষ্টম্ অফ জেন্সিয়েন . . . ২০ গ্রো : এই

ইন্সিউজম্ জেন্সি . . . কম্পোণ্ড ইন্সিউজম্
জেন্সিয়েন . . . ১ ২ আঙ্ক . . .

লাটিন নাম । ইংরাজী নাম । মাত্রা । মন্তব্য ।

মিক্চুবা জেম্মিয়েনি . জেম্মিয়েন মিক্চাব ১—২ আং . . . ঐ

টিংচুৱা জেম্মিয়েনি . কম্পোজিট তফ
কম্পজিটা . জেম্মিয়েন ১—২ ড্রাম . . . ঐ

চিবাটা . . . চিবেটা . জেম্মিয়েনেব ঞায় তিত্ত বল-
কাবক, আগ্নেয়, বক্তপবিহারক ।

ইন্ফিউজন্ চিবাটা . ইন্ফিউজন্ অফ চিবাটা . . ১—২ আং . . . ঐ

টিংচুৱা চিবাটা . . . টিং অফ চিবেটা . . . ১—২ ড্রাম . . . ঐ

লপ্যালম্ . . . হপ্ . . . ৫—২০ গ্রেণ . . . তিত্ত,
বলকাবক ; অধিক মাত্রায় বলকাবক ।
ইহাতে যে তৈল আছে তজ্জন্যই উত্তেজক ।

ইন্ফিউজন্ . . . ইন্ফিউজন্
লপ্যালাই . . . অফ হপ্ . . . ১—২ আং . . . ঐ

এক্ট্রাক্টম্ . . . এক্ট্রাক্ট
লপ্যালাই . . . অফ হপ্ . . . ৫—২০ গ্রেণ . . . ঐ

টিংচুৱা লপ্যালাই . . . টিং অফ হপ্ . . . ১—২ ড্রাম . . . ঐ

মহি . . . মব . . . ১০—৩০ গ্রেণ . . . বলকাবক,
উত্তেজক, বজোনিঃসারক, আগ্নেয়, কফনিঃসারক ।

টিংচুৱা মহি . . . টিং অফ মব . . . ১—২ ড্রাম . . . ঐ

সর্পেন্টেরাই . . . সর্পেন্টেরী রুট . . . ১০—৩০ গ্রেণ . . . উত্তে-
জক, বলকাবক, আগ্নেয়, ঘর্মকাবক .

ইন্ফিউজন্ . . . ইন্ফিউজন্
সর্পেন্টেরাই . . . অফ সর্পেন্টেরী . . . ১—২ আং . . . ঐ

টিংচুৱা . . . টিং অফ
সর্পেন্টেরাই . . . সর্পেন্টেরী . . . ২ ড্রাম . . . ঐ

লার্টিন নাগ । ইংরাজী নাম । মাত্রা । . মন্তব্য ।

ক্যাস্কারিলি কটেক্স . ক্যাস্কাবিলি বার্ক .. ১০—২০ গ্রোঃ বলকাবক,
অপ্প সংকোচক আগ্নেয়, অপ্প কফ প্রিণীভক

ইন্ফিউজন্ম ইন্ফিউজন্ম অফ
ক্যাস্কাবিলি ... ক্যাস্কাবিলি ... ১—২ আং ... ঐ

টিং চুয়া টিং অফ
ক্যাস্কারিলি ... ক্যাস্কাবিলি ... ১—২ ড্রাম ... ঐ

কম্পোজিট কম্পোজিট
কটেক্স . বার্ক . . . ১০ ৪০ গ্রোঃ .. বল
কারক, কোন মতে সংকোচক
নহে, উত্তেজক, আগ্নেয়, জরনাশক

ইন্ফিউজন্ম ইন্ফিউজন্ম অফ
কম্পোজিট ... কম্পোজিট ... ১—২ আং . ঐ

সিক্কোনা কটেক্স ... সিক্কোনা বার্ক .. ১০—৬০ গ্রোঃ .. বলকাবক,
আগ্নেয়, পর্যায়নিবারক, বাহ্য ব্যবহারে পিচন নিবারক ।

ডিক্টাম্ সিক্কোনি ডিক্টাম্ অফ
ফেবি ... ইয়েলো বার্ক ... ১—২ আং ... ঐ

একট্রাক্টাম্ সিক্কোনি লিকুইড একট্রাক্টাম্
ফেবি লিকুইডাম্ ... অফ ইয়েলো বার্ক . . ১০—৩০ মিঃ ... ঐ

ইন্ফিউজন্ম ইন্ফিউজন্ম অফ
সিক্কোনি ফেবি ... ইয়েলো বার্ক . . ১—২ আং ... ঐ

টিং চুয়া টিং অফ
সিক্কোনা ফেবি . ইয়েলো বার্ক . . ৩০ মিঃ—২ ড্রাম . ঐ

টিং চুয়া সিক্কোনা কম্পোজিট টিং অফ
কম্পোজিট . সিক্কোনা . . ১—৩ ড্রাম . ঐ

কোয়ায়িনি সল্ফেট . সল্ফেট অফ কোয়াইনা . ১—৩ গ্রোঃ বল-
কাবক, ৩—১০ গ্রোঃ পর্যায়নিবারক . টিটেনম্
বোগে শুষ্ক মাত্রায় ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে

৬৯৪ চিকিৎসা তত্ত্ব বাবিশি।

লাটিন নাম। ইংবাজী নাম। মাত্রা। মন্তব্য।

ছনিবাব * নিবঃপৌ ৬ য ইহা বিশেষ উপযোগী, বাত, শ্বাবু-
* * * * * ল, ফি কচব্ এমবসি সু ইত্য দি বে গে বিশেষ উপকার কবে

টিংচুবা কোথ ইনি . টীং অফ কোয়াইন ১—২ ডাঃ . ঐ
আইলুনা কোথ ইনি . . . পিল অফ কোয়াইন . . ১—১০ গ্রে . ঐ
বাইনম্ কোথ ইনি . . . ওয়াইন অফ কোয়াইন . . ১—১ আঃ . ঐ
টিংচুবা কুইনাই . . . এমেনিয়েটেড
এমেনিয়েটা টীং অফ কুইনিয়া . . . ১—২ ডাঃ . ঐ

য়্যাসিডম্ সল্ফিউরিকম্ . . . সল্ফিউরিক্ য্যাসিড নির্জল
জাবকেব্ জাত্যান্তরিক ব্যবহাব হয় না জলমিত্র
জাবক অম্পমাত্রায় বলকারক, শৈত্যকারক সংকোচক,
ক্ষাবনাশক, 'নির্জল' জাবক সেবনে বিষত্রিয়া কবে

য়্যাসিডম্ ডাইলুটেড সল্-
সল্ফিউরিকম্ ডাইলুটম্ ফিউরিক্ য্যাসিড . . ৫—৩০ মিঃ . ঐ
য়্যাসিডম্ সল্ফিউরিকম্ এরোম্যাটিক সল্-
এবোম টিকম্ ফিউরিক্ য্যাসিড . . . ৫—১০ মিঃ . . . ঐ
য়্যাসিডম্ নাইট্রিকম্ নাইট্রিক্ য্যাসিড . . . নির্জল জাবক
অত্যন্ত দাহক, জলমিত্র জাবক অম্প পবিমানে বলকারক,
জ্বালেন, শৈত্যকারক, সংকোচক, পিঃ নিগোবক
নির্জল জাবক ভ্রমণে প্রবল বিষ ত্রিয়া কবে।

য়্যাসিডম্ নাইট্রিকম্ ডাইলুটেড
ডাইলিউটম্ নাইট্রিক্ য্যাসিড . . ৫—১০ মিঃ . . . ঐ
য়্যাসিডম্ হাইড্রো- হাইড্রো-
ক্লোরিকম্ য্যাসিড নির্জল
জাবক দাহক, কখনই জাত্যান্তরিক ব্যবহাব হয়
না জলমিত্র জাবক অম্প মাত্রায় বলকারক,
শৈত্যকারক, সংকোচক, ক্ষাবনাশক

য়্যাসিডম্ - ডাইলিউটেড -

লাটিন নাম । ইংরাজী নাম মাত্র । মন্তব্য

হাইডোক্লোবিকম্	হাইডোক্লোবিক	১০—৩০ মিঃ	ঐ
ডাইলিউটম্	যা সিড	১০—৩০ মিঃ	ঐ
য্যাসিডম্ নাইট্রেট- হাইডোক্লোবিকম্	নাইট্রোহাইড্রো- বোরিক য্যাসিড	৫—২০ মিঃ	বল- কারক, শৈত্যকারক, পবিবর্তক, সংকোচক
য্যাসিডম্ নাইট্রেট- হাইডোক্লোবিকম্	ডাইলিউটেড নাইট্রোহাইড্রো- ক্লোবিকম্	৫—২০ মিঃ	ঐ
য্যাসিডম্ ফস্ফবিকম্ ডাইলিউটম্	ডাইলিউটেড ফস্ফবিক য্যাসিড	২০ ৪০ মিঃ	বল- কারক, শৈত্যকারক ও পবিবর্তক । অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া করে ।
আর্জেন্টাই নাইট্রাস্	নাইট্রেট অফ্ সিল্ভার	১—৫ গ্রেঃ	বল- কারক, সংকোচক, আক্ষেপ নিবারণক, অবগাদক । বটীসহ বা বটীকাভাবেই প্রায় ব্যবহার হয় । অধিক দিন ব্যবহারে বর্ণ নীল হইতে পারে, বা চক দাহক, ফোস্ফাকারক, অধিক মাত্রায় প্রদাহিক বিষক্রিয়া করে ।
আর্জেন্টাই অক্সাইডম্	অক্সাইড অফ্ সিল্ভার	১—২ গ্রেঃ	বল- কারক, সংকোচক, আক্ষেপ নিবারণক, অগ্নি দাহক
ক্যাল্‌সাই মল্‌গাস্	মল্‌ফেট্ অফ্ কপর্ব	১—২ গ্রেঃ	সংকোচক, ৫—১০ গ্রেঃ বমনকারক, সংকোচক, বলকারক, অধিক মাত্রায় (১০ গ্রেঃ) বমনকারক বাহ্য ব্যবহারে উত্তেজক, সংকোচক, দাহক অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া করে ।
জিন্‌ক্‌সাই মল্‌গাস্	মল্‌ফেট্ অফ্ জিন্‌ক্‌	১—৩ গ্রেঃ	বলকারক, ১০—৩০ গ্রেঃ বমনকারক .. শ্বাসবীয় বলকারক, আক্ষেপ নিবারণক, হিষ্টিব্রিয়া ও হেমিস্টিজিয়া বোগে ব্যবহার হয় । মাত্রা ১—৩ গ্রেঃ
জিন্‌ক্‌সাই অক্সাইডম্	অক্সাইড অফ্ জিন্‌ক্‌	২—১০ গ্রেঃ	বল- কারক ও আক্ষেপ নিবারণক । বাহ্য ব্যবহারে অতি উত্তেজক উৎসাহক, সংকোচক, অধিক মাত্রায় বল বিষক্রিয়া করে ।

ল্যাটিন নাম । ইংরাজী নাম । মাত্রা । মন্তব্য ।

অক্সিজেন জিন্সাই . অক্সিজেন অফ জিঙ্ক . ঐ

জিন্সাই এমিটস্ . এমিটেট অফ জিঙ্ক ... ১—২ গ্রাঃ বল-
কাবক, ১০—২০ গ্রাঃ বমন কাবক . বলকাবক,
আক্ষেপ নিবাবক, বমনকাবক, সংকোচক ।

জিন্সাই কোবাইডম্ ... কোবাইড অফ জিঙ্ক ... আভ্যন্তরিক
ব্যবহৃত হয় না . বাহ্য ব্যবহারে
দাহক, বিবিধ ক্ষতে বৈহাব হয় ।

বিস্মথাই সব নাইটেট
সবনাইট্রাস্ . অফ বিস্মথ . . . ৫—২০ গ্রাঃ . বল-
কাবক, আক্ষেপ নিবাবক, সংকোচক ।

ট্রোচিসাই বিস্মথাই . . . বিস্মথ লোজেঞ্জেন্স্ ... ১—৬ চাক্তি . . . ঐ

লাইকব বিস্মথাই . . . সোল্যামন্ অফ সাইটেট
এমোনিও অফ বিস্মথ . . .
সিটেটস্ . . . এমোনিয়া . . . ১—১ ড্রাম . . . ঐ

বিস্মথাই কার্বনাস্ ... কার্বনেট অফ . . . ১০—১৫ গ্রাঃ, ষোল্লোশবা-
বিস্মথ . . . বহুয় ১—৫ গ্রাঃ . . . ঐ

বিস্মথাই অক্সাইডম্ . অক্সাইড অফ
বিস্মথ . . . ৫—১৫ গ্রাঃ . . . কার্বনেট
অফ বিস্মথের স্থায় ।

ফিবম্ . . . আয়বন . . . বলকাবক, রক্তজনক, পরি-
বর্তক, বাহ্য ব্যবহারে দাহক ।

ফিবম্ রিড্যাক্টম্ . . . রিডিউসড
আয়বন . . . ২—৫ গ্রাঃ . . . রক্ত ও
বলকারক ।

ট্রোচিসাই ফেবি . . . রিডিউসড আয়-
রিড্যাক্টাই . . . বন লোজেঞ্জেন্স্ . . . ১—৫ চাক্তি . . . ঐ

বাইনুম্ ফেবি . . . ত্রুয়িন অফ আয়বন . . . ১—৪ ড্রাম . . . ঐ

লাটিন নাম । ইংরাজী নাম । মাত্রা । মন্তব্য ।

মিস্চ বা ফেবি এবেম্যাটিক্ মিস্চাব
এবেম্যাটিকা .. অফ আয়বন ১—২ ড্রাম .. গ্র

ফেবি আর্শেনিয়াস্ আর্শেনিয়েট অফ
আয়বন ১—২ গ্রোঃ .. গ্র

ফেবি কার্বনাস্ স্ট্রাকাবেটেড্ কার্বনেট
স্ট্রাকারেটা .. অফ আয়বন ৫—১০ গ্রোঃ .. গ্র

পাইলুলা ফেরি পিল্ অফ কার্বনেট
কার্বনেটিস্ অফ আয়বন ৫—১০ গ্রোঃ .. গ্র

মিস্চ বা ফেবি কম্পজিট
কম্পজিটা .. অফ আয়বন ১—২ ড্রাম .. গ্র
বলকাবক, বলকাবক, বজোনিঃসাবক ।

ফেবি এট্ এমোনি সাইটেট্ অফ আয়বন
সাইট্রাস্ এণ্ড এমোনিয়া ৫—১০ গ্রোঃ .. গ্র

বাইনম্ ফেরি ওয়াইন অফ সাইটেট
সাইটেটিস্ অফ আয়বন ১—৫ ড্রাম .. গ্র

ফেনিএট্ কায়াইনি সাইটেট্ অফ আয়বন
সাইট্রাগ্ এণ্ড কুইনাইন্ ৫—১০ গ্রোঃ .. বলকাবক,
বলকাবক, পীর্ণানিঃসাবক ।

ফেরি আইওডাইডম্ অক্সিওডাইড
অফ আয়বন ১—৫ গ্রোঃ .. বল-
জনক, বলকাবক, পরিবর্তক, মূত্রকারক, বজোনিঃসাবক, মূত্র বিবেচক ।

সিবপ্স ফেরি সিবপ্স অফ আইওডাইড
আইওডাইডাই অফ আয়বন ১—১ ড্রাম .. গ্র

পাইলুলা ফেবি পিল্ অফ আইওডাইড
আইওডিডাই অফ আয়বন ৫—১০ গ্রোঃ .. গ্র

ফেরি অক্সাইডম্ - ম্যাগনেটিক্ অক্সাইড

কার্টন নামক ইংরাজী নাম । মাত্র । মন্তব্য ।

ম্যাগ্নেটিকম্ অফ আয়বন ৫—১০ গ্রেঃ বলকাবক
বক্তজনক, উগ্রতা মাত্র নাই

সেবি পবসাইডম্ হাইড্রিটম্ হাইট পবসাইড অফ আয়বন

সেবি পবসাইডম্ হাইড্রিটম্ হাইড্রিট পবসাইড অফ
আয়বন ১০—৬০ গ্রেঃ বক্তজনক,
বলকাবক, বজোনিঃসারক ও ক্রিমিন শক ।

এম্প্লাষ্টম্ সেবি ... প্লাস্টিক অফ আয়বন ৫

সেবি ফস্ফাস্ ফস্ফেট অফ আয়বন ৫—১০ গ্রেঃ বক্ত-
জনক, পবিবর্তক, বলকাবক ।

সিবর্স সেবি ফস্ফেটিম্ সিবর্স অফ ফস্ফেট
অফ আয়বন ১ ২ ড্রাম ৫

সেবি সল্ফাস্ সল্ফেট অফ আয়বন ২—৫ গ্রেঃ ক্ষাব,
ক্ষাব কার্বনেট, গন্ধক দ্রাবক ত্রিগ সমুদয়
দ্রাবক, অধিকাংশ ঘাতক বর্ণ, ট্যানিক এবং
গ্যালিক যাক্সিডেব সহিত ইহা অঙ্গুলিন ।

সেবি সল্ফাস্ ডায়েড সল্ফেট
এক্সিকেটা অফ আয়বন ১—৩ গ্রেঃ ৫

সিবর্স টার্টারেটম্ টার্টারেটেড আয়বন ৫—২০ গ্রেঃ ক্রিমিনাশ্য
৩০—৬০ গ্রেঃ বলকাবক, মূত্রকাবক,
বক্তকাবক, অধিক ম এ য ক্রিমিনাশ্যক ।

লাইকর সেবিপার ক্রোডাইড ... টিং সোল্যামন্ অফ পব ক্রোডাইড
অফ আয়বন ।

(লাইকর) সেবিপার সোল্যামন্ অফ
ক্রোডাইড লাইটেট অফ আয়বন ১০—৬০ মিঃ বল-
কাবক, বক্তজনক, সঙ্কটক, রক্তবোধক ।

লাইকর সেবিপার ... সোল্যামন্ অফ পবসাইড

লাটিন নাম ইংরাজী নাম । মাত্রা । . . .

সল্‌ফেট্‌স্ . . . অক্‌ আয়বন . অতি শবল সঙ্কোচক ও বস্ত-
বোধক , বস্তবোধার্থ স্থানিক প্রাণাণ কীর্ত্তি

টীংচুবা দেবি এসিটেট্‌স্ . . . টীং অক্‌ এসিটেট্‌ অক্‌ আয়বন

ওলিয়ম্ মল্‌ই কুডনিভব অইল . ১—৮ ড্রাম . . . বলকাবক,
পরিবর্তক, পোষাক

পেপ্সিনা পেপ্সিন . . . ১—৫ গ্রেঃ . . . পাচক ।

পরিবর্তক বা অল্ট টারেট্‌স্‌ ।

হাইড্রোজাইবম্ . . . মাকুবি বিউক্‌ পাবদু
ঔষধার্থ ব্যবহার হয় না, ইহাতে
প্রস্তুত ঔষধই ব্যবহার হইয়া থাকে ।

এম্প্ল্যাস্টম্‌ এমোনায়েসাই . . . এমোনাযাক্‌ এণ্ড
কম্‌ হাইড্রোজিবো . . . মার্কাবে প্লাস্টিক . . . শোষণ
ক্রিয়াব জন্ম অবরুদ্ধ দিতে ব্যবহার হয় ।

এম্প্ল্যাস্টম্‌ হাইড্রোজিবাই . . . ম কুবিযেণ্‌ প্লাস্টিক . . . শোষণ
জন্ম ব্যবহৃত হয় ।

লিনিমেন্টম্‌ হাইড্রোজিবাই . . . লিনিমেন্ট অফ্‌ মাকুবি . . . মুগ্ধ
আনিবান জন্ম ব্যবহৃত হয় ।

প টুলুলা হাইড্রোজিবাই . . . মাকুবিযেণ্‌ পল . . . ৩—৮ গ্রেঃ . . . পবি-
বর্তক, জালানিঃসাবক ।

সপোজিটোবিয়া হাইড্রোজিবাই . . . মাকুবিযেণ্‌ সপোজিটবিজ

অক্সেটম্‌ হাইড্রোজিবাই . . . কক্সেট অক্সেটমেন্ট

কপজিটম্‌ অফ্‌ মাকুবি মুগ্ধ আনাই-
বান জন্ম ইহার দ্বন্দ্ব অতি সহজ উপায়

অক্সেটম্‌ হাইড্রোজিবাই . . . এইটমেন্ট অফ্‌ মাকুবি

লাটিন নাম । ইংরাজী নাম । মাত্রা । মন্তব্য ।

হাইড্রার্জিবাই বেড আইওডাইড
আইওডাইডম্ জীবম্ ... অফ্ মকু'বি ... ১, ১ গ্রোন ... প বিবর্তক,
শোষক, দাহক, অত্যন্ত অল্প মাত্রায় প্রদাহিক বিয়ক্রিয়া
কবে, এজন্য সাবধানে ব্যবহার করা কর্তব্য ।

অক্সেটম হাইড্রার্জিবাই আই টেমেন্ট অফ্ বেড
আইওডাইডম্ জীবাই ... আইওডাইড অফ্ মকু'বি ... ১
হাইড্রার্জাইরাই আইও গ্রীন্ আইওডাইড
ডাইডম্ বিবিডি অফ্ মকু'বি . বালকেব পক্ষে ১—২ গ্রোন,
প্রাপ্তবয়স্কের ১—৩ গ্রোন ... পরিবর্তক ।

হাইড্রার্জিবাই বেড অক্সাইড
অক্সাইডম্ জীবম্ ... অফ্ মকু'বি ... প্লাল নিঃসারক . কিন্তু
আন্তরিক ব্যবহার হয় না, বাহ্যিক ব্যবহারে দাহক

অক্সেটম হাইড্রার্জিবাই অক্সেটমেন্ট অফ্ বেড
অক্সাইডাই জীবাই অক্সাইড অফ্ মকু'রি

হাইড্রার্জাইরাই পর ক্লোরাইড
পর ক্লোরাইডম্ ... অফ্ মকু'বি ... ১—২ গ্রোন ... অতি অল্প
পরিমাণে ব্যবহারে পবিবর্তক, অধিক মাত্রায়
বিয়ক্রিয়া কবে, বাহ্য ব্যবহারে দাহক

লাইকব হাইড্রার্জাই- সোল্যাসন অফ্
রাই পরক্লোরিডাই . পবক্লোর ইড অফ্ মার্ক্যুরি . ১—২ ড্রাম ...
লোসিয়ো হাইড্রার্জাই- ইথেরো মাকু'রি
রাই ফেবা ... রিগেল সল্যাসন ... ১

হাইড্রার্জিবাই পর ক্লোরাইড
সব্ ক্লোরাইডম্ ... অফ্ মাকু'রি ... ১—২ গ্রোন ... পরি-
বর্তক, বিদ্রেক, লালানিঃসারক, পিত্ত নিঃসারক, ক্রিমি-
নাশক, শোষক, অবসাদক ইহাঙ্গারা প্রদাহ-জন্মে না ।

হাইড্রার্জাইরাই সল্যাসন . সল্যেট অফ্ মাকু'বি

পরিবর্তক বা অল্ টারেটিব্‌স্‌ । ৭০১

লাটিন নাম । ইংরাজী নাম । মাত্র । সম্ভব্য ।

হাইড্রার্জাইরন্‌ এমোনিযেটেস্‌ .. এমোনিযেটেড্‌ মকু'বি .. আভ্য-
স্তবিক ব্যবহারি হয় না

অক্সুয়েটেস্‌ হাইড্রার্জাইবাই অয়েটেমেন্ট অফ্‌ এমো-
এমোনিযেটাই ... নিযেটেড্‌ মকু'বি ..

লাইকর'হাইড্রার্জাইবাই এমিড্‌ সোল্যাসন্‌ অফ্‌
নাইটেট্‌স্‌ এমিড্‌স্‌ .. নাইটেট্‌ অফ্‌ মকু'বি .. আভ্য-
দাহক, ল্যাপস্‌, ক্যাসিব ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়

অক্সুয়েটেস্‌ হাইড্রা- অয়েটেমেন্ট অফ্‌
র্জাইবাই নাইটেট্‌স্‌ .. নাইটেট্‌ অফ্‌ মকু'বি ..

আইওডন্‌ ... আইওডিন্‌ ... ১—২. গ্রেণ ... পরিবর্তক,
শোষক, বলকাবক, অধিক মাত্রায় প্রদাহিক বিষ ক্রিয়া কবে ।

টিংচুবা আইওডাই : টিং অফ্‌ আইডিন্‌ .. ৫—২০ গ্রেণ ...
লিনিমেন্ট আইওডাই .. লিনিমেন্ট অফ্‌

আইওডিন্‌ .. বাহ্য প্রয়োগে, ব্যবহৃত ..
লাইকর আইওডাই .. সোল্যাসন্‌ অফ্‌ আইওডিন্‌ ..

অক্সুয়েটেস্‌ আইওডাই .. অয়েটেমেন্ট অফ্‌ আইওডিন্‌ ...
বেপব আইওডাই .. ইন্থেরাসন্‌ অফ্‌ আইওডিন্‌ ..

পটাসিয়াইড্‌ আইওডাইড্‌
আইওডাইডন্‌ ... অফ্‌ পটাসিয়ন্‌ ... ২—১০ গ্রেণ .. আইওডিন্‌
হুইটে যুগ্ম, বাহ্য ব্যবহারে শোষক, উত্তেজক

লিনিমেন্ট পটাসিয়াই লিনিমেন্ট অফ্‌ আইওডাইড্‌
আইওডাইডাই কন্‌ সেপোনি ... অফ্‌ পটাসিয়ন্‌ এও সোপ ..

অক্সুয়েটেস্‌ পটাসিয়াই আইওডাইড্‌ অফ্‌ পটাসি-
আইওডাইডাই .. যম অয়েটেমেন্ট ..

সল্‌ফিউবিদ্য আইওডাইড্‌
আইওডাইডন্‌ .. অফ্‌ সল্‌ফিউবিদ্য .. ১—২ গ্রেণ .. পরিবর্তক

৭০২

চিকিৎসা-তত্ত্ব বারিধি।

ল্যাটিন নাম

ইংরাজী নাম।

মাত্রা

মন্তব্য।

অক্স য়েন্টম্ সল্ফিউরিস্

আইণ্টেমেন্ট অফ আইও-

আইওডিডিই ...

ডাইড অফ সলফার

ঐ

ব্রোমম্

ব্রোমিন্

ঐ

এমোনিয়া ব্রোমাইডম্ ব্রোমাইড অফ

এমোনিয়া ২—২০ গ্রো° পবিবর্তক, শোষক

পটাশাই ব্রোমাইডম্

ব্রোমাইড অফ

পটাশিয়ম্

৫—৩০ গ্রো° পবি

বর্তক, শোষক অবসাদক, উত্তেজক, জননেদ্রিয়ের অবসাদক

আক্ষেপ নিবারক। অসম্মিলন—ক্ষার, অম্ল, বিবিধ ধাতব লব°।

সল্ফব্

সল্ফব্

২০—৬০ গ্রো°

পবিবর্তক, কফ ও

পিত্ত নিঃসারক ঘর্ষকাক, অত্যন্ত অধিক মাত্রায় বিবেচক

কনফেক্সিয়ো

কনফেক্সম্

সল্ফিউরিস্

অফ সল্ফব্

১—২ ড্রাম

ঐ

অক্স য়েন্টম্ সল্ফিউরিস্

সল্ফার আইণ্টেমেন্ট

...

ঐ

পটাশা সল্ফিউবেটো

সল্ফিউবেটেড পটাশ ২—১০ গ্রো°

ইছাব

প্রধান জিয়াৈ শ্বিক বিল্লীর জিয়াৈ বৃদ্ধি কবে পবি-

বর্তক, পিত্ত নিঃসারক, ঘর্ষকারক, উত্তেজক, অধিক

মাত্রায়, বিষক্রিয়া কবে ও মৃত্যু পর্য্যন্তও ছইতে পাবে।

এসিডম্ সল্ফিউরাসম্

সল্ফবম্ এসিড

১—১ ড্রাম

পবি-

বর্তক, পর্য্যায়নিবারক

লাইকর ক্রোবাই

সোণুসন্ অফ ক্রোবিন

১০—২০ মিঃ

পবি-

বর্তক, বলুকাক, উত্তেজক, লালানিঃসারক,

পিত্ত নিঃসারক, পুচন নিবারক, দুর্গন্ধ-

হারক, অধিক মাত্রায় প্রদাহিক বিষ।

কালকম্ ক্রোবেটো

ক্রোয়িনেটেড লাইম্

২০—১০ গ্রো°

ক্রোয়ি-

নেব ছায় ক্রিয়াশীল অধিকন্তু অক্ষনামক।

লাইকম্ কালামম্—

সোণুসন্ অফ

পরিবর্তক বা অণুটোবেটিব্‌স্

৭০৩

ল্যাটিন নাম । ইংরাজী নাম । মাত্রা । মন্তব্য

৩৬৬ বেসিট ক্রোবিনেটেড লাইগ ১০ মিঃ ১ ড্রাম ৩৬৬ ঐ

বেপব ক্রোবাই ইন্‌হেলেসন্‌ অফ ক্রে বিগ্ন ঐ

লাইকব শোডি সোল্যাসন্‌ অফ

ক্রোবেটি ক্রোবিনেটেড শোডি ১০ ২০ মিঃ পরিবর্তক,
সংকোচক, উত্তেজক, অগ্ননাশক, দুর্গন্ধনাশক, পচন নিবাবক

শোডিয়াই ক্রোবাইডম্‌ ক্রোবাইড অফ
শোডিয়ম্‌ ৫—২০ গ্রোন পরি-

বর্তক, আগ্নেয়, অধিক মানাষ বিবেচক, বমনকারক,
ক্রিমিনাশক, চক্ষোপবি বাহ্যিক ব্যবহাবে কোষাকারক

এমোনিয়াই ক্রোবাইড অফ
ক্রোবাইডম্‌ এমোনিয়া ৫ ২০ গ্রোন পরিবর্তক,

পিত্তনিঃসারক, কফ নিঃসারক, শর্দাকাবক,
বজোনিঃসারক, শোষক, শৈত্যকাবক,
উত্তাপসাধক, অধিক মাত্রায় ব্যবহার্য নহে

পটালি ক্রোবাস্‌ ক্রোবেট অফ পটাল ১০ ৩০ গ্রোন পরি-
বর্তক, শৈত্যকাবক, মুত্রকারক ।

ট্রোচিসাই পটালি ক্রোবেট অফ ট্রোচ

ক্রোবেটিস্‌ লোজেন্ডেম্‌ ১—৬ চাক্রি

এসিডম্‌ আসেনিকেলিস্‌ অসেনিয়ম্‌ এসিড ১—১০ গ্রোন

লাইকব আসেনিকেলিস্‌ আসেনিয়েল্‌
সোল্যাসন্‌ ২—১০ মিঃ

লাইকব আসেনিকিসাই হাইড্রোক্লোরিক সোল্যাসন্‌

হাইড্রোক্লোরিক অফ আসেনি ২—১০ মিঃ পরিবর্তক,
পরিণাম নিবাবক, বাহ্য ব্যবহাবে অক্লান্ত দাহক পচন নিবাবক,

অধিক মাত্রায় জীবননাশক বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

শোডি আসেনিয়াম্‌ ওক্সাসেনিয়েট
অফ শোডি ১—২ গ্রোন পরিবর্তক ।

ল্যাটিন নাম । ইংরাজী নাম । মাত্রা । মন্তব্য ।

লাইকনোপ্যাডি . . . মোল্লুসন্ অফ আমেনিয়েট
আমেনিয়েটিস্ . . . অফ শোভা . . . ৫—১০ মিঃ . . . ঐ

ক্যালসিস্ কক্ষস্ . . . ফস্ফেট অফ
লাইগ্ . . . ১০—২০ গ্রেন . . . পরিবর্তক, অল্পনাশক

মার্জি বেডিকা . . . জ্যামেকা মার্জাপেবিলা . . . পরিবর্তক,
বলকাবক, ঘর্ষকারক, কঠিৎ মূত্রকাবক ।

ডিকাক্টম্ মার্জি . . . ডিকাক্সন্ অফ মার্জাপেবিলা . . . ২—৪ আং . . . ঐ

ডিকাক্টম্ মার্জি . . . কম্পোণ্ড ডিকাক্সন্
কম্পজিটম্ . . . অফ মার্জাপেবিলা . . . ১—৪ আং . . . ঐ

একফ্রাক্টম্ মার্জি . . . লিকুইড একফ্রাক্ট
লিকুইডম্ . . . অফ মার্জাপেবিলা . . . ১—২ ড্রাম . . . ঐ

হেমিডেসম্ রেডিকা . . . হেমিডেসম্ স্কট . . . পরিবর্তক,
ঘর্ষকাবক, বসকাবক, মার্জাপেবিলাব পরিবর্তে ব্যবহার হয় ।

সিবপ্স হেমিডেস্ মাই . . . সিবপ্স অফ হেমিডেসম্ . . . ১—২ ড্রাম . . . ঐ

কল্চিকম্ . . . কল্চিকম্ . . . ২—৮ গ্রেন . . . পরিবর্তক,
বিবেচক, মূত্রকাবক, বেদনানিবারক, পিত্তনিঃসারক, ঘর্ষকারক,
অবসাদক, অধিক মাত্রায় বিবমিসা ও বমন উপস্থিত কবে ।

একফ্রাক্টম্ কল্চিকমাই . . . একফ্রাক্ট অফ কল্চিকম্ . . . ১—২ গ্রেন . . . ঐ

একফ্রাক্টম্ কল্চিকমাই . . . একফ্রাক্ট অফ একফ্রাক্ট
এমেটিকম্ . . . অফ কল্চিকম্ . . . ১—২ গ্রেন . . . ঐ

টিংচুরা কল্চিকমাই . . . টিংচুরা কল্চিকম্
সেমিনম্ . . . সীড . . . ১—৩ মিঃ . . . ঐ

বাইনম্ কল্চিকমাই . . . ওয়াইন অফ কল্চিকম্ . . . ১০—৩০ মিঃ . . . ঐ

সাসাক্রাম্ বেডিকা . . . সাসাক্রাম্ স্কট . . . পরিবর্তক, ঘর্ষকাবক ।

ডল্কায়াবা . . . ডল্কায়াবা . . . ১—২ আং . . . পরিবর্তক,
ঘর্ষকারক, বাত ও উপদংশ বোগে ব্যবহার হয় ।

লার্টিন নাম ইংরাজী নাম । মাত্রা । সংখ্যা ।

ইনফিউজন্ ডল্কাগাবি ... ইনফিউজন্ অফ ডল্কাগাবা ... ১-২ আং ...

মেজিবিয়াই কটেক্স মেজেবিয়ন্ বার্ক পবিবর্তক, উত্তেজক ঘর্ষকাবক, মুত্রকাবক, অধিক মাত্রায় অত্র শোলমীল উপস্থিত কবে, বাহ্য ব্যবহারে স্থানিক উগ্রভাসাধিক ও ফোকাকাবক ।

একফ্রাক্টম্ মেজেবিয়াই ইথিবিয়েল একফ্রাক্ট ইথিবিয়ন্ ... অফ মেজেবিয়ন্ ... ৩-৪ আং ...

গে'যেসাই লিগনম্ গো'যেক' উড এক বেজিন্ ১০ ৩০ পবিবর্তক, উত্তেজক ঘর্ষকাবক, মুত্রকাবক, লালানিঃসাবক, বজোনিঃসাবক

গিচ্চুবা গো'সাই ... গো'যেক গিচ্চুবা ... ১-২ আং ...

টিংচুবা গো'য়েসাই এমোনিযেটেড্ টিং এমোনিযেটা ... অফ গো'যেক ... ১-২ ড্রাম ...

বিবেচক বা কেথেটিক্স ।

ওনিয়ম্ রিসিন্ ... ক্যাটব অইল ... ১-২ আং, লালকের পক্ষে ১-৪ ড্রাম

জালপা ... জালাপ ... ১-২ আং ... বিবেচক ।

একফ্রাক্টম্ জালাপি ... একফ্রাক্ট অফ জালাপ ... ৫-১০ গ্রোণ ...

পলবিগ্ জালাপি ... ক্যাপ্সা ও জালাপ ... পোডব ... ২-৬ গ্রোণ ... বিবেচক ।

টিংচুবা জালাপি ... টিং অফ জালাপ ... ১-২ ড্রাম ... বিবেচক

সেমোনিয়ম্ ... স্যামনি ... ১০-২০ গ্রোণ ... অত্যন্ত বিশেষক

লাটিন নাম ইংরাজী নাম । মাত্রা । মন্তব্য ।

স্কেলমায়ি বেজিনা	বেজিন্ অফ স্কাগনি ... ৫ গ্রোন ...	ঐ
কন্ফেক্‌সিয়ো	কন্ফেক্‌সিন্	...
স্কেমোনিয়াই	অফ্‌ স্কাগনি ১০—৩০ গ্রোন	...
	অপ্পা বয়স্কেব পক্ষে ৩—১০ গ্রোন	...
মিক্‌চুবা স্কেমোনিয়াই	স্কাগনি মিক্‌চুব ১—২ আং	...
পলবিম্‌ স্কেমোনিয়াই	কম্পোণ্ড পৌডব	...
কম্পজিটম্‌	অফ্‌ স্কাগনি ১০—২০ গ্রোন, বালক- দিগেব পক্ষে ৩—৫ গ্রোন	...
ইলেটিবিয়ম্‌	ইলেটিবিয়ম্‌ ১—২ গ্রোন ... অতি বিরেচক, সেবনে বুমনি বিবমিষ উপস্থিত হয়	...
বিয়াই বেডিকা	১০—৩০ গ্রোন : রবার্‌ব রুট ২—৫ গ্রোন : বুলকার্ক এবং সংকোচক, ১০—৩০ গ্রোন : বিরেচক ... যুগ্ম, বলকাবক, বিরেচক, এবং সংকোচক ; অপ্পমাত্রায় বলকাবক, পূর্ণ মাত্রায় বিরেচক ।	...
একফ্রাক্টম্‌ বিয়াই	একফ্রাক্ট অফ্‌ রবার্‌ব ৫—২০ গ্রোন ...	ঐ
ইন্‌ফিউজম্‌ বিয়াই	ইন্‌ফিউজম্‌ অফ্‌ রবার্‌ব ১—২ আং ...	ঐ
পাইলুলা বিয়াই	কম্পোণ্ড	...
কম্পজিটা	রবার্‌ব পিন্‌ ১০—৩০ গ্রোন ...	ঐ
পলবিম্‌ বিয়াই	কম্পোণ্ড	...
কম্পজিটম্‌	রবার্‌ব পৌডব ২০—৬০ গ্রোন, শৈশবাবস্থায় ৫—১০ গ্রোন	...
টিংচুবা বিয়াই	টিংচু অফ্‌ রবার্‌ব ১—২ ড্রাম্‌ অগ্নেয় এবং বলকাবক, ৪ ড্রাম্‌ মাত্রায় বিরেচক ...	ঐ
মিরম্‌ বিয়াই	মিরম্‌ অফ্‌ রবার্‌ব ১—৪ ড্রাম্‌ ...	ঐ
বাইনম্‌ বিয়াই	ওয়াইন রবার্‌ব ১—২ ড্রাম্‌ ...	ঐ
সেনা	সেনা ১০—২০ গ্রোন : ব্লিষ্টেচক । ইহাব কার্য কিছু উত্তেজক, শোমিত দ্রব্যী কার্য করে, বায়ুনাশক, ওষুধ গৃহীত ব্যবহার্য অগ্নিলবন—জাবক, ক্ষুব্ধ কার্বনেটে,	...

বিবেচক বা কেথেটিস ।

৭০৭

ল্যাটিন নাম ।

ইংরাজী নাম ।

মাত্রা ।

গুণব্য ।

চুগেব জল, সীস, রৌপ্য এবং তাম্রখটিত লবণ, কয়েকটিব
সবলিমেট, টাটাৰ এমেটিক পীত সিন্কেলা বালক ।

কন্ফেকসিয়ে সেনি . কন্ফেকসন্ অফ সেনা ৬০ গ্রেঃ—৩ ড্রাম . . .

ইন্ফিউজন্ সেনি . . . ইন্ফিউজন্ অফ সেনা ১ ২ আং . . .

সিবপ্ সেনি . . . সিবপ্ অফ সেনা শৈশবাবস্থায় ১—২ ড্রাম,
বিশেষার্থ প্রয়োজ্য . . .

টি'চু'বা সেনি . . . টিং অফ সেনা . . . ১—৪ ড্রাম . . .

মিস্চ'বা সেনি . . . ক্রম্পী ও মিক্চ'ব . . .

কম্পজিটম্ . . . অফ সেনা . . . ১—২ আং . . .

এলোজ . . . এলোজ . . . ৩—৫ গ্রেঃ . . .

উত্তেজক, বিবেচক, বলকাবক, পিত্তনিঃসারক, রক্তনিঃসারক ।

এনিমা এলোজ . . . এনিমা অফ এলোজ . . . ৭ . . .

একফ্টাষ্টম এলোজ . . . একফ্টাষ্ট অফ . . .

বার্বেডেন্সিস্ . . . বার্বেডোজ এলোজ . . . ২—৩ গ্রেঃ . . .

পাইলুলা এলোজ . . . পিল্ অফ . . .

বার্বেডেন্সিস্ . . . বার্বেডোজ এলোজ . . . ৫—১০ গ্রেঃ . . .

পাইলুলা . . . পিল্ অফ এলোজ . . .

এলোডেট ফেবি . . . এণ্ড আয়বণ . . . ৫—১০ গ্রেঃ . . .

ডিক্টাম্ এলোজ . . . ক্রম্পী ও ডিক্ফিডন্ . . .

কম্পজিটম্ . . . অফ এলোজ . . . ২—২ আং . . .

একফ্টাষ্টম্ . . . একফ্টাষ্ট অফ . . .

এলোজ স্কটাইনি . . . স্কটাইনি এলোজ . . . ২—৬ গ্রেঃ . . .

পাইলুলা এলোজ . . . পিল্ অফ স্কটাইনি . . .

স্কটাইনি . . . এলোজ . . . ৫—১০ গ্রেঃ . . .

পাইলুলা এলোজ . . . পিল্ অফ এলোজ . . .

লাটিন নাম . ইংরাজী নাম । মাত্রা । মন্তব্য ।

এট-আসাফিডিড .. এও আসাফিডিড . ১০—২০ গ্রেঃ ...

পাইলুলা এসো-

জেট মর্চি ... এলোজ এও মার্চ পিল ৫—১০ গ্রেঃ . . .

টিংচুবা এলোজ ... টীং অফ্ এলোজ . ২—৩ ড্রাম .

ধাইনম্ এলোজ . ওয়াইন অফ্ এলোজ ১—২ ড্রাম .

কলসিহিডিড পলপা . কলসিহিড পলপা . ২—১০ গ্রেঃ .

বিলেচক, অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া কবে, অল্প মাত্রায় মূত্রকাবক ।

একফ্রাক্টম্ কলসিহি- . কলোও একফ্রাক্ট .

ডিড্ কম্পজিটম্ . অফ্ কলসিহি . ৫—১০ গ্রেঃ .

পাইলুলা কলসিহিডিড পিল অফ্ কলসিহি .

এট-হাযোমায়েরমাই . এও হাযোমায়েরমাম্ . ৫—১০ গ্রেঃ . . .

ম্যানা . ম্যানা ৬০ গ্রেঃ —১ আং .

ম্যাগ্নেসিয়া . ম্যাগ্নেসিয়া ১০—৬০ গ্রেঃ .

অগ্নিশক, বমন নিবাবক . অসম্মিলন—অগ্নাধিক, লবণ, ফটকিবি, ধাতুঘাটিত লবণ নিষাদল ।

ম্যাগ্নেসি কার্বনাস . কার্বনেট অফ্ ম্যাগ্নেসিয়া ১০—৬০ গ্রেঃ .

লাইকব ম্যাগ্নেসি কার্বনেটিড . অফ্ কার্বনেট অফ্ ম্যাগ্নেসিয়া . ১—২ আং .

ম্যাগ্নেসি সলফাস . সলফেট অফ্ ম্যাগ্নেসিয়া . ৬০ গ্রেঃ —১ আং .

এনিমী ম্যাগ্নেসি . এনিমী অফ্ সলফেট .

ল্যাটিন নাম। ইংরাজী নাম। মাত্রা। মন্তব্য।

সল্ফেটস্ ... অফ্ ম্যাগনেসিয়া ... ১৫—৬০ গ্রেঃ বিবেচক, শৈত্যকাবক

পটাসি সল্ফাস্ এসিড টার্ট্রি অফ পটাস ২০—৬০ গ্রেঃ বিবেচক, অল্প মাত্রায় শৈত্য ও মূত্রকারক

পটাসি টার্ট্রিস্ টার্ট্রেট অফ পটাস ... বিবেচনার্থ ২—৪ ড্রাম, মূত্র-
করণার্থ ৬০—১২০ গ্রেঃ ... মূত্র বিবেচক সদি। সর্বদা ব্যবহার হয়।

শোডি ফস্ফাস্ ... ফস্ফেট অফ শোডা ১—১ আং . বিবেচক,
সল্ফেট অফ ম্যাগনেসিয়া ও সোডার স্থায়ী কার্য করে, বিকট-
স্বাদ নহে, এজন্য বালকদিগেব ও দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য ব্যব-
হৃত হয়। প্রত্যবে ইউরিক অ্যাসিড জন্মিলে ব্যবহার করা যায়।

শোডা টার্ট্রেট . টার্ট্রেটেড শোডা ... ১—২ আং . বিবেচক,
মূত্রকারক।

প্রেন্স ... প্রেন্স ... মূত্র বিবেচক।

ক্যাসিয়া ... ক্যাসিয়া ... ১০ গ্রেঃ—১ আং . মূত্র
বিবেচক।

পাউফিলাই ... পাউফিলম্ ... ১—১০—২০ গ্রেঃ

পাউফিলাই বেজিনা ... বেজিন অফ
পাউফিলম্ ... ১ গ্রেঃ . বিবেচক, পিত্ত-
নিঃসারক ও পরিবর্তক।

বেলা ... বেলা ... ১—৪ ড্রাম ... বিবেচক,
সংকোচক।

একফ্রাটম বেলী ... একফ্রাটম
লিকুইডম্ ... অফ বেল ... ১—৪ ড্রাম

লাটিন নাম। ইংরাজী নাম। মাত্রা। মন্তব্য।

ফেইক্‌স্ ফিগ্ ... যুগ্ম বিবেচক
ওলিয়ম্ ক্রোটন
ক্রোটনিস্ অইল ১—২ মিঃ ... অত্যন্ত
বিবেচক, বাহ্য প্রয়োগে উগ্রতাসাধক।

বমনকারক বা এমোউক্স।

ইপেকাকুয়ানা . ইপিঁকাকুয়ানা . কফনিঃসারক . ১—২ গ্রেঃ,
বমনকারক . ১৫—৩০ . গ্রেঃ ... কফ-
নিঃসারক, শ্বেদজনক, বমনকারক, পিত্ত-
নিঃসারক, বজঃনিঃসারক, বিবেচক

পল্‌বিস্ ইপেকাকুয়ানা কল্পোও, পোঁডব তফ
কল্পজিটস্ . ইপেকাকুয়ানা
টোচিসাই ইপেকাকুয়ান
কাকুয়ানী ... লোজেঞ্জেন্স ... ১—৩ চাক্তি ...

বাইনম্ ইপেকাকুয়ানী ... ওয়াইন অফ ইপেকাকুয়ান . বমন-
করণার্থ ২—৪ ড্রাম বাগফেব পক্ষে ১—২ ড্রাম, কফনিঃসারণ
এবং শ্বেদজননার্থ ১০—৩০ মিঃ, শৈলদ্রব্যস্থায় ২—৩ মিঃ।

সিনেপিস্ . মর্ফোর্ড ... বমনকারক,
আগ্নেয়, মুত্রকারক, উত্তেজক, বাহ্য ব্যবহারে উগ্রতাসাধক, ফোস্ফোরিক।

কাটাপ্লাজমা মর্ফোর্ড
সিনেপিস্ পুলটিস্ ...

ওলিয়ম্ সিনেপিস্ . অইল অফ মর্ফোর্ড

লিনিমেন্ট সিনেপিস্ কল্পোও লিনিমেন্ট
কল্পজিটস্ . অফ মর্ফোর্ড

লাটিন নাম। ইংরাজী-নাম। মাত্রা। মন্তব্য।

কুজিন্সাই সলফাস্ ... সলফেট অফ জিঙ্ক ... সলফোয়াল
ব্রিসমথ ... বলকাবক ঔষধ শ্রেণীতে দেখা

কুপ্রাই সলফাস্ ... সলফেট অফ কপার ... বলকাবক শ্রেণীতে দেখা

এন্টিমোনিয়ম্ ... টার্টাবেটেড্ ...
টার্টাবেটম ... এন্টিমনি ... অবসাদক শ্রেণীতে দেখা।

মূত্রকারক বা ডাইউরেটিক্স।

ক্যান্থারিবিম্ ... ক্যান্থারিডিজ ... ২-২ গ্রোঃ ... মূত্রকারক,
উত্তেজক, অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে প্রবল বিষক্রিয়া করে এবং
মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে, বাহ্য ব্যবহারে দাহক, ফোঁদাকাবক।

এম্প্লাষ্টম্ ক্যান্থারিডিজ ... ক্যান্থারিডিজ প্লাস্টার ... ১-২ গ্রোঃ

এম্প্লাষ্টম্ ক্যালিকেসিয়েন্স ... ওয়ারম্ প্লাস্টার ... ১-২ গ্রোঃ

লাইকরু এপিঅ্যাক্টিকা ... লিকুরিৎ লিকুইড ... ১-২ গ্রোঃ

টিংচুরা ... টীং অফ ... ১-২ গ্রোঃ

ক্যান্থারিডিজ ... ক্যান্থারিডিজ ... ১-২ গ্রোঃ

অক্সুয়েটেম্ ... অক্সুয়েটে অফ ... ১-২ গ্রোঃ

ক্যান্থারিডিজ ... ক্যান্থারিডিজ ... ১-২ গ্রোঃ

এসিটম্ ক্যান্থারিডিজ ... বিনিগার্ড অফ ক্যান্থারিডিজ ... ১-২ গ্রোঃ

চার্টা এপিঅ্যাক্টিকা ... লিকুরিৎ পের্পার ... ১-২ গ্রোঃ

সিলা ... স্কুইল ... ১-২ গ্রোঃ ... মূত্রকারক, বমনকারক,

উত্তেজক, কফনিঃসৃতক, অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া

করে, এমন কি ২০ গ্রেণ খাইয়া মৃত্যু হইয়াছে।

এসিটম্ সিলা ... বিনিগার্ড অফ স্কুইল ... ১-২ গ্রোঃ

লাটিন নাম । ইংরাজী নাম । মাত্রা । মন্তব্য ।

পাইলুসানসিলি কল জিটা .	কম্পোণ্ড স্কুইল পিল	৫—১০ গ্রেঃ .	ঐ
সিবস সিলি .	সিবস অফ স্কুইল .	১—১ ড্রাম .	ঐ
টিংচুবা সিলি .	টিং অফ স্কুইল .	১০—৩০ মিঃ .	ঐ
অকজিমেল সিলি .	অকজিমেল অফ স্কুইল .	১—১ ড্রাম .	ঐ
কোপেবা .	কোপেবা .	১—১ ড্রাম .	মূত্রকাবক, উত্তেজক, অধিক মাত্রায় অস্ত্র-গোলমাল উপস্থিত কবে, গনোবিষাব মহোষধি।
ওলিয়ম কোপেবা .	অইল অফ কোপেবা .	৫—৩০ মিঃ .	ঐ
ওলিয়ম জুনিপারাই .	অইল অফ জুনিপার .	১—৫ মিঃ .	উত্তে- জক, মূত্রকারক।
স্পিরিটস্ স্পিষিট অফ .	জুনিপারাই .	৩০ মিঃ—১ ড্রাম .	ঐ
বুক ফোলিয়া .	বুক লীব্‌স্ .	২০—৪০ গ্রেঃ .	মূত্রকাবক, স্বর্ণকারক, উত্তেজক, আশ্বেষ, বলকাবক, বাঘনাশক।
ইনফিউজম বুক .	ইনফিউজন্ অফ বুক .	১—২ আং .	ঐ
টিংচুবা বুক .	টিং অফ বুক .	১—৪ ড্রাম .	ঐ
স্পিরিটস্ ইথরিস্ .	স্পিষিট অফ .	১—২ ড্রাম .	উত্তে- জক, মূত্রকারক, স্বর্ণকারক, শোভ্যকারক।
নাইট্রোমাই .	নাইট্রাস ইথর .	১—২ ড্রাম .	উত্তে- জক, মূত্রকারক, স্বর্ণকারক, শোভ্যকারক।
পেবেবি বেডিকা .	পেবেবা কট .	৩০—৬০ গ্রেঃ .	বল- কাবক, মূত্রকারক।
ডিক্টাম পেবেবি .	ডিক্টামিস্ .	১—২ অং .	ঐ
একফ্রাক্টম .	একফ্রাক্ট অফ .	১—২ অং .	ঐ
পেরুরি .	পেরেবা .	১০—২০ গ্রেঃ .	ঐ
একফ্রাক্টমপেবেবি .	লিকুইড একফ্রাক্ট .		

লাটিন নাম ।	ইংরাজী নাম	মাত্রা ।	গুণাবলি ।
বিকুইডম্	অফ পোবেরা	১—২ ড্রাম	ঐ
পটাসি	এমিটেট্		
এমিটাস্	অফ পটাস্	১০—৬০ গ্রেঃ	মুক্তকারক, ঘর্মকারক, শৈত্যকারক, কাহারও কাহারও মতে বিরোধক ।
এমোনি বেন-	বেনজোয়েট		
জোয়াম্	অফ এমোনিয়া	১০—২০ গ্রেঃ	মুক্তকারক, মূত্রাশয়ের পূবাজন প্রদাহ ও প্রস্রাবে ফস্ফেট জমিলে বিলক্ষণ উপকারী ।
এমোনি ফস্ফাস্	ফস্ফেট অফ এমোনিয়া	৫—১০ গ্রেঃ	উত্তেজক, মুক্তকারক, ইউরিক এসিড বশান্তঃ, গাঁউট, বিউগা টিজম্ ইত্যাদি বোগে বিলক্ষণ উপকারী ।
আমোরেসি বেডিকা	হস্ বাডিস্ স্ট		মুক্তকারক, উত্তেজক, ঘর্মকারক, জালা নিঃসারক ।
স্পিরিটস্ আমোরেসি	কম্পৌণ্ড স্পিরিটস্		
কম্পজিটস্	অফ হস্ বাডিস্	১—২ ড্রাম	ঐ
ডিজিটেলিস্	ডিজিটেলিস্		দায়বীয় অবসাদক ঔষধ শ্রেনীতে বর্ণিত হইয়াছে ।
পটাসি নাইট্রেস্	নাইট্রেট অফ পটাস্		ধামনিক অবসাদক ঔষধ শ্রেনীতে দেখ ।
ওলিয়াম্ টেবেবিহিনি	অয়েল অফ টর্পেটাইন্		ধামনিক উত্তেজক ঔষধ শ্রেনীতে বর্ণিত হইয়াছে ।
পটাসি টার্টাস্	এসিড টার্টেট্		
এসিডা	অফ পটাস্		বিরোধক ঔষধ শ্রেনীতে দেখ ।

কক্ষনিঃসারক বা এক্সপেক্টোরেন্টস্ ।

লাটিন নাম ।	ইংরাজী নাম ।	মাত্রা ।	মন্তব্য ।
ক্রিয়েজোটা	ক্রিয়েজোট • ১—৩ গ্রিঃ	কক্ষ নিঃসারক, সংকোচক, বক্ষ বোধক, পাতন নিবাহক, শ্বাসকাবক, বমন নিবাহক, অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া করে ।	
মিস্চুরা ক্রিয়েজোটাই	ক্রিয়েজোটি মিকস্চব • ২ আং	ঐ	
অক্সুয়েটেস্	অইন্টেমেট্ট অফ		
ক্রিয়েজোটাই	ক্রিয়েজোট • • • •	ঐ	
বেপার নিয়েজোটাই	ইন্টেলিমেন্স অফ ক্রিয়েজোট • • •	ঐ	
গিফা লিকুইডা • • •	টাব • • •	কক্ষনিঃসারক, উত্তেজক, শ্বাসকাবক, দুর্গন্ধহাবক	
অক্সুয়েটেস্ পাইগিস্	অইন্টেমেট্ট		
লিকুইডি • • •	অফ টাব • • •	ঐ	
বেনজোইন • • •	বেনজোইন • • •	১০—২০ গ্রেঃ • • •	কক্ষ- নিঃসারক, উত্তেজক
টিংচুরা বেনজোইনাই	ক্যাম্পো ৩ টিঃ অফ		
ক্যাম্পোজিটা • • •	বেনজোইন • • •	২—২০ ড্রাম	ঐ
এসিডম্ বেনজোইকম্	বেনজোইক এসিড • • •	ঐ	
এডেপ্স বেনজোয়েটম্	বেনজোয়েটেড লার্ড • • •	ঐ	
স্টাইব'স	স্টোমাক • • •	৫—২০ গ্রেঃ • • •	উত্তেজক, কক্ষনিঃসারক ।
সেনিগি বেডিকা • • •	সেনেগা রট • • •	১০—৩০ গ্রেঃ • • •	কক্ষ- নিঃসারক, উত্তেজক, শ্বাসকাবক ।
ইন্ফিউজম্ সেনেগি • • •	ইন্ফিউজন্ সেনেগা • • •	১—২ আং	ঐ

ককশিঃসারক, বা একাপেক্টোরেটম্ । ৭১৫

ল।টিন নাম । ইংরাজী নাম মস্ত।। গীতব্য ।

টিংচুবা সেনেগি . . . টীং অফ সেনেগা . . . ২-২ ড্রাম . . . ঐ
বাল্‌সেম্‌ পিক বিধানম . . . বাল্‌সেম্‌ অফ পিক ১০-৩০ মিঃ উত্তে-
জক, কক, নিঃসারক ।

বাল্‌সেম্‌ টোলুটেম্ . . . বাল্‌সেম্‌ অফ টোলু . . . উত্তেজক, কক-
নিঃসারক প্রদাহিক লক্ষণ থাকিলে অবিধেয়

সিবস্‌ টোলুটেম্ . . . সিবস্‌ অফ টোলু . . . ২-২ ড্রাম . . . ঐ

টিংচুবা টোলুটেম্ . . . টীং অফ টোলু . . . ২-১ ড্রাম . . . ঐ

টেবেরেহিনা কানে- কানেডা . . .
ডেন্সিগ . . . বাল্‌সেম্ . . . ১০-৩০ গ্রোঃ . . . জাব-
পিন্‌ তৈলের ছায় জিয়া

পিঙ্গ বর্গতিকা . . . বর্গতিকা পিচ . . .

অম্‌ জামেবিকানম্ . . . কমন্‌ ফ্রাঙ্কিন্‌ সেন্স . . .

এন্টিমোনিয়ম্‌ টার্টারেটেড টার্টারেটেড এন্টিমনি . . . খাদ্যনিক
উষধ শ্রেণীতে দেখ।

লোবিলিয়া . . . লোবিলিয়া . . . খাদ্যনীয় অব-
সাদক . . . উষধ শ্রেণীতে দেখ।

ইপেকাকুয়ানা . . . ইপেকাকুয়ানা . . . বমনকারক
উষধ শ্রেণীতে দেখ।

মিলা . . . কুইল . . . মুত্রকারক উষধ শ্রেণীতে দেখ।

... নিক্ষেপকারক বা ডিম্বলসেণ্টস্ ।



লাটিন নাম ... ইংরাজী নাম । ... মাত্রা । ... মন্তব্য ।

লোক ... মিল্ক নিক্ষেপকারক, পোষক ।

গ্যাকেলিস্ লাক্টিস্ অগাব অফ মিল্ক নিক্ষেপকারক

ওবম্ এগ্ ... কবোসিভ সর্বিমেট ও ভাস্কের লবণাদি
যেমন তুতিয়া ইত্যাদি ও অগাথ প্রাচীনক বিষক্রিয়া দ্বারা
বিষাক্ত হইলে ইহা বিষম ও নিক্ষেপকারক বলিয়া ব্যবহৃত হয় ।

মেল্ল হনি নিক্ষেপকারক, স্নায়ু বিবেচক

গ্লাইসিরিজ বেড়িক্স লিকরীম্ রুট নিক্ষেপকারক,
নিখিলকারক, সর্দিতে ব্যনহৃত হয়

একক্সট্রাক্টম্ একক্সট্রাক্ট অফ
গ্লাইসিরিজ লিকবীম্ ৫—৩০ গ্রোঃ ঐ

গ্লাইসবাইনম্ গ্লাইসবীম্ ১—২ ড্রাম নিক্ষেপ ও আর্জ-
কারক ।

এক্সেসিয়া গমাই গম্ এক্সেসিয়া কাশ রোগে অত্যন্ত উপকারী

মিউসিলেগো মিউসিলেজ অফ

এক্সেসি গম্ এক্সেসিয়া

ট্রাগাকাঙ্ঘা ট্রাগেকাঙ্ঘা ইহার ক্রিয়া আববি
গদের প্রায় ।

মিউসিলেগা মিউসিলেজ অফ

ট্রাগেকাঙ্ঘা ট্রাগেকাঙ্ঘা ১—২ আঙ্গু ঐ

পলবিম্ ট্রাগেকাঙ্ঘা কলো ও পোডার

কম্পজিইম্ অফ ট্রাগেকাঙ্ঘা ১—৬০ গ্রোঃ ঐ

শ্লিষ্টকাবক বা ডিমল্‌সেণ্টস্ । ৭১৭

লার্টিন গাম ।	ইংরাজী নাম ,	মাত্রা	মন্তব্য ।
ওলিয়ম্ অলিবি . .	অলিব অইল্ . . .	শ্লিষ্টকাবক, বিরুদ্ধক ।	
ওলিয়ম্ ঘিযোত্রমি .	অইল অফ ঘিযোত্রমা . . .	শ্লিষ্টকাবক	
লিনাই সেমিনা .	লিন্সীড্ .	শ্লিষ্ট ও আর্জকাবক, বিবিধ	
	কতে ও উদবাময় বোণে ব্যবহৃত হয়		
ইন্‌ফিউজম্ . . .	ইন্‌ফিউজন্ অফ .		
লিনাই . . .	লীন্‌সিড্ . . .	যথেষ্টক্রমে প্রযোজ্য . . .	ঐ
ক্যাটপ্লাজমা লিনাই .	লিন্সীড্ পুলটিস্ . . .		ঐ
ওলিয়ম্ লিনাই .	অইল অফ লিন্সীড্ . . .		ঐ
ইউবি . . .	রেজিনম্ . . .	অপ্পা শ্লিষ্টকাবক, পোষক	
মোরাইসকম্ . . .	মল্‌বেরি জুস্ . . .	শ্লিষ্টকাবক	
সিবপ্স মোরাই . .	সিরফ অফ মল্‌বেরি . . .		ঐ
সিট্রোরিয়া .	আইসলও য়স্ . . .	শ্লিষ্টকাবক, বলকাবক . এবং	
		পোষক ।	
এমাইলম্ . . .	হাইট ফর্চ . . .	শ্লিষ্টকাবক, পোষক,	
		শোষক, আবরক	
মাইসরাইনম্ এমিলাই .	মিসবীন জফ টাচ . . .		ঐ
হর্ডিয়ম্ ডিক্‌টিক্টেম্ .	পবল্ বার্লী . . .	শ্লিষ্টকাবক পোষক	
ডিক্‌ক্টম্ হর্ডিয়ম্ .	ডিক্‌ক্সন্ অফ বার্লী . . .		ঐ
অলমাই কটেক্স . .	এলেম্ বার্ক . . .	শ্লিষ্ট-	
		কাবক, সংকোচক, বলকাবক	
ডিক্‌ক্টম্ . . .	ডিক্‌ক্সন্ অফ . . .		
অলমাই . . .	এলম্ বার্ক . . .	২—৪ আং . . .	ঐ
ম্যাংকেরম্ পিউরিফিকেটম্ . . .	রিফাইন্ড জুগার . . .	শ্লিষ্ট	
		কাবক, পোষক, শৈত্যকাবক	

ਲਾਟਿੰਨ ਨਾਮ ।

লাটিনি নাম । ইংরাজী নাম । মাত্র । সম্ভব ।

মাত্র ।

সম্ভব ।

सिद्धांत ... शिवप ...

যেবাইয়েকা টীকা শিখকাবক, অঙ্গ বিবেচক

এমিগ্‌ডেলিন-উল্‌সেস্ . স্ফাইট আমণ্ডস্ . পোষক, শিথকাবক ।

অলবিম্ এণ্ডিডেনি কন্সেপ্শনোভ

কম্পজিটস্ তিস্রা অাম ঞ্ণ

মিস্ট্রীবা এমিগা ডেলি. আমণ্ড মিক্সটব ১-২ আং.

ওলিয়ম্ এমিগ্‌ডেলি আগু আইল

ক্রিমিনাশক বা.এন্থেল মিণিটিক্স ।

স্যাটোনিকা ১০—৬০ প্রঃ মহীলতা
স্থায়ী ক্রিমিভাষক

কামাল। কামাল। ৩০ শ্রেণী—১ আং . ফিতাব ন্যায়
ক্রিমিতে সমূহ উপকার করে

কিসে কুসে ২-৩ ভাগে ফিতার আয়
জিমিতে উপকারী -

নৃসিং উজ্জ্বল বৃন্দে . . ইন্দ্র উজ্জ্বল অফ কুসে

গ্রানোটাই বেডিসিসু কটেক্স .: পোমগ্রানোট্ রুট বার্ক ঈষৎ
সঙ্কোচক ও জিগিন্দাশক ।

উকাক্তম্‌ এ্যানোটাই ডিকাক্সমন্‌ অফ
রুডিসিম্‌ পৌমএ্যানোট রুট ১-৩ আং ৭

কলিঙ্গ মামু মেলঘর্ণ জিমিনাশক,
ফিভার স্বায়ী জিমিতে উৎকানী

দাহক বা এক্সারটিভ।

৭১৯

লাটিন নাম।

ইংরাজী নাম।

মাত্রা।

সম্ভব।

একফ্রাক্টম্

লিকুইড একফ্রাক্ট

বিনিমিস্ লিকুইডম্

অফ মেলথর্গ ১৫ মিঃ--১ ড্রাম ই

দাহক বা এক্সারটিভ।

ক্যালব

হীট

পটাশ কফিক

কফিক পটাশ

জলশোষক,

প্রবল দাহক, কিন্তু প্রায় দাহকরূপে ব্যবহার হয় না।

হস্পিট্যাল গ্যাঙ্গ্রিন ইত্যাদি পচা ক্ষতে ব্যবহৃত হয়।

শোডা কফিক

কফিক শোডা

প্রায় কফিক

পটাশের মত, কিন্তু তদপেক্ষা মৃদু।

এসিডস কার্বলিকস

কার্বলিক এসিড

১-৩ গ্রেঃ

পুচন-নিবাহক, হৃগ্নহাবক, উত্তেজক, বায়ুনাশক,

বগননিবারক, দাহক, স্থানিক উত্তেজা সৃধক।

পটাশি পরম্যান গানম্

পারম্যান গেনেট

অফ পটাশ

দাহক, হৃগ্নক-

হাবক, পুচননিবাহক, পরিবর্তক।

গ্লাইসেরীইনম্

গ্লিসেরীন্ অফ

এসিডাই কার্বলিগাই

কার্বলিক এসিড

লালানিঃসারক বা স্যায়েলোগ্নম্

পাইবিথ্রাই ডিডিক্স

পেলিটরি রুট

লালানিঃ

সারক, স্থানিক উত্তেজা সৃধক।

লাটিন নাম । ইংরাজী নাম । মাত্র । মন্তব্য ।

টিংচুবা পাইরিথাই টিং অফ পোলিটবি

গন্ধদ্রব্য বা এরোগাটিক্স ।

কার্ডেমোমম্ কার্ডেমগন্ আম্রৈয়, উত্তেজক,
বাগুনাম্বিক

টিংচুৱা কার্ডেমোগাই কম্পোণ্ড টিং
কম্পজিট। অফ কার্ডে মম্ . . . ১—২ ড্রাম . . . ঐ

ক্যাবিওফাইলম্ ক্লব্‌স্ . . . ৫—২০ গ্রেঃ . . . অজীর্ণ ও উদার-
ধ্মানে বিশেষ উপকাৰী ।

ইন্‌ফিউজম্ ইন্‌ফিউজন্
ক্যাবিওফাইলি অফ ক্লব্‌স্ . . . ১—২ আং . . . ঐ

ওলিয়ম্ ক্যাবিওফাইলি অইল অফ ক্লব্‌স্ . . . ১—৫ মিঃ . . . ঐ

সিনেমোগাই কটেজ সিনেমন্ বার্ক . . . ৫—২০ গ্রেঃ . . . অম্পা
সংকোচক ।

একোফী সিনেমোগাই সিনেমন্ ওয়াটার . . . ১—২ আং . . . ঐ

টিংচুৱা সিনেমোগাই . . . টিং অফ সিনেমন্ ১—২ ড্রাম . . . ঐ

পল্‌বিস্ সিনেমোগাই . . . কম্পোণ্ড পৌডর . . .

অর্কসিনেমন্ . . . ১—৩০ গ্রেঃ . . . ঐ

ওলিয়ম্ সিনেমোগাই . . . অইল অফ সিনেমন্ . . . ১—৫ মিঃ . . . ঐ

কিউবেবা . . . কিউবেবস্ . . . ২০—১২০ গ্রেঃ . . . ঐ

বিল্লীর উত্তেজক—বিশেষতঃ মূত্রমজ্জের

ওলিয়ম্ কিউবেবা . . . অইল অফ কিউবেবস্ . . . ৫—১৫ মিঃ . . . ঐ

টিংচুৱা কিউবেবা . . . টিং অফ কিউবেবস্ . . . ১—২ ড্রাম . . . ঐ

ল টিন নাম ইংরাজী নাম : মাল । মন্তব্য ।

কোবিয়াওই ফুটম্ কোবিয়াওব ফুট ৩০—৬০ গ্রেঃ আশ্বেষ, উত্তেজক, বায়ুনাশক ।

ওলিয়ম্ কোবিয়াওই অইল অফ কোবিয়াওম্ ১—৫ মিঃ ... এই কার্ভই ফুটম্ . ক্যাবাওয়ে ফুট ১০—৬০ গ্রেঃ আশ্বেষ উত্তেজক, বায়ুনাশক ।

একোয়া কার্ভই . ক্যাবাওয়ে এয়াটাব ১—২ আং . এই ওলিয়ম্ কার্ভই . অইল অফ ক্যাবাওয়ে ১—৫ মিঃ . এই

ফক্স . কচিনীল ... আশ্বেষ, উত্তেজক, বায়ুনাশক ।

টিংচুবা ফক্সাই . টিং অফ কচিনীল . . . এই

এনিসাই ফুটম্ . এনিসীড্ . ১০—৬০ গ্রেঃ . . . আশ্বেষ, উত্তেজক, বায়ুনাশক ।

এসেন্সিয়া এনিসাই . এসেন্স অফ এনিস ১০—২০০ মিঃ . . এই

ওলিয়ম্ এনিসাই অইল অফ এনিসীড্ . ১—৫ মিঃ . এই

মাইরিটিকা . নটমেগ ৫—২০ গ্রেঃ . . . আশ্বেষ, নিবাবক অধিক, মীতায় মাদক ।

ওলিয়ম্ মাইরিটিসি . বালটাইল অয়েল অফ নটমেগ . ১—৫ মিঃ . এই

ওলিয়ম্ মাইরিটিসি . এক্সেসড অইল অফ নটমেগ . ১—৫ মিঃ . এই

স্পিবিটম্ মাইরিটিসি . স্পিবিট অফ নটমেগ . ১০—৬০ মিঃ . . এই

পাইপার নাইট্রাম্ . ব্ল্যাক পোপ্পা ৫—২০ গ্রেঃ . অশ্ব-বোগে ভালু নিখিলতায় বিশেষ উপকারী ।

কন্ফেক্সিয়ো পাইপারিস . কন্ফেক্সিয়ন্ অফ পোপ্পা . ৩ গ্রেঃ . . এই

সিমোনিম্ কটেজ . লেমন শিল . . . আশ্বেষ, উত্তেজক, . . .

লাটিন নাম ইংরাজী নাম মাত্রা মন্তব্য

টিংচুয়া লিমেনিস্ টীং অফ লেমন্ পীন্ ...১—২ ড্রাম ... ঐ

ওলিয়ম্ লিমেনিস্ আইজ অফ লেমন্ ... ১—৫ মিঃ ... ঐ

অব্যাসিয়াই কটেক্স অবোজ পিল্ ... আশ্বেষ, উত্তে-
জক, বায়ুনাশক।

ইনফিউজম্ অব্যাসিয়াই ইনফিউজন্ অফ অকোজ ... ১—২ আং ... ঐ

ইনফিউজম্ অব্যাসিয়াই কম্পোণ্ড ইনফিউজন্ কম্পজিটম্ অফ অবোজ পিল্ ... ১—২ আং ... ঐ

সিবপ্স অব্যাসিয়াই সিবপ অফ অবোজ পীন্ ... ২ ড্রাম ... ঐ

টিংচুয়া অব্যাসিয়াই টীং অফ অবোজ পিল্ ... ১—২ ড্রাম ... ঐ

একোয়া অব্যাসিয়াই ফৌবিস্ অবোজ ফৌয়াব ওয়াটাভ ... ১—২ আং ... ঐ

সিবপ্স অব্যাসিয়াই ফৌবিস্ সিবপ অফ অবোজ ফৌয়াব ... ১—২ আং ... ঐ

ম্যাটিসি ফোলিয়া ম্যাটিকো লীব্ বাহ্য ব্যবহারে
বৃদ্ধবোধক, জলোকা দংশন স্থলোব বৃদ্ধি বোধ কবে

ইনফিউজম্ ম্যাটিসি ইনফিউজন্ অফ ম্যাটিকো ... ১—২ আং ... ঐ

পাইমেটো পাইমেটো ১০—৩০ গ্রেস আশ্বেষ, উত্তেজক, বায়ুনাশক।

একোয়া পাইমেটো পাইমেটো ওয়াটাভ ... ১—২ আং ... ঐ

ওলিয়ম্ পাইমেটো আইল্ অফ পাইমেটো ... ১—৫ মিঃ ... ঐ

লাটিন নাম ইংরাজী নাম । মাত্রা । গুণব্যা ।

ফেনিকিউলাই ফুটুস্ . ফেনেল ফুটু . . . উত্তেজক, আশ্লেষ,
বায়ুনাশক ।

একোয়া ফেনিকিউলাই . . . ফেনেল ওয়াটাৰ . . . ১—২ আং . . . ঐ

মেছা পিপবিটা . . . পেপবমিটে . . . আশ্লেষ, উত্তেজক,
বায়ুনাশক, আক্ষেপনিবাহক

ওলিয়ম্ মেছি পিপবিটা . . . অইল অফ পেপবমিটে . . . ২—৫ মিঃ . . . ঐ

স্পিবিটস্ মেছি পিপবিটা . . . স্পিবিট অফ
পেপবমিটে . . . ২—৬ মিঃ . . . ঐ

একোয়া মেছি পিপবিট . . . পেপবমিটে ওয়াটাৰ . . . ১—২ আং . . . ঐ

এসেন্সিয় মেছি পিপবিটা . . . এসেন্স অফ . . .
পেপবমিটে . . . ১—২ আং . . . ঐ

মেছা বিবিডিস্ . . . স্পিযবমিটে . . . উত্তেজক, আশ্লেষ,
বায়ুনাশক ।

ওলিয়ম্ মেছি বিবিডিস্ . . . অইল অফ স্পিযবমিটে . . . ১—৫ মিঃ . . . ঐ

একোয়া মেছি বিবিডিস্ . . . স্পিযবমিটে ওয়াটাৰ . . . ১—২ আং . . . ঐ

জিঞ্জিব . . . জিঞ্জিব . . . ১০—২০ গ্রেঃ . . . আশ্লেষ, উত্তেজক,
বায়ুনাশক

টিংচুয়া জিঞ্জিবিস্ . . . ফুটু টাং অফ
জিঞ্জিব . . . ৫—২০ মিঃ . . . ঐ

টিংচুয়া জিঞ্জিবিস্ . . . টাং অফ জিঞ্জিব . . . ১—১ ড্রম . . . ঐ

সিবপ্স জিঞ্জিবিস্ . . . সিবপ্স অফ জিঞ্জিব . . . ১—১ ড্রম . . . ঐ

এনিথাই ফুটুস্ . . . ডিলুফুট . . . ১০—৬০ গ্রেঃ . . . উত্তেজক, আশ্লেষ,
বায়ুনাশক

ওলিয়ম্ এনিথাই . . . অইল অফ ডিলু . . . ১—৫ মিঃ . . . ঐ

একোয়া এনিথাই . . . ডিলু ওয়াটাৰ . . . ১—২ আং . . . ঐ


লাটিন নাম । ইংরাজী নাম । মাত্রা । মন্তব্য ।

ল্যাংগুইউলা . . . ল্যাংবেওব আগ্নেয়, উত্তেজক,
বায়ুনাশক, আক্ষেপ নিবারক
ওলিয়ম্ ল্যাংগুইউলি . . . ল্যাংবেওব . . . ১—৫ মিঃ . . . ঐ
স্পিরিটম্ ল্যাংগুইউলা . . . স্পিরিট অফ ল্যাংবেওব . . . ৩০—৬০ মিঃ . . . ঐ
টিংচুয়া ল্যাংবেওউলি . . . কুম্পৌ ও টীং অফ
কম্পজিটা ল্যাংবেওব . . . ১—২ ড্রাম . . . ঐ
বোজ্ ম্যাংবিনিস্ বোজ্ মেরি আগ্নেয়, বায়ুনাশক,
উত্তেজক ।

ওলিয়ম্ বোজ্ ম্যাংবিনিস্ . . . অইল অফ বোজ্ ম্যাংবিনিস্ . . . ১—৫ মিঃ . . . ঐ
স্পিরিটম্ বোজ্ স্পিরিট অফ
ম্যাংবিনিস্ বোজ্ মেরি . . . ২০—৩০ মিঃ . . . ঐ
ওলিয়ম্ ক্যাজুপাটি . . . অইল অফ ক্যাজুপাট . . . ১—৫ মিঃ . . . উত্তে-
জক, বায়ুনাশক, আক্ষেপ নিবারক, স্বর্ণকারক ।

স্পিরিটম্ ক্যাজুপাটি . . . স্পিরিট অফ
ক্যাজুপাট ১০ মিঃ — ১ ড্রাম ঐ
ক্যানিলি আল্ট্রিকটেক্স . . . ক্যানিলা অলবা বার্ক উত্তেজক,
বায়ুনাশক, বিবেচক এবং বলকাবেক ঔষধ সহযোগে ব্যবহৃত হয়
কোঅ স্যাফ্রন্ উত্তেজক, বায়ুনাশক ।
টিংচুয়া ক্রোসাই টীং অফ স্যাফ্রন্ . . . ১—২ ড্রাম . . . ঐ

পিত্তনিঃসারক বা হোগলেগ্‌স্ ।



লাটিন নাম ইংরাজী নাম মাত্রা । মন্তব্য ।

ট্যারাক্সেসমাইণ্ডিক্স ড্যাণ্ডেলিয়ন্‌ রুট ... পিত্ত-
নিঃসারক, মূত্রকারক, পরিবর্তক অগ্নেয়,
বলকারক, ক্ষেদজনক, অম্পা বিবেচক

ডিক্টাম ডিক্টাম্‌ অফ
ট্যাবাক্সেসমাই ট্যারাক্সেসম ১—৪ আং ঐ


একট্রাক্টম্‌ একট্রাক্ট অফ
ট্যাবাক্সেসমাই ট্যাবাক্সেসম ১০ ৩০ গ্রোঁ ঐ

সক্স একট্রাক্ট অফ
ট্যাবাক্সেসমাই ট্যাবাক্সেসম ১—২ ড্রাম ঐ

ফেল্‌ববিনম্‌ পিউবিফায়েড
পিউবিফিকেন্টম্‌ অক্স রাইল ৫—১০ গ্রোঁ পিত্ত-

নিঃসারক, বলকারক, মূত্র বিরেচক, মূত্রকারক, ক্রিমিনাশক ।

রক্তোনিঃসারক বা এমিনগ্‌স্ ।



বোরাক্স বোরাক্স ১০—৬০ গ্রোঁ রক্তো-
নিঃসারক, জ্বরায়ু সঞ্চেচক, মূত্রকারক, শৈতীকারক

মেন্‌বোবোমিস্‌ বোরাক্স হমি ... ঐ

গাইসবাইনুম্‌ বোরেশিস্‌ গাইসবাইন অফ বোরাক্স ... ঐ

ওলিয়ম্‌ রিউটা অইন্‌ গম্‌ বিট ১—৫ মিঃ উত্তেজক, রক্তো-

৭২৬ . চিকিৎসা-তত্ত্ব বারিধি ।

লাটিন নাম ইংরাজী নাম । মাত্রা । গুণব্য ।

...	নিম্ন বক, আক্ষেপ নিবায়ক, বায়ুনাশক, বায়ু প্রসারণে উত্তেজিত সাধক এবং ফোঁসকাইক ।
সাবিনি ক্যাবিউমিন	সাবিনি টপস্ ... ৫—১০ গ্রেঃ . বজো- নিঃসারক, জ্বায়ু উত্তেজক, ক্রিমিনাশক ।
ওলিয়ম্ সেবাইনি	অইল অফ সাবিন্ ... ২—৫ মিঃ . ঐ
টংচুবা সেবাইনি ...	টীং অফ সাবিন্ ... ২—৫ ড্রাম . ঐ
গুগুয়েটম্ সেবাইনি	স্ট্রাবিন্ কংক্রেটমেট ঐ

ক্ষার ।

পটাশি কার্বনাশ	কার্বনেট অফ পটাশ্ ... ১০—৩০ গ্রেঃ . অম্ল- নাশক, শুষ্ককারক, ধাবক
পটাশি বাইকার্বনাশ	বাইকার্বনেট অফ পটাশ্ ... ১০—৬০ গ্রেঃ . অম্লনাশক, পরিবর্তক, মুএকাকারক ।
লাইকব পটাশি এফবেসেন্স	এফবেসিং সোল্যুশন অফ পটাশ্ ঐ
লাইকব শোডি	সোল্যুশন অফ শোডি ... ১০ মিঃ—১ ড্রাম . লাইকব পটাশি বুল্বা
শোডি কার্বনাশ	কার্বনেট অফ শোডি ... ১০—৩০ গ্রেঃ . ক্রিয়া কার্বনেট অফ পটাশে বুল্বা
শোডি কার্বনাশ এক্সিবেক্টা	ড্রাইডেড কার্বনেট অফ শোডি ... ৩—১০ গ্রেঃ ঐ
শোডি বাই কার্বনাশ	বাই কার্বনেট অফ শোডি ... ১০—৩০ গ্রেঃ . বাই কার্বনেট অফ পটাশে বুল্বা
লাইকব শোডি—	এফবেসিং সোল্যুশন—

ল্যাটিন নাম ইংরাজী নাম । মাত্রা মন্তব্য ।

এফবের্‌সেন্স	অফ শোডা	...	ঐ
শোডি মিট্রোটাইটম্	এফবের্‌সেন্ট মিট্রোট টেট্	...	ঐ
এফবের্‌সেন্স	অফ শোডা	৬০ গ্রোঃ আং	ঐ
ট্রোটিমাই শোডি	বাইকার্বনেট অফ	...	ঐ
বাইকার্বনেটিম্	শোডা লোজেঞ্জেন্স	১—৬ চাক্তি	ঐ
ক্যালসিম্ কার্বনাস্	কার্বনেট অফ লাইম্	২০—৬০ গ্রোঃ	অগ্নি- নাশক, ধাবক, শুদ্ধকাবেক
মিশ্চু বা ক্রিটি	চাক্ মিশ্চাব	১—২ আং	ঐ
পলুবিস্ ক্রিটি	এবোমীটিক	...	ঐ
এবোমীটিকুম্	পৌডব্ অফ চক্	১০—৬০ গ্রোঃ	ঐ
সেপো	সোপ্	৫—৩০ গ্রোঃ	অগ্নি- নাশক, স্নিগ্ধকাবেক, স্থানিক কোন উত্তেজনা একাশ করে না
লিনিমেন্ট সেপোনিম্	সোপ্ লিনিমেন্টে	...	ঐ
এম্প্লাস্টম্ সেপোনিম্	সোপ্ প্লাস্টব	...	ঐ
এম্প্লাস্টম্ মিবেটাই সেপোনিম্	সোপ মিবেটে প্লাস্টব	...	ঐ

সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় ।

অত্র গ্রন্থে আরও কয়েকটি সাঙ্কেতিক ব্যবহৃত

হইয়াছে যথা ;—

ডাং বা ডিল্	ফুলে	ডাইলিউটেড্ সুবিতে হইবে ।
ডেল্	পাশিবর্ডে	...
১—৫ ইত্যাদি	হইতে ৫ ইত্যাদি	...

য্যাশিডে জলমিশ্রণ-প্রণালী।—য্যাশিড মাত্রেই বড় উগ্র এজন্ম তীব্র অধ্বায় উহা ব্যবহৃত হয় না জল মিশ্রিত করিয়া ব্যবহৃত ক্রমে হয়, উহাদে সহিত জল মিশাইবার পদ্ধতি একরূপ নহে, অর্থাৎ সকল য্যাশিডেই যে সমান সমান পবিমা জল মিশাইতে হয় এমন নহে। ভিন্ন ভিন্ন য্যাশিডকে যেরূপে জল মিশাইয়া ব্যবহৃত ক্রমে হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

১ ড্রাম সল্ফিউরিক্‌ য্যাশিডে ১১ ০ ড্রাম জল।

১ ড্রাম নাইট্রিক্‌ য্যাশিডে ৬ ড্রাম জল

৩ ড্রাম নাইট্রিক্‌ য্যাশিড ৪ ড্রাম হাইড্রোক্লোরিক্‌ য্যাশিডে ২৫ ড্রাম জল (ইহাকে নাইট্রোমিউবিউট্রিক্‌ য্যাশিড কহে)

৪ ড্রাম হাইড্রোক্লোরিক্‌ য্যাশিডে ৩ ০ ড্রাম জল দিতে হইবে। তাহা হইলেই সেই সেই য্যাশিড ডাইলিউটেড্‌ হয়।

অন্যান্য য্যাশিড, গ্যাস্‌ (বাম্প) হইতে প্রস্তুত হয়, সুতরাং জল-মিশ্রণ ব্যতীত ব্যবহারযোগ্য হইতে পারে না। এ কাবন ঔষধ-প্রস্তুত-কাবকেরা জল মিশ্রিত করিয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত বাধেন।

উগ্র তরল ঔষধ সকল বিন্দু পবিমাণে ব্যবহার ক্রমে হয়, কিন্তু বিন্দু পবিমাণে স্থিরতা নাই। বোতল বা শিশির মুখেব পরিসর অনুসারে বিন্দু হোট বড় হইয়া থাকে ডাক্তারেরা যে মিনিম্‌ কণাটি ব্যবহার করেন, তাহার পবিমাণ স্থিরীকৃত হইয়াছে, এজন্য ঐ সকল ঔষধ ব্যবহার ক্রমে নিম্নলিখিত ক্রম অরণ রাখা কর্তব্য

পবিদ্রুত জলের	৪৫ বিন্দুতে	১ ড্রাম হয়।
লবণ জাবক	৫৪	ঐ
গন্ধক জাবক	৯০	ঐ
সুবা	১৩৮	ঐ
ইথাব	১৫০	ঐ
লডেমম্‌	১২০	ঐ
হাইড্রোমিয়েনিক্‌ য্যাশিড	৪৫	ঐ

খার্মামেটার্‌ ক তাপমাত্রা যন্ত্রের ব্যবহার।—

একটি কাচের নল বগলে দিয়া ভাঙারের পর দেখেন, তাহাকে “খার্মামেটার্‌” বা তাপমাত্রা যন্ত্র কহে। ঐ কাচের নলের নীচে পায়া থাকে। গ্যাসের তাপ লাগিলে ঐ পায়া উপরে উঠে। জ্বোতের পবিমাণ জানিবার জন্য উহা গ্যাসের শক্তিকণা দ্বারা থাকে; ঐ এক একটা

দ গকে অংশ বা ডিগ্রী বগে জীব-পবীক্ষাজাত ডাক্তাবেই হুই-পৰ্কাব
নল ব্যবহাৰ কৰেন তন্মধ্যে ছোট ডুলিতে ৯৩ অংশ হইতে ১১০
পর্যন্ত ১৬টি বড় দাগ থাকে, আৰ বড় ডুলিতে ৯০ হইতে ১১৫
পর্যন্ত ২১টি বড় দাগ থাকে আনুষ্ট ২টি বড় দাগেৰু মণিষ্টিটি
ছোট দ গ আছে ছোট দাগগুলি এক ডিগ্রীৰ পাঁচ ভাগেৰ একভাগ।
ভালরূপে গায়েব উতাপ আনিবাব জন্য উহাৰ গায়ে ছোট দাগগুলি
আঁক আছে এই ভাগেৰ মৈব মাগা ধাটীকে, অৰ্থাৎ যেদিকে পাবা
থাকে, সেই নীচেৰ দিক জানা বিশেষ দরকাৰ তাহ ন হইলে
মাগাৰ দিক বগীলৈদিলে কিছুই বুঝাইবে নুই কৈন স্থান পর্যন্ত পাবদ
উঠিয়াছে, তহা জানিবাব জিনু অলোকক ভাল কবিয়া দেখিবে, নচেৎ
দেখিও পাইয়া যাব না

তাপ যন্ত বোগীৰ বগলে দিয়া জীব পবীক্ষা কৰিতে হয় বোগীৰ বগলে
দিবাব পূৰ্বে তাপযন্তটীকে নাড়িবে তাহৰ পৰ নিজেব হাতে মুটোৰ
মধ্যে কিছুক্ষণ রাখিবে তোগাব গায়েব তাপ পাইয়া পাবা যখন ৯৫
অংশ পর্যন্ত উঠিলে, তখন বোগীৰ বগলে দিবে। বগলে যন্তটি এমনি
জুতববা কবিয়া রাখিবে যে, তাপযন্তেৰ গোড়াটী, অৰ্থাৎ যে স্থানে
পাবা আছে যেন সেই স্থানটী বগলেৰ মধ্যে থাকুক এবং স্থানচ্যুত না
হয় এইরূপে ১০ মিনিট বোগীৰ বগলে রাখিয়া কত ডিগ্রী পাবা
উঠিয়াছে তাহা ঠিক কবিবে, কাব বগল হইতে স্থানচ্যুত কৰিয়া
দেখিলে পাবা পুনৰায় নামিয়া পড়িবে।

সহজ লোকের গায়েব উতাপ ৯৮ ডিগ্রী, কিন্তু মৰ মাহুয়ের সমান
নয় ; কাহাব ৯৮, কাহাব ৯৮, কাহাব বা ৯৯ ডিগ্রী। তবেই মাহুয়েব
গায়েব উতাপ পড়ে ৯৮ ডিগ্রী। সহজ গায়েব উতাপ ভাল কৰিয়া
জানা চ ই তাপমানের যেখান পর্যন্ত পাব উঠিলে সহজগায়েব উতাপ
হয়, সেখানে মাহুয়ক মত দাগ আছে, ইহাৰ দ্বারা ডাক্তাবেৰ সহজ-
গায়েব তাপ অনুভব কবেন

৯৯ ডিগ্রীৰ উপৰ পূ বা উঠিলে, কিন্তু ১০০ ডিগ্রীৰ নীচে থাকিলে
অপ জরতাব বুঝিতে হইবে। ১০০ ডিগ্রীৰ উপৰ যত উঠিলে, জ্বরেৰ
প্রকোপ তত অধিক স্থিৰ কুরিতে হইবে। ১০২ কিন্তু ১০৯ পর্যন্ত পাবা
উঠিলে মধ্যম বকমের জ্বর এবং ১০৯ এর যত উপৰ উঠিলে, তত বেগী
জ্বর অনুমান কবিবে।

আয়ুর্বেদোক্ত পরিভাষা ।

৪ ধানে	১ বতি
৬ বতিতে	৩ মাস
৮ মাসায়	১ তৌনা
২ তৌনায়	১ কর্ষ
২ কর্ষে	এক অর্দ্ধ পল, ৩৩ তি বা ত্র্যষ্টমিকী
৩ শুক্লিতে	১ পল
১৬ পলে	১ প্রস্থ
৪ প্রস্থে	১ আঢ়ক ।
৪ আঢ়কে	১ মোগ
৪ যবে	১ গুজ্জা

এক বৎসরের পর মেহসিক্ত গুড় প্রভৃতি হীনবীৰ্য্য হয়, অর্থাৎ তাহার পুষ্কগত গুণ থাকে না । মেহাদি চাবি মাস পবে অধিক গুণ প্রকাশ করে । এক বৎসরের অধিক বাথিলে যতের আব ফলোপ-দায়ক গুণ থাকে না । তিল তৈল এক বৎসরের পব যতদিন থাকিবে, তত অধিক গুণ বৃদ্ধি হইবে । এক বৎসরের পর সামান্যতঃ ঔষধের বীৰ্য্য থাকে না । চূর্ণ ঔষধ দুই মাস পবেই হীনবীৰ্য্য হয় । মোদক ও লেহ এক বৎসরের পব অ ব ভেজকব থাকে না । লঘুপাকী ঔষধ সমুদায় এক বৎসরের পব ভেজশূন্য হয় । আসব অর্থাৎ মদ, ধাতুজব্য অর্থাৎ স্পর্শাদি ও পারদ ইহারা যত পুৰাতন হইবে, ততই অধিক ফল-প্রদা-নোপযোগী হইবে ।

অনুজ্ঞ বিষয়ে ব্যবস্থা—যে স্থানে সূক্ষ্মের নির্দিষ্টতা নাই, সেস্থলে প্রাতঃকাল বুঝিতে হইবে । ভাগ অনুজ্ঞ থাকিলে সমস্তাগে গ্রহণ করিবে । কিন্তু পাত্রে নির্দিষ্ট করিয়া লেখ না থাকিলে যৎপাও বুঝিতে হইবে । তবল দ্রব্য অনুজ্ঞ থাকিলে জন গ্রহণ করিবে । মেখানে যত, দুর্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তথায় গব্যযত, গোব্যযত বুঝিবে ।

এক দ্রব্যের ক্ষুণ্ণভাবে অন্য দ্রব্য গ্রহণবিধি ।—নমু-মভাবে, পুরাতন গুড়, উদ্ভাবে নূতন গুড় চাবি প্রকারে পোড়ে উত্তীর্ণ করিয়া তাহা গহ্ব কবিবে । দুর্গ ক্ষুণ্ণভাবে যুগ বা মসবে

মুখ গ্রহণ কৰা বাইতে পাৰে শালি ধান্য অভাবে যষ্টিক-
ধান্য, জাম্বা অভাবে গাভাৰী মল, দাড়িম অভাবে বৃক্ষাম্ব,
মৌবাক্তি যুতিকাব অভাবে পক্ষপাপ্পাটী, ওগবমূলৰ অভাবে
সিদ্ধীচোপড়, লৌহ অভাবে মৌবাক্তি, শ্বেতসৰ্ষপ—যাহাকে ভাল
কথায় সিদ্ধার্থ কহে, তদভাবে সমান্য সৰ্ষপ গ্রহণ কৰিবে। চই
ও গজপিপ্পলীৰ অভাবে পিপ্পলীমূল, চাকুল্যাৰ অভাবে শালপান্নি
মুঞ্জভিন্দ অভাবে তাম্বুল, কুনকুম অভাবে কাঁচা হৰিদ্ৰা, মুক্তাব
অভাবে শঙ্খচূৰ্ণ, হীরক অভাবে বৈকাণ্ঠ, কাকড়াশৃঙ্গীৰ অভাবে
মায়ম্বীজ, ধন্যাই অভাবে শূলফা, বাবাহিকেন্দেব অভাবে চাগাব আলু,
মুৰ্খা অভাবে জিঞ্জিৰীক, সুবর্ণ অভাবে মৌপ্য—ইহাকও অভাবে
গৌহি প্রয়োগ কৰিবে পুষ্কৰমুখ অপাঠে কুড, মৈন্ধব অভাবে
সামুদ্ৰ বা বিটলবণ, কুন্তমুক অভাবে ধন্য এবং পুষ্প অভাবে কচি
ফল গ্রহণ কৰিবে, তজ্জাতকৈৰ অভাবে বক্তচন্দন, মদ্য অভাবে
শিঙাকী, শুক্ৰিব অভাবে কাঁজী, বক্ষিগধু অভাবে চই, কুড়চি অভাবে
মুখলীমূল, বাগ্গা অভাবে পৰগাছা, জীবা অভাবে ধন্য, ও তুন্ধুক
অভাব হইলে শালি বা ধন্য গ্রহণ কৰিবে রমাঞ্জন অভাবে দাক-
হৰিদ্ৰাব কাথ, কপূৰ অভাবে মুখা, যুগনাভি অভাবে গন্ধশৃঙ্গী এবং
কোকিলান্দেব অভাবে গোকুবৰ্জী গ্রহণ কৰা কৰ্ত্তব্য

স্বরসের লক্ষণ ।—আর্জ জবা গ্রহণ পুষ্কক তৎক্ষণাত্ কুট্টিত
করিয় বস্ত্র দ্বারা পেষিত করিলে যে বস বাহির হয়, তাহাকে উত্ত
জবোর স্বরস কহে শুষ্ক জবোর স্বরস প্রয়োজন হইলে, এই জবোর
আট এক জল দ্বারা উহাকে সিদ্ধ কবিত চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া
তাহা গহণীয়

ঔষধি-অঙ্গ গ্রহণ বিধি—যদি অশ্বথ, প্রভৃতিব ছাণ,
জীবকাশী বৃক্ষের শাখ, তালিগাদিব পত্র এবং ত্রিকলাব ফল গ্রহণ
কৰিবে যে সকল মুখ স্থলতব অথচ অভ্যন্তরে সান্বত কাষ্ঠ থাকে,
তাহার বন্ধন গ্রহণ কৰবে যে সকল ক্ষুদ্র অথচ কাষ্ঠগর্ত নহে, তাহা
মুদ্রা গ্রহণ কৰবে।

পুটপাকের বিধি ।—ঔষধ কোন মৃৎপাত্রে বাখিয়া তদুপরি আব
কথানি প্রাচীনা স্থাপিত কৰিয়া তাহা জম্ব ও বট পাতাদি দ্বারা স্টন
পূৰ্বক বন্ধন কৰিয়া । তদন্তর এক কুণ্ডল জ্বই অঙ্গুলি আন্দাজ
মল কাঁচা মুক্তিক পান কৰিয়া একটী স্তম্ভের তলদেশে “বিল মূটী
মান পূৰ্ণ কৰিয়া তাহা বট ও বট পাত দ্বারা স্টন পূৰ্বক বন্ধন

উদ্ধাধ ইহাতে তাপ পায়, একপাশাপাশি কবিয়া অগ্নি প্রদান কবিয়া ক্রমে উহাব তেজ হ্রাস হইয়া অগ্নিলে পাত্রটি তুলিয়া লইবে

ঔষধের মাত্রা। —ঔষধের মাত্রাসম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম অবশ্যবিত নাই। কাল, অগ্নি বর্গ, বয়সক্রম, প্রকৃতি, দেশ ও বাতাদি দোষানুসারে মাত্রা কল্পন করিবে। মাত্রার ন্যূনাধিক্য হইলে ঔষধে ক্ষেদ্র ও উপেক্ষা করিবে না। স্নেহ জব্য, কাথ, ঔষধ প্রবল্যগ্নি ব্যক্তিব পক্ষে ৮ তোলা, মধ্যমাগ্নি ব্যক্তিকে ৬ তোলা এবং হীনাগ্নি বিশিষ্ট ব্যক্তিব পক্ষে ৪ তোলা পরিমাণে প্রয়োগ করিবে

দ্বিকৃত জব্য গ্রহণ। —ঔষধ, তৈল ও চূর্ণ প্রভৃতি যোগে যে জব্য হইবার উক্ত আছে, সেই জব্য দুই ভাগ দিতে হইবে

অনুত্ত স্থানে অনুপান বিধি। —যেখানে কোন অনুপান লিখিত নাই, সেখানে ফিলার জলের সহিত ঔষধ সেবন করা কৰ্তব্য

অনুত্ত স্থানে মাত্রা বিধি। —যেখানে ঔষধের কোন প্ৰকার মাত্রা লিখিত নাই, সেখানে বোগীব অবস্থা এক ঔষধের বীৰ্য্য বিবেচনায় মাত্রা অবধারণ কবিতে হইবে

বালকের ঔষধের পরিমাণ। —বালকের জন্ম অবধি এক মাস পর্যন্ত এক রতি পরিমাণে ঔষধ মধু, দুগ্ধ, স্তত, চিনি, ইহার কোন একটীক দ্বারা লেইবৎ পেষিত কবিয়া সেবন কবাইবে। এক বৎসর হইলে মাত্রা বার বার ইহার পব যোল বার ইহার পব যোল বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেক বৎসরে ১ মাস কবিয়া মাত্রা বৃদ্ধি কবিবে। যোগ্য হইতে ১০ ৮ বৎসর পর্যন্ত ২ তোলা, তদুর্ধ্বে বালকের মাত্রা প্রায়ে গ কবিবে

ত্রিফল। —হরিতকী, বহেড়া ও আমল্যাকে ত্রিফল বলে

ত্রিকটু। —শুঠ, পিপ্পলী, মরিচ এই তিনটীকে ত্রিকটু কহে।

পঞ্চ লবণ। —সৌবর্জল, সৈয়ব, বিটলব, উস্তিদ লবণ এবং সামুদ্র লবণ

স্নেহ চারিপ্রকার। —স্তত, তৈল, বস্মা ও মজ্জা এই চারিপ্রকার স্নেহ

চতুর্ভূত। —দুর্ধকচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর এই চারিটিকে চতুর্ভূত কহে

ত্রিগুণি ও ত্রিজাতক। —দুর্ধকচিনি, তেজপত্র, এলাইচ এই তিনটীক নাম ত্রিগুণি ও ত্রিজাতক

ত্র্যষণ ও ত্রিমদ। —পিপ্পলী, শুঠী, গোলামবিট এই তিনটীকে ত্র্যষণ এবং বিড়ঙ্গ, মুখা, চিত এই তিনটীকে ত্রিমদ কহে

পঞ্চকোষ। —পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, টাই, চিত্রী, শুঠী, এই পাঁচটীকে পঞ্চকোষ কহে

অষ্টবর্গ। —শক্তি, স্বজি, মেদ, মহামেদ, সশভক, জীবক, কাকোলা, জীব কাকোলা, এই অষ্টটীক নাম অষ্টবর্গ

এই ঔষধে যে সকল ঔষধ উক্ত হইয়াছে, তাহাদেব পাকপ্রণালী থাকা স্থানে লিখিত হইয়াছে, এতদ্বি পৃথকরূপে আব এ স্থলে উক্ত হইল ন তবে যে সমুদয় দ্রব্য বা অঙ্গাঙ্গ জব্য ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিবার পূর্বে শোধন ও মারণাদি দ্বারা ব্যবহারযোগ্য কবিতে হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল

ভস্ম প্রকরণ।

অর্ঘভিন্ম প্রণালী। —যে পরিমাণে অর্ঘ ভস্ম কবিবে, তদুর্ধ্বক অর্ধে অগ্নিতে উত্তপ্ত কবিয়া তৈলে নিমগ্ন কবিবে। এইরূপে প্রত্যেকবার উত্তপ্ত করিয়া ক্রমান্বয়ে তত্র গোমুত্র, কাঁজি এবং কুণ্ডলি কলাইয়ের জলে উক্ত প্রকারে শোধন করিয়া লইবে। তাহার পবে ঐ অর্ধকে পিটিয়া পূর্য্য করিবে। পাত করা হইলে, তাহাকে যতদূর সম্ভব অগ্নি দ্বারা শুষ্ক করা খণ্ডে কর্তন কবিয়া লইবে। তদনন্তর অর্ধের মাত্রা পাবন এবং গন্ধক পৃথক পৃথক ভাগে লইয়া তিন জব্যকে একত্র মর্দন কবিতে থাকিবে। মর্দন কবিতে কবিতে পাবন, গন্ধক এবং অর্ঘ একত্র মিশ্রিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধূসর কবিবে। তাহার পবে ঐ মিশ্র চূর্ণকে স্ততকুমারীর রসে মর্দন কবিয়া একটী চাকতি পেষিত এবং উক্তরূপে শুষ্ক কবিবে। শুকাইলে একটী মৃদিকা বা পটী। দ্বারা অর্ধের সমান গন্ধকচূর্ণ (নীচে অর্ধেক উত্তাপে অর্ধেক) দিয়া তদনন্তর অর্ধের চূর্ণটী বাখিবে এবং ঐ কোটককে মোড় বেঁধে বস্ত্র। গোমুত্রমিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ পেষণ দিয়া একাইবে। পশ্চিশেষে

১০ হস্ত পরিমিত গভীর এবং চিহ্ন পোয়া বা সবিমিষ্ট একটি গর্তে রাখিয়া ৩০ খালি বিগ্ন ঘূটেব পোড়ে দধি করিবে অগ্নি নির্বাপন হইলে সন্ধ্যাবে চাক্তী বাহির করিয়া পুনরায় পাবা ও গন্ধকেব সহিত পূর্ববৎ মর্দন কবিত্তে কবিত্তে উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে যতকুমার বরসে মর্দন কবিত্তা একটি চাক্তি পেল্লত কবিত্তে, তাহার পর আবার তদ্রূপে প্রলেপ দিবে ও কোট ব মধ্যে গন্ধক ঢাকা দিয়া বিগ্ন ঘূটেব তৎপরে পোড়াইবে এইরূপে চৌদ্দ বার বন্ধ কবিত্তে মর্দন ভস্ম হইবে প্রাচীন বৈদিক ব্রহ্মসং প্রথমবার পোড়াইবার সময় অগ্নিব সমান পরিমাণ বগগন্ধক দিয়া মর্দন কবিত্তে হয়, কিন্তু দ্বিতীয় তৃতীয়বারে পাবা গন্ধকেব পূর্ববৎ এক অষ্টমাংশ কম ইয়া দিতে হয়

১১ স্বর্ণ ভস্ম কবিত্তাব অত্যাশ্র অনেক উপায় আছে এমন কি এক পোড়েও ভস্ম কবিত্তে পাবা যায়, কিন্তু উপায়ে প্রকারে স্বর্ণ ভস্ম প্রথা সাধন তঃ চলিত আছে

বৌপ্য ভস্ম প্রণালী - বসাবাইল্য যে ভস্ম বসুরাব জন্ম যে ধাতু গ্রহণ কবা যায় তাহ অবশ্য বিশুদ্ধ হওয়া আশী ক অতি বিশুদ্ধ রূপকে পাওয়া পাত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে কাটিবে তাহার পরে যোপ্যেব সমান পাবদ এবং দ্বিগুণ গন্ধকেব সহিত উত্তমরূপে পূর্বোক্ত প্রকারে মর্দনে কজলী কবিত্তঃ গোড়ালেবুর বসে মাড়িয়া চাক্তি কবিত্তে এবং স্বর্ণ ভস্ম প্রকরণে যেকপ কোটামধ্যে রাখিয়া প্রলেপ দিয়া গজপুটে পোড়াইবার কথা বলা হইয়াছে, সেইরূপ ৪।৫ বার পোড়াইলে বৌপ্য ভস্ম হইবে

তাত্র-ভস্ম-প্রকরণ - তাত্রের পাত প্রস্তুত কবিত্তঃ ক্ষুদ্র কাবে কাটিয়া লইবে, তাত্রের দ্বিগুণ গন্ধক চূর্ণ কবিত্ত অর্ধেক কোটাব মধ্যে দিবে, তাহার পর তাত্র-কুচি-গুলি রাখিয়া অর্ধেক গন্ধক চূর্ণ চাক্তা দিবে চাপ দিয়া তাহার উপর গোড়ালেবুর বসে অর্ধ কোট দিয়া কোটা বন্ধ করিবে এবং উত্তমরূপে প্রলেপ দিয়া শুকাইলে গজপুটে দধি কবিত্তেই তাত্র ভস্ম হইল তাত্র ভস্মের এই ভস্মকে ঘোল দিয়া মাকিয়া চাক্তি কবিত্তঃ ওলেব মধ্যে রাখিয়া তাহার চতুর্দিকে গোময়-মিশ্রিত মৃত্তিকার প্রলেপ দিয়া পোড়াইয়া হইলে ইহাকে অমৃত প্রকরণ করা বলে

পিত্তল-কাংস-ভস্ম-প্রকরণ - তাত্র ভস্মের ন্যায় মর্দন প্রকরণ করিবে। কেবল কাংস ভস্ম কবিত্তে উত্তমরূপে পোড়াইতে হয়,

বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক বাবেই গন্ধক নীচে উপর দিয়ন কবিত্তাব মধ্যে পোড়াইবে

সীমক ভস্ম প্রকরণ - সীমবেব সমান মনঃশীলা পানুব বসেব সহিত মর্দন কবিত্তা তাৎপধ্যে রাখিয়া গজপুটে দধি কবিত্তে সীমক ভস্ম হইবে।

রঙ্গ-ভস্ম-প্রকরণ - বঙ্গ অর্থাৎ বাংকে লৌহপাত্রে চাপাইয়া তাত্রের তাপে গলাইবে, তাহার পর তাহাতে মর্দন সমানভাগে হবিদ্রা চূর্ণ দিয়া একটি নিষকাঠের দণ্ডাবা মর্দন কবিত্তে করিতে হবিদ্রাব ওড়াগুলি ভস্ম হইয়া মর্দন সহিত মিশ্রিত হইলে পকে অস্থখ বন্ধের এক এক মোহাকে চোকালি বলে উহা রনের সমানভাগে চূর্ণ কবিত্তঃ তাহাতে দিয়া নিষদণ্ডে নাড়িতে নাড়িতে উহাও বঙ্গের সহিত মিশ্রিত হইবে তাহার পরে ত্রিফলা চূর্ণ ও জিবা চূর্ণ মিশ্রিত কবিত্তে রঙ্গ চূর্ণ হইয়া আসিবে তাহা হইলেই বঙ্গ ভস্ম হইল ইহা কেই বঙ্গ বলে উক্তরূপে বঙ্গ ভস্ম কবিত্তে প্রায় দুই প্রহর কাল লাগে

স্বর্ণমাকী-ভস্ম-প্রকরণ - তাত্রের ন্যায় জানিবে লৌহ ভস্ম প্রকরণ - ভস্ম করিবার পক্ষে কান্তি লৌহ বা কবিত্ত চাচাই উৎকৃষ্ট এক কবিত্ত চাঁচা বা কবিত্ত লৌহদণ্ড একগাম গভীর মুখে ভিজাইয়া রাখিবে, তাহার পরে উত্তমরূপে লৌহদণ্ড দ্বারা শীলা-খণ্ডে গোমূত্রযোগে মর্দন কবিত্তঃ ছোট চাক্তী কবিত্তা মোড়ে ওক কবিত্তে

উত্তমরূপে শুকাইলে এক এক গর্ত কাটিয়া নীচে উপরোক্ত ঘূটে দিয়া লৌহের চাক্তী গুলিকে পোড়াইবে অগ্নি নির্বাপন হইলে পূর্ববৎ গোমূত্র দ্বারা মর্দন করতঃ চাক্তী করিয়া পোড়াইবে এইরূপে শত বার বন্ধ কবিত্তা শেষে ত্রিফলাকে গোমূত্রে ভিজাইয়া তাহাতে লৌহ মর্দন করিয়া পোড়াইলেই লৌহ ভস্ম হইল।

অভ্র ভস্ম কবিত্তাব প্রকরণ - বনপালঙ্গের বসে অর্ধেক দিবস জয় ভিজাইয়া রাখিয়া তাহার পরে লৌহের ন্যায় গোমূত্রে মর্দন কবিত্তঃ সহস্রবার বন্ধ কবিত্তে অভ্র ভস্ম হয়

হিঙ্গুল হইতে পারদ বাহির করিবার প্রকরণ - বাজারে পাওয়া হিঙ্গুল কুঁড়ি, উহার সহিত প্রায়ই সীমকাদি মিশ্রিত থাকে, এজন্য উহা ব্যবহৃত নহে। হিঙ্গুল হইতে পাবা বাহির হয়, উহা বড় উগ্রবীৰ্য্য এজন্য ভ্রমবিশেষে উহা ব্যবহৃত আছে। যে উপায়ে হিঙ্গুল পাবদ বাহির হয়, তাহার প্রকরণ নিম্নে লিখিত হইল :-

১। হিঙ্গুলকে একটা হাঁড়িতে পুঁবিয়া, একটা সবা ঢাকা দবে সেহ
সবাব তলার যেন ভূষা খড়ি খুব ঘন কবিয়া মাখান থাকে হাঁড়ির
মুখ ময়দা অথবা মাসকলাই যব দাউল বাটা দ্বাৰা বন্ধ করিয়া হাঁড়ির
সর্বাপেক্ষে গোবর মাটিব প্রলেপ দিবে; প্রলেপ শুকাইলে ঐ হাঁড়িতে
১৥ এইব কাল জাল দিবে জাল দিবার সময় সবটি জলপূর্ণ রাখিবে
এবং জল গরম হইয়া বাষ্প হইতে আবদ্ধ কুবিলেই পবিবর্ত কবিবে
এইরূপ ১৪ বাব জল পবিবর্তিত কবা হইলে বুঝিবে, পাবা বাহিব হই-
য়াছে ত হাব পব নামাইয়া হাঁড়ি ঠাণ্ডা হইলে উহা খুলিয়া সবাব
তলেব ভূষা খড়ি চাঁচিয়া তাহা পুঁক নেকড়ায় পুরিয়া শুকিলেই বিগুন্ধ
পাবদ বাহির হয়

মুক্তাভস্ম প্রকরণ ১—মুক্তাকে একদিন জয়ন্তী পত্রের সঙ্গে
ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন কেউর ভিতর রাখিয়া কিঞ্চিৎ জয়ন্তী পত্রের
রস প্রদান কবত প্রলেপ দিয়া গজপুটে দগ্ধ কবিবে।

প্রবালকে এইরূপে ভস্ম করিতে হয়।

মগুর ভস্ম প্রকরণ ১—লৌহ বিষ্ঠাকে তিনদিন গোমূত্রে ভিজা-
ইয়া রাখিয়া লৌহভস্মের ন্যায ২১ পোড় দিবে

শোধন বিধি।

গন্ধক শোধন—গন্ধক লৌহপাত্রে রাখিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত
কব। যখন গন্ধক ভস্ম পাইয়া গেলিয়া যাইবে, তখন অগ্নি হইতে
নামাইয়া ঐ ভস্ম গন্ধক দ্বন্দ্ব তালিয়া দিয়া কিছুক্ষণ রাখিলেই উহা
কঠিনাকার হইবে।

হীরক শোধন। হীরা গোড়াইয়া অগ্নিতে ডুবাইবে। এই
রূপে ২১ বার কবিলেই হীরা শুদ্ধ হইবে।

মুক্তা শোধন—মুক্তাকে জমায়ে গোড়াইলেব বস, ময়, এবং
জয়ন্তী পত্রের বসে স্থাপন কবিবে।

প্রবাল শোধন—খানিকট দূর প্রবালকে সিঁদুর কবিয়া তৎ-
পবে দগ্ধ হইতে তুলিয়া লইবে।

