



# ভিষক-সহচর।

দ্বিতীয়া চিকিৎসাতত্ত্ব-সম্পাদক ও ভারত-ভৈষজ্য-

তত্ত্বাদি গ্রন্থপ্রণেতা

শ্রীঅম্বিকাচরণ রক্ষিত কর্তৃক

সংকলিত।

তৃতীয় সংস্করণ

কলিকাতা ;

১০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে


শ্রীওরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও

২ নং গোসাবাগান স্ট্রীট, "ভিক্টোরিয়া প্রেসে"

শ্রীমুখবিহারীদাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৯।

মূল্য ২৥০ টাকা।



## প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ।

### প্রথম খণ্ড ।

কয়েকখানি ইংরাজী চিকিৎসা-শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ভিষক-সহচর সম্বলিত হইয়াছে । ইহা যাহাতে বঙ্গীয় চিকিৎসক গণের নিত্য ব্যবহারে আইসে, তজ্জন্য যথোচিত চেষ্টা ও পরিশ্রম করা গিয়াছে । ফল কিরূপ হইয়াছে, তাহা চিকিৎসকগণের বিবেচনাধীন রহিল । ইহা ভিষক সমাজের কিঞ্চিদাও উপকায়ে আসিলে শ্রম সফল বোধ করিব ।

১৮০০ শক,

১৫ বৈশাখ ।

\* \* \* \*

### দ্বিতীয় খণ্ড ।

প্রথম খণ্ড ভিষক-সহচরে বোগ লক্ষণাদি ও অভিনব চিকিৎসা মুদ্রিত না হওয়ায় পাঠকবর্গের সম্পূর্ণ সুবিধা হয় নাই । তজ্জন্য দ্বিতীয় খণ্ডে রোগের নির্ধাচন, লক্ষণ, কাণাদি ও অভিনব চিকিৎসা বিবরণ সংক্ষেপে বিবিধ ইংরাজীপুস্তক হইতে সংকলিত হইল ।

১৮০২ শক,

বৈশাখ ।

শ্রী \* \* \*





## তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভিত্তিক-সংস্করণ অনেক দিন হইল নিঃশেষিত হইয়াছে, কিন্তু নানাবিধ কারণে এতদিন ইহার তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রচারিত হয় নাই। এখানে পবনেশবের কৃপায় সে স্মরণ উপস্থিত হইল। এই সংস্করণে ইহা আশ্রয় সংশোধিত ও স্থানে স্থানে পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত করা হইয়াছে। বর্তমান সময়োপযোগী চিকিৎসাবিবরণ সমূহও যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে পল্লীগ্রামস্থ চিকিৎসক সম্প্রদানের কিছুমাত্রও উপকার দর্শিলে শ্রম সফল বোধ করিব।

খাঁটুবা-গোবরডাঙ্গা,

১৮২৩ শক, ফাগুন।

}

শ্রীঅধিকাচরণ রক্ষিত।

## দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

প্রথম সংস্করণের ভিষক-সহচর সমস্ত নিঃশেষিত হওয়ায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। প্রথমে সংস্করণে পুস্তক দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়, এবার এক খণ্ডেই সমস্ত বিষয় সুশৃঙ্খল ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা হইল। এইবারে প্রথম বোগের নির্দ্ব্যচন, তৎপরে লক্ষণ ও কারণাদি এবং শেষে চিকিৎসা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। চিকিৎসা মধ্যে বিস্তর নূতন ঔষধের উল্লেখ আছে। এবারে আবশ্যকানুসারে স্থানে স্থানে পৰিবৰ্ত্তিত, পরি-  
বৰ্ত্তিত ও সংশোধিত করা হইয়াছে। ফলতঃ পুস্তক খানিকে বৰ্ত্তমান সময়ের সম্যক উপযোগী কবিত্তে যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্নেব জুটি করি নাই, এক্ষণে ইহা চিকিৎসক সম্প্রদায়ের উপকাৰে আশি-  
লেই কৃতার্থ হইব।

১৮০৬ শক, ফাল্গুন।

কলিকাতা।

} • শ্রীঅম্বিকাচরণ রক্ষিত।



18682  
37/1/1  
18682

## উপক্রমণিকা

### জিহ্বা পরীক্ষা ।

জিহ্বা পরীক্ষার কি অপরিষ্কার, শুষ্ক বা ভাঙ্গ, ইহার নর্থ ইত্যাদি, গীড়ার চিকিৎসা কালে পরীক্ষা করিতে হয় জিহ্বা অপরিষ্কার থাকিলে কি বুঝায়? জর গীড়ায় জিহ্বা অপরিষ্কার হইতে পারে, স্থানিক কারণ বশতঃ অথবা পানিশয়, অঙ্গ বা যকৃতের সহায়ভূতি হইতেও জিহ্বা অপরিষ্কার হইতে পারে। জ্বরে জিহ্বার অবস্থা, চিকিৎসা আদেশের ভিত্তিতে নির্ণয়ের সহায়তা করে। অধিকাংশ জর গীড়ায় জিহ্বা প্রথমে আর্দ্র মরাত্ত থাকে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোন কোন ক্ষেত্রে জিহ্বা সম্পূর্ণ পরিষ্কার অবস্থায় থাকে। টাইফয়েড জ্বরে কখন কখন একে-ক্রম ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। জ্বরে জিহ্বার মরাত্ত অবস্থা দ্বারা চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য লাভ করা যায় না। কারণ জিহ্বা পরিষ্কার বা অপরিষ্কার যেকোনও থাকুক না কেন, যদি বোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তবে তাহা বিদূরণের চেষ্টা করিতে হইবে এবং যদ্যপি জিহ্বা অত্যন্ত অপরিষ্কার অর্থাৎ পূর্ণ লোপান্ত থাকে, তাহা হইলে পানদ্রব্যের বিরুদ্ধে প্রাণোপায় উৎসাহ, পানদ্রব্যের বিরুদ্ধে ব্যবহারের পবেত্র অবজ্ঞা কালে জিহ্বার উপনি-ভাগ অপরিষ্কার অর্থাৎ লোপান্ত থাকে।

স্থানিক কারণ হইতেও জিহ্বা অপরিষ্কার হয়। তাপুপার্শ্ব-গ্রন্থি বাড়িলে সচরাচর জিহ্বার পশ্চাৎভাগ লোপান্ত থাকে।

ক্ষয়প্রাপ্ত দন্ত বশতঃ জিহ্বাব কতকাংশ মলান্বিত হয়। যদি কেবল এক দিকের তালুপার্শ্ব গ্রন্থি বিবৃদ্ধ কিম্বা ক্ষয়প্রাপ্ত দন্ত একদিকে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে জিহ্বার অর্দ্ধ অংশ লম্বা-লম্বি ভাবে মলান্বিত হইয়া থাকে। পক্ষম যুগ্ম স্নায়ুর স্নায়ুশূল পীড়ায় যখন নিম্নস্থ শাখা সকল আক্রান্ত হয়, তখন আক্রান্ত দিকেব জিহ্বা অপবিষ্কার হয়।

তাম্রকুটের অতিশয় ধূম পান বশতঃও জিহ্বা সচরাচর মলান্বিত হইয়া থাকে।

জিহ্বা, সদা সর্বদা পাকাশয়, অঙ্গ বা যকৃতের ক্রিয়া বিশৃঙ্খলার পরিচায়ক। বস্তুতঃ যখন জ্বর ও কোন স্থানিক কাবণ অর্থাৎ তালুপার্শ্বগ্রন্থি বিবৃদ্ধি, ক্ষয়িত দন্ত ইত্যাদি বর্তমান না থাকে, তখন জিহ্বাব অপরিষ্কার অবস্থা পাকাশয়াজ্জের ক্রিয়া-বৈষম্যের পরিচায়ক।

পূর্বেক্ত অবস্থার মলান্বিত জিহ্বা দ্বারা আমরা কি বুঝিতে পারি? জিহ্বাব এইরূপ অপবিষ্কার অবস্থায় নিম্নোক্ত চারিটী ঔষধ স্বতন্ত্র ভাবে বা সম্মিলিত ভাবে প্রযুক্ত হইলে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা মার্করী, পডোফিলিন, টিংচর অব্, লক্স ভয়িকা ও নাইট্রিক এসিড ডিল।

পূর্বেক্ত ভেষজ চতুষ্টয়ের মধ্যে কোনটী ও কত মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা কিরূপে স্থির করা যায়? যদি কোষ্ঠ-বদ্ধ বর্তমান থাকে, তবে পারদ ঘটিত কোন একটী বিশ্লেচক বা বেজিন পডোফিলিন, বিবেচন হয়, একপ মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হইবে। একরূপ অবস্থায় কোন বিশ্লেচক, বিশেষতঃ পল্লনা, ডেডিকশাল বা কার্লসবাদ আদি স্বভাবজ বেচক জল ফলোপ-

যায়ী হয় সত্য ; কিন্তু এই সকল ঔষধ যদিও আধিকার্য শূন্য  
বিশেষ সুফলপ্রদ হয়, তথাচ পূর্বাধিহিত্তি অনুযায়ী পাবদঘটিক  
ও পডোফিলিন বেচক ঔষধ অপেক্ষা, কম উপকারী

পারদের মধ্যে পূর্ণবয়স্ক রোগীর পক্ষে ক্যালোমেল বা রুপিন  
ও বালক বালিকাদের পক্ষে ক্যালোমেল বা পো ডাউডন উপ-  
যোগী। ক্যালোমেল বা রুপিন, একষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা বা হায়-  
মায়াগাস সহযোগে প্রয়োগ কর্তব্য, কারণ এই সংযোগ বশত,  
পেট কামড়ানি নিবারিত হয় ও ঔষধের ক্রিয়াদিক্য জন্মে।  
অর্ক হইতে এক গ্রেন ক্যালোমেল ও ৩ গ্রেন একষ্ট্রাক্ট হায়-  
মায়াগাস একত্রে বটিকাকারে উপযুক্তপরি তিন বারি প্রয়ুক্ত  
হইলে অভিলষিত ফল লব্ধ হয়। প্রথম বটিকা দ্বারা সাধারণতঃ  
বেশ বিরেচন হয়, দ্বিতীয়টি দ্বারা তদপেক্ষা কম এবং তৃতীয়টি  
দ্বারা কদাচিৎ বিবেচন হয় ; কিন্তু ইহাতে জিহ্বা পরিদার হও-  
য়ায় বিশেষ সহায়তা লাভ করা যায়। আশ্রয় কি ব্যবস্থা করিব—  
পাবদঘটিক বিরেচক বা পডোফিলিন রেজিন ? এই প্রশ্নের সঙ্-  
কটব মনের বর্ণের উপর নির্ভর কবে। মনের বর্ণ ফিকে মত (শ্বে-  
তাভ) হইলে মার্কনী উৎকৃষ্ট বিবেচক। পক্ষান্তরে, যদি মনের  
বর্ণ অত্যন্ত ঘোরান হয়, তবে পডোফিলিনের ব্যবহার প্রয়ো-  
জনীয়। যখন অঙ্গের ক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবে হয় কিম্বা ভেদ  
প্রয়োগ বশতঃ তরল মল নিঃসৃত হইতে থাকে অথচ জিহ্বা  
অপরিস্কার অবস্থায় থাকে, তখন কি করা কর্তব্য ? আশ্রয়  
এইকপ অবস্থার রোগী, সচরাচর পাকাস্মিক, চৈতন্যিক বা আঙ্গিক  
বিশৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট পীড়ায় দেখিতে পাই এবং সময় সময় তরল  
পীড়ার আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় প্রথমে জিহ্বা যত মৃদু পরিদার

হওয়া উচিত, তত শীঘ্র তাহা হইতে দেখা যায় না—ইহা পবিত্রিক্রিয়া বৈষম্যেব একটি বিশেষ চিহ্ন অত্রস্তলে পুনঃচ মার্কবীৰ প্রমোক্ষণ বা পডোফিলিন, এসিড নাইট্রিক ডিন ও টিংচর নক্স ভমিকা সহযোগে প্রযুক্ত হইলে বিশেষ উপকার কবে নিঃসৃত মল যদি অত্যন্ত ফেকাশে বর্ণ বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে  $\frac{1}{2}$  বা  $\frac{1}{3}$  গ্রেণ গ্রে পাউডর দিবাতে একবার ও রাত্রিতে একবার অথবা দিবসে ৩ বার সেবন কবাইবে; যদি মল অত্যন্ত ঘোবাল বর্ণযুক্ত হয় তবে ক্ষুদ্র মাত্রায় অর্থাৎ  $\frac{1}{8}$  বা  $\frac{1}{4}$  গ্রেণ মাত্রায় পডোফিলিন বেজিন, প্রোতঃ ও সন্ধায় ২ বার প্রয়োগ কর্তব্য ডাইলিউট নাইট্রিক এসিড ও টিংচর নক্স ভমিকা প্রত্যেকে ৫ ফোটা মাত্রায় দিনে ৩ বার প্রযুক্ত হইলে মার্কবী ও পডোফিলিনের ক্রিয়ার বিশেষ সাহায্য হয়। কখন কখন জিহ্বার লেপ বা ফব ধূসব বা কৃষ্ণ বর্ণ হয় ও বোগী মুখে অতৃপ্তিকব তিজ্ঞাস্বাদ (বিশেষতঃ প্রোতঃ-কালে) অনুভব কবে এবং এই লক্ষণ বর্তমানে পূর্ব বর্ণিত চিকিৎসোপায় অবলম্বনীয়। সময় সময় এইরূপ চিকিৎসা সম্বন্ধে অতৃপ্তিকব তিজ্ঞাস্বাদ প্রোতঃকালে অথবা দিবসেব অধিকাংশ সময়ে অনুভূত হয়। পাবমাস্থানেট অব্ পটাশেব কবল করিলে সাধারণতঃ এই তিজ্ঞাস্বাদ কিছু সময়ের জন্য দূরীভূত হয়।

জিহ্বা পবিকার হইতে আবস্ত হইলে ফব বা লেপ জিহ্বার অগ্রভাগ ও পার্শ্ব কিনারা হইতে বিদূষিত হয় ও তাহা ক্রমশঃ পাতলা হইতে থাকে, জিহ্বাব কিনারায় তাহা স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। একটু অনুধাবন কবিলে, কোন সময় পবিকৃতি ক্রিয়া আরম্ভ হয়, তাহা সহজে বুঝিতে পাওয়া যায়

টাইকয়েড অবের স্থায় তকণ গীড়ার পবে জিহ্বাব লেপ



খানিক স্থান হইতে অপসারিত হওয়ায় তৎস্থান-চক্ৰকে দেখায়, ইহা প্রায় জিহ্বাব পশ্চাভাগে সংঘটিত হয়। এইরূপ অবস্থাপন্ন জিহ্বা, মৃদু গতিতে যোগাবোগোম্ম হওয়ার চিহ্ন। টাইফয়েড অবস্থায় জিহ্বা দ্বিতীয় বার শুষ্ক হয় ও আজিক শব্দাদি পুনঃ প্রাপ্ত হইত হয়। এইরূপ বোগীব পরে ৫—২০ মিনিট মাঝামাঝি টেম্পেটাইন প্রতি ২ বা ৩ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার হিতকর।

অবে সচরাচর জিহ্বা শুষ্ক থাকে প্রথমে জিহ্বার অগ্রভাগে তৎপরে মধ্যদেশে এই শুষ্কতা আরো, অনন্তর সমগ্র জিহ্বা শুষ্ক হয় ইহাব বিপরীত ক্রমানুসারে আবাব জিহ্বা আর্দ্র হয়। শুষ্ক জিহ্বা সাধারণতঃ স্নায়বীয় অবসন্নতাব পরিচায়ক; প্রলাপ, সচরাচর মৃদু প্রলাপ বা বিড়বিড় কবিতা বকা, এই স্নায়বীয় অবসন্নতায় দৃষ্ট হয়। সচরাচর নিজাভাব হইতে এই স্নায়বীয় অবসন্নতা প্রাপ্ত হইত হয়। নিজাকারক যথা ক্লোরাল, মল্ফোনাল, প্যারলডিহাইড, ব্রোমা-ইড্ অব্ পটাসিয়ম বা ওপিয়ম ব্যবহারে নিজাকারিত হওয়ায় স্নায়ুশুল শান্ত ও সবল হয় ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে জিহ্বার আর্দ্রতা সম্পাদিত হয়। ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম বা ক্লোরাল অপেক্ষা ওপিয়মই সাধারণতঃ অধিক উপকারী, কারণ এতদ্বারা অল্প ঔষধ অপেক্ষা, জিহ্বাব উপর বিশেষ ক্রিয়া দর্শে; নিজার স্নায়ুশুল স্থির ও সবল হওয়ায় এবং জিহ্বা ও পাকশয়ের উপর সাফল্য ভাবে ক্রিয়া দর্শাইয়া, জিহ্বাব-আর্দ্রতা সম্পাদিত হয়।

জিহ্বার শুষ্কতা মদা সর্বদা স্নায়ুশুলেব অসুস্থতাব লক্ষণ, শুধু উহা একোহনিক উদ্বেজক প্রয়োগেবও পরিচায়ক। যদি স্নায়ুব অবসন্নতা নিজাভাব জনিত হয়, তবে সম্ভব হইলে নিজাকারক ঔষধ প্রয়োগে নিদ্রা উৎপাদন করা আবশ্যিক, এতদ্বারা স্নায়ুশুল



নবল ও স্নিহব হওয়ায় জিহ্বা আর্দ্র হয়, পবিপাক ক্রিয়া ও সম্মী-  
করণ ক্রিয়া ভাল ভাবে হয় ও রোগী অধিক আহান কবিত্তে  
সমর্থ হয়।

এল্কোহল অর্থাৎ ড্রাগি আদি প্রয়োগেব দুইটী মুখ্য উদ্দেশ্য  
এই যে, পবিপাক ক্রিয়ার সহায়তা ও স্নায়ু মণ্ডলের বলবিধান।  
নিদ্রা বিশেষ উপকারী, তজ্জন্তু জ্ব-বোগীর স্নিহা হইলে সাধা-  
রণতঃ প্রায়ই উত্তেজক প্রয়োগ আবশ্যক হয় না। যদি নিদ্রা  
উৎপাদন কবিত্তে না পাবা যায় তবে, অথবা নিদ্রা মধ্যেও  
যদি জিহ্বা শুষ্ক থাকে ও বোগী প্রলাপ কবিত্তে থাকে, তাহা  
হইলে এল্কোহল প্রয়োগ বিশেষ প্রয়োজনীয়। এইরূপ স্থলে  
নাড়ীর অবস্থাও এল্কোহল প্রয়োগেব আবশ্যকতা প্রতিপন্ন কবে।  
সচবাচর শুষ্ক জিহ্বা বিশিষ্ট রোগীর নাড়ী দ্রুত ও চাপসহনশীল  
থাকায় এল্কোহল ব্যবহার আবশ্যক হয়

• সচবাচর জিহ্বার অবস্থা দৃষ্টে এল্কোহল প্রয়োগেব আবশ্যকতা  
প্রতিপাদিত হয়, আবার কখন কখন ইহার অবস্থা দৃষ্টে এল্কোহল  
দ্বারা অপকার হইতেছে বুঝিতে পারা যায় যদি জিহ্বা অধিক  
শুষ্ক ও লেপাবৃত হয়, তাহা হইলে উত্তেজক দ্বারা অপকার হই-  
তেছে স্থির কবিত্তে হইবে।

বৃদ্ধদিগেব জিহ্বা সহজেই শুষ্ক হয়, বিশেষতঃ জরবিহীন পীড়ায়  
তজ্জন্তু যুবাদের শুষ্ক জিহ্বাবৃত্তায় বৃদ্ধদের শুষ্ক জিহ্বা বিপজ্জনক  
নহে। যদি জিহ্বা শুষ্ক থাকায় স্নেহ অনিদ্রা থাকে, তবে নিদ্রা-  
কারক ঔষধ সাবধানে প্রয়োগ করা বিধেয়, যদিও অনেক সময়  
নিদ্রাকারক ঔষধ উপকারী, তথাচ বৃদ্ধ ব্যক্তিদেব এতদ্বারা সময় সময়  
অত্যন্ত উদ্দীপনা উপস্থিত হয়। যদি শুষ্ক জিহ্বা সহযোগে অব-

মানব বা দৌর্লভ্য সমুপস্থিত হয়, তবে একাকার ব্যবহারে জিহ্বা ও  
ভুক্ততা বৃদ্ধি ও ক্ষুদ্রাঙ্গান্দা হইতে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়, তাহা কতু বা দিগত  
ঐশ্যমে অল্পমাত্রায় উত্তেজক বিন্যাস করিলে ও তাহাও জিহ্বা মান-  
ধানে পর্য্যবেক্ষণ করিলে

টাইফয়েড জবে শুষ্ক, চক্চক বা কেবল শুষ্ক জিহ্বা দেখিলে  
তাহা অয়েল অন্ টর্সেন্টাইন প্রমোনে পারচায়ন বৃত্তিতে হইবে,  
উহা ৫ ১৫ ঘণ্টা মানায় টিউসিটে জ ২২৫০ ২৩ ঘণ্টা পূর্ব  
প্রযোজ্য।

জিহ্বাব বর্ণও একটা প্রয়োজনীয় চিহ্ন। প্রস্তুত, ফেকাল, মাংসল বা বদ্ব্যলে জিহ্বা ও তাহাতে দন্তের দাগ বসলে তাহা  
বক্তৃহীনতা সহযোগে দৈহিক তত্ত্ব সমূহের বিশিষ্ট অবস্থা বলিয়া  
জানিতে হইবে। সহজ বক্তৃহীনতা, নীচ পান ও কোন কোন  
পূর্বাভাস পীড়া অর্থাৎ জাইট্যা মুক্ত হইল পীড়ায় বক্তৃহীনতা ব্যতীত  
বক্তে জলোমাংস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাতে পূর্বোক্তাধিকৃত চিহ্ন দৃষ্ট  
হয়। তদুপ অবস্থা মুক্ত জিহ্বা দেখিলে তাহা ভায়ন প্রমোনে  
চিহ্ন বলিয়া জানিতে হইবে। বোহের সংলোচক প্রয়োগের  
অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত করা উচিত। আকর্ষণ প্রয়োগ কালে ফে ও  
জিহ্বায় দন্তের দাগ বসিলে তাহা মুখ আসিবার পূর্ব দাগের দিব  
করিতে হইবে

বহুগুণ পীড়ায় পান ও পি তীব্রতায় জিহ্বা বিশেষ আকর্ষণ  
মানব কারণ ইহা ও তাহা পানবদ, অব্যবহিত চাকচিন্যমালী  
প্রয়োগ, তৎসহ চিহ্ন এবং হৃদয় প্রবলতাও পান

জিহ্বা বর্ণবর্ণ ও প্রাণ আকর্ষণ পানবদ অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র  
এই সমূহ উন্নত ও তাহা চিহ্নাবদ অংশে বিশেষ পরিদৃষ্ট :

এবং এইরূপ আবদ্ধ জিহ্বা অত্যন্ত পবিত্র, সর্গতল বা সামান্য লেপযুক্ত হওয়া ইরিটেবল বা উগ্র জিহ্বাব ও পাক-শযেব তদ্রূপ অবস্থার লক্ষণ কোন কোন প্রকার অগ্নি-মন্দ্য পীড়ায়, সময় সময় উদবাস্ত্রে ও বিশেষতঃ যক্ষ্মা রোগে অল্পে ক্ষত জন্মিলে ও সণ্ডটিক অঙ্গচ্ছদ প্রদাহ থাকিলে, জিহ্বার পূর্বোক্ত অবস্থা হয়। অতি অল্প মাত্রায় আর্সিনিক অর্থাৎ লাইকব আর্সিনিকেগিস ১ ফোটা মাত্রায় আহ্বারের অনতিপূর্বে সেবিত হইলে এইরূপ জিহ্বাব ও তদানুযায়িক অবস্থাব সাধারণতঃ উন্নতি সাধিত হয় ইহা স্মরণ বাখা উচিত যে, পাকশযেব বা অঙ্গের সাতিশয উদ্দীপনা বা সণ্ডটিক অঙ্গচ্ছদ প্রদাহ বর্তমানে সময় সময় এতদ্রূপ উগ্র জিহ্বা না থাকিতেও পাবে

আবদ্ধ জ্বরে বোগাক্রমণেব কয়েক দিবস পরে ও জ্বব মাম্মা হইবার পূর্বে এইরূপ জিহ্বা দৃষ্ট হয় এবং তাহা রোগোপশমেব প্রথম-যক্ষ্মায়ও বর্তমান থাকে ইহাকে ট্রুবেরি টং বলে ও ইহা স্কার্ভেট জ্বরেব বিশেষ পবিচায়ক। জিহ্বার উপর হইতে কিউটিকেল স্থলিত হওয়ায় স্ফীদ্র অবস্থা হয়। জিহ্বাব কিউটিকেল আর্দ্র থাকায় চর্ম্মাপেক্ষা সত্তর স্থলিত হয় ইহা বলা বাহুল্য যে, জ্বব থাকা সময়ে আর্সিনিক প্রয়োগে জিহ্বার চিকিৎসা করা বিধেয় নহে যদি বোগারোগ্যোগ্যুথ হইতে বিলম্ব ঘটে ও জিহ্বার ট্রুবেনি অবস্থা বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে লাইকব আর্সিনিক ও নাই-ট্রিক এসিড ব্যবহৃত্রে উপকাব দর্শেণ

স্নায়বীয় জিহ্বা বিশেষ পর্যাবেক্ষণ যোগ্য; সাধারণতঃ ইহা সামান্য লেপযুক্ত ও সফেন বা খুখুযুক্ত ও তাহা কিনারার স্নান-কটেই বিশেষ পবিন্দ্র হয় স্নায়ুপধান ব্যক্তিদিগের, বিশেষতঃ



উত্তেজনার সময়ে, এবং যখন স্নায়ুগুণ্ডে অত্যধিক স্রম ও ক্রান্তি  
বশতঃ অবসাদনগ্রস্ত হয়, তখন এক্ষণে পীড়া সকলে, পূর্ণ বর্ণিত  
স্থিতি পাবিদৃষ্ট হয়

### নাড়ী পরীক্ষা ।

নাড়ীর প্রতি আকুঞ্চনে ধমনীমণ্ডলেন ভিতর দিয়া একটি  
তরঙ্গ প্রেবিত হইয়া উঠিয়া গতিকালে ধমনী পূর্ণ ও নিস্তৃত হয়,  
এবং এই সাময়িক পূর্ণতা বা বিস্তৃতি, কোন ধমনীর উপর অঙ্গুলি  
স্থাপন করিলে সহজে অনুভূত হয়, ইহাকেই পল্স বা নাড়ী স্পন্দন  
বলে ধমনীর বিস্তৃতি বা পূর্ণতা বশতঃ নাড়ী স্পন্দন অনুভূত হওয়া  
সম্বন্ধে মতভেদ আছে । ধমনীর উপর অঙ্গুলি চাপ দিলে বস্তুর  
তরঙ্গ, তদাধা দিয়া যাইবার জন্য ও চাপজন্য ধমনীর চাপটা ভাঙ  
বিদূরণ ও গোলাকার ভাব পুনঃ প্রাপ্তি জন্য, যে বেগ প্রাচ্যোগ বা চেপে  
করে, তাহাতেই নাড়ীস্পন্দন অনুভূত হইয়া থাকে । নাড়ীস্পন্দন  
কৃত্তিগুণের ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে এবং কৃত্তিগুণের অবস্থা ও  
ক্রিয়ানুসারে বিভিন্নপ্রকৃতিক হয় । বক্তাব্যব সমূহের অবস্থান-  
মানেও নাড়ীস্পন্দনের ইতরবিশেষ্য হয়, উহা দেন আকুঞ্চিত বা  
প্রসারিত অবস্থা বশতঃ নাড়ীস্পন্দন বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে ।  
অধিকন্তু ধমনী সকলের প্রাচীন যাইবস বা ক্যানায়স হইলে  
নাড়ীর গতি পবিবর্তিত হয় নাড়ীর গতি বা স্পন্দন, কৃত্তিগুণের  
অবস্থার বিশেষ পরিচায়ক চিহ্ন এবং তরঙ্গ পীড়ার চিকিৎসাকালে  
ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়

পীড়াকালে কৃত্তিগুণের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়,  
তজ্জন্ত নাড়ীর গতি সূক্ষ্ম ভাবে পর্যবেক্ষণ করা বর্তব্য । যতদূর

হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয়, ততক্ষণ জীবন ও আশা থাকে অনেক সময় নাড়ীর গতি দৃষ্টে বিপদাশঙ্কার পবিচয় পাওয়া যায় ও প্রাথমিক চিকিৎসাপায় অবলম্বনের সহ'য্য হয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার জন্য একটী নিউমোনিয়া বা ফুস্কুস প্রদাহগ্রস্ত বোগী গ্রহণ কর এই পীড়ায় যতক্ষণ নাড়ীর অবস্থা ভাল থাকে ততক্ষণ রোগীর আবোগ্যের আশাও বলবতী থাকে কোন কোন বোগীর প্রথমেই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াহীনতা জন্মে ও তাহা নাড়ীর গতি দৃষ্টে অনুভব করা যায় অত্যাশ্চর্য্য স্থলে প্রথমে স্নায়ুগুণ্ডের ক্রিয়াহীনতা জন্মে, তাহা প্রলাপ ও অনিদ্রা দ্বারা জানিতে পাওয়া যায় যদিও এই সকল লক্ষণ দ্বারা উৎকর্ষা পরিবর্দ্ধিত হয়, তথাচ যতক্ষণ নাড়ীর গতি ভাল থাকে, ততক্ষণ আশা বোগীকে আবোগ্য কবিবার আশা কবিতে পারি স্নায়বীয় লক্ষণ সকল দ্বারা হৃৎপিণ্ড অবসাদ গ্রস্ত হয়, তজ্জন্মই ঐ সকল লক্ষণ বর্তমানে উৎকর্ষা জন্মে। কারণ বোগীর যদি স্নানিদ্রা না হয়, তবে এই অস্থিরতা ও তৎসহ প্রলাপ বশতঃ অবিলম্বে রোগী দুর্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং পরিশেষে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। পীড়া দ্বারা হৃৎপিণ্ড সাক্ষাৎ ভাবে বা অন্তঃসত্ত্বা আক্রান্ত হওয়া বশতঃ প্রবলপরিণামে অবসাদগ্রস্ত হয় পীড়ার পরিণাম ফল হৃৎপিণ্ডের উপর দর্শাইয়া বোগীকে শমনসদনে প্রেরণ করে এইজন্য নাড়ীর গতি পর্য্যবেক্ষণ যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

নাড়ীর গতি দ্রুত বা অদ্রুত, মৃদুমান বা সত্ত্বব গমনশীল, মৃদু বা বৃহৎ (পুষ্ট), চাপ সহনশীল বা চাপ অসহনশীল, নিয়মিত বা অনিয়মিত বা পর্য্যায়শীল হইতে পারে।

ଏକାଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ମଧ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱାର ନାଡ଼ି ଅନନ୍ଦ ହওয়া ଉଚିତ, ତାପେକ୍কা ଅଧିକ ବାବ ହେଲେ ତାହାକେ କ୍ଷତ ନାଡ଼ି ବଲ୍ଲ ବାସ୍ନ

କ୍ଷତ ବା ମନ୍ଦ୍ର ଗମନଶୀଳ ନାଡ଼ି ଅନନ୍ଦ—ପ୍ରାତୋକ ଅନନ୍ଦ ଆତ୍ମା-ବିକାପେକ୍কা ଭଗ୍ନ ସମୟ ବାସ୍ନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାତୋକ ତରଫ, ତରଫ ମଧ୍ୟାସନ୍ତୀ ସମୟର ଭୁଲନାଶ, ଭଗ୍ନାଶ୍ରମ ହାସି ହସ ।

ନାଡ଼ିର ଆକୃତି ମହଜାପେକ୍কা ବଡ଼ ହେଲେ ଚାର୍ଜ ପଲ୍ଲ ଏବଂ ମହଜାପେକ୍কা ଛୋଟ ହେଲେ ତାହାକେ ଅଳ୍ପ ପଲ୍ଲ ବଲେ ।

ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଚାପେ ନାଡ଼ିର ଅନନ୍ଦ ମହଜ୍ଜା ବଳ୍ଲ ହସ ତଥାନ୍ତ ତାହାକେ କମ୍ପେସିବଲ ପଲ୍ଲ, ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚା କର୍ତ୍ତେର ମହିତ ବଳ୍ଲ ହସ, ବା ଆଦୌ ବଳ୍ଲ ନା ହସ, ତଥାନ୍ତ ତାହାକେ ଟିନୁ କମ୍ପେସିବଲ ପଲ୍ଲ ବଲେ ।

ନାଡ଼ିର ଅନନ୍ଦ ଅନିୟମିତ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟଶୀଳ ହେଉ ଥାଏ । ଅନିୟମିତ ନାଡ଼ିର ଗତିକାଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଡ଼ିଅନନ୍ଦ, ବିଭୂତି, ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରକୃତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପକାବ ହସ । ପର୍ଯ୍ୟାୟଶୀଳ ନାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟା ମଧ୍ୟା ଏକ ଏକାଠି ଅନନ୍ଦନେର ବିବାସ ଦୃଷ୍ଟି ୧ ।

ଚାରି ପ୍ରକାର ଓ ଯା ହେଉଛି ନାଡ଼ିର ଗତି କ୍ଷତ ହସ । ଭଗ୍ନ, ହର୍ଷଣତା, ଉଦ୍ବେଗନ ଓ ଗୁରୁ ବାସ୍ନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାଡ଼ିର ଗତି କ୍ଷତ ହସ । ବେଗବର୍ତ୍ତୀ ନାଡ଼ିର କାଳେ ମାତ୍ର ମହଜ୍ଜା ହିସାବ ଚାଲେ । ଉଦ୍ବେଗନାଶ ନାଡ଼ିର କ୍ଷତତା ଯେ ନିମ୍ନ ହାସି ହସ ନା, ସତ୍ତ୍ୱାନ୍ତ ଉଦ୍ବେଗନା ଶାନ୍ତ, କେବଳ କ୍ଷତତା ନାଡ଼ିର କେବଳ ବାସ୍ନ ଗୁରୁ ବାସ୍ନ ବା ହିସାବିତା ଶୃଙ୍ଖଳା ନାଡ଼ିର ଅନନ୍ଦ ଗତି ନିମ୍ନେ ୧୫୦ ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉ ଥାଏ ଓ ନାଡ଼ିର ବେଗ ବଳ୍ଲ ହାସି ହେଉ ଥାଏ ।

କିନ୍ତୁ କେବଳ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶୃଙ୍ଖଳା ( ଭଗ୍ନ ମହଜ୍ଜା ବା ଭଗ୍ନବିହୀନ ) ଶୃଙ୍ଖଳା-



বায়ু পূর্বে থাকিলে, তাহা অবিলম্বে তিবোহিত হয়, তৎকালে বেগবতী নাড়ী অল্প কারণ বশতঃ হইয়াছে স্থির কবিত্তে হইবে

জবে উত্তাপের তাবতম্য অনুসারে নাড়ীর গতি স্খলিত হইতে পারে। সময় সময় নাড়ী স্পন্দন ও দৈহিক উত্তাপের সামঞ্জস্য থাকে না। দৈহিক উত্তাপ সমাবস্থায় থাকা সত্ত্বেও আরক্ত জবে নাড়ীর গতি টাইফয়েড জ্বরের অপেক্ষা অধিক দ্রুত হয়। তৎকালে টাইফয়েড জ্বরের অপেক্ষা ফ্যালেরি জবে নাড়ীর দ্রুতগতি অধিক বিপদাঙ্কার পবিচায়ক নহে। পূর্ণবয়স্ক অপেক্ষা বাল্যাবস্থায়, দৈহিক বর্ধিত উষ্ণতা এককপ হইলেও, নাড়ীর গতি অধিক দ্রুত হয়।

দৈহিক উত্তাপের তুলনায় নাড়ীর গতি অধিক দ্রুত হইলে তাহা হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতার পবিচায়ক। দৈহিক উষ্ণতা ও নাড়ীস্পন্দনের সামঞ্জস্যের অভাব অনুসারে এই দুর্বলতার তাব-  
তম্য হয়। এইকপ প্রকারে নাড়ীর গতি, বোগের ভাবীফল ও চিকিৎসা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের বিশেষ সহায়তা করে।

দিনের পব দিন নাড়ীর গতি ক্রমশঃ অধিক দ্রুত হইলে অথচ তৎসহ দৈহিক উত্তাপ সমভাবে থাকিলে তাহা হৃৎপিণ্ডের বর্ধিত মৌর্খল্যের চিহ্ন বলিয়া জানা উচিত।

সকল বিধ জ্বর পীড়ায় পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে ১২০ বারের অধিক স্পন্দিত হইলে তাহা গুরুতর পীড়ার ও হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতার জ্ঞাপক। ১৩০ বা ১৪০ বার নাড়ীর স্পন্দন প্রতি মিনিটে হইলে তাহা সাতিশয় বিপজ্জনক এবং ১৬০ বাব হইলে নোগী প্রায়ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। এইকপ নিয়মের ব্যতিক্রম বিউমোটিক বা বাত জ্বরে সংঘটিত হয়। এই জন্য বাতজ্বরে নাড়ী ৭ বীক্ষা কালে সতর্কতা সহকারে স্থির করা কর্তব্য।

যে, বাতজ্বর বশতঃ কিম্বা ফুৎপিণ্ডাচ্ছাদক পর্দার প্রদাহ বশতঃ নাড়ী অধিক বেগবতী হইয়াছে ১২০ বাব নাড়া স্পন্দন বাতজ্বর বশতঃ হইলে তাহা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এতদ্রূপ রোগীর দৈহিক উত্তাপ অত্যন্ত অধিক অর্থাৎ ১০৪ বা ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত, বোগী অবসন্ন, জিহ্বা সপ্তবতঃ শুষ্ক, ভ্রুচামাচন সর্ভির্জ বা মল সঞ্চিত হয় এইরূপ অবস্থাপন্ন বোগীর সচবাচন মৃত্যু হয় নাড়ী স্পন্দন ১২০ হইতে অধিক অর্থাৎ ১৩০ বা ততোধিক হইলে বোগী নিশ্চয়ই মৃত্যু-কবলিত হয়

যদি পেলিকার্ডাইটিস বশতঃ নাড়ীর গতি ক্ষত হয়, তবে তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প বিশ্লেষণক, যদিচ তৎসময় নাড়ী স্পন্দন ৭০ মিনিটে ১৫০ বা ১৬০ বাব হয় সচবাচন এক্ষণে রোগী দেখা যায়, যাহাদেব শুকতব পেলিকার্ডাইটিস পীড়া ও তদভ্যন্তরে অত্যন্ত মন্থ সঞ্চিত হয়, কিন্তু বাতজ্বর সামান্য ভাবে থাকে। দৈহিক উত্তাপ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় না, কেবল ১০১ বা ১০২ ডিগ্রী এবং কিম্বা পরিক্ষাব কিম্বা সামান্য নেপারূত থাকে এক্ষণে এইরূপ বোগীর নাড়ী স্পন্দন যদিচ ১৬০ বাব পর্য্যন্ত প্রতি মিনিটে হয় ও অত্যন্ত বিষয়ে নাড়ীর অবস্থা মন্দ হয়, অত্যন্ত চাপসহনশীল বা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও চাপ প্রয়োগে নাড়ী স্পন্দন অবরুদ্ধ হয়, তৎকালে আমবা জেদে রোগীর আবেগ্য হওয়ায় আশা করিতে পারি ফুৎপিণ্ডের বিধান সাধারণতঃ প্রদ হিত হয় এবং ফুৎপিণ্ড বিধানে এই দোষেয়া মন্থ মস্তকরণজনিত ক্রিমার ব্যাঘাত বশতঃ এতদ্ব্যসন এমন কি অত্যন্ত শ্বাসক্লম্ব, উপস্থিত হয় এইরূপ পীড়াক্রান্ত বোগীকে দেখিতে সতত মৃতবৎ দেখায়, তাহাব মুখমণ্ডল কালিম ও অত্যন্ত বিকৃত দেখায়, এই সকল চক্ষু যদি ফুৎপিণ্ডের অসুস্থতা নির্দেশ



স্থিতিকৃত হয়, তবে বোগীব আরোগ্যের আশা করা যাইতে পারে ;  
অধিক মাত্রায় ত্র্যাপ্তি আদি উত্তেজক প্রয়োগ বিনাও সফলের  
আশা করা যায় বস্তুতঃ তরুণ স্থংপিণ্ডচ্ছদ প্রদাহ কদাচ অবি-  
লম্বে সাংঘাতিক হয়, ইহা দ্বারা স্থংপিণ্ড প্রসারিত ও তৎসঙ্গে  
স্থংকপাটের পীড়া বা স্থংপিণ্ডের মেদোপকৃষ্টতা সমুপস্থিত হইলে  
বিলম্বে জীবনের অনিষ্ট হইতে পারে অত্যাশ্রয় উপসর্গ বিশিষ্ট  
বাতজ্বর সাধাবণতঃ বোগীব অবস্থা গন্দ হইলেও আরোগ্য হইতে  
পারে নিউমোনিয়া বা ফুফুস প্রদাহ উভয় দিকে হইলে ও  
তৎসঙ্গে স্থংপিণ্ডচ্ছদ প্রদাহ থাকিলেও তাহা হইতে রোগী আরোগ্য  
লাভ করিতে পারে

পুনশ্চ গাইট্র্যাল পীড়ার জন্ত বিষম নাড়ী অত্যন্ত দ্রুত অর্থাৎ  
প্রতি মিনিটে ১২০, ১৩০ বা ততোধিক বাব স্পন্দিত হইলেও  
অত্যন্ত বিপদাশঙ্কা থাকে না সময় সময় তরুণ জবের ( যেমন  
টাইফয়েড ফিভর ) যদিচ দৈহিক উষ্ণতা অধিক হয়, তথাচ নাড়ী  
স্পন্দন বোগ ভোগকালে স্বাভাবিক থাকে, তাহা হইলে তদ্রূপ  
নাড়ী স্পন্দন স্থংপিণ্ডের দৌর্বল্যের অবিদ্যমানতার পরিচয় প্রদান  
কবে এবং তাহা বোগীব ক্ষেপে সুলক্ষণ বলিয়া জানিবে

প্রাচীন পীড়ায় নাড়ীর দ্রুততা, সাধাবণতঃ স্থংপিণ্ডের দুর্বল-  
তার পরিচায়ক নাড়ীর দ্রুতগতির সহিত স্থংপিণ্ডের দৌর্বল্যের  
অত্যাশ্রয় চিহ্ন বর্তমান থাকে "স্থূহ অবস্থা অপেক্ষা এইরূপ দুর্বল  
স্থংপিণ্ড অল্প জোরে রক্ত সঞ্চালিত করে, ধামনিক চাপ ( টেমেন )  
হ্রাস ও নাড়ী কোমল ও চাপসহনশীল হয় ধমনী সমূহের নীচ-  
লতা বশতঃও নাড়ী চাপসহনশীল হয়, এইরূপ অবস্থায় অতি  
সহজে রক্ত শিবা মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ও তদ্বৎ ধামনিক চাপ হ্রাস

প্রাপ্ত হয় ধমনীগুলোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রাণী সমূহের এইরূপ শিথিলাবস্থা, সাধাবলতঃ স্থাপিণ্ডের অভ্যন্তর দুর্বলতা সমন্বিত থাকে, তজ্জন্তু নাড়ীর ক্রান্তি সহ তাহা সাধাবলতঃ চাপসহনশীল হয়। ধমনী সমূহের এইরূপ শিথিলাবস্থা হইতে, স্থাপিণ্ডের অভ্যন্তর দুর্বল না হইলে, নাড়ী মোটা ও পুষ্ট হয়। প্রথম দর্শনে এইরূপ নাড়ী, সবল বক্তা সম্মুখীন হইয়া চিহ্ন প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু চাপ সংযোগে নাড়ীর গতিবোধ হঠাৎ উক্ত লম্বি বিদূর্ণিত হয়। অতএব সর্বসময়ে নাড়ীর চাপসহনশীলতা পরীক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যদি স্থাপিণ্ডের অবস্থা আধিক দুর্বল হইয়া পড়ে ও ধমনীর শাখা প্রাণী সমূহ আনন্দিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্থাপিণ্ডের প্রতি স্পন্দনে ধমনীর মধ্যে অধিক পরিমাণে বক্তা প্রবিষ্ট হয় এবং সেই জন্তু নিবন্ধ মধ্যে মধ্যে বক্তা প্রবিষ্ট হইয়া পুনরাবৃত্তি করে, এই কারণে নাড়ী ক্ষুদ্র বা সরু এবং ক্রান্তি সহ চাপসহনশীল হয়। অতএব নাড়ীর ক্ষুদ্রতা স্থাপিণ্ডের গাতিশয় দৌরবল্যের পরিচায়ক। যখন নাড়ী অভ্যন্তর ক্ষুদ্র বা সরু হয়, তখন তাহাকে ক্ষুদ্রবৎ নাড়ী বলে। স্থাপিণ্ড যখন অভ্যন্তর দুর্বল হয়, তখন তাহার আকৃষ্টন সदा সর্বদা আকর্ষিত ও তাব, তাহা সর্বদা পূর্ণতা প্রাপ্ত ও সর্বদা হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায়। তজ্জন্তু নাড়ীর ক্রান্তি সহ হয় এবং তাহা অত্যন্ত নিশ্চিত চিহ্ন সমন্বিত থাকিলে স্থাপিণ্ডের দুর্বলতার পরিচয় প্রদান করে।

অতএব স্থাপিণ্ডের অবস্থা বিবেচনা করে নীচের ক্রান্তি, (বিশেষতঃ দৈহিক উত্তেজনার অনুপাতে) চাপ সহনশীলতা ও আকৃতি (ক্ষুদ্র বা মোটা) বিষয়ে বিদ্যমান মনঃসংযোগ করা কর্তব্য। নাড়ী অধিক ক্রান্ত, অধিক চাপসহনশীলতা অধিক ক্ষুদ্র হইলে তাহা

হৃৎপিণ্ডের অতিশয় দুর্বলতায় চিহ্ন এবং বোগীব বিপদাশঙ্কার অধিক পরিচায়ক, এইরূপ সময়ে হৃৎপিণ্ডোত্তেজক ঔষধের অধিক প্রয়োজন

এইরূপ নাড়ীর চিহ্ন, অবসন্নলিত বা অববিহীন পীড়ায় হৃৎপিণ্ডীয় উত্তেজক, বিশেষতঃ ত্র্যাণ্ডি আদি ব্যবহারের জ্ঞাপক। অধিকন্তু এই সকল নাড়ীর চিহ্ন, এল্কোহল অর্থাৎ ত্র্যাণ্ডি আদিব ক্রিয়া ও কি পরিমাণ আবশ্যক, তাহা প্রতিপন্ন কবে। এল্কোহল দ্বারা অবসন্ন হৃৎপিণ্ড সর্বল, স্পন্দনের দ্রুততা হ্রাস ও রক্তাধার সমূহ আকুঞ্চিত হয় এবং তন্মতে ধামনিক চাপ বর্দ্ধিত ও নাড়ীব চাপমহনশীলতা হ্রাস হয়।

তকণ ও প্রাচীন দ্বিবিধ পীড়া সমূহে হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা সহ সাধারণ দৈহিক দুর্বলতা বর্তমান থাকে তরুণ পীড়াগ্রাস্ত একপ রোগীব জন্ত আমরা আহুত হইতে পারি, যাহাতে প্রথমে কোনরূপ দুর্বলতাব পরিচয় পাওয়া যায় না, তাহাব দৈহিক উত্তাপ ১০২ হইতে ১০৩ ডিগ্রী; সে সহজে পার্শ্ব পরিবর্তন কবে ব শয্যার উপর উঠিয় বসে, তাহার শ্বস সর্বল, তাহার জিহ্বা আর্দ্র ও সামান্য লেপাবৃত, বা হয় ত পবিকাব সে আহাব কবে ও পবিপাকও ভালরূপ হয়; সে রাত্রিতে ভালরূপ নিদ্রা যায় ও প্রলাপবিহীন থাকে, বস্তুতঃ রোগীর সাধারণ অবস্থা দেখিলে বিপদাশঙ্কা করা যায় না; কিন্তু নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে ১৩০ এবং তাহা সূক্ষ্ম, চাপে রুদ্ধ ও দ্রুত, উত্তেজনা বশতঃ নহে, ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণে স্থিবিদ্ধ বস্তুতঃ এই বোগীর সমূহ বিপদ থাকে নাড়ীর গতি বা সাধারণ অবস্থা কিসের উপর অধিক দৃষ্টি বাধা কর্তব্য? নিশ্চয়ই সতর্ককারী নাড়ীব উপব; কারণ এইরূপ



একটী বোঁগীব গুণতব লক্ষণ সকল অঙ্গ করে ক দিনের মধ্যে পাক-  
শিত হয় ও তজ্জন্ত বোঁগী অবসন্ন বা মৃত্যুকবলিত হয়। তদাপি স্থলে  
অন্ত্যাত্ম লক্ষণাপেক্ষা নাড়ীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণে বিপরীতমত মতান্তর  
সূচিত হইয়া থাকে। আর একটা দৃষ্টান্ত একটা ওষধিকোষ  
বোঁগীকে প্রথমে দেখিয়া কোন গুণতব লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় না,  
কিন্তু যেমন বোঁগ ভোগ হইতে থাকে ও যৎবাধে বোঁগের সাধাবণ  
অবস্থা সন্তোষজনক থাকে, তখন নাড়ী ক্রমশঃ গতিতে আধিক শক্ত  
ও গতিহীন হয়। এখানেও পুনশ্চ নাড়ীর গতি মার্সা অক অবসন্ন-  
তাব আবির্ভাব পূর্বসূচিত করে। সময়ে ২ কোন: ২ বোঁগীব  
নিশেষত প্রযুক্ত নাড়ী সহজে অত্যন্ত দ্রুত হইতে পারে, কিন্তু  
তাহাতে বিপদ সূচনা করে না এমনও হইতে পারে।

ইহা সত্য যে, সময় ২ দিন চিহ্ন তত্ত্ব মতে প্রথমে আরম্ভ  
হয়, সম্ভবতঃ স্নায়ুগুণে অনিদ্রা ও প্রমোদ আকারে আরম্ভ হয়।  
পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, যতক্ষণ নাড়ীর গতি ভাঙ্গ থাকে, ততক্ষণ  
অঙ্গুলের কোন আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। যদি স্নায়ুগুণের  
বিশৃঙ্খলা বা ক্রিয়া বৈষম্য আপনাপনি কিন্না চিকিৎসা পাত্র ভ্রাম  
বা তিরোহিত না হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তে সাধাবণতঃ নাড়ী  
অবসন্ন ও বোঁগীব মৃত্যু হয়।

পর্য্যায়শীল নাড়ীতে মদ্যে ২ এক একটী সন্দেহের বিগ্রহ হয়,  
কিন্তু নাড়ী অন্ত্যাত্ম বিষয়ে সহজ থাকে। এত দিনের মধ্যে ২ বা  
অধিক অঙ্গুল, সম বা বিষম সময় ব্যবধানে হইয়া থাকে। ইহা  
স্পষ্ট বুলি উচিত যে, পর্য্যায়শীল নাড়ী হইতে বিষম নাড়ী স্পষ্ট  
কোন ২ ব্যক্তির জীবন পর্য্যায়শীল নাড়ী থাকিতে পারে, কিন্তু  
সাধাবণতঃ মদ্য বয়সেব পর ইহা প্রথম সমুপস্থিত হয়। ইহা সাম-

যিক বা স্থায়ী হইতে পারে এবং সচবাচর সাময়িক পর্যায়শীল নাড়ী বোগীর বিশেষ ধাতুপ্রকৃতি বশতঃ, কিম্বা কোন২ আহাৰ্য্য দ্রব্য বথা—চা হরিত চা, তাম্বকুটের ধূমপান বা অজীর্ণ বশতঃ উপস্থিত হয়। এই পর্যায়শীল নাড়ী সম্বন্ধে কোন কোন বোগী অনভিজ্ঞ থাকে, বিশেষতঃ পর্যায়শীলতা অভ্যস্ত হইলে হয়। অন্ত্যাত্ম ব্যক্তিগণ অপ্রসন্ন ও স্নায়ু প্রবণ থাকে ও হৃৎপিণ্ড বন্ধ বা গড়াইয়া গেল একপ অন্তত্ব কবে। এই পর্যায়শীলতা সচবাচর কেবল ধমনীতে জন্মে ও তৎসঙ্গে হৃৎপিণ্ডের দুর্বল স্পন্দন হয়।

অধিকাংশ স্থলে হৃৎপিণ্ডের পর্যায়শীল ক্রিয়া বিশেষ আশঙ্কাজনক নহে ও কোন প্রকাৰে জীবনকে বিপদ প্রাপ্ত করে না, কিন্তু ডাক্তার ব্রডবেন্ট বলেন, এইরূপ অবস্থাপন্ন বোগী কোন পীড়াক্রান্ত হইলে সহজে মৃত্যু মুখে নিপতিত হয়। হৃৎপিণ্ডের পীড়ার সঙ্গে নাড়ীর পর্যায়শীলতা সমধিক বিপদজনক।

বিষম বা অনিয়মিত নাড়ী পর্যায়শীল নাড়ী, অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক আশঙ্কাজনক। নাড়ীর বেগ ও তাল (বাইম) উভয়ই বিষম হইতে পারে, পববর্তী স্পন্দন দীর্ঘতা বা প্রস্রুতি, বেগ বা শক্তি ও প্রকৃতিতে বিভিন্ন প্রকাৰ হয়। ইহা সাধারণতঃ মাইট্রাল ও কদাচিত্ অন্ত প্রকাৰ হৃৎপিণ্ডীয় উপস্থিত হয়। হৃৎপিণ্ডের সান্তিশয অবসন্নতা (যেকপ ৩০০ বার বোগে মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্বে হয়) অবস্থায় নাড়ীরগতি বিশৃঙ্খল বা বিষম হয়। ইহাকে মাইট্রাল পল্স বলে এবং ইহা সাধারণতঃ ডিজিটেলিস প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করে, এতৎ প্রয়োগে নাড়ীর বিশৃঙ্খলা হ্রাস বা বিদূরিত হয়। মাইট্রাল পীড়ার জন্য এইরূপ বিশৃঙ্খলা ভেন্ট্রিকুলের প্রসারিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত অবস্থা সমন্বিত থাকিতে পারে। তৎসঙ্গে বাম

ভেটিং কেল স্মাভ বিক বা দুর্বল ও বিধানবিরূতি বিশিষ্ট থাকে  
 ছুপিঙের প্রাচীরেব বিধান বিরূতি থাকিলে ডিজটেলিস্ দ্বারা  
 নাড়ীর বিশৃঙ্খলা প্রায় নিরূপিত হয় না।

বিশৃঙ্খল বা বিষম নাড়া, সচরাচর মাইটাল পীড়ার পরিচায়ক  
 হইলেও ইহা স্বয়ং রাখা উচিত যে, বহু বিস্তৃত মাইটাল পীড়া মধ্যেও  
 নাড়ীর গতি স্বাভাবিক হইতে পারে।

দ্বাদশ বৎসরের নূন বয়স্ক বালক বালিকাদের নিম্ন নাড়া  
 কদাচিৎ হয়। যদি ৬৭ বৎসর বয়সে মাইটাল পীড়া প্রাক্তিত  
 হয় ও বোধী তাহা সম্ভব দ্বাদশ বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকে, তাহা  
 হইলে ৩৭পবে নাড়ীর আনয়মিত ৩ ক্রমঃ সম্পাদিত হয়।

যদিও মাইটাল পীড়া জন্ত বিষম নাড়া বাধ্যবস্থায় কদাচিৎ  
 দৃষ্ট হয়, তথাচ ভ্রান্ত্যব বিজ্ঞানের মতে তদ্রূপ ফোর্ট ট্রেন  
 একোনাইট প্রতি ঘণ্টাশ্রব অনেক বার প্রসূত হইলে নাড়ীর বিশৃ-  
 ঙ্খল গতি উৎপাদন করে। বাধ্যবস্থায় সপ্তদিক মাস্তুলদ্বয়ের  
 প্রদাহের প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় নাড়ীর বিশৃঙ্খল গতি সাধারণতঃ  
 পবিদৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ ইহা বিদ্যমানতা বোঝা নির্ণয়ের বিশেষ  
 সহায়তা করে।

এপর্যন্ত ছুপিঙের ব্যবহার উপর নাড়ী স্পন্দন নির্ভর করে  
 ইহা কথিত হইয়াছে। কিন্তু বক্তার সমূহ অবস্থা বস্তুতঃ  
 নাড়ী স্পন্দনের ইতর বিশেষ সংজ্ঞিত হয়।

ধমনী সমূহের পৈশিক পক্ষার উপর ডায়ামিটার প্রায়গণের  
 ক্রিয়া বস্তুতঃ শূন্য শূন্য রক্তাধার সঞ্চালিত হইয়া বা সংকুচিত হয়।  
 রক্তাধার সমূহ শিথিল হইলে রক্ত মধ্যে ধমনী হইতে শিথিল মধ্যে  
 প্রবিষ্ট হয়, তজ্জন্ত ধামনিক চাপ অল্প হয় ও তদ্বৎ নাড়ী কোমল



ও চাপ প্রয়োগে রুদ্ধ হয়, কিন্তু রক্তাধার সমূহের নিখিলাবস্থা বশতঃ নাড়ী স্থল বা বড় হয়। ধামনিক নিখিলাবস্থা বশতঃ নাড়ী কোমল, পুষ্ট বা বড় ও চাপসহনশীল তথাৎ অঙ্গুলির চাপে অবরুদ্ধ হয়।

অধিকাংশ পীড়ায় ধমনীর নিখিলাবস্থার সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা বর্তমান থাকে। কখন কখন ধামনিক নিখিলতাব সঙ্গে হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিক থাকে, তখন নাড়া কোমল ও চাপসহ, কিন্তু বড় হয়। এইরূপ নাড়া কোন কোন জ্বরের প্রথমাবস্থায় দৃষ্ট হয়। রক্তাধার বিপরীত অবস্থাপন্ন অর্থাৎ অত্যন্ত সংকুচিত থাকিলে বক্ত, ধমনী হইতে শিবা মধ্যে অতি কষ্টে প্রবিষ্ট হয়, ধামনিক চাপ অত্যন্ত অধিক থাকায় নাড়ী ক্ষুদ্র, কিন্তু কঠিন ও চাপসহনশীল হয়। নাড়ীর চাপসহনত্ব এস্থলে পরীক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজনীয়, অতথা নাড়ীর ক্ষুদ্রতা হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতাব জ্ঞাপক হইতে পারে, কিন্তু নাড়ীর চাপ অসহনতা দ্বারা উক্ত এম বিদূষিত হয় ও নাড়ীর ক্ষুদ্রতা, রক্তাধার সমূহের সংকুচিত অবস্থা হইতে উৎপন্ন, বুঝিতে পারা যায়।

যদিও ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে সাধারণতঃ রক্তের নিম্ন চাপ সম্বলিত কোমল, চাপসহ নাড়ী, দুর্বল হৃৎপিণ্ডের সহিত বর্তমান থাকে, তথাচ অনেক সময় ইহার ব্যতিক্রমও দৃষ্টিগোচর হয়। কারণ একটা রোগী অবসাদগ্রস্ত, এমন কি প্রায় মৃত্যুমুখে নিপতিত, ও তদুচ্চ অতি দুর্বল ত্রিগুণযুক্ত হৃৎপিণ্ড থাকা সত্ত্বেও রক্তের উচ্চ চাপ বিশিষ্ট নাড়ী থাকিতে পারে, মণিবদ্ধস্থ ধমনী কঠিন ও স্পর্শে দড়ির স্থায়ী অনুভূত হয় ও বাহ্য উপর পর্য্যন্ত খানিক দূর স্পর্শিত বুঝা যায়, ইহা ডায়াষ্টোল বা হৃৎপিণ্ডের দ্বিতীয় স্পন্দন বা শব্দের সময়ও হয়,

তৎসময় শজা দেশস্থ ধমনীও কঠিন ও দৃঢ় হয়। এইরূপ উচ্চ চাপ সংমিলন ও তজ্জন্ম ক্ষুদ্র ও দৃঢ় নাড়ীসহ মার্শিয়াম হৃৎপিণ্ড-দুর্বলতা ও সার্বক্ষিক দুর্বলতা সচরাচর বাণ্যাবস্থায় পরিদৃষ্ট হয় এবং সময় সময় সপ্তটিক মাস্তকচ্ছদ প্রদাহ ও বৈদিক বায়ুনলোভু প্রদাহ বা ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া বোগে সমাকভাবে দেখা যায়।

এই সকল বিষয় হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, বক্তের উচ্চ চাপযুক্ত নাড়ী থাকিলেই যে তাহা শুভজনক, একপ মত স্থির কবা যুক্তিসঙ্গত নহে। নাড়ীর দ্রুততা ও বক্তের চাপ যখন বিপরীত দিক দর্শন কবায়, তখন রক্তের চাপ অপেক্ষা নাড়ীর দ্রুততাব দিক লক্ষ্য রাখা ও নির্ভর কবা উচিত। যে সকল রোগীর হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত ক্ষীণ, যদিও নাড়ীর গতি ধমনীর উচ্চ চাপের জ্ঞাপক হয়, তথাচ নাড়ী দেখিয়া, সময় সময় হৃৎপিণ্ডের অবস্থা পরিক্ষা করিতে পারা যায় ও রোগীর ঠিক অবস্থা নির্দেশ করা যায়, যে সময় নাড়ীর দ্রুততার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়াও পূর্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ডায়াল্টোলের সময়ও নাড়ী কঠিন ও দৃঢ় অনুভব হয়, এবং মণিবদ্ধ হইতে খানিক দূর উপর পর্য্যন্ত উহা নির্দেশ করা যায়, কিন্তু প্রতি সিষ্টোল জন্ত নিষ্কৃতির সময় সহজাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অনুভূত হয়, রক্তের উচ্চ চাপ সত্ত্বেও এতদপ হয়, অধিকন্তু সামান্য চাপ সংযোগে সহজে নাড়ীর গতি বা তরঙ্গ অবরুদ্ধ হয়।

ধামনিক শিথিলতা অর্থাৎ ধামনিক চাপের হ্রাস বস্তুতঃ ডাষ্ট-এর্টিজম্ উৎপন্ন হয়। এইরূপ নাড়ীতে একটা আন্তরিক গোচক (সেকেণ্ডারি) তরঙ্গ আতিশয় বেশী বোধ হয়, ও তাহা সহজে অঙ্গুলি দ্বারা অনুভব করা যায় বস্তুতঃ ইহা এত সুস্পষ্ট হইতে পারে, যে একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ইহাকে



প্রাথমিক তবঙ্গ বলিয়া ভ্রম কবিত্তে পাবে ও তাহা ছুৎপিণ্ডেব আকুঞ্চনজনিত নাড়ীস্পন্দন বলিয়া ভ্রম হয় একজন শুশ্রূষা-কাৰিনী এই ভ্রমে পতিত হইয়া নাড়ীস্পন্দন দ্বিগুণ গণনা কবিয়াছিল। সচবাচৰ ডাইএটিজন্ বা দ্বিঘাত নাড়ী ধামনিক নিখিলাবস্থায় পৰিচায়ক ও তৎসঙ্গে ছুৎপিণ্ডেব দৌৰ্দ্ধল্য মিলিত থাকে কোন কোন চিকিৎসক এইরূপ নাড়ীৰ স্পন্দনে উহা নিৰ্যাবিত না হওয়া পর্য্যন্ত এল্কোহল ব্যবহাব কবিত্তে বলেন কিন্তু ডাঙাব বিস্তাব এই মতেব পোষকতা কবেন না নাড়ীৰ ক্রতগতিৰ প্ৰতি দৃষ্টি রাখা উচিত এবং নাড়ীৰ ক্রতগতি জন্ত এল্কোহল ব্যবহাব আবশ্যক বিবেচিত হইলে ডাইএটিজন্ বা দ্বিঘাত-যুক্ত নাড়ী উহা প্ৰয়োগেব অধিক প্ৰয়োজনীয়তা প্ৰতিপাদন কবে

নাড়ী বিশেষ ক্রত নহে, কিন্তু ডাইক্ৰোটস্ ও চাপমহ, কোন জ্বৰেব প্ৰথমাবস্থায় সমুপস্থিত হইলে, তাহা এল্কোহল প্ৰয়োগেব আবশ্যকতা প্ৰতিপন্ন কবে না; কিন্তু এইরূপ অবস্থা প্ৰাদুৰ্ভূত হইলে অনতিবিলম্বে উত্তেজক আবশ্যক হইবে বুঝিতে পাবা যায় এবং বোগীকে সতৰ্কতা সহকাৰে পৰ্য্যবেক্ষণ করা উচিত তাহাৰ আগাগা অবসন্নতা বিদূৰিত কৰিবাব উপায়াবলম্বন বিধেয় টাইফয়েড জ্বৰে সচবাচৰ নাড়ীৰ ডাইক্ৰোটস্ অবস্থা সমুপস্থিত হইতে দেখা যায়

ধামনিক উচ্চ চাপ প্ৰযুক্ত যেকূপ নাড়ীৰ গতি হয়, তদ্বিষয় এক্ষণে বিবৃত হইতেছে

ধমনী সচরাচৰ ক্ষুদ্ৰ কিন্তু কখন কখন বৃহৎ, কঠিন ও পাকান দড়িব স্থায় ইহা অঙ্গুলি দ্বাৰা সঞ্চালিত ও বাহু পৰ্য্যন্ত সহজে অলুপ কবিত্তে পাবা যায়

এইকপ অবস্থাপন্ন ধমনীৰ গতি এত অধা যে, ইহা দুৰ্গন্ধ নাড়া  
বলিয়া ভ্ৰম জন্মিতে পাবে, বিজ্ঞ চাপে ইহাৰ গতি ভৱিষ্য ন  
হওয়ায়, সে ভ্ৰম অপসৰিত হয় ততাত্ত তৰিব বৰ সোঁত  
বেবল গতি কক হইতে পারে বস্তুতঃ ইহা অধা স্পন্দন মূৰ নাড়া,  
কাৰণ ধাৰ্মনিক বক্তেৰ অধিক উচ্চ চাপ সূক্ত কামান অধি স্পন্দন  
প্রতি স্পন্দনে সামান্য বিস্তৃত হয়, তৎকা নাড়া স্পন্দন অস্পষ্ট  
থাকে এই নাড়া মূৰ ভিন্ন কঠিন ও মৃদু গতি বিশিষ্ট হয়

নিম্নোক্ত অবস্থাবসতঃ ধাৰ্মনিক চাপ বৰিত হয়

১ বক্তাবাব সমূহেব বিধান কৃতি বা অপকৃষ্টতা

২ মূৰগহিৰ পীড়া, বিশেষ তঃ মূৰুচিৰ মূৰু হি

৩। গাউট বা মূৰু সন্ধি বাত, কামনা বা শ্বাবা, মাস ধাতু  
জনিত বিষাক্ততা, আৰ্গট, গ্যাৰ্গি এমিড

৪ সায়ুমণ্ডলেব অস্থস্থতা বা পীড়া।

৫ জবেব শীত বা কাম্প

এইকপ নাড়া নিঃসন্দেহ ধাৰ্মনিক কাৰণ হৈত বা সৌন্দৰ্য্য অপকৃষ্টতা  
সম্বন্ধিত থাকে, তৎসময় নাড়া কঠিন, মূৰু ও মূৰু কৰ ও স্পন্দন বৰিত  
দড়িবমত ও পূৰ্ণ অস্থস্থত হয় বৰিত ধাৰ্মনিক চাপ অধা  
ধমনীৰ সৌন্দৰ্য্য অপকৃষ্টাবস্থা অধিক পৰবেৰ সৌন্দৰ্য্য ধাৰ্মনিক  
চাপ ও সৌন্দৰ্য্য বিধান পৰিৱৰ্ত্তন এবঃ বৰিৰে মচৰাচৰ উৎপন্ন  
হয় যখন বৰিত চাপ ধাৰ্মনিক বিধানাবস্থা অধা হয়, তৎ  
বিধানাপকৃষ্টতা অধিক পৰবা হৈত, তখন বৰিৰ ভাৰ যেন  
আস্ফাজনক এইকপ অনেক বোগেব পীড়া সংশ্ৰাম যোগে  
পৰাবসিত হয়

ব্রাইটাণ্ড পীড়ায় উচ্চ ধাৰ্মনিক টেনশন বা চাপ বিদ্যমান থাকে,

তৎকাল ও মেদবিশিষ্ট পীড়ায়, বিশেষতঃ সংকুচিত মূত্রগ্রন্থি পীড়ায়, সমুপস্থিত হয় বস্তুতঃ উচ্চ ধামনিক চাপ ও হৃৎপিণ্ডবিবৃদ্ধি সহযোগে অধিক পবিমিত জলীয় মূত্র ও তাহাতে সামান্য পরিমিত আণুলালিক পদার্থের সম্ভাব্যতঃ এইরূপ আকাবেব ব্রাইটস পীড়া নির্ণয়ে সক্ষম হওয়া যায় এলবুমিনয়েড মূত্রগ্রন্থি পীড়া সহ উচ্চ ধামনিক চাপ বর্তমান থাকে না।

৩য়ঃ পীড়ার অবস্থা সমূহে নাড়ীর গতিব পরিবর্তন কিরূপ হয়, পুনরুজ্জীবিত্ব দোষ হইলেও তাহা এস্থলে বিবৃত হইল প্রথমে, পূর্বের সবল ও দৃঢ় দেহ বিশিষ্ট ছিল, একপ এক ব্যক্তির নাড়ীর প্রকৃতি সম্বন্ধে বলিব অব্যবহিত বিভিন্ন অবস্থায় নাড়ীর গতি বিভিন্ন প্রকার হয় একটী কম্পন বা সন্নিবাস্ত জব বোঝাইব দৃষ্টান্ত দেখিলে ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। শীত বা কম্পের সময় ধমনীসমূহ সংকুচিত ও বস্তুর উচ্চ চাপযুক্ত নাড়ীর গতি হয় এই সময় নাড়ী দ্রুত, ক্ষুদ্র, অনেক সময় অত্যন্ত ক্ষুদ্র, কঠিন, চাপ-অসহন-শীল ও দীর্ঘ কিম্বা মূত্রগতিযুক্ত হয় শীতান্তে উষ্ণতাব প্রাদুর্ভাব নাড়ী বড় বা মোটা, কিন্তু এ পর্য্যন্ত হৃৎপিণ্ড দুর্বল হইয়া না পড়ায় নাড়ী বড় ও পুষ্ট হয় ও সহজে চাপে রুদ্ধ হয় না, কিন্তু লক্ষ্যনশীল হয় অব অধিক দিন পর্য্যন্ত ভোগ ও রোগী দুর্বল হইলে নাড়ী অধিক কোমল, চাপ সহ, দ্রুত (কুইক, প্রতি স্পন্দন সহজ অপেক্ষা অল্পক্ষণ স্থায়ী) এবং সচরাচর ডাইক্রোটম বা দ্বিঘাতী হইয়া থাকে

সাতিশয় অবসাদগ্রস্ত অব রোগীর নাড়ী ক্ষুদ্র, দ্রুত (স্ট্রীট বা কুইক), অত্যন্ত চাপ সহ ও স্পন্দন দ্রুততর হয়; নাড়ীর এই সকল প্রকৃতি, পীড়া মৃত্যুতে পর্য্যবসিত হইলে, তৎপূর্ব্ব অধিকতর

সুস্পষ্ট হয়। পূর্ব হইতে দুর্বল রোগী হঠাৎ তরুণ পীড়াক্রান্ত হইলে প্রথম হইতেই নাড়ীর প্রকৃতি পূর্বোক্তরূপ হয় আরেব হ্রাসবস্থায়, বিশেষতঃ পীড়া সহসা পর্যাবসিত হইলে ও তৎসঙ্গে অধিক শ্বেদস্রাব থাকিলে, বোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া না পড়িলে নাড়ী বৃহৎ, অত্যন্ত কোমল, সহজে চাপসহ, দ্রুত ও ডাইক্রোটস হয়। সজ্বর পীড়ায় রোগের বর্দ্ধিতাবস্থায় এবং অরবিহীন পীড়ায় যখন অধিক শ্বেদস্রাব হইতে থাকে, তখন এইরূপ নাড়ী স্পন্দন সাধারণতঃ পরিদৃষ্ট হয়। তরুণ বাত পীড়ায় নাড়ীর গতি এইরূপ হয়, কানন এই পীড়ার সঙ্গে সাধারণতঃ শ্বেদস্রাব থাকে। পুনশ্চ জ্বরপীড়ায় ঔষধের সাহায্যে যখন শুষ্ক চর্ম্ম আর্দ্র হয়, তখন নাড়ী কোমল, বৃহৎ ও চাপসহ হয়। সুস্পষ্ট এণ্টিক রিগর্জিটেশন পীড়ায় নাড়ীর গতি সচরাচর বিশেষ প্রকার হয়। এই নাড়ী বিবিধ প্রকার হয়, ও তাহা রিগর্জিটেশনের পরিমাণ ও স্থাপিণ্ডের বলের উপর নির্ভর করে। নাড়ীর গতি ক্রমশঃ বাড়িয়া চব্বস গীমা প্রাপ্ত হয় এবং তৎপবে সহসা অবকল্প বা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, ভেন্ট্রিকেলের ভিতর রক্ত পুনঃ প্রবিষ্ট হওয়ায় পূর্বোক্ত হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে।

অধিক বর্দ্ধিত রোগীর নাড়ীর তীক্ষ্ণ, ও দ্রুত স্পন্দন অসুস্মিতে অসুস্মৃত হয়। নাড়ী স্পন্দনের আকস্মিক প্রবেশ অসুস্মিতে ধাক্কা লাগে। ইহাই নাড়ীর গতি নিদায়ক প্রকৃতি কোন কোন বোগীর, বিশেষতঃ যখন স্থণ্ডে ও দুঃখম থাকে, তখন যদি কয়েকটী অঙ্গুলি নাড়ীর উপর চাপ দিয়া চাপ হ্রাস বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে নাড়ী স্পন্দন বৃদ্ধি পায়। ইহাকে ছটাবাবৎ বা শটী পম্পস বলে।



এয়টিক রিগজিটেশনে নাড়ী স্পন্দন দেখিতে পাওয়া যায়, ও তাহা মস্তক ও গ্রীবাব ধমনীতে অর্থাৎ ক্যারোটিড ও টেম্পোরাল ধমনীতে সুস্পষ্ট দেখা যায় বাহু মস্তকোপরি উত্তোলন করিলে মণিবন্ধস্থ ধমনীতে অধিকতর সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় এই দৃশ্যমান নাড়ী সম্ভবতঃ ডায়াষ্টোল কালে ধমনী সমূহেব শূন্যতা বশতঃ হয় রক্ত, বিনা-আয়ামে শিবা মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ও এয়টী দ্বাৰা অধিক বক্ত পুনরায় হৃৎপিণ্ডাভ্যন্তরে চালিত হয়, তজ্জন্ত ধমনী অসম্পূর্ণভাবে পৰিপূৰ্বিত হয়, ও প্রতি সংকোচনে বক্ত প্রাপ্ত হওয়ায় অধিক বিস্তৃত হইয়া পড়ে গ্রীবা ও মস্তকের ধমনীর দৃশ্যমান স্পন্দন, এয়টিক রিগজিটেশন ভিন্ন রক্তাধার সমূহেব মৌজীণ সিধান বিকৃতি, সাতীশয় ধামনিক শিথিলতা ও উচ্চ ধামনিক চাপ বশতঃও হয় কেবল উদ্দীপনা, হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের বল বৃদ্ধি করে, সচরাচর তজ্জন্ত স্নায়ুপ্রধান ব্যক্তিদিগেব ক্যাবোটিড পল্‌সেশন দেখা যায় এবং ঈদৃশ ঘটনা সচরাচর জীলোকদিগের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এই স্নায়বীয় স্পন্দন কদাচিৎ গ্রীবাব অর্দ্ধাংশের উপবি পর্য্যন্ত যায় এবং তজ্জন্ত সাধারণতঃ গুরুতর কারণ সম্ভূত দৃশ্যমান ক্যাবোটিড পল্‌সেশন দৃষ্টে তাহা অবিলম্বে অবধারিত হয় কর্ণের নিকট পর্য্যন্ত ক্যাবোটিড ধমনীৰ সম্পূর্ণ দীর্ঘতায়ও শংখ দেশীয় ধমনীৰ দৃশ্যমান স্পন্দন ও সম্ভবতঃ মূখমণ্ডলের ধমনীৰ দৃশ্যমান স্পন্দন, সচরাচর এয়টিক রিগজিটেশন বশতঃ হয়। পেরিকার্ডাইটিস (কার্ডাইটিস সংযুক্ত) বা পেরিকার্ডিয়েল এফিউজন বা রস সঞ্চয় পীড়ায় ধমনীৰ স্পন্দন দৃশ্যমান হয়। সোমোট্র পীড়ায় ধমনীবর্গের শিথিলতা বর্তমান থাকে। এয়টিক রিগজিটেশন, ধমনী সকলেব ডিজেনারেশন বা বিধানবিকৃতি ও উচ্চ ধামনিক

চাপ বা টান বশতঃ স্পষ্ট ধামনিক স্পন্দন ক্যারোটিড বার্তীতেও  
ত্রেকিয়েল, রেডিয়েল ও অল্‌না প্রভৃতি ধমনীতে পরিদৃষ্ট হয়।  
পূর্বেক্ত ত্রিবিধ অবস্থা সংমিশ্রিত থাকিতে পারে। মধ্য ও বৃদ্ধ  
বয়সে এযটির গীড়া হয় এণ্ডোআর্টারিটিস ও এণ্ডোকার্টিটিস  
গীড়া বশতঃ স্বধমনী ও অস্থান্য ধমনীর বিধানাপকৃষ্টতা উৎপন্ন হয়।  
পুৰাতন প্রদাহ দ্বারা সমগ্র ধমনীমণ্ডলী আক্রান্ত হয় ও তাহাদেয়  
স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস ব'লে হওয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তাদার মণ্ডলীখননী  
সংকুচিত হয় ও তজ্জন্ত ঘর্ষণের আধিক্য জন্মে এবং বক্তা সম্বলনের  
অধিকতর বাধা সমুপস্থিত হয় ও তজ্জন্ত ধমনীর চাপ ও বৃদ্ধি পায়।

দৃশ্যমান ত্রেকিয়েল পল্‌শেসন, ধমনীর বিধানাপকৃষ্টতা বা  
এয়টিক রিগর্জিটেশন, কি কারণে হইতেছে তাহা কি উপায়ে স্থির  
করা যাইতে পারে? ধমনীর ডিঅেনারেশনে ধমনী সকল দীর্ঘ  
ও কুঞ্চিত, কল্লইয়ের উপরে ত্রেকিয়েল আর্টরী সহজে দেখা যায়।  
কুঞ্চিত বা কৌবড়ানবৎ নাড়ী সচরাচর ধামনিক বিধানাপকর্ষ  
জন্ত হয় অধিকন্তু ধামনিক বিধানাপকর্ষে ধমনী সকল কঠিন  
ও পাকান দড়িব (কর্ড) প্রায় অনুরূপ হয়, সমস্ত রক্ত তাহা হইতে  
চাপ প্রয়োগে বিদূবিত কবিলেও অনুরূপ করা যায় এবং সময়  
সময় ক্যাব্‌সেরস প্লেটস বা এথিবোমেটস বাঠিষ্ঠ স্পষ্ট অনুভূত  
হয় ত্রেকিয়েলের প্রায় ধমনীবর্ণের বুদ্ধিত অবস্থা সকল সময়  
বিধানাপকর্ষের পরিচায়ক নহে। উচ্চ ধামনিক চাপ বশতঃও  
ধমনীর ঈদৃশ অবস্থা সমুপস্থিত হইতে পারে, এই উচ্চ চাপ অধিক  
সময় স্থায়ী হইলে হয় কিন্তু ব্রাইটাণ্য গীড়ায় ঈদৃশ অবস্থা উচ্চ  
চাপ বশতঃ হইতে দেখা যায় না। ডাক্তার ব্রড্‌বেট ও রিচার্ড  
মহোদয়দ্বয়ের এই মত।

এয়টিক রিগর্জিটেশনে হস্ত উত্তোলিত কষিদে বেডিয়েশ  
পলসেশন দৃষ্ট হয় ধাগনিক বিধানাপকর্ষ বশতঃও ঈদৃশ ঘটনা  
হইতে পারে বাল্যাবস্থায় অত্যন্ত এয়টিক রিগর্জিটেশন থাকিলেও  
নাড়ী স্পন্দন কদাচিৎ দৃষ্ট হয়

এয়টিক অব্‌ট্রক্সন বা হৃৎধমনীৰ অববোধে বাম ভেণ্ট্রিকুলেব  
কোনরূপ বিধানাপকর্ষ না থাকিলে নাড়ী মুহু গতিযুক্ত (স্লো),  
সাধারণতঃ ক্ষুদ্র, অক্ষত ও সচবাচর কঠিন থাকে বিবৃদ্ধ  
ভেণ্ট্রিকুল, হৃৎধমনীৰ সংকুচিত ছিদ্র দিয়া মুহুভাবে রক্ত সঞ্চালিত  
করায় নাড়ী ক্ষুদ্র ও মুহুগতিযুক্ত হয়। প্রতি সিস্টোল দীর্ঘ  
হওয়ায় নাড়ী অক্ষত হয়

স্মৃষ্ট মাইট্রাল অব্‌ট্রক্টভ পীড়ায় নাড়ী যখন বিষম না হয়,  
তখন ক্ষুদ্র ও চাপসহ থাকে

### চর্ম-পরীক্ষা ।

চর্মের অবস্থা দৃষ্টে পীড়ার লক্ষণ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ পাওয়া  
যায় এখানে কেবল শুষ্ক, আর্দ্র ও অধিক শ্বেদাভিযুক্ত চর্ম  
সম্বন্ধে আলোচনা হইবে

অনেক প্রকার জ্বরে অত্যধিক উত্তাপ স্থায়ী থাকিলে চর্ম  
উষ্ণ, সচব'চর অক্ষ'যুক্ত বা তীব্র উষ্ণ থাকে এক্ষণে যদি  
যৌগীর চর্ম তৃপ্তিকরভাবে আর্দ্র করিতে পারা যায়, তাহা হইলে  
রোগী সমূহ তৃপ্তি ও আবাস অশ্ল'ব করে। স্বল্প মাত্রায় ঘন ঘন  
টিংচর একোনাইট বা টার্টার এমেটিক বা পূর্ণ মাত্রায় লাইকর  
এমোনিয়া এসিটেট ও ঘণ্টাস্তর প্রযুক্ত হইলে শ্বেদপ্রাব হইতে

পাবে একোনাইট ও টাট্টার এমেটিক অধিকতর সুফলদায়ক  
জ্বরে ফুস্ফুসেব কোন উপসর্গ না থাকিলে একোনাইট উৎকৃষ্ট ;  
কিন্তু সর্দি, বায়ুনলীভুজ প্রদাহ বা ফুস্ফুস প্রদাহ থাকিলে টাট্টার  
এমেটিক অধিকতর উপযোগী

বহুমূত্র বা ডায়াবিটিস ও এইটাখা পীড়াক্রান্ত অনেক রোগীর  
শুষ্ক চর্ম ঘর্ষাভিষিক্ত করাইতে পারা যায় না

শ্বেদাবির্ভাব দৃষ্টে সচরাচর চিকিৎসার ও ভাবীখল নির্ণয়ের  
সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঘর্ম নিঃসরণেব দুইটী প্রধান কারণ, যথা দৌর্লভ্য ও জ্বরে  
দৈহিক উত্তাপ হ্রাস ; এই দুইটী কারণ অনেক সময়ে এবৎ  
সংমিলিত থাকে অবসাদকর জ্বরপীড়া ও ক্ষয়কাসে স্বেদশ ঘটনা  
সংঘটিত হয়

জববিহীন বোগীর শ্বেদস্রাব প্রবণতা সচরাচর দুর্লভতাব  
পরিচায়ক, অধিকন্তু এতদ্বারা দৌর্লভ্যেব পরিমাণও স্থিরীকৃত হয়।  
অবসাদগ্রস্ত স্বাস্থ্য বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রমে, এমন কি অতি সামান্য প্রমে  
বা কোনরূপ উদ্দীপনা জন্মিবে অতিশয় শ্বেদাভিষিক্ত হয় ব্যায়াম-  
শিক্ষক, ব্যায়ামকারী অতিশয় ঘর্ষাভিষিক্ত হইলে তারার স্বাস্থ্য  
ভাল নহে বুঝিতে পাবে

পুনশ্চ অবসাদনকর পীড়ায় ও রোগান্তেব দৌর্লভ্যে সামান্য  
পরিপ্রমে কিম্বা নিদ্রারহস্য মও অতিশয় ঘর্ম নিঃসৃত হয় ইহা  
মনে রাখা উচিত যে, স্বস্থাবস্থায় বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার  
শ্বেদস্রাব প্রবণতা দৃষ্ট হয়

জ্বরপীড়ায় আকস্মিক দৈহিক উত্তাপ হ্রাস হইবার কালে  
অত্যন্ত ঘর্ম নিঃসৃত হইয়া থাকে স্বেদশ ঘটনা পর্যায়বর্তী



জ্বরের ঘর্ষাবস্থায় ও পায়িমিয়া নামক গীড়াব কম্পাতে সংঘটিত হয় স্নায়কাসাক্রান্ত বোগী, যাহাদের দৈহিক তাপের দৈনিক সান্টিশয় পরিবর্তন সংঘটিত হয়, রাত্রিতে ১০২ ডিগ্রী বা ততো-ধিক হয় ও তাহা প্রত্যুষে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তাহাদের দৈহিক উত্তাপ হ্রাসের সঙ্গে দেহ ঘর্ষাভিযুক্ত হইয়া থাকে অর বোগীর শ্বেদ স্রাবের পরিমাণ, দৈহিক উত্তাপ হ্রাসের তাবতম্যও রোগীর দুর্বলতার উপর নির্ভব করে যখন দুর্বলতা অত্যন্ত অধিক থাকে, তখন শ্বেদস্রাবও সচবাচর অত্যন্ত অধিক হয়; কিন্তু দৈহিক উষ্ণতা ২ ডিগ্রী বা তদপেক্ষা কম পরিমাণে হ্রাস হয়।

প্রোক্ত দ্বিবিধ প্রকার শ্বেদস্রাব, যখন অসংমিলিত থাকে, তখন সহজে তাহা প্রভেদ করা যায় পাইয়িমিয়া ব্যতীত অন্তবিধ জ্বব গীড়ায় নিত্য একবার উত্তাপ বৃদ্ধি ও হ্রাস পায় এবং উজ্জ্বল জ্বরের উত্তাপ হ্রাস বশতঃ ঘর্ষা নিঃসরণও দিনে একবার, প্রধানতঃ তাহা অতি প্রত্যুষে হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে দৌর্বল্য জন্ত শ্বেদস্রাব, যে কোন সময়ে ও বাবস্থাব হইতে পারে; ও তাহা শ্রম, নিদ্রা বা উদ্দীপনা বশতঃ সমুৎস্থিত হয়।

অগ্রান্ত তরুণ জ্বাপেক্ষা আবদ্ধ জ্বরে সচবাচর অধিকক্ষণ স্থায়ী ও অধিক পরিমিত শ্বেদস্রাব হইয়া থাকে তদ্ব্যতীত আরক্ত জ্বব আরোগ্য হইবার কালে দেহে বড় বড় ঘামাচি (সিউডো-মিনা) বাহিব হয় ও উপত্বক পরিপূর্ণিত হইবার সুবিধা হয়

বাতজ্বব (রিউমেটিক ফিবার) বতীত তরুণ জ্বরের প্রথমাবস্থায় দৈহিক উত্তাপ বেশী থাকিলেও অত্যধিক শ্বেদস্রাব হওয়া সান্টি-শয় দৌর্বল্যের ও ভাবীকলের শুকত্বের পরিজ্ঞাপক যখন প্রচুর শ্বেদস্রাবের সঙ্গে মুখমণ্ডল, কণ ও নথের নিম্নে কালিয়া

পরিদৃষ্ট হয়, তখন তাহা স্থূপিতের চূর্ণলতা ভূমিত রক্ত সঞ্চালনের  
মুহূর্ত্তা জন্ত সংঘটিত বলিয়া স্থির করিতে হইবে ইহাও রোগের  
গুরুত্বের পরিজ্ঞাপক। চর্ম্ম স্পর্শ কবিলেও রোগীর অবস্থা  
পরিজ্ঞাত হওয়া যায় অত্যন্ত স্বেদনিঃসরণ জন্ত চর্ম্ম কোমল ও  
চট্‌চটে হইলে তাহা সার্বাস্থিক দৌর্ব্বল্যের চিহ্ন, তৎসময়  
নাড়ী কোমল, বৃহৎ ও চাপসহ হয় এই লক্ষণ বর্ত্তমানে সচ-  
রাচর এককোহলিক উত্তেজক ব্যবস্থা করিবার আবশ্যক হয়।

### মূত্রে পরীক্ষা।

স্বাস্থ্যবস্থায় প্রস্রাবে বর্ণ তৃণবৎ, উষ্ণ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ এবং  
দৈহিক তাপের সম পরিমিত তাপ বিশিষ্ট থাকে। ইহার আক্ষে-  
পিক গুরুত্ব স্বাস্থ্যবস্থায় ১০০৫ হইতে ১০২০ পর্য্যন্ত হয় মূত্রেব  
উপাদান সকল রক্তের মধ্যে থাকে এবং মূত্রগ্রন্থি দ্বারা তাহা  
হইতে নিষ্কাশিত হয় শবীর হইতে এই সকল পদার্থ রীতিমত  
ভাবে নিঃসৃত না হইলে তাহা বোগপ্রবণ হইয়া উঠে প্রস্রাব  
কখন বেশী ও কখন কম হইয়া থাকে প্রস্রাবের স্বাভাবিক  
উপাদান ভিন্নও অন্যান্য পদার্থ নানা কারণে তৎসহ নিঃসৃত হইয়া  
থাকে। শোণিতের স্বাভাবিক অবস্থা বিচ্যুতি ব মূত্রগ্রন্থি, মূত্র  
প্রণালী ও মূত্রাশয়ের গীড়া বশতঃ মূত্রের স্বাভাবিক উপাদান  
পরিবর্ত্তিত ও তৎসহযোগে অন্যান্য পদার্থ সংমিশ্রিত হয় দেহের  
ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় প্রস্রাবের বর্ণ ও উপাদান সমূহের ইতর বিশেষ  
হইয়া থাকে। শ্রমবিরতি, উপবাস, নিদ্রা, আহার্য ও পানীয় দ্রব্যের  
পরিমাণ এবং চর্ম্ম ও বহির্জায়ের প্রকৃতি অনুসারে মূত্র নিঃসরণের  
পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়

স্নাতিশয় দৈহিক শ্রমাস্তে ও জ্বাদি তরুণ পীড়ায় মূত্রের বর্ণ অত্যন্ত ঘোরাল বা লাল হয় মূত্রে রক্তের ভাগ থাকিলে উহা দেখিতে ধূস্রবৎ হয়, পিত্তের বর্ণদ পদার্থ বিদ্যমানে পীতাত দৃষ্ট হয়। সুস্থ ব্যক্তির প্রস্রাব কিয়ৎকাল একটী পাণ্ডে ধরিয়া রাখিলে মূত্রাশয় ও মূত্রনলী হইতে নিঃসৃত শ্লেষ্মা উহার সঙ্গে বিমিশ্রিত থাকায়, নিম্নে জমিয়া যায় ইহা স্বাভাবিক অবস্থায়ও হইতে পারে। প্রস্রাবে শ্লেষ্মা, পুয় ও ফস্ফেট ঘটিত লবণ থাকিলে উহা ঘোলা দেখায় মূত্রের স্বাভাবিক উষ্ণতা বশতঃ ইউরিক অম্লযুক্ত লবণ দ্রবীভূত থাকে, কিন্তু মূত্রনিঃসরণের কিছুকাল পরে মূত্রের উষ্ণতার হ্রাস জন্ত উহা দানাকারে জমিতে দেখা যায় এবং উত্তাপ প্রয়োগে পুনরায় গলিয়া যায় ইউরিয়া বিশ্লিষ্ট ও তজ্জন্ত কার্বনেট অব্ এমোনিয়ার উৎপত্তি হইলে মূত্রে এমোনিয়ার গন্ধ পাওয়া যায় মূত্রে ইউরিয়া আদি পদার্থের অধিক সমাবেশ জন্ত আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়িয়া যায় প্রাতঃকালোব নিঃসৃত প্রস্রাব, আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ার্থ ব্যবহার্য্য একটী কাচের নলের মধ্যে প্রস্রাব ঢালিয়া লইয়া তাহাতে ইউরিনিমেটার দিয়া গুরুত্ব পরীক্ষা করিতে হয় বিবিধ কারণে মূত্রের আপেক্ষিক ভারের হ্রাস বৃদ্ধি হয় মূত্রে জলীয়াংশ অধিক হইলে ভাব বা গুরুত্ব হ্রাস ও অল্প হইলে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রস্রাবে শর্করা ও ইউরিয়া অধিক থাকিলে তাহা গাঢ় হয় জ্বর ও অন্যান্য বিধ তরুণ পীড়ায় ইউরিয়া আদি পদার্থ সমূহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় আপেক্ষিক গুরুত্বও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ব্রাইটাখা পীড়ায় মূত্রগ্রন্থির বিধানোপাদনের বিকৃতি বশতঃ শোধিত হইতে মূত্রের উপাদান সমূহ নিয়মিত পরিমাণে নিঃসারিত হইতে না

পারায় মূত্রের আপেক্ষিক ভার প্রায়ই কম হইয়া থাকে। যে সকল পদার্থ মূত্র সহ বাহির হওয়া উচিত, তাহা না হইতে পারায় শোণিতে সঞ্চিত থাকিয়া তাহাকে অবিশুদ্ধ বা বিষাক্ত কবিয়া তুলে। সেকপ অবস্থা অতিশয় সঙ্কটজনক ডায়াবিটিস ইন্সপিডম্ পীড়ায় মূত্রের জলীয়াংশ কেবল বৃদ্ধি পাওয়ায় আপেক্ষিক ভার কমিয়া যায়, এমন কি ১০০৫ পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। সেইরূপ মূর্ছাবায়ুও অস্বাভাবিক স্বাভাবিক পীড়াবেশের পূর্ব মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি ও আপেক্ষিক ভার কম হইয়া থাকে।

প্রস্রাব—অম্ল, ক্ষার বা সমক্ষারাম প্রতিক্রিয়া বিশিষ্ট হয়। ক্ষারিক অম্ল ও তৎসংক্রান্ত লবণ, ইউরিক ও হিপিউরিক অম্ল এবং সময় সময় ল্যাক্টিক, অগ্জ্যালিক প্রভৃতি অম্ল হইতে প্রস্রাবে অম্লত্ব উৎপাদিত হয়। প্রস্রাবে স্থায়ী ও উদ্বায়ী দ্বিবিধ ক্ষার-ময় পদার্থ থাকে। চিকিৎসা কালে মূত্রের প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ ক্ষারত্ব বা অম্লত্ব নির্ণয় করা প্রয়োজনীয়। মূত্রের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষার্থ টবমেরিক ও নিটমস কাগজ ব্যবহৃত হয়। মূত্রে ক্ষার থাকিলে পীতবর্ণ টবমেরিক কাগজ পাটলা বর্ণ হয়। নিটমস কাগজ প্রস্রাবে অম্ল থাকিলে লালবর্ণ হয়। পরিপাক কালে মূত্রের অম্লত্ব হ্রাস এবং উপবাস ও অধিক ঘোনিঃসরণে তাহার বৃদ্ধি হয়।

মূত্রে এসবুমেন বা আণুবালিক পদার্থের মাত্রা শিকণার্থ উত্তাপ ও নাইট্রিক এসিড প্রয়োগ আবশ্যিক হয়। এতদ্বারা আণুবালিক পদার্থ জমিয়া যায়। অম্ল প্রতিক্রিয়ায়ুক্ত মূত্রে এসবুমেন থাকিলে তাপ প্রয়োগে উহা জমিয়া যাওয়ায় ঘোলাটে হয়; এই ঘোলাটে ভাব অম্ল প্রয়োগে তিবোহিত হয় না। মূত্রের



প্রতিক্রিয়া স্থির না করিয়া যদি উত্তাপ প্রয়োগ করা যায় ও মূত্র ঘোলাটে হইয়া যায়, তাহা হইলে এই ঘোলাটে ভাব এলুমেনে জন্মিত কি না স্থির করিতে হইলে উহাতে অল্প পরিমাণে নাইট্রিক এসিড সংযোগ করিতে হয় এলুমেন থাকিলে মূত্রে ঘোলাটে অবস্থা তিবোহিত হয় না, কিন্তু ফসফেটস্ থাকিলে ঐ ঘোলাটে ভাব তিবোহিত হইয়া মূত্র ২ বিকার দেখায় একটী কাচের টেবু টিউবে মূত্র রাখিয়া স্পিবিট ল্যাম্পের উপর ধরিয়া উত্তাপ প্রয়োগ ও ফুটাইতে হয়। কারণে মূত্রে এলুমেন থাকিলে উত্তাপ প্রয়োগে তাহা না জন্মিয়া যাইতে পারে একপা-  
 ১৪ বস্থায় এসিটিক এসিড বা অন্য কোন এসিডের দ্বারা মূত্রের অল্প বিধান কর্তব্য মূত্র সমষ্কারাল বা সামান্যকপ অল্পযুক্ত হইলে ফসফেটের সত্তা প্রযুক্ত উত্তাপ সংযোগে ঘোলাটে হওয়া সম্ভব।  
 ২. এরূপ মূত্রে নাইট্রিক এসিড অল্প পরিমাণে ঢালিয়া দিলে ঘোলাটে ভাব আশু বিদূষিত হয় ইউরেটস ও ইউরিক এসিড অধিক পরিমাণে থাকিলে প্রস্রাব ঘোলাটে হইতে পারে, ইহা স্বাভাবিক বাথা আবশ্যক সেরূপ প্রস্রাবে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উক্ত ঘোলাটে ভাব বিদূষিত হয় স্বাস্থ্যবস্থায় মূত্রে সামান্য পরিমাণে শর্করা থাকে, এরূপ কোন কোন চিকিৎসকের অভিমত।  
 ভুক্ত দ্রব্যের অবস্থা এবং শরীর পোষণ কিম্বা যান্ত্রিক ক্রিয়ার সাময়িক বৈষম্য বশতঃ মূত্রে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে মূত্রে শর্করার ক্ষণিক বৃদ্ধি বোগ মধ্যে পরিণত নহে। মূত্রে শর্করার আতিশয্য থাকিলে ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়। মূত্রের আপেক্ষিক ভাব বেশী হইলে তাহাতে শর্করা আছে কি না পরীক্ষা করা কর্তব্য মূত্রে যে শর্করা

দেখা যায়, তাহা জাফা শর্করার সমধর্মী। সুগিষ্ট ফল মাত্রেরই এই শর্করার মতো থাকে। বিবিধ উপায়াবলম্বনে শর্করার মতো স্থিরীকৃত হয়, কয়েকটী প্রধান উপায় এখানে বিবৃত হইল।

শর্কবায়ুক্র মুত্রের সহিত পটাশ বা সোডা সংযোগ করত ফুটাইলে তাহাব বর্ণ পরিবর্তিত হয়। লাইকর পটাশ বা লাইকর সোডা সম পরিমিত মুত্রের সহিত মিশাইয়া (টেষ্ট টিউবের মধ্যে) স্পিবিট ল্যাম্পের উপর ধনিত্বা কিয়ৎকাল ফুটাইলে শর্কবাব স্বল্পতা বা আতিশয়া অনুসারে মুত্রের বর্ণের পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। শর্করার ভাগ অল্প থাকিলে মুত্রের বর্ণ পাটকিলে লাল ও তদপেক্ষা অধিক থাকিলে গাঢ় পাটল বর্ণ এবং অত্যন্ত বেশি থাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। এখানে বলা আবশ্যিক যে, প্রসাবে এলুমেন কিম্বা অধিক পরিমাণে ফসফেটস থাকিলে প্রোক্ত প্রক্রিয়ানুযায়ী পরীক্ষাকালে মুত্রের বর্ণ লাল হইতে পারে। সেরূপ স্থলে প্রসাব হইতে আগে ফসফেটস বা এলুমেন পৃথকভূত করত তৎপরে শর্কবাব পরীক্ষা করিতে হয়।

সশর্কব প্রসাব লাইকর পটাশ ও সলফেট অব্ কপার সংযোগে ফুটাইলে সলফেট অব্ কপার, সব্জকমাইডে পরিণত হয়। ১ গ্রাম প্রসাবে ১ গ্রাম লাইকর পটাশ মিশ্রিত করিলে তৎপরে ১০ গ্রাম সলফেট অব্ কপার, ১ আউন্স আগে প্রব করত তাহাস এক এক ফোটা উক্ত প্রসাবে ঢালিয়া দিবে। এই মুত্রের সহিত সলফেট অব্ কপার মিশ্রিত হইলেই উহা ঘোলাটে হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহা অধিক ক্ষণস্থায়ী হয় না; প্রসাব নাড়িলে এই ঘোলাটে হ্রার বিদূরিত হয়। কপার সালিউসন এক এক ফোটা দিতে

হইবে ও টেষ্ট টিউবস্থিত মূত্র নাড়িতে হইবে। এইরূপে কয়েক বার  
নিষ্ক্ষেপেব পব মূত্র আর ঘোলাটে হয় না, কিন্তু তাহা পরিষ্কার  
ও নীল বা হরিৎবর্ণ হয়। এই প্রক্রিয়া ফুটাইলে শর্কবার সত্তা  
বশতঃ তাহার নিম্নভাগে বক্তাভ পদার্থ জমে, অল্পক্ষণ পরে  
তাহা গাঢ়তর হইয়া পাটকিলে বা স্ফবকির গুঁড়াব স্থায় দৃষ্ট  
হয়। এই গুঁড়াব স্থায় পদার্থই সর্বস্বাস্থ্যইড্ অব্ কপার।

প্রক্রিয়ার সহিত প্রত্যাহ বস্ত পবিমাণে শর্কবা নিঃসৃত  
হইতেছে, তাহা নিম্নলিখিত উপায়াবলম্বনে স্থিবিদ্ধ হইতে পারে  
একটি ১২ আউন্স বোতল বা শিশিতে ৪ আউন্স মূত্র পূরিয়া  
তাহাতে একটি ছোট কুল পবিমিত জার্মান ইয়েষ্ট সংযোগ কর।  
ঐ বোতলের মুখ একটি সামান্য ছিদ্রযুক্ত কর্ক দ্বারা বদ্ধ করিবে,  
যেন সেই ছিদ্র দিয়া কার্বনিক এসিড নিঃসরণেব বাধা না হয়।  
তৎপরে উহা একটি আলমারি বা বাক্সের উপর বা অন্য কোন  
উষ্ণ স্থানে রাখিয়া দিবে যতক্ষণ তাহা ফার্মেন্ট বা উৎসেচিত  
না হয়। ইহা ছাড়া আব একটি ৪ আউন্স শিশিতে মূত্র  
পরিপূরিত ও উত্তমরূপে কর্ক বদ্ধ করিয়া ও তাহাতে ইয়েষ্ট বা  
অভিষব না দিয়া, তৎপার্শ্বে রাখিয়া দিবে। প্রায় ২৪ ঘণ্টার  
মধ্যেই উৎসেচন ক্রিয়া পর্যাবসিত হইয়া যায় ও ফেণা বা সর  
পরিষ্কার হয়। উক্ত উৎসেচিত মূত্র একটি টেষ্ট টিউবে ঢালিয়া  
স্পেসিফিক গ্রাভিটি বা আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করিবে।  
তৎসময় অন্য শিশিতে যে মূত্র বক্ষিত হইয়াছে, তাহাও একটি  
টেষ্ট টিউবে ঢালিয়া লইয়া তাহারও আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়  
করিবে। স্থান অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হইলে ১৮ ঘণ্টার মধ্যেই  
উৎসেচন ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। আপেক্ষিক গুরুত্ব পরীক্ষার ২।৩

ঘণ্টা পূর্বে উক্ত ২টি শিলীকে একটি শীতল স্থানে রাখা উচিত, কাবং তাহাতে উহা চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূবায়ু উত্তাপের সমতুল্য হইতে পারে। পোতা দ্বিবিধ মূত্রের আপেক্ষিক গুণত্বের ভারতম্যানুসারে শর্করার পরিমাণ স্থিতিকৃত হয় যথা অনুসন্ধানিত মূত্রের ভাব বা গুরুত্ব যদি ১০৫০ হয় ও উৎসেচিত মূত্রের গুরুত্ব ১০২০ হয়; তাহা হইলে সাধারণতঃ প্রাপ্তি তবল আউন্স মূত্র ৩০ গ্রোণ সুগাব বা শর্করা আছে বুঝিতে হইবে। এইরূপে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যত পরিমিত প্রস্রাব নির্গত হয়, তাহা মাপিলে ও পতি আউন্সে ৩০ গ্রোণ ধরিয়া হিসাব করিলে সমস্ত দিনা বারের কত পরিমাণ শর্করা নিঃসৃত হইতেছে, তাহা নির্ণীত হইতে পারে।

প্রস্রাবে পিত্ত থাকিলে ইহার বর্ণ পাটল বা পীত হয়। একখানি স্বেতবর্ণ পেটে একটু খানি প্রস্রাব ঢাতিয়া দিয়া তাহার উপর ছই এক ফোটা নাইট্রিক এসিড দিবে পিত্তের বর্ণদ পদার্থ তাহাতে থাকিলে উক্ত মূত্রের চতুষ্পার্শ্ব নানাবর্ণ বর্ণ পরিদৃষ্ট হয়

### দৈহিক উত্তাপ।

সুস্থাবস্থায় দৈহিক উত্তাপ প্রায় সমভাবে থাকে। দিন বারের মধ্যে সময়ানুসারে সামান্য ইতন বিশেষ হইয়া থাকে। থার্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্র কক্ষাভ্যন্তরে ৫ মিনিট দিয়া রাখিলে জ্বর ব্যক্তি-দিগের দৈহিক তাপ সাধারণতঃ ৯৮.৪ বা ৯৮.৬ ডিগ্রী হইয়া থাকে। প্রাতঃকাল অপেক্ষা অপরাহ্নে দৈহিক তাপের সামান্য হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অধিক বা এক ডিগ্রী



হ্রাস হয়। সেই অবস্থায় তাপ পরিমাণ প্রাতঃকাল পর্যন্ত সমভাবে থাকিয়া তৎপরে সামান্যরূপে অর্থাৎ অর্ধ বা এক ডিগ্রী বাড়িতে পাবে। এই বৃদ্ধির চরম সীমা বেলা ৯১০টার সময় সমুপস্থিত হয়। ব্যক্তি বিশেষে পূর্বোন্নিখিত স্বাভাবিক তাপের পরিমাণ অপেক্ষা সামান্য হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তির সুস্থাবস্থায় দৈহিক তাপ ৯৭, ৯৭ বা ৯৮ বা ৯৯ পর্য্যন্ত হইতে পারে। বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের স্বাভাবিক শারীর তাপ স্থিতিকৃত হয়। ৯৯ ডিগ্রী অপেক্ষা শারীর তাপ অধিক হইলে তাহাকে জ্বর বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অপরায় ৪টার সময় দৈহিক তাপ কমিতে আরম্ভ হইয়া মধ্যরাতে হ্রাসের শেষ সীমায় উপনীত হয়। যাহাদের স্বাভাবিক তাপ পরিমাণ ৯৮.৪, এই সময়ে তাহাদের তাপ পরিমাণ ৯৭.০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হইতে পারে। ২৫ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিদিগের তাপ পরিমাণ উচ্চ সংখ্যায় দুই ডিগ্রী কম বেশী হইতে পারে, কিন্তু ৪০ বৎসর বয়সের পন ইহা ১ ডিগ্রী পরিমাণের অধিক হইতে প্রায় দেখা যায় না। বয়স তদপেক্ষা কম হইয়া থাকে। সুস্থাবস্থায় সূর্য্যকিরণে অধিকক্ষণ থাকিলে বা সাতিশয় শারীরিক পরিশ্রম করিলে তাপ পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাহা বহুক্ষণ স্থায়ী হয় না। যদি কোন কারণে এই তাপ অধিক সময় ব্যাপী হয়, তবে তাহাকে পীড়া বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। শরীর তাপের স্বাভাবিক অবস্থা পরিবর্তিত হইলে তাহা রোগের পরিচায়ক স্থির করিতে হইবে। সুস্থাবস্থায় রক্তের তাপ ১০০.০ ডিগ্রী। হৃৎপিণ্ড হইতে দূরবর্তী স্থানে তাপ অপেক্ষাকৃত কম থাকে। শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপ অপেক্ষা বহির্ভাগের তাপ কম হয়। দৈহিক তাপ নির্ণয়ার্থ কক্ষ

দেশ ব্যতীত মলদ্বারের ভিতর ও জিহ্বার উপর তাপমান যন্ত্র বাখিয়া পরীক্ষা করা যাইতে পারে ইহাতে তাপ পরিমাণ সূক্ষ্ম ভাবে স্থিরীকৃত হইতে পারে, কিন্তু একদেশে এই প্রণালী অবলম্বনে তাপ পরিমায় নানা আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে, তজ্জন্ত এদেশে তাপ পরিমায় চম্পা সাধারণতঃ কক্ষদেশে তাপ-মান যন্ত্র সংস্থাপন করা হয় কক্ষদেশে তাপ অপেক্ষ মলদ্বারে তাপ প্রায় এক ডিগ্রি অধিক এবং জিহ্বার তাপ তদপেক্ষা কিছু কম

বাত্রি দ্বিপহবে ৮ বঙ্গের রাশি অর্থাৎ ৩৪ টি পদ ও দৈর্ঘ্য তাপপরিমাণ কমিবার চন্দ্রমাস, সূত্রবাং তৎসমঃ বর্ষীয় জীবনা শক্তি হ্রাস হয় অতএব সীড়িত ব্যক্তি দশকে ৮ বর্ষে তাপ-কম পর্যবেক্ষণ ও আবশ্যকানুযায়ী উত্তেজক ঔষধ ব্যবহার করান উচিত তাপ সংরক্ষণার্থ কল্যাণ উপায়ও অবলম্বনীয়

মানব দেহে নিবস্তব তাপোৎপত্তি ও তাপক্ষয় হইতেছে এত কিয়ৎকাল কোন ব্যক্তির ঘটিলে তাপ বৃদ্ধি বা হ্রাস ও তাহার বোগসূচক হয়। তাপমান যন্ত্র ব্যবহারে বোগ নির্ণয় ও তাহার ভাবীযণ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায়

বক্ষদেশে ২৪ ঘণ্টায় তাপ পরিমাণ ৯৮.৪ বা ৯৮.৬ ডিগ্রী, নাড়ী প্রতি মিনিটে ১ হইতে ৭৫ পর্যাস পদম ১৮ বা ২০। ইহ পূর্ব বর্ষ সূত্র ব্যক্তি পৌষমণ্ডা মাপিতে চেষ্টা। তাপ এক ডিগ্রী বাড়িলে নাড়ী ৮ বা ৯ অধিক স্পন্দিত ডিগ্রী প্রবাস দুই বার বেশী হয় থাকে তাপ যতই বৃদ্ধি হউক না কেন স্থপ্তি ও শুষ্ক রুমের নিম্না পূর্বোক্ত অঙ্গপাতার মানেই বাড়িয়া থাকে তজ্জন্ত তাপ কমিলে নাড়ী ও শ্বাস প্রবাসও সেই

অনুপাতে কমিয়া আইসে তাপ হ্রাস পাইল, কিন্তু নাড়ীর সংখ্যা হ্রাস পাইল না, এক্ষণ দৃষ্ট হইলে তাহা রোগীর পক্ষে অমঙ্গলকর বুদ্ধিতে হয় তাপ হ্রাস সহযোগে নাড়ীস্পন্দন সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া জীবনী শক্তি হীনতাব পরিচায়ক তৎসময় যথোপযুক্ত উত্তেজক ঔষধ ও পথ্য প্রদান অতীব প্রয়োজনীয় নিঃশ্বাস ও প্রস্রাব (সিক্রিশন ও এক্সক্রিশন) বৃদ্ধিসাধন ও শৈত্য প্রয়োগ দ্বারা দৈহিক তাপ হ্রাস কবিত্তে পারা যায়। উচ্চ দৈহিক তাপ অধিক সময় ব্যাপী হইলে অন্তঃ ফলোৎপত্তি হইতে পারে এই উচ্চ তাপ সহসা হ্রাস প্রাপ্ত হইলেও তাহা বিপজ্জনক টাইফয়েড প্রভৃতি একজ্বরে সহসা তাপ হ্রাসেব উপায় অবলম্বন করা উচিত নহে রোগের ভোগ কালের একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে, তৎসময় দৈহিক তাপ ঔষধ প্রয়োগে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবার চেষ্টা কবিলে রোগীর সমূহ বিপদ উপস্থিত হইতে পারে নির্দিষ্ট বোগ ভোগ কাল অতীত হইলে দৈহিক তাপ ক্রমশঃ স্বাভাবিক হইয়া আইসে ম্যালেরিয়া ঘটত একজ্বরে তাপ পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে চেষ্টা করা অযৌক্তিক নহে ৯৯ বা ৯৯.৫ ডিগ্রীর অধিক দৈহিক তাপ হইলে তাহা পীড়ার চিহ্ন হইলেও সময় সময় স্বাভাবিক তাপ বর্তমানে পীড়ার অবিদ্যমানতা দৃষ্ট হয় না বিবিধ কারণ ও প্রাচীন পীড়ায় জ্বরের সত্তা দৃষ্টিগোচর না হইতে পারে কোন কোন পীড়ায় স্বাভাবিকাপেক্ষা তাপ পরিমাণ কম থাকিতে দেখা যায় পীড়ার গুরুত্ব অনুসারে দৈহিক জ্বরের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মূত্র ভাবেব পীড়ায় দৈনিক তাপ পরিবর্তন অধিক পরিমাণে হয়, তাপ সায়ংকালে বৃদ্ধি ও প্রত্যুষে

হ্রাস হয়, কিন্তু গুরুতর পীড়ায় দৈনিক তাপ পরিবর্তন সামান্যকম থাকে বা আদৌ থাকে না। সকল সময়েই উচ্চ শাবীর তাপ বিদ্যমান থাকে। প্রত্যহ ২ বা ৩ তাপ পরিবর্তন ২০° উত্তর প্রান্তঃকালে ৮ বা ৯ টা ও সায়াংকালে ৮ বা ৯ টার সময় তাপমান প্রায়োগে তাপ পরিমাপ করা বিশেষ। যদিও সাধারণতঃ প্রাতঃকালীন দৈনিক তাপ কম থাকে, তথাপি কে না কোন বোঁদো ইহাব বিপরীত অবস্থা বিদ্যুত হয়। দৈনিক উত্তাপ স্ফূর্ত্যবশতঃ অধিক হইলে তাহাকে অবনতি হয়। তবে দেহাভ্যন্তরে আন্তরিক পরিবর্তন (মেটাবলিজম) অধিক হওয়ায় দৈনিক তাপ যদি গায়ে দৈনিক তাপ ১০১ ডিগ্রী হইলে চব্বি সামান্য, ১০৩ ডিগ্রী হইলে উচ্চ বলে। তবে ১০৫ বা ৬ ডিগ্রী বা তদধিক হইলে তাহাকে হাইপার পাইরোমিয়া বলে, ইহা বড় বিপজ্জনক অবস্থা। সাধারণতঃ তবে শাবীর তাপ ১০৫ বা ৬ ডিগ্রী হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা প্রায়ই অধিকক্ষণস্থায়ী হয় না। এই দৈনিক বৃদ্ধিত তাপ ৩০° বা ৩১° ব্যাপী হইলে দুক্লান্ত লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয় ও বোঁদোনে সংকটাপন্ন করে। পূর্ণ বয়স অথবা শৈশবাবস্থায় পীড়ায় তাপ পরিমাণ অধিক হয়, ইহা স্বাভাবিক বর্তব্য। সংক্রামক ও প্রাদাহিক পীড়ায় দৈনিক তাপ বৃদ্ধি হয়। পীড়ার প্রকৃতি অনুসারে এই তাপ বৃদ্ধি হয়। অন্যান্য অবস্থায় পীড়ায় পীড়ার আতিশয়া চতুর্দশবে দৈনিক তাপ বৃদ্ধি হয়। স্বাভাবিক তাপমান দ্বারা পীড়ার আতিশয়া নির্দেশিত হয়। বৃদ্ধিত দৈনিক উত্তাপ অধিক সময় ব্যাপী হইলে দৈনিক সংক্রামক রোগ হ্রাসতা ও নিরোগোৎপাদনের অপকৃষ্টতা বা পরিবর্তন সংশোধিত হয়। ডাক্তারিক দৈনিক তাপ হ্রাস, পীড়ার আন্তরিক পর্যাবধান অনিত্য হইলে তাহা বিপজ্জনক



জানিবে ও তাহা কোলাপ্স বা হিমাজ্জাবস্থায় পরিণত হয় টাইফয়েড জবে এওরূপ হইলে আত্মিক রক্তস্রাবের সম্ভাবনা

### টাইফয়েড ফেজ্ বা অবস্থা

প্রবল ও অধিককাল ব্যাপী জবে দৈহিক তাপ অত্যধিক থাকিলে এই টাইফয়েড অবস্থা সমুপস্থিত হয়। ইহাতে শরীরে স্নায়ুশক্তি দুর্বল ও অবসন্ন হয় এবং বিবিধ সংকটজনক লক্ষণ সমূহ প্রাক্তভূত হয়। ইহাতে দেহ নির্ণ, তেজবিহীন, শাঙ্গী প্রভৃতি, বোমল ও বিষম গতি বিশিষ্ট, ক্ষিপ্রা শব্দ, পাংশুবর্ণ ও বহিঃনিঃসরণ কালে কম্পমান, চক্ষু সর্ভিস বা মল সঞ্চয়, বুদ্ধিবৃত্তি বিশৃঙ্খল ও জড়ীভূত, মূত্র পলাত, জ্ঞানহীনতা, শ্রবণ শক্তিহীনতা, রোগীর চিৎকারে শব্দ, পার্শ্ব পরিবর্তনে তক্ষমতা, বোগীর মস্তক উপাধান হইতে বিচ্যুত হয় রোগীর টাইফয়েড জব ১৩তম গুণতত্ত্ব স্বল্পবিবরণ জবেও এইরূপ অবস্থা সমুপস্থিত হয় যে অবস্থায় পেশীমণ্ডল দুর্বল ও কম্পিত হইতে থাকে হস্ত পদাদিতে এই কম্পন স্পষ্ট দেখা যায় পেশীর অগ্রভাগস্থ টেন্ডন বা কণ্ডুর সকল কম্পিত ও সংকুচিত হওয়ায় তৎসমুদায় যেন উল্লক্ষিত হইতেছে, একপ বোধ হয় ইংরাজীতে ইহাকে সল্ সল্টস্ টেন্ডনস বলে মস্তিষ্ক বিকারগন্ত হওয়ায় বোগীর দর্শন ও শ্রবণ শক্তিহীনতা জন্মে বোগী বাস্তবিক বস্তু ধৰিতে চেষ্টা করে ও শয্যাবস্ত্র টানিতে থাকে শোণিতেও দূষিত অবস্থা মাস্তক বিবরণে একটী প্রধান কারণ মাস্তিক লক্ষণ সমূহ, মস্তিষ্কের প্রদাহজনিত বা টাইফয়েড অবস্থা বশতঃ সমুদ্ভূত তাহা স্থির করিয়া তাহা প্রতিনিধানোপায় অবলম্বন করা উচিত

## বাহ্যাবয়ব ।

বোপীৰ বাহ্য অবয়ব পর্যবেক্ষণে অনেক সময় ভাৰ্য পীড়ান  
 শুকত ও বৃষ্টি সমন্বয় জ্ঞান লাভ কৰিতে পাৰা যায় । তেবেৰ  
 অবস্থা দৃষ্টে বক্তা মৰ্গগন ক্রিয়া কিব পৰ্যবেক্ষণে হইতেছে তাহা সমাব  
 প্রকাৰে অবগত হওয়া যায় । জীব দ্বারা নিঃসৃত ও গ্রহণ হওয়ায়  
 চৰ্ম শুষ্ক ও খসখস ভাবাপন্ন হয় । দেহাভ্যন্তৰে নিঃসৃত ও গ্রহণ  
 ক্রিয়া ক্রিপা ভাবে সম্পাদিত হইতেছে তাহা চামড়ার অবস্থা  
 পর্যবেক্ষণেও অনেক বৃত্তিতে পাবা যায় । তাপোৎপত্তির হীনতা  
 বা তাপক্ষয়েৰ বৃদ্ধি বশতঃ চৰ্ম শীতল ও শাবীক দৌৰ্দ্ধা প্রাপ্ত  
 ত্বকস্থ কৈশিক ধমনীমণ্ডলে সম্যকরূপে বক্তা মৰ্গগনৰ অভাব  
 পৰিদৃষ্ট হয় । ত্বকেৰ শীতলতা বহুদূৰদূৰায়ী হওয়া ও শুভ দৃষ্টি  
 মধ্যে পৰিগণিত । একপ অবস্থায় উৎকৃষ্ট ভেদজ ও পুষ্টিকর  
 খাদ্য ব্যবহার অতীব পয়োজনীয় । সচবাচর পীড়াক্রমে দৈহিক  
 শীর্ণতা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে । ইহাতে এষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায়  
 যে, শবীর পোষণেৰ অভাব হইয়াছে ও তৎসঙ্গে দেহাভ্যন্তরে  
 আণবিক পরিবর্তন ও তৎসত্ত্ব তৎসত্ত্ব অধিক হইতেছে । পুৰাতন  
 পীড়ায় দৌৰ্দ্ধা প্রাপ্ত বক্তা হইতে মস্ত বা বস ক্ষয়িত হইয়া চৰ্ম-  
 নিয়ন্ত্র তত্ত্ব সমূহ সঞ্চিত হইয়া শোথ উৎপাদন করে । তৎসত্ত্ব  
 অজুলি দ্বারা চাপনে অজুলি বদাগ বসিয়া যায় । একপ ঘটনা  
 দেহেৰ স্থান বিশেষে অর্থাৎ হস্ত পদে ও মুখমণ্ডলে অথবা মৰ্দ্ধাবয়বে  
 সংঘটিত হইতে পারে । হাম ও বসন্ত প্রভৃতি ফোটা জবে সমস্ত  
 শবীর ফুলিয়া উঠে ।

মুখমণ্ডল সমগ্র দেহের মপণ স্বরূপ । দেহাভ্যন্তরে কোন

পীড়া প্রচ্ছন্নভাবে আছে কি না, তাহা মুখমণ্ডল দেখিয়া অনেক সময় বুঝিতে পাবা যায়। দৈহিক স্বাস্থ্য অগত ও দেহ পীড়াগ্রস্ত হইলে মুখমণ্ডল স্নান ও বিবর্ণ হইয়া থাকে। তন্নিম্ন ওষ্ঠাধন নীলিম, চক্ষুব পাতা ক্ষীণ, গণ্ডদেশ আবক্রিম প্রভৃতি ভাব সমুপস্থিত হয়। বোগী উৎকণ্ঠিত ও যাতনায় কাতর থাকিলে তাহা মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইয়া থাকে। বহু দর্শন ব্যতীত এই সকল বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ কবিত্তে পাবা যায় না। দুরারোগ্য কঠিন পীড়ায় নাসাগ্রভাগ স্ফা, চক্ষু কোটরগত, ললাটপ্রান্ত নিম্ন, বাহ্যকর্ণ নীতল বা সংকুচিত, ললাটস্থ চর্ম শুষ্ক ও অচিকণ, সমগ্র মুখমণ্ডল সবুজ, নীল বা কালিম ইত্যাদি লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হয়। এই সকল লক্ষণ ঘোবতর বিপদাশঙ্কার পবিচায়ক। ওষ্ঠাধন নীলিম হইলে তাহা শোণিত সঞ্চবৎ ব্যাঘাত বশতঃ জন্মিয়াছে স্থিব কবিত্তে হইবে। ফুস্ফুস প্রদাহে মুখমণ্ডল আবক্রিম ও শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুতভাবে সম্পাদিত হয়। মুএগ্রহির পীড়ায় প্রথমে অক্ষিপুটে ক্ষীণতা দৃষ্ট হয়, তৎপবে সর্ব শরীরে শোথ জন্মিয়া থাকে। ষক্বেতব পীড়াবশতঃ মুখমণ্ডল পাণ্ডুব ও মলিন হয়। মূর্ছাবায়ু পীড়ায় চক্ষুর দৃষ্টি চঞ্চল হয়। গণ্ডমালা দ্বারা আক্রান্ত বোগীর অধর ক্ষীণ বা মোটা দেখায়। নানাকপ পীড়ায় মুখমণ্ডলেব ভাব নানাক্রপ হইয়া থাকে। ভূয়োদর্শনে এই সকল বিষয়ের জ্ঞান লব্ধ হয়।

# ভিষক-সহচর ।

জেনারেল ডিজিজেস্—সার্ববাস্ত্বিক পীড়া ।

হাইপারেমিয়া—সার্ববাস্ত্বিক রক্ত-ধিক্য ।

এই বোগে শরীরে অধিক পরিমাণে রক্ত বা উহার লাল-বর্ণ দানা সঞ্চিত হয় বড়ো অথবা উপদান বর্ধিত না হইয়াও কেবল রক্তবর্ণ দানার আধিক্য হইয়া থাকে

লক্ষণ — শরীরে ভাব বোধ, আদ্য, লম্বিমুখতা, নিদ্রা-ভুতা, নাশাধবনি, ও স্বপ্নদর্শন, শির্বোদ্বর্গন, বক্তব্য, কৈশিক রক্তমণ্ডল অতিপূর্ণ, শিবা মকলা ক্ষোভ এবং নাড়ী-স্পন্দন পুষ্ট, সবল ও সতেজ হয়

চিকিৎসা । —এই বোগের চিকিৎসায় পথ্যের প্রাতি-বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । পথ্য তদিক পুষ্টকরকরকর উচিত নহে সর্লপ্রকার মদ্যপান নিষিদ্ধ প্রত্যহ বিশুদ্ধ বায়ুতে ব্যায়াম আলাইন্ পথ্যগেটিভস্—৩৩১, ৩৩৪, ৩৩৫ সোমা-ইড অব্ এমোনিয়ম অধিক মাত্রায় লাইকর পটাশ কোন কোন চিকিৎসক রক্তমোক্ষণের অনুমোদন করেন



ইহাতে যে সংখ্যা লিখিত হইল, উহা ব্যবস্থার সংখ্যা । আব-  
শ্যকানুসারে ব্যবস্থাবলী দৃষ্টব্য

### এনিমিয়া ও ক্লোরোসিস্—রক্তহীনতা ও নীলপ্রদর ।

এই বোগে শরীরে রক্তের স্বল্পতা বা অপকর্ষ জন্মে ; বক্ত-  
বর্ণ দানাব স্বাভাবিক পরিমাণেব হ্রাস হয় । সুস্থাবস্থায় বক্তের  
সহস্র ভাগে ১৩০ ভাগ রক্তবর্ণ দানা থাকে । বিবিধ পীড়ার  
ইহা একটি লক্ষণ

লক্ষণ — শরীরেব বর্ণ ফেকাশে ও পাণ্ডু হয় । জিহ্বা ও  
চক্ষু আদি শৈথিল্যিক ঝিল্লী শ্বেতাভ হয় । নাড়ী-স্পন্দন দ্রুত ও  
দুর্বল, ক্ষুধাভাব, হৃদযমনীতে উচ্চ শব্দ, গ্রীবাদেশীয় শিরাতে  
এমরধবনিবৎ শব্দ, মূচ্ছাক্রমণ, হৃৎস্পন্দন ও শ্বাসকৃচ্ছ, শোথ,  
এবং ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড ও অন্ত্রবেষ্টাভ্যন্তরে বস সঞ্চিত হয় । ঋতুব  
অভাব ও কখন কখন সাংঘাতিক মূচ্ছা বা সংজ্ঞাহীনতা সমুপস্থিত  
হইয়া থাকে

ক্লোরোসিস্ বোগ জীলোকদেব যৌবনাবস্থার প্রারম্ভে উৎপন্ন  
হয় । ইহাতে শরীরেব রক্তহীনতা জন্মে । বক্তের জলীয়াংশ বর্ধিত  
হয় এবং উহার বক্তবর্ণ দানাব স্বল্পতা হয় । শরীরেব বর্ণ নীলিম  
হয়, তজ্জন্ত এই বোগকে নীলবোগ বা নীলপ্রদর কহে । কোষ্ঠ-  
বদ্ধ, মূত্রাধিক্য, গুম্বাবায়ু, বাজাবিশৃঙ্খলা, শ্বেতপ্রদর, শিথিলপীড়া  
ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা থাকে এবং অক্ষিগোলক বহিস্ফুর্গ বলিয়া  
বোধ হয়

চিকিৎসা ।—হাইপোফস্ফাইট অব্ সোডা বা লাইম ১

হইতে ৬ গ্রা, চিনির পাকের সঙ্গে মেব্য। ল্যাক্টো ফস্ফেট লাইম অক্সিজেন; ফস্ফেট অব লাইম শ্রোত ব্যক্তি ও যে সকল ক্রীলোক অধিক সম্মান প্রাপ্য বশতঃ এবং বজ-আধিকা হেতু রক্তহীন হয়, তাহাদেব পক্ষে উপযোগী পটাশ ও সোডা দ্বারা পাকায় ও যকৃতের বন বিধান সাধিত হয় পুষ্টিকর ও রক্তবর্দ্ধক পথা শীতল জলে স্নান মিন্‌কানাঘটিত ঔষধ— ১৯৩, ১৯৪ ছগ, মংসেব বোল, ডিম্ব, মদ্য, ত্রাণ্ডি পুষ্টি বিবিধ প্রকার লৌহঘটিত ঔষধ—টিং ফেবি পারক্লোরাইড—১৭১, ১৭৬ ফেরি এট্‌ কুইনী সাইট্‌স্—১৭২, ১৭৩, ১৭৪ ফিরম রিডক্টম্ ২০৪, ২০৫, ২০৬ আয়রন ও নল ফস্ফেট ও ল্যাক্টেট অব আয়রন ১৮৭, ২০১, ২০৭, ২০৮ অত্যন্ত প্রকার লৌহ ঘটিত ঔষধ অসহ হইলে ফেবি এট্‌ এসোনি সাইট্‌স্ ব্যবহার্য ১৮০, ১৮৮ কার্বনেট অব আয়রন পিল কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে লৌহঘটিত ঔষধ ব্যবহারে সতর্ক হইবে, একপ অবস্থায় লৌহঘটিত ঔষধেব সঙ্গে বিবেচক ঔষধ যোজনা করিয়া ব্যবহার্য—১৭৭, ২০৪, ২০৯ লৌহঘটিত ঔষধেব সঙ্গে সলফেট অব্‌ ম্যাগ্নিসিয়া, পেপ-সিন্‌, ম্যালোজ ও বিয়াই ইত্যাদি প্রয়োজ্য লৌহঘটিত ঔষধে উপকার না হইলে আর্সেনিবি বিহিত গুরুতর পীড়ায়ও আর্সেনিক্‌ প্রয়োজ্য স্নায়ুগুণেব উগ্রতা থাকিলে হাইডেট ক্লোরাইড ও স্পিবিট ক্লোরোফর্ম ও ভূতি দিবে অস্থিরতা থাকিলে টিংচার হায়সায়ামাস স্বপ্নানন্দন থাকিলে অল্প মাত্রায় টিংচর একোনাইট—৯৮, ৯৯, ১০৪, ১০৭ ট্রান্সফিউজন্‌ অব্‌ ব্লড্‌ অর্থাৎ একদেহ হইতে রক্ত বইয়া অপর দেহে প্রবিষ্টকরণ। মানসিক চিন্তাদি-জনিত হইলে ফস্ফেট অব্‌ জিঙ্ক ও আয়রন; অথবা ফস্ফরিক এসিড

ডিল, তিও বলকারক ফাণ্টেব সঙ্গে ; ১৮৭ কডলিভর অয়েল ।  
এসিড্‌স্—যুবতীদিগেব পীড়ায় শৈল্পিক ঝিল্লিব বদবিধান করে ।  
গ্যালিক এসিড—প্রাচীন শৈল্পিক বা ৩২'র অবজ পীড়ায় বিধেয় ।

### ডায়েবিটিস্—মধুমেহ

শরীরেব কোন কোন বিশেষ ক্রিয়াবৈষম্য জনিত এক প্রকার  
পুষ্কাতন পীড়া ইহাব বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইহাতে মূত্র অধিক  
পরিমাণে নিঃসৃত হয় ও তাহার সহিত দ্রাক্ষাকর্করা বা গ্রেপ শুগাব  
বিমিশ্রিত থাকে ইহার অপর নাম ডায়েবিটিস্‌ মেলিটস । যেরূপ  
বহুমূত্রে শর্করা থাকে না, তাহাকে ডায়েবিটিস্‌ ইন্সপিডস্‌ বলে ।

লক্ষণ ।—এই বোগেব লক্ষণ সকল প্রথমতঃ অজ্ঞাতসারে  
সমুপস্থিত হয় । ইহাতে অবলাব ও অধিক পরিমাণে মূত্রপ্রাব  
হয় মূত্র ঈষৎ গাঢ়বর্ণ ও মিষ্ট গন্ধবিশিষ্ট হয় এবং তাহার আপে-  
ক্ষিক গুরুত্ব ১.০৪৫ হইতে ১.০৫০ চর্ম্ম শুষ্ক ও কর্কশ এবং  
কোষ্ঠবদ্ধ হয়, মল কঠিন, অবিরত তৃষ্ণা, সাধারণ স্বাস্থ্যেব অপ-  
কর্ম্ম, পৈশিক দৌর্বল্য ও রতিশক্তির বিনাশ হয় । কটিদেশে  
বেদনা, হস্তপদের শীতলতা, ও তৎসঙ্গে জালা বোধ হয় দুর্বলতা  
ক্রমিক বৃদ্ধি, দৈহিক ভারের হ্রাস, চর্ম্ম কুঞ্চিত, পদ ও জঙ্ঘাতে  
শোথ এবং মূত্রে সময়ে সময়ে আণ্ডলালিক পদার্থ দৃষ্ট হয়  
নিখাসে ক্লোরোফর্ম্মেব ছায় গন্ধ, দন্ত বিনষ্ট হওয়ার সঙ্গে মাটির  
শিথিলতা ও সচ্ছিদ্রতা মানসিক অবসন্নতা ও উগ্রতা । পাকায়মে  
শূন্যতা বোধ ও তৎসহ ক্ষুধাতিশয় উভয় চক্ষুতে ছানি পড়িবাব  
উপক্রম বিস্ফোটক-প্রবণতা—কিছু দিনান্তে যক্ষ্মা রোগ উপ-  
স্থিত হইতে পাবে । প্রগাঢ় বোগে অবসন্নকব প্রদাহ অর্থাৎ

বায়ুনলীভুজ, ফুস্ফুসচ্ছদ, ফুস্ফুস বা অন্ত্রচ্ছদ-প্রদাহ মনুপাশ্রিত হইয়া রোগীকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত কবে তড়ির প্রত্যাহার পচন, যক্ষ্মা বা ক্রমশঃ অবসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া রোগী মনবৎ বোলা সম্ভব কবে মূত্রে শর্করার সত্তা অবমাননার্থ ফংগাস, পটাশ, কপার বা ফার্মেন্টেসন্ টেষ্টে উপায় অবলম্বনীয়।

চিকিৎসা। — ব্রোম ইড অন্ পটাসিয়ম সেবনে কাহার কাহার উপকার দর্শে অক্সিজেন দ্বারা মূত্রস্থ শর্করার তৎপল হ্রাসিত হয় আলিগিনোট অব মোডা দ্বারা দুই জন বোণী আরোগ্য হইয়াছে; তাহাদিগকে পূর্বের অন্যান্য ঔষধ দেওয়া হয়, কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার উপকার হয় নাই জৈষদুষ্ক জলপানেব দ্বারা এই বোগেব পিপাসা কথঞ্চিৎ উপশান্ত হয়। শর্করাবিহীন মূত্রাধিক্য বোগে অধিক ও বর্দ্ধিত মাত্রায় ভোলিয়ান্ প্রয়োগে হিতফল উপলব্ধি হয় ক্রিয়েজোট, আর্গট, গ্যালিক এসিড, জেবোবাণ্ডি, গোল্ড ক্লোবাইড ইত্যাদিও ব্যবহার হয়

এই বোগেব নিদানাদি অদ্যাপি প্রকৃতরূপে স্থিরীকৃত না হওয়ায় চিকিৎসাব দ্বারা প্রায়ই রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইতে দেখা যায় না; তথাচ নিয়ম পূর্বক ঔষধ সেবন করিলে অনেক সময় বিশেষ উপকার হইয়া থাকে পণ্য পুষ্টিকর হইবে, অথচ তাহার মধ্যে যত কম পরিমাণে শর্করার অংশ থাকে ততই ভাল জাতকর খাদ্য অর্থাৎ মাংস, ডিম্ব ইত্যাদি মধুপেয় শ্রেষ্ঠ ব্রানডোফ বা জ্বির বটী ও ডাক্তার পোভি কৃত অমণ্ডেল বা বাদামেব বিসকুট অথবা কেবল বাদাম দুই—যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। ডাক্তার ডব্লিন, কেবল ১৮ গাইন্ট পরিমাণে মাটি-তোলা দুগ্ধ সেবন করাইয়া কয়েকটা রোগী আরোগ্য



কবেন পিপাসা নিবারণার্থ সোডা ওয়াটার, বিশুদ্ধ নিষ্কর-বারি, ভিটি বা সেল্জর ওয়াটার, মাংসের ঝোল, জল সহ ত্রাণ্ডি, ও যুহু আসব দিবে তত্র পানও উপকারী ঔষধ বস্তাদি পরিধান ও নিয়ম পূর্বক প্রত্যহ বিশুদ্ধ বায়ু পরিপূর্ণ স্থানে পাদচারণ ও ব্যায়াম কবা কর্তব্য সোডা ফস্ফ বিরেচনার্থ শর্করার পরিবর্তে গ্লিসিবিণ বা স্ট্রাকেরাইন জামের বীজেব সাব অর্থাৎ একষ্ট্রা জাম্বোলিন লিকুইড উপকারী বলিয়া কথিত হয় ঔষধেব মধ্যে ওপিয়ম ও কোডিইন বা মর্ফিয়া শ্রেষ্ঠ, ইহা সেবনে বোগীব সাধারণ লক্ষণাদি তিবোহিত হয় ও মূত্রেব আর্পেক্ষিক ভার অনেক কমিয়া আইসে সাইট্রেট অব্ এমোনিয়া ও আয়বণ ; কার্বনেট অব্ সোডা ; বাইকার্বনেট অব পটাশ এবং ওজানিক ইথর ব্যবহৃত হইয়াছে কখন কখন ওপিয়মেব সঙ্গে কুইনাইন দিলে বিশেষ উপকার হয় কুইনিন ব্রোমাইড ও মর্ফিয়া স্ট্রীকনিয়া ১৬, ১৭, ১৮ স্ট্রীকনিয়া ও আয়বণ ১৭৩, ২০৫ এসিড ফস্ফবিক ডিল— ১৮৭, ২৯৫ ক্যালসিয়ম সলফাইড, এমোনিয়া আয়বণ এণ্ড এলম্, বডলিওব অয়েল, গ্লিসিবিণ অধিক পবিমাণে শর্করা সেবন দ্বাবা চিকিৎসা প্রকরণ কয়েক বৎসবাবধি প্রবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু অনেক চিকিৎসক ইহার বিদ্বেষী যত্নতজ পীড়ায় মেদাধিক্য রোগীব পক্ষে ও প্রলাপে এল্কেলাইন ওয়াটার্স এমোনিয়ম ফস্ফেট আর্সেনিক পূর্ণ মাত্রায় রেডোডেন' সাইট্রেট অব্ ইউবিনিয়ম ১ হইতে ২ গ্রেন বা ক্রমশঃ বর্ধিত মাত্রায় আহাবান্তে সেবনে উপকার দর্শিয়াছে কোমা বা অটৈতন্তাবস্থা উপস্থিত হইবার আশঙ্কা থাকিলে অধিক পবিমাণে সাইট্রেট পটাশ উপকারী

## হেমরোজ—রক্তাব ।

রক্তাব হইতে যে কোন কারণে বক্ত নিঃসৃত হয়, তাহাকে রক্তাব ( হেমরোজ ) বলে

আঘাত বা সার্জিক অপরিবিধ কারণে এতদূর ঘটনা সংঘটিত হইতে পারে গুটিকা ও ককট বোগ প্রভৃতি দ্বারাও এরূপ হয় রক্তাধিক্য বা প্রদাহেব লক্ষণ, বর্তমানে রক্তাব হইলে তাহাকে গ্যাকটিও বা সবল, এবং দুর্বলতা লক্ষণ ও বক্তেব অপকর্ষ বশতঃ হইলে গ্যাকটিও বা দুর্বল রক্তাব বলে মধ্য মধ্য বক্তাব হইলে এবং তাহাতে সার্জিক শ্বাসের অন্তর ফল দর্শিলে তাহাকে কনষ্টাউশনাল বা সার্জিক বক্তাব, এবং জীলোকদেব ধতুসাব বা হইয়া নাগিকা হইতে রক্ত কবিত হইলে, তাহাকে ডাইকোবায়ম্ বা প্রতিনিধি বক্তাব কহে কোন বোগের বক্তিতাৎস্থায় বক্তাব হইয়া শুভ বা অশুভ ফলোৎপত্তি হইলে, তাহাকে ক্রিটিক্যাল বা রোগেব শুভাশুভ পরিণামসূচক বা সার্জিক বক্তাব বলে বাল্যবস্থায় সাধারণতঃ নাগাবদ্ধ হইতে, পূর্ববঙ্গ ফুসফুস, বায়ুনদী ভুজ, পাকাস্থ, মুত্রপথ ও জবায় হইতে ; এবং পূর্ব বঙ্গের মাগিধ বক্তাব ও সবল হইতে বক্তাব হইয়া থাকে কোন কোন বোগেব রক্তাবের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি থাকে, তাহাকে হেমরোজিক ডায়গনিস্টিক বক্তাব বা দাত্ত প্রকৃতি কহে ইহাদেব শরীরে জলোক মংল ববিনে বা উহাদের দন্তোৎপাদনা-দির পব, সমূহ রক্তাব হয়

চিকিৎসা —অর্শ, জলোক-দষ্ট স্থান, মংল ( কাটিয়া

গেলে ) আদি হইতে রক্তস্রাব হইলে জলমিশ্র বা বিগুহ্ব ভিনিগার বা সিকি অথবা হামামেলিসের অবিষ্ট বা ইহাব সাব হেজিলিন্ প্রযোজ্য রক্তস্রাব বশতঃ স্থূপিত্তেব ক্রিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলে ত্রাণ্ডি বা তৎসহ দাডেনম সেবন বিহিত ক্রিয়েজোট বা কার্কলিক এসিড বা কষ্টিক স্থানিক ব্যবহার্য্য ডিজিটেলিসের ফাণ্ট প্রয়োগে উপকার হয় হামামেলিসেব অবিষ্ট ১ বা ২ মিনিম কিম্বা ততোধিক মাত্রায়, ২৩ ঘণ্টান্তর সেবনে বিবিধ পকার রক্তস্রাব নিবাবিত হয় হেজিলিনও বিশেষ ফলোপধায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বণ্ডাধাব হইতে রক্তস্রাব হইলে, দাইকর প্লম্বাই সব এসেটেটস বা টিংচর ষ্টীল স্থানিক ব্যবহার্য্য ছুর্কদ বণ্ডাধাবে কুইনাইন সেব্য নাক ও পাকায় হইতে রক্তস্রাব হইলে পৃষ্ঠবংশে উষ্ণ জলপূর্ণ থলি সংস্থাপন কবিলে উপকার হয় চাপ প্রয়োগে অনেক রক্তস্রাব বন্ধ হয়

কেহ কেহ বলেন যে, অল্প হইতে বণ্ডাধাব হইলে তাহা সহসা বন্ধ করা বিধেয় নহে, কিন্তু তাই বলিয়া অধিক বণ্ডাধাব হইতে দেওয়াও উচিত নহে বণ্ডাধাব বন্ধ কবিলে আভ্যন্তরিক যন্ত্রে কোন প্রকার বণ্ডাধিক্য বা এদাহ না হয়, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য বিবেচক ঔষধ ও আহাবেব সুব্যবস্থা দ্বারা উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে বোগীকে শারীরিক ও মানসিক শ্রম ও চিন্তা হইতে স্থগিত রাখিবে বাসগৃহ শীতল ও বিগুহ্ব বায়ুপূর্ণ হইবে শীতল পানীয় ও বরফ প্রভৃতি দেওয়া যায় সংশ্রাস বোগ উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে যদি তৎসময় নাসিকা হইতে রক্ত পড়ে, তবে তাহা সহসা বন্ধ করিবে না স্থানিক শৈত্য প্রয়োগ ; ট্যানিক এসিড, গ্যানিক এসিড ও যারোমেটিক সল্ফিউরিক এসিড—২১৮ এমোনিয়ো আয়রণ ম্যাগন—উৎকৃষ্ট রক্তবোধক

টিংচব ফেরি পাবক্লোরাইড বা পাবনাইটটিস। মল্ফিউরিক এসিড ডিল স্যালম ও মল্ফিউরিক এসিড—২১১ ইপি বা-কিউয়ানা ১ গ্রোং মাক্রাম বিবমিমা হওয়া পর্যন্ত দনে পাকশায় ও ফুসফুসীয় বক্তাৰবে বমন বিশেষ অনিষ্টকৰ, কিন্তু এসোন্তোর বক্তাৰবে উপকাৰী এসিটেট অব্ লেড ২২৫, ২২৮ ডিজি-টেলিস ও আৰ্ণিট অব্ বাই দ্বাবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধৰ্ম ৭ টৈপিক সুর সংকুচিত হওয়ায়, সময়ে সময়ে উহাদেব ব্যবহাৰে বক্তাৰবে বন্ধ হইতে পাৰে; জাব্ হইতে বক্তাৰবে হইলে উহাবা বিশেষ উপকাৰী ফুসফুস, পাকশায় ও মূত্রগ্রহি হইতে বক্তাৰবে হইলে অয়েল অব্ টপেণ্টাইন ২১৭; অয়েল অব্ টপেণ্টাইন গর্দিনও ব্যবহার্য পুনঃ পুনঃ প্রকামিত বক্তাৰবে বাইকব হাইডার্জ পাবক্লোরাইড, ফুসফুস বা মূত্রগ্রহিব পীড়া বর্তমানে এই ঔষধ প্রয়োগ নিষিদ্ধ ওপিয়ম দ্বাবা অভ্যস্ত অবসন্নতা নিবাবিত হয় শিবা মধ্যে এমোনিয়াব পীচকাৰি কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে মল্ফিউরিক এসিডেব সঙ্গে মলফেট অব্ মোডা ও ম্যাগনিসিয়া; ক্যাষ্টেব অয়েল —৩৩০, ৩৩৬ ট্রান্সফিউজন অব্ ব্লড বাট না ও ম্যাটিকো উপকাৰী ফুসফুসীয় বক্তাৰবে টিং ফেরি এসিটেট অধিক স্তল মিলিত কবত ঘন ঘন সেব্য

### থুম্বোসিস্ ও এম্বলিজম্ ।

ঘনীভূত বক্তা ও দ্বাবা বক্তাৰবেব অভ্যস্তরোণ প্রাণী সম্পূর্ণ বা আংশিক অবরুদ্ধ হয় এই ঘনীভূত রক্ত, সাধাবৎতঃ ফাই-ব্রিন্স বা স্কীম পদার্থনিষ্ঠ, ইহাকে থুম্বো বলে যে সবল রোগে মাতিম্য অবসন্নতা প্রাপ্ত হয়, বিশেষতঃ ক্রুপ বা স্ক্রুপ,



ডিপথিরিয়া বা বিল্লীক প্রদাহ, আরক্ত জ্বর, হৃদস্তববেষ্ট প্রদাহ, ফুসফুস প্রদাহ, যক্ষ্মা, টাইফস বা মোহ জ্বর, এরিসিপেলাস বা বিসর্প ও বক্ত্রাবাদি বোগে বক্ত্রাধারের প্রণালীতে এতাদৃশ ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে গর্ভাবস্থায় ও প্রসবান্তে বক্ত্রের অবস্থা একপ হয় যে, সহজে এই রোগ সন্নিপস্থিত হইতে পারে।

ঘনীভূত স্ত্রীয় পদার্থ হৃৎপিণ্ড বা অন্ত্র বক্ত্রাধার হইতে দূরীকৃত হইয়া সংকীর্ণ ব্যাসবিশিষ্ট বক্ত্রাধারের মাধ্যমে সঞ্চালিত হওত আবদ্ধ হয় ইহাকে এমলিজম বলে যে যন্ত্রে গিয়া ইহার গতি অবরুদ্ধ হয়, তদনুকূপ লক্ষণাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে ফুসফুস বা যকৃতের কৈশিক শিরায় গিয়া উহা আবদ্ধ হইতে পারে ফুসফুসীয় ধমনীতে বৃহৎ আকারের ঘনীভূত স্ত্রীয় পদার্থ আবদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ শ্বাসরোধ হয়, কিম্বা যদি উহা ফুসফুসের মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ফুসফুসের পচন সংঘটিত হয় এতদ্রূপ ভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির কোন প্রধান বক্ত্রাধার অবরুদ্ধ হইলে তাহার নিম্নাংশে পচন আরম্ভ হয়

ইহাদের চিকিৎসার যুক্তি বিভিন্ন বোগীর পক্ষে বিভিন্ন প্রকার। রোগীর পবে কি হইবে, তৎপতি দৃষ্টি না করিয়া, তৎকালে যাহাতে সে জীবিত থাকে, তাহার উপায় অবলম্বন করিবে বেদনার শান্তি ও বক্ত্রসঞ্চালন সংস্থাপন তত্ত্ব চেষ্টা করিবে এই বোগে যে সকল ঔষধের উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহাদের ক্রিয়া প্রায়ই অনিশ্চিত অত্যন্ত অবসন্নতা উপস্থিত হইলে উত্তেজক অর্থাৎ এমোনিয়া, ইথর ও ব্রাণ্ডি দিবে ১, ৩, ১১, ১৩ রোগীকে স্থির ও শান্তভাবে রাখিবে এসেন্স অব্‌ বিফ বা চিকেন, কাঁচা ডিম ও ছন্ধ যথেষ্ট পরিমাণে দিবে আল্‌কেমিজ বা ক্ষারবর্গ রক্তের

তবলতা সম্পাদন কার, তজ্জন্তু কার্বনেট অব্ এমোনিয়া উপকারী হইতে পারে ; যদি রক্তে এমোনিয়াব আধিক্য থাকে জানা যায়, তবে ইহা ব্যবহার্য্য নহে কার্বনেট অব্ এমোনিয়া ও আইয়ো-ডাইড অব্ পটাসিয়াম ওপিয়ম দ্বারা বক্তৃসঞ্চালন অস্থির হয় ও তাহার অস্থিরতা নিবাবিত হয় রোগীর স্বাস্থ্যের অপকৃষ্টতা সংশোধনার্থ কুইনাইন—১৯৩ । সলফবাস এসিড ।

### ড্রুপ্সি—উদরী—শোথ ।

প্রদাহ ব্যতীত দেহাভ্যন্তরস্থ মাস্তক গ্রন্থিবে বা শরীরের বহির্ভাগের যোজক তন্তুর মধ্যে জল বা মাস্তক রস সঞ্চিত হয় । উহা কখন স্বতন্ত্র ও কখন বা সন্নিবিষ্ট ভাবে সমুপস্থিত হয় শিবা সকল ও তাহাদের কৈশিক প্রশাখা সকলের অভ্যন্তর পূর্ণাবস্থা হইতে এই বোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । বিবিধ কারণ বশতঃ শিবাগণের ঈদৃশ অবস্থা সমানীত হয় তন্মধ্যে সাধারণতঃ এই কয়েকটি প্রধান ; যথা—অর্কুদ, জ্বায়ুর চাপ প্রভৃতি কারণে শিবাগণগুলি চাপিত হয় যকৃতের বৈধানিক পীড়া দ্বারা পিত্তরস বী শিবাগণগুলিতে বক্তৃসঞ্চালনের ব্যাঘাত সংঘটিত হয়, তাহাও এই বোগের একটা প্রধান কারণ ছত্রপতি দানের বপাটি সকলের পীড়া, বক্তৃসঞ্চালনের ব্যাঘাত বশতঃ শিবাগণের বৃদ্ধি অকৃত, বায়ুনলীভূজ প্রদাহ ও ফুসফুসভ্যন্তরে বায়ুসঞ্চয় (এম্ফিসিমা) প্রভৃতিও এই বোগের কারণ যুক্তপ্রস্থিতে বক্তৃসঞ্চয় ও প্রদাহ হইলে বক্তৃ অবিগুহ্য হওয়া বশতঃও একপ্রকার শোথ সমুৎপন্ন হয় ইহাতে যুক্তের প্রধান উপাদান—মুরিয়া নিঃসৃত হইতে না

পাবায় রক্ত অবিশোধিত থাকে। রক্তহীনতা বা রক্তের জলীয়াংশ বিবর্ধনেও এই পীড়া উৎপন্ন হয়

চিকিৎসা।—বৃদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তিগণের পদদ্বয়ের শোথে লাইকর আর্সিনিকেলিস সেবনে উপকার দর্শে সার্ক্সাঙ্গিক ও স্থানিক দ্বিবিধ শোথেই বাইটার্‌টেট অব্‌ পটাশ উপকারী; ইহাব দ্বাবা জলীয় অংশের সঙ্গে বস্তুর অবিগুহ পদার্থ বিদূষিত হয়। বিরেচনার্থ কলোসিস্ত্র, জেলাপ, ইনেটেব্রিয়ম, সলফেট অব্‌ ম্যাগ্ন-নিসিয়া প্রভৃতি উপযোগী। কোন কোন প্রকার উদবীতে এবং বাইটার্‌থ্য মূত্রগ্রন্থির পীড়ার কোপে বা ব্যবহার কবিতা উপকার লক্ষ্য হইয়াছে হৃৎপিণ্ডের পীড়া বর্তমানে নূতন প্রস্তুত ডিজিটেলিসেব ফণ্ট ব্যবহার্য্য ষ্ট্রেংথ্যন্থস্‌ও উপকারী

যে যে বোগের জন্ত উদবী ও সার্ক্সাঙ্গিক শোথ প্রকাশিত হয়, তত্তৎ রোগের চিকিৎসা প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা কবিলে বোণীব শোথ নিবারণের জন্ত মূত্রকারক, বিবেচক, শ্বেদজনক ও বমন-কারক ঔষধ প্রযোজ্য ট্যাপিং ও একিউংচব দ্বাবা সঞ্চিত জল বহিস্কৃত কবিলেও অনেক সময় উপকার হয় শবীব পোষণের জন্ত পুষ্টিকারক আহাব দেওয়া কর্তব্য বিবেচক ঔষধের নিম্ন লিখিত সংখ্যা ব্যবস্থেয়, ৩২৭, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৮ মূত্রকারকেব মধ্যে ৩৬৩, ৩৬৮, ৩৭১ যকৃতের পীড়া জন্ত বোগ হইলে;—১৬৯, ১৭৩, ১৭৪, ১৮২ প্লীহা বশতঃ হইলে—১৬৭, ১৭২, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৮, ১৯১, ১৯৩ কেবল মাত্র দুগ্ধ পান কবিতা এক মাস থাকিতে পারিলেও এই বোগ আবোগ্য হইতে পারে এমোনী ক্লোরাইড ও ট্যারাক্সেকম ৪১২ বেজিনা পডফাইলাই;—৩৪৭ বিবিধ প্রকার লোহ

খটত ঔষধ ও পটান আইয়োডাইড যে যজ্ঞেব পীড়া বশতঃ  
বোগ সমুদ্ভূত হইয়াছে বুঝিতে পাবা যাইবে, সেই যজ্ঞের পীড়ায়  
যে প্রকার চিকিৎসাপণানী লিখিত হইয়াছে তদনুযায়ী চিকিৎসা-  
সোপান অবলম্বনীয় ।

### বেবিবেবি—একপ্রকার সার্বসাম্প্রদায়িক শোথ ।

বর্ধিত দুর্বলতা, সম্যক বক্তৃতা, উৎকর্ষ, দেহের  
বাহ্যংশে অসাড়তা, অসংযমীয় শোথ, শ্বাসক্লেশ,  
পক্ষাঘাত, মূলাশ্রুপত্তি এবং হৃৎকোষ ও মুস্কুলবোদ্ধে মাস্তক  
রস সঞ্চিত হয় অবশেষে অবসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া বোগীকে  
কালের ক্রমশঃ নিপাতিত করে

ইহা সচরাচর সিংহল দ্বীপে হইয়া থাকে ইলিটেমিসম,  
৩৩৮, ৩৪৮ ব্যালোমেল ও স্কইন, শ্বইন ও ডিজিটেলিস্ টিংচর  
ফেবি পাবক্লোবাইড অয়েল নাইগম ১০ মিনিম ১৫ মিনিম, টি বক  
ফারক ৫ হইতে ১৫ গ্রোঃ স্পিবিট অব্ নাইট্রস ইথর পটাসী  
টার্ট এসিড। সোডা এসিড ওপিয়াম, নয়াওমিকা । পুষ্টিকানক  
খাদ্য, স্বা প্রভৃতি এসিটেট অব্ পটাস, জুনিওন হৃৎকোষের  
গুরুতর দক্ষণে ডিজিটেলিস ও স্কইনিয় । জল বায়ু পরিবর্তন ।

### ইনফ্লামেশন্—প্রদাহ

ইহাত স্থানিক বক্তৃতা সঞ্চিত হইয়া পায় বস প্রাপ্ত হয়  
ইহা দ্বারা কখন শবাবের বিধান অপচয় ও কখন বা উপচয়  
হইয়া থাকে আক্রান্ত স্থানে রক্তাধিক্য হয়



লক্ষণ।—বেদনা, ক্ষীণতা, উত্তাপ ও আরক্ততা—এই চারিটী মূল প্রধান। ইহাতে রক্তের স্রবীণের বৃদ্ধি ও রক্তা-  
গুর হ্রাস হয়। রক্তের উষ্ণতা বর্দ্ধিত হয়। আনুষঙ্গিক জ্বর,  
অবসন্নতা, শীত, নাড়ী দ্রুত, নিঃশব্দতা, তৃষ্ণা, ক্ষুধাভাব, সমল  
জিহ্বা, মূত্রে ক্রোবাইডেব হ্রাস, যুরিয়া নিঃস্রব বৃদ্ধি, ঘর্ষ, বিলোপী  
জ্বর, রক্তস্রাব, পুষ্টিপত্রি, ক্ষত প্রকাশ ও পচন প্রভৃতি ইহার  
লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত

চিকিৎসা।—একোনাইট দ্বারা আশ্চর্য্য সফল উপলব্ধি  
হয় সকল প্রকার প্রদাহে প্রথমাবস্থায় ইহার অরিষ্ট অর্ধ বা এক  
ফোটা মাত্রায় ২১ বা ৩ ঘণ্টান্তর প্রয়োজ্য। ফুস্ফুস প্রদাহে  
টার্টারেট অব্ এন্টিমনি ১ ইহাতে ১ গ্রেন বা আইনম ৫—১৫ মিনিম  
মাত্রায় ২৩ ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে চক্ষুপ্রদাহে  
—এট্রপিয়া, বেলেডোনা, ডিজিটেলিস্ ও ওপিয়ম মাস্তক  
প্রদাহে—একোনাইটের পর ব্রাইওনিয়া অর্ধ বা এক মিনিম  
মাত্রায় উপকারী।

প্রদাহের চিকিৎসাকালে বোগীর জীবনীশক্তি যাহাতে অত্যন্ত  
অবসন্ন হইবা না পড়ে, তজ্জন্তু বিশেষ চেষ্টা থাকিবে সর্বল  
কার উদ্দীপনা নিবারণ করিবে পথ্য লঘু হইবে বরফ  
তল জল যথেষ্ট দিবে অত্যন্ত বেদনা ও উগ্রতা থাকিলে  
দ্রব্য ঔষধ ব্যবহার্য্য জলের বেগ বেনী থাকিলে, প্রাণ-  
১ শৈত্যমিশ্র ২৮২, ২৮৩, ২৮৮, ৩০০ অস্ত্রে মল সঞ্চিত  
লে—বিবেচক। নাড়ী দুর্বল, ক্ষুদ্র ও অনিয়মিত গতিশীল  
—মাংসের কাথ, দুগ্ধ, ক্রিম, কাঁচা ডিম ও মদ্য অর্ধড্রাম  
। ইথর ও ১০ মিনিম ভাইনম কলচিকম একত্রে মিশ্র

প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে ইউরেটস্ বহির্গত হয় প্রদাহ-  
বস্থায় অধিক শ্বেদস্রাব বা তরল মল নির্গত হইতে থাকিলে  
তাহা সহসা নিবারণ করা কর্তব্য নহে, কারণ ঐরূপ হইয়া  
প্রদাহের শান্তি হইতে পারে ; কিন্তু যদি উহা দারা বোণী অত্যন্ত  
অবসন্ন হইয়া পড়ে, তবে তাহা নিবারণ করা কর্তব্য প্রদাহ  
দমনার্থ বিবিধ প্রকার স্থানিক ঔষধ প্রয়োজিত হইয়া থাকে  
শীতল জল, ববফ, ইভাপোবেটীং লোশন—১১৮, ১১৯, ১২০  
উত্তপ্ত ফ্লানেল দ্বারা বা অগ্নিরূপ ফোমেন্টেসন ইত্যাদি বোণ  
পুরাতন হইলে ব্লিষ্টার, টিং আইয়োডিন ও বিবিধ উত্তেজক মর্দন  
ব্যবহৃত । বাতের প্রদাহে সেবনার্থ স্যালিসিন, স্যালিসিলিক এসিড  
বা স্যালিসিলেট অব্ সোডা প্রয়োজ্য মস্তিষ্ক প্রদাহে বেলে-  
ডোনা । প্রলাপ ও উত্তাপাধিক্যে ক্লোরাল চক্কু, কর্ণ ও নাসি-  
কার পুষ্ক-ক্ষরণযুক্ত প্রদাহে পলসেটিনা ।

যে সকল প্রদাহে পুয়োৎপত্তি হয়, তাহাতে ও শৈল্পিক বিধীর  
প্রদাহে মার্কবী বিশেষ উপকারী নহে অগ্নাত প্রকার প্রদাহেও  
ইহা বিশেষ সাবধানতা সহকারে ব্যবহাব করিবে । প্রদাহের  
সার্কাস্টিক চিকিৎসা—কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, বিরেচক ; জরাতি থাকিলে  
মূত্রকারক ও শ্বেদজনক ঔষধ । ক্যালোমেল ও ডোভার্স পাউ-  
ডর পুরাতন প্রদাহে আইয়োডাইড্ অব্ পটাশিয়ম, মার্গা-  
প্যারিলা, ও কডলিভ অয়েল ইত্যাদি

বয়েল—বিষ ফোড়া । —ক্ষুদ্র, \* ক্ত ও অত্যন্ত বেদনা-  
বিত ফোটক । প্রকৃত চর্ম ও তৎসন্নিহিত যোজক তন্তুতে প্রদাহ  
হইয়া উৎপন্ন হয় । পুয়োৎপত্তি ও ক্ষত হওত রোগারোগ্য হইয়া  
থাকে । বেলেডোনা ও গ্লিসিরীণ অথবা অহিফেন বা কোকেইন

বেদনা-হরণার্থ স্থানিক প্রয়োজ্য স্পিরিট ক্যাম্ফর, বোগের প্রারম্ভে তুলী দ্বারা অর্ধ মিনিট লাগাইবে, চর্ম শুষ্ক হইলে কর্পূর মিশ্রিত তৈল সংলগ্ন করিবে; কয়েকবার প্রয়োগ করিলেই বিষ্ফোটক বন্দিয়া যায় কলোডিয়ন; ব্লিষ্টাব মলকাইড্ অব্ ক্যাল-সিয়ম— $\frac{1}{8}$  হইতে  $\frac{1}{2}$  গ্রেণ মাত্রায় ক্ষীরশর্করা সহ ২৩ ঘণ্টান্তর প্রয়োগে শীঘ্র শীঘ্র পুষোৎপত্তি বা উহা নিবাবিত হয় ও আব নূতন স্ফোটক বাহিব হয় না স্থানিক ওষধ ওষাটব ড্রেসিং, পুন্টিস পূব বাহিব হইয়া গেলে বোবাসক বা বেঙিন অয়েন্টমেন্ট বা কার্বলিক অয়েল অত্র পরিষ্কার করণার্থ বিবেচক পুষ্টিকর খাদ্য বলকারক ঔষধ—কুইনাইন ও মিনাবেল এসিড প্রভৃতি, ১৬৭, ১৯৩, ১৯৪ বোগেব প্রারম্ভে এম্প্লাষ্ট্রম ওলিয়াই বা টিং আইয়োডিন, অথবা টিং কষ্টিক লোশন বা সিট্রিন অয়েন্টমেন্ট বা ওলিষেট মার্কবী লাগাইবে পুনঃপুনিকতা নিবা-রণার্থ আর্সেনিক কর্ণাভান্তবস্থ বিষ ফোডায় ফার্মাকোপিয়াব কবো-দিত সল্লিমেট সলিউশন কয়েক ফোট দিয়া কর্ণ ছিজে তুল্য দিয়া বাধিলে উপকার হয়।

হর্ডিয়োলম্—আঞ্জনী।—ফোমেণ্টেশন, ওষাটব ড্রেসিং টিং আইয়োডিন, কষ্টিক লোশন বিবেচক, কুইনাইন ও বার্ক টিং অব্ ষ্টীল টিং পলসেটিল্য  $\frac{1}{8}$ —১ মিনিম মাত্রায় পুনঃ পুনঃ হইতে থাকিলে মলফব ব্যবহার্য্য প্রথমোক্তায় চর্মের পাতাব লোম উৎপাটন করিয়া সূচীব অণে কার্বলিক এসিড সংলগ্ন করন্ত স্থানিক প্রয়োগে উপকার হয় ইবেলো অক্সাইড অব্ মার্কবীব ক্ষীণ মলম প্রয়োগ উপকারী রেড অক্সাইড অব্ মার্কবী ও কোকেইন ১ গ্রেণ, ভ্যাসিলিন ২ ড্রাম



## কার্বঙ্কল—পচনশীল বিস্ফোটক ।

চর্ম্মের কতক অংশ ও তৎসম্বন্ধিত তন্তুব এক প্রকার প্রদাহ বোগ, ইহাতে অল্পস্থ রসাদি শ্রাব হইয়া উক্ত তন্তু আদির অভ্যন্তরে সঞ্চিত হয় ।

লক্ষণ । চ্যাপ্টা ও গোলাকান শলিতা, দন্দবে বা অতীক্ষ কণ্ঠে বেদনা, পুয়োৎপত্তি, সবও পুয়শ্রাব, যোজক তন্তুব পচন, বক্তাব অবিগুহানস্থা, মার্কাজিক উপদ্রব, অবসন্নতা, পুযাত্মক বক্ত ( পাইমিয়া ) রোগোৎপত্তির আশঙ্কা ।

চিকিৎসা । বেলেডোনা ও গ্লিসিৰীণ, বেদনানিবারণার্থ স্থানিক প্রয়োজ্য । আর্গিকা, স্থানিক ও আভ্যন্তরিক কার্বলিক এসিড, গ্লিসিৰীণ বা তৈল সহ বা ধাবনরূপে মলফাইড অব্ ক্যালসিয়াম  $\frac{1}{2}$  গ্রেণ মাত্রায় ১২ বা ৩ ঘণ্টান্তর সেব্য লিন্‌সিড পুলটীস ওয়াটার ড্রেসিং, বেদনা নিবারক ঘোমেন্টেমন অথবা কোকেইন বা ক্লোবান লোশন শত্ৰিত অংশের উপর ইথর স্প্রে দিলে উহা সম্ভব বিদূষিত হয় কষ্টিক লোশন ও আইগোডিন্‌ লিনিমেন্ট বা অগ্নুয়েঃ হাইড্রাজ্জ স্থানিক দিবে পুণ হইলে ক্রসিয়ান অর্থাৎ লম্বাদি ভাবে ছই বান কাটিবে শত্ৰিত অংশ বিদূষিত হইলে উত্তেজক দ্ব্যোত দিনে—২৫ উত্তেজক তৈল—২৮ আইয়োডোফর্ম বা টর্পেন্টাইন অয়েন্টেমেন্ট মার্কাজিক চিকিৎসার জন্য পডোফিনিন বটিকা—৩৪ । সোডি মলফাস্ ও ট্যারাকসেকম -৩৩৯ । ম্যাগ্না মলফ, ৩৩১ । ক্যাষ্টর অয়েল । মিড্‌গীজ পাউডর । ক্লোবট অব্ পট্যাশ ও টিং পারক্লোরাইড অব্ আয়রণ—১৮৯ । মিনারেথ এসিডস্ ও বার্ক, ১৭০, ১৯৩ । এমোনিয়া



ও বার্ক—১৮৩, ১৮৪      কুইনাইন ও আয়রন—১৭২, ১৭৪ ১৭৬,  
১৭৭      সহজ পাচ্য খাদ্য    কিম, দুগ্ধ, ডিম্ব, মাংসেব কাথ    আব-  
শ্যক মত উত্তেজক ও মদিরা প্রযোজ্য    বেদনা নিবারণার্থ ওপি-  
য়ম ৮৮, ৮৯, ৯৮, ১৪১      মুখমণ্ডলস্থ পীড়ায় বেদনা উপশমনার্থ  
বিউটিল ক্লোরাল হাইড্রেট সেব্য

### ক্যান্সার কৰ্কট রোগ ।

রক্তের এক প্রকার বিশেষ অবিগুদ্বাবস্থা হইতে এই বোগ  
কৰ্কটাকার অর্ক্সুদরূপে উৎপন্ন হয়    বক্তে এক প্রকার অবিগুদ্ব  
পদার্থ সঞ্চিত হওয়ায় ইহাব বর্দ্ধন হইতে থাকে    ইহা একটা  
সার্ভাস্টিক বোগ    কেহ কেহ বলেন যে, ইহা প্রথমে স্থানিক,  
অবশেষে সার্ভাস্টিক হইয়া পড়ে    কিন্তু এতৎসম্বন্ধে অনেক মত  
ভেদ দৃষ্ট হয় ।    সাধাবণতঃ এই বোগ তিন ভাগে বিভক্ত  
যথা ১ম,—কঠিন কৰ্কটিকা বা স্ক্লিভস্ বা হার্ড ক্যান্সার    ২য়—  
কোমল অর্থাৎ মিডুলারি বা সফ্ট ক্যান্সার    ৩য় ইপিথিলি-  
য়েল ক্যান্সার

লক্ষণ ।—অর্ক্সুদ হস্ত দ্বারা নাড়িতে পারা যায় ; ইহা  
দ্বারা প্রকৃত বিধান-বিকার জন্মে, পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহ আক্রান্ত  
হয়, ক্রমশঃ আচ্যক গ্রন্থি ও নাড়ী এবং অবশেষে সমস্ত দেহ  
এতদ্দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে    কৰ্কটিকাৰ্ক্সুদ ক্রমশঃ কোমল  
ও উহাব বিধান বিশ্লেষ সমুৎস্থিত হয়    চর্ম্ম বা শৈথিক ঝিল্লিতে  
ক্ষত ; দুর্গন্ধ, গভীর ও প্রসাবশীল ক্ষত, দুর্গন্ধ ও উগ্র ক্ষত-  
স্রাব, রক্তক্ষরণ, দুর্বলতা ও অবসন্নতাব ঐমিক বৃদ্ধি, বিবর্মিয়া

ও বমন, উদরাময়, সম্পূর্ণ গতিশক্তিবিহীনতা ও অবসন্নতা এবং অবশেষে মৃত্যু। কর্কটিক ধাতু পদ্ধতির লক্ষণ অর্থাৎ—চন্দ্রমণ্ডল বর্ণ মলিন পীত, মুখাকৃতি আকৃষ্ট, সার্বজনিক ক্ষয় ও দুর্বলতা, বল ও কার্যদক্ষতার সম্পূর্ণ হানি, মানসিক উগ্রতা ও ভীতি ইহাতে বেদনা ও যন্ত্রণাতিশয়া বর্তমান থাকে।

এই রোগের অর্কুদে এক প্রকার বিশেষ বোম্ব জন্মে, তাহাকে ক্যান্সার সেল বা কর্কটিক বোম্ব বলে। নিঃস্রাবক গ্রন্থিকোষের সহিত ইহাদেব অনেক মৌনাদৃশ্য আছে।

চিকিৎসা। ক্রোনাল হাইড্রট ১০ গ্রাম মাত্রায় দিবস তিনবার সেবন করিলে অত্যন্ত পথ্য বেদনাও উপশান্ত হয়। ক্রোমিক্লোরাইড বা ক্রোমিক্লোরাইড, ইহাতে বেদনার শান্তি হইতে পারে। আইওডোব্রম স্থানিক ব্যবহার্য। মিসিবিল অব ট্যানিন ও কার্বনিক এসিড। আর্মোনিক ১৬৮, ১৮৯, ১৯১, ৪১১। আর্সিনিসাই অক্সোডিডম ১, ইহাতে ১২ গ্রাম দিনে দুইবার, আহাবেব দুই ঘণ্টা পর সেবা বেলেডোনা—৯৫, ১০১, ১৬৪, ৪০৫। ফেরি এমোনিয়ো ক্রোমাইডম ৪ ইহাতে ১০ গ্রাম ফেরি পারঅক্সাইড, ফেরি সালফেট—১৮৭। হাইড্রার্ক ক্রোমিক্লোরাইড ৩৯৮, ৪০২। আইয়োডিড—১৭৫, অথবা ক্রোনাম বা প্রুপিয়ামের সঙ্গে প্রুপিয়াম ৮৮, ১৩৩, ১৩৪। স্থানিক—এন্টমোনিয়াট টানাক্রোমাইডম আর্মোনিক—৮৪। বেলেডোনা ১২৯। কার্বনিক এসিড ২৮। বাসনিক এসিড ১১। সিবোমাইন ফার্মেন্টম ইহাও ক্রোমাই। ক্রোমিক এসিড; ক্রোনাম—১২৫, ১২৩। ক্রোনাম পুন-টিম। ফেরি আর্সিনিয়াস; হিমোটক্সিলমের মাত্র হাইড্রার্ক

আইয়োডিডম্ কব্রমেব মলম। অজুমেঃ হাইড্ৰজ। আইয়ো-  
ডিন :৬ প্লয়াই ক্লোবাইডম ভায়েনা পেষ্ট [ কুইক লাইম  
ও পটাশী কল্ক্যালসী সমভাগে ] ক্লোবাইড্ অব্ ব্রোমিয়ম।  
জিন্সাই ক্লোবাইডম্। হাইড্ৰাষ্টিস্ ক্যানাডেন্সিস্ স্থানিক ও আভা-  
ন্তরিক প্রয়োগ সফলপ্রদ।

### স্ক্ৰফিউলা ও টুৰবাকউলোসিস্।

রক্তেব একপ্রকাব পীড়া। শবীবেব বিশেষ বিশেষ বিধানে  
গুটিকা সঞ্চিত হয়। গণ্ডমালা, ক্ষয়বোগ, গুটিক মস্তিষ্কোদক ও  
অঙ্গচ্ছদ প্রদাহ এবং অঙ্গযোজকাভ্যন্তরস্থ গ্রন্থিব ক্ষয় রোগ  
(টেবিস মেসি ন্ট কা) পূৰ্ব্বোক্ত কাবণে সমুদ্ভূত হয়। এই রোগে  
বক্তেব কৌদূৰ্ণ পৰিবৰ্ত্তন হয়, তাং অদ্যাপি স্থিবীকৃত হয় নাই ;  
সম্ভবতঃ গাঢ় অপেক্ষা তবন পদার্থেৰ আধিক্য হয় এবং বিশে-  
ষতঃ রক্তাণু কমিয়া যায়। কৈশিক বক্তাধারে তরলাকার এক  
প্রকাব গুটিকা বা দান দানা পদার্থ সঞ্চিত হয়, তৎপবে ইহা ঘনী-  
ভূত হইয়া থাকে। বিবিধ যান্ত্ৰিক ওস্ততে ইহা সন্নিবেশিত হয়  
সচরাচৰ ফুসফুসে ইহা অধিক দৃষ্ট হয়।

লক্ষণ। অজৰ্ণ, শৰ্কবা ও মেৰ পদার্থ সমীকরণে কষ্ট,  
অন্ন উদগাব, বৃক্কাণা, উদবাধান, দেহেব পাণ্ডুরতা ও মৈত্যা  
মুভব, কিন্তু তপনান দ্বাবা দোথলে দৈহিক উত্তাপ বৰ্দ্ধিত  
হইয়াছে দেখা যায়। উদব ক্ষতি, মুখমণ্ডল অন্ন ক্ষাত, তৎ  
সঙ্গে ওষ্ঠাধব ও নাসিকা ক্ষাত দেখায। বুদ্ধিবৃত্তি আদি উত্তম-  
রূপে পৰিবৰ্দ্ধিত হয়। বক্তাধান ধাতুপত্তি, কণকুহব হইতে

পুষ্করণ, মস্তকে সজদোস্তেদ এঁ বা ও তালুপার্শ্ব এস্থিবি বিবৃদ্ধি, পদ ও কক্ষদেশে হইতে দুর্গন্ধি স্বেদপাঁচ, নাড়ী জ্ঞাত ও দুর্বল, সার্বাস্থিক দৌর্বল্য, দৈহিক ভাবের ক্রাস, সাদৃশ্য প্রকার জবেব প্রবণতা। যে যন্ত্র আক্রান্ত হয়, তাহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়। জীবনেব সকল সময়েই এই বোগ সমুদ্ভূত হইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ ৩ ১৫ বৎসব ও ১৮ হইতে ৪০ বৎসব বয়ঃক্রমেব মধ্যেই অধিক হয়। যে কোন কারণে বক্তের অস্বস্থতা সম্পাদিত হয়, তাহাতেই এই বোগ জন্মিতে পারে। বক্ষের স্বাভাবিক বিকৃতি, কুসংস বিধাতার অপকর্ষ, পবিপোষণেব ব্যাঘাত ও অপবসিত রক্তিক্রিয়াও এই বোগেব কারণ।

গণ্ডমালাজনিত ফোটিকাদি, যোজক তন্তুত অজ্ঞাতসারে সমুৎপন্ন হয়। কখন কখন ইহা পাকে ও কখন না থাকিয়া বহুকাল স্থায়ী হয়। কোন কোন সময় ইহাতে ক্ষত হইয়া নিকটবর্তী স্থানসমূহে প্রসারিত হইয়া পড়ে। ইহাও ক্ষত সাধারণতঃ গ্রীবা, স্বন্ধ, বাহু বা কুঁচবিতে দৃষ্ট হয়। এই ক্ষত সহজে বা সম্পূর্ণরূপে আবোধ্য হয় না।

চিকিৎসা আধুনিক দ্বারা বদ্ধিত নীরবায়তা হ্রাসিত হয় ও ইহা পবিবর্তক হইয়া উপকার ববে। ক্রোমাইড অব্ ক্যালসিয়াম, ১০ হইতে ২০ গ্রেম মাল্য, দুই মাস, তাৎক্ষণিক সেবন করিলে গ্রীবার ওহিবিরদ্ধন ও পোচীন উদরায় উপশমিত হয়। ফসফট অব্ লাইম সেবনে ক্ষত আবোধ্য হইতে পারে। সলফাইড অব্ ক্যালসিয়াম ৫০ ১০ গ্রেম মাল্য ২১৩ ঘণ্টাস্তব সেবন করিলে গণ্ডমাণীয় ক্ষত ও ফোটিকাদি উপ-



শামিত হয়। কডলিওব অয়েল—১৯২, ৪১০ আইয়োডিন ১৭৫, আইয়োডাইড্ অব্ পটাসিয়ম, ১৯২, ৩৯৯ ৪০৬ আইয়োডাইড্ অব্ এমোনিয়ম আইয়োডাইড্ অব্ আয়রন—১৮১, ১৮২, ১৯৯, ৪০৩ কুইনাইন ও আয়রন, ১৭২, ১৭৪, ১৭৬, ২০১, ২০৮। আর্সিনিক ও আয়রন ১৮৯ ক্লোবেট অব্ পটাশ ও আয়রন—১৮৯। ক্লোবেট অব্ পটাশ ও সিনকোনা এসিড ফস্ফ ডিল

সামুদ্রিক বায়ুসেবন, সমুদ্রের জলে স্নান, উৎকৃষ্ট ও পুষ্টিকারক দ্রব্য আহাব যথা দুগ্ধ, দুগ্ধ ও লাইম ওয়াটর, ডিম্ব, মাংস প্রভৃতি বিগুন্ধ বায়ুপূর্ণ স্থানে বাস বায়ু পরিবর্তন প্রত্যাহ নিয়মিত ব্যায়াম ক্যালিবিয়ট ওয়াটর পান বিশেষ উপকারী সাধাবণ স্বাস্থ্য যাহাতে উন্নত হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্তব্য ব্লিষ্টার, আইয়োডিন পেন্ট, পুন্টিস ও কার্বলিক এসিড প্রভৃতি বর্জিত গ্রন্থিতে স্থানিক ব্যবহার্য হাইপোফস্ফেট অব্ লাইম বা সোডা সেবনে বিশেষ উপকার হয়

### ল্যুপস।

ইহা এক প্রকার বিনষ্টকর চর্ম রোগ পীড়ার প্রাবল্ডে এক বা অধিক কোমল ও অল্প লাল গুটিকা উৎপন্ন হয়; পরে উহাব উপর মাগড়ী পড়ে ইহাব ক্ষত শুষ্ক হইয়া গেলে ক্ষতচিহ্ন বর্তমান থাকে ইহা প্রায় মুখমণ্ডলেই হয় তরুণ ও প্রৌঢ় বয়সেই অধিক হইতে দেখা যায় এবং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদেরই অধিক হয় এই রোগ দ্বিবিধ—১ম প্রকারে ক্ষত

অল্প বা আদৌ থাকে না, তথাচ বোগারোগের পর গভীর ক্ষতচিহ্ন থাকিয়া যায় ২য় প্রকারে ক্ষত হয়, সাধারণতঃ উহা দ্বারা নাসিকার বাহ্য অংশ আক্রান্ত হয় ৭তম্বাণা আক্রান্ত অংশ বিধ্বংসিত হয়, এমন কি কখন কখন সমস্ত নাক খসিয়া পড়ে

চিকিৎসা — শবীরেব বলবৃদ্ধিকরণার্থ পুষ্টিকর খাদ্য, কডলিওর অয়েল, কুইনাইন ও আয়রন, ফস্ফেট অব্ আয়রন ও লাইম আর্সেনিক ; ডনোভান্স সলিউশন । আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম ও সার্জ বেড্ আইয়োডাইড্ অব্ মার্কবী, গ্রীণ আইয়োডাইড অব্ মার্কবী আইয়োডাইড্ অব্ আয়রন । আইয়োডিন থ্রীসিরিং সহ

স্থানিক—অগ্নিদাহন ; প্রবল কষ্টক—ক্লোরাইড অব্ জিঙ্ক, নাইট্রিক এসিড, ক্রমিক এসিড, কার্বলিক এসিড, এসিড সলিউশন অব্ নাইট্রেট অব্ মার্কবী, ক্রিয়েজোট, স্ট্রাণ্ডিগনিক এসিড, ইত্যাদি কষ্টিক দ্রাব্য দক্ষ কাব্য। উভেজক দ্রব বা কার্বলিক এসিড ও থ্রীসিরিং স্থানিক প্রয়োগ করিলে আইও-ডাইড অব্ সলফর চালুগুবাব তৈল । আইয়োডোফর্ম

## নেত্রমী — মহাকুষ্ঠ ।

বক্ত অবিগুহ্য হইয়া এই বোগ উনো রোগ প্রকারেব পূর্বে সার্বজ্ঞিক স্নাত্ত্যেব অপকর্ষ উৎপাদিত হয়। ৩৭২রে উদ্ভেদ বাহির ও চর্ম্ম বিবর্ণ হয়। এই বোগ দিবধ—এক প্রকারে স্পর্শবোধ নষ্ট হয়, তাহাকে ম্যানিস্টিটিক নেত্রমী ; ও

অপব প্রকারে চর্ম্ম গুটিকা বা ক্ষুদার্কুদ জন্মে বলিয়া তাহাকে ট্যাবকিউলটেড লেপসী বলে প্রথম প্রকারে স্নায়ু ও স্নায়ুকেন্দ্র ও দ্বিতীয় প্রকারে চর্ম্ম ও শৈল্পিক বিল্লি আক্রান্ত হয় ইহারা স্বতন্ত্র ভাবে বা একত্রে অবস্থিতি কবিতে পারে প্রথমে চর্ম্ম ফুলিয়া উঠে এবং উহা কর্কশ হয়, তৎসঙ্গে অল্পাধিক জ্বর থাকে উদ্বেদ সকল, অর্কুদ বা গুটিকার ছায় হয় ও তাহাতে ক্ষত জন্মে এই ক্ষত পচিয়া হস্তপদের অঙ্গুলি আদি পড়িয়া যায় নাকের চর্ম্ম পুঙ্ক হয় আক্রান্ত স্থান সকল মোটা অর্থাৎ স্ফীত হয় নাসাগ, ওষ্ঠাধর, কপোল ও কর্ণের বাহ্যংশ স্ফীত ও বিবর্ণ হইয়া থাকে নখ বিবর্ণ ও সশঙ্ক, কক্ষ ও বক্ষগদনাস্থ গ্রন্থিসমূহ স্ফীত হয় গাত্রজ্বালা ও দেহ হইতে এককপ তৈলাক্ত ঘ্রেন নিঃসৃত হয়। হস্তপদ সকল স্ফীত, কুঞ্চিত ও অকর্ম্মণ্য হয় এবং অণ্ডকোষ শুষ্ক হয় অঙ্গাদি এরূপ অন্যত হইয়া পড়ে যে, উত্তপ্ত মৌহশলাকা ধবিলেও রোগী কিছু বুঝিতে পারে না কাহাব কাহার অল্প বেদনা থাকে

চিকিৎসা। —৭র্জন তৈল ও চূণের জল সমভাগে স্থানিক প্রয়োজ্য ৭র্জন তৈল, ৫ ১০ মিনিম মাত্রায় চূণের জল সহ আভ্যন্তরিক সেবনেও উপকার দর্শে

এই বোগ প্রায়ই আবোগ্য হয় না তবে ঔষধ ব্যবহারে বোগের বৃদ্ধি স্থগিত অথবা প্রথমাবস্থা হইতে রীতিমত চিকিৎসা করিলে কেহ কেহ আবোগ্য হইতে পারে ব্যায়াম এবং উচ্চভূমি ও পার্শ্বত্যা প্রদেশে বায়ুপরিবর্তন জন্ত গমন করা উচিত পুষ্টিকর অথচ সহজে পরিপাক হয়, একপ পথ্য দেওয়া কর্তব্য। আর্সি-

নিক, সল্ফর ও আইয়োডিন বাথ ঔষধেব মধ্যে কঙ্কালিতর  
অয়েল, কুইনাইন ও ষ্ট্রীল এবং আর্সিনিক ও আইয়োডিন, ষ্ট্রীক-  
নিয়া, বিরেচক। তিত্ত বলকারক ও ফসফেট ঔষধাদি। পানদ-  
ঘটিত ঔষধ এককালে ব্যবহার কবিবে না হাইড্রোইন  
এসিয়াটিকা অর্থাৎ থলকুড়ীর পত্র সেবনেও কাহার কাহার  
উপকার দর্শিতে দেখা যায় কার্বলিক এসিড তৈলের মধ্যে  
স্থানিক ব্যবহারে কিছু কিছু উপকার হয় কার্বলিক এসিড  
আভ্যন্তরিকও ব্যবহার হইতে পারে কেহ কেহ নাইট্রিক এসিড  
কেহ বা সাইট্রিক এসিডেব বিশেষ প্রশংসা কবেন। স্পর্শগোপ  
সংযুক্ত কুষ্ঠবোগে লাল চিএব (প্লোমেগো বোভিয়া) অবিষ্ট  
১ ড্রাম মাএয় দিবসে দুই তিন বার ফলপ্রদ

### রিকোর্টস্—অস্থিকোমলতা।

এই পীড়া বাল্যকালে হয় পূর্ণবয়স্কদের ঈদৃশ বোগকে  
অস্টিয়ো মালেসিয়া বলে ১৫ বা ১৮ মাস বয়সের সময় যখন  
শিশু হাঁটিতে আবস্ত করে, তখনই এই রোগ প্রকাশিত হয়।  
অস্থি সকল বর্দ্ধিত হইতে থাকে; কিন্তু উহা কোমল ও নম-  
নীয় হয়। অস্থিবিধান দেখিতে স্মৃহ বোধ হয়; কিন্তু উহাতে  
পার্শ্ব পদার্থের সম্যক পরিমাণেব অভাব জন্মে দুঃখী লোক-  
দেব গণ্ডমালা ধাতুপ্রকৃতিক শিশুগণই এই বোগে অধিক  
আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ।—মস্তক মচরাচর বড়, কপাল উন্নত, তালুপার্শ্ব-  
গ্রন্থি দীর্ঘ, মুখাকৃতি বিশেষ প্রকার আকৃতিবিশিষ্ট, বক্ষঃ অপ্রশস্ত



ও উহার মধ্যস্থ অস্থি উন্নত দেখায় পৃষ্ঠবংশের বক্রতা ; অঙ্গের, বিশেষতঃ অধঃশাখার অস্থির বক্রতা ; দেহ বর্দ্ধানের ব্যাঘাত এবং ব্রহ্মতালু বিলম্বে ও ক্রমশঃ অবকঙ্ক হয় বস্তুগহবরের বিকৃতি হওয়ায় শীলোকদের প্রসবের সময় বিশেষ ক্লেশ হয় । এই বোগেব বিশেষ লক্ষণ এই যে, শিশু নিদ্রিতাবস্থায় গাএাবরণ বাথে না, বালিশে মাথা বাথে না নিদ্রিতাবস্থায় মুখমণ্ডলে, গলদেশে; মস্তকে ও বক্ষে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম হইয়া থাকে উদর ও নিম্নশাখা অতিশয় শুষ্ক থাকে যৌবনাবস্থার পৰ অস্থি সকল দৃঢ় হয়

চিকিৎসা। এই বোগ প্রায়ই বালকদিগেব হইয়া থাকে ; যে সকল বালকেব এই বোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহাদিগেব নবম বা দশম মাস বয়ঃক্রম হইলেই লেবিগেব বা ৭৭ বিসেব কেমিক্যাল ফুড দিবে পৰিষ্কার প বিচ্ছন্নতাব প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করা কৰ্তব্য আনুযজিক কোন বোগের লক্ষণ প্রকাশিত হইবায়াএই তৎপ্রতিকারার্থ যত্ন করিবে সার্বাস্থিক শক্তি বর্দ্ধনার্থ লৌহঘটিত ঔষধ ধাতব অম্ল, নক্স, তিত্ত বলাকাবক, ফসফেটস প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার্যা, তৎসঙ্গে কুইনাইন মিশ্রিত কবিয়া দিলে অনেক সময় বিশেষ উপকাব হয় কডজি ভাব অয়েল ছুন্ধ সহজে পরিপাক না পাইলে চুণেব জলেব সঙ্গে দিবে মাংসের নোম সিনাপা ফেনি ফসফেট, ফস্ফেট অব্ আফ-বণ ; ফসফেট অব্ লাইম, সোডা ও পটাস হাইপোফসফেট অব্ লাইম বেচনার্থ বিউবার্ক, সিরপ অব্ সেনা, বা ক্যাষ্টেব অয়েল পদদ্বয় বক্র না হইতে পারে, তজ্জন্তু বিবিধ প্রকাব স্পিউটে ব্যবহার কবিবে বাসস্থান বিশুদ্ধ বায়ুপূর্ণ হওয়া উচিত ।

সুগ্ৰপায়ী শিশুৰ প্ৰসূতিকে ফ্ৰেঙ্কট অৰ্জাইম সেৱন কৰাইলে শিশুৰ উপকাৰ হয় এই বোগে লব্ধ জলে গান বিশেষ উপকাৰী।

### স্ফুৰ্ত্তি—শীতান ।

এক প্ৰকাৰ বিমিশ্ৰিত অসুস্থাবস্থা অধিক দিৱস তৰণ উদ্ভিজ্জ আহাৰ না কৰিলে সমুৎপন্ন হয়

লক্ষণঃ —মুখাকৃতি পাণ্ডুৰ-ধূস্ৰবৰ্ণ, মাৰ্ক্সাঙ্গিক চৰ্ম্মও সাধা-  
ৰণতঃ তদ্ৰূপ ; মাড়ি স্ফীত, সচ্ছিন্ন, ফেকাণে বা নীলিম ; শ্বাস  
দুৰ্গন্ধ ; দৌৰ্দ্ধল্য, বাত্ৰাক্ৰতা ; বধিবতা, শ্বাসকৃচ্ছ । মাড়ি পচিয়া  
যায় ও দন্ত শিথিল হয় মাড়ি, নাক, মুখ, পাৰ্শ্বাংশ ও অঙ্গ  
হইতে বক্ত্ৰাৱ হয় বিস্তীৰ্ণ কালশিৱা, পদস্ফীতি, পদেব  
অনমাতা, উদাশ্ৰ, কাৰ্য্যক্ষমতা, উদরাময়, বক্ত্ৰামাশয়, উদনী ও  
অবসন্নতা প্ৰভৃতি লক্ষণও ক্ৰমশঃ প্ৰাদুৰ্ভূত হয়

চিকিৎসা । —ডাঃ কুক বলেন যে, এট্ৰপিয়াৰ হাইপো-  
ডাৰ্মিক ইনজেক্সন বা অধস্তাচ প্ৰক্ষেপ দ্বাৰা এই বোগ আৰোগ্য  
হয় লিমন জুস ( লেবুৰ রস ), কমলালেবু ও তৰণ উদ্ভিজ্জ  
দ্ৰব্য ; এই কয়েকটি দ্ৰব্য বীতিমত সেৱন কৰিলে শীতান ৰোগ  
উৎপন্ন হইতে পাবে না বক্ত্ৰাৱ বোধৰ্থ গ্যুলিক এগিড,  
আৰ্গট, টিংচৰ অৰ্জাইম পাবক্লোৰাইড অৰ্জাইম, ২১৮, ১৭১। বেচ-  
নাৰ্থ—লিকুইড এল্ভাক্ট অৰ্জাইম বা ক্যাক্সেৰা এগিড সন্-  
ফিউৰিক ডিল মাডিৰ কাঠি সন্পাদনাৰ্থ নাইট্ৰেট অৰ্জাইম  
ভৰ স্থানিক প্ৰযোজ্য। সংকোচক কবল—২৫৫, ২৫৭, ২৫৮।

ট্যানিক এসিড লোজেন্স যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ, কাঁচা ডিম, মাংসেব ঝোল, গোল আলু, কপি, পেপে, পিয়াজ প্রভৃতি । স্প্রুস-বিয়াব, এল, সেরী ও সাইডব প্রভৃতি আসব । সাইট্রেট অব্ পটাশ, ক্রিম অব্ টার্টব । এমন কার্ব, আর্সেনিক । ফেরি আর্সি-নিয়াস অস্থিরতা নিবারণার্থ ওপিয়ম কুইনাইন ও আয়রন সেবনে পীড়া সত্তর আরোণ্য হয় । মাংস, সিনকোনা ও চার্কোল ।

### পার্পুরা ।

রক্তের ও কৈশিক শিরার অস্বস্থাবস্থা হইতে এই বোগ উৎপন্ন হয় ইহাতে রক্ত হইতে রক্তাণু বিল্লিষ্ট হইয়া পড়ে এবং চর্ম্মেব উপর কালশিরাব মত দাগ হয়

লক্ষণ ।—আলস্য, দুর্বলতা, মুখাকৃতির বর্ণ পাণ্ডু বা ধূস-বৎ, নাসাবক্ত্রাব, পাকশয়োপবি বেদনা, খাদ্যদ্রব্যে লালসা, হৃৎবেপন, শিরোঘূর্ণন, কোষ্ঠবদ্ধ । রক্ত ক্ষবিত হইয়া বিবিধ তন্তুতে জমে । চর্ম্মোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তপূর্ণ দাগ বা পীড়কা দৃষ্ট হয় । বড় বড় কালশিরা চিহ্ন, প্লীহার বিবৃদ্ধি ও কোমলতা । রক্তের অবিগুহতা জন্ত গাত্রে এক প্রকাব ফোটোৎপত্তি হয় ও তাহা রক্ত-পূর্ণ বোধ হয়

চিকিৎসা ।—সলফেট অব্ সোডা ও সলফিউরিক এসিড ক্যাপ্টব অয়েল সলফেট অব্ সোডা ও ট্যাবাক্সেসকম, ৩৩৯ । কুইনাইন ও আয়রন, ১৭২, ১৭৪, ১৭৬ । কুইনাইন ও মিনারেল এসিড, ১৬৭, ১৯৩, ১৯৪ । কুইনাইন, ষ্টীল ও আর্সি-নিক ফসফেট অব্ আয়রন আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব হইলে

অয়েল অব্ টর্পেন্টাইন, ২১৭ ; গ্যালিক এসিড ও মলফিউরিক এসিড, ২১৮ আর্গট বিশেষ উপকারী । পুষ্টিকারক খাদ্য টাটকা ফল ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্য এল ও অন্যান্যবিধ মদ্য এলম্ ব্রাণ্ডি সহ স্থানিক টিংচর ল্যাবিসিস্ । ডিম্বিটেলিস্ বও-  
আবে আর্গটনেব হাইপোডার্মিক গীচকারি হেজিলিন বা হামে-  
য়েলিস সেব্য ।

## গইটার বা ব্রেকোমিল ।

বাঙ্গালায় ইহাকে গলগণ্ড বলে গ্রীষ্মদেশস্থ থাইরইড গ্রন্থি  
বিসৃদ্ধ হইলেই এই নামে আখ্যাত হয় যে স্থানেব জলে  
চূর্ণের ভাগ অধিক থাকে, তথায়ই এই বোগ অধিক হয়

লক্ষণ —সমস্ত গ্রন্থি বা উদার পার্শ্ব বা মধ্যভাগ স্তম্ভিত  
হয় দক্ষিণ দিকেব গ্রন্থিই পোষ বর্জিত হয় বোণী গলদেশেব  
বিকৃতি ব্যতীত অন্য কোন অসুখ অনুভব কবে না কেহ কেহ  
গলাব ধমনীতে দব্দব্ বোধ কবে এবং কাহার কাহার স্ববেপন,  
মানসিক অবসন্নতা, অজ্ঞান ও বক্তাপকর্ষেব অপবাগব লক্ষণ বিদ্যা-  
মান থাকে শ্বাসকষ্ট ও দিগন্তে ( ৩ বর্গদেব চাপে ) কষ্ট হয়  
আর্কটব-বিশৃঙ্খলা, অন্নবজঃ, প্রচুর শ্বেতপ্রার । এক প্রকারে গোণে  
যেন চক্ষুগোলক বাহিরে নিঃসৃত হইতেছে দেগায় তাহারক  
একজপ্খালমিক্ গইটার বলে স্বস্পন্দন ও গ্রন্থিতে নাড়ী-  
স্পন্দনেব স্থায় স্পন্দন হয়

চিকিৎসা —যে প্রকার রোগে চক্ষুগোলক বহিঃস্থবীন  
দেখায়, তাহাতে টিংচর বেলেডোনা ৫ ফোটা মাত্রায় এক এক



ঘণ্টান্তর প্রয়োগ কবিলে উপকার দর্শে বেরিয়ম ক্লোরাইড ধাম-  
নিক বড়োয় চ'প' বুদ্ধি কষঃ ২৫ বও ইনফিঃ সিনকোনা ১ আউন্স সেব্য, ইহা বাহ্যিকও  
ক্যালিবিয়েট ওয়াটস ডিজিটেলিস ও ষ্ট্রোফান্ডাস

এই বোগ স্থান বিশেষে অধিক হয় অতএব বোণীকে তৎ-  
স্থান প্ৰতিভাগ কবিত্তে পবামর্শ দিবে আইয়োডাইড অব্‌ এমো-  
নিয়ম ৫ গ্রেণ, ইনফিঃ সিনকোনা ১ আউন্স সেব্য, ইহা বাহ্যিকও  
ব্যবহার কবা যাইতে পাবে ব্রোমাইড অব্‌ পটাসিয়ম, ৪০৯ ;  
পটাসী আইয়োডিডম্ ৩৯৯, ৪০২ কডলিভার অয়েল । আই-  
য়োডিন্ অয়েন্টমেন্ট ও টিংচার বাহ্যিক প্রয়োজ্য, সেবনার্থ পয়ো-  
গেও উপকার হয় আইয়োডাইড অব্‌ আয়বণ, ১৮১, ১৮২, ৪০৩ ।  
কুইনাইন ও আয়বণ বেড আইয়োডাইড অব্‌ মার্কবী অয়েন্ট-  
মেন্ট আইয়োডাইড অব্‌ পটাসিয়ম অয়েন্টমেন্ট সেবনার্থ  
হাইড্রোক্লোরিক এসিড ডিন ( অর্ধ পার্সেন্ট সলিউশন ) ৫—১০  
মিনিম মাএয় প্রয়োজ্য ফস্ফেট অব্‌ সোডা অধিক মাএয়  
অধিক দিবস পর্য্যন্ত সেবনে গলগও ছোট হইয়া আইসে



### ওবিসিটি—মেদরোগ ।

চর্ম্মেণ নিম্নে ও কোন কোন : অন্তঃকোষ্ঠেব চারি দিকে  
অত্যধিক মেদ সঞ্চিৎ হয় তন্তুব মেদাপকৃষ্টতা ইহা হইতে  
স্বতন্ত্র পীড়া

লক্ষণ — যান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ স্মৃজ্ঞানভাবে সম্পন্ন  
হইতে বাধা প্রাপ্ত হয় মানসিক ও শারীরিক শক্তি হ্রাস  
হয় শ্বাস প্রশ্বাস, রক্ত সঞ্চালন ও পরিপাক যন্ত্রেব ক্রিয়া-

বিশৃঙ্খলা ঘটে অল্প শ্রমে শ্বাসবোধ, পরিমাণে ও গুণে বক্তব্য হীনতা জন্মে পৈশিক দুর্বলতা, মথারুতি পাণ্ডুর ও অল্প ক্ষীণ, বাত ও শ্বাসশূল-প্ৰবণতা এই বোগে দীর্ঘ জীবন লাভ ঘটে না। হঠাৎ মৃত্যু অসাধারণ নহে। এই বোগেব কারণেব মধ্যে এই কয়েকটি প্রধান—যথা কৌলিক দেহ-প্রকৃতি, পরিমাণাধিক আহাৰ, অধিক পরিমাণে তীব্র পদার্থ সেবন; আলস্য ও অচৰিত্যুতা, অত্যধিক নিদ্রা; মেদ, শূল, শৰ্করা ও উদ্ভিজ্জাদি অতি অধিক পরিমাণে ভক্ষণ শরীরের মধ্যেই ভুক্ত দ্রব্যেব মধ্য হইতে মেদ জন্মে।

\* চিকিৎসা। —যে সকল দ্রব্য আহাৰ কৰিলে অধিক পরিমাণে মেদ উৎপন্ন হয়, সে সকল দ্রব্য যত পরিহার কৰিতে পাবা যায়, ততই ভাল। চিনি, দুগ্ধ, ঘৃত, আলু বিধি প্রভৃতি মধ্য সেবন নিষিদ্ধ। কেবল মাংস ও টাটকা উদ্ভিজ্জ সেবন উপকারী। সোডা ব্রোমাইড্ পটাশ আইয়োডাইড থাইবইড একৃষ্টাঙ্ক যথোপযুক্ত ব্যায়াম মাটাতোলা ছুট ব্রোমাইড লব্ এমোনিয়াম, ৪২৭ স্পিবিট এমোনিয়া বাবোমেটিক ও কার্বনেট অব্ ম্যাগ্নেসিয়া ব্যায়াম সাত ঘণ্টার অধিকবান নিদ্রা ঘাইবে না। বিবেচক ঔষধ লাইকন পটাসী সেবনে উপকার দর্শে। আল্-কেলিজ্ ও আল্-কেলাইন ওয়াটস' উদ্ভিজ্জ মিশ্র। অপর্যাপ্ত।

## ইউরিমিয়া—মূত্রানুৎপত্তিজনিত বিকার ।

বক্তে যুরিয়া সঞ্চিত হইলে এই রোগ উৎপন্ন হয় মূত্রগ্রন্থি দ্বারা যুরিয়া নিঃসৃত না হইলেই ইহা হয়

লক্ষণ মস্তিষ্ক ও কশেরুকা মজ্জার মধ্যে এক বা উভয়েবই ক্রিয়াবৈষম্য সমুপস্থিত হয় খেঁচুণী বা বিকম্প, অচেতনাবস্থা, আঙুলালিক মূত্রবোগ, মূত্রানুৎপত্তি

চিকিৎসা রক্তকে বিশুদ্ধ করিবার জন্ত মূত্র বেচক ও ঘর্ষকারক ঔষধ প্রয়োজ্য । শ্বেদশ্রাবকরণার্থ উষ্ণজলে স্নান, তৎ সঙ্গে চা, লিমনেড, শীতল জল সেব্য ওয়েট সিট প্যাকিং জলে ভিনিগার মিনাইয়' ওদার' স্পঞ্জিং বিরেচকের মধ্যে স্ট্রাংইন পর্গেটিভ্‌স্, ৩৩১ এসাফেটিডা ও ক্যাপ্টর অয়েলের পিচকাবী— ৩৬০ ইলিটেরিয়ম, জেলাপ পডোফিলিন—৩৪৭, ৩৪৮ দুর্বলতা থাকিলে লৌহঘটিত ঔষধ—১৯০, ১৯১ আর্সিনিক ব্যবহাবে অনেক সময় উপকার হয় ডিজিটেলিস—৩৬৩ ডিজিটেলিস পএব পুলটীস এসিটেট অব্ পটাশ মর্টার্ড পুলটীস উত্তেজক ঔষধ অল্প পরিমাণে দিবে আক্ষেপ উপস্থিত হইলে ক্লোরোফর্ম, ক্লোরাল, ইথর ও এসাফেটিডা, ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়ম—৯৮, ১৩০, ১৩৯, ৪২১, ৪২২, ৪২৪ । টি ও কফি, আকো-কট, ট্যাপপোকা ও শর্করা প্রভৃতি দিবে যবক্ষারজানবিশিষ্ট খাদ্য জব্য অল্প পরিমাণে দিবে বেণী অচেতন অবস্থায় থাকিলে, উত্তেজক ও আক্ষেপনিবাবক ঔষধ পীচকাবি দ্বারা মলদ্বারে প্রবেশিত করিবে

## য়াকোলিয়া—পিত্তপ্রাবরোধজ বিকার ।

যকৃতেব ক্রিয়াবিরতি বশতঃ রক্তস্থ যে যে পদার্থ দ্বারা পিত্ত উৎপন্ন হয়, তাহা বক্তে থাকা হেতু রক্ত বিযাক্ত হইয়া পড়ে যকৃতের তরুণ হ্রাস বোগ, যকৃৎকাঠিন্য ও মোপকৃষ্টতা প্রভৃতি পীড়া বশতঃ এই বোগ জন্মিতে পাবে ।

লক্ষণ —সায়ুমগুলের অস্বাভাবিক অংশা উত্তেজনা, উচ্চ প্রলাপ, বিকম্প, স্যামিয় অবসন্নতা, অচেতন্যাবস্থা, পাকাশয় ও অঙ্গ হইতে বক্তপ্রাব, কালশিরা ও কাহার কাহার কামল বা ছায়া উপস্থিত হয় ।

চিকিৎসা ।—যকৃতের বিবিধ পীড়া বশতঃ পিত্তপ্রাব এক-কালীন রক্ত হইয়া রক্তে মিশ্রিত থাকিলে প্রবল বিরেচক সমূহ—কোটন অয়েল—৩২৮, ৩৪৬ পডোফিলিন—৩৪৭ বেন্জইক এসিড—৩ এমোনি ক্লোরাইডম—৪১২ । নাইট্রোহাইড্রো-ক্লোরিক এসিড

## গাউট—বাতরক্ত

এক প্রকার বিশেষ সন্ধিপ্ৰদাহ—সার্বাস্থিক কাবণ হইতে সমুৎপন্ন হয় কোলিক দেহপ্রকৃতিও এই বোগের অনুরূপ আক্রান্ত সন্ধিতে অত্যন্ত বেদনা ও ক্ষীণতা, অল্প সহ সার্বাস্থিক উপদ্রব এবং বিশেষতঃ পনিপাক যন্ত্রেব কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা থাকে এই রোগ বাবস্থাব হইয়া থাকে ।

লক্ষণ ।—তরুণ বোগাক্রমণেব পূর্বে বুক জ্বালা, উদরা-গ্নান, বক্ষের বামপার্শ্বে অতীক্ষ বেদনা, স্থলপিণ্ডের ক্রিয়া-বৈষম্য,



চর্ম শুষ্ক, শীতপিণ্ড বা আমবাত, মূত্রে যুবেটের আধিক্য প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। রাত্রিতে সহসা রোগ উপস্থিত হয়, তৎসময় পদের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে তীব্র বেদনা, তদ্রূপ বেদনা গুল্ফেও অনুভূত হয়। শীত হইয়া পবে শবীর উষ্ণ হয়। পীড়িত অংশ ক্ষীত ও স্পর্শাসহ হয়। জ্বর, উত্তাপ, অস্থিরতা, কোষ্ঠবদ্ধ, তৎসঙ্গে জিহ্বা মলাবৃত; মূত্রে যুবেট, অধিক পরিমিত ফস্ফেট বা আঙুলালিক পদার্থও থাকে। তৎপবে ক্রমশঃ বোগ তীব্রোহিত হয়; কিছুদিন রোগী স্তম্ভ থাকে, আবার বোগাক্রান্ত হয়। সন্ধিব চতুর্দিকে খটকাবৎ প্রস্তর জন্মে, উহার উপাদান প্রধানতঃ যুবেট অব্ সোডা। সন্ধি হইতে এই বোগ সময় সময় আভ্যন্তরিক যন্ত্রে গমন কবে, যথা—পাকায়, হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কচ্ছদ। পীড়িত অংশে শৈত্য সংস্পর্শ বশতঃ ঈদৃশ ঘটনা হয়। ইহাকে স্থিতিপরি-বর্তনশীল বা বিট্রোসিডেন্ট গাউট বলে।

চিকিৎসা। একোনাইটের অরিষ্ট ব্যবহারে এই বোগের বেদনা অনেকাংশে নিবাবিত হয়। স্যালিসিলেট অব্ সোডা, স্যালিসিলিক এসিড প্রদাহিত সন্ধির উপরে কলোডিয়নের প্রলেপ ২৩ বা ৪ বার দিলে শীঘ্রই বেদনাব উপশম হয়। প্রদাহ না থাকিলে আক্রান্ত সন্ধিতে আইয়োডোফর্মের স্থানিক প্রয়োগে বেদনা বিদূরিত হয়। বেদনায়িত স্থানে পিপারমেন্ট অয়েল দ্বারা লেপ দিলে উপকার দর্শে। প্রাচীন রোগে সল্ফাইড দ্বারা উপকারক। বেদনাবিশিষ্ট সন্ধিতে ভিরাট্রিয়ার মৃণ্ম স্থানিক প্রয়োজ্য। সল্ফরস এসিডেব ফিউমিগেসন, বোগীব শয্যা বস্ত্রাদিতেও উহার উগ্র বাষ্প লাগাইয়া তদ্বারা রোগীকে আবৃত করিয়া রাখিলে, শ্বেদস্রাব ও নিদ্রা হইয়া রোগী অনেক আশাম

বোধ কবে বিবেচক—৩২৭, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৫ ৩৩৭, ৩৪৪, ৩৫২, ৩৫৪ । এসিটেট, সাইটেট ও বাইকার্বনেট অব্ পটাশ—২৮৭, ২৮৮, ২৯২ ২৯৬ বেদনা নিবারণার্থ ওপিয়ম, হায়সায়ামাস ও বেনেডোনা । সকলেব সঙ্গেই কলচিকম ডাইন দিবে । এক ট্রাক্ট, টিংচর ও ভাইনম কলচিকম .দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহা ব্যবহারকালে সাবধান থাকা বর্তব্য যে, যেন অত্যন্ত অধিক পরিমাণে সেবন করান না হয় ।

বিবিধ ও বার ফার আই-য়োডাইড অব্ পটাসিয়ম—বা এমোনিয়ম ৩৯৯, ৪০১, ৪০৪ আক্রান্ত স্থান উষ্ণ রাখিবে । তুলা, ফ্লানেল প্রভৃতি দ্বারা জড়াইয়া রাখা কর্তব্য । ৪ ড্রাম কার্বনেট অব্ সোডা, ২ ড্রাম লডেনম ও ১০ আউন্স গরম জল, ইহাতে লিণ্ট ভিডাইয়া প্রদাহিত সন্ধিতে লাগাইবে ও তত্পরি কচি কলার পাতা দিয় বাঁধিয়া রাখিলে উপকার হয় । পুলটিসেব সঙ্গে এক ট্রাক্ট বেনেডোনা বা ওপিয়ম মিশ্রিত করিয়া দিবে । সম্ভাব বেদনানিবারক ধৌত দ্বারা আক্রান্ত সন্ধিস্থান ভিডাইয়া রাখিবে ১১০, ১১২, ১১৩, ১৫৪, ১৫৬ ।

প্রদাহ কথঞ্চিৎ অপসাবিত হইলে বিবিধ উত্তেজক, অবসাদক ও বেদনানিবারক ষর্দিন প্রয়োজ্য,—৪৩, ৪৮, ৫১, ১৪৪, ১৪৬, ১৫২, ১৫৩ ।

টিংচর ও লিনিমেন্ট আইয়োডিন লঘুপাক দ্রব্য পথ্য দিবে । দুগ্ধ, এবারট, ট্যাণ্ডি ওকা, অন্ন প্রভৃতি শ্রাদ্ধব, সোডা বা ভিসি ওয়াটার মাংস নিষিদ্ধ । .বোগ পুনর্বার উপস্থিত হইতে না পাবে, তজ্জন্ত সুপথ্য, ব্যায়াম, উৎকট মানসিক শ্রম পাবহান, জৈয়দ্ব্য বা সমুদ্রের হায়ে স্নান পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জরপান বিধেয় । এল্, পোর্টার প্রভৃতি মদ্য নিষিদ্ধ ।

সময়ে সময়ে অন্নানক বিবেচক । কার্বনেট অব্ চিথিয়া ৩—৬

গ্রেণ মাত্রায় দিবসে ২ ৩ বাব, ইহাতে প্রস্রাব বৃদ্ধি পাইয়া যুবিকাশ  
 নিঃসৃত হয় লিথিয়া সাইট্রস গোয়েকম, ক্লোবেট অব্ পটাশ।  
 ফস্ফেট অব্ এমোনিয়া কুইনাইন ও কলচিকম বক্তহীনতা  
 থাকিলে লৌহঘটিত ঔষধ—ফেবি এট্ এমন্ সাইট্রস, ভাইনম  
 ফেরি, সিবপ ফেবি আইয়োডাইড্ ইত্যাদি আইয়োডাইড অব্  
 পটাসিয়ম ও আইয়োডাইড অব্ এমোনিয়ম প্রত্যেকে ৪০ গ্রেণ,  
 জল ৪ ড্রাম, গ্লিসিবিং ১ আউন্স—এই বোগে চক্ণোন হইলে  
 স্থানিক প্রয়োজ্য বিবিধ প্রকাব মিনাবেল ওয়াটর্স ভিসি,  
 কার্লস্বাড, হাবোগেট স্থান পরিবর্তন বিট্রোসিডেন্ট গাউটে  
 কাউন্টব ইবিটান্ট, টর্পেন্টাইন ষ্টিউপ্স এবং ক্লোবোফর্ম ও  
 বেলডোনা প্রভৃতি আক্ষেপ-নিবাবক ঔষধ প্রয়োজ্য

আর্থিকা ও আর্গিনিক সেবন উপকারী অনিদ্রার জন্য মল্  
 ফোনাল প্রয়োজ্য অবসন্নতা প্রাপ্ত হইলে উওজক প্রয়োজ্য  
 ইদানীং এই বোগে পাইপি রেজিন উপকারী বলিয়া কথিত হয়।

### রিউমেটিজম—বাত।

তরুণ ও প্রাচীন ভেদে এই বোগ দ্বিবিধ

তরুণ বাত —ইহা একটা প্রবল পীড়া, এতদ্বারা রোগী  
 সমূহ কষ্ট ভোগ করে, ইহাতে প্রবল জ্বর ও কখন কখন হৃৎপিণ্ড  
 আক্রান্ত হয় দেহাভ্যন্তরে ল্যাক্টিক এসিড বা ক্ষীবায়েব  
 আধিক্য এই বোগেব কারণ বলিয়া কথিত হয় খাদ্য দ্রব্যস্থ  
 শ্বेतসার প্রথমতঃ ক্ষীবায়ে পবিণত হয়, পবে উহাব সহিত অগ্নি-  
 জেন মিলিত হইয়া কার্বনিক এসিড ও জল হয়, ইহা ফুসফুস দিয়া

বিদূরিত হইয়া থাকে। কোন কাৰণ বশতঃ প্রোক্ত ক্রিয়াব  
ব্যাঘাত জন্মিলে শরীরেব মধ্যে ক্ষীরায় সঞ্চিত হইয়া পড়ে।

লক্ষণ । — অস্থিৰতা, জ্বর, আর্জতা বা শৈত্য সংস্পর্শেব  
পব অঙ্গাদির অনগাতা ও বেদনা সম্বন্ধে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, এক  
বা ততোধিক বৃহৎ সন্ধি বেদনাম্বিত ও শ্বীত হয় প্রথমে  
জ্বর ও সার্বাস্থিক উপদ্রব বোগী নড়িতে চড়িতে অসমর্থ  
হয়, সন্ধিব বেদনা এত যন্ত্রণাদায়ক হয় যে, শয্যাবস্ত্রের ভাবও  
অসহনীয় হইয়া উঠে চক্ষু অতৃপ্তিকর বা অশ্রুস্রাবযুক্ত স্বেদ-  
স্রাব হইয়া থাকে। নাড়ী পুষ্ট, দ্রুত ও লক্ষনশীল; সচরাচর  
কোষ্ঠবদ্ধ; সময়ে সময়ে উদবাসয়; জিহ্বা আর্দ্র, কিন্তু গাঢ় মলা-  
বৃত, মূত্র লালবর্ণ, অম্ল, স্বল্প ও যুবেটপূর্ণ। রোগেব পুনরাক্রমণ  
অতি সাধারণ। এই বোগেব উপসর্গেব মধ্যে এই কয়েকটা  
প্রধান, যথা — প্রদাহ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন কবে,  
হৃৎবেষ্ট বা হৃদান্তবচ্ছদ আক্রান্ত হইলে রোগ সাংঘাতিক  
হইতে পারে কখন কখন বায়ুনলীভুজ, ফুসফুসচ্ছদ, ফুসফুস,  
মস্তিষ্ক বা মস্তিষ্কচ্ছদেব প্রদাহ সমুৎস্থিত হয় কোন উপসর্গ  
না থাকিলে এই বোগ ১৫ ১৬ দিন হইতে ৩০ দিন থাকে যদি  
সাংঘাতিক হয়, তবে তাহা হৃদপিণ্ড আক্রান্ত হওয়া বশতঃই  
হইয়া থাকে

চিকিৎসা — যাকুটিয়া বেসিগোম্মার অবিষ্ট ৫ মোটা  
মাত্রায় ব্যবহার কবিলে ত্বরূপে বাত বোগেব বেদনা সম্বন্ধে উপ-  
শমিত হয় উষ্ণ উষ্ণ পুণ্ডীস বেদনাগ্নত স্থানে স্থাপন বনিলে  
শ্রালিসিলিন্ ও হইতে ১৫ গ্রোণ মাত্রায় ২ ঘণ্টান্তর সেবন কবা-  
ইলে ১ বা ২ দিনেব মধ্যে বোগোপশম লক্ষিত হয় প্রথমে



বেদনা ও তৎপরে জ্বব বমিয়া যায় স্থালিসিলেট অব্ সোড ব্যবহারে উপকার লব্ধ হইয়াছে, এতৎ ব্যবহারে স্থূপিণ্ড আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা অনেকাংশে নিবারিত হয় মাত্রা ৩—১৫ গ্রেণ। স্থালিসিলিক এসিডও স্ফুল্পপ্রদ সল্ফবস এসিডের ফিউমিগেশন ও শয্যাবস্ত্রাদিতে উহাব বাষ্প লাগান উপকারক ভিয়ার ট্রিয়ার মলম স্থানিক প্রয়োজ্য একোনাইট, আর্গিকা, বেন্-জইক্ এসিড্। ব্রাইওনিয়া মহোপকারী

স্থালাইন্ পর্গেটিভ্‌স্ ৩৩১, ৩৩৪, ৩৩৯, ৩৫০, ৩৫৩, ৩৫৪  
অথবা ক্যালোমেল ৫ গ্রেণ ও জেলাপ ৩০ গ্রেণ বেদনা নিবারণার্থ পূর্ণ মাত্রায় ওপিয়ম্ দিবে ইহাতে শ্বেদস্রাব হওয়ায় বিষাক্ত পদার্থ বিদূষিত হইতে পাবে ওপিয়ম ও বেলেডোনা প্রতিবাএ শয়নকালে—১০১ কম্পাউণ্ড ইপিক্যাক্ পাউডর ৪ ৬ ঘণ্টান্তর অনেকে পূর্ণমাত্রায় কুইনাইন ব্যবহারেব অনুমোদন করেন ইহাব সঙ্গে ৪৫ গ্রেণ আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম দিলে সমধিক উপকার লব্ধ হয় টিংচাব ভিরেট্রাই ভিরিডিস্ ১ ৩ মিনিম মাত্রায় এক আউন্স জল সহ ৩ ৪ ঘণ্টান্তর আবশ্যক মত সেবা টিংচব একোনাইট দ্বাবা নাড়ী স্পন্দনেব দ্রুততা ও জ্বব নিবারিত হয়—২৭২। সেবনার্থ নাইট্রেট অব্ পটাশ ১০—৩০ গ্রেণ মাত্রায় জলেব সঙ্গে ও বাহ্যিক উহাব উগ্র দ্রব পীড়িত স্ক্‌কিহনে বস্ত্রখণ্ড দ্বাবা ভিজাইয়া দিবে জর্দীব-বস ২৩ আউন্স দিনে ২৩ বার, ইহা ব্যবহারকালে বিশেষ সাবধান থাকা কর্তব্য, কারণ সময়ে সময়ে ইহা দ্বাবা অত্যন্ত অবসন্নতা উপস্থিত হয় বাইকার্বনেট অব্ পটাশ বা সোডা ২০ হইতে ৩০ গ্রেণ, শুষ্ক জল বা সোডা ওয়াটবেব সঙ্গে ৩ ৪ ঘণ্টা-

শুভ দিবে—২৯২, ২৯৬ ইহাব সঙ্গে ভাইনম কলচিকম ৫—  
১০ মিনিম সাইট্রেট অব্ পটাশ যদি পীড়া এক বা ততোধিক  
সন্ধিস্থানে অধিক দিন পর্য্যন্ত থাকে, তবে পূৰ্ব্বোক্ত ঔষধের  
সঙ্গে আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম মিশ্রিত করিয়া দিবে। শ্বেদ-  
স্রাবের স্বল্পতায় উষ্ণ বাষ্প স্নান। বোগাস্টেব দৌৰ্বল্যে এমো-  
নিয়া ও বার্ক ১৮৩; ফেরি এট এমোনি সাইট্ ১৮০ প্রবল  
জঙ্কণাদি তিবোহিত হইবার পবেই কড্‌গিওব অয়েল ব্যবহার  
করিতে আবস্ত করিলে উপকার হয়। লাইকব্ আর্গিনিকেলিস্।  
স্থানিক ঔষধ—আক্রান্ত সন্ধি তুল্য, ফ্রানেন বা অয়েল সিধ দ্বারা  
মর্ষদা আবৃত রাখিবে জলে সোডা ও অহিফেন মিশ্রিত করিয়া  
সেই জল উত্তপ্ত করণানন্তর তদ্বারা সেক দিবে তৎ প্রদাহ  
একটু উপশান্ত হইলে সন্ধির চতুষ্পার্শ্বে গুল গুল বিষ্টাব লিনি-  
মেন্ট আইয়োডিন মালিশ করিয়া তুল্য দ্বারা ঢাকিয়া রাখা  
উচিত কেহ কেহ তরুণাবস্থায় বিষ্টাব দ্বারা ফোঁদা কবাইয়া  
তত্পরি পুলটীস্ দিতে বলেন সর্দি প্রবণ রোগে পক্ষে ডাক্-  
মাঝা। অনিদ্রা ও প্রলাপ বর্তমানে লিথিয়া ব্রোমাইড্ প্রদাহ  
কথঞ্চিৎ উপশান্ত হইলে রসটক্স সেবন সুফলপ্রদ। অয়েল  
অব্ উইন্টার গ্রীণ ও ইকুথিয়ল উপকারী

এই রোগ দ্বারা হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা হইলে  
অনেকে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ ও মার্কনী দ্বারা মুখ আনয়ন  
করিতে বলেন কিন্তু উক্ত উপায়ে পূর্ণমাত্রায় ওপিয়ম সেবন  
করান এবং লিম্বিড ও মর্টার্ড পুলটীস্ সংলগ্ন করান অধিক উপ-  
কারী অথবা ১ গ্রোণ মাত্রায় ওপিয়ম ২৩ ঘণ্টাস্তর হৃৎপ্রদাহ  
বর্তমানে সেব্য। বাইকার্বনেট অব্ পটাশ সেবন রহিত করিবে

না তৎপরে হৃৎপিণ্ডাবক পর্দার অভ্যন্তরে বক্তবস প্রাবিত হইল ঘ্রিষ্টাব ও আইয়োডাইড্ অব্ পটাশিয়ম সেবন কবান কর্তব্য প্রথমে লঘুপাক পথ্য দিবে অধিক দৌর্বল্য প্রকাশিত হইলে মাংসেব বোল, দুগ্ধ, ডিম্ব প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পাবে। শর্করা ব্যবহার নিষিদ্ধ মদ্য ও আসবাদি বিশেষ আবশ্যক না হইলে দিবে না।

প্রাচীন বাত কখন তবণ বোগেব পব হয়, কখন বা ইহা আপনাপনি উপস্থিত হয়। বৃদ্ধ বয়সে এই বোগ অতি সাধাবণ সন্ধি বা সায়ুর সৌত্রীণ আবরণ, পেশীচ্ছদ, কণ্ডুরা ও অস্থিচ্ছদ প্রধানতঃ এই বোগেব দ্বারা আক্রান্ত হয়। প্রমেহ বশতঃ এক প্রকার বাতবোগ হয়, তাহাকে গনোরিয়েল রিউ মোটজম বলে কোমবে, বজ্রগে, গ্রীবা ও বক্ষেব পেশীতে সময় সময় বাতরোগ জন্মে।

চিকিৎসা। স্যাক্টিয়া রেসিমোজা বিশেষ উপকারী। কাপসিকমেব উগ্র অরিষ্ট লিণ্টে ভিজাইয়া স্থানিক প্রয়োজ্য বেদনা নিবারণার্থ ক্লোরাল অয়েল মেজিবিয়ান ও সাসাফ্লাস্ সল্ফর ও সল্ফাইড্ স্থানিক ও স্থানরূপে। অলিয়েট অব্ মার্করী এণ্ড মর্ফিয়া স্থানিক প্রয়োজ্য সোডী স্ট্রালিসিলেট ও কুইনী স্ট্রালিসিলেট স্ট্রালিসিলেট অব্ সোডা ব্যবহারে দেহ হইতে যুবিদ্য নিঃসৃত হইয়া উপকার হয় সার্বস্বদিক স্বাস্থ্য যাহাতে উন্নত হয়, তজ্জন্ত যত্ন কবিবে পবিপাক ক্রিয়া যাহাতে স্নৃশৃঙ্খল ভাবে সম্পাদিত হয়, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য আইয়োডাইড অব্ পটাশিয়ম বা সোডিয়ম—৩৯৯, ৪০১, ৪০৪ ; ইহার সঙ্গে বাইকার্বনেট অব্ পটাশও মিশ্রিত করিয়া দেওয়া

যায় । কডলিভর অষেল । কুইনাইন ও বেলেডোনা আইরো-  
ডাইড অব্ আয়বণ—১৮১, ৪০৩ টিংচর গোস্ককম—২৮৬ ।  
কল্‌টিকম—বিবিধ ঔষধেব সঙ্গে সার্ম্পারিচ ৩৩৯ । কনসিড  
মল্লিমেট—৩৯৮, ৪০২ আর্সিনিক ও ভাইনম ফেরি ১৯১  
একোনাইট ও আইরোডাইড অব্ পটাসিয়ম ৪০৪ টিংচর  
ব্রাইওনিয়া ও রসটক্স লিগিয়া ব্রোমাইড স্ক্রুজ সন্ধির পীড়ায়  
হাবোগেট প্রভৃতি মিনারেল ওয়াটস উষ্ণ বাষ্প-স্নান, সল্ট  
ওয়াটর বাথ স্থানিক—ব্রিষ্টাব, আইরোডিন পেন্ট আইকর  
এমোনিয়া ও সোপ লিনিমেন্ট ৪১ বিবিধ উত্তেজক, অবসাদব  
ও বেদনানিবাবক মর্দন—৪৩, ১৪৪, ১৪৯, ১৫০, ১৫৩ সব-  
কিউটিনিয়ম ইন্‌জেক্‌শন অব্ স্কিফিয়া ও এটপিন্ কটিবাতে  
বেলেডোনা পাষ্ট্রব ও এম্প্লাষ্ট্রম্ ফেরি লাগাইলে উপকার হয়  
পেশীর কণ্ডরা এই রোগে আক্রান্ত হইলে সলফর চূর্ণ বা মলম  
স্থানিক প্রযোজ্য বাতরোণীর পক্ষে গাত্রে ফুণেন ব্যবহার  
করা উচিত এবং বিয়াব ও উত্তেজক মদ্য সেবন নিষিদ্ধ । অয়েল  
ইউক্যালিপ্টস্ মর্দন । গ্যালব্যানিক ব্যাটারী দ্বারা তাড়িত প্রয়োগ  
লিনিমেন্ট পটাসী আইরোডাইড কম্ সেপোনী ইকুথিয়স ৫—১০  
গ্রেণ্ মাত্রায় সেবনে উপকার হয়, সম্ভবতঃ ইহাতে সল্‌ফর থাকায়  
উপকার দর্শে বিগুন্ধ সল্‌ফর সেবনও সফল প্রদ পীড়িত  
সন্ধিতে পর্যায়ক্রমে স্নেহ ও উষ্ণ জলধাণা প্রয়োগ হিতকর ।



ক্লিনিক অষ্টিয়ো আর্থাইটিস্—এক প্রকার বাত ।

সন্ধি স্থানেব এব প্রকার পুরাতন পীড়া। গাউট ও রিউ-  
মেটিজমেব সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে সোসাদৃশ্য থাকিলেও তাহা  
হইতে ইহা একটা স্বতন্ত্র পীড়া।

লক্ষণ পীড়িত সন্ধি ক্ষীত, বেদনায়িত ও অনমনীয়  
তরুণরোগ হঠাৎ উপস্থিত হয় ও তৎসঙ্গে জ্বর ও সার্ভান্সিক  
অসুস্থতা বর্তমান থাকে কিন্তু সাধারণতঃ এই বোগ প্রাচীন।  
প্রারম্ভে গাত্রগুরুতা, আলস্য, অস্থিৰতা, ক্ষুধাভাব ও দুষিত  
নিঃশ্রাব বর্তমান থাকে। তৎপবে সন্ধি সকল শক্ত ও বেদনা-  
য়িত, নৈহিক বিগ্নোব মধ্যে রস আবিভ হওয়ায় উহা ক্ষীত ও  
বিস্তৃত। বজ্জক, ডা'মু ও গুদ'ফ সন্ধিতে পীড়া হইলে বে'লি  
হাটিতে পাবে না। হস্ত দ্বাবা টিপিলে বা অন্ন আখাও কবিলে  
রস সঞ্চালন অনুভব কবিতো পাব যায়। সম্ভবঃ কালে সন্ধিতে  
এক প্রকার বিশেষ ফুটন শব্দ বোগী নিজে শুনিতে পায়।  
রোগ অধিক দিবস স্থায়ী হইলে সন্ধিবিধান পূর্ণ হওয়ায় সন্ধি  
অচল হইয়া পড়ে। কখন কখন সন্ধিস্থ উপস্থি বিনষ্ট হওয়ায়  
সন্ধি অকর্মণ্য ও বিধান পবিবর্তন হইয়া থাকে। তৎসময়  
পেশীতে আক্ষেপ, মানসিক অবসাদ, আলস্য, অগ্নিমান্দ্য ও  
পাকায়ণয়ে অন্ন, বাত্রিতে নিদ্রাব ব্যাঘাত, বতঃসঞ্চালনেব মৃদুতা  
বৎ ৩ঃ স'র্দে ল'গ'ব প্রবণত। এই বোগেব স্থিতিকাল কয়েক  
মাস হইতে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত।

চিকিৎসা —জীণোকদেব ধু বৈষম্য থাকিলে স্যা'ক্টিয়া  
বেসিমা'জা বিশেষ উপকারী। ৪ আউন্স সোডা ও ২০ গ্রো  
আর্সনিয়েট অব সোডা এক গামলা জলে মি'াইয়া তাহাতে

মান করিলে উপকার হয় । একোনাইট, আর্নিকা, স্যালিসিলেট কুইনিন বা সোডা, লিথিয়া, গোয়েকম্ কলচিকম্, আইয়োডিন, পল্‌সেটিলে সেবনে সময় সময় উপকার দর্শে ।

ইহাকে বিউমেটিক্ গাউট বা আর্থাইটিস্‌ও বলে । ইহাতে উভয় প্রকার পীড়ার প্রকৃতি মিশ্রিত থাকে । স্ত্রীলোকদের এই পীড়ার সঙ্গে জয়াঘুর ক্রিয়া বিশৃঙ্খলা থাকিলে, তৎপ্রতিকার সাধন সর্বাগ্রে কর্তব্য । মূত্র বিবেচক—সলফেট অব্ সোডা ও সল্‌ফর প্রভৃতি । কডলিওব আয়রণ । আক্ৰান্ত সম্বিতে উষ্ণ জলসেচন । সল্‌ফর ও ম্যাগ্নেসাইন বাথ্ আর্সেনিক বাথ্, কুইনাইন, সিরপ ফেরি আইয়োডাইড, লাইকব পটাশ, আইয়োডাইড ও ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়ম, কলচিকম্ ও লাইকব আর্সিনিকেলিস । ইহাদিগকে স্তম্ভ স্তম্ভ অথবা দুই তিনটী একত্রে ব্যবহার করিলে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে আইয়োডিন ও ব্রোমিন ঘটিত ঔষধ দিবে না ; কারণ আর্ন্তব-স্রাবের আধিক্য থাকিলে এতদ্বারা তাহা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । একোনাইট ও সার্পেন্টেরী ৪২৮ । সাময়িক স্নিষ্টাব, আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম অয়েন্টেমেন্ট বা লিনিমেন্ট ও মার্কিউ-বিয়েল স্নিষ্টাব দ্বারা সন্ধিস্থান স্থাপীত । অন্যান্য স্থানিক বাতে উল্লিখিত বিবিধ মিনারেল ওয়াটস সেবনে বিশেষ উপকার হয় । তন্মধ্যে হাইড্রোজেন, কার্বোনেট, ভিমা, স্পা প্রভৃতি প্রধান । নিম্নলিখিত মলম মর্দনে বিশেষ উপকার হয়, যথা এসিড্ স্যালিসিলিক, টার্পেন্টাইন অয়েল, ও ক্যালোলাইন প্রত্যেকে ২০ ড্রাম ও চর্বি ও আউন্স ইহা মক্কা প্রকার বাতে প্রয়োজ্য ।

## পাইমিয়া—আইকরিমিয়া—পূযাত্মক রক্ত ।

রক্তে শাটিত পদার্থ বা পূষকণা আশোষিত হইলে এই রোগ জন্মে ইহা এক প্রকার রক্তেব পীড়া

লক্ষণ — কম্প শীত, শ্বেদশ্রাব, নাড়ী দ্রুত, আপস্রাবিক আক্রমণ, উদবাময়, বক্তামাশয়, ফুসফুস চ্ছদপ্রদাহ, অগ্রচ্ছদপ্রদাহ, বিসর্প, বিস্ফোটক ও ফোটক প্রভৃতি শীর্ণতা শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি, অবসন্নতা, তৎপবে মৃত্যু প্রাচীন বোগেব লক্ষণ অপেক্ষাকৃত মৃদু ও তাহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়

চিকিৎসা — প্রথনাবধিই উত্তেজক ব্যবহার কবিবে এমোনিয়া ও ইথর ২, ৩ ব্রাণ্ডি, ইথর ও সিনকোনা ১৩ ব্রাণ্ডি ও ডিম্ব, বিস্ফুটী, চিকেন ব্রথ দুগ্ধ, ক্রিম প্রভৃতি কুইনাইন ও নাইট্রিক এসিড ১১৩, ১৯৪ বেদনার উপশমার্থ অহিফেন বমন নিবারণার্থ এমোনিয়া ও হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ডিল ৪ সাইট্রেট অব্‌ সোডা, লবেল ওয়াটব, সোডাওয়াটার, বিস্মথ ববফ সেবনার্থ, এবং পাকশায়োপবি পুলটীস ও সিনাপিজম ওয়েটসিট প্যাকিং, এসিড স্পঞ্জিং সলফেট অব্‌ ম্যাগ্নিসিয়া বা সোডা কতাদিতে আইয়োডোফর্ম, কার্বলিক এসিড, থাইমল, পাব-ম্যাঙ্গানেট অব্‌ পটাশ প্রভৃতি স্থানিক ব্যবহার্য্য বোষিক এসিড, কার্বলিক এসিড, সোডা সল্ফ কার্বোলাস, পটাশ পাব-ম্যাঙ্গানেট, আর্গটিন, ফেবি পাবক্লোরাইড, আইসোডিন জেব ব্রাণ্ডি, মর্ট লিকর, কুইনিন, স্ট্রালিসিন, টেবিলিহু সেবনীয় কুইনিন, টিং ষ্টিল ও ক্লোরেট অব্‌ পটাশ বিশেষ উপকারী

## এরিসিপেলাস—বিসর্প ।

চর্মের বিস্তীর্ণ ও প্রসাধনশীল প্রদাহ, এই প্রদাহ সচরাচর চর্মের নিম্নস্থ যোজক তন্তুতে হয়। এই রোগের সঙ্গে জ্বর থাকে ও আক্রান্ত অংশ ঘোর লালবর্ণ, উষ্ণ, বেদনায়িত ও ক্ষীত হয়। ইহা এক প্রকার বিশেষ বিষ হইতে উৎপন্ন হয়। অসুস্থ অবস্থায় ক্ষত-বোগী অনেকগুলি এক স্থানে থাকিলে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা ; ইহা বহুব্যাপক স্পর্শক্রমক। শরীরের সকল অংশেই এই পীড়া জন্মিতে পারে। স্বয়ংস্রুত বিসর্প—মুখমণ্ডলের ও মস্তকের চর্মেই সচরাচর হইয়া থাকে। আঘাত-জনিত বিসর্প—আহত স্থানেই জন্মে।

লক্ষণ ।—দেহাতান্তবে বিষ প্রবিষ্ট হওয়ার ৩ হইতে ৭ দিন পরে রোগ প্রকাশিত হয়। শীত, কম্প, ওলা বেদনা, জ্বর ও সার্বসঙ্গিক অসুস্থতা। মূত্র কখন কখন আণ্ডালানিক, মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খলা, প্রলাপ। বমন, বিবমিষা, উদবাসয়। মুখমণ্ডলে এই রোগ হইলে মুখাকৃতি এককালে পরিবর্তিত হয়। মস্তিষ্ক বা তাহার ষ্টিগীতে প্রদাহ প্রসারিত হইলে প্রায়ই রোগ সাংঘাতিক হয়। জীবনীশক্তির অবসন্নতা হয়। মধুমেহ ও আণ্ডালানিক মূত্ররোগে পীড়িত ব্যক্তিদেব এই রোগ হইলে প্রায়ই তাহা সাংঘাতিক হইয়া থাকে। ইহার বিষ দ্বারা নব প্রসূতিদের স্মৃতিকাজর হইতে পারে।

চিকিৎসা ।—একোনাইটেব অরিষ্ট বোগের প্রারম্ভে সাবধানে সেবন করাইলে রোগের বর্দ্ধন স্থগিত হয়। টিকা দেওয়ার পর এই বোগ হইলে বেলেডোনা অয়েন্টমেন্ট স্থানিক প্রয়োগ বিশেষ উপকারী। ইকুথিয়ল ও লানোথিন সমভাগে



গিশাইয়া স্থানিক প্রয়োজ্য বেলোডোনা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক  
 প্রয়োগ কবিলে বেগু স্ফট উপস্থিত হয় ইহা একেমনাইটের  
 সঙ্গে পর্যায়ক্রমে ব্যবহার কবা আবশ্যক হইতে পাবে ডিজিটেলি-  
 সের ফাণ্ট বা ষ্টার্চ পাউডার ও বোরিক এসিড সমভাগে স্থানিক  
 প্রয়োজ্য সল্‌ফরস এসিড ও গ্লিসিবিণ সমভাগে স্থানিক  
 ব্যবহার্য বোরিক এসিড লোশন প্রথমে যুহু বিরেচক,  
 তৎপবে কার্বনেট অব্‌ এমোনিয়া ও সিনকোনা ১৮৩ কুইনাইন  
 ও নাইট্রিক এসিড ১৯৩, ১৯৪ এমন কার্ব ও টিং বেলোডোনা  
 টিংচাব অব্‌ পাবক্লোবাইড অব্‌ আয়ব ও ক্লোবেট অব্‌ পটাশ  
 ১৮৯ লঘুপাক দ্রব্য আহাৰ করিতে দিবে শীতল পানীয় ২৯৪,  
 ২৯৬ বরফ, পেষ্ট ওয়'ইন, ব্র'ণ্ডি, ছক্ক, চ'ংসেব জুঃ প'লিহেড  
 ফোমেটেসন, কলোডিয়ন, কষ্টিক লোশন, আইয়োডিন পেষ্ট  
 বালকদিগের এই বোগ হইলে বলকাবক পথ্য ও ঔষধ দিবে  
 পুষ্কোৎপত্তি হইলে অস্ত্র করিয়া দিবে তৎপবে কার্বলিক এসিড বা  
 থাইমল অয়েদ ও লিণ্ট দ্বাৰা ক্ষত স্থান আচ্ছাদিত করিয়া  
 বাধিবে টিং ষ্টীল বাহ্যিক লোশনরূপে জলসহ রস্‌ টক্স,  
 বেন্‌জইক এসিড, বেন্‌জোয়েট সোডা পটাশ পাবম্যাঙ্গানাস্‌  
 সলিউসন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ব্যবস্থেয় জীবনীশক্তি সংবৰ্দ্ধনার্থ  
 উত্তেজক বিধেয়। ভাইনাই গ্যালিসাই মিক্‌চাব উৎকৃষ্ট  
 আহার ও ঔষধ টিং ষ্টীল অধিক মাত্রায় প্রয়োজ্য জর  
 অধিক থাকিলে, টিং ষ্টীলেব সঙ্গে কুইনিन ব্যবস্থেয় অংপিণ্ডের  
 অবসন্নতা প্রাচুৰ্য হইলে কুইনিन ও ষ্টীল না দিয়া স্পিরিট  
 এমন এবোমেট, টিং সিনকোনা ও ব্রাণ্ডি ব্যবস্থা কবা উচিত

### ডিপথিরিয়া—বিগলীক প্রদাহ।

রক্তের অবিপ্লবাবস্থা বশতঃ গলাভ্যন্তরের একরূপ গুরুতর প্রদাহ, ইহা বহুব্যাপক ও স্পর্শাক্রামক, এই বোগে অবসন্নতা প্রাদু-  
ভূত হয় ইহাব বিশেষ চিহ্ন এই যে, ইহাতে ক্রিমি বিদ্যী উৎপন্ন  
হয় বোগ আরোগ্য হইলে স্বর পরিবর্তিত হইয়া থাকে ; গলাধঃ  
কারক পেশীসমূহের আংশিক পক্ষাঘাত ও উদ্ধশাখার দুর্বলতা,  
দৃষ্টির অস্পষ্টতা ও অন্তবিধ শৌণিক সাময়িক অসুস্থতা থাকিয়া  
যায় পূর্ণবয়স্ক অপেক্ষা বালকদের এই রোগ অধিক হয়।  
সাধারণতঃ ছঃখীলোক ও আর্দ্রস্থানবাসীদিগের এই রোগ জন্মিতে  
দেখা যায়

লক্ষণ — ক্রমশঃ লক্ষণাদি প্রকাশিত হয় দৌর্বল্য  
বোধ ও শৈথিল্য, শিরঃপীড়া, নিবসিয়া, সামান্য প্রকার  
উদরাময়, শীত, তন্দ্রা ও গ্রীবার আড়ষ্টতা বোধ। তৎপরে তালু-  
পার্শ্বগ্রস্থি প্রদাহিত ও ক্ষীণ হয় ; চোখালের নিম্নস্থ এস্থিতে  
বেদনা ও প্রদাহ, আনাজিহ্বা, গলকোষ ও তৎসংলগ্ন শৈথিল্য  
বিগলীতে প্রসারিত হইয়া পড়ে গলাধঃকরণে কষ্ট যদি  
প্রদাহ প্রশমিত হইয়া রোগ আবোগ্যোন্মুখ না হয়, তাহা হইলে  
গঠনোপযোগী ( প্লাষ্টিক ) সূত্রীক পদার্থের অবন হইতে থাকে  
ইহা প্রথমে কোমলতালু ও নাসা পরিখায় ( নজাল ফসি )  
অথবা তালুপার্শ্বগ্রস্থি বা গলাকোষের ( ফ্য বিন্স ) পশ্চাৎভাগে  
প্রকাশিত হয় ক্ষণিক বস দেহিতে পাংশুবর্ণ দাগের স্তায়,  
উহা বর্ধিত ও প্রবল্যব সম্মিলিত হইয়া বড় বড় হয় ও দৃশ্যে  
মলিন, ধোত চর্ম্মের স্তায় দেখায় নোগের বুদ্ধির সঙ্গে এই  
ক্রিমি বিগলী আকৃতিতে বড় ও অধিক পুরু হইতে থাকে এবং

উহা শৈল্পিক ঝিল্লীতে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হয় । যদি বলপূর্বক উহা ছিঁড়িয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে আবার নূতন উৎপন্ন হয় । উহা মাড়িতে ও কপোলাভ্যন্তবে, অন্তবহননীতে বা শ্বস্বস্ত্রের ভিতর দিয়া কণ্ঠনালীতে প্রসারিত হইয়া পড়ে । যখন এই কৃত্রিম ঝিল্লী বিদূষিত ও পচিতে আবদ্ধ হয়, তখন নিশ্বাসে ভয়ানক দুর্গন্ধ হয় । উহা বিদূষিত হইবার পৰ তৎস্থানে ক্ষত হয় ও তাহাতে পচন সমুপস্থিত হইতে পারে । আবার তত্ত্ব সকল ক্রমশঃ সুস্থাবস্থাপন্ন হইতেও পারে । প্রকৃত ঝিল্লীক প্রদাহেব ঝিল্লী, চর্ম্মের ক্ষত স্থানে, চক্ষুর শৈল্পিক ঝিল্লীতে বা ঘোনিদ্রাবে অথবা সরলাস্ত্রের শৈল্পিক ঝিল্লীতেও কখন কখন উৎপন্ন হইয়া থাকে । সার্কারিক লক্ষণ প্রথমে সামান্য প্রকার থাকে, কিন্তু শীঘ্রই অস্থিরতা ও অবসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া জ্বর, নাড়ী দ্রুত, মুখ দিয়া লালাস্রাব, দুর্গন্ধ শ্বাস, খাদ্যে ও শ্রম করিতে অনিচ্ছা । গিলন ক্ষমতা প্রায়ই থাকে না, মুখগহ্বরেব পশ্চাত্তাগ ও বায়ুনলী হইতে রক্তস্রাব কখন কখন হয় । আণ্ডালিক মূত্র ও চর্ম্মে কালনিবা অবসন্নতা, বক্ত-স্রাব, পুয়াক রক্ত, পচন বা কোথ কিম্বা শ্বাসবোধ বশতঃ রোগী মৃত্যু হয় । বোণী ববারব সজ্ঞান থাকে । আবোগ্য হইলে দুর্বলতা ও রক্তহীনতা আদি অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে ।

চিকিৎসা । — ক্রোবিনেটেড অব্ সোডার উত্তম স্থানিক প্রযোজ্য । পচন উপস্থিত হইলে ক্লোরিন সলিউশন, হাইড্রোক্লোরিক এসিড স্থানিক ব্যবহার্য্য । আইয়োডিন ইনহেলেসন ট্যানিন স্ট্রো বরফ খণ্ড বোগেব প্রাবণ্ডে চুষিতে দিবে । বোগা-রোগের পরবর্তী পক্ষাঘাতে ট্রীকুনিয়াব অধস্তাচ প্রক্ষেপ

এসিড ভেপার ( ভিনিগার ২৩ আউন্স ও স্পুটিড জন্ ১  
পাইন্ট ) টিংচর অব্ পাবক্লোরাইড অব্ আয়রণ ও গ্লিসিনিণ  
ও কার্বলিক এসিড স্থানিক প্রযোজ্য কবল —পাবক্লোরাইড  
অব্ আয়রণ ১—২ ড্রাম, জল ৭ আউন্স পাবগ্যাথানেট  
অব্ পটাশ, কার্বলিক এসিড ও আইয়োডিন গার্মে মস্ফেট  
অব্ সোডা সলিউসন মলফরস্ এসিড শ্রে বাডক, হাই-  
ড্রোক্লোরিক এসিড অনেক স্থানিক ঔষধ প্রয়োগের বিপক্ষ ।  
সাধারণ ঔষধেব মধ্যে ইপিকাক ও কার্বনেট অব্ এমোনিয়া  
দ্বাৰা বমন কবাইবে, ২৮০ বমনার্থে এপোমর্কিন তৎপবে  
স্ক্যাক্কেলাইন ড্রিঙ্ক, ২৯২, ২৯৩ বোণী দুৰ্গন্ধ হইয়া পড়িলে  
ও রক্তস্রাব হইবার উপক্রমে পাবক্লোরাইড অব্ আয়রণ ও কুইনাইন  
১৭৬। স্ফেডিয়ম বেন্জেফেট, স্ফেডিয়ম হাইপোসফাইট বহিঃক ও  
আভ্যন্তরিক । পেপেব আটা । গ্লিসিনিণ অব্ বোবিক এসিড ।  
ফাইব্রিনের ক্লট হইবার উপক্রমে এমোনিয়া ও বার্ক ১৮৩, ১৮৪ ।  
আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম ও ক্লোবেট অব্ পটাস প্রোবেট  
অব্ পটাশ ড্রিঙ্ক দুধ, মগাসেন যু, মদ্য, ডিষ্ট, এটিও ও জল,  
ম্যাম্পোন, গ্লিমেনেড্, ববফ বেডেডোনা, আর্সেনিক গোগোর  
বাসগৃহ পরিষ্কার হওয়া ও তাহাতে দুৰ্গন্ধনাশক জ্বা ছড়াইয়া  
দেওয়া উচিত কোষ্ঠবদ্ধ না থাকিলে বিবেচক হিবে না ।  
বিবেচকের মধ্যে ক্যাঠিব অমেন এবং ক্যাং মেন ও এলোপ  
মূত্র অল্প অল্প হইতে থাকিলে কোমবে ২ সিনার উষ্ণ স্পুটিস,  
সিনাপিজম । এই বোগে স্নাব নিঃসৃত হইয়া স্বাসবোধেব  
উপক্রম হইলে উত্তেজক বমন দিবে তাহাতে কার্যসিদ্ধি না  
হইলে ট্রেকিমোটগা কনিবে । ক্লোবোয়নর্গ ইন্ডেটোন্ন গিলি-



বার অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইলে পীচকারি দ্বারা ঔষধ ও খাদ্য দিবে। রোগ কিঞ্চিৎ আরোগ্য হইলেই স্থান পরিবর্তন এবং কুইনাইন ও লোহাটত ঔষধ ব্যবস্থায় সায়ানাইড অব্ মার্কসী ইন্-টন বা ক্যালোমেল ।

### ৫৫ ইনফুয়েনজা—বহুব্যাণী সর্দিজ্বর ।

বহুব্যাণীক অসুস্থতা, তৎসহ বিশেষ দুর্বলতা, শীত, চক্ষু ও নাক দিয়া জলপড়া, সম্মুখ কপালে বেদনা, কাসি, অস্থিরতা ও জ্বর বর্তমান থাকে ।

লক্ষণ — শীত বা কম্প, পবে চর্ম উত্তপ্ত ও শুষ্ক, চক্ষুর নিকটে অত্যন্ত কণ্ কণে বেদনা, নাক দিয়া জলপড়া ও ইঁচি, মুখগহ্বরের পশ্চাভাগে বেদনা, স্বরভঙ্গ, ক্লেশদায়ক কাসি, শ্বাসকষ্ট পৃষ্ঠে ও অঙ্গাদিতে বেদনা, আশ্বাদের বিকৃতি, তৎসহ পাকাশয়েব বিশৃঙ্খলা । শায়বীয় ও পৈনিক দুর্বলতার চিহ্নাদি কখন কখন ইহার সঙ্গে ফুসফুস ও বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ হয় । রোগেব পবিণামে অধিক মল, মূত্র বা শ্বেদ নিঃসৃত হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—একোনাইট ও য়্যাক্টিয়া রেসিমোজার অরিষ্ট সেবনে বিশেষ উপকার লব্ধ হইয়াছে । সল্ফাবস এসিডেব ফিউমিগেশন বা ইন্হেলেসন্ কম্পাউণ্ড ইপিক্যাক পাউডার ৫—১০ গ্রেণ, বাত্রিতে এসিটেট বা সাইট্রেট অব্ এমোনিয়া ইথব সহ ভাইনম ইপিক্যাক ও সিরপ অব্ হেমিডিস্‌মিস ২৮৭, ৩১২ । এমোনী কার্ব ও ডিকক্সন্ সেনেগা ৩০১ ।

টিংচর ক্যান্ফর কম্পাউণ্ড ; ক্যান্ফর ও একটুকটুক হায়ম্যাগ্‌মাস ৩১৮। বক্কে মর্টার্ড পাউচর ; গলার অভ্যন্তরে উষ্ণ বাষ্প লাগান, কার্বলিক শ্রে ব' গার্গল' অরসম্মতর লক্ষণ প্রকাশিত হইলে এমোনিয়া, ত্রাণ্ডি প্রভৃতি দিবে ছুধ, ডিম্ব, বার্ণি-ওয়াটব, মাংসের ঘূষ প্রভৃতি পথ্যার্থ বিধেয়। নোংরোরোগের পদবর্তী দুর্বলতার বার্ক ও ফস্ফরিক এসিড ডিল্ কুইনাইন সহ লোহস্ফটত ঔষধ। উষ্ণ বাষ্প-স্নান, উষ্ণ জলের স্পঞ্জিং।

### ছপিং কফ্—ছপশব্দক কাসি ।

এক প্রকার সংক্রামক পীড়া, প্রধানতঃ বালকদিগেবই হয়। একবার হইলে আর হয় ন'। অল্প অল্প, বমন, প্রথমে সর্দি পরে কাসি হয়। এই কাসির প্রকৃতি অগ্নিরূপ অর্থাৎ ইহা থাকিয়া থাকিয়া হয় ও তাহার সহিত ছপ ছপ শব্দ মিশ্রিত থাকে। রোগের স্থিতি ২ বা ৩ সপ্তাহ হইতে ২।৩ মাস পর্য্যন্ত হইতে পারে।

লক্ষণ ।—জ্বর, থাকিয়া থাকিয়া কাসির আক্রমণ, নাক দিয়া সর্দি নিঃসরণ ও তদ্ব্যতীত অস্থিরতা, চর্ম উষ্ণ, বক্কে ক্রেশ বোধ। জ্বর ছাড়িয়া গেলে কাসিতে কর্কশ বা ছপ শব্দ শ্রুত হয়। কাসির আক্রমণ রোগী জানিতে পারিয়া ভীত হয় কাসিতে কাসিতে শ্বাস-রোধের চ্যাস হইয়া থাকে, কিছুক্ষণ পরেই রোগী আবার প্রকৃতিস্থ হয়। যদি কাসির আক্রমণের অবসান সময়ে বমন হইয়া যায়, তবে রোগী পুনরাহ্ন আহ্ন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। কখন ঘণ্টায়

কখন বা দিনে ২৩ বার কাসিব আক্রমণ উপস্থিত হয় আশু-  
ষঙ্গিক রোগেব মধ্যে হাস, বসন্ত, ফুসফুস ও বায়ুলীভুজ-  
প্রদাহ, উদরাময়, মস্তিষ্ক পীড়াদির সঙ্গে ইহা সমুপস্থিত হইতে  
পারে। কাসি অত্যন্ত অধিক হইলে নাসিকা, কণ বা মুখ  
দিয়া রক্তস্রাব বা কণকুহবের বিলী বিদীর্ণ হয় চক্ষুর শ্বেতাংশে  
রক্তক্ষরণ বা কালনিরা ফুসফুস প্রদাহ প্রোক্তভূত হইলে  
প্রায়ই সাংঘাতিক হয়। আক্ষেপ, ও মস্তিষ্কোদক ইহাব আশু-  
ষঙ্গিক রোগ।

চিকিৎসা।। তরুণ অবস্থা তিবোহিত হইলে গ্যালম  
২—৬ গ্রেণ, মধু বা গ্লিসিरीণ সহযোগে-২৩ ঘণ্টান্তর প্রযুক্ত  
হইলে উপকর দর্শে অন্ত ম'এ'ফ টিংচর ক্যানেবিস ইণ্ডিক  
ব্যবহারে সফল উপলব্ধি হয়। কার্বনেট অব্ পটাশ ১—২  
গ্রেণ মাত্রায়, ক্লোবাইড অব্ এমোনিয়ম, আর্গটি, কোনিয়ম,  
লোবিলিয়া, মস্ক, বেলেডোনা, জেলসিমিয়ম ভেলিরিয়ান ও  
জিঙ্ক ট্যানিন স্তানিক, গলাভ্যস্তবে। পল্‌মেটিল ১ গিমিম বা  
ইহাব বীৰ্য এনিমোনিম অর্ধ বা ১ গ্রেণ মাত্রায় সেবা। ক্লোরোফর্ম,  
লডেনম বা মর্ফিয়া গ্লিসিবিণ সহ অবলেহ উপকারী।

বমনকারক ঔষধ ২৭৬, এপোমর্ফিন টিংচর অব্ স্কুইল  
ও ক্যাম্‌বেটেড টিংচর অব্ ওপিয়ম। এমোনিফর্ম ও সেনেগা  
৩০১ ভাইনম ইপিক্যাক ও ফিবগ প্যাপেভেরি, ৩০৪।  
সলফেট অব্ জিঙ্ক ও বেলেডোনা, ১৪৩ এমোনিয়া, ইথর  
ও হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, ১৩৭। মনোব্রোমেট অব্ ক্যাম্‌ব।  
পৃষ্ঠবংশে বেলেডোনা, ক্লোরোফর্ম, ক্যাম্‌ব ও সোপ লিনিমেন্ট  
একত্রে মালিশ কবিত্তে দিবে নাইট্রিক এসিড ডিল, ১৬৯।

ব্রোমাইড অব্‌ এমোনিয়ম, ৪২৭। ব্রোমাইড অব্‌ পটাশিয়ম, ৪০৯, ৪২২ হাইড্রেট অব্‌ ক্লোবাল, বিউটিল ক্লোবাল ৪২৩ নাইট্রেট অব্‌ সিলভর লোশন ও ল্যাক্সেবে বাগান অত্যন্ত অধিক পরিমাণে স্লেয়া উঠিতে থাকিলে স্যাণ্ডাম, সলফেট অব্‌ জিঙ্ক, সল্ফিউরিক এসিড ডিল ও বার্ক, গ্যানিক এসিড ইত্যাদি প্রযোজ্য বোগ প্রাচীনা কাল ধাব করিলে বোহ-টিও ঔষধ, কডলিভর অয়েল, ও বায়ু পরিবর্তন বিধেয় আক্ষেপ নিবাবণার্থ ক্লোবোফর্ম আত্মাণ এমিল নাইট্রস।

## মস্প্‌স — প্যারোটাইটিস।

কর্ণমূলগ্রন্থি প্রদাহ

কর্ণমূলস্থ লালনা গ্রন্থিতে এক প্রকার প্রদাহ হয়

লক্ষণ — শীত, অগ্ন জ্ব, অঙ্গ বেদনা, এক বা দুই দিকের কর্ণমূলগ্রন্থি ক্ষীণ ও বেদনাস্থিত হয় ৪ দিনে বোগের পূর্ণাবস্থা হয়, তৎপবে উপশমিত হইতে থাকে কদাচিৎ পাকিয়া উঠে কখন কখন বোগের সময় বা উপশমকালে শুন বা অপ্রকোষ ক্ষীণ হয়

চিকিৎসা। — গে পাউডার ও জেল মাণায় দিবসে ৩৪ বার ব্যবহার করিলে বেদনা ও ক্ষীণতা উপশমিত হয়। একোনাইট ও বেগেডোনা অব্‌ মধে ব্যবহার্য। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে মৃদু বিবেচক, অন্ন নিবাবণার্থ স্বেদজনক ও মূণকারক ঔষধ জেববাণ্ডি উপকারী। ফ্লানেল দ্বারা উষ্ণ জল সেক, টিংচর অব্‌ আইয়োডিন পেন্ট, বেগেডোনা ক্লোরেট অব্‌ পটাশ,



কুইনাইন, টিংচর সিনকোনা কম্পাউণ্ড, টিংচর ফেরিপারক্লোরাইড, নাইট্রো-গিউরিক এসিড ডিন ইত্যাদি ঔষধ প্রযোজ্য এন্টিসেপ্টিক গার্গলও উপকারী

### গ্লান্ডস্‌ এণ্ড ফার্মী ।

এক প্রকার স্পর্শক্রামক ও সাংঘাতিক জ্বর বিশেষ, এইরূপ বোগেব বিষ পীড়িত অঙ্গাদিব শরীর হইতে মানব-দেহে প্রবিষ্ট হয় প্রোক্ত দ্বিবিধ পীড়াই একরূপ, কিন্তু নাসাবন্ধে রোগ জন্মিলে তাহাকে গ্লান্ডস্‌ এবং আচুষক নাভীমণ্ডলে জন্মিলে ফার্মি কহে

চিকিৎসা — সল্‌ফুর এসিড, সল্‌ফাইট অব্‌ ম্যাগ্নেসিয়া আইয়োডাইড অব্‌ পটাশিয়াম ও টিংচর সিনকোনা কম্পাউণ্ড কুইনাইন, ক্রীক নিয়া, আর্সিনিক এমনকার্ক প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ, পুষ্টিকাবক খাদ্য স্থানিক—ক্লোরাইড অব্‌ জিঙ্ক লোশন, সলিউসন অব্‌ পাবমান্‌গানেট অব্‌ পটাশ, কার্বলিক এসিড, ক্রিয়েজোট ভেপার বাথ ক্লোবিনেটেড সোডা, পটাশ বাইক্রেমেট, সল্‌ফুর আইয়োডাইড

### ম্যালিগ্নান্ট পাষ্টিউল্‌ বা সাংঘাতিক পুথবটি ।

গবাদিব শরীর হইতে মল্লয়া দেহে সংক্রামিত হয়

লক্ষণ — শরীরের বাহ্য প্রদেশে উদ্ভেদ বা পীড়কা প্রকাশিত হইয়া উহা শীত ও বিবর্ণ হয় অত্যন্ত প্রবল প্রদাহ, সাতিশয় শীততা, বাঠিহ ; জীবনী শক্তির অবসন্নতা

বা বিধান বিনাশ, বিবর্ণতা, দুৰ্গন্ধ শ্বাস, ধামকচ্ছ, চক্ষুশক্তি-  
বিহীনতা। সর্করিক রক্তবিষাক্ততা লক্ষণ সহ সোণীর  
মৃত্যু হয়

চিকিৎসা। —ঔষ কষ্টম যথা—পটাস। ফিউজা, এসিড  
নাইট্রেট অব্ মার্কবী ও অগ্নি দ্বারা পোড়াইয়া দেওয়া তৎপাথ  
কার্বলিক এসিড দিবে সেবনার্থ—কুইনাইন ও ঈল, ১৭৬,  
কুইনাইন ও মিনাবেল এসিডস ১৬৭, ১৯৩, ১৯৪ ঈল ও  
ক্লোবেট অব্ পটাস, ১৮৯ সলফাইট অব্ সোডা ও ম্যাগ্ন  
নিসিয়া এণ্ডি, এমোনিয়া, ইথর, লুক, ডিম্ব, মাংসযুষ

### হাইড্রোফোবিয়া—জলাতঙ্ক ।

উন্মত্ত জন্তুর লাল। মানব-দেহে প্রবিষ্ট হইলে এই রোগ  
জন্মে। সাধারণতঃ শৃগাদা, কুকুবাди থেপিয়া উঠিয়া যাহাকে  
দংশন করে, তাহাবই এই বোগে আক্রান্ত হইবার সম্পূর্ণ  
সম্ভাবনা থাকে বিষ বক্তে প্রবিষ্ট হওয়ার ৩০ দিন হইতে  
কয়েক মাসের মধ্যে বোগ প্রকাশিত হইতে পারে রোগ-  
ক্রমণের পর ৩৪ দিনেই প্রায় বোগী মরিয়া যায়

লক্ষণ । —প্রত্যেক্ষ ও বক্ষের পেশী সমূহে আক্ষেপ,  
উদর-বক্ষঃ ব্যবধায়ক ( ডায়াফ্রাম ) পেশীর আক্ষেপিক ক্রিয়া,  
তরল পদার্থে সান্ধিয় ভয় জল পান করাইলে বা বায়ু-  
প্রবাহ সংস্পর্শে আক্ষেপাদির বৃদ্ধি হয় মুখ দিয়া গাঢ়  
লালা নিঃসরণ হইতে থাকে অস্থিরতা, উৎকর্ষা, প্রলাপ  
ও অবসন্নতা

চিকিৎসা।—উন্নত কুকুৰ বা কোন জন্তুতে (শৃগালাদি) দংশন কবিলে তৎস্থান কষ্টিক পেন্‌সিল, কার্বলিক এসিড, নাইট্রিক এসিড, বা উওপ্ত ১০১২ নংকো দ্বারা দগ্ধ কৰিবে দংশিত স্থান হইতে চৰ্ম্মাদি উত্তোলন কৰিয়া ফেলিতে কেহ কেহ বামন জলাতঙ্ক বোগ উপস্থিত হইলে এট্রপিন বা মর্ফিয়াব সৰ্কিউটিনিয়স ইন্‌জেক্‌সন সলিউসন অব্‌ সলফাইট বা হাইপো সলফাইট অব্‌ সোডা বা ম্যাগনিসিয়া সেবন ও মলদ্বাবে পীচকাৰি নিৰাভ্যন্তবে এমোনিয়াব পীচকারী সল্‌ফব ফিউমিগেশন বয়ফ সেবন ও পৃষ্ঠবংশে স্থানিক প্রয়োগ অধিক পরিমাণে দীর্ঘকাল জল মলদ্বাবে পীচকাৰি দিলে তৃষ্ণা নিবারণ হইতে পাবে ওপিয়ম অধিক মাত্রায়, বেলেডোনা, ইণ্ডিয়ান হেম্প, কুবাৰী ক্লোরোফর্ম সেবন ও আত্মাণ হাইড্রেট ক্লোবাল, ব্রোমাইড বা আইওডাইড অব্‌ পটাসিয়ম, ষ্ট্র্যামোনিয়ম, বা ধূতুৰা, জেববাণ্ডি গুলিব ধূমপান পৃষ্ঠবংশে বেলেডোনা, এমোনিয়া ও ক্লোরোফর্ম লিনিমেন্ট নাইট্রেট অব্‌ এমিল, নাইট্রোগ্লিসিৰিৎ দ্বত সেবন উপকারী বলিয়া কথিত হয় মেথলোম ও তুলায় বীজ সেবনে বিষ নষ্ট হয় বলিয়া প্রবাদ আছে

### ম্যালিগন্যান্ট কলার।—ওলাউঠা।

বহুব্যাপক পীড়া, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় সাংঘাতিক হয় এই রোগে সাতিশয় অবসন্নতা, শবীরের বাহ্য প্রদেহ শীতল ও নীলবর্ণ, বমন, ৫৬দ, মূত্রানুৎপত্তি, উদর ও হস্ত পদাদির পেশীতে আক্ষেপ কখন কখন বোগ প্রকাশের পূর্বে সামান্য উদ্বাসময় থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ ২৪৭ বোগ প্রকাশিত হয়

লক্ষণ ।—তিন অবস্থা—১ম, ভেদ বমন, তদ্বারা বোধ হয়, দেহ হইতে বিষ বিদূরিত হয় । ২য়, তদ্ব্যতীত কণী-  
নিকা কুঞ্চিত, আক্ষেপ, হাল, শরীরের শীতলতা ও পর্যায়িক  
নাড়ী স্পন্দন । ৩য়, মূত্রপ্রাব-রোধ ও হিমাক্ত । অত্যন্ত ভেদ বমন ;  
ভেদ জলবৎ বা চালুনী জলেব গ্রাস হয় । উহাতে অধিক  
পরিমাণে ইপিথিলিয়াম ও অল্প আণ্ডুলালিক পদার্থ থাকে,  
তন্নিম্ন অতি সামান্য পরিমাণে পিত্ত ও অধিক পরিমিত লবণ  
থাকে সাতিশয় পিপাসা, বক্ত সঞ্চালন মৃদু ও শ্বাস বাধা  
প্রাপ্ত, সাতিশয় অবসন্নতা, সর্ব শরীর তুষারবৎ শীতল,  
চর্ম ও ওষ্ঠাধর নীলবর্ণ, শ্ববভঙ্গ বা অস্বাভাবিক শ্বর, মুখাকৃতি  
সংকুচিত, চক্ষু কোঠবপ্রবিষ্ট, কণীনিকা সংকুচিত ও সঞ্চালন-  
বিহীন । পেটে জ্বল ও বেদন, নড়ী সূত্রবৎ বা অস্পষ্ট বা  
বিলুপ্ত, ও রক্তসঞ্চালন স্থগিত হয় জ্ঞানেব কোন বৈলক্ষণ্য  
প্রায়ই হয় না । ১৮ ঘণ্টা বাঁচিয়া থাকিলে পবে রোগোপ-  
শয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হয় । নাড়ীস্পন্দন পুনরায় অনুভূত হয় ও  
মলের সঙ্গে পিত্ত দেখা যায় প্রস্রাব না হইলে বিকার  
উপস্থিত হয় । তাহাতেই বোণী মৃত্যু-কবলিত হয় মৃত্যুর  
পূর্বে শিরঃপীড়া, তন্দ্রা, খেঁচুনি, জ্ঞানহীনতা দি প্রাপ্তভূত  
হয় কাহার কাহার শেষে প্রতিক্রিয়ার সময় জব হয়, তাহা  
হইতে কেহ কেহ আরোগ্য ও কেহ কেহ বা মৃত্যুমুখে  
নিপতিত হয় ।

এক প্রকার কীটগু হইতে এই পীড়া উৎপন্ন হয় ।

চিকিৎসা—রোগের সূত্রপাতে স্ট্রাচুরেটেড স্পিরিট অব  
ক্যাম্‌ফর ঘন ২ প্রয়োগ মহোপকারী লাইকন আর্সিনিকেল



$\frac{1}{2}$  বা ১ ফোটা মাত্রায় বমন নিবারণার্থ ও হিমাজ্জাবস্থায় প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার লাভ করা যায় স্পিরিট অব্ ক্যাম্ফর ৬ ফোটা মাত্রায় রোগের প্রাবল্যে ১০ মিনিট অন্তর রোগোপশম না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করিবে। তৎপবে এক ঘণ্টান্তর উহা সেবন করাইতে হইবে শৈশব বিষচিকায় গ্রো পাউডার সিকি গ্রেন প্রতি ঘণ্টান্তর ব্যবহারে উপকার দর্শে অতি অল্প মাত্রায় লডেনম ও শ্বেতসাবেব মিউসিলেজ একত্রে মলদ্বারে পীচকাবী দিলে উক্ত ঔষধের ক্রিয়াব সাহায্য হয় হিমাজ্জাবস্থায়  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  গ্রেন মর্ফিয়া বা তৎসহ ক্লোবাল হাইড্রেট অধস্তাচ প্রক্ষেপকপে প্রযুক্ত হইলে বিশেষ উপকার করে প্রথমাবস্থায় ক্লোরোডাইন পিপাসা ও বমন নিবারণ ও উত্তেজনার্থ ত্রাণ্ডি ও বরফ জল

এই রোগের চিকিৎসায় বিবিধ ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহাব প্রকৃত আরোগ্যকর কোন ঔষধ অপর্য্যন্ত স্থিৰীকৃত হয় নাই নিম্নলিখিত ঔষধ সমূহে প্রায়ই উপকার দর্শে। সিড্‌লিজ পাউডার, ৩৫৩ ; সোডি ক্লোরাইড ও পটাশী ক্লোরাস, ২৯১ পিপাসা নিবারণার্থ সোডা ওয়াটব, লিমনেড, শীতল জল, বরফ, লিনসিড্ টি বমন ও পাকাশয়ের উদ্দীপনা নিবারণার্থ পাকাশয় প্রদেশে মর্টার্ড ক্যানোবিস ইণ্ডিকা, ৯৮ ক্লোরোফর্ম ও ইথর—৩, ৯৮ স্পিরিট গ্রামোনী ব্যাবোমেটীক ও ইথর, ২ হস্তপদদ্বয় শীতল হইলে ও হিমাজ্জের সময় তর্পিণ তৈল ও শুট চূর্ণ প্রভৃতি দ্বাৰা সর্বাঙ্গ মর্দন করিবে হিমাজ্জের সময় বা প্রাক্কালে নানা প্রকার অস্থায়ী উত্তেজক বিধান করিবে কার্বলিক এসিড অর্ক গ্রেন, টিংচাব আইয়োডিন ২ গিনিম প্রতি ঘণ্টান্তর চাপখালিন,

ফাইজীপমাইন, পডোফিলিন, ওলিয়ম বিসিনি, ক্লীকনিয়া ।  
 কুপ্রাই সল্ফ, কার্বলিক এসিড ও বিসমথ ক্যালোমেল উৎ-  
 কৃষ্ট আন্ত্রিক পচননিবারক ভেদ নিবারণের জন্ত চক্ মিক্‌চব,  
 ২১৪, ২১৫, ওপিয়ম—১৩৩, ১৩৪, ১৩৬ ; গ্যালিক এসিড,  
 ২১৮ ; প্লম্বাই এসিটাস, ২২৫ ; বিসমথ ও মর্ফিয়া, ২৩৪ ;  
 পল্ড ক্রিটী য়ারোমেটীক কম্ ওপিয়ো, ২৩২ । যতক্ষণ  
 পর্যন্ত মলে পিও দৃষ্ট না হয়, ততক্ষণ ২ হইতে ১০ গ্রেন মাত্রায়  
 ক্যালোমেল এক বা দুই ঘণ্টান্তর দিবে বোগীর গৃহে কার্বলিক  
 এসিড ছড়াইয়া দিবে সল্ফরাস এসিড গ্যাস বা গন্ধকের  
 ধূম দেওয়া বোগের প্রথমাবস্থা ভিন্ন অন্ত্যাবস্থায় অহিফেন  
 নিষিদ্ধ । স্পিবিট অব্ ক্যাম্ফর প্রথমাবধি দিবে টিং ভিরেট্রম  
 এল্‌ব্ কেহ কেহ বলেন যে, এই বোগে ভেদবগন বন্ধ করা উচিত  
 নহে । শিরা মধ্যে এমোনিয়া ও অন্যান্য ক্ষার দ্রব্যের পীচকারি ।  
 এট্রপিয়ার হাইপোডার্মিক পীচকাবী হিমাঙ্গে মূত্রস্রাব কবণার্থ  
 কোমবে ড্রাই কপিং, বেলডোনা, ক্লোবোফর্ম ও সোপ লিনি-  
 মেন্ট মর্দন, ভূসীর পুলটীস, উষ্ণজল সেক সেবনার্থ বেন্-  
 জোয়েট অব্ এমোনিয়া, স্পিবিট ইথরিস নাইট্রোগাই, লিন্সিড্  
 টি, দুগ্ধ ও জল, কোরেট অব্ পটাশ, নাইট্রেট অব্ পটাশ,  
 টিংচর ক্যান্থেরাইডিস । বোগান্তে—কুইনাইন প্রভৃতি বলকাবক ।  
 পথ্যার্থ প্রথমে মাণ্ড, য়ারাকট, বেলগুটাব ঝোল, গন্ধভাছলেব  
 ঝোল, পরে অনমণ্ড, দুগ্ধ, অন, মৎস্তের ঝোল, তরকারি, মাংসেব  
 ঝোল ও পোর্ট প্রভৃতি দিবে পীড়াব প্রাজ্জ্বল্য কালে বিশুদ্ধ  
 পানীয় জল ব্যবহার অতীব আবশ্যক । জল সিদ্ধ করিয়া ও ছাকিয়া  
 পান করা উচিত ।

## ইয়েলো ফিবার বা পীতজ্বর ।

ইহা এক প্রকার তরুণ ও বিশেষ গুরুতব পীড়া ইহার সঙ্গে কামল, প্রবল শিরঃপীড়া ও কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ বমন হয় । স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষদের এই রোগ অধিক হয় । ইহা এক প্রকার বিশেষ বিযোড়িত ও সম্ভবতঃ সংক্রামক । ভাবত-বর্ষে ইহাতে দেখা যায় না ।

লক্ষণ প্রথমে ক্ষুধাভাব, আলস্য, শিরোবুর্ন, শিরঃ-পীড়া, মানসিক অবসন্নতা প্রকাশিত হয় তৎপবে শীত, চর্ম উষ্ণ, নাড়ী দ্রুত, চক্ষু আবৃত ও বেদনাবিহীন, ও মুখমণ্ডল আবৃত্তিম হয় পৃষ্ঠে ও অঙ্গে বেদনা, বড় বড় সন্ধিতে বেদনা, পাকশযের উগ্রতা, চাপে স্পর্শসহ্যতা, বিবিগিয়া, বমন, উদগাব পিপাসা, কোষ্ঠবদ্ধ, মল পিণ্ডবিবহিত কষ্টকর অস্থিবতা, মানসিক উৎকণ্ঠা, অনিদ্রা, প্রলাপ প্রস্রাব বদ্ধ বা সরত্ব হয় । বাগি বা কোন স্থানে পচন আক্ষেপ ও জ্ঞানহীনতা ইত্যাদি স্থিতিকাল সাধারণতঃ ৩ ইহাতে ৯ দিবস তিন জনের মধ্যে একজন মরে

চিকিৎসা। —বোগী শয্যায় \* যন করিয়া থাকিবে পথ্যার্থ যব, ম্যারোরুট, সাণ্ড, দুগ্ধ, চুণেব জল, শীতল জল, চা, ববল, লিমনেড, ব্রথ, বিফ্‌টী বিবেচক—পডোফিলিন, ক্যালো-মেক্স, সল্‌ফেট অব্ ম্যাগ্নিসিয়া, জেলাপ ও সেনা অধিক শাস্ত্রীয় কুইনাইন ব্যবহার সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে তাপিণ তৈলের পীচকাবি কেহ কেহ ব্যবস্থা করেন বিবেচনাব পর কুইনাইন ও বার্ক বা টিংচর ফেরিপারক্লোবাইড ও মিনাবেল এসিড, ১৭৬, ১৯৩, ১৯৪ নাইট্রোমিউরিয়েটিক এসিড ডাইলিউট বমন

নিরাবণেব জন্তু ক্লোরোফর্ম, ক্লোরোডাইন, মর্ফিনা, একষ্ট্রাক্ট  
বেলেডোনা ; লাইম ওয়াটার, অয়েল টর্পেন্টাইন প্লিষ্টাব ও মট্টার্ড  
প্লাষ্টাব, পায়ের ডিমে হিমাঙ্গ হইলে উওজক বেলেডোনা,  
আর্সিনিক, ক্যাম্ফর, ব্যাছেবাইডিস্, ক্যাপ্সিকম, কার্বটিক এসিড,  
ভেজিটেবল চার্কোল উওজকেব মধ্যে এই রোগে এমোনিয়া  
আদৌ দিবে না শ্চাম্পেন্ ও স্পার্ক্লি মসিলি নামক মদ্য উওজ-  
জনার্থ দেওয়া যাইতে পারে জ্বাতিশয্য নিবারণার্থ টিং একো-  
নাইট বা ভিবেটুম ভিরিড অল্প মাএাষ সোডা বেন্জোয়েট ও  
শ্চালিসিলেট

### সিম্পল কণ্ঠনিউড্ ফিবার ।

মূহ পীড়া, ১ ১০ দিন থাকিতে পারে

লক্ষণ ।—বোগী অকস্মাৎ আলস্য, গাঠগুরুতা, বিব-  
মিয়া, ক্ষুধাভাব, শীত এবং পৃষ্ঠে ও অঙ্গে বেদনা দ্বারা আক্রান্ত  
হয়। কয়েক ঘণ্টা পরে চর্ম উষ্ণ, নাড়ী দ্রুত, শিরঃস্রাব, পিপাসা,  
কোষ্ঠবদ্ধ ও মুএব স্বল্পতা হয় কখন কখন সামান্য  
প্রকার প্রলাপ লক্ষণাদি বাহ্যিতে বৃদ্ধি, ঠর্য দিনে বা তৎপরে  
শ্বেদস্রাব বা উদবাস্য প্রকাশিত হইয়া বোগীকে আরোগ্যোন্মুখ  
করে তৎপরে দুর্বলতা থাকে

চিকিৎসা । অয়েব উওপাদি নিবারণার্থ লবং ঘটিত  
বিবেচক, ৩৩১, ৩৫৩ অথবা একোনাইট, বেলেডোনা, জেণ্টিম-  
সিয়ম, শ্চালিসিলিক এসিড শ্বেদজনক মিশ্র, ২৮৭, ২৮৮ ২৮৯ ।  
দুর্বলতাব লক্ষণ প্রকাশিত হইলে বলকানক ঔষধ ও কুইনিন,



১৮৩, ১৮৪ স্থানিক বক্তাধিক্য বা প্রদাহ উপস্থিত হইলে তন্নিবারণ ও কোন বিশেষ বিপদজনক লক্ষণাদি উপস্থিত হইলে সম্ভব তাহাব প্রতিবিধানের উপায় কবা কর্তব্য। আবশ্যক অনুসারে মস্তকে শীতল জল সেচন, ঈষদুষ্ণ জল দ্বাৰা শরীর স্পঞ্জিং, লঘু পথ্য প্রভৃতি দিবে যখন শারীরিক বল-হ্রাস অত্যন্ত অধিক হইবে তখন পোর্ট, ব্রাণ্ডি, মাংসেব যুষ প্রভৃতি দেওয়া কর্তব্য

### টাইফস ফিবার ।

এক প্রকার স্পর্শ সংক্রামক জ্বর, সাধারণতঃ বহুব্যাণীক্ৰুপে প্রকাশ পায়। অরুচ্যেব সময় হয়, ইহা দারিদ্র্যেব সহচর স্থিতিকাল ১৪ হইতে ২১ দিন

লক্ষণ —বোগবিষ দেহাভ্যন্তরে নীত হওয়াব ১ হইতে ১২ দিন পবে লক্ষণাদি প্রকাশিত হয়। চর্ম শুষ্ক ও উষ্ণ, পিপাসা, চক্ষু ভারি, কোষ্ঠবদ্ধ, বোধ শক্তির অভাব, ও অবসন্নতা প্রভৃতি। সন্ধ্যাকালে উগ্রতা, অস্থিরতা, ও অনিদ্রা উদ্বেদ ৭ম দিনেব পূর্বে কদাচ আবির্ভূত হয় বিশৃঙ্খল দাগ, ধূসর বা তুত ফলেব বর্ণ বিশিষ্ট উদ্বেদ, চাপিলে মিলাইয়া যায় এবং চর্মের উপর উন্নত বলিয়া বোধ হয় জ্বের শেষ পর্য্যন্ত উহাবা প্রকাশিত থাকে কখন কখন উহা আদৌ বাহির হয় না প্রথম সপ্তাহে কর্ণে শব্দ বা বধিবতা, চক্ষু লাল বর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, জিহ্বা শুষ্ক ও ঈষৎ লীলাভ, জাগরণশীলতা বা নিদ্র, মূলাগতা, যুবিমা বৃদ্ধি ক্লোরাইড হ্রাস, কখন কখন মূত্র আণ্ডালিনিক, সময়ে সময়ে মুত্রানুৎপত্তি ও তজ্জনিত বিকার দ্বিতীয় সপ্তাহে—সাতিশয় অবসন্নতা, পেশীর

আফেপ, প্রলাপ ফুসফুস, ফুসফুসজ্বর বা বায়ুনলী-ভূজ প্রদাহ প্রাচুর্য হইলে বিপদাশঙ্কা আরও বর্দ্ধিত হয় বোগোপশম মূহুর্তে হয়, সাধারণতঃ ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ দিবসে আবদ্ধ হয়। কখন কখন বোগোপশম কালে অধিক নিদ্রা, শ্বেদস্রাব, মূত্রস্রাব, বা উদবাময় উপস্থিত হয়। বোগ সাংঘাতিক হইলে মৃত্যু সাধারণতঃ দ্বাদশ হইতে বিংশতি দিবসেব মধ্যে হইয়া থাকে পাঁচ জন এই বোগে আক্রান্ত হইলে এক জনেব মৃত্যু হয় রোগী বয়স অধিক হইলে আশঙ্কাও অধিক

চিকিৎসা। এই বোগ এক প্রকার বিশেষ বিষ দ্বারা সমুদ্ভূত হয় যেখানে এই রোগের প্রাচুর্য হয়, তথাকার লোকদিগর সুপথ্য সেবন ও বিশুদ্ধ পানীয় ব্যবহার করা কর্তব্য গৃহে স্বগন্ধি ও পচন নিবারক দ্রব্য ছড়াইয়া দেওয়া উচিত বোগীকে পবিত্র গৃহে রাখিবে এবং তাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু গমনাগমন করিতে পাবে একপ উপায় বিধান করিবে। ক্লোরাইড অব লাইম ও ক্লোরাইড অব জিঙ্কেব মূহ ধাবন, আইয়োডিন, কার্বলিক এসিড ও সলফরস এসিড গ্যাস প্রভৃতি দ্বারা গৃহেব দুর্গন্ধ নিবারণ করিবে। গৃহে অগ্নি রক্ষা করাও বিস্তর উপকার হয়। এই রোগের একটি স্বাভাবিক গতি আছে, সেই গতি বোধ করা আমাদের সাধ্যাত্ত নহে কষ্টকর লক্ষণাদি নিবারণ জন্ত ঔষধ প্রয়োগ কর্তব্য কেহ কেহ অধিক মাত্রায় অর্থ্র ৫ ১০ গ্রেস পবিমানে কুইনিন, ডাইলিউট সলফিউরিক এসিডেব সঙ্গে ২ ৩ ঘণ্টাস্তর, কর্ণে শর্কাদি প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করিতে বলেন তৎসঙ্গে বিফ্টি, ত্রাণ্ডি ও মদ্যাদি দিবে রোগের প্রথমাবস্থায় ভাইনম ইপিক্যাক এক আউন্স, উষ্ণজলের সঙ্গে, অথবা ইপিক্যাক ও

কার্বনেট অব্ এমোনিয়া দ্বারা বমন কৰাইবে তৎপবে কোষ্ঠবদ্ধ বিদূৰিত করণার্থ ক্যাষ্টর অয়েল বা কম্পাউণ্ড জেলাপ বা রিউবার্ব পাউডর দিবে এসিড ফস্ফরিক ডিল, এসিড্ হাইড্রোক্লোরিক ডিল, এসিড্ নাইট্রিক ডিল, ১৬৯ য়াৰ্বোমেটীক সল্ফিউৰিক এসিড ২০ ৩০ মিনিম্ মাএায় ৪ ৬ ঘণ্টান্তর। অবসন্নতাব লক্ষণ প্রকাশ হইবামাত্রই উত্তেজক ঔষধ, ব্রাণ্ডি ক্লাবেট এবং ফার্মাকো-পিয়াব ব্রাণ্ডি ও এগ্গিকশচব অনিদ্রা ও অস্থিরতা বর্তমানে ওপিয়ম প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু ফুমফুসেব কোন পীড়া বর্তমান থাকিলে উহা ব্যবহাবে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত ওপিয়ম, হায়দ্রামাস, ক্লোবাল ও ব্রোমাইড্ অব্ পটাশিয়ম দ্বাবাও অস্থিরতা ও অনিদ্রা তিরোহিত হয় প্রেলাপ ও মস্তিষ্কে বক্তাদিকা থাকিলে মস্তকে শীতল জল, ববফ ও অল্গাত শৈত্য প্রয়োগ ১১৯ শজ্ঞদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্লিষ্টাব চৈতন্য বাহিত্য অধিকক্ষণ স্থায়ী থাকিলে মস্তকে ও ঘাড়ে বড ব্লিষ্টাব দিবে আনুযজিক বোগ লক্ষণ উপস্থিত হইলে উত্তেজক ঔষধাদি প্রয়োগে বিরত হইবে না আনুযজিক রোগেব চিকিৎসায় তত্তৎ রোগেব চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিবে \*বীবেব বল হ্রাস না হইতে পারে, এতদুপযোগী পথ্যাদি দিবে জিহবা পরিক্ষারার্থ বেলেডোনা, প্রেলাপ নিবারণার্থ ক্লোবাল, এবং উত্তাপ হ্রাসার্থ কুইনাইন সেব্য অনিদ্রায় সল্ফোনাট প্রোফাজ্য ক্লেপিওব দুৰ্লভতায় ও ক্রিয়া-লোপাশঙ্কায় থ্রীকনিয়া, ডিজিটেলিস, স্ট্রোফ্যান্থস, কফিইন সাইট্রস, চক্ষু আদি প্রয়োজ্য।

## টাইফয়েড ফিবার—আন্ত্রিক জ্বর

স্পর্শক্রামক ও সংক্রামক জ্বর, শরৎকালে এক বিশেষ বিষেব প্রভাবে উৎপন্ন হয়। জায়ন্তব পদার্থ পাচিয়া গেলে, নর্দামাদি হইতে উথিত বাষ্প স্বাধীনভাবে বা পানীয় জলে মিশ্রিত হইয়া দেহে প্রবিষ্ট হইলে, এই জ্বর হয় ইহা ধনী ও দরিদ্র সকলকেই আক্রমণ করে স্থিতিকাল ৩০ দিন। অনেকের রোগ ২১ বা ২৮ দিনে পর্যাবসিত হয় কখন কখন একবার আরোগ্যের পর পুনরায় ইহা আবির্ভূত হয়

লক্ষণ —এই বিষ দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হওয়াব ১০ হইতে ১৪ দিনের মধ্যে, কখন কখন এক বা দুই দিনের মধ্যেই বোগ-লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় হীণ, শিরঃস্পন্দন, শিথিলতা, তন্দ্রে বেদন, দুর্বলতা, তৎসঙ্গে উদবাসেষের প্রবণতা ও বমন। অস্থিরতা, মুখমণ্ডল পাণ্ডুব, কপোলদেশে আবণ্ড চক্ৰ; মূত্র স্বল্প, তাহাতে যুবিয়াব আধিক্য ও ক্রোবাইডের বিনোপ, নাড়ী-স্পন্দন প্রতি মিনিটে ১২০ বা ৩০০তক; শ্বাস দুর্গন্ধ, সর্দা সর্বদা এমোনিয়াব গন্ধ বিশিষ্ট; জিহ্বা শুষ্ক ও জ্বলন্ত পীত বা দাল বা চিকণ দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রাবল্যে বা তাহার ২১ দিন পূর্বে গাত্রে পীড়কা বাহির হয় প্রথমে বক্ষ বা উদবে গোলাপী বর্ণের উদ্ভেদ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগের জ্বায়ে দেখায়, প্রথমে উহা অল্প সংখ্যক ও গোলাকার থাকে এবং চাপিলে অদৃশ্য হয় কতক উদ্ভেদ তিবোহিত ও কতক নূতন আবির্ভূত হয়। শতকরা ১০ ১২ জনের উদ্ভেদ বাহির হয় না দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যসময়ে প্রলাপ; বর্ণে শব্দ বা বধিবতা, ওজ্রা, অবসন্নতা ও শয্যাশ্রিতাদি প্রকাশিত হয় উদবাস্থান, চাপিলে দক্ষিণ কুক্ষিদেশে গড় গড় শব্দ ও উদবাস্থ। অজ্ঞাভ্যন্তরে



( ইলিয়ম ও সিকম ) ক্ষত হওয়ায় বক্তৃতা মল ক্ষারধর্মী ও  
 চূর্ণ অম্লাবদাবণ, তৎসহ সাংঘাতিক অন্ত্রচ্ছদ পোদাহ  
 মূত্রগ্রস্থির রক্তাধিক্য মাস্তিক ও ফুসফুসীয় উপদ্রব ৫১৬ জনেব  
 মধ্যে একজন মবে অস্ত্রাভ্যন্তবে যে পেমার্স প্যাচেজ নামক  
 গ্রন্থি আছে, তাহাতে ক্ষত ও তাহার বিধান পবিবর্তন হয়

চিকিৎসা —এই বোগেব চিকিৎসাও অনেকাংশে  
 পূর্বোক্ত বোগেব অনুরূপ প্রাণন্তে একমাণা ক্যাষ্টব অয়েল  
 বা এক আউন্স ফ্লুইড ম্যাগ্নিসিয়া দিবে কেহ কেহ ইপিকাক  
 বমনকাবক মাত্রায় প্রয়োগ কবিত্তে বলেন ৩৭পবে উদবাগর  
 উপস্থিত হইলে অল্প মাত্রায় ওপিয়ম, বিসমথ, ক্যাটিকিউ, ব্যাউনী,  
 লগউড ২১৫, ২২২, ২২৪ গ্যালিক এসিড ২১৮, ২২৬  
 সলফেট অব কপার ও ওপিয়ম, ২৩০ ১০ হইতে ১৫ মিনিম  
 মাত্রায় ফ্লুইড একট্রাঃ অব্ ওপিয়ম, দুই আউন্স মিউসিনোজ অব ষ্টার্চ  
 সহযোগে মলদ্বারে পীচকাবী উদবাগান থাকিলে টর্পেন্টাইন  
 ২৪৯ ঈষদুষ্ণ জলেব পীচকাবি উদবে বেদনা থাকিলে ওপিয়ম  
 ৮৮, ১০৩, ১৩৩ স্থানিক—উদবে ফোমেণ্টোন, একট্রাক্ট বেলে-  
 ডোনা ও গ্লিসিবিং, লিনসিড্ পুলটীস, পোস্টচেডীব সেক রক্তশ্রাবে  
 এসিটেট অব্ লেড ও ওপিয়ম বা মর্ফিয়া ২২৫, ২২৮। টর্পে-  
 ন্টাইন ২১৭ এমোনিয়া আঘবণ ম্যালম শবীনেব উত্তে-  
 জনার্থ ত্রাণ্ডি, মস্ক, ক্লোবিক ইথর, এমোনিয়া প্রভৃতি বিবে টেপিড্  
 বাথ, ভিনিগার ও উষ্ণজলের দ্বারা স্পঞ্জিং পথার্থ দুগ্ধ, ডিম্ব,  
 মাংসেব যুষ, পোর্ট, ক্লাবেট, ত্রাণ্ডি। কুইনাইন ও মিনারেল  
 এসিড্‌স, ১৯৩, ১৯৪ পেট কাঁপায় সোডা সল্ফ কাব্বলাম বা  
 টেরিবিন ডাইলিউট কফরিক বা মিউবিষেটীক এসিড উপ-

কারী বোগীকে স্থিতির ভাবে বিশুদ্ধ বায়ু সংগ্রহ করিতে পারে একপ গৃহে বাথিবে মলত্যাগ ও প্রস্রাব—শয্যায় শায়িত থাকিয়া করা কর্তব্য কার্বলিক এসিড আদি পচন নিবারণ উপকারী এই বোগে অল্পে একপ্রকার ক্ষত হয়, ভজ্ঞাত তরল খাদ্য ভিন্ন কোন প্রকার কঠিন খাদ্য দেওয়া উচিত নহে। রোগ আবোগ্য হইলেও বিশেষ সতর্কতা সহকারে পথ্যবিধান কর্তব্য অল্প পবিমাণে ২৩ ঘণ্টান্তর পথ্য দিবে দুগ্ধ উৎকৃষ্ট, চুণের জল সহ দেওয়া ভাল।

বালকদিগেব এই বোগ হইলে পূর্বোক্ত প্রণালী অবলম্বনে চিকিৎসা কবিতে হইবে, কিন্তু ঔষধাদি অল্প মাত্রায় দিবে আনুষঙ্গিক কোন বোগাদি প্রোতুত হইলে তাহাব চিকিৎসা সাধাবণ প্রণালী অবলম্বনে কবিবে উদবাসয় নিবারণার্থ যোগ্য ও শরীরোক্ষতা হ্রাস কবণার্থ ডিফি টেলিস প্রয়োগ কবিতে কেহ কেহ পবাসর্গ দেন আন্ত্রিক রক্তপ্রাবে জার্গট উদবাসয়েব জন্ত কবোসিব সল্লিমেট ১১০ গ্রো (এক গ্রোণের ষতংশেব একাংশ) ২৩ ঘণ্টান্তর প্রয়োজ্য মুখ না আইসে একপ পবিমাণে ক্যানোমেন বোগেব প্রাবন্তে দেওয়া যাইতে পাবে শরীরেব উত্তাপ হ্রাস কবান জন্ত কুইনাইন বা সালিসিলিক এসিড বা সালিসিলেট অব্ সোডা জথবা এন্টি-পাইবিণ বা কিনাসিটিন ব্যবহার হয় উদবাসায টিংচর কটো বিশেষ উপকারী। স্ফুপিণ্ডেব বল বক্ষার্থ ক্যাফিইন, ডিজি-টেলিস ও স্ট্রোফ্যান্থস বোবাসিক এসিড ব্যবহারে উপকার লক হইয়াছে ক্রোবিন প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে উহার ব্যবস্থ ১৫ গ্রো চূর্ণীকৃত ক্রোরেট অব্

পটাসিয়ম একটী ১২ আউন্স শিনী বা বোতলের ভিতর পুরিবে এবং তৎপরে তাহাতে ৬০ মিনিম ট্রিং হাইড্রোক্লোরিক এসিড ঢালিয়া দিয়া কৰ্ক বন্ধ করিবে ও নাড়িবে, যতক্ষণ পীতবর্ণ বাষ্প দ্বারা বোতল পূর্ণ না হয় অনন্তর ক্রমশঃ জল সংযোগ ও সতত আলোড়ন করিবে, ইহাতে উক্ত ক্লোরিণ বাষ্প জলে মিশিয়া যায় এই এক বোতল পূর্ণ হুবে ২৪ ও ৬ গ্রেণ কুইনিন ও এক আউন্স সিৰপ অরেঞ্জ মিশাইবে ইহা অর্ধ হইতে এক আউন্স মাএয় বোগেব অবস্থানুসাবে ২৩ বা ৪ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিবে সল্ফিউবস্ এসিড, গোয়েকল উৎকৃষ্ট পচন নিবাবক নিদ্রা কবণার্থ সোডা ব্রোমা-ইড ও মর্ফিয়া

### সেবিরোম্পাইন্যাল ফিবর ।

এক প্রকার বহুব্যাপী জ্বর, ইহাতে মস্তিষ্ক ও কশেকক মজ্জার ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা থাকে ও গাএ এককণ রক্তবর্ণ উদ্বেদ বাহিব হয় তীব্র শিরঃপীড়া, বমন, গ্রীবাব প্ৰস্তাৎ দিকের পেশীর আকুঞ্চন ও তাহাতে তীক্ষ্ণ বেদনা, পৃষ্ঠবংশ ও অঙ্গে বেদনা ও প্রবল প্রলাপ স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষেব এই বোগ অধিক হয়, পূর্ণবয়স্কাপেক্ষা ১৪ বৎসরেব নিম্ন বয়স্ক বালক-দের অধিক হয় স্থিতিকাল ২ ৭ দিন শতকবা ২৫ হইতে ৮০ জনেব মৃত্যু হয় মানসিক ও শারীরিক অবসন্নতা, মুখাকৃতি নীলিম ও উৎকর্ষাব্যাজক, সাতিশয় অস্থিরতা, চক্ষু বক্তবর্ণ, কণীনিকা সংকুচিত বা বিশৃঙ্খল, জ্ঞানহীনতা, অস্পষ্ট দৃষ্টি ।

চিকিৎসা।—মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশে শীতল জল ও শৈত্য-মিশ্র বা বরফ প্রয়োগ। সব্‌কিউটানিয়স ইন্‌জেক্সন অব্‌ মর্ফিয়া ও এট্রপীন কখন কখন কেবল মর্ফিয়াব ইন্‌জেক্সন দ্বারা বিশিষ্ট হিতফল দর্শে। কুইনাইন, বেলেডোনা, ব্রোমাইড অব্‌ পটাশিয়াম ও আইয়োডাইড অব্‌ পটাশিয়াম দ্বারা উপকার হয় পথ্যার্থ বরফ, বরফ মিশ্রিত জল, সোডাওয়াটার, দুগ্ধ, যুষ, কাঁচা ডিম্ব। বিশেষ আবশ্যক না হইলে উত্তেজক ঔষধ নিষিদ্ধ। অত্যন্ত বমন থাকিলে পীচকাবি দ্বারা পথ্য দিবে। বমন নিবারণার্থ বিসমথ ও হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, ৯৩ মর্ফিয়া ও ক্লোবোফর্ম, ৯৮ পৃষ্ঠবংশে বেলেডোনা ও ক্লোরোকর্মাদির লিনিমেন্ট মর্দন

### বিল্যাপ্সিং বা ফেমিন্ ফিবর।

ইহা একরূপ সংক্রামক বোগ, বোগোপশমেব পৰ দুর্ব্বলা-বস্থায় রোগেব পুনরাবির্ভাব হয়। ইহা বহুব্যাপকরূপে প্রাচু-ভূত হয়। দুর্ভিক্ষ ও অনাকষ্টেব সময় এই বোগ জগে

লক্ষণ।—শীত, কপালে বেদনা, পৈশিক বেদনা হইয়া পরে জ্বর প্রকাশিত হয়। নাড়ী দ্রুত, পিপাসা, পাকায় শ্বেদে বেদনা ও বমন, কখন কখন প্রাচুর্যেব ইচ্ছা দেহেব নানা স্থানেব চর্ম্মে রক্তবিন্দু সঞ্চিত থাকিতে সময় সময় দেখা যায়, কিন্তু এই বোগেব বিশেষ কোন প্রকার উদ্বেদ নাই। সান্তিণয় অবসন্নতা। ৫ম বা ৭ম দিবসে রোগোপশম আবন্ত হয়। চতুর্দশ দিবসে রোগেব পুনরাবি-



ভাব হইয়া থাকে । তাহার ২৩ দিনে পবে আবার ক্রমশঃ  
রোগোপশম হয় ৪০ জনের মধ্যে ১ জন মবে

‘চিকিৎসা’ ।—মুখবিবেচক—কাণ্টের অফেল, হিউবার্শ  
বা জেলাপ পাউডর । শ্বেদজনক মিশ্র ২৮২, ২৮৩, ২৮৮ ।  
শ্বেদজনক ও শৈত্যকাবক চূর্ণ ২৯৭, ২৯৮, ৩০০ । ভিনিগার  
ও ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা স্পঞ্জিং বমন হইলে সিনাপিজম, সোডা  
এসিড, সোড ওয়াটার প্রভৃতি কামল হইলে এসিড নাইট্রো-  
মিউরিয়াটিক ডিল এমোনিয়া ক্লোরাইড, পডফিলিন, ট্যাবাক্সেসেকম  
আবশ্যক হইলে মধো মধো বিরেচক দিবে । গাত্রে বেদনা  
হইলে ওপিয়ম অর নিবারণার্থ কুইনাইন, টিংচার সিনকোনা  
কম্পাউণ্ড, ডিকক্সন সিনকোনা দুগ্ধ, ডিষ ও মাংস-যুষ প্রভৃতি  
পথ্য দিবে । সোডা হাইপো সল্ফাইট প্রযোগে উপকার হয় ।  
অবসন্নাবস্থায় ত্র্যাণ্ডি আদি উত্তেজক ও পুষ্টিকর সহজপচ্য পথ্য  
বিধেয়

### স্মল পাক্স—বসন্ত

এক প্রকার সংক্রামক জ্বর, তৎসঙ্গে পীড়কা উৎপন্ন হয় ।  
বিশেষ প্রকার কোন বিষ শরীরে আশোষিত হইলে ইহা হয়  
গোমহর্যাদান ( ভ্যাক্সিনেসন ) যত অধিক প্রচলিত হইবে,  
বোগও ক্রমশঃ তত নিম্ন হইবে

লক্ষণ —এই বোগে চারি অবস্থা—১ম শরীরে বিষ  
প্রবিষ্ট হইয়া রোগ প্রকাশ পর্য্যন্ত প্রথমাবস্থা অর্থাৎ প্রৈজ  
অব্ ইনকুবেসন ২য়, প্রাথমিক অবাবস্থা ( প্রাইমারি ফিবার ) ।

৩য়, উদ্ভেদাবস্থা ( ইবপ্‌সন ) । ৪র্থ, দ্বিতীয়ক জ্বর—( সেকেন্ডারি ফিভর ) প্রথমাবস্থা ১২ দিন থাকে । তৎপরে শরীরে ভাববোধ, শিরঃপীড়া, জ্বর, বমন ও পৃষ্ঠদাশ এবং কটিব পেশীতে বেদনা হয় । এই সকল লক্ষণ একাশের ৪৮ ঘণ্টা পবে শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ পীড়কা বাহির হয়, তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে প্রদাহিত ও পাকিয়া উঠে । নাসিকা ও মুখগহ্বরেব শৈল্পিক ঝিল্লীতে পীড়কা বাহির হইয়া পাকিয়া উঠে । সাধারণতঃ গলাভ্যন্তরে বেদনা, কাহার কাহার উহার সন্নিহিত যোজক তন্তু ক্ষীত ও প্রদাহিত হয় । সময়ে সময়ে স্নায়বীয় উগ্রতা বমন ও পৃষ্ঠ বেদনা প্রবল হইলে বোগ প্রায়ই গুরুতর হইয়া থাকে । তৃতীয় দিবসে উদ্ভেদ বাহির হয়, প্রথমতঃ মুখমণ্ডলে, গ্রীবায ও গণিবন্ধে, তৎপরে দেহেব মধ্য অংশে এবং সর্বশেষে অধঃশাখায় উদ্ভেদ জন্মে । ৯ম দিবসে উহার পাকিয়া উঠে, তৎপরে পুঁথ নিঃসৃত হইয়া মামডী পড়ে, তাহার ৪৫ দিন পবে মামডী শুষ্ক হইয়া পড়িয়া যায় । উদ্ভেদ যখন অল্পসংখ্যক ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকে, তখন তাহাকে ভ্যাবিয়োলা ডিস্ক্রিটা—এবং যখন উদ্ভেদ বহুসংখ্যক ও পরস্পর মিলিত ভাবে অবস্থিতি কবে, তখন তাহাকে ভ্যাবিয়োলা কনফ্লুয়েন্স কহে । শেষোক্ত প্রকার বোগই প্রায় সাংঘাতিক হয় । এই রোগেব ছায় সংক্রামক পীড়া আৰ নাই । যাহাদেব কোন প্রকার টীকা হয় নাই, তাহাদেব এই রোগ হইলে তাহা প্রায়ই সাংঘাতিক হয় ।

চিকিৎসা — স্যাক্টিয়া রেসিমোজা আভ্যন্তরিক ঔষোগ করিলে, কেহ কেহ বলেন যে, বসন্তেব দাগ থাকে না । গটো-

পার্চা বা ইণ্ডিয়া ববার, ক্লোরোফর্মের দ্রব কবতঃ স্থানিক প্রয়োগ  
 কবিলে দাগ নিবাবিত হয় এই বোগে যত কম ঔষধ  
 ব্যবহৃত হয়, ততই ভাল ; কাবণ ঔষধ দ্বাৰা এই রোগের  
 গতি প্রায়ই নিবাবিত হয় না কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে স্ফালাইন  
 ল্যাক্সেটিভ্‌স্ ৩৩৪, ৩৩৯, ৩৩১, ৩৩২, ৩৫৩ গলভ্যন্তরে ক্ষত  
 বা বেদনা হইলে টিংচর মর ও ভূতিব কবল ৭৫, ৭৮ উদবাময়  
 উপস্থিত হইলে ছফ ও চুণের জল, ক্যাটিকিউ ও চক মিক্‌চর,  
 বিসমথ ও টিংচর কাইনো, ২২৪, প্লম্বাই এসিটাস ও ওপিয়ম  
 ২২০ ; গ্যালিক এসিড ও মর্ফিয়া, ২২৭ অত্যন্ত অস্থিবতা  
 থাকিলে ক্লোরোফর্ম ও মর্ফিয়া, ৯৮ ওপিয়ম ও হেনবেন ৯০,  
 ১০৪ আবশ্যকানুসারে ইথর, এমোনিয়া, বাণ্ডি, পোর্ট প্রভৃতি  
 উত্তেজক ও বদকাবক প্রয়োজ্য কুইনাইন, বার্ক, নাইট্রিক  
 এসিড বা ষ্টীল ও কডলিভ অয়েল ছফ অন্ন, মাংসের  
 যুষ ও ডিম্ব প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পারে জ্বর বেগ ও শবীরের  
 উত্তাপ হ্রাস কবণার্থ লাইক ১ এমোনিয়া এসিটেটীস, ২৮২, ২৮৩,  
 ২৮৪, নাইট্রিক ইথর ও নাইট্রেট অব পটাশ ২৮৯ বসন্তের  
 দাগ নিবাবণের জন্ত গ্লিসিরা ও বোজ ওয়াটার সমভাগে ;  
 লাইম লিনিমেন্ট ; নাইট্রেট অব্‌ সিণ্ডর, বসন্ত গাঢ়িয়া  
 দেওয়া ; কলোডিয়ন, মার্কিউরিয়াল অয়েন্টমেন্ট, কোণ্ড্রিম  
 সল্ফাইট অব্‌ সোডা বা সল্ফে' ক'র্ক'ট অব্‌ সোডা উপ-  
 কারী কুইনিন ও টিং ষ্টীল ও উৎকৃষ্ট পচন নিবাবক অয়েল  
 অব্‌ ইউক্যালিপ্টাই বাহ্যিক প্রয়োগ উপকারী, সমভাগ চুণের  
 জল ও নাবিকেল তৈল অমণ্ড অয়েল ৭ ড্রাম ও লাইকর  
 প্লম্বাই সব এসিটেটীস্ ১ ড্রাম, ইহাতে চুলকাণি ও জ্বালা নিবা-

রিত হয় । ডাবের জল দ্বারাও ধোত করিলে উপকার হয় । বসন্তের পৰ গুটিকা সমূহ হইতে পুষ্টি নিঃসৃত হইয়া গেলে অক্সাইড অব্‌ জিঙ্ক, বা প্লাচ পাউডর স্থানিক

### চিকেন পক্স—পানবসন্ত ।

এক প্রকার সামান্য সংক্রামক পীড়া, প্রায়ই শিশু ও বালকদেব হয় । কখন কখন পূর্ণ বয়সেও হইতে দেখা যায় । ৬—৮ দিনের মধ্যে বোগ পর্যাবসিত হয় । পীড়কা বাহির হওয়ার দ্বিতীয় দিনে উহা জল পূর্ণ ও তাহার চতুষ্পার্শ্ব আবিভূম হয় । প্রথমে ক্ষুদ্র ও পৃষ্ঠে, তৎপরে মস্তকে উদ্ভেদ বাহির হয় । মুখমণ্ডলে প্রায়ই উদ্ভেদ প্রকাশ হইতে দেখা যায় না । চতুর্থ দিনে উহা শুষ্ক হইতে থাকে, তৎপরে পড়িয়া যায় । বিশেষ প্রবল সার্বজনিক দক্ষণ থাকে না । আনুষঙ্গিক জ্বরও মৃদু থাকে । একবার হইলে এই বোগ আবার হয় না ।

চিকিৎসা । —মৃদু বিবেচক, দাইকর এমোনিয়া এমিটেটস ও নাইট্রিক ইথর মিক্‌চর । রোগান্তে দৌৰ্বল্যে কুইনাইন, বার্ক, কডলিভার অয়েল, আয়রন ঘটিত ঔষধ ও পুষ্টি-কর পথ্য দিবে ।

### মিজল্‌স—হাম ।

এক প্রকার সংক্রামক একজর, পূর্বে সর্দি হইয়া পূর্বে প্রকাশিত হয় ; তৎপরে লালবর্ণ উদ্ভেদ দৃষ্ট হয় এবং প্রায়ই



এই রোগের সঙ্গে বা পরে শ্বাসযন্ত্রস্থ শৈল্পিক বিল্লীতে প্রদাহ জন্মিতে দেখা যায়

লক্ষণ ।—শবীরাভ্যন্তরে বিষ প্রবিষ্ট হওয়ার ১০ হইতে ১৫ দিন পরে শবীবে ভারবোধ, শীত, সর্দি ও জ্বর হয়। চক্ষু, নাসাবন্ধ, মুখগহ্বর, তালু ও বায়ুনলী আদি স্থানের শৈল্পিক বিল্লীতে রক্তাধিক্য হয়। চক্ষুপাতা শ্বেত এবং লালবর্ণ ও জলপূর্ণ, আলোকাসহতা, হাঁচি, শুষ্ক কাসি, গলাভাঙ্গা, অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, তন্দ্রা, চর্ম উত্তপ্ত ও তৎসঙ্গে নাড়ী কঠিন ও দ্রুত। জ্বর প্রকাশের চতুর্থ দিবসে গীড়কা বা উদ্ভেদ বাহির হয় এবং সপ্তম দিবসে তাহা মিলাইয়া যায় ইহাব উদ্ভেদ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগেব গ্রায়, চর্ম হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ, কতকগুলি একত্রে সম্মিলিত হইলে বড় দেখায় উদ্ভেদ বাহিব হইলেই সকল সময় জ্বর ত্যাগ হয় না ফুসফুসীয় লীড়া প্রায়ই হয়, তজ্জন্ত বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। সময়ে সময়ে স্বরযন্ত্র প্রদাহ, মুখবোগ, কর্ণকুহর-প্রদাহ, নাসা-বন্ধাব, তরুণ গুটক রোগ ( ট্যুবরকিউলোসিস ) বা তরুণ মূত্রগ্রাস্তি-প্রদাহ এই বোগের পব জন্মে এবং তদ্বৎ জীবন বিপদাপন্ন হয়

চিকিৎসা ।—সর্দি ও কাসি নিবারণার্থ একোনাইট ব্যবহার কর্তব্য। কার্বনেট অব্ এমোনিয়া ৩ হইতে ৫ গ্রেণ মাত্রায় ২৩ ঘণ্টান্তর। উদ্ভেদ হঠাৎ বিনুশ্ত হইলে মর্টার্ড বাথ প্রয়োজ্য। মুহু বিবেচক, লাইকর এমোনিয়া এগিটেটস ও নাইট্রিক ইথর ও নাইট্রেট অব্ পটাশ প্রভৃতি স্বেদজনক ও শৈত্যকাষক ঔষধ, ৩৮৩, ২৮৭, ২৮৯ কাসি বর্তমানে উহার

সহিত ভাইনম ইপিক্যাক, টিংচর ক্যাফর কং, মফিয়া, ও টিংচর হায়সায়ামাস সংযুক্ত কৰিব। বক্ষে সিনাপিজম্ ও কোমেণ্টেশন। তিনিগার ও জল দ্বারা স্পঞ্জিং পথার্থ মাণ্ড, এরোকট, দুগ্ধ, অন্ন, সোডাওয়াটার প্রভৃতি দিবে। আনুষঙ্গিক রোগ উপস্থিত হইলে তাহাব চিকিৎসা করিবে রোগীকে গৃহেব মধ্যে উষ্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত কৰিয়া রাখিবে। রোগান্তে দুৰ্বলতা নিবারণ জন্য কুইনাইন, টিংচর সিনকোনা, ষ্টীল, কডলিভব অয়েল, পুষ্টিকাবক খাদ্য। উষ্ণ জল দ্বারা পাদস্নান; অবসাদনেব লক্ষণ উপস্থিত হইলে উত্তেজক বিধান কর্তব্য।

### স্কাৰ্লেট ফিভৰ—আবন্ত জ্বৰ।

একরূপ সংক্রামক জ্বৰ—ইহাতে চৰ্ম্মে রক্তবর্ণ উদ্বেদ বাহিন হয়। চৰ্ম্ম ভিন্ন মুখগহ্বৰেব শ্লেষ্মিক ঝিল্লীতেও উহা দেখিতে পাওয়া যায়। জ্বৰেব দ্বিতীয় দিবসে পীড়কা বাহির হইয়া ৫ম দিবসে মিলাইতে আরম্ভ হয়। সদা সৰ্ব্বদা এই রোগেব সঙ্গে গলাভ্যন্তরেব ও হৃদযঃ গ্রন্থিৰ প্রদাহ বর্তমান থাকে। হামেব ঞ্চায় ইহা প্রায় বালাবস্থাতেই হয়, কিন্তু তদপেক্ষা ইহা ভয়ঙ্কর। ইহা জীবনে কেবল একবার হয় দ্বিতীয়বার যদি কাহারও হয়, তবে পীড়কা বাহিন হইতে দেখা যায় না এবং তাহা মূঢ় আকারে প্রকাশিত হয়।

এই রোগ ত্রিবিধ—১ম স্কাৰ্লেটিনা সিমপ্লেক্স—ইহাতে কেবল চৰ্ম্ম আক্রান্ত হয়। ২য় ম্যান্‌জিনোজা—ইহাতে চৰ্ম্ম ও কণ্ঠাভ্যন্তর আক্রান্ত হয়। এবং ৩য় ম্যালিগ্‌না—ইহাতে কেবল কণ্ঠাভ্যন্তর আক্রান্ত হয়।

চিকিৎসা।—কোন কোন চিকিৎসক এই রোগের প্রাবল্য হইতে কার্বনেট অব্ এমোনিয়া বা এসিটিক এসিড বা বেলেডোনা ব্যবহার করেন ভিনিগার স্পঞ্জিং ইপিক্যা-কেব দ্বারা বমন কম্পাউণ্ড জেলাপ পাউডর, ক্যাস্টর অয়েল, সিডলিজ পাউডর দ্বারা বিবেচন লাইকব এমোনি এসিটেটস, নাইট্রিক ইথর, ক্লোরেট ও নাইট্রেট অব্ পটাশ প্রভৃতি শ্বেদ-জনক ও শৈত্যাকারক ঔষধ সমস্ত দিবে অত্যন্ত বমন হইতে থাকিলে পেটের উপরে মর্টার্ড প্লাষ্টর, সেবনার্থ বরফ, সোডা-এসিড, সোডাওয়াটার ও লিমোনেড প্রভৃতি প্রলাপ হইলে মস্তক মুগুন করাইয়া শীতলজল ও শৈত্যমিশ্র, ১৯৯, প্রয়োজ্য নাড়ী ক্ষীণ ও অবসন্নতা প্রাদুর্ভূত হইলে এমোনিয়া, ব্রাণ্ডি, ইথর প্রভৃতি বিধেয়। গলাব অভ্যন্তরে ক্ষতাদি হইলে কণ্ডিস সলিউশন ও কার্বলিক এসিডের দ্বারা কবল করিয়া দিবে ক্লোরেট অব্ পটাশ ড্রিঙ্ক নাইট্রেট অব্ সিলভর লোশন গলাভ্যন্তরে স্থানিক প্রয়োজ্য মাংসেব কোল, দুগ্ধ, ডিম্ব, ব্রাণ্ডি, গ্যারাকট প্রভৃতি পথ্যার্থ দিবে আনুষঙ্গিক রোগের চিকিৎসা তওৎ বোগের চিকিৎসা-প্রণালী অনুসারে করিবে। বোগান্তে কুইনাইন, ষ্টীল, বার্ক, মিনাবেল এসিড্‌স প্রভৃতি বিধান করিবে। ইহার প্রতিষেধক ঔষধের মধ্যে বেলেডোনা প্রধান।

### ডেঙ্গু।

একরূপ স্পর্শাক্রামক অব্, ইহাতে আবজ্ঞান উত্তেজ বাহিব হয় ও সন্ধিতে প্রবল বাতবেদনা অনুভূত হয় সময়ে



সময়ে গলাবেদনা ও অণুকোষ ক্ষীত হয় সাধারণতঃ গ্রীবা ও কুচ্কীব গ্রন্থি ক্ষীত হইয়া থাকে। স্বর, বাহু, কাঁঠি, নিত্য, উরু ও জংঘাতে বেদনা, পেশী ও অস্থিতে অত্যন্ত বেদনা, শিরঃপীড়া, মুখমণ্ডল আবদ্ধিম, নাড়ী দ্রুত, জিহ্বা মলাবৃত্ত, বমন, বিবসিধা ও সাতিশয় অবসন্নতা রোগের স্থিতিকাল ৮ দিন।

চিকিৎসা।—প্রথমে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে একটী সিড লিজ্ পাউডর বা কল্পাউও রিউবার্ব পাউডর লাইকব এমোনিয়া এসিটেটস ও নাইট্রিক ইথর ২৮৩, ২৮৮ উত্তম মিশ্রের সঙ্গে টিংচর অব্ বেলেডোনা ১০ ২০ মিনিম মাত্রায় দিবে বেদনা নিবারণার্থ ওপিয়ম, হায়সায়ারাস পিপা সায নীতল জল, বরফ ও সোডাওয়াটার বোগাস্তে দৌর্কলো কুইনাইন, টিংচর ও ডিক্কসন সিনকোন, ছুঙ্ক, মাংস প্রভৃতি দিবে বেদনা স্থানে বিবিধ প্রকার বেদনানিবারণক ও উত্তেজক মর্দন বিধেয় বলবর্দ্ধনার্থ কড়্টিভর অয়েল, পৌহ-যাটত ঔষধাদি। বাতের ছায় বেদনা ও সন্ধি আক্রান্ত হইলে ভাইনম কলচিকম, বাইকার্বনেট অব্ পটাশানি দিবে প্রদাহিত ও বেদনান্বিত সন্ধিতে লিনিমেন্ট আয়োডিন মর্দন টিংচর বসটক্স সিকি মিনিম মাত্রায় উপকারী।

### প্লেগ—মড়ক

টাইফস জ্বরের ছায় এক প্রকার সংক্রামক একজ্বর

লক্ষণ। - বিষ দেহাভ্যন্তরে ও বিষ্ট হওয়ায় কয়েক ঘণ্টা

হইতে তিন সপ্তাহ পরে বোগ প্রকাশিত হয় চর্মনিম্নস্থ তন্তুভে  
রক্তপূর্ণ চিহ্ন, বাগি ; গ্রীবা, কক্ষ, বক্ষঃ ও অন্ত্রায়াজক ঝিল্লীস্থ  
গ্রন্থিতে প্রদাহ, পচনশীল বিস্ফোটক, জ্বর, উদবাসয় ও বমন  
যক্ণ, স্থূপিশু ও প্লীহায় প্রবল বক্তাধিক্য ও উহাদেব বিধান  
কোমল হয় সাতিশয় অবসন্নতা, মূত্রানুৎপত্তি, বক্তাশ্রাব, বিকম্প,  
সংজ্ঞাহীনতা, অবশেষে মৃত্যু

চিকিৎসা — বমনক বন্ধ, মূত্রবিবেচক ও শ্বেদজনক  
ঔষধ প্রযোজ্য মিনাবেল এসিড্‌স, কুইনাইন, ওপিয়ম, ক্রোমিক  
ইথর, ব্রাণ্ডি ও ক্যাম্ফর প্রভৃতি উত্তেজক পুষ্টিকাবক খাদ্য,  
উত্তেজক ঔষধ গৃহাদিতে দুর্গন্ধহাবক ধোতাদি ছড়াইয়া দিবে  
সর্বদা তৈল মধু ইত্যে কেহ কেহ বলেন বিবিধ এন্টিসেপ্টিক  
ঔষধ প্রযোজ্য

### ইন্টারমিটেন্ট ফিবার—বিষমজ্বর ।

ইহার অপব নাম এটিউ

ম্যালেরিয়া অর্থাৎ এক প্রকার দূষিত বায়ু হইতে এই জ্ব  
জন্মে জ্বর আসার সময় শীত, পবে শ্বেদশ্রাব হইয়া জ্বর মগ্ন  
হয় জ্বের বিবাকালে শরীর শূন্য বোধ হয়, কিন্তু নির্দ্ধাবিত  
সময়ান্তে পুনরায় জ্বর আইসে যত দিন বোগ আবোগ্য না  
হয়, তত দিন এইরূপ নিয়মে জ্বর আসিতে থাকে এই  
জ্বর ত্রিবিধ ঐকাহিক বা কোটিডিয়ান, দ্ব্যাহিক বা টার্সিয়ান  
এবং ত্র্যাহিক বা কোয়ার্টেন প্রত্যহ এক সময়ে জ্বর আসিলে  
তাহাকে ঐকাহিক, এক দিন অন্তর হইলে দ্ব্যাহিক ও দুই

দিবস অন্তর হইলে ত্রাহিক জ্বর কহে। জবেব বিবাম কালকে ইন্টারমিসন কহে কখন কখন জব এক দিনে দুই বার হয়, তাহাকে দ্বৈকালীন বা ডবল্ টাইপ বলে।

লক্ষণ — এই জ্বরের তিন অবস্থা—শৈত্যাৱস্থা উষ্ণাবস্থা ও স্বেদাবস্থা। প্রথম অবস্থা অর্ধ হইতে তিন চারি ঘণ্টা থাকে দ্বিতীয় অবস্থা—তিন ঘণ্টার কম নহে ও ১২ ঘণ্টার বেশী থাকে না এবং তৃতীয়াৱস্থা - কয়েক ঘণ্টা থাকিয়া বোগী স্তম্ভ বোধ কবে গীহা বিরুদ্ধি, যকৃৎ ও পাকযন্ত্রেব বিশৃঙ্খলা বাবদ্যাব জব হইতে থাকিলে কোন কোন সময় প্রাচীন মূত্র-গ্রন্থিপ্রদাহ সমুপস্থিত হয়

চিকিৎসা — শৈত্যাৱস্থায় উষ্ণ পানীয় যথ যবোদক, চা প্রভৃতি সেবনার্থ ও গাত্রে লেপাদি দিয়া বোগীর শীত নিবারণ করিবে শীত হওয়ার কিঞ্চিৎ পূর্বে ১০ ১৫ ঘণ্টা মাত্রায় টিংচব ও পিষম সেবনার্থ দিলে বিশেষ উপকার হয় নাইট্রেট্ অব্ এনিল ও অন্যান্য নাইট্রেট ব্যবহারে শীত নিবারিত হইতে পারে। পাইলোকার্পিনেব হাইপোডার্মিক ইন্জেকশনেও ব্যবহার হয় উষ্ণাবস্থায় বরফ, শীতল জল, শীতল পানীয়, গাত্ৰাদি ঈষদুষ্ণ বা শীতল জল দ্বারা স্পর্শিৎ স্বেদস্রাব করণার্থ এই অবস্থায় লাইকব এম্যানিয়া এসিটেটীস, স্পিরিট অব্ নাইট্‌স ইথর ও নাইট্রেট অব্ পটাশ ২৮২, ২৮৭, ২৮৮ সিবিমিয়া বা বগন থাকিলে ২৯০ জেম্‌স পাউডর ও ক্রোবেট অব্ পটাশ, ৩০০। স্বেদস্রাবকালে তবল ও ঈষদুষ্ণ পানীয় দিবে বিরেচক ষটিকা ৩৪১, ৩৪৪, ৩৪৭ রাএ এবং প্রাতে ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৬, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩। পাকায়নে অজীর্ণ জব্যাদি সঞ্চিত থাকিলে

ইপিক্যাক বমনকারক মাত্রায় দিয়া বমন করান কর্তব্য  
 বিরামকালে কুইনাইন ও নাইট্রিক এসিড ১৬৭ লাইকব  
 আর্সিনিকেডিস ও সিনকোনা ১৬৮ কুইনাইন বিবেচকেন সঙ্গে  
 ১৭৭। কুইনাইন, নাইট্রিক এসিড ও সিনকোনা ১৯৩, ১৯৪  
 কুইনাইন ও নক্সভমিকা ১৯৫ কেরি সল্ফ ও কুইনাইন ২০৯  
 কুইনাইন, বিয়াই, জেনাপ ২১০ কুইনাইনের হাইপোডার্মিক  
 ইন্জেকশন একোবস ক্যালোমস (চিবতা ও নাটাব ফনোর  
 শাঁস সহ) গার্লিক দিনে ২৪ টী এমোনি ব্রোবাইডম,  
 স্যাট্রিমিডিস, স্যাট্রিমল ১৫ মিনিম মাত্রায়, বিবিবীং, স্যালিসিন,  
 বার্কেরিস নিসিয়ম জ্বাবেশ অবিলম্ব বন্ধ কবিবাব চেষ্টা  
 কর্তব্য অনেক বাব বা দিবস জ্বাবেশ হইতে থাকিলে আভ্য-  
 ত্তবিক যত্নদি আক্রান্ত হইয়া পড়ে, তখন চিকিৎসা দ্বারা মোক্ষ  
 রোগ্য করা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে তজ্জন্ত প্রথম হইতেই স্ফু-  
 কিত্বসা কর্তব্য এককপ সূক্ষ্ম জীবাণু রঙে প্রাবিষ্ট হইয়া এই  
 রোগ উৎপাদন করে জ্বাব সহিত প্লীহা বিবৃদ্ধি থাকিলে  
 শেযোক্ত ঔষধ বিম্ব উপযোগী ৪১৯ নাটাব ফনোর শাঁস  
 ও গোলমবিচ কার্ল লিগনাই ২০—৬০ গ্রো মাত্রায় ক্যাস-  
 কেরিলা, সিড্রন, সিনকোনা ১৭০, ২৮৪, ১৯৩ ককুমাস  
 কর্ডিফোলিয়স, কফিব ফার্ট, কেরি সল্ফাস ১৭৭, ১৭৮ জেন-  
 সিয়ান ১৯৫ নার্কোটিন, পাইপব নাইগম, পিপানিন, কোণা  
 সিয়' সয়'মিড' ফেব'ফিউজ' (বে'হন বার্ক), নক্সভমিকা,  
 জিন্সাই অক্সাইডম, জিন্সাই সল্ফ ১৯৭, ২০০ পৃষ্ঠবংশে  
 ড্রাই কপিং, ওপিঘম লিনিমেন্ট মর্দন, কুইনাইন ও নাটাব  
 একত্রে মর্দন ইহাব সঙ্গে প্লীহা বিবৃদ্ধি থাকিলে উপযুক্ত ঔষধ



ব্যতীত ব্রোমাইড অব্ পটাশিয়াম ৪০৯, উহাব সঙ্গে টিংচর নক্সডমিকা ৩ ৫ মিনিম ফেবি এট কুইনী সাইট্রস ১৭২, ১৭৩, ১৭৪ ফেরি পাবল্লারাইড ও আইয়োডিন ১৭৫ কুইনাইন ও ষ্ট্রিকনিয়া ১৭৮ ভাইনম ফেবি ও ডার্মিনিক ১৯১ কুইনাইন ও ল্যাক্টেট অব্ আয়রণ ২০১, ২০৮ ঘিরম নিডফটম ও নক্সডমিকা ২০৫ ফেবি সল্ফ ও কুইনাইন ২০৯। কড লিওর অয়েল, আইয়োডিন বা বেড্ আইয়োডাইড অব্ মার্করী অয়েন্টমেন্ট অত্যান্ত কোন প্রকাব আন্তরঙ্গিক বোগ বা লক্ষণ উপস্থিত হইলে সাধাবণ প্রণালী অবলম্বনে চিকিৎসা কবিলে সিন্‌কোনা ফেব্রিফিউজ ৩ ৬ গ্রেণ মাত্রায় ১২ বা ৩ ঘণ্টান্তর ২৩ বার প্রয়োগ করিলে জ্বর আসা নিবাবিত হয়। ইহা বটিকা, চূর্ণ বা তিস্র ত'ব'ব ব্যবস্থ' কব' যাইতে প'বে লেবুর রস সহ ওলিলে বটিকা হইতে পারে জলমিশ্র গন্ধকজাবক দ্বাবা ইহা দ্রবীভূত হয়। দার্জিলিং প্রদেশে রোপিত সিন্‌কোনার বন্ধল হইতে প্রস্তুত হয়, ইহা কুইনাইনের সমগু-কারী ও তৎপরিবর্তে ব্যবহার্য। ইহা সেবনে কাহাব কাহার বমন হয়, তাহা নিবারণার্থ ১২৩ মিনিম মাত্রায় টিংচর ওপিগম প্রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অনেক সময় আণানুরূপ স্মফল প্রাপ্ত হওয়া যায় সত্বে লেবু একটী চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া ও জলে সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ সেবন করিলে জ্বরারোগ্য হয়। কুইনাইনের দ্বায় ইহা দ্বাবা ম্যালেরিয়া নষ্ট হয়। সংশ্রুতি মিথিলিন ব্লু প্রয়োগে উপকাব দর্শে বলিয়া কথিত হয় বালকদিগকে ১ গ্রেণ মাত্রায় ক্যাপসিউলেব মধ্যে পুরিয়া সেবন করিতে দেওয়া হয় ও ৩৪ ঘণ্টান্তর পুনঃ প্রয়োগ বসিতে হয়।



হাইপোগ্লফাইট অব্‌ সোডা ১৫ ২০ গ্রেণ মাত্রায় ২ ঘণ্টাস্তর ব্যবহার করিলে জ্বর আরোগ্য হয়। অ্যালিমিলিক এসিড দ্বারা অনেক সময় জ্বর আরোগ্য হয়, কিন্তু ইহাকে অনেকে কুইনাইনের সাহায্যকারী ঔষধ মনে করেন। গীহবিবৃদ্ধিতে টিংচর সিয়েনোথস্‌ উপকারী। বাহ্যিক প্রয়োগার্থ বিন আইয়োডাইড্‌ মার্করী অয়েন্টমেন্ট বা লিনিমেন্ট পটাশ আইয়োডাইড্‌ কম্‌ মেনপোনি।

### রেমিটেন্ট ফিবার—স্বল্পবিরাম জ্বর।

ইহার কারণও পূর্ববর্ণিত জ্বরের স্থায়ী স্থান বিশেষে ইহা প্রবলাকারে প্রকাশিত হয়। উষ্ণপ্রধান দেশে এই পীড়া প্রায়ই শুকতর আকার ধারণ করে।

লক্ষণ —পূর্ববর্ণিত জ্বরের স্থায়ী; কেবল ইহাতে জ্বরের সম্পূর্ণ বিরাম না হইয়া অল্প কম পড়ে। এই স্বল্প বিরাম সময়কে রিমিসন বলে। এই স্বল্পবিরামাবস্থা ৬ হইতে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত থাকিতে পারে, কিন্তু অনেক সময় তদপেক্ষা কম থাকিতে দেখা যায়। তৎপবে পুনরায় জ্বরের প্রকোপ হয়। প্রকোপের পূর্বে প্রায়ই শীত হয়। আবার কখন শীত হয় না। প্রাতঃকালেই জ্বর কিছু নবম পড়ে। এই রোগ ১৪ ১৫ দিবস বা ততোধিক দিন থাকিতে পারে। বোগাবসানে ঘর্ম হয়। কখন কখন এই জ্বর অবসন্নকর জ্বরে (লো ফিবার) পরিণত হয়। শিশুদেব স্বল্পবিরাম জ্বর, টাইফয়েড জ্বরের রূপান্তর মাত্র। প্লীহা, যকৃৎ ও ফুসফুসাদি আভ্যন্তরিক যন্ত্রে সময়ে সময়ে বক্তাধিক্য হয়। মস্তিষ্কে বক্তাধিক্য হইলে প্রলাপ ও

তন্মাদি উপস্থিত হয় । বমন, বিবমিষা, গাত্রদাহ, পিপাসা, উদ-  
রাময়, জিহ্বা মলান্বত, প্রবল শিরঃপীড়া, কোষ্ঠবদ্ধ, মূত্র স্বল্প  
ও আবদ্ধ, নাড়ী পুষ্ট ও দ্রুত, দৈহিক উত্তাপ অত্যন্ত বর্দ্ধিত  
( ১০৪।১০৬ ডিগ্রী ) ও ক্ষুধাভাব ইত্যাদি গুরুতর পীড়ার  
লক্ষণাদি টাইফস ও টাইফয়েড জ্বরের গ্রাম্য হইতে পারে

চিকিৎসা — ইহার চিকিৎসা অনেকাংশে বিষম জ্বরের  
গ্রাম্য জ্বরের উত্তাপাদি নিবারণের জন্য স্থানাইন ও এফাব-  
ভেসিং ড্রাফ্টস্ ২৯০, ২৮৯, ২৮৮, ২৮৪ নীতল পানীয়,  
বরফ ইত্যাদি বিবেচনার্থ ৩২৯, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৪৩,  
৩৪৪, ৩৪৭, ৩৫৩ । ইপিক্যাক ২০ গ্রেণ দ্বারা বমন ।  
ঈষৎ জল দ্বাৰা বা ভিনিগার ও জল দ্বাৰা স্পঞ্জিং ।  
জ্বরের উত্তাপ উপযুক্ত ঔষধে নিবাবিত না হইলে নিয়-  
লিখিত ব্যবস্থামত ঔষধ দিবে ভাইনম এন্টিমোনিয়েল  
২৬৭ । টিংচর একোনাইট ২৭২ ইপিক্যাক ও এন্টি-  
মোনিয়েল পাউডর ২৯৮, ২৯৯ ক্লোবেট অব্ পটাশ ও  
জেন্স পাউডর ৩০০ পিপাসা নিবারণার্থ পটাশ টার্ট এসিড  
২৯৩ ক্লোবেট অব্ পটাশ ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড ডিল  
২৯৪ একেব উত্তাপ হ্রাসিত হইয়া নিবাসকাল উপস্থিত হইলে  
কুইনাইন ২—৬ গ্রেণ মাত্রায় ২৩ ঘণ্টান্তর দিবে । পুনরায়  
উত্তাপ উপস্থিত হইলে উহা সেবন বহিত করিবে । কোষ্ঠবদ্ধ  
থাকিলে কুইনাইনের সঙ্গে বিরেচক ঔষধ মিশ্রিত করিয়া দিলে  
বিশেষ উপকার দর্শে ১৭৭, ১৯৫, ২০৯, ২১০ উদরাময় বর্তমান  
থাকিলে কুইনাইনের সহিত মর্নিয়া, ও পাকাময় উগ্র থাকিলে  
সোডা এসিডের সহিত উহা ব্যবহার করিবে কুইনাইন ও এসিড

নাইট্রিক ডিল ১৯৩, ১৯৪ । কুইনাইন ও ইন্ফিঃ য়োজি এসিডাই ১৬৭  
 মাস্তিক রক্তাধিক্যেব লক্ষণ অর্থাৎ প্রলাপ বা চৈতন্য হানিব লক্ষণ প্রকাশিত হইলে মস্তক যুগুন করিয়া শীতল জল, শৈত্যমিশ্র ১১৯, ১১৮ ; বরফ, ভিনিগার ও জল দিবে । ইহাতে উপকার না দিলে ব্লিষ্টাব ও মর্টার্ড প্লাষ্টব দিবে পশ্চাৎ গ্রীবা ও জঙ্ঘাব পশ্চাতেও ব্লিষ্টাব ও মর্টার্ড লাগাইবে বিবেচক দিবে মৃদু প্রলাপ ও অত্যন্ত অবসন্নতাব লক্ষণ প্রকাশিত হইলে উওজক ও বলকারক ঔষধ ২, ৩, ৫, ৬, ১৩, ১৯৩, ১৯৪ এতদ্ব্যতীত অবস্থানুসারে পূর্বোক্ত ঔষধাদিও প্রযোজ্য । বমন হইতে থাকিলে সোডাএসিড, লিমনেড, ডাবেব জল, একোয়া লবোসিবেসাই, ১০ গর্ফিয়া ও ক্লোবোফর্ম ৯৮ বিস্মথ ও হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ৯২, ৯৩ সোডি বাইকার্ব ও একোয়া লবোসিবেসাই ২৯০ বরফ সোডাওয়াটার, বার্লিওয়াটব, মিশ্রিত সববত ও লেবুব বস ক্রিয়েজোট বা কুজোট বা নাইটেট সিবিয়ম ভাইনম ইপি-কাক আন্ ফোটা মাত্রায় হিকা হইলে হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ৯২, গর্ফিয়া ও ক্লোবোফর্ম ৯৮ । এমোনি কার্ব ও হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, ৪ । মস্ক ও ক্যান্ফর ১৪ বেলেডোনা ও ক্লোবোফর্ম ৯৫ । ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়ম ৪২২ হাইড্রেট ক্লোরাই ৪২৪ পৃষ্ঠবংশেব উপব মর্টার্ড উদবাগ্মান হইলে এসাফেটিডা উষঃ জল সহ পীচকারি, ৮২, ৮৩ সেবনার্থ তার্পিণ তৈল বা টেরিবিণ অল্প মাত্রায় দিবে । উদবে তার্পিণ তৈলের মেক ও মলদ্বাবে ক্যাষ্টব অয়েল ও তার্পিণ দ্বাবা পীচকারি ৮১, ১৬১, ১৬২, ৩৬০ উদবাময়ে বিবিধ সঙ্কোচক ঔষধ প্রযোজ্য এসিড সল্ফ ডিল ২১২ চক মিকশর ও সিবপ প্যাপেভেরিস ২১৪ ।

বিসমথ ও সিনকোনা ২২৪। ট্যানিক এসিড ২২১। গ্যালিক এসিড ২১৮। গ্যালিক এসিড ও ডোভর্ম পাউডর ২৩৩। বিসমথ ও ট্যানিক এসিড ২৩৪, ২৩৫। তৃতীয় ঘণ্টা নিঃসৃত হইয়া হিগারের লক্ষণ উপস্থিত হইলে ব্রাণ্ডি, এমোনিয়া, ইথর, মস্ক, ক্যাম্ফর প্রভৃতি ঘন ঘন প্রয়োগ্য। বোণী অতিশয় অস্থিরতা প্রদর্শন করিলে অল্প মাত্রায় অহিফেন বা বেলডোনা ঘটিত ঔষধ দিবে। পথ্যার্থ—মাগু, এরারট, ট্যাপিওকা, স্ক্রী, স্ক্রু, মাংসের ঝোল, পোর্ট ওয়াইন প্রভৃতি এবং ইক্ষু দাভিম, কিস্-মিস্, পেঁপে, পানিকল, কেশুর, যব ও অন্ন মগু, খই, মিছবি প্রভৃতি বিবেচনা মত প্রদান করিবে। বালকদিগের স্বল্পবিরাম জ্বরে জেলুসিমিয়ম বিশেষ উপকারী।

পূর্বেোক্ত উপায়াদি অবলম্বনেও যদি জ্বর হ্রাস প্রাপ্ত না হয়, তবে ওয়েট্‌ মিট্‌ প্যাকিং অর্থাৎ আদ্র বস্ত্র দ্বারা গর্ভ শরীর আচ্ছাদন, ঈষৎ জলে স্নান, বাষ্প স্নান প্রভৃতি দ্বারা স্নেহস্রাব হইয়া জ্বরের উত্তাপ তিবোহিত হয়। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ও প্রলাপ হইলে বেলডোনা ব্যবস্থা করিবে। প্রবল প্রলাপে ক্লোরাল ও ব্রোমাইড অব্‌ পটাশিয়ম তাপ পরিহারার্থ-ডিড্রিটেলিস অল্প মাত্রায়, স্যালিসিলিক এসিড ও স্যালিসিলেট অব্‌ সোডা অর্ধ বা ১ ড্রাম্‌ মাত্রায় বাতিতে এক বাব বা অল্প মাত্রায় (৩—১৫ গ্রেণ) অথবা থিনাসিটিন বা এন্টিপাইরিন ২৩ ঘণ্টা পর প্রযুক্ত হইলে জ্বরের বর্ধিত শব্দবোধ্য হ্রাসিত হয়। কিন্তু ইহা বিশেষ সাবধানে ব্যবহার করা বিধেয়। ছৎপিণ্ডের অবসাদক বলিয়া মতর্ক থাকা কর্তব্য। স্যালিসিলেট অব্‌ কুইনাইন ৩৪ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিলেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।



ফিনাসিটিন্ ব্যবহাবেও অব মগ্ন হয় স্বপ্নিওব দুৰ্বলতা বৰ্ত্তমানে  
কফিইন সাইট্রাস সহ প্রয়োজ্য অয়েল ইউক্যালিপটাই ও গোমে-  
কল্ও উপকারী

### ব্যালানাইটিস ।

শিশুমুণ্ড ও তদাচ্ছাদক চৰ্ম্মেব অভ্যন্তরস্থ শ্লেষ্মিক বিল্লীৰ  
প্রদাহ ইহা আবক্ত ও স্থানে স্থানে হাজিয়া যায় ।

লক্ষণ । উত্তাপ, কণ্ঠযন, শ্লেষ্মামিশ্রিত পুষ্পাব, শ্লীততা ;  
শ্লীততা অধিক হইলে আচ্ছাদক চৰ্ম্ম খোলা যায় না ইহার  
সঙ্গে প্রমেহ আদি পীড়া সম্মিলিত থাকিতে পাবে ।

চিকিৎসা ।—শিশুমুণ্ড উত্তমরূপে পৰিষ্কার কৰিবে কষ্টিক  
বা কোন প্রকার সংকোচক ধাবন দিবে মলিউসন অব্ সল্  
এসিটেট অব্ লেড বা কষ্টিক লোশন ( ৩ গ্রেণে এক আউন্স  
জল ) দ্বারা উক্ত স্থান পেণ্ট কৰিবে গ্লাও পিনিস ও প্রিপিউ-  
সেব মধ্যে শুষ্ক লিণ্ট বা তুলা দিয়া বাধিবে ইহা দ্বারা ফাইমো-  
সিস্ বোগ হইলে অর্থাৎ চৰ্ম্ম খুলিতে না পারিলে পুলটীস্ দিবে  
এবং গোলার্ডস্ লোশন ও লিণ্ট দ্বারা তৎস্থান ভিজাইয়া বাধিলে  
শ্লীততা হ্রাস হয় তৎপবে চৰ্ম্ম খোলা যাইতে পাবে অথবা  
তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে অঙ্গ কৰিবে । পাবম্যানগানেট  
অব্ পটাশ লোশন অভ্যন্তর বেদনা থাকিলে লেড লোশনের  
সঙ্গে ওপিয়ম দিবে

### গনোরিয়া—প্রমেহ ।

মূত্রমার্গেব নৈমিত্তিক বিদ্যীব প্রদাহ, সাধারণতঃ অত্র ভাগ আক্রান্ত হয় । ইহাতে এক প্রকার স্পর্শ সংক্রামক ব স্লেষ্মাবিশিষ্ট পুণ্ড্র প্রদাহ হইয়া থাকে

লক্ষণ ।—স্পর্শসংক্রামণেব পর তৃতীয় দিবসে শিশ্নুগুণ্ড উষ্ণ ও কণ্ডুয়নযুক্ত হয় । মূত্রমার্গ আবদ্ধ ও পূর্ণ, শ্বেতবর্ণ পুণ্ড্র প্রদাহ কবিত্তে জ্বালা, কুচকীতে বেদনা, মূত্রাশয়ের উগ্রতা, অণ্ডকোষ ভাবি বোধ ও তাহাতে আকর্ষক বেদন । আনুসঙ্গিক রোগ যথা—পুরুষ-অঙ্গ উন্নত ও শক্ত এবং বেদনারিত ( কড়ি ) ; শিশ্নুগুণ্ড প্রদাহ, মূত্রমার্গ হইতে বক্তপ্রাব, মূত্রাবরোধ, স্ফোটক, মূত্রাশয়-মুখশায়ী গ্রন্থি প্রদাহ, মূত্রাশয় প্রদাহ, অণ্ডকোষ প্রদাহ, প্রমেহ জনিত চক্ষু উঠা ও বাত ।

চিকিৎসা ।—টিংচব একোনাইট ১ ফোটা মাত্রায় প্রতি ঘণ্টান্তর তরুণ রোগে ব্যবহার্য্য । ক্যানেনিস ইণ্ডিকার টিংচার ব্যবহারে সময় সময় উপকার হয় । ক্যান্থেরাইডিস্ টিংচর ১ ফোটা মাত্রাব প্রয়োগে স্ফুল উপলব্ধি হইয়াছে । গ্লিসিবিণ্ অব্ ট্যানিন্ ১ ড্রাম, অলিভ অয়েল বা মিউসিনেজ ১ ড্রাম, একত্রে পিচকারী দিলে উপকার দর্শে । টিংচব ফেবি অর্দ্ধ ড্রাম, টিংচব ওপিয়ম ১ ড্রাম, জল ২০ আউন্স একত্রে মিশ্রিত করতঃ তদ্বাচা মূত্রমার্গে পিচকারী দিবে । সল্ফো কার্বলেট অব্ জিঙ্ক ২০ গ্রেণ জল ৮ আউন্স একত্রে মিশ্রিত করতঃ দিনে ২ ও বার পিচকারী দিবে । ক্লোরাইড অব্ জিঙ্ক ১ বা ২ গ্রেণ, জল ২০ আং একত্রে দ্রবীভূত করতঃ রোগের প্রাবল্যে মূত্রমার্গে পিচকারী দিলে ২৪ হইতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রোগোপশম লক্ষিত হয় । পারম্যাঙ্গা-

নেট অব্‌ পটাশ, কেরোসিন সল্লিমেট, বোরাসিক এসিড লোশন  
 পিচকারী একাট ঔষধেব লোশন কয়েক দিবস ধীরভাবে  
 ব্যবহার করা উচিত ঘন ঘন ঔষধ পরিবর্তন করা ভাল নহে ।  
 উগ্র পিচকারী অপেক্ষা মৃদু লোশনেব পিচকারী সম্যক ফলোপ-  
 ধায়ী যদি ঘন ঘন পিচকারী দেওয়া বশতঃ অণ্ডকোষে বেদনা  
 জন্মে, তাহা হইলে ইহাকে উষ্ণ জলে নিমজ্জিত করিবে বা ঘন  
 ঘন স্বেদ দিবে তাহাতে উপশম বোধ না হইলে ঘন ঘন  
 পিচকারী দেওয়া বহিত করিবে সেই সময় বোণীকে শয়ন  
 করিয়া থাকিতে উপদেশ দেওয়া বিধেয়

প্রমেহ রোগেব চিকিৎসাব প্রধান উদ্দেশ্য যে পুষ্ণ্যাব রহিত  
 করা । এই রোগে নচরাচর কোপেবা ও অয়েল কিউবেব ব্যব-  
 হৃত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রদাহ সত্তে, মূত্রাশয় উগ ও অণ্ডকোষে  
 বেদনা ও গায়ে কোন প্রকার উদ্বেদ থাকিলে ইহাবা অব্যবহার্য্য  
 বোগেব প্রাপ্তেই নাইট্রেট অব্‌ সিলভর লোশন ( ৫ ১০ গ্রাণ,  
 জল ১ আং ) দ্বাবা মূত্রমার্গে পিচকারী বিবেচক ও শীতল  
 দ্রব্য পানার্থ দিবে । প্রতিবার প্রস্রাব করাব পব সব এসিটেট্  
 অব্‌ লেড লোশন, সলফেট অব্‌ জিঙ্ক লোশনের পিচকারী দিবে ।  
 শিশু উষ্ণ জলে স্নাত করিবে মলদ্বারে অহিফেনের সপোজিটরী  
 ১৬৬ । পিচকারী দ্বাবা সময়ে সময়ে বিবিধ উপদ্রব আসিয়া  
 উপস্থিত হয়, অতএব উহা সাবধানে ব্যবহার করিবে এসিটেট  
 অব্‌ পটাশ ও নাইট্রস ইথর ব্যালসম কোপেবা ও অয়েল  
 কিউবেব প্রদাহ উপশান্ত হইলে দিবে ৩২৭, ৩৭৩ । গর্জ্জন  
 তৈল এই রোগের বিশেষ উপকারী ঔষধ । চন্দনেব তৈল ৫—  
 ২০ মিনিম মাত্রায় মিউসিলেজ সহ দিনে ২৩ বার । জালা

নিবারণার্থ নাইকব পটাশ ও ক্যান্ফব ওয়াটার । ছুঙ্ক ও জল, স্নিঙ্ক ও শীতল পানীয়াদি সেবন । লিঙ্গোচ্ছ্বাস নিবারণার্থ ক্যান্ফব একটু বেশী মাএয় ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়ম উপকারে অণ্ড-কোষদ্বয় সম্প্রেক্ষণী বাণ্ডেজ দ্বারা উত্তোলিত বাধিবে । মূত্রমার্গ দিয়া বক্তৃতা হইতে থাকিলে শীতল জল ও বরফ সংলগ্ন করা-ইবে, সেবনার্থ ট্যানিক এসিড, হেজিলিন বা হামামেলিস না টর্পেন্টাইন অয়েল দিবে আর্গটও দেওয়া যায়

### ক্রমিক গণোরিয়া ।

স্বচ্ছ শ্লেষ্মাশ্রাব, বেদনা বা জ্বালা থাকে না । যন ঘন প্রস্রাব করিতে হয়, জিহ্বা ঘটনাব কাবণ মূত্রাণয়ের গ্রীবা ও উহার মুখ-শায়ী গ্রন্থি উগ্রতা বিটপ দেশে ( পেরিনিয়ম ) বেদনা

চিকিৎসা । বিসমথ অক্স আউক্স, গ্লিসিবিণ অক্স আং জল ও আউক্স, একত্রে মূত্রমার্গে পিচকাবী দিলে বোগোপশম হয় পূর্ববর্ণিত অগ্রান্ত ঔষধও ইহাতে প্রযোজ্য

ফস্ফবিক এসিড ও নক্লভমিকা ফস্ফেট অব্ আয়বণ ও ফস্ফবিক এসিড ১৮৭ এমোনিয়া আয়বণ এলম্ স্টীল ও ক্যান্থেনাইডিস ১৯০ । কডলিভ অয়েল, আইসোডাইড ও ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়ম, টিংচল ফেবি পাবক্লোবাইড স্তান্ডাল উড্ অয়েল অয়েল কিউবেব ~~ক্যালগাম~~ কোগোবা । কিউ-বেব চূর্ণ ও ম্যালম সাক্ষাচক ধাবনের পিচকাবি যথা- সল-ফেট অব্ জিঙ্ক ২৪৪ ম্যালম ও পদ্যাই এসিটাস ২৪৫ নাই-ট্রেট অব্ সিলভর, ক্লোরাইড অব্ জিঙ্ক ও ভূতি ~~মূহ~~ ধাবনের পিচকারী । এই রোগ পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হয় মলদ্বারে,



মূত্রাশয়ে বা উহাব সন্নিহিতে কোন প্রকার উদ্দীপনা বর্তমান থাকিলে উষ্ণ জলে স্নান, ওপিয়ম ও বেলেডোনা সপোজিটবী প্রয়োগ কর্তব্য; এবং বকু ও ইউডা অর্থাৎ ডিক্কসন সেবা। আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম, টিংচব হাঘসায়ামাস বা বেলেডোনার সঙ্গে গর্জন তৈল মিউসিলেজের সঙ্গে ত্রিফলাব জলেব পিচকারীও উপকারী।

### গনোরিয়া ইন্ ফিমেলস্।

মূত্রমার্গ, যোনিদ্বার ও তাহাব মধ্য ও জরায়ুব গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত স্থানের শৈল্পিক বিলীব তরুণ বা প্রাচীন প্রদাহ অপ-  
বিত্ত রাতক্রিয়া ও অগ্নাশ্রু কাবণেও হইয়া জন্মে, কিন্তু কি কাবণে  
বোগ উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা অনেক সময় ঠিক কবিত্তে পারা  
যায় না।

চিকিৎসা — হট্ হিপ্ বাথ, উষ্ণ জলেব ইন্জেক্সন  
মুত্ৰ বিবেচক। সংকোচক ধৌত দ্বারা গীচকারী, যথা। মলফেট  
অব্ জিঙ্ক, ক্রোবাইড অব্ জিঙ্ক, গ্যালগ, লাইকব প্রম্বাই সব  
এসিটেটস, দন্ধ ফটকিবি, কষ্টিক প্রভৃতি ট্যানিন ও এসিটেট  
অব্ লেডের পেসারী। সেবনার্থ পূর্বেক্ত ঔষধাদি ব্যবহার্য্য  
অর্থাৎ পুরুষদের রোগে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে বিবিধ এন্টি-  
সেপ্টিক লোসনের গীচকারী জরায়ু ও মূত্রাশয় পর্য্যন্ত প্রদাহ  
বিসর্পিত হইলে এণ্ডোমিট্রাইটিস ও মিট্রাইটিস রোগেব চিকিৎসা  
কবিত্তে হইবে।

### ভিজিটেসন বা ওয়ার্টস্—শিল্পে আঁচিল ।

সংকোচক ধাত, অক্সাইড অব্ জিঙ্ক, নাইটেট অব্ সিলভর, পারক্লোবাইড অব্ আয়রন, এসিটিক এসিড, শুষ্ক সলফেট অব্ জিঙ্ক, এসিড নাইটেট অব্ মার্কবী ; গ্লিসিরিন অব্ কার্বলিক এসিড প্রয়োগ, অথবা কাঁচি দ্বারা কর্তন স্থানিসিলিক এসিড কলোডিয়ন সহ স্থানিক । লাইকর আর্সেনিকেলিস তুলী দ্বারা স্থানিক প্রয়োগ ।

### একসকোরিয়েসন্—শিল্পের নিঘর্ষণ ।

শীতল বা দীর্ঘক্ষণ জলে উত্তমরূপে ধৌত করিবে। সংকোচক ধাবন, সলফেট অব্ জিঙ্ক, স্যালিস, নাইটেট অব্ সিলভর ইত্যাদি ।

### হার্পিস্ প্রিপিউসিয়েলিস ।

শিশাববক স্বক্বেব দক্ষ, ইহা আপনাপনিই প্রায় আরোগ্য হয় সেবনার্থ সিড্‌লীজ পাউডর বা সলিউশন অব্ কার্বনেট অব্ ম্যাগনিসিয়া এক মাত্রা । স্থানিক—অক্সাইড অব্ জিঙ্ক, স্যালিস লোশন অথবা সব এসিটেট অব্ লেড অয়েন্টমেন্ট । কটিকের মুহু ধাবন ।

### প্রাইমারি সিকিফিস—প্রাথমিক উপদংশ ।

ইহা ৪ প্রকার ; এক প্রকার বিশেষ বিষ ইহাতে উৎপন্ন হয় ।

ইন্ডিউরেটেড স্ফাক্স ।—এই প্রকার ক্ষতে প্রদাহ ।

কুঁচকীব গ্রন্থিবিবৃদ্ধি হয়। এই রোগেব পরিণামে সার্কাস্মিক লক্ষণাদি আবিভূত হয় দেহের মধ্য বিষ প্রবিষ্ট হওয়ার ১০ দিন হইতে ৬৭ সপ্তাহ পবে রোগ প্রকাশিত হয় ইহাতে ক্ষতেব কিনাবা ও মূলদেশ কঠিন হয় অর্থাৎ লসীকা আব বশতঃ ঐকপ শক্ত হইয়া থাকে উহা হইতে সামান্য প্রকাব আব নিঃসৃত হয় এই বোগে আক্রান্ত ব্যক্তিব শবীরে এই আবব স্পর্শসংক্রমণ শক্তি থাকে না।

চিকিৎসা।—ইহা একটা সার্কাস্মিক পীড়া। আর্জেন্টাই নাইট্রস ৫০, ২৩৬, ২৬১ ফেবি সল্ফাস সূক্ষ্ম চূর্ণ, লাইকব হাইড্রাজিবাই নাইট্রেটস ৬১, ৬৭। হাইড্রাজ অক্সিডাই কব্রাই ৬৬ লোসিয়ো নাইগ্রা ২০ ইয়ানা ওয়ান ২৪ এসিড নাইট্রিক ; আইয়োডিন ২৬, ১৭৫ বিবিধ প্রকার সংকো চক ধৌত বেদনাব আত্মগোচর ধৌত ঔষধেব সহিত ত্রিষম ও বেনেডোনা মিশ্রিত কবিয়া দিবে এবং সেবনার্থও বিধান কবিবে ইহাব সার্কাস্মিক চিকিৎসা “কনস্টিটিউসনাল সিফিলিসের” মধ্যে বর্ণিত হইল আইডোফর্ম, বোরিক এসিড সেবনার্থ গ্রে পাউডব, প্লমার্স পিল আদি মুখ না আইসে একপ পবিমাণে প্রয়োগ উপকারী। ১ গ্রেন গ্রে পাউডর ২৩ বাব ২৪ ঘণ্টায় সেব্য।

নন্ ইন্ডিউরেটেড স্কাফর।—ইহাতে যে প্রদাহ হয়, তাহাতে পুষ্টিপাদন কবে। ইহা স্থানিক পীড়া—পরে সার্কাস্মিক গৌণিক লক্ষণাদি প্রকাশিত হয় না। এব বা তদধিক ক্ষত

থাকে, কিম্বা স্পষ্ট দেখা যায় ও বোধ হয় যেন তন্তু সকল কাটিয়া ফেলিয়াছে অধিক পৰিগিত পুষ্পাব ।

চিকিৎসা — বিষ সংলগ্নেৰ পঁচ দিনেৰ মধ্যে কষ্টক দ্বাৰা পুড়াইয়া দিলে ক্ষতৰ বিষ নষ্ট হয় ইহা সাক্ষাৎক পীড়াৰ মধ্যে পৰিগণিত নহে নাইট্ৰেট অব্ সিল্ভৰ, নাইট্ৰিক এসিড, পটাশা ফিউজা, এসিড মলিউসন অব্ নাইট্ৰেট অব্ মার্কবী, মল্ফিউবিক এসিড যংন এই সকল স্থানিক ঔষোগ দিবে, তখন যাহাতে উহা সূস্থ স্থান স্পৰ্শ না কৰে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতৰ্কতা অবলম্বন কৰিবে । সংকোচক ধোত—আৰ্জেণ্টাই নাইট্ৰস ২৩৬, কুপ্ৰাই সলফাস ২৩৮, লাইকব প্লামাই সব এসিটেটস ২৪০, জিন্সাই সল্ফ ২৪২ ব্লাক ওয়াশ ২০, ইয়েলো ওয়াশ ২৪ । নাইট্ৰেট অব্ সিল্ভৰেৰ মলম ২৬১ । ক্যালোমেল অয়েণ্টমেন্ট ২৬৫ । কুইনাইন, লৌহঘটিত ঔষধ, পুষ্টিকাৰক পথা । কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে বিবেচক । কোমল ( নন্থইন্ডিউৰেটড ) উপদংশীয় ক্ষতে আইডোফৰ্মা চুৰ্ণ ছড়াইয়া দিলে ক্ষত শীঘ্ৰ আৰোগ্যগ্ৰস্থ হয় । পাব অক্সাইড অব্ হাইড্ৰোজেন ধোত দ্বাৰা ক্ষত দিনে ২৩ বাৰ ঔক্ষালন কৰিলে ও তাহাৰই দ্ৰবে লিণ্ট ভিজাইয়া ক্ষতোপরি সংস্থাপন কৰিয়া রাখিলে ক্ষত সম্ভব শুদ্ধ হইয়া যায় ।

ক্যাজিডেনিক স্মাংকৰ । — ক্ষতশীল প্ৰদাহেৰ মঞ্চে এই বোগ সমুপস্থিত হয় । ক্ষত ক্ষুদ্ৰ, উগ্র ও বিচ্ছিন্ন ; তাহা হইতে অসুস্থ পুষ্প ক্ষবিত হয় ক্ষতেৰ বিশৃঙ্খলভাবে প্ৰসাৰি হইবাব প্ৰবণতা থাকে । ইহাতে যে বাগি হয়, তাহা পাৰ্শ্ব



উঠে ও সেই পু্য কোন স্থানে লাগিলে ক্ষত হয় ইহাতে সার্কী-  
জিক লক্ষণাদি প্রকাশিত হয় না

চিকিৎসা । ফোমেন্টেশন, পুল্‌টীস সেবনার্থ পূর্ণ  
মাত্রায় অহিফেন কষ্টিক ও উদ্দীপক ঔষধ নিষিদ্ধ বেদনা-  
নিবারক, অবসাদক ও সংকোচক ধাবন মার্কিউবিয়েল  
ফিউমিগেশন ওয়ার্ম হিপ্‌ বাথ্‌ এসিড কার্বলিক ও গ্লিসিরিন  
২৮ অজুয়ে রেজিন ৬৩, ৬৪ সেবনার্থ বার্ক ও নাইট্রিক এসিড  
লৌহঘটিত বলকবোধক আইয়োডাইড অব্‌ পটাশিয়াম ও সার্সা-  
প্যারিলা পুষ্টিকাবক খাদ্য

সূক্ষিৎ স্রাংকর — ইহাতে ক্ষত শটিত অর্থাৎ পচিতে  
থাকে । ইহাতে বাগি হয় না পরিণামে সার্কীজিক উপদংশেব  
লক্ষণাদি জন্মে না স্থানিক চিকিৎসাতেই বোগ আরোগ্য  
হয় রোগ সময়ে সময়ে এমন প্রকৃতব আকার ধারণ কবে  
যে, শিশ্নমুণ্ড ও তদাচ্ছাদক চর্ম্ম এককালে বিনষ্ট হয় দুর্বল  
বেশ্যাদেব এই পীড়ায় বাহ জননেদ্রিয়ের কতক অংশ পচিয়া  
থসিয়া পড়ে

চিকিৎসা উত্তেজক ঔষধ ও পুষ্টিকাবক খাদ্য  
বেদনা নিবারণার্থ ওপিয়াম ফোমেন্টেশন, পুল্‌টীস, কার্ব-  
লিক এসিড, কডিও সলিউসন, অজুয়ে রেজিন ও টর্পেন্টাইন,  
চারকোল পুল্‌টীস কুইনাইন ও বার্ক, এমোনিয়া ও বার্ক । ক্রোবেট  
অব্‌ পটাশ ও টিংচার ফেরি পারক্লোবাইড ক্রোবেট অব্‌ পটাশ  
ধোত ২৪৩ কার্বলিক এসিড ও গ্লিসিরিন ২৮ ।

### বিউবো—বাগি ।

এক প্রকার বিশেষ বিষ শোষিত হইয়া কুঁচকীর\* গ্রন্থিকে প্রদাহিত কবে। চর্ম্মের নিম্নস্থ গ্রন্থিই আক্রান্ত হয় কখন কখন কোন বিষের আশোষণ ব্যতীতও কুঁচকীর গ্রন্থিতে বেদনা ও প্রদাহাদি হইয়া থাকে। উপদংশ, প্রমেহ, অপরিমিত রতিক্রিয়া প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে। লসীকাবাহী নাড়ীদের যে কোন কারণে উগ্রতা জন্মে, তাহাতে এই রোগ উৎপত্তি সম্ভাবনা। কোন কোন প্রকার বাগি পাকে ও কোন কোন প্রকার পাকে না।

চিকিৎসা।—স্থানিক এমোনি ক্লোবাইড ( স্পিট বোজ-মেরির সঙ্গে ), আর্জেন্টাই নাইট্রস, ক্রিয়েজোট, আইয়োডিন্ পেণ্ট, অলুয়ে হাইড্রাজ পটাসী ক্লোবাস আভ্যন্তরিক ও স্থানিক ২৪৩ ব্লিষ্টার্স, ফোমেণ্টেশন, পুলটীশ, আইয়োডাইড অর্ অর্ পটাসিয়ম অয়েন্টমেন্ট, পটাসা ফিউজা সেবনার্থ প্রথমে বিবেচক, পরে কুইনাইন ও আয়রন ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬। কডলিভর অয়েল, আইয়োডাইড অর্ পটাসিয়ম। কোনকপে না বসিলে কঠিন করিবে, তৎপরে ক্ষত শুষ্ক করণার্থ কার্বলিক এসিড আদি দিবে। আইডোফর্ম ও কলোডিয়ন স্থানিক প্রযোজ্য

### কনস্ট্রিক্টাউসনাল নিফিলিস—মার্বাসিক উপদংশ।

ইন্ডিউরেটেড বা কঠিন ক্ষতযুক্ত উপদংশ রোগের পবিণাম ফল। এই কারণে শবীবের বিবিধ প্রাচীন অসুস্থতা জন্মে। তন্নিম্ন মার্কাসিক উপদংশ বিষ বশতঃ অস্থিগীড়, চর্ম্ম দুর্দমা ক্ষত,

চর্মপীড়া, শৈশ্নিক-ঝিল্লীতে ক্ষত, ধ্বজভঙ্গ, বক্ষ্যাস্ত, গর্ভশ্রাব ও জরায়ুৰ মধ্য ঞ্গ বিনষ্ট হইয়া থাকে

লক্ষণ :—প্রথমে সার্বক্ষিক অসুস্থতা থাকে, তৎপরে জ্বর, মানসিক দুৰ্ব্বলতা, শরীরে ভাববোধ ও আলস্য, অঙ্গে বেদনা ও চর্মের বর্ণ পীত বা মলিন পীত হয় । কিছু দিন পবেই চর্ম তাম্রবর্ণ উদ্ভেদ বাহিব হয় । চর্ম ক্ষত, জাঁটিল, শৈশ্নিক ঝিল্লীতে গুটিকা ও মাংসাক্ত, চর্ম ও চর্ম নিম্নস্থ যোজক তন্তুতে অর্কুদ, কেশ পতন অর্থাৎ মস্তকে টাক পড়ে, ঞ্গ ও চক্ষুপাতাব লোম বিনষ্ট, উপদংশীয় উপতারা প্রদাহ ( আইবাই-টিস ); নখেব বিবর্ণতা ও বিনাশ বা বিদাবণ এবং তাহাদের মূলে প্রদাহ ও ক্ষত । জিহ্বা, ওষ্ঠ ও মুখগহববেব পশ্চাৎ অংশে অগভীর ক্ষত, স্বরযন্ত্রে ক্ষত ; অস্থি ও অস্থিচ্ছাদের পীড়া, বক্ষোস্থির মধ্যস্থলে বেদনা মস্তিষ্ক, কশেরুকমজ্জা, কুস্কুস, হৃৎপিণ্ড ও যকৃতাব পীড়াও এতৎ কারণে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—পথ্যার্থ লঘুপাক ও পুষ্টিকাবক ঔষ্য—ছন্ধ, কাঁচা ডিম্ব গরম কাপড় গায়ে দিবে ওয়ার্ম ওয়াটার, ভেপার বা টর্কিস বাথ । অত্যন্ত বেদনা বর্তমানে ওপিয়ম । ব্যক্তিভে নিদ্রা না হইলে বা অত্যন্ত উদ্দীপনা থাকিলে ইছাব সঙ্গে বেলেডোনা মার্কনী অঃ মাণায় অর্থাৎ মুখ না আইগে এইরূপ ভাবে দিবে ক্লুশিল, গ্রে পাউডর, ক্যালোমেল, বিন্ আইয়োডাইড, কবোসিব সলিমেট ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪০২ ৩৯৮ । মার্কিউবিষেল অমেন্টমেন্ট, মার্কিউবিষেল ভেপার বাথ । স্কনোভান্স সলিউসন ৫১০ ঘোঁটা মাণায় একটু বা ডিককঃ

সার্সাপারিলা বা অনন্তমূলেব কাথ সহ। আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম ৩৯৯, ৪০১, ৪০৬, ৪১১। আইয়োডাইড আয়রন ৪০৩। আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম ও কার্বনেট অব্ এমোনিয়া। কডলিভ অব্ অয়েল। আইয়োডাইড অব্ সোডিয়ম ও আইয়োডাইড এমোনিয়ম স্বতন্ত্র ভাবে বা পটাসিয়মেব সঙ্গে মিশাইয়া প্রযোজ্য।

### ইন্ফ্যান্টাইল সিকিলিস—সহজাত উপদংশ।

পিতামাতার শরীর হইতে উপদংশ বিষ সন্তানের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া কার্য করে শিশুসন্তান প্রথমে দেখিতে স্নায়ু থাকে, আবার কখন কখন ডাহাব চর্ম্ম অনুরঞ্জল ও মুখাকৃতি কুক্ষিত (বৃদ্ধদের গ্রাম) দেখায়। ইহাকে কন্‌জেনিটাল সিকিলিসও বলে

লক্ষণ — জন্মের এক মাসের মধ্যেই সর্দি হয় ও নাক দিয়া জলীয় স্রোতা নিঃসৃত হইতে থাকে। তৎপরে কাসি, স্তনপানে কষ্ট, মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক, শ্বস কর্কশ ও ভয়; গলা ও মুখের ভিতর অগভীর ক্ষত, মুখ, নাসা, নিতম্ব ও বাহু এবং সন্ধির সঙ্কুচিত অংশের বর্ণ তাম্রের গ্রাম; তাহা বিদারিত ও হাজিয়া যাওয়াব গ্রাম হয়। শিশুর শরীর শুষ্ক ও দুর্বল হইতে থাকে যন্ত্রের মেদাপকৃষ্টতা ও ফুসফুসে কঠিন ও বড় বড় গুটিকা। উপদংশীয় উপতাপা ওদাহ, বাধরতা। চক্ষুর কাল ক্ষেত্রে ওদাহ ও তাহাব মধ্যের তন্তু আদিতেও ওদাহ।



চিকিৎসা।—মার্কিউরিয়েল অয়েন্টমেন্ট মর্দন, গ্রে পাউডার ১ বা ২ গ্রেণ মাত্রায় অত্যন্ত শিশুদের জন্য ১—২ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ বিধেয় আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম, ক্রোবেট অব্ পটাশ সেব্য মাতার দুগ্ধ পান না করাইয়া আর এক জন স্তন্য স্ত্রীলোকের দুগ্ধ পান করাইবে অভাবে গাভী, গর্দভী ও ছাগী দুগ্ধ ব বহার্য্য শিশুর বোগ আরোগ্যকরণার্থ সময়ে সময়ে মাতাকে ঔষধ সেবন করাইবে। শিশু অত্যন্ত দুর্বল থাকিলে ক্রোবেট বা আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়মের সঙ্গে টিংচর সিনকোনা কম্পাউণ্ড মিশ্রিত করিয়া দিবে। ব্রু অয়েন্টমেন্ট (২০—৩০ গ্রেণ) একখানি ফ্রানেলে মাখাইয়া তাহা উদর বা হাটুতে বাঁধিয়া দিবে এবং প্রত্যহ নূতন করিয়া দিবে এইকপ উপায়ে বোগ সম্ববই আরোগ্য হয় স্থানিক ক্ষতাদিব জন্য অক্সাইড অব্ জিঙ্ক অয়েন্টমেন্ট, সিট্রিন অয়েন্টমেন্ট ৬০ গ্রেণ, মোমেব মলম ১ আউন্স দৈনন্দিন জলে শিশুকে স্নান করাইবে

### সিফিলিফোবিয়া—উপদংশাতক্ষ।

উপদংশ হওয়ার ভয়, কিন্তু উক্ত পীড়া জন্মিবার কোন চিহ্ন না হইলেও রোগী ওজ্জ্বল মাতিশয় আশঙ্কিত হয় ও পীড়ার কাল্পনিক লক্ষণাদি ভাঙ্গিয়া

লক্ষণ।—অত্যন্ত মানসিক ক্লেশ, মার্কাসিক স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং উপদংশ বিষয় ভেদজ সেবনার্থ মাতিশয় ইচ্ছা কাল্পনিক শুক্রমেহ ও ধবজভঙ্গের অনুরূপ লক্ষণাদি ইহাতেও হয়

চিকিৎসা।—জিঙ্ক ও স্ট্রীকনিয়া ২০৫। কুইনাইন ও

নকুসভমিকা ১৯৫ লৌহঘটিত ঔষধ ১৭২, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৮৭, ১৮৮। কডলিভ অব্ অয়েল, হাইপোফস্ফাইট অব্ মোডা। ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়াম স্কিফ ও জেনসিয়ান বা কোমাসিয়া ১৯৭, ১৯৮। পুষ্টিকারক খাদ্য, ঈষদ্রব্য বা শীতল জলে স্নান, ব্যায়াম, বায়ু পরিবর্তন।

### ডিজিজেস্ অব্ দি নৰ্ভস্ সিস্টেম— স্নায়ুগুণের পীড়া।

একিউট এনকেফেলাইটিস—তরুন মস্তিষ্ক প্রদাহ

মস্তিষ্ক ও উহার পর্দার প্রদাহের পরিমাণ ও বিস্তৃতি অনুসারে জীবিতাবস্থায় অল্পধিক বিমিশ্রিত লক্ষণাদি প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পবে পর্দাতে রক্ত সঞ্চয়, তৎসঙ্গে লসীকা, বক্তরস বা পুথ ক্ষরিত দৃষ্ট হয় মস্তিষ্ক রক্তপূর্ণ, আক্রান্ত অংশ মলিন রক্তবর্ণ থাকে এবং সময়ে সময়ে মস্তিষ্ক কোমল বা তাহাতে পুয়োৎপত্তি হয়।

লক্ষণ।—প্রাথমিক চিহ্নের মধ্যে জ্বর, বিবসিয়া, বমন, তীব্র শিরোবেদনা; তীক্ষ্ণ, কঠিন ও বিশৃঙ্খল নাড়ী; কোষ্ঠ-বদ্ধ, আদৌক ও শব্দাসহতা; জাগরণশীলতা; যন্ত্রণাসূচক দৃষ্টি বা অপ্রকৃষ্টতা; চক্ষু জলপূর্ণ, চিন্তা শক্তির বিশৃঙ্খলা বা প্রলাপ। মস্তিষ্ক বিদীর্ণ আক্রান্ত হইলে এই সকল লক্ষণ সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় তৎপরে ১২ ঘণ্টা হইতে ২ দিন পরে বোগেবদ্বিতীয়া-বস্থা আরম্ভ হয় হিমাবস্থা, অচেতনতা, শব্দ অস্পষ্ট বা বাক্য কণনে কষ্ট, দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি অপ্রবল; কনীনিকা আল্পিনের

শায় সংকুচিত হওত পরে প্রসাবিত হয় তির্ধ্যাক দৃষ্টি ও অক্ষিপুটের পেশীবর্গের পক্ষাঘাত, পৈশিক আকৃঞ্চন, মৃতবৎ মুখাকৃতি, দন্ত ও মাড়িতে মদ্যসঞ্চয়, শীতল ঘর্ম, সংকোচক পেশী সকলের শিথিলতা, খেঁচুণী, পক্ষাঘাত এবং সম্পূর্ণ জ্ঞান-হীনতা। তৎপরে বোগীব মৃত্যু হয়। কখন কখন প্রাথমিক লক্ষণের মধ্যে হঠাৎ বিকম্প বা খেঁচুনি আবস্ত হয়, তদবসানে রোগী সংজ্ঞাহীন হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় কিম্বা খেঁচুণী ঘন ঘন হইতে থাকে ও ২৪ ঘণ্টা পরে বোগী সংজ্ঞান হয়। যখন মাস্তিক পদার্থ আক্রান্ত হয়, তখন প্রায়ই বিবগিয়া ও বমন সহ; এবং যখন মিলী আক্রান্ত হয়, তখন খেঁচুণী হইয়া বোগ প্রকাশিত হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কখন কখন ২৩ সপ্তাহ পর্যন্ত বোগী বোগ ভোগ কবিয়া পঞ্চম প্রাপ্ত হয়।

চিকিৎসা। উগ বিরেচক ক্যালোমেল ও জেলাপ সেবন কবাইয়া তাহার তিন ঘণ্টা পরে ম্যাগ্না সলফ মিশ্র ৩৩১, ৩৩৪ কম্পাউণ্ড ডিকক্সন অব্‌ স্যাডোজ ৩২৭ ক্রোটন অয়েল ৩২৮, ৩৪৬ সিডলিজ পাউডর ৩৫৩ অয়েল বিসিনি ও টর্পেন্টাইনের পিচকাবী ৩৬০ লাইকব এমোনিয়া এসি-টেটাস ও ভাইনম এন্টিমোনিয়েলিস মিশ্র ২৮৩ লাইকব এমোনিয়া এসিটেটাস ও একোনাইট ২৮৮ মস্তক মুগুন কবাইয়া মস্তকে শৈত্য প্রয়োগ ১১৯ কেবল শীতল জল, বরফ, ভিনি গার মিশ্রিত জলও ব্যবহার্য। গাড়ুব নলের দ্বারা উচ্চ হইতে জল ধারা (ডুন্) ব্যবহার কব যাইতে পারে। ইহাতে হৃদম্য প্রলাপাদিও নিবাবিত হয় সেবনার্থ আইয়োডাইড অব্‌ পটা-সিয়াম এই রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ৩—৮ গ্রেন মাত্রায় ৪।৬

থন্টাস্তব । এন্টিপাইরিণ ও একমালজিন সেবনে মাস্তিক বেদনা উপশমিত হয় । ব্রোমাইড ও বেলেডোনা বেদনা উপশমেব পর নিজার জন্ত সল্ফোনাল প্রযোজ্য । আক্ষেপে পটান ও এমন ব্রোমাইড । বমনে বয়ফথও চুষিতে দিবে । আইমোডাইড অব পটাসিয়ম বলকাবক বা উত্তেজক ঔষধের সঙ্গেও দেওয়া যায় । হিমাক্সেব সময়ে উত্তেজক অর্থাৎ এমোনিয়া, ইথর, মদ, ব্রাণ্ডি, বিফটি প্রভৃতি প্রযোজ্য । ছগ্ন, কাঁচা ডিম্ব, মাংসেব ঝোল পথ্যার্থ । মার্কবী ব্যবহাবে বিশেষ উপকাব হয় । বাহ্যিক ব্লু অয়েন্টমেন্ট ।

পূর্বে এই বোগেব চিকিৎসায় রক্তমোক্ষণ, ব্রিষ্টাব, উগ্র-বিনেচক, ডিজিটেলিস, ক্যালোমেল ও অন্যান্য প্রকার মার্কবী প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এক্ষণে উক্তরূপ চিকিৎসা প্রণালী প্রায়ই অবলম্বিত হয় না ।

### সিম্পল মিনিজাইটিস ।

স্বল্পষ্ট কারণ ব্যতীত স্যারকনইড ও পায়ামেটার কিণ্ডীর প্রদাহ, কখন পতন বা আঘাত অথবা বর্ণ ও নাসা বোগের প্রসাধন বা সূর্যোত্তাপে ভ্রমণ বশতঃ জন্মে । উপদংশবিষ ও বাত রোগও ইহার অন্ততম কারণ ।

লক্ষণ । জ্বর, মস্তকে তীব্র বেদনা ; উগ্রতা ও তৎসঙ্গে প্রবল প্রণাপ । মতত মুখমণ্ডল আরক্তিম, তৎপবে পাণ্ডুর । নাড়ী দ্রুত । পৈশিক আকুঞ্চন, অবসন্নতা ও জ্ঞান-হীনতা ।

মস্তিষ্কের কুজ প্রদেশস্থিত কিণ্ডীর প্রদাহে—প্রথমে শীত বা বালকদেব আক্ষেপ । তৎপবে চর্ম উষ্ণ ও শুষ্ক, নাড়ী কঠিন



ও দ্রুত ; কোষ্ঠবদ্ধ তীব্র শিবোবেদনা, শব্দে বা সঞ্চালনে বৃদ্ধি মুখমণ্ডল পর্যায়ক্রমে আবণ্ডিত ও পাণ্ডুবর্ণ চক্ষুর ধ্বংস বক্তবর্ণ, চক্ষু জনপূর্ণ, এবদৃষ্টি সশব্দ ও প্রবল প্রলাপ প্রথমেই আবন্ত হয় সাতিশয অস্থিরতা, পৈশিক আশ্রয়, তির্যক দৃষ্টি, বমন তিন বা চারি দিন পবে জ্বর কমে । — নাড়ী অবসন্ন, জিহ্বা ধূসবর্ণ ও শুষ্ক, উদ্দীপনা হ্রাস এবং জ্ঞান-হীনতা হয় সাতিশয অবসন্নতা বোগ আনোণ্যোগ্য হইলে অল্পে অল্পে উপকার হইতে থাকে

মস্তিষ্ক প্রথম বিঘ্নী ( ডিউকামেটাব ) আক্রান্ত হইবার কারণ — আঘাত, করোটীক পীড়া, বর্ণ ও নাসিকার পীড়া

চিকিৎসা — ইহার চিকিৎসা পূর্নবর্ণিত নোংগের লক্ষ্য আঘাত বশতঃ হইলে ও চতুর্দ্বার্ষ্যে ক্ষীণ ৭ দি থাকিলে অল্প দ্বারা তৎস্থান চিবিয়া দেওয়া আবশ্যক খেঁচুনীতে ব্রোমাইড অব পটা-সিয়াম বিশেষ উপকারী

### টুবরকিউলার মিনিউলাইটিস ।

পাঁচ বৎসরের নানবয়স্ক বালকদের সাধারণতঃ হয় প্রধানতঃ গণ্ডমালা ধাতুপ্রযুক্তি বালকদের এই বোগ জন্মে মস্তিষ্ক ও তৎসংশ্লীষে গুটিকা সঞ্চিত হইয়া তাহার প্রদাহিত হয় । পূর্বে এই রোগকে একিউট হাইড্রোসেলোস বসিত

লক্ষণ — বিবিধ ও অনিশ্চিত ইহা তিন অবস্থা — যথা ১ম অবস্থা — পনিপোষ্য চিয়ার ব্যাঘাত জন্মিবাব জন্মাদি গণ্ডমালা প্রকৃতিব চিহ্ন শুষ্ক কাসি, উগতা, শব্দ ও আনোকাশ-লতা, শিবোবেদনা এবং নিমোঘূর্ণন মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের অন্ত্য

দক্ষণ ; জ্বরের প্রকোপ ও বিবাম, পবিবর্তনশীল শ্বাস, জিহ্বা মলা-  
বৃত্ত, শ্বাস দুর্গন্ধ, বমন ও কোষ্ঠবদ্ধ শিশুবা তজ্জাপুক্ত অথচ অস্থির ;  
দন্ত কিড়মিড ও মূহু শ্ববে ক্রন্দন কবে , ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠে  
ও চীৎকার কবিয়া কাঁদে , প্রায়ই প্রলাপ বকে ৪ ৫ দিন পবে  
বোগ দ্বিতীয়াবস্থায় উপনীত হয় । বালক নিগুঢ় থাকিতে ইচ্ছা  
প্রকাশ কবে । মুখাকৃতি পর্যায়ক্রমে আবক্ষিম ও পাণ্ডুবর্ণ এবং  
যজ্ঞণাবাঞ্জল চক্ষু নিম্নগিত ও জ্র কুঞ্চিত কথা কহিতে  
পাবিলে বোগী নিবোধেদনা, ক্লাস্তি ও অনিদ্রাব অনুযোগ কবে  
নাড়ী অনিয়মিত, ক্রততাব হ্রাস অর্থাৎ মিনিটে ১২০ হইতে ৮০  
বাব স্পন্দিত হয় বক্ষণাদি অন কালের ভগ্ন উপশমিত হয়  
তৎপবে অচেতনতা ও মস্তকেব গুৰতা সমুপস্থিত হয় তিষ্ঠাব  
দৃষ্টি, বোগী সংজ্ঞা-শূণ্য, নাসিকা ও ওষ্ঠ চুলকাইতে থাকে, কিন্তু  
তৎসময় হস্তেব অঙ্গুলি কাঁপে খেঁচুনী, পক্ষাঘাত মলমূত্র  
অজ্ঞাতসাবে নির্গত হয়

এক বা দুই সপ্তাহ পবে তৃতীয় অবস্থা উপস্থিত হয় তৎসময়  
তজ্জা উপস্থিত হওত শ্রগাচ অচেতনাবস্থা জন্মে নাড়ী অত্যন্ত  
দুর্বল ও ক্ষীণ, শাখা সকল শীতল ও দেহে শীতল ঘর্ষ নিঃসৃত হয়  
পক্ষাঘাত ও সম্ভবতঃ খেঁচুনী উপস্থিত হয় ও তৎপবে মৃত্যু হয়

পূর্ণবয়স্কদেব এই বোগেব পূর্বে ফুসফুস পীড়া বর্তমান থাকে ।  
বমন সহ বক্ষণাদি ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়

চিকিৎসা। —এই বোগেব চিকিৎসাস অবসাদক উপায়  
অবলম্বন কবা উপকারী নহে আবশ্যক হইলে জলোকা দ্বাবা  
রক্তমোক্ষণ । বিনেচক কম্পাউণ্ড জেলাপ বা রিউবার্ব পাউ-  
ডর ; সিঙ্কীজ পাউডর, মলফেট অব ম্যাগ্নেসিয়া পডোফিলিন

পিল, ৩৪৭    আইয়োডাইড অব্‌ পটাশিয়াম অর্ক্‌ হইতে ৩৪ গ্রেণ  
মাত্রায় ৪৬ ঘণ্টান্তর    মস্তকে শৈত্যপয়োগ ১১৯    বালাকেব  
দন্তোদ্ভেদ কালে এই বোগ হইলে মাড়ি চিবিয়া দিবে । দুর্বলতাব  
লক্ষণ প্রকাশিত হইলে বলকাবক ও উত্তেজক ঔষধ    পোর্টওয়াইন  
জলের সঙ্গে, বিস্‌টি অথবা স্পিবিট এমোনিয়া য়াবোমেটীক, মিনা-  
বেল এসিড্‌স, ইথর, মস্ক প্রভৃতি    কেহ কেহ এই বোগে মার্কবী  
ব্যবহার করেন    কডলিভ অয়েল, হাইপো ফস্‌ফাইট অব্‌ লাইম  
ও সোডাও উপকারী    টার্টার এমিটিক অয়েন্টমেন্ট মস্তকোপবি  
মর্দনে প্রত্যাগতা সাধিত হতে উপকার দর্শে    নিদ্রাব জগ্‌ সল্‌ফো-  
জাল ও বেদনা নিবারণার্থ    এন্টিপাইবিণ ও ব্রোমাইড প্রয়োজ্য  
ট্রিবায়েল মর্টুইড    মস্তকে ববফ বা শৈত্যলব ধাবন    পথ্যার্থ বরফ  
সংযুক্ত দুগ্ধ

### সেরিলাইটিস

খিলী ব্যতীত মাস্তিক পদার্থের আংশিক প্রদাহ    কদা-  
চিৎ হয়

লক্ষণ ।—মস্তকেব অভ্যন্তরে গভীর ও স্থায়ী বেদনা,  
সার্বাঙ্গিক অসুস্থতা ও বমন    দর্শন ও শ্রবণ শক্তির অপ-  
কৃষ্টতা, মনোভাবের বিশৃঙ্খলা, স্বর শক্তির অভাব, আশ্বেষ,  
পক্ষাঘাত ও চেতনাভাব    ইহাতে কেবল মাস্তিক পদার্থ  
প্রদাহিত হয় ।

চিকিৎসা ।—এন্‌কেফেলাইটিস বোগেব জ্ঞান

## ক্লিনিক এনকেফেলাইটিস ।

তরুণ প্রোদাহিত ২৮ ব' অপ.াপ'নি স্বাবীনভাবে সংপৃষ্ঠিত  
হইতে পারে

লক্ষণ নানা প্রকার লক্ষণ জনো উদ্গাদবোৎসব  
জারন্তেব লক্ষণাদিব সহিত ইহাব সাদৃশ্য আছে সাতিনাম মান-  
সিক উদ্দীপনা বা অবসন্নতা মানসিক প্রোতাবণা বা মিথ্যা  
বিশ্বাস কথা কহিতে অনিচ্ছা পকাশ বা তোতলা কথা কোন  
কোন পেনী শক্ত । সাগান্ত নিবোবেদনা, ক্ষুধাভাব, কোষ্ঠ বদ্ধ  
নাভী-স্পন্দনের বিন্ধ্যনা তৎপবে লক্ষণাদি স্পষ্ট প্রকাশিত  
হয় ; স্মরণশক্তিব হানি, বাহ্যেজ্জিষেব ক্রিয়ার ব্যাঘাত ; পক্ষাঘাত,  
সার্বাস্থিক স্বাস্থ্যের হানি বোগ কয়েক মাস বা বৎসব পর্যন্ত  
থাকিতে পারে

চিকিৎসা । — যখন যেকপ লক্ষণাদি উপস্থিত হয়, তখন  
তাহার উপশমের চেষ্টা করিবে সার্বাস্থিক স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল  
থাকে, তদুপায় অবলম্বন কর্তব্য দুগ্ধ পথ্য দিবে । কর্ণের পশ্চাতে  
বাবন্ধাব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্লিষ্টাব দিবে, মস্তকেব কেশ কামাইয়া আইয়ো-  
ডাইড অব্ মার্করী অয়েন্টমেন্ট মর্দন করিবে কোষ্ঠ পবিদ্ধাব  
বাখিবে জীলোক বোগী হইলে জবাযুব ক্রিয়া যাহাতে স্পৃহা-  
ভাবে সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া কর্তব্য । শয্যাগতের  
সস্তাবনা হইলে “ওয়াটব বেডে” শয়ন করাইবে । কডলিভের  
অয়েল ও পুষ্টিকব খাদ্য ব্যবহাবেও উপকার হয় ।



## সফ্নিং অব্‌ ড্রেন ।

মস্তিষ্কে স্থায়ী বেদনা, আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী নিরোবর্ণন  
বুদ্ধিবৃত্তির হ্রাস, প্রশ্লেব উত্তর প্রদানে ক্রেশবোধ, অপ্রাফুল্লতা ও  
অবনাদ, কোন কারণে উত্তেজিত হইলে অশ্রুস্রাব । অঙ্গাদিতে  
বেদনা বা অবশতা ও আক্ষেপ আহারাঙ্তে নিদ্রালুতা শ্রবণ  
ও দর্শন শক্তির অগ্নাধিক অপকৃতা প্রাদাহিক কোমলতাতে  
শিবোবেদনা অত্যন্ত তীব্র হয় অঙ্গাদিতে বেদনাবিশিষ্ট আক্ষেপ  
ও আকুঞ্চন, পক্ষাঘাত সহ আক্ষেপ এক বা উভয় শাখার  
( হস্তপদ ) সংকোচক পেশী সকল আকুঞ্চিত ভাবে থাকে ।  
মার্কাস্ট্রিক বোধশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ প্রাদাহিক বা অপ্রাদাহিক  
রোগেব দ্বিতীয় অবস্থায় কোন বিশেষ অঙ্গে পক্ষাঘাত বা দেহেব  
অর্দ্ধপার্শ্বিক পক্ষাঘাত সহসা উপস্থিত হয়, কিন্তু জ্ঞানের কোন  
বৈলক্ষণ্য হয় না সহজেই বোগী আত্মজ্ঞান বিবহিত হয় ; কোন  
কথার উত্তর প্রদানে কষ্ট অনুভব করে দৌর্বল্য, দুর্বল ও  
পর্যায়শীল নাড়ী বমন ও কোষ্ঠবদ্ধ প্রস্রাব ভাগে কষ্ট ।  
মল অর্নৈচ্ছিক ভাবে নিঃসৃত শ্বাসকষ্ট ও মশল শ্বাস, তৎপবে  
অচেতনতা ও অবশেষে মৃত্যু ৫০ বৎসর বয়ঃক্রমের পর এই  
বোগ অতি সাধাবৎ ।

চিকিৎসা ।—সাধাবৎ শ্রান্ত্য যাহাতে উন্নত হয়, তৎপক্ষে  
বিহিত চেষ্টা করা কর্তব্য পুষ্টিকাবক ও লঘুপাক পথ্য । প্রত্যাহ  
বিগুণ বায়ুতে অন্ন অন্ন ভ্রমণ করা উচিত, কিন্তু ক্লান্তি বোধ না হয়,  
তজ্জন্ত সাবধান থাকিবে কোষ্ঠ পরিষ্কার করণার্থ মৃদু বিরেচক ;  
অনিদ্রা ও উদ্দীপনা বর্জ্যমানে ক্লোবাল, সল্‌ফোন্‌চাল, ইণ্ডিয়ান হেম্প  
বা ব্রোমাইড অব্‌ পটাশিয়ম সেবনার্থ বিধান করিবে অঙ্গাদি

পক্ষাঘাতাক্রান্ত হইলে ফসফরস, ক্রীকনিয়া জিঙ্ক ও আইয়োডাইড অব পটাসিয়ম আদি প্রয়োজ্য কঙ্কালভন্ন অয়েল, মাংস, ডিম্ব ও মাখম ব্যবস্থায়

### টিউমার অব ব্রেন ।

লক্ষণাদি প্রায়ই অস্পষ্ট থাকে। সচরাচর নিরোবেদনা, বমন, নিরোষুর্গন, মানসিক অবসন্নতা ও বুদ্ধি বিশৃঙ্খলা, আংশিক পক্ষাঘাত ও আপস্মানিক আক্ষেপ প্রকাশ পায় ।

চিকিৎসা। — আইয়োডাইড অব পটাসিয়ম ও মার্করী । উপদংশজাত অর্কুদ ভিন্নও অগ্নাত প্রকার অর্কুদে আইয়োডাইড অব পটাসিয়ম বিশেষ উপকারী । উপদংশীয় অর্কুদে উক্ত ঔষধে উপকার না হইলে পারদঘটিত ঔষধ ব্যবহার্য্য

### ক্রমিক হাইড্রোকেফেলস ।

বালকদেবই সচরাচর এই রোগ হয় । অনেক সময় ইহা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই হয় এবং কখন কখন মস্তিষ্কের গঠনবিকৃতি বশতঃ জন্মিতে পারে । কখন ট্রান্সকিউলাব মিনিজ্জাইটীসের পূর্বে বা কখন পরে এই রোগ প্রকাশিত হয় । মস্তকের আকার বদ্ধিত হয় । তরল পদার্থের চাপ ও যুগ্ম অসংযুগ্ম সেবনী বিচ্ছিন্ন হইতে পারে । এক দিক অধিক বড় হয় । অস্থিসকল পাতলা ও স্বচ্ছ হয় । মস্তিষ্কবিদ্যুৎ পুরু ব্যাটারেল ভেন্ট্রিকুলে সিরম বা সস্ত সঞ্চিত হইয়া উহাকে অত্যন্ত প্রসারিত করে । ২৩ আউন্স হইতে ২৩ পাইন্ট পর্য্যন্ত তরল পদার্থ সঞ্চিত হইয়া থাকে

লক্ষণ — শিশুদেব ছয় মাস বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই বোগ আরম্ভ হয় বা জন্মাবধিও থাকিতে পারে শিশু আগ্রহ সহকারে আহাব কবে বটে, কিন্তু তাহার শরীর বর্ধিত হয় না কয়েক সপ্তাহ পরে শরীর শীর্ণ হইতে থাকে। মস্তক বড়, মুখ মণ্ডল ছোট থাকে। মস্তক একদিকে অবনত হইয়া পড়ে বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষীণ, উগ্রতা ও খিটখিটে স্বভাব, আলোক ও শব্দে বোধাতীশয়া আশ্মারিক ভাঞ্জেপেব প্রবণতা; সাতিশয় পৈশিক দুর্বলতা। চক্ষুগোলকের ঘূর্ণায়মান গতি, তির্যক দৃষ্টি বা দৃষ্টিলোপ। শিরঃপিণ্ডা বিবমিয়া, কোষ্ঠবদ্ধ বা কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধ মল। দন্ত কিড়মিড় করে, জাগিলে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে দ্বিতীয়াবস্থায় চৈতন্যহানি, পাণ্ডুরতা, নাড়ী মুহু, কণীনিকা পেশ্যবিত বা সংকুচিত, নাসা ও ওষ্ঠ কণ্ডয়ন বা খোটা আবোগা হওয়াব উপযুক্ত বোগে ক্রমশঃ চৈতন্যহীনতা, পাণ্ডুরতা ও উগ্রতা তীব্রোহিত হয় ক্ষুধাবোধ, পৈশিক শক্তির বৃদ্ধি, শীর্ণতার ভ্রাস বা বিবাম। সাংঘাতিক বোগে সাতিশয় অবসন্নতা ও নাড়ীর ক্রততা ও পক্ষাঘাত সমুপস্থিত হয় অবশেষে অচৈতন্যাবস্থা বা খেঁচুনি প্রাপ্ত হইয়া রোগী মানবলীলা সম্বরণ করে।

চিকিৎসা — মুহু বিবেচক, পুষ্টিকারক পত্রা, কড লিভর অয়েল, গ্লিসিবিং আইগোডাঠড অব জায়বন। গ্রে পাউডার বা ক্যারোলেস মিক গোল হইলে জর্দ গোল মাত্রায় দিনে ২ বার সেব্য ও নু অয়েন্টমেন্ট মস্তকে মর্দন কর্তব্য। মুত্রকারক—এসিটেট অব পটাস, টিংচর অব স্কুইচ কুইনাইন অল্প মাত্রায়। এডিসিও পিষ্টন দ্বারা ২ স্তকে চাপ প্রয়োগ।



সল্ট ওয়াটার বাথ, সমুদ্রতীরে বাস। হাইপোকফাইট অব্, সোডা বা লাইম অথবা ক্রোবেট অব্, পটাশ ও টিংচব অব্, ঈল সেবনে উপকার দর্শিতে পারে।

## গ্যাপোপ্লেক্সী ও সেরিব্রাল হেমরেজ ।

( সংশ্রাস ও মস্তিষ্কে রক্তস্রাব )

এক প্রকার অচেতনাবস্থা, মস্তিষ্ক চাপিত হইলে হঠাৎ ও কাশিত হয়। স্পর্শবোধ, চিন্তাক্রি ও ত্রৈচ্ছিক সম্বন্ধ ক্ষমতা সহসা বিনষ্ট হয়, তৎসঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাস ও রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার অল্প বা অধিক প্রবল বিশৃঙ্খলা জন্মে।

লক্ষণ ।—রোগাক্রমণের পূর্ববর্তী লক্ষণ শিরোবেদনা ও শিবোঘূর্ণন—মস্তক অবনত করিলে বিশেষরূপে অনুভূত হয়। মস্তকে পূর্ণতা ও ভারবোধ, কর্ণনির্নাদ, ক্ষণস্থায়ী বধিবতা ও অন্ধতা বা কখন কখন দ্বিদৃষ্টি, পুনঃ পুনঃ নাসাব্যব্রাব, বিবগিয়া, কখন কখন অঙ্গে অবশতা বোধ, শ্ববণশক্তি বিনষ্ট, সাত্ত্বিয় মানসিক অবসন্নতা, অসম্বন্ধ বাক্যকথন, তন্দ্রা, অস্পষ্ট উচ্চারণ এবং অঙ্গের, মুখমণ্ডলের শৈথিল্য বা অক্ষিপুটেন আংশিক পক্ষাঘাত।

সংশ্রাস প্রবণ ব্যক্তি—যাহাদেব পিতা পিতামহেব এই গীড়া ছিল, যাহারা আলস্য পববণ এবং পুষ্টিকর ও উষ্ণ মশলাবিশিষ্ট দ্রব্য অবিরত আহার করে, যাহাদেব উদর মেদবিশিষ্ট, মস্তক বৃহৎ, মুখমণ্ডল আরক্রিম, ত্রীবা ছোট ও পুরু এবং বয়ঃক্রম অধিক। মূত্রগহ্বর গীড়া, হৃৎপিণ্ড বা রক্তাধায়েব গীড়া, অপরিমিত স্নানাপান এবং অত্যন্ত ব্যব্রাবাদিব অববোধও ইহাব কারণ মধ্যে পরিগণিত

রোগাবশ্যকালীন চিহ্ন—রোগাবশ্য কয়েক ঘণ্টা হইতে কয়েক দিবস পর্য্যন্ত থাকিতে পারে সম্পূর্ণ জ্ঞানহীনতা, নাড়ী প্রথমে সাধাবণতঃ ক্ষুদ্র থাকিয়া পবে পুষ্ট হয় স্বাভাবিকাবস্থা অপেক্ষা নাড়ীর গতি মৃদু এবং কখন বা অনিয়মিত হয় শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া অদ্ভুত ও ক্লেশকর, প্রায়ই সমক অর্থাৎ ঘড় ঘড় শব্দবিশিষ্ট হয় মুখ দিয়া গাঁজলা বাহির হয়। অশুভ-ফলপ্রসূ রোগে বোগীব সর্ব শরীর শীতল শ্বেদাভিযুক্ত হয়। মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু অনুজ্জল ও ক্ষটিকাও এবং তৎসঙ্গে এক বা দুই দিকেব চক্ষু তাবা প্রসারিত গিলন শক্তির হানি বা ব্যাঘাত। কোষ্ঠবদ্ধ বা অট্টৈচ্ছিক ভাবে মলনিঃসরণ। অট্টৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ বা মূত্রাবরোধ, যতক্ষণ মূত্রাশয় পরিপূর্ণ না হয়; তৎপরে ফোটা ফোটা মূত্র নিঃসরণ হইতে থাকে যখন রোগী অসম্পূর্ণভাবে আরোগ্যলাভ কবে, তখন অজ্ঞাধিক পক্ষাঘাত প্রায়ই অবশিষ্ট থাকে

প্রকারভেদ—অচেতনতাবস্থা নিম্নলিখিত ত্রিবিধ উপায়ে পর্য্যবসিত হয় ইহা ক্রমশঃ তিবোহিত হওয়ায় বোগী স্তম্ভ বোধ কবে বা ইহাব অসম্পূর্ণ তিবোধান হওয়ায় মন বিকৃত ও শরীরের কোন কোন অংশে পক্ষাঘাত হয় বা অচেতনতাবস্থা মৃত্যুতে পরিণত হইতে পারে। যেযোক্ত প্রকারে রোগ পর্য্যবসিত হইলে মাস্তক পরীক্ষায় কখন কখন উহাব কোন পীড়া দৃষ্ট হয় না বা কখন উহাতে রক্ত সঞ্চিত হইয়া থাকিতে দেখা যায়। রক্ত-সঞ্চয়েব স্থান—ভেন্ট্রিকেলস্, পস্ভেবোলাই বা ম্যাকনইড বিটীব মধ্য বা নিম্নে

রোগাক্রমণ—প্রথম প্রকারে বোগী সহসা ভূমিতে পতিত

হয়, তৎকালে স্পর্শবোধ ও সঞ্চলনশক্তি এককালে থাকে না। প্রগাঢ় নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির গায় বেগী পড়িয়া থাকে। মুখ-মণ্ডল প্রধানতঃ আরক্তিম, শ্বাস সন্দ্ব ; নাড়ী পুষ্ট ও অদ্ভুত। কখন কখন খেচুনী বা অঙ্গের বা শরীরেব একদিকেব পেশীর আকুঞ্চন বা কাঠিষ্ঠ থাকে।

দ্বিতীয় প্রকারে প্রথমে অচেতন অবস্থা হয় না। বোগী মস্তকের মধ্যে আকস্মিক বেদনাব অনুরোধ করে। পাণ্ডুতা, বমন ও মূর্ছা, কখন কখন বমন মূর্ছাপন্ন হইয়া বোগী ভূমিতে নিপতিত হয় না, কিন্তু আকস্মিক বেদনা সহ সামান্য ও ক্ষণস্থায়ী জ্ঞানহীনতা জন্মে। কয়েক ঘণ্টা পবেও নিবঃপীড়া থাকে, বোগী ক্লিষ্ট ও ভ্রমযুক্ত হয় এবং তদনন্তর ক্রমশঃ সম্পূর্ণ অচেতন হইয়া পড়ে। ইহা হইতে প্রায়ই আরোগ্য হইতে দেখা যায় না। মস্তিষ্কাভ্যন্তরে বক্তৃতাও জমিয়া থাকিতে দেখা যায়।

তৃতীয় প্রকারে মস্তিষ্কাভ্যন্তরে রক্তস্রাবের লক্ষণাদি সহ পীড়া প্রকাশিত হয়। শরীরেব একপার্শ্বিক পক্ষাঘাত। কখন কখন বাকুশক্তি বিনষ্ট ; কিন্তু জ্ঞানের কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। অচেতনাবস্থা উপস্থিত হয় অথবা ক্রমশঃ বোগোপশম বা রোগী পঞ্চস্থ প্রাপ্ত হয়।

চিকিৎসা। — ইহার চিকিৎসা দ্বিবিধ, ১ম প্রতিষেধক, অর্থাৎ যাহাতে রোগ উপস্থিত না হয়, তজ্জন্ত উপায়াবলম্বন ; ২য় রোগাক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসা যাহাদের এই রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা, তাহাদের পক্ষে অধিক শারীরিক শ্রম, অধিক স্ত্রী-সহবাস, মদ্যপান, অধিকক্ষণ মস্তক অবনত করিয়া থাকা, অধিক উষ্ণতা বা শৈত্য সংস্পর্শ, অত্যন্ত মানসিক শ্রম

ইত্যাদি কবা উচিত নহে মস্তক শীতল জল দ্বারা ধোও ও  
মৃদু রেচক ব্যবহার কবা উচিত বঞ্ছনীয়তা থাকিলে অল্প মায়ায়  
লৌহঘটিক ঔষধ সেব্য বোগাক্রমণেব পৰ অনেক বঞ্ছমোক্ষণ  
কবাব পরামর্শ দেন, কিন্তু বর্তমানকালে উহা প্রায় কবা হয়  
না উগ্রবিরেচক—গ্যালোজ ৩৩৫, ৩৪০ ; কলোসিঙ্ক ৩৪১,  
৩৪২, ৩৪৫ ; অয়েল কোটন ৩২৮, ৩৪৬ ; ক্যানোমেল ৩৫১,  
৩৫২, সলফেট অব্ ম্যাগনিসিয়া ৩৩১, ৩৩৪ গলাধঃকরণেব  
ক্ষমতা না থাকিলে কোটন অয়েল ১ বা ২৩ ফোঁট জিহ্বাব  
পশ্চাৎগে লাগাইয়া দিবে ; উত্তেজক পীচকারী ৮১, ৮৩, ৩৬০ ।  
মর্টার্ড পেডিলিউভিয়া, ডজ্জার ও গ্রীবার পশ্চাতে মর্টার্ড পাঠিব ।  
প্রশ্রাব অবরুদ্ধ থাকিলে মূত্রমার্গে শলাকা (ক্যাথিটার) দিয়া প্রশ্রাব  
কবাইবে কেহ কেহ বমনকারক ঔষধ দিতে বলেন মস্তকে  
বরফ ও শীতল জল প্রয়োগ অতীব হিতকর পুষ্টিকারক পথ্য  
ও দুগ্ধ ইত্যাদি দিবে

অধিকাংশ স্থলে মস্তিষ্কভ্যন্তরে বক্ত্র প্রাবিত হয় বোণীকে  
স্থিতিরভাবে রাখিবে, নাড়াচাড়া কবিবে না । মস্তক ও গ্রীবা  
উন্নত ভাবে রাখিবে মস্তকে বরফ ভরোব পটী বা আইস  
ব্যাগ দিবে আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম উপকারী । কেহ কেহ  
আইয়োডাইডেব ব্রোমাইড সঙ্গে প্রয়োগ করিতে বলেন ।

### কন্কসন্ অব্ ত্রোণ ।

বাহ্যিক আঘাত হইতে মস্তিষ্ক আলোড়িত হয় ঠহাতে  
মূর্ছা, বমন, জ্ঞানহীনতা ও পৈশিকশক্তি বিনষ্ট হয় । বোণী  
বখন বখন শীঘ্র ও কখন বা কয়েক ঘণ্টা পবে সজ্ঞান হয় ও



মুহু বোধ কবে অথবা সহসা বা কয়েক দিনান্তে কালক্রমে পতিত হয় । মৃত্যুর পরে মস্তিষ্কে কোন বোগ-চিহ্ন দৃষ্ট হয় না । বিস্তৃত কখন কখন মস্তিষ্কের কোন অংশ বিচ্ছিন্ন বা সংঘর্ষিত কোমলতা দেখা যায় ।

লক্ষণ ।—মস্তিষ্ক আঘাতের পৰিমাণের তারতম্যানুসারে লক্ষণের নানাধিক্য হয় । অভিঘাত বা শব্দ সামান্য প্রকার হইলে রোগী শীঘ্রই জ্ঞানলাভ কবে মনোভাবের বিশৃঙ্খলা, মূর্ছা, বমন, শীত, তজ্জালুতা ও কর্ণে শব্দ হয় । প্রবল প্রকার অভিঘাতে রোগী অধিকক্ষণ অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া থাকে, যেন প্রগাঢ় নিদ্রাভিভূত আছে বলিয়া বোধ হয় । আলোকেও কনোনিকা বোধহীন থাকে গাত্র শীতল ও পাণ্ডুর, পেশী সকল শিথিল, নাতী ক্ষীণ, দ্বার সংকোচক, পেশী সকল শিথিল, শ্বাস প্রশ্বাস হইতেছে বলিয়া অনুভব করিতে পারা যায় না । কিছুকাল পরে রোগী আংশিক উপশম লাভ কবে, তখন চিন্তাশক্তি বিশৃঙ্খল, বাক্য উচ্চারণ স্পষ্টরূপে কবিত্তে অক্ষমতা, সদা সর্বদা প্রবন বমন সময়ে সময়ে এক বা অপব শাখা পক্ষাঘাতাক্রান্ত সাংঘাতিক রোগে রোগী ভূমিতে পতিত হইয়া সেই স্থানেই মৃত্যু-কবলিত হয় ।

চিকিৎসা ।—রোগীকে নিস্তর ও শান্তভাবে রাখিবে । মস্তক বালিশের উপর রাখিয়া শীতল জল, বরফ বা নৈত্যাম্রাদি দিবে, ১১৯, ১২০ । জিহবার উপরে ২৩ খোটা কোটন অবেরা অনেক সময় মৃদু উত্তেজকও আবশ্যিক হয় । কখন কখন অল্প মাত্রায় ত্রাণ্ডি ও জল দিবে । শরীরের উত্তাপ সংরক্ষার্থ গায়ে কম্বল দিবে এবং উষ্ণ জলপূর্ণ বোতল সংলগ্ন রাখিবে । বোগে-



উগ্রতা নিবারণের পব মানসিক শ্রমবিরতি, অনুভূতক খাদ্য ও সময়ে সময়ে মৃদুবেচক ঔষধ আবশ্যক ।

লো।

কবার

সন্শ্লেীক—অর্কাদাত ।

না ইহা সংক্রাসেব সদৃশ পীড, গ্রীষ্মপধান দেই প্রায় জনো ।  
৩৪২ এতদেশে বোদ্রেব উত্তাপ যখন অত্যন্ত অধিক হয়, তখন ইউ-  
বোপীয় মৈনিকগণেব এই বোগ হইতে দেখা যায়

লক্ষণ —প্রধানতঃ মূর্ছা, তৃষ্ণা, চর্ম ও অতিশয় উষ্ণ, শ্বাসপ্রাণের বিলোপ শিথিলতা ও বক্ষ টান বোধ ।  
নাড়ী সময়ে সময়ে পূর্ণ ও দ্রুত ; এবং সময়ে সময়ে এত ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র যে, সহজে অনুভব করিতে পাওয়া যায় না বোগ বৃদ্ধির সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া প্রবলতর হয় ; বোগীকে জাগাইতে পাওয়া যায় না মুখমণ্ডল পাণ্ডুর ; বমন হইয়া বোগী সম্পূর্ণ অচেতন হয় । সে সময়ও চর্ম উষ্ণ থাকে, শ্বাসকৃচ্ছ, কনীনিকা মস্কৃতি, তৎসঙ্গে চক্ষুতে রক্তাধিক্য, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অনিয়মিত মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে কনীনিব প্রসারিত হয় মা তপয় ঋণকৃচ্ছ, বমন কোন কোন বোগীর লক্ষণাদি স্পষ্টভাবে উপস্থিত হয় না । সময়ে সময়ে সূর্যে ব প্রথমে উত্তাপে প্রমত্তেব পব বোগী সহসা অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পতিত হয় ও এক বা দুই দীর দীর্ঘ শ্বাস ভাগ কবত মৃত্যুপ্রাপ্তে নিপতিত হইয়া থাকে । বোগ আবেগোন্মুখ হইলে নিঃশব্দেব বিশৃঙ্খলা, অবিরাগ অব, দুঃসুখীয় উপসর্গ, আংকি পক্ষাঘাত বা সাতিশয় অবসন্নতা হেতু সম্পূর্ণ শাস্থ্যলাভ করিতে বিলম্ব হয় চর্ম শীতল ও জর্জর না হওয়া

পর্যন্ত বিপদের আশঙ্কা থাকে আরোগ্যের কয়েক মাস পরে পক্ষাঘাত বা উন্মাদেব লক্ষণাদি সমুৎপন্ন হইতে পারে ।

চিকিৎসা — মস্তক, গ্রীবা ও বক্ষে শীতল জলধারা, মস্তকে শীতল জলসেচন ও ববফের থলি । মস্তক ও সমস্ত শরীর ববফ দ্বারা মর্দন পশ্চাদ্গ্রীবা দেশে ব্লিষ্টার নামাবন্ধে, এমোনিয়ার ভ্রাণ দিবে যদি স্থূপিশ্বেব ক্রিয়া স্থগিত হওয়া বশতঃ উত্তেজক প্রয়োজন হয়, তবে এমোনিয়া ও ব্রাণ্ডি আদি দিবে শাখাদ্বয়ে অর্থাৎ হস্তপদে মর্টার্ড পুলটিস ও টর্পেন্টাইন্ টিউপ্ । চা সেবনে কখন কখন উপকার দর্শে । উত্তেজক পীচকাবী—৮৩, ৩৬০ পৃষ্ঠবংশে ববফের থলী সংস্থাপন । ইহার প্রতিষেধক চিকিৎসা—প্রত্যহ প্রাতে শীতল জলে স্নান, মাদক দ্রব্য সেবন পরিত্যাগ ; জল, চা, লিমনেড ও অন্যান্য প্রকার পানীয় ; বীতিমত সময়ে আহার ; রৌদ্রে বাহির হওয়ার সময় মস্তক আর্জি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে ও মস্তকে ছত্র দিবে । মস্তক-ঘূর্ণনাদি উপস্থিত হইলে মস্তকে শীতল জল দিবে ও ছায়ায় শয়ন করিবে । শ্বাসাববোধের উপক্রম হইলে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস করান উচিত আক্ষেপ উপস্থিত হইলে নাইটেট্ অব্ এমিল বা ক্লোবোফর্ম্ আঞ্জাৎ ব্যবহার্য্য মলদ্বাবে ববফ মিশ্রিত শীতল জলের পীচকাবি

য়্যাফেসিয়া ও য়্যাগ্নিসিয়া ।

( বাক্শক্তি ও শ্রবণশক্তির অভাব । )

মস্তিষ্কেব বিকার বশতঃ বাক্শক্তি ও শ্রুতিশক্তির নিলোপ লেখা বা সংকেত দ্বাৰাও রোগী মনোভাব প্রকাশে অসমর্থ

হয় ; শব্দ মনে থাকে না এই রোগ কখন কখন কেবল ক্ষণস্থায়ী হয় যেক্রপে প্রবল জ্বাভ্রের দুর্বলানস্থায়ী জন্মে ; তৎকালে ইহা মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য বশতঃ উৎপন্ন হয় মস্তিষ্কের কোমলতা ব্যাধি বা মস্তিষ্কে বক্তপ্রাণ বশতঃ এই পীড়া চিরস্থায়ী হইতে পারে দক্ষিণ দিকের অর্দ্ধাঙ্গ-পক্ষাঘাতেব সঙ্গে সাধাবণতঃ এই রোগ জন্মিয়া থাকে এই বোগের সঙ্গে সংন্যাস উৎপত্তিও প্রবণতা থাকে

লক্ষণ ।—হঠাৎ বাকশক্তির অভাব, সম্ভবতঃ অল্প কাল পরে ২১টী শব্দ উচ্চারণ ক্ষমতা জন্মে যাহা জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহাতেই বোগী কেবল সেই কথা কয়টী বলে মুখাকৃতি বুদ্ধি পরিচায়ক, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও শ্ববযন্ত্রের সম্বলন ও কৃতিত্ব থাকে বোগীব যাহা বলিবার ইচ্ছা, তাহা বেষ্ম বুদ্ধিতে পাবে, কিন্তু বাক্য, সংকেত বা লেখা দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতে পাবে না এই প্রকার বোগী যদিও দ্রব্যাদির নাম উচ্চারণ করিতে পাবে না, কিন্তু তাহাদেব ব্যবহার সমাক্রুপে বুদ্ধিতে ও কবিত্তে পারে

চিকিৎসা ।—মস্তিষ্কের বিকার বশতঃ এই বোগ উৎপন্ন হয় রোগী মানসিক ভাব লেখা, কথা বা ভাবভঙ্গী দ্বারাও প্রকাশ করিতে পাবে না এই বোগের সঙ্গে অর্দ্ধাঙ্গ-পক্ষাঘাত না থাকিলে রোগ সম্ভব আবেগা হইতে পারে পক্ষাঘাত সংসৃষ্ট বোগে ঔষধ দ্বাব প্রায় উপকার দর্শে না, কিন্তু উপদংশ-বিষোদ্ধৃত বোগে আইয়োডাইড্ অব্ পটাসিয়ম ও করসিব্ সল্লিমেট—৩৯৯, ৪০১, ৩৯৮ কডলিভর অয়েল, হাইপোফস্ফাইট অব্ সোডা ও বার্ক পক্ষাঘাতেব চিকিৎসা দৃষ্টব্য

### ডিলিরিয়ম—ট্রিমেন্স—গদাত্যয ।

স্বরাপান দ্বারা শরীর বিযাক্ত হইয়া এই বোগ জন্মে ।  
 ত্রমাসিক প্রলাপ, ভীতি, হস্তপদের পেশীর কম্পন, দুর্বলতা  
 ও আগরণশীলতা । প্রলাপ আরম্ভের ৪৮ হইতে ৭২ ঘণ্টা  
 পরে বোগোপশমকর নিজা আবিভূত হইয়া বোগ পর্য্য-  
 বসিত হয় ।

লক্ষণ . অনিদ্রা, ক্ষুধাভাব, বিবমিষা, কোষ্ঠবদ্ধ । অবিরত  
 ও অপ্রবল প্রলাপ—উহা রাত্রি সমাগমে বন্ধিত হয় সদা-  
 সর্বদা বাক্যকথন বা বিড় বিড় কবিয়া বকা সদাসর্বদা হস্ত  
 কাঁপা ও মুখমণ্ডলের পেশীতে আকস্মিক আকুঞ্চন হয় । দৃষ্টি  
 ও শ্রবণ শক্তির বিভ্রম সকলের প্রতি সন্দেহ বা ভয় ।  
 রোগী একপ বিশ্বাস হয় যে, শয্যাব নিম্নে বা দ্বারের নিকটে  
 কোন অপরিচিত লোক উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান আছে । মানসিক  
 ও শারীরিক অবসন্নতা । সাধাবণতঃ উত্তেজিত ও ব্যগ্র প্রকৃতি  
 প্রবলতর বোগে মূত্র সলফেট ও যুবিয়াব বৃদ্ধি এবং ফস্ফেটের  
 হ্রাস হয় । ফ্রিনাইটিস বা মস্তিষ্ক প্রদাহে ফস্ফেটের বৃদ্ধি হয় ।  
 আরোগ্যোন্মুখে বোগে উপশমকর নিজা উপস্থিত হইয়া  
 ১২ ঘণ্টা বা তদপেক্ষা অধিকক্ষণ থাকে তাহা হইতে জাগরিত  
 হইবার পর বোগী স্বেচ্ছ বোধ করে, কিন্তু তাহার শরীর দুর্বল  
 থাকে । সাংঘাতিক বোগে অবিরত জাগরণশীলতা থাকে, বিড়  
 বিড় কবিয়া প্রলাপ বকে । বগুরাক্ষেপ বসন্তঃ হস্ত পদ বক্র  
 হইয়া আইসে । অবসন্নতা, শীর্ণতা, অচেতন বা খেঁচুনি  
 বা সাংঘাতিক মূর্ছা ও হইতে ৭ দিনের মধ্যে সাধাবণতঃ রোগীর  
 মৃত্যু হয় ।



চিকিৎসা । টাটার এমিটিক ও অহিফেন সেবনে উন্মত্ততা ও অনিদ্রা নিবারিত হইতে পাবে ক্যাপসিকম চূর্ণ ২০ ৩০ গ্রেণ মাত্রায় মধুর সহিত একত্রে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে নিদ্রা সমুপস্থিত হইতে পাবে সময় সময় প্রলাপ হইতে থাকিলে হায়সায়ামাস ব্যবহার্য্য । অস্থিরতা নিবারণ ও নিদ্রাকরণার্থ ওপিয়ম, মর্ফিয়া ৮৮, ৯৮, ১০৩, ১০৫, ১৩৫, ১৩৯ । উত্তেজক দেওয়া যাইতে পারে । রোগী যেকণ মদ্যপানে অভ্যস্ত, তাহা অল্প অল্প পরিমাণে দিবে । সকল রোগীকেই উহা দেওয়া কর্তব্য নহে । বরফ, স্ট্রালাইন ঔষধ, সিডলীজ পাউডর, সোডা এসিড, ছন্ধ, কঁচা ডিম্ব, বিফুটি ইত্যাদি পথ্য । ওয়েটসিট প্যাকিং, সহস্র ধাবায় স্নান । ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়ম্ ও হাইড্রেট ক্লোরাল পূর্ণ মাত্রায় । আবশ্যক মত উত্তেজক । ক্লোরোফর্ম দ্বারা প্রলাপাদি নিবারিত হইত পারে । সল্ কিউটানিয়স ইন্জেকসন্ অব্ মর্ফিয়া । নিদ্রাকরণার্থ সল্ফোনাল প্রযোজ্য । টিংচর ডিজিটেলিস অর্ধ আউন্স এক মাত্রা ব আবশ্যক হইলে ৪ ঘণ্টা পরে আর এক মাত্রা

### ডিপ্সোমেনিয়া—স্বরাপান-পিপাসা ।

স্বরাপানে সান্ত্বনয় ইচ্ছা, তৎসঙ্গে সার্বাস্থিক অবসন্নতা ও অস্থিরতা অধিক মাত্রায় স্বরাপান বশতঃ স্নায়ুকেন্দ্রের কার্য্য, শ্বাসযন্ত্রের রক্তাধিক্য ; যকৃতের মেদোপকৃষ্টতা ; পাকশায়ের প্রাচীরের প্রাচীন প্রদাহ ও বিধান পুর ; হৃৎপিণ্ড ও মূত্রগহ্বর

বিধানগত পীড়া, যকৃতের কাঠিগ্র ও ক্রাস, উদবী ও সঙটিক রোগ সমুস্থিত হইতে পাবে ।

চিকিৎসা ।—আহারের পূর্বে লাইকর আর্সেনিকেলিস ১ ফোটা সেবন কবিলে ক্রেশকর বমন নিবারিত হয় অধিক মাত্রায় ক্যাপসিকম আহারের পূর্বে বা সুরাপান ইচ্ছা যখন বলবতী হয়, তখন সেবা ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়ম ও আর্সেনিক, তিক্ত ফাণ্ট সহ সেবন করাইলে সুরাপানের অভ্যাস নিবারিত হইতে পারে । মাদক পানীয় এককালীন নিষিদ্ধ । হেনবেন, হপ বা অল্প মাত্রায় ওপিয়ম দ্বারা অনিদ্রা নিবারণ করা কর্তব্য । বার্ক ও মিনাবেল এসিড্‌স—১৬৯, ১৭০ ; কুইনাইন—১৯৩, ১৯৪ । কুইনাইন ও নক্স-ভমিকা ১৯৫ ফস্ফেট অব্ আয়রন—১৮৭, ২০৭ । ফস্ফেট অব্ জিঙ্ক । অক্সাইড অব্ জিঙ্ক । হাইপোফস্ফাইট অব্ সোডা ও লাইম । পেপ্সিন ৪১৭ । এমোনিয়া ও বার্ক—১৮৩ । কুইনাইন ও সাইট্রেট অব্ আয়রন—১৭৩, ১৭৪ । জিন্সাই তেলিরিয়ানাস—১৯৮ । ফিরম্ রিডক্টম—২০৪ ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়ম, ৪০৮, ৪০৯ দুগ্ধ, সোডাওয়াটার, সিবপ অব্ লিমন বা অবৈজ্য ত্রাণ্ডি না দিয়া এমোনিয়া, ইণ্ডার প্রভৃতি উত্তেজক দিবে ।

## ইন্স্থানিটী—উন্মাদ, বাতুল ।

ইহাতে মনোব শ্রাব্যিক অবস্থার বৈলক্ষণ্য জন্মে । তদ্বৎ বিবেচনা শক্তিও যথোচিত ভাবে থাকে না ।

লক্ষণ । --রোগ প্রকাশের কয়েক মাস পূর্বেই মাস্তিষ্ক

বিকার লক্ষণ সমুপস্থিত হয় । মস্তিষ্কের অসুস্থতা সহসা উপস্থিত হয় না । প্রথমাবস্থায় চিকিৎসার্থ যত্ন না কবিলে নোংরা ছুরারোগ্য হইয়া উঠে । প্রবল শিরঃপীড়া, শিবোঘ্নন ও মানসিক বিশৃঙ্খলা, উগ্রতাব প্রকোপ, বিশেষতঃ উপযুক্ত কাৰণ অভাবে মানসিক সুস্থিবতার বিনাশ, অভ্যস্ত কর্ম কবিত্তে বিবাগ, জীবন ক্লান্তিবোধ, অনিদ্রা বা জড়তা, স্মৃতিশক্তির অভাব বা হানি, বাহ্য কর্ণে বক্তাবর্কদ, বাক্য উচ্চারণ অসম্পূর্ণ, দৃষ্টির অস্পষ্টতা, একত্রে ভাব বোগী যে প্রকৃতিস্থ নহে, তাহা নিজেই বুঝিতে পারে এবং পূর্বপরিচিৎ বন্ধুদেব সঙ্গ পরিত্যাগ করে তল্লীল ও ধর্মবিরুদ্ধ চিন্তা মনোমধ্যে উদ্ভিত হওয়ায় যন্ত্রণাভব করে । ভয়ঙ্কর স্বপ্নদর্শন অগ্নিম ন্য বা অজীর্ণ বোগে আক্রান্ত হয়

উন্মাদেব আনুযজিক বোগেব মধ্যে সার্বাস্থিক প্রক্ষাঘাত ও মৃগী বোগ প্রধান উন্মাদ রোগ কয়েক প্রকার আছে, নিয়ে তাহাদেব উল্লেখ কবা গেল ।

মেনিয়া—প্রবল উন্মাদ —ইহাতে রোগী অতিশয় প্রলাপ বকে হিতাহিত বিবেচনা শক্তি যদিও এককালে বিনষ্ট হয় না, কিন্তু উহার বিশৃঙ্খলা সমুৎপাদিত হইয়া থাকে মনেব মধ্যে নানা প্রকার লমায়ক, অসম্ভব ও পবিবর্তনশীল ভাবোদয় হইতে থাকে প্রকৃতি উগ্র ও ভয়ঙ্কর হয় । কদাচিৎ এই বোগ সহসা উপশম হয়, কিন্তু অন্ত্য প্রকার বাতুলতা অপেক্ষ ইহা অনেক সময় আকস্মিকভাবে সমুপস্থিত হইতে দেখা যায় ইহান পূর্বকপ-পবিবাব আদি ও কার্যের প্রতি তাচ্ছিল্য ; আত্মীয় স্বজনগণেব প্রতি অবিশ্বাস । বিনা কাৰণে ক্রোধ ও নিবাগ ভাব অনিদ্রা-সাধারণ প্রলাপ ও মতি-

শয় মানসিক বিশৃঙ্খলাসহ বোগ প্রকাশিত হয় আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্তি । চৌৎকাব, হাঙ্গু আদি অধিকক্ষণ স্থায়ী । ভয়ঙ্কর ক্রোধ ও অনিষ্টকর ভাবে মঞ্চবণ । দৌর্জল্য, অবসন্নতা ও শীর্ণতা । নিদ্রাব অভাব, খাদ্যে অনিচ্ছা । মূত্রধারণাক্ষমতা । রোগাবোগ্যেব পূর্বে নিদ্রা, আহারে ইচ্ছা এবং তৎসঙ্গে প্রলাপ ও মানসিক বিশৃঙ্খলার ক্রমশঃ ত্রিবোধান

মনোমেনিয়া—আংশিক উন্মাদ —এই প্রকার বোগে বুদ্ধিবৃত্তি আংশিক বিশৃঙ্খল হয় বা রোগী কোন প্রকার বিভ্রম কর্তৃক আক্রান্ত হয় । মনোবিকার এক বিষয়ে আবদ্ধ থাকে মন দৃঢ়, মনোভাব অল্প, এমাত্মক ও স্থির ; কিন্তু তাহা শাসনাধীন থাকে না । প্রকৃতি প্রবল মনোভাবের অনুরূপ হয় । রোগী যে বিভ্রম কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহার সত্যতা প্রতিপাদনার্থ নানা প্রকার তর্ক ও যুক্তি প্রদর্শন কবে । এইরূপ বোগার মধ্যে কেহ কেহ মনে কবে যে, তাহার দেহ ক্ষটিক দ্বারা নির্মিত এবং এইরূপ ভাব মনে দৃঢ়ীভূত হওয়ায় বিশেষ সতর্কতা সহকারে চলে অর্থাৎ যেন কোনরূপ আঘাতাদি লাগিলে ভগ্ন হইয়া যাইবে । আংশিক প্রলাপ ব্যতীত অগ্ৰাণু বিষয়ে এইরূপ ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ লোকের জ্ঞায় কার্য্য কবে । তন্মধ্যে এই প্রকার রোগ নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত কঠিন । এক প্রকার বোগে বোগী নিত্যন্ত বিষন্ন, ভীত বা নিরাশ হয় এবং মঞ্চবণ, ভ্রমণ, বাক্য কথন বা আহাব আদি করিতে অনিচ্ছুক থাকে । ইহাকে মেলান্-কোলিয়া বা বিয়াদবাথ কহে । আত্মহত্যা করিতে প্রবল ইচ্ছাবিশিষ্ট রোগকে অটোফোমেনিয়া এবং নরহত্যা করান প্রবল ইচ্ছাবিশিষ্ট বোগকে ম্যাট্রোফোমেনিয়া বলে । গৃহাদিতে অগ্নি দেওয়ার



প্রবল ইচ্ছাবিশিষ্ট বোগবে পাইরোমেনিয়া, এবং চুম্বি কবিত্তে ছদ্মগনীয় ইচ্ছা বিদ্যমান থাকা বোগকে প্লেপ্টোমেনিয়া বলে। এইরূপ অন্যান্য প্রকার বাতুলতাও আছে। স্মীলোকদিগেব যামোমাদকে নিম্ফোমেনিয়া ও পুৎযদিগের তজ্জপ বোগকে স্তাটিন্‌ ব্রায়েসিস কহে।

ডিমেন্সিয়া—বুদ্ধিহীনতা।—এই প্রকার বোগে জ্ঞানস্বাৎ বা বয়ঃক্রম হেতু বুদ্ধিবৃত্তির দুর্বলতা জন্মে। মন ক্ষীণ, মনোভাব বিশৃঙ্খল, অসম্বন্ধ ও পবিত্বজনীন স্মৃতিশক্তির বিশেষ হানি। কিছু দর্শন বা শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাত্‌ ভুলিয় যায়। প্রকৃতি অস্থির, বাণকবৎ ও সবল ইহাদেব কোন ‘বয়ঃ ৩ গুণাগ বা স্থগ’ থাকে না’ মধ্য মধ্য অস্থিরতা ও উগ্রতার প্রকোপ হয়। মূলাশয় ও মনাশয় আয়ত্ত থাকে না। রোগেব শেষাবস্থায় সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত সমুপস্থিত হয়।

ইডিয়োসি বা ড়বৎ নির্বোধতা।—বুদ্ধিবৃত্তির আংশিক বা অসম্পূর্ণ অভাব—মস্তিষ্কেব ঘঠনের অসম্পূর্ণতাজনিত। জন্মাবধিই এই বোগ জন্মে। মনোবৃত্তি বিবদ্ধিত হয় না। মনোভাব সামান্য প্রকার ও অল্প থাকে। প্রকৃতি নির্বোধবৎ সামান্যিক ও ক্ষণস্থায়ী ক্রোধ। শূন্য মুখাকৃতি, বাহ্যকর্ণের সন্নিকটে স্তম্ভাকর্ষদ বাকোচ্চারণ ও পদসঞ্চারণ অসম্পূর্ণ। সময়ে সময়ে এই প্রকার বোগ অন্ধ, বন্ধি ও মূক হইয়া থাকে।

চিকিৎসা —যাক্‌টিয়া বোসমোজা—গর্ভাবস্থায় বা প্রসবান্তের উদ্ভাদ বোগে বিশেষ উপকারী। স্রোমাইড্‌ অব্‌ পটা, সিয়ম ৬০ গ্রাং ও টিংচব ক্যানেবিস ১ ডান একত্র সেবন করিলে উদ্ভাদ বোগ উপশান্ত হইতে পারে। বোপীকে উক্ত জন্মেব

টবে বসাইয়া মস্তকেব নীতল জলধাৱা দিবে। কোনিয়ম জুস ; ও প্রবল সপৰ্যায় ৰোগে হায়মায়াগাস মন স্থিৰ, ব্যৰসা পৰিবৰ্তন, নিয়মিত নিদ্ৰা, চন্দ্ৰ, যকুৎ, মূত্রগ্রাহ ও ভগ্নবহা নালীৰ ক্ৰিয়াৰ স্মৃষ্ণতা সম্পাদন। মস্তিষ্কেব কোন বিশেষ পীড়া বৰ্ত্তমান না থাকিলে মৰ্ফিয়া ও একট্ৰাঃ ওপিথম অথবা হেম্প, হায়মায়াগাস, হোমোনিয়ম ও কোবোফৰ্ম প্রভৃতি দ্বাৰা স্নায়ুগুণেব উদ্দীপনা শাস্তি কৰিবাব চেষ্টা কৰিবে। টিংচৰ ডিজিটেলিচ ৩০ মিনিম ৮ ঘণ্টান্তৰ দৌৰ্জ্বল্য থাকিলে কুইনাইন ও আয়ৰণ— ১৭২, ১৭৬, ফস্কেট অব্ জিঙ্ক ও নক্সমিকা, হাইপো ফস্ফাইট অব্ সোড ; কড্‌লিভৰ অয়েল প্ৰভৃতি দিবে পুষ্টিকাৰক খাদ্য, বায়ু পৰিবৰ্তন নিজাকৰণাৰ্থ ক্লোৰাল, ৪২৪ ; বেলেডোনা ১০১ ; ব্ৰোমাইড অব্ পটাশিয়ম ও মল্‌ফোনাৰ ও প্যাৰলডি-হাইড কোষ্ঠ পৰিষ্কাৰ কৰণাৰ্থ বিবেচক ও অন্যান্য যন্ত্ৰাদিৰ ক্ৰিয়াৰ স্মৃষ্ণতা সম্পাদনাৰ্থ তত্পৰবোণী ঔষধ পৰ্যোজ্য সহস্ৰ-ধাৰা ও নীতল জলে স্নান মৰ্ফিয়া বা এটোপিনেব মৰ্কিউ-টিনিয়ম ইন্‌জেক্‌চন ওয়েটশিট প্যাকিং, টৰ্কিশ বাথ বোণী যাহাতে চিকিৎসকৰে বিশ্বাস কৰে, তত্পায় চেষ্টা কৰিবে ৰোগীকে মৃদুভাবে শাসনাৰ্থ কৰা কৰ্তব্য, কোন প্ৰকাৰ শাৰী-ৱিক দণ্ড দেওয়া উচিত নহে

পিউয়াবপ্যাৰল মেনিয়া — বোণিগীৰ শাৰীৱিক \* জি সংবক্ষণ এবং মস্তিষ্ক ও স্নায়ুগুণেব উদ্দীপনা নিবাবণ কৰা আবশ্যক প্ৰথম উদ্ভাৱনাৰ্থ উত্তেজক, বলকাৰক ঔষধ ও পুষ্টিকৰ খাদ্য প্ৰয়োজন এমোনিয়া ও বার্ক, ১৮৩ কুইনাইন ও ফস্ফরিক এনিড কড্‌লিভৰ অয়েল ৪১০, মাংসেব

যুগ ও মন্য মস্তিষ্কেব উদ্দীপনা নিবাবণার্থ একষ্ট্রাক্ট ইয়ামো-  
নিয়ম—১০৬ ; একষ্ট্রাক্ট ওপিয়ম ১০৩ , ক্যান্ধব ও হায়সায়ামাস  
বা বেলেডোনা ; ক্লোবাল, ৪২৪ । মর্ফিয়া ও ইণ্ডিয়ান হেম্প—  
৮৮ । ব্রোগাইড্ অব্ পটাসিয়ম ৪০৮, ৪০৯ ; মর্ফিয়াব অধস্তাচ  
পিচকাবী কোষ্টবক্ক থাকিলে অল্প মাএয় ক্যান্ধব অয়েল ;  
কনফেবান অব্ সেনা ৩৫৬ , পডফিলিন গীল, ৩৬৭ হায়সিনের  
অবস্তাচ প্রক্ষেপ  $\frac{1}{4}$  গ্রৈণ মাএা, ইহাতে স্ননিজ্জা হইয়া রোগোপ-  
শমেব সাহায্য হয় ।

### হেড্যাক—শিরঃপীড়া ।

বিবিধ তরুণ ও প্রাচীন বোগেব সঙ্গে সমুপস্থিত হইয়া থাকে ।  
বালক ও বৃদ্ধ অপেক্ষা পূর্ণবয়স্কদেব এই বোগ অধিক হয় পল্লী-  
গ্রাম অপেক্ষা নগরবাসীরা এবং দৃঢ় ও বর্জিত লোকোপেক্ষা ক্ষীণ  
ও স্নায়ুপ্রধান ব্যক্তিরা এবং নিম্ন শ্রেণীব লোক অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর  
লোকেবা এই বোগ দ্বাবা অধিক আক্রান্ত হয় ।

এই বোগ প্রধানতঃ ৪ প্রকাব

১ । অর্গানিক হেড্যাক বা যান্ত্রিক শিরঃপীড়া —মস্তিষ্ক বা  
তৎসংশ্লিষ্ট পীড়ার প্রথমাবস্থায় এই প্রকাব শিরোবেদনা জন্মে ।  
ইহাব সঙ্গে শিরোঘূর্ণন, কখন কখন বমন, মানসিক বিবৃজালা  
ও কর্ণনির্নাদ থাকে বেদনা—ভীক্ষ বা অপ্রবল বা ছুটিকা-  
বেধবৎ বা দব্দবে , মস্তিষ্ক অপেক্ষা বিস্তারিত পীড়ায় বেদন প্রবল-  
তর হয় প্রদাহজনিত বেদনা সাতিশয় তীব্র ও তাহা উত্তাপ,  
শব্দ বা নড়িতে চড়িতে বৃদ্ধি পায় এবং মস্তক উত্তোলনে ক্লান্ত

হয়। স্থাপিণ্ডেব কণাটেব পীড়ায়, স্নায়ুগুণ্ডেব রক্ত প্রাণিব  
ব্যাঘাত জন্মিবায় শিবোবেদনা উৎপন্ন হয়

২ প্লেথবিক হেড্যাক বা রক্তাধিক্যজ শিবঃপীড়া।—মস্তি-  
ষ্কের রক্তাধাৰে বক্তাধিকা হওয়া বশতঃ এই রোগেব উৎপত্তি  
হয়। কর্ণে নাড়ীন্দ্রনের স্থায় দব্দব বোধ, মস্তক অবনত  
কবিলে শিবোঘূর্ণন, কোষ্ঠবদ্ধ যে সকল ব্যক্তি অপবিমিত পান  
ভোজন করে, অথচ যথোচিত শ্রম বা ব্যায়াম করে না এবং  
অধিক বেলায় নিদ্রা হইতে জাগবিত হয়, তাহাদেব প্রায়ই এই-  
রূপ শিবঃপীড়া জনে। অভ্যস্ত আব (খতু আদি) অবকদ্ধ হইলে  
ইহা সমুপস্থিত হয়

৩ বিলিমস হেড্যাক—ঐপদিক শিবঃপীড়া।—কখন কখন  
স্থায়ী বা কখন অবিরত থাকে ক্ষণস্থায়ী বেদনা জাহানেব  
দোষ বা অপবিমিততা আদি হইতে জনে মদ্যপান বশতঃও  
এই বোগেব উৎপত্তি হইয়া থাকে। বাণিতে ভানরূপ নিদ্র না  
হইলে প্রাতঃকালে বেদনা প্রবল হয়। কারণ তিরোহিত হইলে  
রোগও আনোগ্য হয়। বাঃপীড়া ও অগ্নিমান্দ্যএস্ত ব্যক্তিদেব  
সততই এই বোগ জন্ম। ইহাকে সিক্‌হেড্যাকও বলে। পাক-  
শয ও ক্ষুদ্রাঙ্গেব প্রথমাংগেব ত্রিমা-বিশৃঙ্খলা, মনোবৃত্তি হ্রাস,  
দুর্গন্ধ ধাস, উদবাগান, বিষঃতা ও বিবমিষা যক্কা হব ক্রিসা  
কসন্যাক্ ভাবন সম্পাদিত হয়। মন মৃত্তিকাবর্ণ, মুত্র বহু ও  
বক্তবর্ণ

৪। নর্ভস হেড্যাক। ম মবীয় শিবঃপীড়া। সাধাবণঃ দুর্কলতা  
ও অবসন্নতা হইতে জনে মূলপ্রাণিব পীড়া বশতঃ বক্তেব  
অপকৃষ্টতা ও রক্তাধাবাদি ইহাব কারণ। ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তেব উদী-



পনাও ইহার একটি কারণ হেমিজেনিগা বা অর্ধপার্শ্বিক শিবঃপীড়া পর্যায়ক্রমে হয় অর্থাৎ একবার উপশমিত হইয়া পুনরায় হয় সম্ভাবনকে অধিক স্তম্ভপান করান বশতঃ জীলোক-দেব এক প্রকার শিবঃপীড়া জন্মে গুল্মবায়ু প্রদান জীলোক-দেব বেদনা মস্তকের উপরে এক স্থানে তাবদ্ধ থাকে ও তৎস্থান লৌহশলাকা দ্বারা বিদ্ধ হইতেছে বোধ হয়, ইহাকে ক্লেভস্ হিষ্টিরক্‌স্ বলে ।

চিকিৎসা। ব্যাক্টিয়া বেমিমোজা, সায়বীয় শিরো-বেদনায় প্রযোজ্য; বিশেষতঃ গুল্মবায়ু প্রদান জীলোকদেব ঋতুকালে পীড়া হইলে ইহা বিশেষ উপকারী। বেলেডোনা টিংচর ও ষ্ট্রনিম ম্যাগ্না তিন বটীক সেবনে, পাকায়ন বা জবাবুক বিগ্ৰহা তিনিত চসুগোব ও পাক বেদনা উপশমিত হয়। গডি-কে তন ও ক্য ফক একত্রে স্থানিক বস্ত্রঃ অভাব বা আবির্ভাব বশতঃ বোগ জন্মিত হইয়াছে অব্ এমোনিমম। সমুখ কপা-লেব বেদনায় ইথর স্রো প্রযোজ্য উষ্ণ জলক্ষেদ ও পদে উষ্ণ জলসেচন মস্তকে বনঃপূর্ণ থালা সংস্থাপনে উপকার হয়। পাতলা মল নিঃসরণযুক্ত উদরার্চনে মাজ্জৈতিক শিবঃপীড়া মিলিত থাতিলে বাহকোবাইড অব্ মার্ভারী এবং গেগেব শতাংশেব এবং ১০০ দিবসে তিনবার সেবন করিলে উপকার দগে। স্ত্রীলে বেদন ঋতুকালে বক্তাধঃকৃত শিবোলে নায় ভিবেটম ভিনিডিন টিংচর ব্যবহারে উপকার হয়। একানাইট অক্টেমেণ্ট স্থানিক ক্লান্তি-আদি তনিত পীড়া ও তৎসঙ্গে বমন থাকিলে ক্যানোবিস্ ইড্রিকার টিংচর স্তম্ভক আয়বণ ও ম্যালোজ সহ প্রযোজ্য ক্রোটন ক্রোবাণ দ্বারা পৈত্তিক শিবঃপীড়া উপশমিত হয়। দান্না পাউডর প্রান্তি

যাত্রা একটা এবং বোঁগের বর্তমান সময়ে ৩ ঘণ্টাস্তর সেবা ।  
নাইট্রেট অব্ এমিল আঘাণ কবিলে বেদনা উপশমিত হইতে পারে,  
কিন্তু ইহা অল্প মাত্রায় ও সাবধানে ব্যবহার করিতে হয় । বিবমিষা  
ও শিরঃপীড়া সহ তবণ পাকায় সর্দিতে টিংচর নব্যভমিকা ১  
ফোটা মাত্রায় সেবনে বিশেষ উপকার দ্রষ্টব্য ফর্মফরস ১০ হইতে  
২০ গ্রাণ মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে এই বোঁগে বিশেষ উপকার দর্শে ।  
ভেলিনিয়ানেট অব্ জিঙ্ক বা এমোনিয়া । ভিরাট্রিনা অয়েন্টমেন্ট  
স্থানিক মর্দনে বেদনা উপশমিত হয় ফিনাসিটিন, এন্টিপাইলিন,  
কফিইন সাইট্রস সহ পায়োগে উপকার হয় ।

মস্তিষ্কে বহুাধিক্য ও অগ্নিমান্দ্যের লক্ষণাদি বিদূষিত করিতে  
চেষ্টা করিবে । শরীরের শক্তি বৃদ্ধির উপায় করাও তৎসঙ্গে আব-  
শ্যক সহজে পরিপাক পায়, এরূপ খাদ্য দ্রব্য দেওয়া উচিত ।  
মৃদু বিশেষক—বিউবার্ব ও সেনা ৩৩২ ; নাইট্রিক এসিড ও  
ট্যাবাক্সেসেকম ; পডোফিলিন ও হেনবেন ৩৪৭ , ডিঃ য্যালোজ  
৩২৭ , বিউবার্ব ও ব্রুপীন বোঁগ বাত সংশ্লিষ্ট হইলে কলচিকম  
প্রয়োজ্য । পৈত্তিক শিরঃপীড়ায় পেপসিন ৪১৭ ; কুইনাইন ও  
ইপিক্যাক বা বিউবার্ব স্নায়বীয় শিরঃপীড়ায় নাইট্রো হাইড্রো-  
ক্লোরিক এসিড, এমোনিয় ও কুইনাইন, টিংচর বেলোডানা ।  
একো-নাইট ও কোবোফর্ম একত্রে এবং পান পথেও পানি ছড়-  
ইয়া দিয়া বেদনার স্থানে ধরিয়া উপকার হয় । ফর্মফেট অব্ জিঙ্ক  
ও নব্যভমিকা ৪২৯ । ক্লোরাইড অব্ এমোনিয়ম ৪১২ । ওল-  
বায়ুবোঁগবিশিষ্টা স্ত্রীলোকদের পক্ষে নব্যভমিকা, জিঙ্ক বা ঈল ১৭৩,  
১৮৭, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৭, ১৯৮, ২০৫, ৪১৮ । অর্ধকপালে শিরঃ  
পীড়ায় কুইনাইন ও আর্গিনিক ; তৎসঙ্গে বেলেডোনা বা অল্প

ফোন মাদক ঔষধও দেওয়া যাইতে পারে ক্লোরাল ৪২৪ ;  
ব্রোমাইড অব পটাশিয় ৪২২ ; ট্রাইমোনিম , ১৭০' পাউডর ;  
সহস্র ধাবায় শান, নৈত্যামিশ ১১৯, ১২০ মস্তকে অডিকোলন,  
ল্যাভেণ্ডর, গোলাপজল দিবে বিবিধ প্রকার বেদনানিবারণক  
লিনিমেন্ট যথা ১২৪, ১২৫, ১২৮, ১৪৪, ১৪৬, ১৫২ ১৫৩  
কপিং, ব্লিষ্টার, মর্টার্ড মস্তকে ও পশ্চাৎ হীবা বা শঙ্খ দেশে  
উপদংশ বিষ দ্বারা এই বোগ উৎপন্ন হইলে আইয়োডাইড অব  
পটাশিয়ম ৩৯৯ বায়ু পরিবর্তন ক্লোরাল ও ক্যাম্ফর, বা মেছল  
ও ক্যাম্ফর একত্রে স্থানিক প্রয়োগ

### ভটিংগে — শিরোবুর্গন ।

অল্পক্ষণ স্থায়ী শিরোবুর্গন, ইহাতে বোগী পড়িয়া যাইতে পারে  
এবং নিকটবর্তী দ্রব্যাদি ঘূর্ণিত হইয়া বোধ হয় । অধিকাংশে  
জল মৌজা হইয়া দাঁড়াইয়া বেড ইতে পারে না বোগীবৈশেষ  
পর মস্তকে বেদনা ও সময়ে সময়ে বিবিধিয়া প্রাহুভূত হয় । অনেক  
সময় ইহা মস্তিষ্ক পীড়ার পূর্বকপ সঙ্গতিক দুর্বলতা , এন্তে য  
অবিশুদ্ধতা—অহিৎন, তাগাক বা স্নান দ্বারা যত্রাপ হয় , কিম্বা  
হৃৎপিণ্ড, যক্ৰ, মূত্রস্থি, পাকায়ন বা অন্ত্রে কোন কোন প্রকার  
পীড়া, এই বোগের কারণ মস্তিষ্কব মধ্যে বড় সঞ্চান্নেব কোন  
বকম বাধা জন্মিলে শিরোবুর্গন বা বুর্গ হয় সংক্রাম ও পক্ষা-  
ঘাতেব পূর্বে এককপ শিরোবুর্গন জন্মিতে দেখা যায় সামান্য  
প্রকার মূত্রবোগে খেচুনি না হইয়া যে বোগ শিরোবুর্গন হওত বোগী  
বেশ হয় বুদ্ধদেব কোন কারণ ব্যতীত অথবা ধর্মীয় প্রাচীনের  
পীড়া বা অপ্রবল নৈবিক বদ্ধাধিক্য বশতঃ শিরোবুর্গন জন্মে

চিকিৎসা ।—এই রোগে বলকারক ও আক্ষেপনিবারক ঔষধ প্রয়োজ্য । বিস্তৃত অত্যন্ত বক্তাপ্রধান ব্যক্তিদের পক্ষে অবসাদক ঔষধ আবশ্যক হইতে পারে মদ্যাদি নিষিদ্ধ ; অল্প মাত্রায় পরিবর্তক ও বেচক ঔষধ বিহিত—৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৯ কর্ণের পশ্চাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফিটাব । বত্ৰহীনতার লক্ষণাদি প্রকাশিত হইলে এবং স্নায়ুগুণ দুর্বল থাকিলে ক্লোরাইড অব এমোনিয়াম, ফস্ফেট ও হাইপোফস্ফেট অব লাইম ও সোডা, কডলিভর অয়েল, লৌহ-ঘটত ঔষধ, ও মাংস, মদ্য ইত্যাদি বৃদ্ধিগেব সাময়িক শিরোগূর্ণন বোগে কবোসিব সল্লিমেট ও বার্ক

### স্পাইনাল মিসিন্‌জাইটীস—পৃষ্ঠবংশীয়-

মজ্জাববক পর্দাব প্রদাহ ।

পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জাববক পর্দাব তরুণ পদাংক, সচবাচব হয় না ইহা সহজে আবোগ্য হইতে পারে অথবা প্রদাহ বশতঃ রস ক্ষবিত্ত হয় বা মজ্জা কোমল বা উহাতে পুঁষ উৎপত্তি হইয়া থাকে । তরুণ বোগ উপমস্তিক্ষের বা মস্তিক্ষের পর্দাব পীড়াব সঙ্গে বিমিশ্রিত থাকে । প্রাচীন বোগ, কণেরুবাব ক্ষতরোগ সংশ্লিষ্ট থাকে । বাহ্যিক আঘাত এবং নৈত্য ও আর্দ্রতা ( বাতবোগদেব পক্ষে ) ইহাব সাধারণ কাব

লক্ষণ ।—প্রবণ জব ও উনিদা পৃষ্ঠবংশীয় তীব্র জ্বালা-যুক্ত বেদনা ও তাহা জঙ্গাদিতে পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া পড়ে । উহা চাপ সংলগ্নে ও সঞ্চাণনে বর্দিও হয় অনেক সময় ইহাবে বাত রোগ বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশেব কাঠি



ও টঙ্কাবৎ আকুঞ্চন অঙ্গাদি দুৰ্দ্ধন, অধঃশাখায় কখন কখন  
গন্ধাঘাত হইতে পারে রসসাব বুদ্ধি হইতে থাকিলে \*ক্তি  
বিনষ্ট হয় শ্বাসকৃচ্ছ বোধ; তীব্রা, পৃষ্ঠ ও উদবে আকুঞ্চন বোধ।  
মূত্রাববোধ, দুৰ্দ্ধম্য কোষ্ঠবদ্ধ, বা কখন কখন তদবসানে উদবাসয়।  
মাতিশয় অবসন্নতা, সন্ময়ে সময়ে পেলাপ এবং অচেতনতা।

চিকিৎসা আইয়োডাইড অব্ পটাশিয়াম ও একো-  
নাইট ৪০৪; কবসিব সল্লিমেন্ট ও সর্গাপাবিনা ৪০২; বেড্  
আইয়োডাইড অব্ মার্কবী, একোনাইট ও গোসেকম্, ট্রামোনিবম;  
হেনবেন; বেলেডোনা কণ্ঠব অংগ কালোমেলা ও জেলাপ  
স্থানিক—বেলেডোনা বা একোনাইট লিনিমেন্ট লিণ্টে ভিজাইয়া  
লিন্সীড পুলটীস, স্ফেসেন্টমন (পলীহেড) বনফ, ব্লিষ্টাব, টাট্টারে-  
টেড অব এণ্টিমোনী অষেটমেন্ট, আইয়োডিন পেন্ট, ডলোবা।

### মাইলাইটীন — পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার প্রদাহ।

পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জাব প্রদাহ সচরাচর হয় না কখন কখন ফুস্-  
ফুসপ্রদাহ, জঠবান্ধপদাহ ও একজাবব সঙ্গে এই বোগ মিটিত  
থাকে নৈতা, আর্দ্রতা, সদ্য এং ও আঘাতাদি হইতে ইহা উৎ-  
পন্ন হয় সাধাৰণতঃ এই বোগের পৰিণামে পুয়োৎপত্তি ও মজ্জাব  
কোমলতা বাদি উপস্থিত হয়

লক্ষণ — সর্ধন এবংপ নহে মস্তাকব অভ্যন্তরস্থ  
অংশে পীড় জগিল গভীর শিবোবেদনা, মুখমণ্ড ও মস্তাবর  
আক্ষেপিক সঞ্চালন, অল্পজাবিত বাকা, দাঁতকপাটী, চিনে কষ্ট,  
বাধাপ্রাপ্ত আক্ষেপিক শ্বাস প্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিশৃঙ্খল,

অর্দ্ধাঙ্গ বা অপববিধ পক্ষাঘাত তৎকালস্থায় বোগ সাংঘাতিক হইবার উপক্রমে সাতিশয অবসন্নতা, শ্বাসকৃচ্ছ, বর্ধিত, সমুৎসর্গ অনৈচ্ছিকভাবে নিঃসৃত হয় যদি কিঁনিক শ্বাসমূলেব উপবে সমগ্র মজ্জাতে প্রদাহ হয়, তাহা হইলে শ্বাসাববোধ হইয়া রোগীর অবিলম্বে মৃত্যু হয় গ্রীবার অংশে প্রদাহ হইলে— গিলিতে কষ্ট, মস্তক উত্তোলনে অপাবগতা, গ্রীবার পশ্চাতে তীব্র বেদনা, অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, হস্ত ও বাহুতে সূচীবোধবৎ বেদনা ও স্ফুড় স্ফুড় বোধ এবং উর্দ্ধ শাখায় পক্ষাঘাত । পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জাব মধ্যস্থলেঃ ( অর্থাৎ ডর্সাল বিজ্ঞ ) প্রদাহ হইলে—আক্রান্ত অংশে বেদনা, হস্ত ও পদেব অঙ্গুলীতে অসাড়তা ও সূচীবোধ বোধ, দেহের আক্ষেপিক সঞ্চালন, বাহু ও অধঃশাখার পক্ষাঘাত, শ্বাসকৃচ্ছ, সাতিশয হ্রাস পানন্দন কটিদেশস্থিত মজ্জাব প্রদাহে প্রথমেই অধঃশাখার পক্ষাঘাত, উদর বেদনা, তৎসঙ্গে এবং বোধ যে উদর একটি বজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ আছে আক্ষেপ ; মূত্রাববোধ, তৎপবে মূত্রাববগাঙ্গমতা—মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত বশতঃ হয় মলদ্বাবের সংকোচক পেণীব পক্ষাঘাত প্রকৃত অনৈচ্ছিক মল নিঃসরণ । বিল্লী-প্রদাহ অপেক্ষা মজ্জা-পদাহ বেদনা অপেক্ষাকৃত কম প্রবল হয় ; কিন্তু ঐ বেদনা উত্তাপ প্রয়োগে ও চাপে বৃদ্ধি পায় সহজেই শয্যাশ্রিত জনে

চিকিৎসা — মস্তিক ও তদাববক পক্ষা প্রদাহেব চিকিৎসা সান গ্রায় পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জা ও তদাববক পক্ষা চিকিৎসা জানিবে । ক্যানোমেল ও জেনাপ ; জেনাপ ও মেনা ; অথবা ক্যাপ্টর অয়েল ও টর্পেন্টাইন এনিমা আইয়োডাইড অথ পটাসিয়ম পুরাতন বোগে বিন্ আইয়োডাইড বা বাইক্লোরাইড্ অব মার্কনী । ক্যানি-

টব দ্বারা মধ্যে মধ্যে মূৰ বাহির করিবে বও বিকা বর্তমানে  
কড়নিওব অয়েন, আয়বণ, ফক্ষবগ পৃষ্ঠবংশে শৈত্যপ্রয়োগ বা  
প্রত্যুগতাসাধক দ্রব্য সংগ্রহ করিবে

### স্পাইন্ড্যান হেমবেজ - পৃষ্ঠবংশীয়

#### মজ্জাভ্যন্তরে রক্তপ্রাব ।

মস্তিষ্কাভ্যন্তরে বক্তস্রাবের প্রায় ইহা সাধারণ নহে, কদাচিৎ  
উপস্থিত হয় আঘাত, মজ্জা বা বিল্লীত তরল পোহ, ধমনীত পর্দার  
মেদাপকৃষ্টতা, কশেককায় স্ত ও ও হাব অপ্রবিত্ত পীড়ায়, রক্ত  
প্রথম বিল্লীত বাহিরে বা বিল্লোদন মধ্যে ক্ষবিত হইয়া জমে বা  
মজ্জার ধূসবর্ণ অংশে বক্তপ্রাব হয় ইহাতে অবিলম্বেই অথবা  
কিছুকাল পরে স্রাবণীত পদার্থের কোমলতা হওয়ায় মৃত্যু হয়

লক্ষণ — বিদ্যো বক্তাধারের অবস্থানমতে ব্যক্তাদি প্রকা  
শিত হয় বিল্লীত মধ্যে বক্তস্রাব হইলে সাধারণতঃ বক্ত  
নীচে গিয়া সঞ্চিত হয় । এই কারণে পরীক্ষাত—এ মণঃ উদ্ধ দিকে  
বিস্তৃত হয় পৃষ্ঠে তীব্র ও আকস্মিক বেদনা, সমগ্র সময়ে মস্তকেও  
অনুভূত হয় । অনেক সময় প্রবল জ্বরে সমুপস্থিত হইয়া থাকে  
মজ্জার উপরি অংশ চাপিত হইলে শ্বাসকষ্ট হয় অংশিতের ক্রিয়া  
অবসর, শরীর শীতল ও পাণ্ডুবর্ণ জ্ঞানেন কোন বৈকল্য হয়  
না মজ্জার মধ্যে রক্ত সঞ্চিত হইলে উদ্ধ স্থানের নীচের স্রাব যে  
যে অংশে অবস্থিত, সেই সকল স্থানে অবস্থিত পদার্থাদি অল্প  
বক্তপ্রাব সাগাণ্ড প্রবাব হইলে কয়েক ঘণ্টা পরে মস্তক শক্তি  
ক্রমশঃ বিনষ্ট হয় ।

চিকিৎসা ।—পৃষ্ঠবংশোপবি বরফ ও নৈতামিশ্র দিবে ;  
রোগীকে স্থিতি ও নিস্তক রাখিবে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যত্নভাবে  
হওযাব জন্য টংচব একে'ন'ইট সেবনার্থ বিধান করিবে

### স্পাইন্ডাল টিউমার্স—পৃষ্ঠবংশীয় অৰ্কুদ ।

মজ্জাতে অৰ্কুদ দ্বারা চাপ পাওয়ায় পক্ষাঘাত ও আংশিক  
হ্রাস জন্মে গুটিকা, কর্কটিকা, অস্থি বা অন্ত্রবিধ অল্পস্থ বর্ধন  
হয় । কশেৰুকায় উপদংশীয় পীড়া বশতঃ অৰ্কুদ জন্মে

লক্ষণ ।—এমশঃ জন্মে, মজ্জা অত্যন্ত চাপিত না হওয়া  
পর্যন্ত পক্ষাঘাত হয় না বোধ অপেক্ষা সঙ্করঃ শক্তির পক্ষা-  
ঘাত অগ্রে হয় অৰ্কুদেব অবস্থানেব উপব বেদনা । শাখাতে  
খাল ধবা ও আক্ষেপ জন্মে ।

চিকিৎসা ।—ইহাতে সার্জিক্যাল চিকিৎসা আবশ্যিক ।  
আইয়োডাইড্ অব্ পটাসিয়াম, কডলিভৰ অয়েল, পুষ্টিকাৰক  
খাদ্য । প্রত্যাগতা সাধক দ্রব্য স্থানিক প্রয়োজ্য ।

### হাইড্রোবেকিস এণ্ড স্পাইন্ডাল-বাইফিডা ।

এক বা ততোধিক কশেৰবান পশ্চাৎ পর্কপ্রবর্ধন ( ল্যামিনা )  
ও কর্কট প্রবর্ধনের সহজাত অভাব হইবায়, পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জান  
পর্দা, তবল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ হয় পৃষ্ঠবংশের সকল অংশেই  
ইহা জন্মিতে পারে, কিন্তু সচবাচর কাটিদেশেই হইয়া থাকে

লক্ষণ —একটী অৰ্কুদ জন্মে, তাহাব আকৃতি বিভিন্ন  
প্রকার হইতে পারে সময় সময় উহা বাগকেব মস্তক সদৃশ



হয়। হস্ত দ্বারা টিপিলে উহাব মধ্যে তবল পদার্থের সঞ্চলন অনুভূত হয় বোগীকে মোড়া করিলে উহাতে টান পড়ে ক্ষীততা অর্জিত, চর্ম স্থস্থ অথবা নীলবর্ণ ও তাহাতে রক্ত সঞ্চিত হয় মস্তিষ্কোদক রোগের সঙ্গে সংমিশ্রিত থাকিলে ভাবিফল অশুভ মূত্রাশয়, সবলীয় ও অধঃশাখায় পক্ষাঘাত বর্তমান অমঙ্গল-পরিচায়ক

চিকিৎসা — সার্কাজিক স্বাস্থ্য যদি উত্তমাবস্থায় থাকে ও অর্কুদ ছোট হয়, তবে কোন প্রকার চিকিৎসোপায় অবলম্বন না করিলেও চলে। গটাপাচ্চী বা পরিষ্কৃত চর্ম দ্বারা চাপ প্রয়োগ করিবে। অর্কুদ অত্যন্ত বড় হইলে একটী সূক্ষ্ম ট্রোকার দ্বারা ট্যাপ্ করা যাইতে পাবে; তৎপরে অ'ইক্সে'ডিন ইন্জেক্সন দিবে। সার্কাজিক স্বাস্থ্যোন্নতি যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা করিবে। পথ্য পুষ্টিকাবক হওয়া উচিত সমুদ্রতীরে বাসস্থান নির্ময় করিতে পারিলে ভাল হয়

### স্পাইন্টাল ইরিটেমেন—পৃষ্ঠবংশীয়মজ্জার উদ্দীপনা ।

এই নামের কোন গীড়া আছে কিনা সন্দেহ। তবে স্পীন্টোক-দের কতকগুলি লক্ষণ এই নামে আখ্যাত হয় শুনে বেদনা; বক্ষ, উদর বা জবাযুতে বেদনা কোন কোন কশের্বকাধ কণ্টক প্রবর্তনের উপর চাপিলে বেদনাবোধ হয়। পেশীশূল ও শূলবায়ু সংমিশ্রণ ও ৩৭সহ সার্কাজিক দৌর্বল্য বর্তমান থাকে

চিকিৎসা — একোনাইটের মলম স্থানিক শীতল জলধারা দিলে উপকার হইতে পাবে উহার সঙ্গে লবণ

মিশ্রিত করিয়া দিতে কেহ কেহ বলেন । কিন্তু ও স্থিরভাবে বিশ্রাম, বেলেডোনা প্লাষ্টিক, পুষ্টিকর খাদ্য, কডলিভ অয়েল, বার্ক, ষ্টিল ইত্যাদি জবাব দিয়া যাহাতে সুস্থতা তৈরি হয়, তাৎপর্ষ্য । সামুদ্রিক বায়ু সেবন, পরিমিত ব্যায়াম ।

## প্যারালিসিস্—পক্ষাঘাত ।

### হেমিলিজিয়া—অর্দ্ধাঙ্গ-পক্ষাঘাত ।

শরীরের এক দিকের পক্ষাঘাত, উর্দ্ধ ও অধঃশাখা আক্রান্ত হয় । এই প্রকার পক্ষাঘাত অতি সাধারণ । শরীরের দক্ষিণ অথবা বামদিক সাধারণতঃ অধিক আক্রান্ত হয় যদি একশাখা অক্ষত হয়, তবে প্রায়ই বাহ্যতে হইয়া থাকে ।

লক্ষণ ।—সপ্তম যুগ্মনাযু বা মুখমণ্ডলস্থিত স্নায়ু কদাচিত্ আক্রান্ত হয় । পঞ্চম যুগ্মনাযুই ইহাতে আক্রান্ত হয় । তাহাতে পক্ষাঘাতাক্রান্ত কপোলদেশ শিথিল হইয়া পড়ে এবং মুখ স্নান্দ্রদিকে আকর্ষিত হয় জিহ্বা বাহির কবিলে পীড়িত দিকে হেলিয়া পড়ে । উচ্চারণ অসম্পূর্ণ—৯ম ও ৫ম স্নায়ুর পক্ষাঘাত বশতঃ হয় । ৩য় স্নায়ু আক্রান্ত হইলে উপবেব চক্ষুপাতা নিম্নীলিত, কনীনিকা প্রসারিত, পরিবর্তনশীল তির্যক দৃষ্টি স্পর্শ-বোধহীনতা । মানসিক বৃত্তির হানি ও অশ্রুস্রাব প্রবণতা হয় । ভ্রম, ও শব্দের অপব্যবহার মস্তিষ্কেব লোহিত কোমলতা ব্যাধিতে আক্রান্ত অংশেব পেশী শক্ত ও আকৃষ্ট থাকে । আশাহীন রোগী অঙ্গাদি শীর্ণ হয় । পরিপোষণেব অপকর্ষ বশতঃ পেশীরও শীর্ণতা জনে । অঙ্গুলি সকল করতলেব দিকে

আকৃষ্ণিত হইয়া থাকিলে বোগেৰ ভাবিফল অশুভ আৰোগ্য হইবাব বোগে জজ্ঞাব পীড়া প্রথম উপশমিত হইতে আবশ্য হয় যখন জজ্ঞাব অগ্ৰে বাহু বলপ্ৰাপ্ত হয়, তখন বোগেৰ ভাবিফল অশুভ

চিকিৎসা —বিবেচক জেলাপ, স্বামনী ৩৪৪, ৩৪২, ক্রোটন অয়েল—৩২৮, ৩৪৬ কাষ্টৰ অয়েল ও টাৰ্পেণ্টাইন এনিমা ৩৬০ মস্তকে বা পশ্চাৎ ত্রীবায দ্বিষ্টাব আইমোডাইড অব্ পটাশিয়ম ৩৯৯, ৪০১, বোগ পুৰাতন হইলে অল মাএম ষ্ট্রীকনিয়া ( ড়ো গ্ৰেং ) দিনে তিনবাৰ, ১৭ আইবব ষ্ট্রীকনিয়া ১৬। ফক্ষবস, ফক্ষরিক এচিড স্থানিক উত্তেজক মৰ্দ ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৬ প্রভৃতি মস্তিষ্কেৰ বৈধানিক পীড়া অবৰ্ত্তমানে বা তিবোহিত হইলে ইলেব্টিসিটী ও গ্যাল্ভানিজম এনোজ্য কডলিভৰ ভয়েং ৪১০ বসফেট অব্ আমবণ, এমোনিয়া সাইট্রেট অব্ আমবণ প্রভৃতি মুছ বোহঘটিত বলকবোষণ ছুফ, মাংস প্রভৃতি বলকব ও পুষ্টিকব পণ্য প্রথমাবস্থায় সংশ্ৰাম বোগেৰ স্থায় চিকিৎসোপায় অবলম্বনীয়

### প্যারাপিজিয়া—অধোঙ্গ পক্ষাঘাত।

দোহৰ অধঃশাখায় পক্ষাঘাত সেই বোগ দ্বিবিধ, ১ম প্রকাৰ বোগ পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জাব বা উহাব কিৰ্ঘীৰ পীড়া বশতঃ জনো ২ম প্রকাৰ বোগ, কোন এবটা বোধমক্তিপণেৰ শাসু হইতে প্ৰতিক্ষিপ্ত উত্তেজনা ( বিফেয়া ইণ্ডিটেমেন ) কাৰণকক মজ্জাতে উপনীত হইলে হয় সম্ভবতঃ মজ্জাব মধ্যে বক্ত-সঞ্চালন অসম্যক ভাবে সম্পাদিত হয়

লক্ষণ ।—ক্রমশঃ ও অজ্ঞাতসাবে বোগ আবিষ্ট হয় ।  
জড় ও পদেব দুর্বলতা, অসাড়তা ও ঝিন্ ঝিন্ বোধ হয় ।  
এই দুর্বলতা ক্রমশঃ পৰিবার্কিত হইয়া অধোজাখার সঞ্চালন ও  
বোধশক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে । মূত্রাশয় ও মলদার-সংকোচক  
পেশীর পক্ষাঘাত মূত্রাশয়ে প্রস্রাব অধিবসন থাকিয়া পচিয়া  
যায় । জড়্যাব আক্ষেপ ও তাহার অনৈচ্ছিক গতি তদ্বাবা  
বোণীব সমূহ ক্রেশ হয় । এই বোগে প্রতিক্ষিপ্ত সঞ্চালন  
সহজে উত্তেজিত হয় । সার্কার্যিক শাস্ত্র হীন হইয়া পড়ে

চিকিৎসা ।—এই বোগে চিকিৎসাকালে পৃষ্ঠবংশীয়  
মজ্জাভ্যন্তরে বক্তাবিকা থাকিলে আর্গট অব্ বাই ও বেলেডোনা  
ব্যবহার্য্য । আর্গট, ৫ বা ৬ গ্রেণ মাত্রায় দিনে দুই বার  
সেবা ও তৎসময় পৃষ্ঠবংশে একখানি বড় বেলেডোনা প্লাষ্টিক  
দিবে । কিছু দিন এইরূপ প্রণালীতে চিকিৎসা করায় যদি  
উপকার না দর্শে, তবে অন্যান্য ঔষধেব মধ্যে আইয়োডাইড  
অব্ পটাসিয়ম দিবে ৪০৫ কডলিন্ডব অয়েলও উপকারী,  
৪১০ অস্থিৰতা নিবারণার্থ হেনবেন, ইণ্ডিয়ান হেম্প বা  
কোনিয়ম । পুষ্টিকর পথ্য অজ্ঞাদিতে উত্তেজক মর্দন ও  
গাণ্ডানিজম । পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জাব পোষণাভাব জনিত পীড়া হইলে  
ঈকনিয়া । মলদার বাথ ; কুইনাইন ও আয়রন—১৭২, ১৭৩,  
১৭৪ । ওয়াম, লাইট্টেট অব্ সিলভর, ২ ইপে ফস্ফাইট  
অব্ সোডা পৃষ্ঠবংশে ববক ও উৎকর্ষণ পথ্যাক্রমে স্থাপন ।  
অল্পে ক্রমি ব অল্প উত্র পদার্থ বর্তমান থাকিলে তাহার প্রতিকার  
চেষ্টা করিবে



## লকোণমাটৰ যাটাবুসি টেবিমুডৰ্ লম ।

অধঃতলৈ এক বিশেষ প্ৰকাৰ পদ্ধতিত অপৰিণত বতি  
ক্ৰিয়া, শৈত্য, আদি তা ও বাত প্ৰভৃতি কাৰণে সমুৎপন্ন হয়  
পুৰুষদেহ প্ৰৌঢ় বয়সলৈ সাধাৰণতঃ এই বোগ হয় ইহাতে  
পৃষ্ঠবংশীয় মস্তকৰ পৰ্শ্বাংশ শুভ্ৰেণ মাযু স্তনেৰ শীৰ্ষতা ও বিধান  
বিশেষ সংঘটিত হয়। থাকে তৎপক্ষে উহাতে মেদকণা ও  
যাজক তৎপৰ বিদ্ৰিও জন্মে চৰ্শ্বৰ ও মস্তকৰ অন্তৰ্গত অংশে  
বিধান বিকাৰ থাকিতে পাবে

লক্ষণ স্থিৰগতিৰ হ্রাস ও বা সম্পূৰ্ণ বিনাশ সংঘটিত  
ওমায বোণী বেড়াইতে বহু অল্পতৰ বাবে, সোঁতা হইয়া ও স্থি-  
তাবে চমন বহিতে অসমৰ্থ হয় ৭ টানিয়া টানিয়া ও কঁপি  
কঁপি চলে অধঃগত পদ্ধতিত হইতে ইহা স্বতন্ত্ৰ পীড়া  
উহাতে ক্ৰীড়ন সঞ্চালন শীঘ্ৰে হ'ব সম্পূৰ্ণ বিনাশ সংঘটিত  
হইয়া থাকে স্থিতিশক্তি ও বুদ্ধিৰ কোন বিকাৰ জন্মে  
না কখন কখন ইহাৰ সাদ্ৰ, ২য়, ৩য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম বা ৮ম  
(বান বান শাখা) যুগ্মমাৰ্গৰ অংশ পৰ্য্যন্ত বিদ্যমান  
থাকে বদাচৰ্য্য বৰিবত্ত জন্মে, চিহ্নিতে বহু, তিষ্ঠাত  
দৃষ্টি; দ্বিদৃষ্টি; উদবেৰ চানিদিৰে কেন এৰটী বজু দাবা আৰম্ভ  
আছে একো বোধ হয় বাত বেদনা, অস্থানে ভাবধ তীব্ৰ  
ভাৱনা, কিং পৃষ্ঠবংশ পৰ্য্যন্ত কাৰণে কেন মবেদন স্থান  
দৃষ্ট হয় না অধঃগত অসাড়তা ও তাহাতে স্ফোৰণৰোধ  
শ্রমকাৰে পড়িয়া যাওঁয়াক অসুখ হয়, তদন্তে বোণী পদ  
সংযাৰ প্ৰাণ দৃষ্টি থাকে এবং উহা আশ্বেদিব ভাবে অগ্ৰাদিকে

নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে অবশেষে অবশ্যথাব সম্ভবশক্তি  
বিলুপ্ত হয় স্নায়বীয় অক্ষতা, ক্রমিক বৰ্দ্ধিত দৌৰ্ব্বল্য রোগ  
ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হয় এই রোগ প্রায়ই সম্পূর্ণরূপে আৰোগ্য  
হয় ন সময়ে সময়ে অশ্রান্ত পীড় প্রকটিত হইয়া বোনীকে  
মৃত্যুমুখে নিপাতিত করে

চিকিৎসা —ফস্ফেট অব্‌ আয়বণ, ১৮৭, ২০৭  
আইয়োডাইড অব্‌ আয়বণ—১৮১, ১৯৯, ৪০৩ কুইনাইন ও  
আয়বণ—১৮৩, ২০১, ২০৮ বার্ক ও ফস্ফরিক এসিড হাইপো  
ফস্ফাইট অব্‌ সোডা বা লাইম, বেচে ডোনা, ইণ্ডিয়ান হেম্প,  
কডলিওব অথবা সন্কব বাব, গ্যাংভানিডম আইয়ো  
ডাইড ও ব্রোমাইড অব্‌ পটাসিয়ম; টিংচব অব্‌ নক্স ভমিকা ও  
ঈকনিয়া প্রভৃতি ফস্ফেট অব্‌ ডিক্স লাইকব আর্সেনিক,  
নাইট্রেট অব্‌ মিল্ডব ক্লোরাইড অব্‌ গোল্ড ও সোডা

### ইনফ্যান্টাইল্‌ প্যাৰালিমিস—নৈশব পক্ষাঘাত

পূর্ণবয়স্কদের পক্ষাঘাত বোধেব স্থান শিশুদের এই পীড়ায়  
কোন আশঙ্কাব কাৰণ নাই যদিচ ইহা সহজে আৰোগ্য  
হয় না বা কখন কখন একেবানেই আৰোগ্য হয় ন, তথাচ ইহাব  
দ্বাবা জীবন বিনষ্ট হইতে দেখা যায় . ডবিকণ্ড পূর্ণবয়স্কদের  
নোংগে হাঁড় ও নাকের দুইপাশে দুইপাশে দুইপাশে হাঁড়  
ইহাতে তদ্রূপ হাঁড়িতে দেখা যায় না এই পীড়ায় সাধারণতঃ  
অঙ্গবিশেষ আক্রান্ত হয় কখন কখন অর্দ্ধাঙ্গ বা অৰ্দ্ধাঙ্গের  
পক্ষাঘাত ঘনো । সময়ে সময়ে স্ফোট অনাতে ইহার উৎপত্তি  
হয়, আবার অনেক সময় মারাত্মক কোন প্রকাৰ অসুস্থতা

ব্যতীতও জন্মিতে দেখা যায় দৃষ্টান্তেও কালেও এই বোগ জন্মিতে পারে এই প্রমাণাত্মক বাত বোগ বা বক্তৃতা সম্বন্ধে পীড়া বলিয়া এমন হইতে পারে কিন্তু ইহাতে প্রায়ই বেদনা থাকে না, প্রত্যাহার কেবল বোধাত্মক থাকিতে পারে

চিকিৎসা —মুখ বিবেচক—ক্যাষ্টর অয়েল, নিউবার বা ক্যামনী ঈষদ্রব্য জলে স্নান, মাড়ী ক্ষীত হইলে চিবিয়া দেওয়া ; গ্যাল্‌ভানিজম আইগোড ইন্ড অব্‌ ৩ টি মিম, আইয়ো-ডাইন্ড অব্‌ আয়ব, বার্ক, কডলি ভব অয়েল, অল্প মাত্রায় টিংচর অব্‌ ষ্টীল ও নেবিগেব কেমিক্যাল ফুড আদি প্রয়োগ্য বিশেষ সম্বন্ধনতঃ সহিত অল্প অল্প চিকিৎসা হইকন ঈ কনিয় ব্যবহার করা যাইতে পারে পুষ্টিকর খাদ্য, সমুদ্র বায়ুতে ভ্রমণ, ঈষদ্রব্য ও লবণ মিশ্রিত জলে স্নান হিত এবং পার্লামেন্টর কেমিক্যাল ফুড অর্থাৎ ফরফট অব্‌ লাইম, সোডা, আয়ব ও পটাশ একত্রে প্রয়োগে উপকর দশিতে পারে

### রাইটস্‌ প্যাবলিটিমস্‌ লিপিকবেব

#### পক্ষাঘাত

এই বোগে কসেকটী পেশিতে আক্ষেপ উৎস্থিত হওয়ায় হস্তসাধ্য কার্য্য করিতে কোন প্রায় অসম হইয়া পড়ে ইহাতে ঐচ্ছিক শক্তিব অংশিক হানি হয় এই রোগ যে কেবল লিপিকর ব্যবসায়ীদের হয় তাহ নহে, ভদ্রতাও হস্তসাধ্য কার্য্য করে, এরূপ অন্যান্য ব্যক্তিদিগকেও এই বোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায় বোগের প্রাবল্ডে হস্ত বা বাহন পেশীর কাঠিও জন্মে

উহা রাত্রিতে বিশ্রাম করার পথ তিবোধিত হয় । রোগী শ্রমবশতাবে হস্ত সঞ্চালন করিতে পারে না অর্থাৎ লিখিবান বা অন্যান্য কার্য্য করিবান কালে হাত কাঁপিতে থাকে হস্ত বা বাহুর পেশীতে জ্বালাবোধ ও কখন কখন উহাতে অগ্নি বা অধিক কন্কন্ করে কলমাদি ধরিলেই অঙ্গুলি, বিশেষতঃ বৃদ্ধ ও তর্জনী অঙ্গুলি কুঞ্চিত হয়

চিকিৎসা — আক্রান্ত হস্তকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে দেওয়া আবশ্যক, কাবঃ তদ্ব্যতীত ঔষধ সেবন বিশেষ ফলোপধায়ী হয় না । পুষ্টিকাবক খাদ্য, দুগ্ধ, ডিম্ব, কডলিভাব অয়েল, গ্যাল-ভানিজম হাইপোফস্ফাইট অব্ সোডা বা লাইম বার্ক ; ষ্টীলের সহিত নক্স কুইনাইন ও ফসফেট অব্ জিঙ্ক বা আয়রন

## হিষ্টরিক্যাল ও রিউমেটীক্ প্যারালিসিস ।

লক্ষণ । — হিষ্টরিক্যাল প্যারালিসিতে স্নায়ুকেन्द्र বা গতিশক্তি বিধায়ক স্নায়ুব কোন পীড়া বর্তমান থাকিতে দেখা যায় না ইহা শুষ্কবায়ুবোগেস্ত স্ত্রীলোকদের হয় । ভয়, সত্যিঃ উদ্দীপনা, ভিদ্ভাধারের উত্তোজনা আদি হইতে এই বোগ জন্মে । অধঃশাখা বা এক দিকের বাহু ও পদে, বা কোন বিশেষ পেশীতে এই বোগ জন্মে । শুষ্কবায়ুর অন্যান্য লক্ষণও বর্তমান থাকিতে পারে । গতিশক্তি ক্ষয়প্রাপ্তিতে অধঃশাখার পেশী সমূহ আক্রান্ত হয় অথবা বাহুঃ প্রসারক পেশীবর্গ বা ত্রিকোণ ( ডেম্‌টাইড্ ) ও চতুষ্কোণ ( ট্র্যাপিজিয়াম্ ) পেশী আক্রান্ত হওয়ায় বোগী হস্ত উত্তোলনে অক্ষম হয় । বোগ সহসা বা ক্রমঃ প্রাদুর্ভূত হইতে পারে



চিকিৎসা ।—হিষ্টিক্যাল পক্ষাঘাত রোগে দৌহাটত ও আক্ষেপনিবাবক ও সার্বাস্থিক স্বাস্থ্যোন্নতি বিধায়ক ঔষধ প্রয়োজ্য বিউমেটিক পক্ষাঘাতে আইয়োডাইড অব্‌ পটাশিয়াম, কডলিভ অয়েল, গ্যান্‌ভানিজম ও বিবিধ মর্দন ফলপ্রদ

### প্রোগ্রেসিভ্‌ মস্কিউলার হ্যাট্‌ফি ।

পৈশিক স্নেহের দানা ও মেদাকৃষ্টতা বশতঃ এই বোগ জনে পবিপোষণের কোনরূপ ব্যাঘাত বশতঃও জঁদুশ ঘটনা হয়

লক্ষণ উর্দ্ধ ও অধঃশাখার বাঁ সমস্ত দেহের ত্রিচ্ছিক পেশী আক্রান্ত হয় পৈশিকস্নেহের আক্ষেপ ও কম্পন অজ্ঞাদিতে ভাববোধ, উহা ক্রমশঃ দৌর্বল্যে পবিণত হয় পৈশিক শীর্ণতা বশতঃ মুহূর্ত্তকালীন ও কুক্ষিত দেখায় সময়ে সময়ে শ্বাসশূল বা বাতবেদনা সর্দিলাগাব প্রবণতা বুদ্ধিবৃত্তি ও নাক্রান্ত, সার্বাস্থিক স্বাস্থ্য প্রায়ই ভাল থাকে বোগের বুদ্ধিব সঙ্কে আক্রান্ত অঙ্গের সঞ্চরণ শক্তি এককালে বিনষ্ট হয় উচ্চারণ ও গিলন ক্ষমতা বিনষ্ট হইতে পারে শ্বাসাববোধ হইয়া প্রায়ই বোগীর মৃত্যু হয় সর্দি, বায়ুনলীভুজ-পদাহাদি বা স্নায়ু বায়ুনলীতে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হওয়া বশতঃ শ্বাসাববোধ হয় পশু'কামধ্য ও উচ্চ বক্ষ ব্যবধায়ক পেশী এই বোগে আক্রান্ত হওয়ায় হৃৎপিণ্ড বিনির্গত হইতে না পারার শ্বাসবধ হইয়া যায় সময়ে সময়ে শ্বাসক্রিয়া-সম্পাদক পেশীবর্গের পক্ষাঘাত বশতঃও জঁদুশ ঘটনা হইয়া থাকে বোগের স্থিতিকাল কয়েক মাস হইতে কয়েক বৎসর বোগ সম্পূর্ণ আবোগ্য হয় না সকল বয়সেই এই

রোগ হয়। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষেবা এই রোগে অধিক আক্রান্ত হয়। শৈত্য, আর্দ্রতা বা গুরুতব শ্রম এই বোগেব কাবণ বলিয়া কথিত হয়। জ্বর, অর্কীষাত, পতন ও আঘাতাদি কারণেও ইহা জন্মিতে পারে। ইহা কৌলিক।

চিকিৎসা —হাইপো ফস্ফাইট অব্ সোডা বা লাইম, ৪৩০। নাইট্রেট অব্ সিলভর (২'০ ১ গ্রোণ) দিনে তিন বার; গ্যালভানিজম, সল্ফর বাথ আক্রান্ত পেশী সমূহ উত্তেজক মর্দন দ্বাৰা মালিশ স্ট্রীকনিয়া, নক্সভমিকা, মার্কনী, আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম, কডলিভর অয়েল।

### মার্কিউরিয়েল পলুমী—পারদজনিত পক্ষঘাত।

ঐচ্ছিক পেশীব আক্ষেপিক সঞ্চরণ, অর্থাৎ যখন উহাদিগকে কার্য্য কনাইতে ইচ্ছা হয়, তখনই উহাদেব আক্ষেপিক কম্পন জন্মে। বোগেব বর্দ্ধিতাবস্থায় উচ্চারণ, চৰ্ৰণ ও সঞ্চরণ ক্রিয়া কষ্টেব সহিত সম্পাদিত হয় সময়ে সময়ে এ লাপ বা তরুণ উন্মাদ বোগ উপস্থিত হয়। হস্তের ব্যবহার করিতে রোগী একেবাবেই পাবে না অপস্থাব, সাতিনয় দুৰ্বলতা, বাক্রিতে অস্থিরতা, চৰ্ম্ম মণিন ধূসর বর্ণ, মাডিতে ক্ষত, দন্ত কৃষ্ণবর্ণ ও দিথিদ হয় পারদেব ধূম যাহাদের গাএ লাগে, তাহাদেব এই বোগ জন্মে

চিকিৎসা। —সল্ফর বাথ আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম—৩৯৯, ৪০১ পুষ্টিকর খাদ্য, সমুজের বায়ুসেবন। আইয়োডাইড অব্ সোডিয়মও উপকারী

## লেড্ পলুমী—সীমজনিত পক্ষাঘাত ।

সীমশুলের সহযোগে বা স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয় সীমধাতুর আকরে বা সীমার সংস্পর্শে যাহারা কৰ্ম্ম করে, তাহাদেব এই রোগ জন্মে

লক্ষণ ।—বাৎ ও হস্তের শায় আক্রান্ত হয়, তদ্ব্যতীত তৎস্থানেব প্রসাবক পেশী সকলে পক্ষাঘাত জন্মে বাহ প্রসাবণ কবিলে হস্ত ঝুগিয়া পড়ে ইহাকে স্টিষ্ট্রপ্ বলে অধঃশাখা কদাচ আক্রান্ত হয় মাড়িতে নীলবর্ণ দাগ হয়

চিকিৎসা আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম—৩৯৯, ৪০১ সল্ফর বাথ ওয়ার্ম বাথ, গ্যালাভানিজম, আক্রান্ত অঙ্গ লিনিমেন্ট দ্বারা মর্দন, সল্ফিউরিক এসিড মিশ্রিত জলপান হিতকর

## প্যারালিসিস এ জিটান্স—বেপথু

পেশীবর্গের অনৈচ্ছিক কম্পন—হস্ত, বাহ বা মস্তকে আবৃত্ত হইয়া ক্রমশঃ সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হয় পৈশিক শক্তিব ক্রাস, বুদ্ধি ও বোধশক্তি অনাক্রান্ত, দেহকাণ্ড সমুখদিকে হেণায়মান লমণ-কালে অল্প দৌড়ানার মত বোধ হইতে থাকে বোগ স্বচ্ছভাবে পবিবর্দ্ধিত হয় বর্দ্ধিত বোগে রোগী নিজা যাইতে অসমর্থ হইয়া থাকে চৰ্ৰণ ও গির্ন কিয়া বষ্টেব সহিত সম্পাদিত হয় মলমূত্রের অনৈচ্ছিক নিঃসরণ সামান্য প্রকার প্রলাপ ও সম্পূর্ণ অচেতনাবস্থা

চিকিৎসা ।—কশেককমজ্জার প্রাচীন প্রদাহ-জনিত রোগে বেলেডোনা ; পৃষ্ঠবংশে বেলেডোনার প্রাচীর ব মলম ও সেবনার্থে আর্গিট প্রয়োগ করিলে উপকার হয় । প্রায় সকল প্রকার পক্ষাঘাতে ঔকনিয়া ৮০ হইতে ৮৫ গ্রেণ মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে সূক্ষ্মপ্রাণ হইয়া থাকে । একট্রাঃ ক্যালেকারবিন্ ৮৮ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বাতুলদের সার্ভাস্ট্রিক পক্ষাঘাতে, ও তদ্ব্যতীত অধোজ পক্ষাঘাতাদিতে উপকার করে । পৃষ্ঠবংশীয় পীড়াজনিত মূত্রাঘবোধে ক্যানেনবিস ইণ্ডিকা দ্বারা সূক্ষ্ম লব্ধ হয় । ওজাবায়ুরোগ-সংশ্লিষ্ট পক্ষাঘাতে ফফবস্ ব্যবহার্য্য । বিড়ক বায়ুসেবনে, পুষ্টিকর খাদ্য, জীবদ্রব্য জলে স্নান বা গন্ধকমিশ্রিত জলে স্নান লৌহঘটিত ঔষধ , কডলিওব অয়েল , ওপিয়াম, ও গ্যান্‌তানিজম

### কন্ডল্‌সন্স —আক্ষেপ, খেঁচুনী ।

সমস্ত শরীরের পেশীসমূহের প্রবল ও অনৈচ্ছিক আক্ষেপ বা সংকোচন, থাকিয়া থাকিয়া হয় ও তৎসঙ্গে রোগী সংজ্ঞাবিহীন হইয়া পড়ে । সময়ে সময়ে আকুঞ্চন আংশিক, ও অধিক ক্ষণস্থায়ী ; ও তৎসঙ্গে আক্রান্ত পেশী শক্ত হয়, ইহাকে টনিক স্প্যাজম বা বিশেষ আক্ষেপ এবং যাহাতে ঘন ঘন আক্ষেপ হয় ও তদবসানেই পেশীর শিথিলতা জন্মে, তাহাকে ক্লনিক বা ক্ষরিতাক্ষেপ বলে । শ্বাসযন্ত্রের বৈধানিক পীড়া, শ্বাস-কেন্দ্রে রক্তের গতি যথোচিত ভাবে না হইলে, মাড়ি বা অন্তঃস্থনলীর উদ্দীপনা, মূত্রগ্রন্থির পীড়া, আণ্ডালজিক মূত্রবোগ ও বক্তের অবিশুদ্ধাবস্থা, এই রোগের কারণ । কোন বিষয়ে



অকস্মাৎ প্রবল মনোবেগ উপস্থিত হইলেও এই রোগ জন্মিতে পাবে

লক্ষণ ।—বোগের পূর্বে লক্ষণাদি প্রকাশিত হইতে পারে আবার কোন কোন সময় পূর্বে লক্ষণাদি অনুপস্থিত থাকিয়া বোগ প্রকাশ পায় সমস্ত ঐচ্ছিক পেনী আক্রান্ত হয় বা কেবল মুখাণ্ডের পেশীতে আক্ষেপ থাকে ৩ মাসে সময়ে বেধন দেহেব একান্ত বা এক দিক আক্রান্ত হয় সার্কার-  
নিক আক্ষেপে মুখমণ্ডল বিকৃত, পাণ্ডুর বা নীলিম ; চক্ষুগোলক  
বহিঃ নিঃসৃতবৎ ; আলোকপাতে কনীনিকার বোধাভাব ; দন্ত  
কিড়মিড় ; জিহ্বা দন্ত দ্বারা দগ্ধিত বা বহিঃ নিঃসৃত অনৈ-  
চ্ছিক মলমূত্র নিঃসরণ, শ্বাসকৃচ্ছ আক্ষেপ এক বাব মাত্র  
বা ঘন ঘন হইতে পাবে, তৎপরে নিদ্রাবেশ হয় অগ্রান্ত  
প্রবল বোগেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থাকিলে সাংঘাতিক হয় না ।

চিকিৎসা ।—বোণীর গাএবঙ্গ নিখিল করিয়া দিবে  
এবং তাহাকে এবপ স্থানে রাখিবে, যেন শ্বাসসহ বিস্তৃত  
বায়ু গ্রহণের কোন বাধাও না ঘটে মস্তকে নীতল জলধারা,  
উষ্ণ জলের টবে বসাইয়া মস্তকে শীতল জলধারা বড়ের অবি-  
গুণাবস্থা বোগেব কার বণিয়া অনুমিত হইলে বাই টার্টারেট  
অব্ পটাশ ব্যবহার হিতকর ভিনিটম ভিরিড ব্যবহার করি-  
কেহ কেহ সূক্ষ্ম উপকৃষ্টি কনিসাছেন শ্বাসসহায় ১৪৬৬  
উষ্ণ জল পূর্ণ বোতল সংস্থাপন বিরেচক ও আক্ষেপনিবারণক  
এনিমা—৮২, ৮৩, ৩৬০ জিহ্বান উপরে ক্রোটন অয়েল ১ বা  
বা ২ ফোটা গিলিবাব সমর্থ্য থাকিলে এবং প্রকাশ্যে কোন  
উগ্র পদার্থ থাকা অনুমিত হইলে বমনবারণ ঔষধ—২৭৬,

২৮১ । মর্ফিয়ার হাইপোডর্মিক ইন্‌জেক্সন । বেলেডোনা ও ক্যাম্‌ফ ৪২০ ইথর ও ভেলিবিয়ান ১৩০, ১৩৫ বেলেডোনা ও ক্লোরোফর্ম ৯৫ ; ক্লোরোফর্মের আত্মা, সফেট অব্‌ এমি-  
গিন ১ গ্রেন দিনে তিনবার হাইড্রেট ক্লোরাল ৪২৪ ; মস্ক ও এসাফেটিডা ১৩৯ ; স্ট্রাণ্টোনাইন ৩৮১ ব্রোমাইড অব পটা-  
সিয়ম, আক্ষেপ-নিবারক ঔষধের সঙ্গে এমোনিয়াম আত্মা ।  
নাইট্রেট অব্‌ এমিন ২৩ ফোটা লিটে ঢালিয়া মইয়া তাহা  
আত্মা জন্ত প্রয়োজ্য

শৈশবাবিকম্প—এসাফেটিডা ও ক্লোরিক ইথর ৪২১ ;  
ক্যানেবিস ইডিকা, ক্লোরোফর্ম ও এমোনিয়াম আত্মা ; ফেবি  
পারঅক্সাইড, মস্ক—১৪, ১৩৪ । পটাসিয়াম আইয়োডিডাই—  
৪০৫, ৪০৭ ; ব্রোমাইড অব্‌ পটাসিয়াম—৪০৯, ৪২২ ; রিউটা  
গ্রাভিমোলেন্স ক্রিমি থাকিলে স্ট্রাণ্টোনাইন ৩৮১ ; একট্রাঃ  
ফেলিসস্ লিকুইড ৩৮০ ; স্প্রিট ইথরিস ও ডিঃ পোমগ্রানেট  
৩৮২ ; স্কামনী ও ক্যালোমেল ৩৫২, টর্পেন্টাইন ও ক্যাপ্টর অয়েল  
আভ্যন্তরিক ও পিচকাবী আহারের বিষয়ে সতর্কতা উফ  
জলের টবে বসাইয়া মস্তকে নীতল জলধারা পাকশয়ে অজীর্ণ  
জবা থাকিলে ইপিক্যাক বমনকারক মাত্রায় । দন্তোদ্বেদ হওয়ার  
সম্ভাবনা থাকিলে মাড়ি চিবিয়া দেওয়া উচিত পাকশয়ে অম  
থাকিলে স্যাণ্ডিসিয়া কার্ক, ড্রিস ওয়াটনের সঙ্গে হাইড্রেট  
ক্লোরাল ২৩ গ্রেন মাত্রায় এমোন ব্রোমাইড

প্রসবান্তে বিকম্প—বিবেচক ও আক্ষেপ-নিবারক ঔষধ,  
ক্লোরোফর্মের আত্মা এন্টিম টার্ট ; ক্যাম্‌ফ—১৪, ১৩৯ ;  
মর্ফিয়া ও ক্লোরোফর্ম ৯৮ ; মর্ফিয়াম হাইপোডর্মিক ইন্‌জেক্সন,

ওপিয়াম—৮৮, ১৩১, ১৩৫, ১৩৬, বেলোডানা ও ক্লোবোফর্ম  
২৫, ভেলিরিয়ান ও হামসায়ামাস ১৩০ পসর না হইতে এই  
রোগ উপস্থিত হইলে সত্বর প্রসব করান বর্তব্য মস্তকে বরফ  
ও শীতল জল তাপিন তৈলের পিচকাবি—৮১, ৮৩, ১৬২  
হাইড্রেট ক্লোবাল ৪২৪ ; বোমাইড অব্‌ পটাসিয়াম ৪২২, অথবা  
আফেপনিবাবক ঔষধেব সঙ্গে

### এপিলেপ্সী — অপস্মার, মূগী ।

এই রোগেব প্রধান লক্ষণ—সংজ্ঞা ও স্পর্শশক্তিব আকস্মিক  
বিলোপ, তৎসঙ্গে বিলম্বি আক্ষেপ ; উহা কয়েক সেকেণ্ড  
পরেই স্ববিভাক্ষেপে পবিত্র হয় । ইহাতে কেবল ত্রৈচ্ছিক  
পেশীতে আক্ষেপ হয় বোঁগাবেশ তিরোধানের পর বোঁগী  
অবসর ও অচেতন হইয়া পড়ে এই বোঁগের আবেশ সময়ে  
সময়ে হয় । কোলিক প্রকৃতি ও নিকট সম্বন্ধীয় ব্যক্তির সহিত  
পরিণয় এই বোঁগেব পূর্ববর্তী কারণ বোঁগাবেশ সমুৎপন্ন হইলে  
বোঁগী সহসা পড়িম যায় কখন কখন রোঁগাবেশ এত সহসা  
সমুৎপন্ন হয় যে, বোঁগী অস্বাভাবিক থাকিলে তাহা হইতে অবতরণ,  
অগ্নিব নিকটে থাকিলে তাহা হইতে দূরে গমন বা শয়ন করিতে  
সময় পায় না সময়ে সময়ে বোঁগাক্রমণের কয়েক মিনিট বা  
ঘণ্টা পূর্বে রোঁগী বুঝিতে পারে ও এই সকল পূর্ব সূচনা হয় ;  
যথা—দৃষ্টিবিভ্রম, নিরোবেদন, নিবোধূর্ণন, চিন্তাশক্তির বিশৃঙ্খলা,  
ভয় বোধ ও শব্দীবে একরূপ সিঁড় সিঁড় বোধ হয় উহাকে  
অরা এপিলেপ্টিকা বদে মূগাকৃতি মৃতবৎ, চীৎকার বা ক্রন্দন,  
মুখে গাঁজলা, বর্ষ শীতল, বমন ও শ্বাসকৃচ্ছ ইত্যাদি । দীর্ঘ

শ্বাস পরিত্যাগের পৰ রোগীবসান হয় । বোগাবেশ ২ ৩ মিনিট থাকে । কখন কখন ২ ১ ঘণ্টাও থাকিতে পারে ।

**চিকিৎসা** —বেলেডোনা নিম্নলিখিত উপায়ে ব্যবহৃত হইয়া উপকার লব্ধ হইয়াছে । যথা একট্রাঃ বেলেডোনা ও বেলেডোনার পত্র চূর্ণ প্রত্যেকে ১ গ্রেণ, একত্রে এক বটিকা, প্রত্যহ একবার সেব্য । রোগাবেশ দিনে বা রাত্রিতে উপস্থিত হওয়ার বিভিন্নতানুসাবে ঔষধ দিনে বা বাত্রে সেবন করিতে হইবে । এক মাস ঔষধ সেবনের পৰ প্রত্যহ দুইটি কবিনা বটীকা সেবন বিধেয় । এইরূপে ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হইবে । রোগীর অবস্থানুসাবে মাত্রা নির্ণয় করা কর্তব্য । নাইট্রেট অব্ এমিল আয়্রাণ বা মিউসিলেজেব সহিত ২ ৩ ফোটা মাত্রায়, বোগাবেশ ঘন ঘন হইলে ব্যবহার্য্য । নাইট্রেট বা অক্সাইড অব্ সিজডব ব্যবহারে কখন কখন উপকার দর্শে বোগাক্রমণের সময়ে রোগীকে শয্যাশয়ন কবাইয়া বস্ত্রাদি খুলিয়া দিবে, মস্তক উন্নত রাখিবে । বিশুদ্ধ বায়ু যাহাতে রোগী শ্বাস ধারা গ্রহণ করিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করা কর্তব্য । মস্তকে শীতল জলধারা, মুখে ও বক্ষে শীতল জলসেচন । কাহাব কাহাব এই বোগ উপস্থিত হওয়ার পূর্বে পা বা হাত মুড় মুড় কবে, এইরূপ বোধ হইলেই তথায় এবটী সূতা বা অন্ত কোন প্রকারে বন্ধন করিলে অনেক সময় বোগাক্রমণ স্থগিত থাকে তৎপরে রোগীর সাধাবণ স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল অংস্থায় থাকে তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য ষোমাইড অব্ পটাসিয়ম—৪০৮, ৪০৯ বেলেডোনা বা এট্রপিয়া ; হাইপোডার্মিক ইন্জেক্সন অব্ এট্রপিয়া ; কুইনাইন—১৯৩, ১৯৫ ; বিবিধ লৌহঘটিত ঔষধ জিঙ্কঘটিত



ঔষধ—১৯৭, ২০০, ২০৫ হাইপো ফসফাইট অব্ মোড বা  
দাইম ৪০৩। কডলিভ অয়েল, হার্মাটাইট, ইন্ডিয়ান হেম্প,  
পুষ্টিকর খাদ্য, নীতল জলে স্নান, মহাশ্রাব্য স্নান, লবণমিশ্রিত  
জলে স্নান, পৃষ্ঠবংশে বনফ আইয়োডাইড অব্ পটাশিয়াম,  
ট্রীকনিয়া অতি অল্প মাত্রায়

### হিষ্টিরিয়া ওদ্যনায়ু বোগ ।

একরূপ স্নায়বীয় পীড়া, বোগাবেশ সত্বে সময়ে হয় । বোগা-  
ক্রমণেব সময় অধিক পরিমাণে মূত্র নিঃসরণ ও ভাটার মত একটা  
পদার্থ গলা বাহিয়া উঠিতেছে বলিয়া বোধ হয় সময়ে সময়ে  
আক্ষেপ বা বিকম্প সমুপস্থিত হইয়া থাকে শ্রীলোকদেব  
যৌবনাবস্থার প্রাবল্য হইতে আর্জব বিনোদ সময় পর্যন্ত এই  
বোগাক্রম হইবার সমধিক সম্ভাবনা কখন কখন পুরুষদেবও  
এই বোগ হয় ।

লক্ষণ — বোগাশয় কালে অঙ্গাদি ও দেহকাণ্ডের  
আক্ষেপ । মুষ্টিবদ্ধ হস্ত দ্বারা বোগী বক্ষঃস্থলে আঘাত করে,  
বা নিজের কেশ বা বস্ত্রাদি ছিড়িতে থাকে চীৎকার, এন্দান,  
শ্বাসরোধবোধ বা গলাব ভিতর ভাটার শ্রাব্য এবা সঞ্চলন অল্প-  
ভব বোগাবেশ ত্রিবোধানেব সময় রোগী ক্রন্দন বা হস্ত কণ  
এবং কখন বা তৎকালে হিকা সমুপস্থিত হয় সময়ে সময়ে  
বোগী অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়া যায় আবার উত্থান  
বোগোপকম হইলে বোগী সজ্ঞান হয়, বিস্তৃতাঙ্গাবাদ ও ক্রন্দন  
করে উত্তেজনার সময় অস্বাভাবিক মূত্রত্যাগ হইতে পারে এই  
বোগ বসন্তঃ দেহেব এক দিকের বা অপরদিকের পদাঘাত জন্মিত

পাথে শরীরের বিবিধ বিধানে স্পর্শাতিশয্য হওয়ায় অত্যন্ত রোগের মধ্যে ভ্রম জন্মিতে পারে কখন কখন স্পর্শহীনতাও হয় । উহাতে দক্ষিণ অঙ্গের বাম দিক অধিক আক্রান্ত হয় ক্ষুধা কখন বর্দ্ধিত ও কখন হ্রাসপ্রাপ্ত হয় মুত্রাববোধ, অশ্রাবী, ফুসফুসচ্ছদপ্রদাহ, ক্ষয়কাস, শ্বরাভাষ, পক্ষাঘাত, অপস্মার এবং সন্ধি ও পৃষ্ঠবংশের পীড়ার সহিত ইহাব ভ্রম জন্মিতে পারে এই বোগ-জন্মিত কাস, হিকা বা বমন সময় সময় দুর্দম্য হইয়া উঠে । স্থীলোক রোগীদের ওষ্ঠ পুর ও উপবেব চক্ষুপাতা নিম্নীলিত ভাবে থাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে না ভাবিয়া সহসা উত্তর প্রদান করে আর্জবস্রাব বিশৃঙ্খলা, ও শ্বেত-প্রদব থাকে ।

চিকিৎসা ।—টিংচব নক্সভমিকা ২ মিনিম ও টিংচব ওপিয়ম ১ মিনিম, একবে দিবসে ৩৪ বাব সেবন করিলে অনেক উপকার লব্ধ হয় । মধ্যবয়সেব স্থীলোকদেব পীড়ায় মস্তকভার, মুখমণ্ডল আবক্তিম, শ্বেদনিঃসরণ, উদরাধ্বান, ও অবসন্নতা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে প্রোক্ত ঔষধ বিশেষ উপযোগী শারীরী স্থীলোকদিগেব স্থাপিণ্ডেব স্পন্দন ক্রম ও বিশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হইতে থাকিলে একোনাইট ব্যব-হাবে উপকার দশে শিবঃপীড়া বর্তমানে ঐক্টিয়া রেসি-মোডা ব্যনহাধ্য কোলোফর্ম ও গুল্মবায়ু-জন্মিত পক্ষাঘাতে কক্ষরম । কোন কোন প্রকার বোগে ভেলিরিয়া-নেট অব্ জিফ্র প্রযোজ্য । বোগাক্রমণেব সময় বোগিনীব গাএস্থ বস্তাদি খুলিয়া অথবা শিথিল করিয়া দেওয়া কর্তব্য । নোটিবী অজ্ঞানাবস্থান নিজেব শরীরে কোন আঘাত না করে,

তদ্বিষয়ে সাবধান থাকা উচিত। মুখ ও অঙ্গাদিতে পাখা দ্বারা বাতাস দিবে। এমোনিয়া কার্বনাস গ্রাণ করাইবে এবং গিলিতে পাবিলে এমোনিয়োটো টিংচর অব্ ভেলিব্রিয়ান ১ ড্রাম বা ফোটিড্ স্পিবিট্ অব্ এমোনিয়া ঘন ঘন সেবন করাইবে ও তৎসহ ব্রোমাইড্ অব্ পটাশ বা সোডা দিবে। মুখমণ্ডল, মস্তক ও বক্ষঃস্থলে শীতল জলসেচন; অঙ্গ পরিষ্কার কবণার্থ বিবেচক, ঋতুপ্রাচীর দোষ থাকিলে তাহার প্রতিফার করা কর্তব্য অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব হইলে সংকোচক ঔষধ, শীতল জলে কটিমান ও অল্প পরিমিত রক্ত-স্রাবে স্যালোজ মিশ্রিত বিবেচক, ওয়ার্ম বাথ, স্ট্রীকনিয়া ও আয়বণ, কম্পাউণ্ড ডিক্কসন অব্ স্যালোজ ও কম্পাউণ্ড আয়বণ মিক্শচর এমাফেটিডা ও নক্সভগিকা, কুইনাইন ও স্ট্রীল ১৭৬; স্ট্রীকনিয়া ও স্ট্রীল ১৭৩, ১৭৮, ১৮৮, ২০৪, ২০৫ জিফ ও নক্সভগিকা ২০৫; ফস্ফেট অব্ আয়বণ—১৮৭, ২০৭; হাইপো ফস্ফাইট্ অব্ সোড ৪০৩; ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়াম—৪০৮, ৪০৯, ৪২২। কঙ্কলিভন অয়েল; ভেলিব্রিয়ান ও ইথর ১৩০; ফস্ফেট অব্ জিফ ও আয়বণ ৪২৯, ভেলি ব্রিয়ানেট অব্ জিফ ২০৫। পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ বায়ুতে পাদচারণ, সহজ ধারায় স্নান, গ্যালভানিজম।

### ক্যাটালেপ্সী।

ইচ্ছা ও জ্ঞানের আকস্মিক স্তম্ভন; ইহাতে বোগী রোগা-ক্ষয়কালে যেকোন ভাবে মগন কনিয়া থাকে, ঠিক তদ্রূপ ভাবেই থাকে নিজে নিজে অবস্থানের পরিবর্তন করিতে

পাবে না । বোগাক্রমণ কয়েক মিনিট হইতে কয়েক ঘণ্টা বা এক জুই দিবস থাকিতে দেখা যায় রোগী সহসা রোগবিমুক্ত হয় ও রোগবেশকালীন কোন বিষয় স্বাভাবিক ক্রিয়া বলিতে অসমর্থ হয় অগাধ ব্যক্তি অপেক্ষা স্নায়ুপ্রধান ও গুণবান রোগগ্রস্তা নাবীগণ এই বোগে অধিক আক্রান্ত হয় ইহাতে কোনরূপ বিপদাশঙ্কা নাই মস্তিষ্কের প্রাচীন কোমলতা বা তাহাতে অর্জুদ না থাকিলে এই পীড়ার পরিণামে সংশ্রাস বা বাতুলতা জন্মিতে কদাচ দৃষ্ট হয় ।

চিকিৎসা । - হিষ্ট্রিবিয়া রোগেব স্থায়

### কোরিয়া—তাওব ।

এই পীড়ায় ঐচ্ছিক পেনী সমূহ বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও অঙ্গুল পেনী সকল বিশৃঙ্খল, সঙ্কল্প ও হাশ্বজনকভাবে সঞ্চালিত হয় । আক্রান্ত পেনীবর্গ সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছায়ত্ত থাকে না । বালিকাদেব—৬ হইতে ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই রোগ জন্মিতে পারে । কখন কখন ইহা বালকদেবও হইয়া থাকে ।

লক্ষণ । —প্রারম্ভে মুখমণ্ডলেব পেনী সমূহেব সাংঘাত্য স্বরিত আক্ষেপ জন্মে, ক্রমশঃ সমস্ত ঐচ্ছিক পেনী আক্রান্ত হয় । বোগী স্তম্ভিত ভাবে থাকিতে অসমর্থ হয়, কিন্তু সঞ্চরণ কতক পৰিমাণে ইচ্ছায়ত্ত থাকিতে দেখা যায় । সতত হস্ত, বাহু ও সমস্ত সময় জড়নাদি অবিনত সঞ্চালিত হইতে থাকে । মুখাকৃতি বিকৃত ও কুঞ্চিত এবং শূন্যতাব্যঞ্জক । প্রকৃতি উগ্র, ক্ষুধা বিশৃঙ্খল, সাংঘিক কোষ্ঠবদ্ধ । শরীরেব এক দিক, অপরদিক অপেক্ষা অধিক আক্রান্ত হয় নিজাকালে পেনীব বিশৃঙ্খল



সঞ্চালন স্থগিত থাকে স্ববেষ্ট বা স্বদাস্তবিন্যাস প্রদাহ সংঘটিতে পারে এই দীড়ার মাজ, পূর্ক্স যা পাবে বাত জ্বর উপস্থিত থাকিতে পারে এই বোগ কদাচ অপস্মাবে পরিণত হয়

চিকিৎসা — বাতবোগ বিমিশ্রিত থাকিলে এক্টিয়া বেসিমোজা উপকারী, কিন্তু এতদপেক্ষা আর্মেনিক শেষ্ঠ অমিশ্রিত বোগে আর্মিনিক বিশেষ উপকারী প্রবঃ চৈনিক সঞ্চালন বঃ ৩ঃ নিদ্রাব ব্যাঘাত জন্মানে রোবাল বা সরাফোনাল ব্যবহার্য্য নিদ্রাব ব্যাঘাত হইলে মর্ফিয়াব অধম্মাচ প্রমোপ ভিবেট্রম ভিবিউও ব্যবহৃত হয় পুষ্টিবর খাদ্য, নীতল জলে স্নান, ব্যায়াম, স্নানসিদ্ধ উৎকর্ষ নং হয় এক্ষণে উপস্থাপন। অল্প পৰিষ্কার ববণার্থ বিবেচক ও স্ত্রীলোক হইতে ঋতু সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য স্কাঙ্কেবেটেড্ কার্বনেট অব্ আয়রন ; ষ্টীল ও এমোনিয়া ১৮০, ১৭৮ ষ্টীল ও আর্মিনিক ১৮৯, ১৯১ ; অক্সাইড অব্ জিঙ্ক , কঙ্কলিভর অয়েল ১৯২, ৪১০ ভেলিবিয়ানেট অব্ এমোনিয়া ১৩০ ; ক্যাঙ্কোবাবিণ্, নাই-ট্রেট অব্ সিণ্ডব ২০২ ; ফিবস রিডব্টম্ ২০৪ ভেলি রিয়ানেট বা সরাফট অব্ জিঙ্ক ১৯৭, ১৯৮, ২০৫ বেঙ্ক-ডোনা ৯৫ ১৪৩, ট্যানবিস ইণ্ডিকা ৯৮, স্কাঙ্কোনিম্ম স্ত্রীক্নিমা ১৬, ১৭, ১৮, ১৯৫, টপেন্টাইন ; এমাফেটিডা ; ক্যাঙ্কব ও মস্ক ১৪ কোবোফর্ম ইন্হেগেসন, মস্কর বাণ, পৃষ্ঠবংশে ব্লিষ্টাব, গ্যালভানিডম

## টেটেনস—ধনুস্তম্ভ ধনুর্ঘটংকার ।

কতকগুলি ঐচ্ছিক পেশীর বহুক্ষণস্থায়ী আক্ষেপ বা আকুঞ্চন ।  
 আক্রান্ত পেশীর কণ্ঠস্থ অবিবর্ত থাকে ; তদ্ব্যতীত এইকণ  
 আক্ষেপকে বিলম্বি আক্ষেপ বা টনিক স্প্যাজম্ বলে । আঘাত-  
 জনিত ধনুর্ঘটংকার অপেক্ষা স্বয়ম্ভূত বোগ স্মৃতিকিৎস্ত বিষমাত্ম্য  
 ক্রীক্ৰিয়া ব্যবহার করিলে এই পীড়ার অনুরূপ লক্ষণাদি প্রকা-  
 শিত হয় ।

লক্ষণ ।—বোগ সহসা সমুপস্থিত হয়, গলা ও হনুর  
 পেশী প্রথমেই আক্রান্ত হইয়া থাকে । বোগী সর্দি হওয়ার  
 অনুবোগ কবে এবং গলাবেদনা ও গ্রীবা আড়ষ্ট হইয়াছে  
 বলে কিন্তু অসুখ ও আড়ষ্টতা ক্রমশঃ বর্জিত হইয়া জিহ্বা-  
 মূল আক্রান্ত হওয়ার গলাধঃকরণে কষ্ট হয় । শব্দাদেশস্থ ও  
 চর্কণ ক্রয়ানুসঙ্গিক পেশী সকল ক্রমশঃ আক্রান্ত হয়, তদ্ব্যতীত  
 বোগী মুখ ব্যাদান করিতে পারে না । বোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে  
 মুখমণ্ডলের অবশিষ্ট পেশী এবং দেহকাণ্ড ও শাখা সমূহের পেশীও  
 ব্যাদিগ্রস্ত হইয়া পড়ে আক্ষেপ অবিরাম থাকে, কেবল  
 কোন কোন বোগীর নিদ্রাকালে উহার বিরাম দৃষ্ট হয় আক্ষেপ  
 ১৫ মিনিট বা অর্ধ ঘণ্টান্তর প্রবলতরভাবে হইতে থাকে ; ক্ষ-  
 য়েণ পূর্বে উহার আংশিক বিবর্ত জগো পৃষ্ঠদেশের সবল  
 পেশী সমূহ আক্রান্ত হইলে দেহ ধনুকাকার হয় এবং তদ্ব্যতীত  
 বোগী কেবল মস্তক ও শূলফদেশে ভব দিয়া শয়ন করিয়া  
 থাকে ; এতদূর আক্ষেপকে অকিস্থোটেইনিস্ বলে । যখন  
 গীবা ও উদরের সবল পেশী আক্ষেপ বলতঃ দেহ সম্মুখদিকে বক্রী  
 হইয়া যায়, তখন তদূর আক্ষেপকে এস্ত্রস্খোটেইনিস্ বলে । দেহ

কোন এক পার্শ্বে বক্রীভূত হইলে তাহাকে প্লুরম্‌থোটোনস্ বলে। এই রোগে রোগী সমূহ যন্ত্রণা ভোগ করে। মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, ক্র কুঞ্চিত, কপালের চর্ম আকুঞ্চিত ; চক্ষু স্থির ও উন্নত এবং কখন কখন অশ্রুপূর্ণ, নাসাবন্ধু প্রসারিত ; মুখের কোণ পশ্চাদ্দিগে আকর্ষিত, দন্ত দৃশ্যমান, শ্বাস কষ্টকর, বস্তুস্থিতে তীব্র বেদনা। সাতিশয় ভূষণ কিন্তু গলাধঃকরণেব চেষ্টা করিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত, চর্ম স্বেদাভিষিক্ত। রোগী নিজা যাইতে পারে না ; কেবল কয়েক মিনিটের জন্ত তুল্যবিষ্ট হয়। বুদ্ধিবৃত্তি পবিশ্রাব ও অনাক্রান্ত থাকে। তৃতীয় ও পঞ্চম দিবসেই সাধারণতঃ মৃত্যু সংঘটিত হয়। অবসন্নতা ও শ্বাসাবরোধ দ্বারা মৃত্যু হয়।

চিকিৎসা। নাইটেট্ অব্ এফিল আয়ড্ কবাইলে উপকার দর্শিতে পারে। ক্যালোবাব বন সেবন কবাইতে না পাবিলে উহার তবণ সাবের অধস্তাচ প্রক্ষেপ বা মলদ্বারে পীচকারি দেওয় যাইতে পারে। কিন্তু শ্বাসাবরোধ না জন্মে তৎপ্রতি দৃষ্টি বাধিতে হইবে। আঘাতজনিত ধনুষ্টংকার রোগে ক্ষতের অবস্থা পবিদর্শন করিয়া, যদি তদভ্যন্তরে কোন প্রবাব শল্য বা বাহুবন্ত বর্তমান থাকে, তবে তাহা বিদূষিত ও ক্ষতের চিকিৎসা কবিবে। শ্বাসুতে আঘাত লাগিলে আঘাতিত স্থানের উপবিভাগে উক্ত শ্বাসু দিবিক্ত করা উচিত। কোষ্ঠ পরিধান-করণার্থ ক্যালোমেল ও জেলাপ আক্ষেপ নিবারণার্থ হাইড্রেট ক্লোবাল ৪২৪ বোমাইড অব্ পটাশিয়ম ও ভেতি নিয়ান ৪ ৮, ইহার সঙ্গে অর্ধ গ্ৰেণ মাত্রায় একট্রা বেলেডোনা, ক্লোরোফর্ম ইন্‌হেলেশন ; লাইকব এণ্‌পীমান অধস্তাচ প্রক্ষেপ ; উরানার সব্

কিউটিনিয়স পীচকারি নাইকোটিন্ ১ ফোঁটা মাত্রায়, ক্যাল-  
বারবিন্ চূর্ণ ১—৩ গ্রেণ মাত্রায়। বেলডোনা বাহ্যিক ও আভ্যন্ত-  
রিক। কোনিয়ম, ইণ্ডিয়ান হেম্প পৃষ্ঠবংশে অধিক কাচ পর্য্যন্ত  
বনফ সংলগ্ন করিয়া বাখা, ও ওপিয়ম স্মোকিং বা গুলির ধূমপান  
হিতকর। বে গীকে নিস্তরু ও অন্ধকান গৃহে রাখিবে ও তাহার  
নিকট বেলী লোক যাতায়াত কবিত্তে দিবে না এবং তবল পুষ্টিকর  
খাদ্য দিবে।

### সিপ্লেস্মেন্স—অনিদ্রা, নিদ্রাভাব।

অনিদ্রা সদা সর্বদা উন্মাদ রোগের পূর্বরূপ। সাধারণতঃ  
উন্মাদাবস্থায় অনিদ্রা হওয়ার লক্ষণাদি বর্জিত হয় বাতুলদের  
নিদ্রা হওয়ার ইচ্ছা বিলুপ্ত হয় সময়ে সময়ে স্বপ্ন দর্শন হেতু  
বোগী নিদ্রা ঘাইতে ভীত হয় বিপুল উদ্দীপনা, মানসিক উৎ-  
কর্ষা, বিবিধ তবণ পীড়া, অজীর্ণ, হৃৎপিণ্ড ও রক্তাধারের পীড়া,  
গর্ভাবস্থা, কামল (বক্ত বিধাত্ত হইলে সময় সময় তন্দ্রা অন্তে)  
প্রভৃতি কারণে নিদ্রাব ব্যাঘাত সমুপস্থিত হয়

চিকিৎসা।—ক্রেটন ক্রোবাণ ৫—১০ গ্রেণ মাত্রায়  
প্রযুক্ত হইতে পারে। স্পিনিট ক্রোবোফর্ম পূর্ণ মাত্রায়। হায়সায়াম-  
মাস ১০৪ ; ট্রামোনিয়ম ১০৬ ; হপ ; ইণ্ডিয়ান হেম্প , মর্ফিয়া  
ক্রোরোফর্ম ও হেম্প ৯৮ ; ওপিয়মের এনিমা ও মপোজিটরী ১৬৩,  
১৬৪, ১৬৬। মর্ফিয়া আভ্যন্তরিক ও উর্হাব অধস্তাচ পীচকারী।  
হাইড্রেট অব ক্রোবাল ৪২৪ , ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম বা সোডি-  
য়ম—বেলেডোনা বা হায়সায়ামাসেব সঙ্গে অনিদ্রাব কাব-  
জানিতে পারিলে সর্বোপে তাহাই বিদূষিত করা কর্তব্য বোষ্টরক



থাকিলে বিরেচক ; বুকজ্বালা ও পাকায়সে অল্প থাকিলে বিসমথ, সোডা বা ম্যাগ্নিসিয়া, শিরঃস্রাব মস্তকে শীতল জলপটী ; দৌর্বল্যে পোর্টওয়াইন, ও অত্যন্ত বলকবোধ ; শরীর উষ্ণ থাকিলে শয়নের সময় শীতল জল বা সোডা ওয়াটার এক গ্লাস, উষ্ণ জলে পদ ধোও কবা, চক্ষে উপরে জলের পটী প্রত্যহ বিশুদ্ধ বায়ুতে ব্যায়াম, পথ্য লঘু হওয়া উচিত, অজীর্ণ না হইতে পাবে তজ্জন্ত বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন সলফোনাল ৮—১০ গ্রেণ মাত্রায় উষ্ণ জলে গুলিয়া শয়নের এক ঘণ্টা পূর্বে সেব্য শয়নের পূর্বে এক গ্লাস শীতল বা ঈষৎ উষ্ণ জলপান প্যারলডিহাইড উৎকৃষ্ট নিদ্রাকারক

### হাইপোকণ্ড্রিয়েসিস—অবসাদবায়ু ।

সর্বদা এই রোগের সঙ্গে কোন কোন যন্ত্রের ক্রিয়াবিকাৰ ও সময় সময় বিধানবিকাৰ বর্তমান থাকে সাধারণতঃ পরিপোষণ ও জননযন্ত্রের ক্রিয়াব ঈদৃশী অবস্থা জন্মে বোগী অমূলক ও কল্পিত অনিষ্টপাতের আশঙ্কা কবে উহারা অন্তঃ কতক সময় পর্যন্ত কর্তব্যকর্ম প্রকৃতিস্থ ভাবে কবে, কিন্তু অত্রের কার্য ও মত সম্বন্ধে সাতিশয় বোধাতিশয় প্রকাশ কবে আভ্যন্তরিক পীড়া, ধবজভঙ্গ, উন্মাদ ও মৃত্যুভয়ে আশঙ্কিত হয় । কোন কার্যে মতি স্থির থাকে না বক্তৃ সঞ্চালন মৃদু, ও দন্ত শিথিল হয় এই রোগ প্রকৃষদেরই অধিক হয়

চিকিৎসা ।—ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়ম ব্যবহাবে সুফল উপলব্ধি হয় কোষ্ঠ পরিষ্কারকবর্গার্থ বিবেচক ঔষধ ব্যবহার না করিয়া সুপথ্য ও ব্যায়াম দ্বারা উক্ত ক্রিয়া সংসাধনের চেষ্টা করা

কর্তব্য । রক্তহীনতা বর্তমানে কুইনাইন ও লৌহবীজিত ঔষধ—  
১৭২, ১৭৩, ১৭৬ । ষ্ট্রীকনিয়া বা নক্স-ভমিকা—১৬, ১৭, ১৮৮,  
১৯৫, ২০৪, ২০৫ ফস্ফেট অব্ জিঙ্ক ও আয়রন ৪২৯ ; হাই-  
পোফস্ফাইট অব্ সোডা বা লাইম, ৪৩০ ; ফস্ফেট অব্ আয়রন  
১৮৭ ; নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ ডিল ; কডলিভ অব্ অয়েল ;  
এসাফেটিডা ; মস্ক ১৪, ১৩৯ । সহস্র ধাবায় মান ; সমুদ্রের  
জলে মান, পুষ্টিকর খাদ্য, ও বিশুদ্ধ বায়ুতে ব্যায়াম লাইকব  
আর্সিনিকেলিস ও টিংটাল ।

### নিউরাইটিস—শ্বাসপ্রদাহ ।

শ্বাসের প্রদাহ কদাচ উপস্থিত হয় । আঘাত ও তজ্জনিত  
ক্ষত হইতে বা ধমনী বন্ধন কালে শ্বাসজড়িত হইলে শ্বাসে প্রদাহ  
হইতে পারে । বাতরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের আপনাপনিও এই পীড়া  
জন্মিবার সম্ভাবনা । অবিরত তীব্র বেদনা, শ্বাসের কাণ্ড ও শাখাদি  
পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে ; জ্বর ও অস্থিরতা । প্রাচীন প্রদাহে শ্বাস-  
শূলেব অনুরূপ লক্ষণাদি প্রকাশিত হয় ।

চিকিৎসা ।—আইয়োডাইড অব্ পটাশিয়াম—৩৯৯, ৪০১,  
৪০৪ । কলচিকম ; একোনাইট স্থানিক বেলডোনা লিনি  
মেন্ট, ওয়াটব ড্রেসিং, লিনসিড্ পুলটাস । পুরাতন প্রদাহ  
কুইনাইন ও ব্রিষ্টাব ফোমেটেসন, মর্ফিয়াব অধস্তাচ প্রক্ষেপ

### নিউরাল্জিয়া শ্বাসশূল ।

শ্বাসের কাণ্ড বা শাখাতে প্রবল বেদনা হয়, উহা থাকিয়া  
থাকিয়া উপস্থিত বা প্রকুপিত হইয়া থাকে । মস্তক, দেহ-

কাণ্ড বা শাখাস্থিত স্নায়ুবার্গ আক্রান্ত হইতে পারে প্রোক্ত স্থান সকলের চর্মেব অব্যবহিত নিম্নস্থ স্নায়ুগণই অধিক আক্রান্ত হয়

প্রকার ভেদ । পঞ্চম যুগ্ম স্নায়ুর শাখাতে বেদনা সমুপস্থিত হইলে তাহাকে টিক্‌ডলর ; সপ্তকেব এক পার্শ্বেব স্নায়ুতে বেদনা হইলে তাহাকে অর্দ্ধাভেদক বা হেমিক্রিনিয়া ; এবং বজ্রগ-দেগস্থ সিয়াটিক স্নায়ুতে বেদনা জন্মিলে তাহাকে সিয়াটিকা বলে । কেহ কেহ হুংশুল ও পাকাশয়েব শূলকে এই প্রকার স্নায়ুশূলেব অন্তবর্তী মনে কবেন

৫ম যুগ্মস্নায়ুর তিনটী শাখাই এই বোগে আক্রান্ত হইতে পারে যখন বেদনা প্রথম অর্থাৎ চক্ষুস্থ শাখার ( অপথালমিক ) অস্থস্থতা জনিত হয়, তখন স্প্রো অর্কিট্যাল স্নায়ু সাধাবণতঃ বেদনান্বিত হইয়া থাকে এবং তদ্ব্তে কপালে বেদনা হয় ২য় বা স্পীবিয়ব ম্যাক্‌জিলায়ী স্নায়ুতে পীড়া হইলে ইন্‌ফ্রাঅর্বিটেল স্নায়ু সর্বত্র আক্রান্ত হয় তাহাতে কপোলদেশে, নিম্ন চক্ষুপাতায়, নাসাপুটে ও ওষ্ঠে তীববেধবৎ অসহ বেদনা সমুপস্থিত হয় ৩য় শাখা অর্থাৎ ইনফিরিয়র ম্যাক্‌জিলায়ী স্নায়ুতে বোগ জন্মিলে অধর, মাড়ি, দন্ত, চিবুক ও জিহ্বাব পার্শ্বে বেদনা হয় যে কোন স্নায়ু আক্রান্ত হউক না কেন, বেদনা প্রায়ই মুখমণ্ডলেব এক দিকে আবদ্ধ থাকে এই বোগ সহসা উপস্থিত হয় বেদনান্বিত স্থান রোগী হস্ত দ্বাবা চাপিয়া ধবে । বেদনাব ক্রমঃ বৃদ্ধি হয় ; ছুরিকাবেধ ও জ্বালাযুক্ত বেদনা বোধ হইয়া একটু পবেই বেদনা উপশান্ত হইয়া থাকে রোগাক্রমণের পূর্বে পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়া-

বিশৃঙ্খলা, শ্বাসকৃচ্ছ, অল্প শীত পরে উষ্ণতা প্রাচুর্য হইয়া।  
কখন কখন কয়েক সপ্তাহ বেদনা তীব্র হইয়া উঠে এবং  
আবাব কয়েক দিন পর্যন্ত অবিবর্ত বেদনার প্রকোপ উপ-  
স্থিত হয় অজীর্ণ, রক্তহীনতা, মুণ্ড্যস্ত্রের গীড়া, মুখদেশস্থ  
অস্থির গীড়া, মস্তিষ্কের যান্ত্রিক গীড়া, এবং দন্ত ও মাড়ীর  
রোগ জন্মে।

অন্ধাবভেদক।—একপার্শ্বের জ্ঞ ও কপালে বেদনা,  
তৎসঙ্গে অনেক সময় বমন হয় এই রোগ সময়ে সময়ে  
উপস্থিত হয়।

সিয়াটিকা বা গৃধ্রসী —সিয়াটিক স্নায়ুতে তীব্র বেদনা  
জন্মে; এই বেদনা বক্ষের দোহাইতে আরম্ভ হইয়া পশ্চাদ্ভাগ দিয়া  
পদ পর্যন্ত গমন করে প্রদাহ, বাত, উপদংশীষ বিষ, দুর্ঘ্রিত বায়ু,  
সর্পিণ্য ক্লান্তি, শৈত্য ও অর্জিতা এবং কোষ্ঠবদ্ধ—এই গীড়ার  
কারণ মধ্যে পবিগণিত

চিকিৎসা।—ক্যাম্পিকমেব উগ্র ফাণ্ট লিণ্টে  
ভিজাইয়া স্থানিক প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে ক্লোরাল  
ও ক্যাম্ফর সমভাগে মিশাইয়া স্থানিক মর্দনে বেদনা উপশান্ত  
হয়। ক্লোবেট অব পটাশ মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল প্রযোজ্য। ২৩  
ফোটা ক্লোরোফর্ম তুলায় কবিয়া কর্ণকুহরের মুখে দিয়া  
বাঁধিলে দন্তশূল ও মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল ৩ বোটা হয় এন্টারিন  
ক্লোরাল ও গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগে মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, ও তড়িগ  
গ্রীবা, মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ ও জবাযুব স্নায়ুশূলে উপকার দর্শে  
ইথর স্প্রে জেলসিনিয়ম—দন্তশূলে বিশেষ উপকারী আই-  
ডোফর্ম ও ক্লোরোফর্ম স্থানিক ওলিয়েট অব মর্ফিন।



নাইট্রেট অব্‌ এমিলেব আভ্রাণ। ফস্ফবস ১১০ হইতে ১২০ গ্রেণ প্রতি তিন ঘণ্টান্তর সকল প্রকার স্নায়ুশুলেই প্রয়োগ করা যাইতে পাবে ক্যামোমাইল ; আর্গট ; থ্র্যামোনিয়ম , কোনা-য়ম ; ভেলিবিয়ানেট অব্‌ জিঙ্ক বা এমোনিয়া বোগের কাবণ বিদূষিত কবিবার চেষ্টা সর্ব প্রথমে কবিবে। সার্কাস্টিক স্বাস্থ্যোন্নতি বিধায়ক ঔষধাদি ব্যবস্থা করিবে মৃদু বিবেচক ম্যালোজ, ৩২৭, ৩৪০ ক্যাপ্টর অয়েল ৩২৯ ; বিয়াই ও সেনা ৩৩২ ; কলসিহ ও ক্যালোমেজ ৩৪৪ , পডফি-লিন ৩৪৭ ; পিল রিয়াই কম্পাউণ্ড ও নক্সভমিকা ৪৬৯ বিবে-চক এনিমা ৩৬০ লৌহঘটিত বলকবোধধ কুইনাইন ও ষ্টীল ১৭৬ ; আয়বণ ও নক্সভমিকা বা স্ট্রীকনিয়া ১৭৩, ১৮৮, ১৯৫, ২০৪, ২০৫ পেপ্সিন ৪১৭ ; রিউবার্ব ও ইপিক্যাক। পাকা-শয়ে অগ্ন জন্মিলে অগ্ননাশক ঔষধ ইহাব সঙ্গে বাতরোগ সংশ্লিষ্ট থাকিলে আইয়োডাইড অব্‌ পটাসিয়ম ; একোনাইট ; আর্নিকা ও কলচিকম ম্যালেবিষাজনিত বোগে কুইনাইন ১৬৭, ১৯৩, ১৯৪ ; আর্সিনিক ১৬৭, ১৮৯, ১৯১ ; জিঙ্ক ঘটিত ঔষধ ১৭৯, ১৯৮, ২০০ ফস্ফবস প্রায় সকল প্রকার স্নায়ু-শুলে উপকার কবে ভেলিবিয়ানেট অব্‌ এমোনিয়া ১০ ২০ গ্রেণ মাত্রায় ইনফিঃ ক্যালম্বাব সঙ্গে , ক্লোরাইড অব্‌ এমোনি-য়ম ৩০ গ্রেণ মাত্রায় সিয়াটিক নামক স্নায়ুশূল বোগে মার্করী ; আইয়োডাইড অব্‌ পটাসিয়ম ; ক্রোটন অয়েল প্রভৃতি উগ্র বিবেচক ; কডলিওর অয়েল ; আয়বণ , সলফেট অব্‌ সোডা আয়রনের সঙ্গে ফেসিয়াল নিউরালজিয়া রোগে ক্ষয়িত দন্ত থাকিলে তাহা তুলিয়া দিবে। বেলডোনা, একোনাইট, ভিরে-

টীয়া বা ওপিয়ম স্থানিক প্ৰয়োজ্য ১১৪, ১২৫, ১২৭, ১২৯, ১৫২, ১৫৩ ব্লিষ্টাৰ দিয়া তৎস্থানে মৰ্ফিয়া চূৰ্ণ ছডাইয়া দিলেও বেদনাব উপশম হয় মৰ্ফিয়া ও এটু পিয়ার অধস্তাচ প্ৰক্ষেপ। সিমাটিকা নামক স্নায়ুশূলে ইহা বিশেষ উপকাৰী আৰ্শিনিক ৬% গ্ৰেণ; এটুপিন ৬% গ্ৰেণ, জল ৫ মিনিম একত্ৰে হাইড্ৰো-ডৰ্মিক পিচকাৰি শীতল বা ঈষদৃষ্ণ জলে স্নান, বেদনানিবারক ঔষধ দ্বাৰা মৰ্দ্দন। বোগীব যাতনা আশু নিবারণার্থ নিম্নলিখিত ঔষধ প্ৰয়োজ্য ইথৰ বা ক্লোৰোফৰ্ম ইন্থেলেশন; হাইড্ৰেট ক্লোৰাল; স্পিৰিট ইথৰ; মৰ্ফিয়া, ষ্ট্ৰামোনিয়ম; বেলেডোনা; কোনিয়াম; ব্ৰোমাইড্ অব্ পটাশিয়ম প্ৰভৃতি ঔষধ সেবনার্থ নিধান কৰিবে কুইনাইন ও বেলেডোনা; সলফেট অব্ বিবিন্নিয়া; স্ত্ৰালিসিন প্ৰভৃতি ৬ গ্ৰেণ কোকেইন হাইড্ৰো-ক্লোৰাস পবিত্ৰত জলে দ্ৰব কৰত অধস্তাচ প্ৰক্ষেপ এন্টি-পাইবিণ, ফিনাসিটিন, এক্সালজিন প্ৰভৃতি প্ৰয়োগে উপকাৰ দৰ্শিয়াছে। দন্তমূলেৰ, স্নায়ুশূলে জেনসিমিমম উপকাৰী

ডিজিজেন্ অব্ দি অৰ্গান্ অব্ ৱেস্পিৰেগন

( শ্বাসযন্ত্ৰেৰ পীড়া )

ক্যাটাৰ—সৰ্দি

নাসিক্ৰু ও বায়ুনলীৰ কতক অংশৰ প্ৰকৃতিক বিঘ্নীতে প্ৰদাহ হয় বায়ুনলী-ভ্ৰুজ-প্ৰদাহ হইলে তাহাকে ব্ৰংকাইটিস বলে। নাসিকা ও গলাৰ শ্লেষ্মিক বিঘ্নী আক্ৰান্ত হইয়াই মচৰাচৰ সৰ্দি প্ৰকাশিত হয়

লক্ষণ । —গাএগুরুতা, অঙ্গে বেদনা, পৃষ্ঠে কক্ৰণে

বদনা, কপালে টানবোধ, নাক দিয়া অত্যন্ত শ্লেষ্মা নিঃসরণ, মতিশয় অশ্রুস্রাব, স্বরভঙ্গ, গলাবেদনা। সমল জ্বিহ্বা, অল্প বা মধিক জ্বভাব, তৃষ্ণা, ক্ষুধাভাব ও নাড়ী দ্রুত ৪৮ খণ্টা পরে লক্ষণাদি তীব্রোহিত হইতে থাকে অথবা উহা তালুপার্শ্ব শ্বি, স্নায়ুনলী-ভুজ ও ফুসফুস প্রদাহাদি বোগে পবিণত হইতে পারে।

চিকিৎসা।—টিংচন একোনাইট ও ভাইনম এন্টিমোনি-  
য়নিস অল্প মাত্রায় শিবঃপীড়া, পেশীর কাঠিগু ও অস্থিতে  
লগ্নকণে বেদনা বর্তমানে এক্টিয়া বেসিমোজা ব্যবহার্য্য  
ক্লাবেট অব্ পটাশ ক্লোবাইড অব্ এমোনিয়ম প্রাচীন অবস্থায়  
গাইকর এমোনিয়া এসিটেটীস ২৮২, ২৮৩, ২৮৪; এমোনিয়া  
৪ বার্ক ৩০১, ৩১০। স্প্রিঃ ইথরিস নাইট্রোসাই—২৮৪, ২৮৯,  
পিক্যাক ২৭১ ২৮৭, ২৯৯, ৩০৪, ৩০৯, ৩১২ ইনফিঃ  
লেনাই ৩১২, ২৮৭, ওপিয়ম ৮৮, ৯০, ১০৩, ২৯৭ লাইকব  
টাশ ও সিলি ৩০৫, ৩০৬, ৩০৮, ৩১০, ৩১৬, ৩১৭। সোডা বাই-  
কার্বোনেট; জেমস্ পাউডর; ফুট বাথ বা ঈষদুষ্ণ জলে পদধোত  
লগ্ন, মৃদু বিবেচক; শয়নকালে ক্লোবোফর্ম ২ ফোঁটা, ও  
লেকুইড একষ্ট্রাক্ট অব্ ওপিয়ম ৫ ২০ মিনিম সেবন কবাইবে  
গাণ্ডি ও ঈষদুষ্ণ জল। আইয়োডিন ভেপার আঘ্রাণ জলীয়  
দার্থ এককালে পবিবর্জন সর্দির প্রথম অবস্থায় শয়নকালে  
ডাভর্স পাউডর ৫ বা ১০ গ্রেণ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে  
পূর্ব আঘ্রাণ ও সেবন উপকারী কোকেইন হাইড্রোক্লোরাস  
গ্রেণ, মেথল ২ গ্রেণ, স্যালিসিলিক এসিড ৫ গ্রেণ, বোবিক  
এসিড ১ ড্রাম, মার্শম্যালো চূর্ণ ২ ড্রাম একত্রে মিশাইয়া নস্ত্ররূপে

প্ৰয়োগ হিতকৰ লেবুৰ বসেৰ নশ্ৰুও উপকাৰী লাইকব এটুপিয়া ১ মিনিম মাত্ৰায় অথবা টিংচাৰ বেলেডোনা ২৩ মিনিম ব্যবহাবে বেশী সৰ্দি পড়া কমে ।

## ক্লিনিক ইনফাৰ্মেশন্ অব্ দি নষ্ট্ৰিল্‌স্ বা ওজিনা ।

( নাসাবন্ধুৰ পুৰাতন প্ৰদাহ । )

সৰ্দি অধিকদিন স্থায়ী হইলে নাসাবন্ধুৰ ওচীন প্ৰদাহ হয় । বিশেষতঃ বাত ও গণ্ডমালা ধাতুপ্ৰকৃতিক ব্যক্তি, উপদংশ বিষ, ফোটক, ক্ষত, অস্থিক্ষত বা নাসাবন্ধু বাহ্য বস্তুৰ সংস্থান আদি দ্বাৰা এই ৰোগেৰ উৎপত্তি হয়

লক্ষণ ।—সাধাৰণ সৰ্দিৰ লক্ষণ, নাক বন্ধ ও অস্থখবোধ, শ্লেষ্মিক বিল্লী ক্ষীত, শিৰোবেদনা অধিক পৰিমিত ও ছুৰ্গন্ধ শ্লেষ্মামিশ্ৰিত পুয়স্ৰাব, তৎসঙ্গে সময় সময় বক্ত মিশ্ৰিত থাকে শ্লেগা শুক হইয়া নানাবন্ধু মামডী পড়ে উহা নাকে থাকিলে পচিয়া ছুৰ্গন্ধ হয় নাসাবন্ধুদ্বয়-ব্যবধায়ক-গ্ৰাটীৰ বখন কখন পচিয়া যায় বা কখন কখন উহা ছিদ্ৰীভূত হয় অস্থি ক্ষত বা শাটত হইতে পাৰে দেহে উপদংশবিষ বৰ্ত্তমানই এতাদৃশ ঘটনা হয়

চিকিৎসা ।—এসিটেট অব্ এলিউমিনাব ধৌত দ্বাৰা ধাৰা দিলে উপকাৰ হয় গ্লিসিৰিন অব্ ট্যানিন স্থানিক স্যালম, জিঙ্ক, পাৰমান্গানেট অব্ পটাশ, বোবিক এসিড প্ৰভৃতিৰ ধাবন দ্বাৰা পিচকাৰী নাইট্ৰেট অব্ মাৰ্কবী অয়েণ্টমেণ্ট ১ ভাগ, মোমেব মলম ৬ ভাগ, একত্ৰে নাসাবন্ধু সংলগ্ন কৰিবে গ্লিসিৰিন



অব্ কার্বলিক এসিড ; বিসমথ ; ক্রোবেট অব্ পটাশ ৩০ গ্রেণ  
ও মার্কবা অর্ধ আউন্স ; বেড অক্সাইড অব্ মার্কবী ৫ গ্রেণ  
ও মার্কবা এক আউন্স স্থানিক প্রয়োজ্য । সেবনার্থ কুইনাইন  
ও আয়রন ; নাইট্রোগিউবিয়োটিক এসিড ও বার্ক ; ষ্টীল ও  
আর্সিনিক—১৮৯, ১৯১ কডলিভ অয়েল ; পুষ্টিকর খাদ্য  
ব্লুপীল ও বিউবার্ভ গগুমাল ধাতুপ্রকৃতিক লোকদেব পক্ষে  
আইয়োডাইড অব্ আয়রন ; আইয়োডিন ; আর্সিনিক ঈষদ্রব্য  
জলের পীচকারি, আইয়োডিন, ক্রিয়েজোট, টর্পেন্টাইন বাষ্প  
আত্মা, বায়ুপরিবর্তন উপদংশ বিষজনিত বোগ হইলে সেবনার্থ  
আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম, কবোসিব সল্লিমেট । মার্কিউ-  
বিষেল ভেপার বাথ সার্মাপ্যারিলা নাসাবন্ধ সর্বদা পচন-  
নিবারক ধৌত দ্বারা সতত পরিষ্কার রাখা কর্তব্য এবিষ্টল,  
ধাইমল, তৈল বা গ্লিসিবিণ সহ প্রয়োজ্য উপদংশজাত  
পীড়ায় কবোসিব সল্লিমেট ১ গ্রেণ ও জল ৫ হইতে ১০ আউন্স,  
একএ ধৌতকপে প্রয়োজ্য ।

### ইপিস্টিাক্সিস্—নাসা-রক্তশ্রাব ।

বাল্যকালে নাক দিয়া রক্তশ্রাব হওয়া অতি সাধারণ ; উহাতে  
প্রায় কোন অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হয় না কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে  
রক্তশ্রাব হওয়া চিকিৎসার বিষয় যদি বোগীব সংক্রাম প্রবণতা বা  
হৃৎপিণ্ড বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে রক্তক্ষরণ দ্বারা সম্ভবতঃ  
উপকার দর্শে যে সকল পীড়ার বুদ্ধির সময় বক্ত অবিগত  
হইয়া পড়ে, তাহাতে রক্তশ্রাব হইলে তাহা অনিষ্টকর হয়  
লিউকোসাইথিমিয়া বা রক্তহীনতা বোগ বিশেষে বর্তমানে

অধিক পরিমাণে নাসাবন্ধস্রাব হইলে সহসা মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে

চিকিৎসা ।—বালক ও বক্তপ্রধান ব্যক্তিদের পক্ষে একোনাইট অল মাত্রায় ঘন ঘন ব্যবহার করিলে বন্ধস্রাব নিবাবিত হয় হ্যামামিলিস ; ইপিকাকিউয়ান্হা মিনাবেল এসিড ও বার্ক ১৭০ ; এমোনিয়া আয়বণ ম্যালম ; টিংব অব্ পারক্লোরাইড অব্ আয়বণ ১৭১ ; অয়েল অব্ টর্পেন্টাইন ২১৭ ; মূত্র বিরেচক যকৃতেব ক্রিয়া বৈষম্য থাকিলে নাইটিক এসিড্ ও ট্যাবাক্‌সেকম পুষ্টিকব খাদ্য স্থানিক ঔষধেব মধ্যে ম্যালম লোশন ; মাটিকো পএচুর্গ ; ট্যানিন্ ; পারক্লোরাইড অব্ আয়বণ জলসহ , সংকোচক ধাবণ ঙ্গি টিষ্ট নাসারন্ধ্রে পুরিয়া দেওয়া । হস্তদ্বয় মস্তকোপরি উত্তোলন করিয়া ক্ষণকাল রাখিলে বন্ধস্রাব নিবাবিত হয় পশ্চাৎ গ্রীবাতে শীতল জল ধাবা, নাসাপুটেব উপবে ববফ সংস্থাপন দুর্কী ও দাড়িমের ফুলেব বস নাসাবন্ধে দিলেও বন্ধস্রাব নিবাবিত হয় একুট্রাক্ট হাইড্রাষ্টিন্ লিকুইড ৫ হইতে ১০ ফোঁটা মাত্রায় সেবন কবাইলে বন্ধস্রাব নিবাবিত হয়

### এফোনিয়া—স্বরাভাব ।

স্বববজ্জ্ব ক্রিয়া বা বিধানগত পীড়া বশতঃ স্বব বিনষ্ট হয় । সামান্য প্রকার স্বরভঙ্গ হইতে সম্পূর্ণ স্বরাভাব বা মুকতা ঞ্গো ইহা কখন স্থায়ী ও কখন ক্ষণস্থায়ী হইতে পারে

ক্রিয়াবিকারজ রোগ—শূল্যবায়ুজ স্বরাভাব, তৎসঙ্গে উত্তরোগের অগ্রাণু লক্ষণ বিদ্যমান থাকিতে পারে আর্ন্তব

বিশৃঙ্খলা, এক বা উভয় ডিম্বকোষের উদ্দীপনা, শ্বেতপ্রদর, বজ্রঃস্রাব ও কখন বজ্রঃআধিক্য। রোগী কয়েকদিন ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলে। তৎপরে রোগ শান্তি হয়। কিন্তু উহার পুনরুপস্থিতি সাধাবণ ভয় জন্ম স্বাব্যাব নর নারী উভয়েরই হইতে পারে। বোগ অধিক দিবস স্থায়ী হইলে স্বব-  
য়জ্জু শিথিল ও শক্তিহীন হয়।

বিধান বিকাবজ্রবোগ—প্রদাহ, মাস্তক ক্ষরণ ও শৈথিল্য বিলীল ক্ষত হইতে উৎপন্ন হয়। স্ববয়স্কে বা নিকটে কোনকপ অর্ধদুর্দা দি জন্মিলে অথবা মস্তিষ্ক পীড়ায় স্ববয়স্কে পেশীতে পক্ষা-  
ঘাত হওয়ায় স্বাব্যাব সমুপস্থিত হইতে পারে।

চিকিৎসা —মর্দিজনিত বোগে এমোনি ক্লোরাইড ভেপার; ক্লোরিন ভেপার। ভাইনম ইপিক্যাক ৯ ড্রাম, ও অক্সি-  
মেল সিলি ৩ ড্রাম বমনার্থ ৩৪ ঘণ্টাস্তর তৎপরে তরল ও ঘর্মকারক ঔষধ গুল্মবায়ু ও স্নায়বীয় বোগে এট্রপিন বা বোলেডোনা; ফেবি পারঅকসাইড, পাইবিথুম; ইলেকট্রিসিটি; জিন্সাই ভেবিনিয়ামাস ১৯৮, ব্রোমাইড অব্ এমোনিয়ম ১০ গ্রেণ দিনে ৩ বাব। স্ববয়স্কে প্রদাহ বা ক্ষত থাকিলে কষ্টিক লোশন স্থানিক প্রযোজ্য। স্ববয়স্কে পক্ষাঘাত বশতঃ পীড়া হইলে কুইনাইন ও ষ্টীল ১৭৩, ১৭৪, ১৭৭, ১৭৮। স্ববয়স্কে পীড়া বশতঃ হইলে কষ্টিক লোশন স্থানিক, সংকোচক স্প্রে। লৌহ-  
ঘটিত বলকাবক ঔষধ, ও কডলিভ অব্ অয়েল আদি সেব্য।



ডিসফোনিয়া ক্লিরিকোরম । ক্লজিমান্সসোবথোট । ১৬৯

ডিসফোনিয়া ক্লিরিকোরম । ক্লজিমান্সসোব-  
থোট । ( যাজকদিগের স্বরভঙ্গ ) ।

ইহা অনেক সময়ে কেবল স্নায়বীয় পীড়া, বোগের প্রথম-  
বস্থায় যান্ত্রিক বিকল থাকে না । কিন্তু কণ্ঠাভ্যন্তরতালিপ্ত  
শ্লিথী উত্তা ও বোধাতিশয়া থাকে । অবশেষে শৈল্পিক  
শ্লিথী নিশিতা, প্রদাহ বা রক্তাধিক্য জন্মে তালুপার্শ্ব গ্রন্থির  
বিবৃদ্ধি, আল্জিহবার দীর্ঘতা, গলাভ্যন্তরে উদ্দীপনা, প্রদাহ, ক্ষত  
বা অসুস্থ বিধান সঞ্চয় যাজক, ব্যবহারাজীব, বক্তা, নায়ক ও  
গায়ক প্রভৃতি এই পীড়াক্রান্ত হইতে পারে

লক্ষণ — কণ্ঠদেশে উপরি অংশে অসুখ বোধ, তৎসঙ্গে  
সতত ঢোক গিলিতে ইচ্ছা অর্থাৎ গলাব মধ্যে কিছু আছে বলিয়া  
বোধ হয় কাসি ও শ্লেষ্মা নিঃসরণ স্ববয়স্বে অসুখ বা বেদনা  
বোধ স্ববস্তু হ্রাস, গলভঙ্গ, সময় সময় স্ববস্তু শৈল্পিক  
ক্ষুদ্র গ্রন্থিতে পীতবর্ণ পদার্থ সঞ্চিত হয় । আঠাবৎ শ্লেষ্মাবিমিশ্রিত  
পুষ্যভ পদার্থ গলাব ভিতর ও তালুতে লাগিয়া থাকে

চিকিৎসা । — কুইনাইন ; আয়বণ ; সহস্র ধারা স্নান ;  
সমুদ্র জলে স্নান, কার্যা হইতে বিশ্রাম ; আইয়োডাইড অব  
পটাসিয়ম ; আইয়োডাইড অব্ আয়বণ ; আইয়োডাইড বা  
বোমাইড অব্ এমোনিয়ম ; ফস্ফেট অব্ জিঙ্ক, ট্রীকনিয়া ও  
ষ্টীল, ষ্টীল ও ব্রোবেট অব্ পটাশ ; ফস্ফরিক এসিড ও নক্স-  
ভমিকা ; কডলিভর অয়েল স্থানিক—নাইট্রেট অব্ সিল-  
ভব লেশন ( ৩০ গ্রোণে এক আউন্স ) ; সংকোচক লেশনে  
আয়ান, বিবিধ প্রকার ইন্হেলেশন



## তুপ, টেকিয়াইটীস—স্বরস, যুংডী ।

টেকিয়া 'বা' কণ্ঠনলীর শৈল্পিক ঝিল্লি প্রদাহ, সর্বদা উহাব সঙ্গে স্বরযন্ত্রেও প্রদাহ হয় অব ও প্রদাহ সহ আক্রান্ত অংশে কৃত্রিম ঝিল্লী উৎপন্ন হয় ২৩ বৎসর বয়স্ক বালকদেবই সাধারণতঃ এই পীড়া হইয়া থাকে অনেক সময় ইহাব সঙ্গে বায়ুনলীভুজ বা কুস্কুস্ প্রদাহ বিমিশ্রিত থাকিতে পারে অব-সন্নতা, শ্বাসবোধ ও আক্ষেপ আদি সমুপস্থিত হওত রোগীর মৃত্যু হয় এই বোগেব মৃত্যুসংখ্যা অত্যন্ত অধিক ।

লক্ষণ ।—প্রথমাবস্থায় সর্দিব লক্ষণ, সামান্য জ্বর, কাসি, 'ল' '৩' 'জ', তন্ত্র', চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, নাসারকু 'দিয়' তবল শ্লেষ্ম 'নঃ-সরণ ১৮ ঘণ্টাব মধ্যে নিশ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ প্রত হয়, গলা-ভাজা, কাসি, সময়ে সময়ে স্বরযন্ত্রেব পেশীতে আক্ষেপ তৎপবে বোগেব বিশেষ লক্ষণাদি প্রকাশিত হয় কাসিব প্রকৃতি অন্ত-কপ হয় অর্থাৎ ধাতুনির্মিত নলের মধ্যে ফুৎকার দিলে যেকপ শব্দ হয়, কাসিতেও তদ্রূপ বোধ হয় নিশ্বাস দীর্ঘ, তৎসঙ্গে লাক্ষবনি মিশ্রিত থাকে তালুপার্শ্ব গ্রন্থি ও আলজিহ্বা আবদ্ধ ও ক্ষীণ হয়, কিন্তু তালুপার্শ্ব গ্রন্থিতে প্রদাহেব অপেক্ষা ক্ষীণতা কম থাকে অব পরিবর্তিত, শ্বাসকৃচ্ছ্র ও শ্বাস ক্রত, সতত কাসি অবসন্নতা, তৎসহ নাড়ীস্পন্দন দুর্বল ও বিগৃহ্যন তৃষ্ণা, উগ্রতা ও অস্থিরতা, মুখাকৃতি ভয় ও উৎকণ্ঠা জ্বাপক বোগী নিজ গ্রীবা আঁকড়াইয়া ধরে বা যুগ্মেব মধ্যে অঙ্গুলি পুরিয়া দেয় এইরূপে যন্ত্রণাব কাবণ বিদূষিত করিতে চেষ্টা পায় বাস্তিতে পীড়াব বৃদ্ধি হয় ও প্রাতঃকালে কিছু কম পড়ে রোগ উপ-

শমিত হইতে থাকিলে কাশির প্ৰকৃতি পৰিবৰ্ত্তিত হয় বোগ  
মুক্তিতে পৰিণত হইবাব কালে তন্দ্ৰা উপস্থিত হয়। বোগী চম  
ক'ইয়া উঠে ও শ্ব'স হ'লে স'তিশ'য় ব'ষ্ট অহু'ব ক'ল শ্ব'স  
বোধ হইবাব আ'ক্ষা থাকে ফুসফুসে বক্তাধিক্য, চৰ্ম্ম শীতল  
ও শ্বেদাভিযুক্ত হয়

চিকিৎসা।—বোগের প্ৰথমাবস্থায় টিংচব একোনাহট  
অন্ন মাত্ৰায় সেবন কৰাইলে উপকাৰ দৰ্শে, বিশেষতঃ সৰ্দিজনি এ  
বোগে ব্যবহাৰ্য্য। কটকিৰি ১ ড্ৰাম, মধু বা চিনিৰ পাকৈৰ সহিত  
মিলাইয়া ১০ ১৫ মিনিট অন্তৰ বমন না হওয়া পৰ্য্যন্ত সেবন  
কৰাইবে প্ৰবল প্ৰকাৰ পীড়ায় দিনে ৩৪ বাৰ বমন কৰান  
বিধেয়। বোগের সূচনা হইতেই চিকিৎসা কৰিতে আবশ্য কৰা  
উচিত। লোবিলিয়া ও সেনেগা ব্যবহৃত হইয়াছে। সল্ফুৰস এসিড  
ও ট্যানিন শ্ৰে। এই বোগের চিকিৎসাকালে বিশেষ সাবধান  
হওয়া উচিত রোগীকে শয্যাশয়ন কৰাইয়া বাধিবে, গাত্ৰে  
ফ্লানেল দিবে, গলদেশে ফোমেণ্টেসন বা উষ্ণ পুলটিস ইপিক্যাক্,  
জিঙ্ক প্ৰভৃতি দ্বাৰা বমন। বিবেচনार्थ ক্যালোমেল ও ক্যাষ্টৰ  
অয়েল। ঈষদুষ্ণ জলে স্নান, গলদেশে বেলডোনা একট্ৰাঃ,  
লিনিমেন্ট বা টিংচব স্থানিক প্ৰয়োগ। স্বৰযন্ত্ৰেৰ পেণীৰ আক্ষেপ  
থাকিলে আইয়োডাইড অব পটাসিয়ম; সেনেগা এসাফেটিডাব  
সঙ্গে, ৪০৭; এমোনিয়া ও সেনেগা ৩০১। ইনহেলেশন অব  
অক্সিজেন গ্যাস; বিস্টি; চুণেৰ জল ও দুগ্ধ, ওয়াইন বা ব্ৰাণ্ডি;  
গ্ৰ্যাবোমেটীক স্পিৰিট অব্ এমোনিয়া, ক্লোৰিক ইথৰ ও সেনেগা  
অবশেষে টেক্সিটগী ক্যালোমেল ও কবোসিব সল্লিমেট প্ৰভৃতি  
ব্যবহাৰ হইয়াছে বোৰিক এসিড, কাৰ্বলিক এসিড, অয়েদ

ইউক্যালিপ্টাই, ক্রিয়েজোট, আইয়োডিন ও টেরিবিণ প্রভৃতিব  
স্প্রে বা বাষ্প আঘাণ হিতকর । গলাব মধ্যে কষ্টিকাদি লাগান  
উচিত নহে লাইম ওয়াটার ৮ আউল ও লাক্টিক এসিড  
ও ড্রাগ, একত্রে স্প্রে যোগে প্রয়োজ্য ইহাতে কৃত্রিম ঝিল্লী দ্রবী-  
ভূত হয়

### ল্যারিন্জাইটিস—স্বরযন্ত্র-প্রদাহ ।

স্বরযন্ত্রেব তরুণ প্রদাহ একটী বিরল পীড়া ইহার ভাবি-  
ফল সাধারণতঃ সাংঘাতিক তরুণ প্রদাহ ব্যতীত স্বরযন্ত্রে  
প্রাচীন প্রদাহ ও ক্ষত আদি হইতে পারে ।

তরুণ প্রদাহ—পূর্ণ বয়স্কদের হয় । অসুস্থ ব্যক্তিদের  
সর্দি বশতঃ এই বোগ উপস্থিত হইতে পাবে । সময় সময়  
উপদংশ বিষ প্রভাবে এই পীড়া উৎপন্ন হয় । এই পীড়ার সহিত  
ক্রপ বোগেব ভ্রম জন্মিতে পাবে, ইহাতে স্বরওঙ্গ বিশেষ লক্ষণ,  
কিন্তু ক্রপে সাংঘাতিক শ্বাসকষ্ট বিদ্যমান থাকে ।

লক্ষণাদি সহসা প্রাদুর্ভূত হয় কয়েক ঘণ্টা পরে জ্বর,  
কণ্ঠাভ্যন্তর আবদ্ধ, টুটিতে বেদনা, শ্বাস ও গিলন কষ্ট, সাতি-  
শয় উৎকণ্ঠা, গলাভাজা বা সম্পূর্ণ স্ববাতাব । আক্কেপিক  
প্রকোপ ও শ্বাসরোধ আশঙ্কা । নিশ্বাস দীর্ঘ, বিশেষ প্রকাব  
শব্দ অর্থাৎ নলের মধ্যে বেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে যেকণ  
শব্দ হয় কর্কশ কাসি, গিলন কষ্ট, কঠিন অপেক্ষা তরল দ্রব্য  
গিলিতে অধিক কষ্ট মুখমণ্ডল আবদ্ধিম, চক্ষু উন্নত, নাতী  
কঠিন, সাতিশয় সার্বাস্থিক অসুস্থতা স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালী শীঘ্র  
শীঘ্র অধঃ ও উর্দ্ধে সঞ্চালিত হইতে থাকে । শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পা-

দ্রব পেশী সকলের ক্রিয়া প্রবলতরভাবে হইতে থাকায় বক্ষঃস্থল  
সবেগে উন্নীত হয় রোগী তজ্জাবিষ্ট হয় ও প্রলাপ বকে।  
শ্বাসাবরোধ হইয়া মৃত্যু সংঘটিত হয়।

প্রাচীন প্রদাহে প্রায়ই ক্ষত উৎপন্ন হয় সান্দ্রাস্থিক উপ-  
দংশ হইতে এই বোগ জন্মিতে পারে।

চিকিৎসা।—একোনাইট সেবনে উপকার দর্শিতে  
পারে সলফরস এসিডের আঘ্রাণ বা ধূম প্রয়োগ বা স্প্রে অর্থাৎ  
অণুধাবা। বোগী নিস্তদ্ধভাবে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে  
কথা কহিতে নিবারণ করিবে। রোগীর বাসগৃহ উষ্ণ ও উহাব  
অভ্যন্তরস্থ বায়ু যাহাতে আর্দ্র থাকে, তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য  
বোগীকে উষ্ণজল বা উষ্ণ জল সহ হাইড্রোসিয়ানিক এসিড,  
স্পিবিট ক্লোবোফর্ম বা বেলেডোনা মিশ্রিত করিয়া নল দ্বারা  
তাহার ধূম গলার ভিতর লাগাইবে গলদেশে তাম্বিন তৈল  
ও উষ্ণজলের সেক, লিনসিড পুলটিস সহ একট্রাণ্ট বেলেডোনা।  
রোগীর শরীর উপদংশ বিষে দূষিত থাকিলে ক্যালোমেস ও  
ওপিয়াম; মার্কিউরিয়েল ৩০ পার বাথ; আইয়োডাইড অব্ পটা-  
শিয়াম। দুগ্ধ, ডিম্ব, মাংসের বোল, পোর্ট, ব্রাণ্ড প্রভৃতি পদার্থ  
দিবে। শ্বাস প্রশ্বাসের বিশেষ কষ্ট ও রক্ত বিগুদ্ধ হইতে বাধা  
প্রাপ্ত হইলে ট্রেকিমোটমী নামক শস্ত্রক্রিয়া সম্পাদন করা কর্তব্য  
স্বরযন্ত্রে অধিক ক্ষীণতা উপস্থিত হইলে নাইট্রেট অব্ সিলভার  
(৪০ গ্রাং, জল এক আউন্স) স্থানিক প্রয়োজ্য রোগীকে  
প্রথমে মৃদু স্বেদজনক ঔষধ দিবে উষ্ণ জলের সঙ্গে টিংচর  
আইয়োডিন বা কার্বলিক এসিড মিশাইয়া তাহার বাষ্প কণা-  
ভ্যন্তবে লাগাইবে। অত্যন্ত বেদনা নিবারণের জন্য কোকেইন



জলে দ্রব করিয়া ও গ্লিসিরিং অব্‌ বোবেসিসের সঙ্গে মিলাইয়া গলার মধ্যে লাগাইবে। ১ ভাগ মেইল ও ১০ ভাগ অলিভ অয়েল একত্রে স্থানিক প্রয়োজ্য

### ল্যারিন্‌জিস্মস্‌ স্ট্রিডিউলস্‌—আক্ষে- পিক গ্রুপ।

শিশুদেব এক প্রকাব আক্ষেপিক পীড়া, প্রধানতঃ দন্তোদ্ভেদ কালে হয়। ইহাতে রাইমা গ্লটিডিস্‌ আংশিক বা সম্পূর্ণ অববদ্ধ হইতে পারে, তদ্ব্যতীত ফুস্‌ফুসেব মধ্যে বায়ু গমনেব বাধাত বা অববোধ হয়।

লক্ষণ। শ্বাসক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত, ও হস্ত পদেব অঙ্গুলিতে আক্ষেপ শিশুদেব সহসা শ্বাসকৃচ্ছ উপস্থিত হয়। নিশ্বাস গ্রহণে বিশেষ চেষ্টা ও তদ্ব্যতীত পদবিক্ষেপ কবে এবং বোধ হয় যেন শ্বাস বদ্ধ হইল। ক্ষণকাল পরেই আক্ষেপ তিরোহিত হয় ; তখন বোগী সহজে শ্বাস গ্রহণ কবিতে পারে। কয়েক ঘণ্টা বা দিবস অন্তর বোগের প্রকোপ হইতে পারে

চিকিৎসা। ইহা শিশুদেব দন্তোদ্ভেদকালে উপস্থিত হয়। বোগ উপস্থিত হইলে তৎসময় শরীরেব অধোদে উষ্ণ-জলধারা, মস্তকে ও মুখমণ্ডলে শীতল জলধারা ও পাখা দ্বারা বাতাস করিবে। আবশ্যক হইলে কৃত্রিম শ্বাস প্রস্থাপন, অল্প মাএয় ক্লোবোফর্ম্‌ আদ্রাণ ; ইথৰ্‌ ও এমোনিয়াব আদ্রাণ কোন-কপ উপায়ে উপকার না হইলে ট্রেকিসোটমী করিবে। বোগেব আবেশ তিরোহিত হইলে গৃহ বিবেচক, আক্ষেপনিবারণ কড়-

লিউব অয়েল, ষ্টীল ওয়াইন ; বায়ু পবিত্রতা বেলেডোনা ২ গ্রেণ দিনে তিনবার, বা ইহার সঙ্গে ব্রোমাইড অব্ পটাশিয়াম বা এসোনিয়ম অথবা সলফেট অব্ জিঙ্ক ক্রমশঃ বর্ধিত মাত্রায় এসাফেটিডা, ভেলিরিয়ানেট অব্ তায়বৎ ; কুইনাইন ; কুমিনাশক ঔষধ, মাড়ি শ্লীত হইলে চিবিয়া দিবে পথ্যার্থ দুগ্ধ, অন্ন ও মাগু ইত্যাদি । এন্টিপাইবিন অর্ক বা ১ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহারে উপকার দর্শিয়াছে সিকি মিনিম মাত্রায় টিংচর আইয়োডিন ঘন ঘন প্রযোজ্য ।

### ব্রঙ্কাইটিস — বায়ুনলীভূজ-প্রদাহ ।

বায়ুনলীভূজস্থ শৈল্পিক বিল্লিতে প্রদাহ ইহা তরুণ ও প্রাচীন দ্বিবিধ এক বা উভয় ফুস্ফুস বা কতকাংশ আক্রান্ত হইতে পারে

তরুণ বায়ুনলীভূজ-প্রদাহ ।—বিপদজনক পীড়া, প্রদাহ প্রসাবিত হইয়া ফুস্ফুসেব কোমলবিধান আক্রমণ করিতে পারে ।

লক্ষণ — জ্বর, বক্ষঃস্থলে আকর্ষণ বা টান বোধ, দ্রুত শ্বাস ও তৎসঙ্গে সাঁই সাঁই শব্দ ও কাসি শ্লেষ্মা ঘন ও আঠাবৎ, পরে পূষবৎ হয় নাড়ীস্পন্দন দ্রুত ও দুর্বল, জিহ্বা মলাবৃত, শিবোবেদনা ও গাত্রশুকতা, বমন ও সাতিশয় উৎকর্ষা ।

বড় বড় ও মধ্যমাকারের বায়ুনলীভূজের-প্রদাহ অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলীতে প্রদাহ হইলে তাহা বিশেষ আশঙ্কাজনক পূর্ণবয়স্ক অপেক্ষা বালক ও বৃদ্ধদেব শেযোক্ত প্রকার অর্গাৎ কৈশিক বায়ুনলী-ভূজ-প্রদাহ ( ক্যাপিলাবি ব্রঙ্কাইটিস ) প্রধানতঃ

হইয়া থাকে এই প্রকার প্রদাহে শ্বাসাধিক্য হওয়ায় উপ-  
ক্রম দৃষ্ট হয় শ্বাসকষ্ট, বায়ুপ্রদেশে বক্তাধিক্য, সতত কাসি,  
অস্থিরতা ও বর্ধিত অবসন্নতা এবং সাংঘাতিক বোগে প্রলাপ, তন্দ্রা  
ও চৈতন্যবিহীনতা বোগ বর্ধনেব সময় কখন কখন এক বা  
ততোধিক বায়ুনলী গাঢ় শ্লেষ্মা দ্বারা ক্লব হয়, তন্মধ্যে সেই  
অংশে বায়ু প্রবিষ্ট হইতে পারে না, ইহাকে পালমোনারি  
কোলাপ্স বলে। ফুস্ফুসের কতক অংশ ক্রিয়া বিবহিত হওয়া  
বশতঃ অন্যান্য অংশেব ক্রিয়াধিক্য হওয়ায় উহাদেব মধ্যে অধিক  
বায়ু প্রবেশ কবে

রোগের প্রগমাবস্থায় বক্ষঃস্থলে আকর্ষণ করিলে সতত  
ছুইটী শুক শব্দ শ্রুত হওয়া যায়। যথা—রংকস ও সিবিলিস।  
বড় বড় বায়ুনলীতে রংকস ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুনলীতে সিবিলিস  
শ্রুত হয়, সুতরাং শেষোক্ত শব্দ আশঙ্কাকর। প্রদাহিত অংশে  
শ্লেষ্মাশ্রাব হইতে থাকিলে শুক শব্দেব পরিবর্তে আর্দ্র শব্দ শুনা  
যায় অর্থাৎ বড় ও ছোট ক্রিপিটেশন বা কেশমর্দন শব্দ  
বন্ধে প্রতিবাচ কবিলে শব্দেব পরিবর্তন হয় না।

প্রাচীন বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহ।—সাধারণতঃ বৃদ্ধ  
বয়সেই হয় অত্যন্ত কাসি, শ্বাসকষ্ট, অতিশয় শ্লেষ্মা নিঃস-  
রণ—শৈত্য ও আর্দ্রতা বশতঃ বৃদ্ধি হয় নীতকালে বৃদ্ধ  
লোকদের এই প্রকার প্রাচীন প্রদাহ বশতঃ সতত কাসি হয়  
আকর্ষণে ভেসিক্যুলার মম্বর বা বুদ্ধবুদ্ধ শব্দ শ্রুত, তৎসঙ্গে বংকস,  
সিবিলিস ও আর্দ্র ক্রিপিটেশন মিশ্রিত থাকে। কখন কখন  
ফুস্ফুসের বিধান বায়ুনলী প্রসারিত হইয়া কঠিন হইয়া পড়ে  
সময় সময় অধিক পরিমিত ও দুর্গন্ধ শ্লেষ্মাবুক্ত পুঁথশ্রাব



হয়। পীড়া সাগাৎ সম্বন্ধে সাংঘাতিক হয় না। অত্যন্ত রোগ ইহার সঙ্গে মিলিত হইয়া রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

চিকিৎসা — প্রথমে টিং একোনাইট বা ভাইনম এন্টি-মোনিয়েল প্রয়োগে জ্ব ও প্রদাহ প্রশমিত হইতে পারে। শ্লেষ্মা সবল হইলে এন্টিমনি প্রয়োগ বহিত করিবে আঙ্গিনিক এম্ফিমিয়া থাকিলে। শ্বাসকষ্ট থাকিলে লোবিলিয়া ও বেজেডোনা অধিক উপকারী। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ক্যাষ্টর অয়েল ৩২৯, ৩৩৬; সল্ফেট অব্ মাগনিসিয়া ও সেনা—৩৩১, ৩৩৪; সালাইন্ ড্রাফ্টস ২৮২, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০। শ্লেষ্মা নিঃসরণ ও প্রদাহ দমনার্থ এমোনিয়া এণ্ড সেনেগা—৩০১, ৩০৩, ৩১০, ৩১১ জ্ব নিবারণার্থ কুইনিন দেওয়া যায়, কিন্তু ইহাতে শ্লেষ্মা শুষ্ক হইতে পারে, তজ্জন্ত তৎসম্বন্ধে লক্ষ্য রাখা উচিত ট্রিক্লোনিয়া—শ্বাসকেন্দ্র উত্তেজিত করিয়া কফনিঃসারক হয় কার্বনেট অব্ এমোনিয়া—১৮৩, ১৮৪; সাইট্রেট অব্ পটাশ; এমোনিয়া ও একোনাইট ২৮৮; টার্টারেট অব্ এন্টিমোনি ২৮৩, ২৬৭, ৩০৮। কলটিকম; ক্যালোমেল—৩৪১, ৩৪২, ৪১৬। হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ডিল; পটাশী নাইট্রস ১৮৯; ক্রোমেট অব্ পটাশ, ভাইনম ইপিক্যাক ও টিংচর ক্যান্ধব কম ওপীয়ো লবেল ওয়াটার ২৯০, ক্রোব্রিগ ইন্হেলেশন, ড্রাই কপিং, টর্পেন্টাইন ষ্ট্রুস, টর্পেন্টাইন লিনিমেন্ট ৪৪; বক্সে মর্টার্ড পাষ্ট্র, ব্লিষ্টাব, লিন্সীড পুলটিস, ক্রোটন অয়েল ও টার্টারেটেড অব্ এন্টিমোনি অয়েন্টমেন্ট ভাইনম ইপিক্যাক—৩০৯, ৩১২; অথবা এমোনিয়াব সঙ্গে। বোগীর গৃহের বায়ু আর্দ্র থাকা উচিত। ছত্র, সাগু, স্যাবোরুট, মণ্ড, কর্ণ ফ্লাউয়ার, ওয়াইন



হোম, বিফ্টি, চিকেন ব্রথ স্লেয়া অধিক পবিমাণে সঞ্চিত থাকিলে বমন কারক ঔষধ হট্ট ওয়াটার ভেপার বা উষ্ণ জলের বাষ্প আঘাণ এবং তৎসহ বিবিধ এন্টিসেপ্টীক ঔষধ মিশাইয়া দিলে বিশেষ উপকার হয় কাসিব সাতিশয় উগ্রতা থাকিলে মফিয়া বা ওপিয়ম অল্প মাত্রায় ও সতর্কতা সহকারে প্রয়োগ করিতে হয় ওরুণাবস্থায় পার্শ্ববেদনায় টিং ব্রাই-ওনিয়া ১ মিনিম মাত্রায়

বাযুনলীভুজের পুৰাতন প্রদাহ —এক্টিয়া বেসি-গোজা; কার্বনেট অব্ এমোনিয়া ১৮৩, ১৮৪; সাইট্রেট অব্ এমোনিয়া; এমোনিয় এণ্ড সেনেগা—৩০১, ৩০৩, ৩১০, ৩১১। এমোনিয়াকম—৩০৫, ৩০৭, ৩১৩ স্কুইল ও এমোনিয়া—৩০৬, ৩১০ ভাইনম ইপিক্যাক—৩১৪, ৩১২; সিবপ সিলি ৩২১, ৩২২; কম্পাউণ্ড স্কুইলপীল ৩১৫, আর্সিনিক; বালসম পেরু-ভিয়ানম ৩০২, কলচিকম, কোনিয়ম ৩১৫, ৩১৬ কোপেবা; ক্রিয়োজোট; ডিজিটেলিশ; মিঃ ফেবি কঃ, লাইকর ফেরি পাবনাইট্রেটস বেনজোয়েট অব্ এমোনিয়া বা সোডা ৩০৩; ইপিক্যাক—৩১৪, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৯, ৩২০ লোবিলিয়া ইন্-ফ্লেটা—১০৮, ৩০৭; মর, ডিজিটেলীস ১০২; নাইট্রোহাইড্রো-ক্লোবিক এসিড; পটাসী ক্লোবাস; প্লম্বাই এসিটাস; লাইকব পটাস আইরোডাইড অব্ পটাসিয়ম—৩৯৯, ৪০১, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৭ ষ্টোরাক্স; সল্ফর, সম্বল উষ্ণজলের বাষ্প, কড্-লিওব অয়েল, সুরা, আসব, পুষ্টিকর খাদ্য, টর্পেন্টাইন ষ্টুপ্স, টর্পেন্টাইন ও এসিটীক এসিড লিনিমেন্ট টর্পেন্টাইন ও ক্রিয়ো-জোট ইন্হেলেনসন বক্ষে মণ্ডারাদি প্রত্যাগ্রতাসাধক ঔষধ, বিবিধ

উত্তেজক মর্দন—৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৯ পিচ, প্লাষ্টিক, ব্রিষ্টার্স, টার্টার এমটিক ও ক্রোটন অয়েল অয়েন্টমেন্ট বিবিধ প্রকার উত্তেজক মিশ্র ও বটিকাদি দুগ্ধ, পুষ্টিকাবক খাদ্য, মাংসযুষ ইত্যাদি কার্বলিক এসিড ও অয়েল ইউক্যালিপ্টাই প্রভৃতির আত্মাণ ফফেট অব লাইম; সল্ফর—প্রাচীন রোগে সল্ফরস এসিডেব ইনহেলেশন, স্প্রে বা ফিউগিগেসন হাই-পোফফাইট অব লাইম ও সোডা পটাশ আইয়োডাইড প্রযোগে শ্লেষ্মা তবল হয় ইহা অগ্ন্যাণ্ড শ্লেষ্মা নিঃসারক ঔষধেব সঙ্গে ব্যবহৃত হইতে পারে।

### এজুমা—শ্বাসকাস।

এককপ শ্বাসবীয় গীড়া; বায়ুনলীভুজেব গোলাকার পৈশিক স্ত্রেব আকুঞ্চন বা আক্ষেপ বশতঃ হাঁপানি উৎপন্ন হয় বোগেব প্রকোপ সাক্ষাৎ বা প্রতিক্রিয়া উদ্দীপনা আদি হইতে হয়। মিডুলা অবলংগেটা হইতে উত্তেজনা সাক্ষাৎভাবে গমন করতঃ আকুঞ্চন উৎপন্ন করে, অথবা নিমোগ্যাষ্ট্রিক বা ফুফুস-জঠরীয় শ্বাসর ফুসফুস বা জঠর অংশ হইতে উত্তেজনা মিডুলা অবলংগেটাতে নীত হওত পুনরায় মোটর শ্বাসস্থত্র দ্বারা প্রতিক্রিয়া হইয়া আকুঞ্চন বা আক্ষেপ উপস্থিত করে

লক্ষণ — নিবোধেদনা ও নিদ্রালুতা বা শ্বাসকাসেব বা অন্ত্র প্রকার উপদ্রব পূর্বে উপস্থিত হইয়া শ্বাসকাস অর্থাৎ হাঁপানি উৎপন্ন হয় ইহা অনেক সময় অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া থাকে বাত্ৰি দুই প্রহরেব ২৩ ঘণ্টা পবে বোগীর সূহসা নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং বক্ষে টানবোধ ও শ্বাসরোধবৎ অনু

ভব হইতে থাকে ক্রমশঃ শ্বাসকষ্ট বাড়িতে থাকে। শ্বাস-  
গ্রহণেব সুবিধাকবণার্থ রোগী বাবহার অবস্থানেব পরিবর্তন  
কবে বক্ষঃস্থল অত্যন্ত প্রসারিত হয় এবং ফুসফুসাত্যন্তবে  
বায়ু প্রবেশ ও তথা হইতে নিঃসৃত হইবাব সমূহ ব্যাঘাত  
জন্মে আকর্ষণ কবিলে স্বাভাবিক নিশ্বাসেব শব্দ শ্রুত হওয়া  
যায় না, কিন্তু তৎপরিবর্তে সিবিলাণ্ট বংকাই বা উচ্চ সাঁই  
সাঁই শব্দ ও তীক্ষ্ণ শীশ্ দেওয়াব ছায় শব্দ শুনা যায় নাড়ী  
ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ, চক্ষু পলকহীন, মুখাকৃতি উৎকর্ষাধ্যাজক, ওষ্ঠ  
ধূসববর্ণ, দেহেব বাহ্যংশেব উষ্ণতা হ্রসিত হওত ৮২ ডিগ্রী  
হয় কিন্তু কিছুক্ষণ পবে ক্লান্তি বশতঃ শরীর উষ্ণ শ্বেদা-  
ভিষিক্ত হয়। অধিকক্ষণ পবে বোগী আরাম বোধ কবে।  
কাসি ও তৎসঙ্গে অন্ন অন্ন শ্লেগা বাহির হয়। বোগাবেশ  
তিবোহিত হইলে বোগী নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে গীড়ার  
বিরামকালে রোগীব শ্বাস্য ভাল থাকে ও সহজে শ্বাস ক্রিয়া  
সম্পাদিত হয় অধিকাংশ শ্বাসবোগীর শরীর ক্ষীণ ও স্বক  
গোল, কপোলদেশ নিম্ন, শ্রব প্রাণ ভঙ্গ, সামান্য কাসি ও মুখ  
ক্লেশব্যাজক থাকে বিবামকাল ২৪ ঘণ্টা হইতে ১২ মাস  
বোগাবেশ সময় সময় বা পর্যায়ক্রমে হয়। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ-  
দেব অধিক হয় অনেক সময় কৌলিক দেহ প্রকৃতি হইতে  
ইহা জন্মে। স্বয়ম্ভূত বা আক্কেপিক বোগেব সঙ্গে অল্প আনু-  
যঙ্গিক গীড়া থাকে না কৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, অন্তবহনলী ও  
স্নায়ুগুণ্ডের গীড়া বশতঃ শ্বাস উপস্থিত হইতে পাবে

চিকিৎসা। — গীড়ার প্রাবল্যে একোনাইট প্রয়োগ কবিলে  
বোগাবেশ তিরোহিত হয়, সর্বদা পরবর্তী শ্বাসেও ইহা দ্বারা উপকার

হইতে পাবে । ফটকিবি চূর্ণ ১০ গ্রেণ জিহ্বাব উপর দিয়া  
বাথিলে রোগের প্রকোপ তিরোহিত বা হ্রাসিত হয় বেদো-  
ডোনা, ব্রোমাইড অব পটাসিয়ম, ক্যানেবিস ইণ্ডিকা । গ্রিণ্  
ডিলিয়া বোবষ্টাব সার ৩ গ্রেণ মাত্রায় দিনে তিন বাব সেবনে  
বোগাক্রমণ নিবাবিত হয় তজ্জগ উহাব গিকুইড একষ্ট্রাক্ট  
২০।৩০ মিনিম মাত্রায় অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টান্তর বোগাবেশ কালে  
সেব্য । ভাইনম ইপিথ্যাক স্প্রে—কণ্ঠান্তবে ছৎপিণ্ডের পীড়া  
না থাকিলে অক্সিজেন । তাম্বকুটেব ধূমপান দ্বাবাও সময়  
সময় আক্ষেপ নিবাবিত হইতে পাবে সল্ফবস এসিড আত্মাণ  
বা ধূম প্রদান বোগেব উত্তেজক কাবণ কি বুঝিতে পাবিলে  
তাহা বিদূষিত করিবে । পাকশযে অজীর্ণ দব্য পূষিত থাকিলে  
বমনকাবক ঔষধ অল্পে অধিক মল সঞ্চিত থাকিলে বিবেচক  
পীচকারি দিবে । আক্ষেপ নিবাবণার্থ আইওডাইড অব পটাসিয়ম  
ও টিংচব বেলেডোনা ৪০৫ । নাইট্রেট এমিল, ক্রোরোফর্ম ও  
ইথব ইন্হেলেসন ধুতুবাব পত্র ও শাখাদি তামাকেব ত্রায়  
কলিকায় সাজিয়া তাহাব ধূমপান নাইটব পেপাব ফিউম্‌স  
ষ্ট্রংকফি, ব্রাণ্ডি বা হুইস্কি সবকিউটিনিয়ম ইন্জেকসন অব  
এট্রপিন ও মর্ফিয়া ; টর্পেন্টাইন ষ্টুপ্স, হট ওয়াটার ষ্টুপ্স, সিনা-  
পিজম, হেমলক পুলটীস বেদোডোনা ও ক্রোরোফর্ম ৯৫, টিংচব  
লোবিলিয়া ইথিবিয়া—৯৯, ১৩৮ একষ্ট্রা ষ্ট্রামোনিয়াই ১০৬ ।  
আবশ্যকানুসাবে অন্যান্য প্রকাব আক্ষেপনিবাবক ঔষধ প্রয়োজ্য  
নাইট্রেট অব এমিল ২ ১ ফোঁটা লইয়া তাহাব আত্মাণ মর্ফিয়া  
৬ গ্রেণ ও লাইকব এট্রপিয়া ১ মিনিম পরিমিত জল সহ অধস্তাচ  
প্রক্ষেপ দিলে রোগাবেশ তিবোহিত হয়



বোগাবেশ তিরোহিত হইলে সার্কাসিক স্বাস্থ্যেব উন্নতি  
 বিধায়ক উপায় অবলম্বনীয় শীতল জলে স্নান, বা স্পঞ্জ  
 বাথ অজীর্ণকর দ্রব্য আহাৰ নিষিদ্ধ, অত্যন্ত শ্লেষ্মা নিঃসৃত  
 হইতে থাকিলে ট্যানিন বা ক্যাটিকিউ লোজেন্‌জেস্। পৰিপাক  
 ক্রিয়াব দুৰ্বলতা থাকিলে এসিড নাইট্রোমিউবিয়েটিক ডিল  
 ১৬৯, পেপ্সিন ৪১৭ বোগেব কাৰণ স্পষ্ট বুঝিতে না  
 পারিলে আইমোডাইড অব্ পটাসিয়ম ব্যবহাবে উপকাৰ হয়,  
 ৩৯৯, ৪০৫ আর্সিনিক (লাইকব) ২৬ মিনিম মাত্রায়  
 ফস্ফরস কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে কম্পাউণ্ড বিউবার্ক পীল ৫ গ্রেন,  
 একট্রাঃ কোনাযম ৫ গ্রেন রাত্রিতে শয়ন কালে সেব্য ইন্‌হে  
 লেসন অব্ অক্সিজেন গ্যাস বা পাব অক্সাইড্ অব্ হাইড্রো  
 জেন বক্ষে ভিনিগাব স্পঞ্জিং এমোনিকার্ক ৪, ১১, স্প্রিঃ এমন  
 এবোমেটীক—১০, ৯৯, ক্যান্‌ফ—৩০৭, ৩১৮, ক্যাষ্টর ১৪০  
 হাইড্রেট অব্ ক্লোবাল, কুইনাইন, আয়বণ ও বিবিধ প্রকাৰ  
 বলকারক ঔষধ ও পথ্য বায়ু পবিতৰ্তন করা বিশেষ আব-  
 শ্যকীয় কফিইন সাইট্রাস শ্বাসকাসে স্থগিও দুৰ্বল থাকিলে  
 উপকার করে

### এম্ফিসিমা অব্ লংস্।

এই রীড়া দ্বিবিধ; ১ম ভেসিকিউলার বা পাল্মোনারি  
 এম্ফিসিমা, ২য়, ইন্‌টর লবিউলার এম্ফিসিমা প্রথম প্রকাৰে  
 বায়ুকোষ বিস্তৃত, উহাদেব ক্ষয় ও বন্ধাবাবাব অববোধ  
 উপস্থিত হয় দ্বিতীয় প্রকাৰে যোজকতন্তুব মধ্যে মধ্যে  
 বায়ু সঞ্চিত হয় উভয় প্রকাৰেই শ্বাসকষ্ট, সাময়িক হাপানি;

এবং বোগী এক্ষণে অসুস্থ হইয়া পড়ে যে, কোন প্রকার শ্রমযুক্ত কার্য্য কবিতো পাবে না। এতদ্বাৰা হৃৎপিণ্ডেব দক্ষিণ উদব পীড়িত হয় ও তৎসহ নৈবিক বক্তৃতি ও উদব বক্তৃতি জন্মিতে পাবে।

**ভেসিকিউলার এন্ফিসিয়া** — এক বা উভয় বা প্রত্যেকেব কিয়দংশ আক্রান্ত হইতে পাবে। কোন প্রকার শ্রম করিলে শ্বাসকষ্ট বদ্ধিত হয়। ক্ষীণ কাসি, সফেন শ্লেষ্মা নিঃসরণ, মুখমণ্ডল ধূস্রবর্ণ, শ্ববেব ক্ষীণতা, শবীনেব শীর্ণতা ও বলহানি এবং বক্র বা অবনত গতি দেহেব উত্তাপ হ্রাসিত ; কোষ্ঠবদ্ধ ; দুর্বল ও মৃদু নাড়ীস্পন্দন, হৃৎপিণ্ডেব \*ক ক্ষীণ বক্ষের পীড়িত দিক উন্নত ও গোলাকাব আকর্ষণে অত্যন্ত অস্পষ্ট ভেসিকুলাব মর্শ্বাব দৃশ্য হয়।

**ইন্টব লবিউলার এন্ফিসিয়া** — সহসা বায়ুকোষ বিদীর্ণ হইয়া গেলে উৎপন্ন হয় কদাচ পূর্বেক্ত রোগের সহিত মিলিত থাকে আক্ষেপনিবারক ঔষধ দ্বাৰা উপশম হইতে পাবে। অধিক স্থান ব্যাপী বোগ অবিরামেই সাংঘাতিক হয়।

**চিকিৎসা** — আর্সিনিক দ্বাব অল্প অল্প শ্বাসকষ্ট ও সর্দি সংমিশ্রিত রোগ উপশমিত হয় যদি শ্বাসকষ্ট অধিক ও তৎসঙ্গে বায়ুনলীভুজের প্রদাহ থাকে, তবে আর্সিনিক অপেক্ষা লোবিলিয়া বা বেলেডোনা উৎকৃষ্ট ক্রোবাগ হাইড্রেট বলকারক পথ্য ; উষ্ণ বস্ত্রাদিব দ্বারা বক্ষঃস্থল আচ্ছাদন, শয্যাশয় শয়ন করিয়া থাকা উচিত পবিপাক শক্তি বাহাতে স্বাভাবিকরূপে নির্বাহিত হয়, তাহার চেষ্টা কবিবে বলা

কারক ও আক্ষেপনিবাবক ঔষধ সেব্য । কুইনাইন ও আয়রণ ,  
 ষ্টীল ও পেপ্সিন কডলিভ অয়েল ; এমোনিয়া ; ইথর ;  
 হাইড্রোসায়েনিক এসিড ডিল—২, ৩, ৪ ইত্যাদি ইথিবিয়ান  
 টিংচর অব্ লোবিলিয়া , ইণ্ডিয়ান হেম্প—১৩৮, ৯৮ ষ্ট্রামো-  
 নিয়ম স্মোকিং ; ক্লোবোফর্ম ৩৬পার বায়ু পবিবর্তন আইয়ো-  
 ডাইড অব্ পটাসিয়ম বিশেষ উপকারী ছৎপিণ্ডের দৌর্বল্যে  
 ও প্রসারণে ষ্ট্রোফাস্‌স, ডিজিটেলিস, স্পাট্টিং, কফিইন প্রভৃতি  
 হিতকর

### ইডিমা অব্ দি লংস্—ফুসফুসের শোথ ।

অধিক দিন স্থায়ী প্রবল বক্তাদিক্য বশতঃ ফুসফুসে ইডিমা  
 জন্মে ; যে কোন কাবণে এই বক্তাদিক্য উপস্থিত হইতে পারে,  
 কিন্তু বিশেষতঃ ছৎপিণ্ডের পীড়া সংশ্লিষ্ট বক্তাদিক্যের জন্মই  
 ইডিমা জন্মে ইহা সাক্ষাৎ শোথ বোগের আনুষঙ্গিকও  
 হইতে পারে । ইহাতে শ্বাসকষ্ট ও বক্ষে টান বোধ থাকে ।  
 বেদনা প্রায়ই থাকে না অল্পাধিক কাস সহ অধিক পবি  
 মাণে জলবৎ শ্লেষ্মা ক্ষবণ হয় ।

চিকিৎসা —মূত্রকারক ঔষধ, বলকারক ঔষধ, বল-  
 কব পথ্য চর্ম্মের উপর যে সকল ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশিত  
 হয়, তাহা বলকবোধের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা  
 কর্তব্য বক্ষে ডুই কপিং । বোগীকে স্থস্থি ব ভাবে রাখিবে  
 ডিজিটেলিস ব্যবহারে উপকার দর্শিতে পারে কুইনাইনও  
 উপকারী

## হিমপ্টিসিস্—রক্তোৎকাস

স্ববয়স্ক, বায়ুনলী, বায়ুনলীভুজ বা ফুসফুসেব বায়ুকোষ হইতে বক্ত্রাব হয় মধ্যো মধ্যো এইকপ মুখ দিয়া রক্ত উঠা ফুসফুস বা হৃৎপিণ্ডের পীড়া জ্ঞাপক কাসিতে কাসিতে মুখগহ্বর রক্তপূর্ণ হয়, বক্ত্র লালবর্ণ ও সফেন, বক্ত্রের সহিত থুথু বা গয়েব মিশ্রিত থাকে মলদ্বার দিয়া বক্ত্রাব হয় ফুসফুস বা বায়ুনলীভুজীয় লক্ষণাদি থাকে গুটিকা সঞ্চয়, হৃৎধমন্ত্রবৃদ্ধি ।

বক্ত্রবমন অর্থাৎ হিমোটিমিসিস বোগ হইতে ইহাকে এই সকল লক্ষণ দ্বারা প্রভেদ কবিত্তে হয় বক্ত্রবমনে বিবমিষা, পাকায়ণে টানবোধ, অধিক পরিমাণে বক্ত্র বমন হয়, রক্ত সফেন থাকে না, কিন্তু উহা কালবর্ণ, এবং তাহা খাদ্য দ্রব্য বিমিশ্রিত থাকে মলদ্বার দিয়া বক্ত্রাব ও পাকায়ণিক বা কুদ্রাজিক লক্ষণাদি বর্তমান থাকে কিন্তু এই বোগে শ্বাস-বষ্ট, বক্ষে বেদনা বা উষ্ণতা ; কাসিতে কাসিতে বক্ত্র উঠা, বক্ত্র সফেন ও ঘোব লালবর্ণ এবং থুথু মিশ্রিত ফুসফুসের অপবাপব লক্ষণাদিও বর্তমান থাকে

চিকিৎসা ।—লিকুইড এক্সট্রাক্ট অব্ আর্গট ১০।২০ ৩০ মিনিম মাএয় ৩৪ ঘণ্টান্তর অথবা গুরুতব বোগে এক ঘণ্টা-ন্তর ব্যবহার করিলে বক্ত্রাব নিবাবিত্ত হয় আর্গটিনেব অধস্তাচ প্রক্ষেপ হ্যাগামিলিস টিংচর ১২৫ মিনিম মাএয় ২।৩ ঘণ্টান্তর প্রয়োগে উপকার দর্শে। ইপিক্যাক পাউডব বা ভাইনম ; ইনফিঃ ডিজিটেণিস মর্ফিয়াব অধস্তাচ প্রক্ষেপ



অর্থাৎ হাইপোডার্মিক ইন্জেক্সন বক্তৃত্ত্ব শীঘ্রই বন্ধ করা  
 কর্তব্য বোগীকে শযায় শয়ান ও নিস্তর থাকিতে পৰামৰ্শ  
 দিবে গ্যালিক এসিড ১০—১৫ গ্ৰেণ মাট্রায় ১২৩ বা ৪  
 ঘণ্টান্তর বোগেব অবস্থানুসাবে প্রয়োজ্য ইহার সঙ্গে সল্-  
 ফিউরিক এসিড ম্যাবোমেটিক মিশ্রিত করিয়া দিলে অনেক  
 সময় বেশী উপকার হয় বক্তৃত্ত্ব (এনিমিয়া) লক্ষণ  
 বর্তমান থাকিলে গ্যালিক এসিডেব অপেক্ষা ৫ ১০ গ্ৰেণ  
 মাট্রায় এমোনিয়ো সলফেট অব্ আয়বণ উপযোগী বন্ধে  
 নৈতাপ্রয়োগ ও বরফ খণ্ড মুখে বাখিয়া চুষিলে উপকার  
 হয় ক্লোরাইড অব্ সোডিয়ম ২ ড্রাম একটী জলপূর্ণ বড়  
 গ্লাসে ঢালিয়া তাহা ঘন ২ এক ২ চুমুক পান কবিলে বক্তৃত্ত্ব বন্ধ  
 হয় ছাজিলিন, টিং ফেবি এসিটেট্‌স্, ক্লোরাইড অব্ ক্যালসিয়াম  
 উপকারী বিরেচনার্থ সলফেট অব্ ম্যাগ্নিসিয়া, সলফেট অব্  
 আয়বণেব সঙ্গে, ১৭৭ এক চা চামচ পবিমিত লবণ জল  
 সহ সেবন কবিলে বক্তৃত্ত্ব নিবারিত হয় টর্পেন্টাইন,  
 বক্ষঃস্থলেব উপব ডাই কপিং, টর্পেন্টাইন ষ্টুপ্স বোগীকে  
 ছুঁক, মাংসব যুষ, কাঁচা ডিম্ব প্রভৃতি বলবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক  
 পাদ্য দিবে ক্লাবেট ও পোটটোমাইন বিশেষ উপকারী  
 কাসি নিবারণার্থ মর্নিয়া এটোমাইজড ম্যাট্রীন্‌জেন্ট ফ্লুইড  
 এসিড ট্যানিকের ইনহেলেশন বায়ু পরিবর্তন ও পরিবর্তক  
 ঔষধ সেবন কর্তব্য এসিটেট অব্ লেড ও ওপিয়াম, বা টিংচর  
 ও পাব্‌ক্লোরাইড অব্ আয়বণ ও উপকারী টর্পেন্টাইন আত্মাণ  
 বিশেষ উপকারী একটা বড় পাত্রে উষ্ণ জল বাখিয়া তাহাতে  
 টর্পেন্টাইন ঢালিয়া দিবে উহা বোগীব নিকট বাখিবে অর্থাৎ

যাহাতে তাহা হইতে উদ্ধিত বাষ্প সহজে আশ্রাণ কবিত্তে পারে  
ইহাতে কাসিব উগ্রতা ও রক্ত উঠা নিবাবিত হয়

## প্লুবিমী, প্লুবাইটস ফুস্ফুসাববক- বিল্লী-প্রদাহ

ফুস্ফুসাববক বিল্লীর প্রদাহ, ইহা তখন ও প্রাচীন ভেদে  
দ্বিবিধ এক বা উভয় দিক আক্রান্ত হইতে পারে

লক্ষণ — শীত বা অল্প কল্প, জ্বর বা ক্ষুব্ধ পার্শ্ব তীব্র  
ব স্রুতীবোধবৎ বেদনা উহা সাধাবণতঃ চুচুকেব নিম্নে অনু-  
ভূত হয় নিশ্বাস গ্রহণ কালে ফুস্ফুস ও সাবিত হইলে বেদনা  
বৃদ্ধি হয়, তন্নিম্ন কাসিতে, পার্শ্ব শয়ন কবিত্তে ও চাপে  
বেদনাব আতিশয়া হয় ক্ষুদ্র শুষ্ক কাসি, চর্ম উষ্ণ ও শুষ্ক,  
দৈহিক উত্তাপ ১০১ হইতে ১০৫ ডিগ্রী কমপোলদেশ আর  
ক্রিম নাড়ী কঠিন ও দ্রুত, শ্বাস প্রশ্বাসও কিকিৎ দ্রুত, উৎ-  
কণ্ঠা ও অস্থিরতা মূত্র স্বল্প ও বক্তবর্ণ ভৌতিক লক্ষণ—  
প্রথমে ঘর্ষণ শব্দ শুষ্ক ও প্রদাহিত প্লুবা অর্থাৎ ফুস্ফুসজ্বরের  
ছই পর্দা পবম্পাব ঘর্ষিত হওয়ায় ঘর্ষণ শব্দ শ্রুত হওয়া যায়  
ইহা শীঘ্রই তিবাহিত হয়, তখন পর্দাদ্বয় আর্দ্র ও চিক্ন হইয়া  
উঠে ও প্রদাহ উৎপাদিত হইতে থাকে তখন পর্দাদ্বয়  
একত্র সংযুক্ত হইয়া যায় বা উহাদের মধ্যে মাষ্টক বস সন্ধিত  
হয় শেষোক্ত ঘটনা হইলে তাহাকে হাইড্রোথোরাক্স বনে  
মাষ্টক বস কয়েক আউন্স হইতে কয়েক পাইন্ট পর্য্যন্ত হইতে  
পাবে অত্যধিক পরিমাণে বস সঞ্চয় হইতে ফুস্ফুসের ত্রিভা

## নিউমোনিয়া — ফুসফুস-প্রদাহ ।

ফুসফুসের তরল প্রদাহ, বাম দিকের অপেক্ষা দক্ষিণ দিকের ফুসফুস অধিক সময় আক্রান্ত হয় উর্দ্ধ অপেক্ষা ফুসফুসের নীচের অংশ অধিক পীড়িত হইয়া থাকে । উপদ্রববিহীন বোগের স্থিতিকাল গড়ে ১৪ দিন

লক্ষণ — অস্থিৰতা ও জ্বরভাব সহ বোগ প্রকাশিত হয় এক হইতে তিন দিবসাবসানে শীত, তৎপবে বিবমিষা, কাসি, আঠাবৎ ঘন এবং ইষ্টকবর্ণ গয়েব, পার্শ্ববেদনা, শ্বাসকষ্ট ; নাড়ীস্পন্দন ১৪০ বা ১৬০ পর্য্যন্ত প্রতি মিনিটে, দৈহিক উষ্ণতা ১০৫ ডিগ্রী, তৃষ্ণা, ক্ষুধাভাব, অবসন্নতা, শিবেদনা এবং ক্ষণস্থায়ী প্রলাপ এই বোগের তিন অবস্থা ১ম— স্পিনিজেন্সন বা বক্তপূর্ণাবস্থা এই সময় পীড়িত অংশ বক্তপূর্ণ বা বক্তবসপূর্ণ থাকে আকর্ণনে ক্ষুদ্র ক্রিপিটেশন বা কেশ-মর্দন শব্দ শুনা যায়, কিন্তু প্রথম প্রথম উহার সহিত বুদ্ধবুদ্ধ বা ভেসিকিউলাব শব্দ মিশ্রিত থাকে বক্ষে প্রতিঘাত করিলে স্বাভাবিক শব্দ শ্রুত হয়, কিন্তু ক্রমশঃ উহার পরিবর্তন সংঘটিত হয় ২য়, প্রদাহ বৃদ্ধি হইলে রেড্‌ হিপাটিজেন্সন বা লোহিত যক্ষতাভ আকার হয় স্পঞ্জবৎ প্রকৃতি বিনষ্ট হইয়া ফুসফুস বিধান কর্তিন ও গাঢ় হয় ক্ষুদ্র কেশ মর্দন বা বুদ্ধবুদ্ধ শব্দ শ্রুত হয় না, কিন্তু ব্রংকোফনি বা বায়ুনলীতে স্বর প্রতিধ্বনি ও বায়ুনলীব শ্বাস শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় । বক্ষে আঘাত করিলে ডল্‌ শব্দ শ্রুত হয় ৩য়, গ্রে হিপাটিজেন্সন বা পুক-লেণ্ট ইন্‌ফিল্ট্রেশন অর্থাৎ ধূসব যক্ষতাভ বা পৃথপূর্ণ অবস্থা

ফুসফুসের তন্তুতে পুষ্টি, ফুসফুসের কতক অংশ কঠিন হয় ও বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। অনেক সময় প্রকৃত পুষ্টি, না জন্মিয়া একরূপ তবল পদার্থ সঞ্চিত হয় ফুসফুসের কতকাংশ বিদীর্ণ ও পুষ্টি শোষাসহ বাহির হইতে থাকিলে গর্গিলিং ক্রিপিটেশন শ্রুত হওয়া যায় ফুসফুস পূর্য পূরিপূরিত হওয়ার পূর্বে প্রদাহ উপশান্ত হইলে যকৃতভাবাপন্নও স্থায়ী বা বা ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হয় শোষোক্ত প্রকার ঘটনায় ফুসফুসের ভিতর পুনরায় বায়ু গমনাগমন করিতে থাকে।\* রোগের প্রথম ও দ্বিতীয় দিবসে প্রস্রাবে ক্লোবাইডের পরিমাণ স্বাভাবিক থাকে, কিন্তু প্রদাহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার পরিমাণের হ্রাস হয় ফুসফুস যকৃতভাবাপন্ন হইবার সময় প্রস্রাবে ক্লোবাইডের অংশ অদৃশ্য হয় রোগ ক্রমশঃ আরোগ্যোন্মুখ হইতে আবর্ত হইলে ক্লোবাইড পুনঃ দৃষ্ট হয় তখন প্রদাহ প্রাচীন বোগে পরিণত হইতে পারে ইহাতে ফুসফুস তন্তুর অংশ বিশেষ গাঢ় ও কঠিন হয় গুটিকজাত কঠিনতার সহিত এম হইতে পারে এতদ্বারা দুর্বলতা, শীর্ণতা, কাসি, জ্বরভাব, ক্ষুধালোপ ও বমি যন্ত্রণানুভব হয়।

চিকিৎসা — বোগের প্রাবল্যে অতি অল্প মাত্রায় ও ঘন ঘন টার্টার এমেটিক প্রযুক্ত হইলে একোনাইট অপেক্ষা অধিক উপকার দর্শে, বিশেষতঃ যদি চর্ম শুষ্ক ও উষ্ণ থাকে রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইলে ত্রাণ্ডি ব্যবস্থা করা বিবেচ্য বেদনার আতিশয্য নিবারণার্থ মর্ফিয়ার ইন্জেকসন্ টাইফয়েড অর্থাৎ সান্নিপাতিক লক্ষণ বর্তমানে যক্ষবস উত্তাপ হ্রাস করিবার জন্য স্যালিসিলেট অব্ সোডা ; আইওনিয়া ও ভিরেটম ভিরিড



প্রযোজ্য অথবা এন্টিপাইরিন, ফিনোসিটিন সাবধানে প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু বিশেষ উপকার দর্শে না কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ক্যাষ্টর অয়েল এক মাত্রা বোগীকে স্থির ও নিশ্চল ভাবে রাখিত রাখিবে রোগীর বাসগৃহেব বায়ু আর্দ্র রাখিবে দৈহিক উত্তাপ হ্রাস ও প্রদাহ দমন করণার্থ লাইকর এমোনিয়া এসিটেটস— ২৮২, ২৮৩; লাইকর এমোনিয়া এসিটেটস ও একোনাইট ২৮৮, অথবা লাইকর এমোনিয়া এসিটেটসেব সঙ্গে ভাইনম কলটিকম বা টিংচর ওপিগম কাসিব উগ্রতা নিবারণার্থ ক্লোবোফর্ম অম্লান; বোগী অত্যন্ত দুর্বল হইলে এমোনিয়া ও ক্লোবোফর্ম ৩১০; বক্ষস্থলে মসিনাব পুলটীস; পপীথেড্ ফোমেন্টেসন, টর্পেন্টাইন ঔষ্ম (৬খু পথ), শীতল জল, দুগ্ধ, মাংসেব যুষ, ত্রাণ্ডি, পোর্ট আদি সুবা, ডিঘ। বলকারক ঔষধেব মধ্যে বার্ক ও এমোনিয়া; কুইনাইন ও আয়বণ—৩, ৯, ১৮৩, ১৮৪, ১৭৬ হৃৎপিণ্ডেব দৌর্বল্য প্রাচুভূত হইলে ত্রাণ্ডির সঙ্গে লাইকর ষ্ট্রীকনিয়া সেবনার্থ বিধান করিবে অথবা ২।৩ ফোটা লাইকর ষ্ট্রীকনিয়া হাইপোডার্মিক ইন্জেক্সন দিবে। ডিজিটেলিস, কফিইন, স্পারটীন, স্ট্রোফান্ডস উপকারী এমন কার্ক ও সেনেগা ৩০১, ৩০৩, বিবিধ প্রকার উত্তেজক কফ নিঃসারক ঔষধ প্রযোজ্য ৩, ৮, ১৩, ৯৭, ৩০৬, ৩০৮, ৩১১, ৩২২ বোগ পোচীনাংকার ধারণ করিলে আইয়োডাইড অব পটাসিয়ম ৪০৫, ৪০৭; আইয়োডাইড অব আয়বণ, ক্লোবাইড অব এমোনিয়া; কডলিওব অয়েল; আইয়োডিন লিনিমেন্ট বক্ষে মর্দন; পুষ্টিকর পথ্য ও বায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি। পূর্বে এই বোগে অধিক মাত্রায় এন্টিগনী, ক্যালো-

মেল ও বঙামোক্ষণাদি ব্যবহৃত হইত ; কিন্তু এক্ষণে তদ্বারা চিকিৎসা করা প্রথা উঠিয়া গিয়াছে প্রদাহ অত্যন্ত বর্ধিত হইয়া যদি পচন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উদ্ভেজক ও বল-কাবক ঔষধ ; স্নুবাতি, মাংস যুষ, লাইকব সোডি ক্লোরেট ৭, এমোনিয়া ও বার্ক ; ক্লোবেট অব পটাস ও ষ্টীল ১৮৯, কড্ লিভ অয়েল কার্বলিক এসিড ও ক্রিয়েজোটের ইনহেংসন বা টর্পেন্টাইন ভেপার কুইনাইন, পোর্ট, সিনকোনা প্রভৃতি দিবে নিদ্রাহীনতার সল্ফোনাল প্রয়োজ্য। ক্লোবাল—হুং-পিণ্ডের অবসাদক বিধায় ব্যবহার্য্য নহে বেদনাব আত্যাঘে অতি সতর্কতা সহকাবে শ্বেদজনক ঔষধেব সঙ্গে অন্ন মাট্রায মর্ফিয়া দেওয়া যাইতে পারে রোগ প্রস্রুতি, কাসি ও পেক্টোরাল স্পাস্টিক জন্ম ক্যালসিস হাইপোফস্ফ হিতকর ইহা সিবপ টলু, টিং নক্স বা ইউক্যালিপ্টাই অয়েল সহ ব্যবহার্য্য এই পীড়ার চিকিৎসা-কালে হুংপিণ্ডের ক্রিয়াব উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য

থাইসিস্ বা পালমোনারি কনজম্‌সন।

যক্ষ্মা—ক্ষয়কাস।

এই বোগ কোলিক বা স্বয়ন্তূত হইতে পারে বাম ফুস্‌ফুস অধিক আক্রান্ত হয় উর্দ্ধ অংশের পশ্চাৎ ও অগভাগে সাধা-বণতঃ গুটিকা সঞ্চিত হয় জীবনের সকল সময়েই এই বোগ জন্মিতে পারে

তরুণ বোগ —এই পীড়া অত্যন্ত বিরল সহসা শীত, কম্প, জ্বর, বেদনা, কাসি ও শ্বাসবৃদ্ধি উপস্থিত হইয়া

রোগ আরম্ভ হয় । কিয়ৎকাল পরেই বিলেনী জ্বর (হেপটিক ফিভার), অতিশয় স্বেদস্রাব ও উদবাময় প্রাক্তভূত হইয়া থাকে । ফুসফুস বিধান অবিলম্বে নষ্ট হইয়া উহার মধ্যে গহবর জন্মে । ক্রমশঃ শীর্ণতা পরিবর্দ্ধিত হয় রোগের প্রারম্ভ কালাবধি ৩ হইতে ১২ সপ্তাহের মধ্যে অতিশয় অবসন্নতা উপস্থিত হইয়া বোগীর মৃত্যু হয় । ফুসফুসের মৰ্কস্থানে বিশেষতঃ মধ্য ও নিম্ন বিভাগে ( লোবে ) গুটিকা সঞ্চিত হয় ।

প্রাচীন রোগ ।— এই প্রকার পীড়াই সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় এক বা উভয় ফুসফুসেই গুটিকা সঞ্চিত হয় । শবীরেব অন্ত্যবিধানেও গুটিকা সঞ্চিত হইতে পারে ।

লক্ষণ । ক্রমশঃ বর্দ্ধিত কাসি, বক্তোংকাস, দুর্বলতা, শ্লেষ্মা নিঃসরণ, ক্ষুধাভাব ও মেদাঙ্ক দ্রব্য ভক্ষণে অনিচ্ছা ; অজীর্ণ, নাড়ী দ্রুত, জ্বর, অল্প অল্প শ্বাসকষ্ট, শীর্ণতা, স্বেদস্রাব ও উদবাময়, স্বরদৌৰ্বল্য বা স্বরভঙ্গ যত দিন পর্য্যন্ত গুটিকা সঞ্চিত হইতে থাকে, ততদিন দৈহিক উত্তাপ বর্দ্ধিত হইয়া ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হইতে পারে জরুস্থি ও অংশফলকাস্থির নীচে অতীব কন্কনে বেদনা সময়ে সময়ে মলদ্বাবে নালী অর্থাৎ ভগন্দর উপস্থিত থাকে । প্রথমাবস্থায় রক্তোংকাস অতি সাধারণ মুখগহবর ও গলাতে শ্বেতবর্ণ ক্ষত গলকোষ, স্বরযন্ত্র ও বায়ুনলীর শৈল্পিক বিহীতে ক্ষীণ প্রত্যাহ এই সকল স্থানে শৈল্পিক বিহীর নিম্নেও গুটিকা সঞ্চিত হইতে পারে জীলোকদের জরাযুর ক্রিয়া বিশৃঙ্খলা, আর্তব বিলোপ যকৃতে বক্তাধিকা ও বেদনা হস্তেব নখ সকল বক্রীভূত হয় হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগ জড়িত । দৌৰ্বল্য ও শীর্ণতা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হয় ।

অধিক পবিত্রিত নৈশ ঘর্ষ । উদবায়ন—অস্বস্থ নিঃশ্বাস বা অস্বস্থ  
ক্ষত বশতঃ উৎপন্ন হয় মূত্রে সময় সময় আল্‌বুমেন বা শর্করা  
থাকে শাখাষ অর্থাৎ হস্তপদে শোথ ও বেদনা মৃত্যুকাল পর্যন্ত  
মনোবৃত্তি প্রকৃতিস্থ থাকে ।

## ভৌতিক লক্ষণ বা ফিজিক্যাল সাইন্স

প্রথমাবস্থায়—যদি গুটিকা সঞ্চয় অত্যধিক হইয়া থাকে, তবে  
জত্রর অধঃ ও উর্দ্ধ প্রদেশ বিস্তৃত হয় । আক্রান্ত দিকের উর্দ্ধ ও  
সম্মুখ অংশ ভালরূপে প্রসারিত হইতে পারে না । আঘাতে ডল্  
শব্দ কর্কশ বা নলীয় শ্বাস ( টিউলার ইন্সপিরেশন ) প্রশ্বাস  
দীর্ঘ বায়ুনলীয় শ্বাস ও তাহাতে স্বর প্রতিধ্বনি—ব্রংকিয়েল  
বেস্পিরেশন ও ব্রংকোফনি । দ্বিতীয়াবস্থায়—জত্রর নিম্ন ও উপর  
প্রদেশ বসিয়া যায় । বক্ষঃ সঞ্চবণের অসম্যকতা । আঘাতে ডল্  
শব্দ স্পষ্ট যদি গুটিকা অল্প ও এন্ফিসিমা থাকে, তাহা হইলে  
ডল্ শব্দ হয় না । বড় কেশ মর্দন শব্দ বা ক্রিপিশন স্পষ্ট  
ফুসফুসে—পিউরাইল বা শৈশব শ্বাস শব্দ শ্রুত হয় তৃতীয়াবস্থায়—  
জত্রর নীচের অংশ অতিশয় বসিয়া যায় । আক্রান্ত দিক  
বিস্তৃত । পশ্চাৎ মধ্যস্থান কুঞ্চিত বা পশ্চাত্তাগে আকর্ষিত ।  
ফুংপিণ্ডের স্পন্দন স্পষ্ট অনুভূত ও দৃষ্ট হয় । আঘাতে ডল্  
শব্দ । গরুগিলিৎ বা অস্বস্থ গহ্ববে তবল পদার্থ দ্বারা এইকপ  
শব্দ হয় । ক্যাভার্নস রেসপিরেশন বা গাহ্ববিক শ্বাস গহ্বব  
আংশিক বা সম্পূর্ণ শূন্য থাকিলে এম্পোরিক রেজোনান্স  
অর্থাৎ বোতলের মুখে ফুৎকার দিলে যেমন শব্দ হয় । গহ্বব



বৃহদাকার হইলে পেক্টোবিলোকুই অৰ্থাৎ দ্বয় প্ৰতিধ্বনি স্পষ্ট  
শুনা যায়

চিকিৎসা ।—এট্ৰিয়া হৃৎকোষ—১৮০ গ্ৰেণ অবস্থায় প্ৰক্ষেপ  
অথবা ৮৮ গ্ৰেণ বটিকাৰূপে দিলে শ্বেদশ্ৰাব নিবাবিত হয় নিদ্ৰাব  
জন্তু ক্লেবাল বা সলফোনাল ; ইহাতে কাসি ও অধিক শ্বেদশ্ৰাব  
নিবাবিত হয় । নৈশ কাসতে ক্ৰোটন ক্লেবাল কাসির জন্তু  
জেলসিমিয়ম ইপিকিউয়ান্‌হা প্ৰে—গলাভ্যন্তৰে উদবাময়ে  
কবোদিৰ সল্লিমেট ১১৮ গ্ৰেণ নৈশঘৰ্ম্মে ডোভৰ্স পাউডৰ ।  
ফসফেট অব্‌ লাইম—প্ৰাচীন বোগে ও উদবাময়ে কুইনাইন—  
উত্তাপ হ্ৰাস ও ঘৰ্ম্ম নিবাবণ জন্তু ব্যবহাৰ্য্য নিশ্বাসে দুৰ্গন্ধ ও  
দুৰ্গন্ধি শ্লেষ্মাশ্ৰাবে শ্ৰাঙ্গিসিদ্ধি এন্ডিও ৫ গ্ৰেণ মাত্ৰায় প্ৰয়োজ্য  
সল্‌ফবস এন্ডিডেব ইনহেলেমন, প্ৰে বা ফিউমিগেশন । ফুসফুসা-  
ভ্যন্তৰে গুটিকা সঞ্চিত হইলে সাক্ষাঙ্গিক স্বাস্থ্যৰ উন্নতি বিধায়ক  
উপায়াবলম্বন কৰ্ত্তব্য পথ্য পুষ্টিকাৰক হওয়া উচিত ; বিগুন্ধ  
বায়ুতে ব্যায়াম ; বক্ষঃস্থল পশমী কাপড় দ্বাৰা আচ্ছাদিত রাখা ;  
ঈষদুষ্ণ জলে স্নান ও গাত্ৰ মৰ্দ্দন । কড্‌লিভৰ অয়েল সেবন বিধেয়  
আহাৰেব জন্তু ছাগ ও কুকুটাদিৰ মাংস, দুগ্ধ, ঘৃত, নবনীত, ত্ৰাণ্ডি,  
পোৰ্টোদি মদ্য পাকায়ণেব শক্তিব দুৰ্ব্বলতা থাকিলে পেপসিন  
৪১৭ ; ম্যাকেরেটেড্‌ সলিউসন অব্‌ লাইম । বায়ু পৰিবৰ্ত্তন এই  
বোগেৰ পক্ষে বিশেষ হিতকৰ এই রোগেৰ সৰ্ব্ব প্ৰধান ঔষধ  
কড্‌লিভৰ অয়েল—১৯২, ৪১০ প্ৰথমে এক চা চামচ মাত্ৰায়  
দুগ্ধেৰ সহিত আহাৰান্তে সেবনীয় ইহা দিনে দুই তিনবাব  
সেবন কৰান যাইতে পারে পাকায়ণে অগ্নি উৎপন্ন হইলে  
লাইম ওয়াটাৰেৰ সঙ্গে কড্‌লিভৰ অয়েল দিবে, বুকজ্বালা ও

ও বিবমিষা থাকিলে উহাৰ সঙ্গে পেপসিন দিবে কডলিভৰ অয়েল ও মণ্ট একষ্ট্রাক্ট প্যানক্রিয়েটিন্ ৬ হইতে ৮ গ্ৰেণ মাত্রায়, জল বা জিঞ্জব ওয়াইনের সঙ্গে ; প্যানক্রিয়েটিক ইমলসন্ ১—৪ ড্রাম মাত্রায় আহাৰের পরই সেব্য কডলিভৰ অয়েল যদি পাকা-শযে সহ না হয়, তবে ইহাৰ পীচকাবি বা মর্দন ব্যবহার্য গ্লিসি-বিন ; কোকোয়া নট অয়েল বা সাইট্রেট অব্ আয়রন এণ্ড এমোনিয়া সিৰপ অব্ আইয়োডাইড্ অব্ আয়বণ, টিংচর অব্ পারক্লোবাইড্ অব্ আয়রন ও কুইনাইনাদি—১৮১ ১৮২, ১৭৬, ১৮৯, ১৯৩, ২০১ বিবিধ প্রকাৰ লৌহঘটিত ঔষধ আই-যোডিন ও আইয়োডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্ ১৭৫, ১৯২, ৩৯৯, ৪০১, ৪০৭, ৪১১ লিকুইড একষ্ট্রাক্ট অব্ সিনকোনা, লাইকর পটাশ ; আর্সিনিক ৪১১, ফস্ফরস ; হাইপো ফস্ফাইট অব্ সোডা ও লাইম, ৪৩০ কাসিব আতিশয্য থাকিলে মর্ফিয়া বা ওপিয়ম ; শিথ পানীয় বস্ত্র উঠিতে থাকিলে অয়েল অব্ টর্পেণ্টাইন ২১৭, এমোনিয়ো সলফেট অব্ আয়বণ, গ্যালিক এসিড ইত্যাদি স্থপাণ্ডেব ক্রিয়ার উগ্রতা বর্তমান থাকিলে হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ডিল বা ১৭সঙ্গে অল্প মাত্রায় ডিজিটেলিস বা টিংচর অব্ আমেবিকান্ ওয়াইল্ড চেবি নৈশ শ্বেদজাব নিবারণার্থ গ্যালিক এসিড, মিনাবেল এগিড্‌সেব সঙ্গে ; বা ইনফিঃ বার্ক বা শয়নকালে অক্সাইড অব্ জিঙ্ক ৫ গ্ৰেণ বা কডলিভৰ অয়েল ও পোর্ট ওয়াইন। উদবাসম নিবারণার্থ ক্যাটি-কিউ ২২০ ; কটো ; কাইনো ও মগুডড ২২২ কম্পাউণ্ড কাইনো পাউডব ; ওপিয়ম এনিমা ; বিসমথ—২২৪, ২৩৪, ২৩৫ ; অক্সাইড অব্ সিলভর ও ওপিয়ম। সলফেট অব্

কপাৰ ও ওপিয়ম শ্লেষ্মাশ্রাব ক্ৰাস করণার্থ ও উগ্রত নিবারণার্থ টৰ্পেণ্টাইন ইন্‌হেলেশন, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ইন্‌হেলেশন বক্ষঃস্থলে প্রত্যাগ্ৰতা সাধনার্থ ক্রোটন অয়েল লিনিমেন্ট, ব্লিষ্টার, ড্রাইকপিং; সিনাপিজম্‌স, টৰ্পেণ্টাইন ষ্ট্ৰুপ্‌স, আইয়োডিন লিনিমেন্ট, বেলেডোনা ও একোনাইট লিনিমেন্ট ফুসফুসে ক্যান্সাৰ হইলে পুষ্টিকাৰক খাদ্য, কঙ্কলিওব অয়েল, উত্তেজক, বলকাৰক ও বেদনা নিবারণক ঔষধ প্রয়োজ্য গোয়েকল, ইউক্যালিপ্টল, ক্রিয়েজোট প্রভৃতি সেবন ও আত্মাৰ হিতকাৰী কাৰ্বনেট অব্‌ গোয়েকল ১০ ১৫ গ্ৰেণ, দিনে ২ ৩ বাৰ দুগ্ধেব সহিত সেবনে বিশেষ উপকাৰ দৰ্শে আৰ্শিনিক ও মলফব প্রযোগেও বিশেষ উপকাৰ হয়

ডিজিজেন্স্‌ তব্‌ দি হাৰ্ট—হৃৎপিণ্ডের পীড়া

পেরিকার্ডাইটিস ।—( হৃৎপিণ্ডাববক ঝিল্লী প্রদাহ )

হৃৎপিণ্ডেব আববক পর্দাব প্রদাহ বাত, ব্রাইটাখা মূত্রগ্রন্থিব পীড়া, পূৰ্বাশ্রক বক্ত ও শীতাদ বোগেব সঙ্গে এই পীড়া সৰ্ব্বদা উপস্থিত হইতে দেখা যায়

লক্ষণ ।—সময় সময় এত সামান্য যে সহসা বোগ নির্ণয় কবিতে পাৰা যায় না সূত্রীণ পদার্থ স্বল্প ক্ষবিত হয় বা ক্ষবিত মস্ত অবিলম্বে আচুষিত হয় বা পর্দাব সংযোগ উপস্থিত হয়; তখন কেবল জবভাব ও হৃৎপিণ্ড প্রদেশে কষ্ট বোধ হয় আৰ অতিশয় হওয়ায় ( হাইড্রোপেরিকার্ডিয়ম ) হৃৎপিণ্ড চাপিত হইলে উহার স্পন্দন বিশৃঙ্খল হয় অত্যন্ত

প্রবল জ্বর, হৃৎপ্রদেশে বেদনা, ঐ বেদনা ছুরিকা বা তীর বেধবৎ ও বাম অংসফলকাস্থিব ভিতর দিয়া বাম জএস্থি ও স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত উখিত হইয়া পবে বাহু পর্য্যন্ত নামিয়া আইসে হৃৎপিণ্ডেব ক্রিয়া বিশৃঙ্খল, নাড়ীস্পন্দন অনিয়মিত, শ্বাসকৃচ্ছ, শয়ন কবিত্তে অশক্তি, মুখাকৃতি ঔৎকণ্টিক, কর্ণে নিনাদ, শিবোষুর্গন, নাসারক্তস্রাবাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয় রোগ বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে সাতিশয দুর্বলতা, কাশি, সময় সময় শ্বাসাববোধ, মুচ্ছা প্রবণতা, মুখমণ্ডল ও শাখাতে শোথ সাতিশয অস্থিবতা, মুখমণ্ডল বিকৃত, ধনুস্তম্ভবৎ আক্ষেপ, প্রলাপ ।

ভৌতিক লক্ষণ — ফিক্সন বা ঘর্ষণক শুনিতে পাওয়া যায় ও হস্তে অনুভূত হয় হৃৎপিণ্ডেব ক্রিয়াব উৎসাহ ।

চিকিৎসা । — প্রথমাবস্থায় সাতিশয বেদনা ও প্রদাহ থাকিলে একোনাইট টিংচর অল্প মাত্রায় বাবংবার মেব্য বোষ্টবদ্ধ থাকিলে ক্ষাবণটিও বিবেচক ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৯ বাই-কার্বনেট অব্ পটাশ ৩০ গ্রেণ্ মাত্রায় ২৩ ঘণ্টান্তর বেদনা ও অস্থিবতা নিবারণার্থ ওপিয়ম, ওপিয়ম ও বেভেডোনা—৮৮, ৯৫, ১০১ ভেপার বাথ, পপী ও ক্যামোমাইল ফোমেণ্টেশন, মসিনাব উষ্ণ পুলটীস ক্ষাব পানীয়—২৯২, ২৯৩, ২৯৬ হৃৎপিণ্ডেব বলবিধানার্থ ডিজিটেলিস লঘু পথ্য, মণ্ড, সাণ্ড, ম্যাবাকট, ছুফ, মাংস যুষ ও মদ্যাদি দেওয়া বিধেয় বস প্রানিত হইয়া সঞ্চিত হইবে ব্লিষ্টাব ও সেবনার্থ আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম, বেড আইয়োডাইড অব্ মার্কবী ট্যাপিং বাত পীড়া জনিত রোগে বাতপীড়ার চিকিৎসা অবলম্বনীয়



এণ্ডোকার্ডাইটিস হৃৎপিণ্ডাভ্যন্তরস্থ-ঝিল্লী প্রদাহ।

হৃৎপিণ্ডাভ্যন্তরে প্রলিপ্ত মাস্তক ঝিল্লীব প্রদাহ, ইহা সচরাচর তরুণ সন্ধিবাত্ত বোগ-সংশ্লিষ্ট থাকে সাধারণতঃ পেরিকার্ডাইটিস রোগের সহিতও মিলিত ভাবে উপস্থিত হয়

লক্ষণ — প্রবল রোগে হৃৎপিণ্ড প্রদেশে যাতনা ও অসুখ বোধ জ্বব; নাড়ী ক্ষুদ্র, ক্ষীণ ও পর্যায়শীল চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া থাকিতে বোগী ভাল বাসে অস্থিরতা ও উৎকর্ষা, নীতল শ্বেদপ্রাব যাতনাদায়ক শ্বাসকৃচ্ছ, সতত পার্শ্ব পরিবর্তন, মুচ্ছা বাত বোগের সঙ্গে উৎপন্ন হইলে কখন কখন নির্ণয় করিতে পাবা যায় না দক্ষিণ দিক অপেক্ষা হৃৎপিণ্ডের বামদিকে এই গীড়া অধিক হয় কপাট ও দ্বাব আচ্ছাদক ঝিল্লীই সাধারণতঃ আক্রান্ত হয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাংঘাতিক নহে, কিন্তু পরম্পরিত ফল তদ্রূপ। পরিণাম—হৃৎপিণ্ডের কপাটের স্থায়ী গীড়া, রক্তাপকৃষ্টতা, বক্ত সঞ্চালনের অববোধ, উদবী বা আকস্মিক মৃত্যু

চিকিৎসা — পূর্ববর্ণিত বোগের স্থায় প্রদাহের প্রাবস্ত হইতেই কার্বনেট অব্ এমোনিয়া; স্যারোমেটিক স্পিরিট অব্ এমোনিয়া দিবে—ইহাতে হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে ফাইব্রিন জন্মিতে পারে না

ভ্যান্ডিউলার ডিজিজ অব্ হার্ট—

হৃৎপিণ্ডের কপাটের গীড়া।

হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তর-প্রলিপ্ত ঝিল্লীর প্রদাহ বশতঃ উহাব অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হয়, অর্থাৎ উহাব উপবে ও নীচে লম্বীক

সঞ্চিত হইয়া থাকে । হৃৎপিণ্ডের দ্বাবে কপাট সকলের স্বচ্ছতা ও কোমলতা বিনষ্ট হইয়া উহা পুরু, সংকুচিত ও প্রস্ফাব সংযুক্ত হয় প্রদাহ ব্যতীত কপাটে তালি ও তজ্রপ মাংসাক্ষুব উপস্থিত হইতে পারে উহা অস্থিত বা অস্থি বিধানে পরিবর্তিত হইতে পারে পরিণামফল দ্বিবিধ দ্বাব সংকুচিত ও অপ্রশস্ত হইয়া রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত বা অববোধ জন্মে, ইহাকে ভ্যালভিউলার অবষ্ট্রেক্সন বলে অথবা কপাট পুরু ও ছোট হইলে উহা বাবা দ্বাব সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইতে না পারায় বক্ত প্রত্যগত হইয়া থাকে, ইহাকে ভ্যালভিউলার ইন্সফিসিয়েন্সি বলে

লক্ষণ — স্বাসকষ্ট, সাগাণ্ড প্রকাব হইতে অত্যন্ত প্রবলাকাব হইয়া থাকে এবং উহা শ্রম দ্বাবা বর্দ্ধিত হয় হৃৎবেগন ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিশৃঙ্খলা এবং আকর্গনে তৎসহ অস্থি শব্দ ও মর্মর প্রত হয় নাড়ীস্পন্দনের পরিবর্তন হয় হাইট্রল কপাটের গীড়ায় নাড়ী কোমল ও অনিয়মিত ; কিন্তু হৃৎধমনীর কপাটের গীড়ায় কঠিন ও লক্ষনশীল, অথচ নিয়মিত ফুসফুসে বক্তাধিক্য, বায়ুনলীভুজ ও ফুসফুস-প্রদাহ, ফুসফুসে বক্তপ্রাব নাক, মুখ, পাকায় ও বায়ুনলী হইতে বক্তপ্রাব অধঃশাখায় শোথ, সময় সময় বাহ ও মুখমণ্ডলেও শোথ, বক্ষোদক বা হাইড্রোথোবাক্স উদনী শোথ ও উদবী সাধাবণতঃ হৃৎপিণ্ডের বাম অপেক্ষা দক্ষিণদিকের গীড়ায় অধিক প্রকাশিত হয় শিবোবেদনা, কর্ণ \* ক, শিবোথূর্গন, মুচ্ছা, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ও মস্তিষ্কে রক্তপ্রাব— এই সকল হৃৎধমনীর গীড়ার বিশেষ লক্ষণ নিদ্রাকালে চম্কাইয়া উঠা, ভীতিকর স্বপ্ন, বিশামেব ব্যাঘাত যকৃৎ ও প্লীহা বিরুদ্ধি পরিপাকক্রিয়া বিশৃঙ্খল ; মুখমণ্ডল দ্রিয় ক্ষীত, কপোতদেশ বক্তবর্ণ,

ওষ্ঠে রক্তাধিক্য ও চক্ষু উজ্জ্বল বোগ যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, বোগী তত দুর্বল ও শ্বাসপ্রধান হয় অধিক শ্রম, মানসিক ভাব, অনুপ-  
যুক্ত খাদ্য এবং শৈত্য ও তাপের দ্বারা বোগীর অসুখ বৃদ্ধি হয়।  
অবশেষে মৃত্যু—কখন সহসা মুছিয়া বশতঃ হয় কিম্বা ক্রমশঃ আন্ত-  
মস্তক অসুস্থতা হইতে সংঘটিত হইয়া থাকে

**ভৌতিক লক্ষণ ।**—হৃৎপিণ্ডের এক বা উভয় শব্দের  
সহিত বা তৎপরিবর্তে বিলোম্ভ মর্মর অর্থাৎ কামারের জাঁতার শ্রাব  
শব্দ হয় মর্মর কখন কর্কশ বা পাবাবতের শ্রাব বা সিস্ দেওয়া  
বা বাদ্যযন্ত্রের শ্রাব হয় যে প্রকার হউক না কেন, ইহা হৃৎপিণ্ড  
ও বৃহৎ ধমনীতে রক্ত সম্পূর্ণ সঞ্চালিত হইতে বাধা পাইলে উৎপন্ন  
হয়, ইহাকে অর্গানিক বা যান্ত্রিক মর্মর বলে এবং রক্তের পরিবর্তিত  
অবস্থা বা হৃৎগতবে জমা বক্তব্য ( ক্লট ) দ্বারা রক্ত সঞ্চালনের  
বাধা জন্মিলে ইন্‌অর্গানিক বা ফংসনাল অর্থাৎ যান্ত্রিক বা ক্রিয়াজ  
মর্মর কহে দক্ষিণ দিক তপেক্ষা হৃৎপিণ্ডের বাম দিকের প্রলিখ্ত  
ঝিল্লী, কপাট ও দ্বার অধিক পীড়িত হয়। ট্রাইকম্পিড বা পালমো-  
নাবি ভাল্ভের পীড়া নিশ্চয়ীকৃত করিতে পারা যায় না হৃৎধমনী  
ও মাইট্রাল কপাটের পীড়ার লক্ষণাদির তালিকা—

**ক্লট** —যদি সিষ্টলিক অর্থাৎ প্রথম শব্দ সহ হয় ও তাহা  
হৃৎপিণ্ডের বেস্ বা গুলে উচ্চতর হয়, তবে এয়ার্টিক অবষ্ট্রক্সন্  
অর্থাৎ হৃৎধমনীৰ অবরোধ আব উহা হৃৎপিণ্ডের এপেক্স বা  
অগ্রভাগে হইলে মাইট্রাল ইন্‌সফিসিয়েন্সি অর্থাৎ অসম্পূর্ণতা।

**ক্লট** ।—আদি ডায়াষ্টলিক অর্থাৎ ২য় শব্দ সহ হয় ও মূলদেশ  
উচ্চতর হয়, তবে এয়ার্টিক ইন্‌সফিসিয়েন্সি বা হৃৎধমনীৰ অস-  
ম্পূর্ণতা। এপেক্স অর্থাৎ অগ্রভাগে হইলে মাইট্রাল অবষ্ট্রক্সন্।



নাড়ী—নিয়মিত, পুষ্ট বা সৰল, বা কম্পন ও লক্ষনশীল হইলে  
একটিক ডিজিজ বা হৃৎগমনীয় পীড়া নাড়ী যদি অনিয়মিত,  
পর্যায়শীল, অসম, কোমল, ক্ষুদ্র ও দুর্বল হয়, তবে মাইট্রাল ডিজিজ  
বা মাইট্রাল কপাটের পীড়া

ফুসফুসীয় ধমনীস্থ অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটের পীড়ায় বুকাস্থির  
মধ্যাংশের বাম ধাব হইতে বাম জত্রুস্থি পর্যন্ত স্থানে বিলোজ মর্শ্ব  
শ্রুত হয়। নাড়ীস্পন্দন অপবিবর্তিত থাকে দক্ষিণ হৃৎকর্ণ ও  
হৃৎদবেব মধ্যে টাইক্সপিড্ ভাল্ভ থাকে তাহার পীড়া অতি  
বিবল। পীড়া হইলে বুকাস্থির মধ্য ও অধঃ অংশ হইতে পাকাশয়  
প্রদেশ পর্যন্ত মর্শ্বর শ্রুত হওয়া যায় হৃৎগমনী ও তাহার শাখাতে  
শোনা যায় না জুগুলাব বা গ্রীবাব শিবা স্পন্দিত হইতে থাকে  
ধমনীর স্পন্দন অপবিবর্তিত থাকে মর্শ্বর সিষ্টালিক বা ডায়াষ্টালিক  
ইহা স্থির কবিত্তে হইলে আকর্ষণ সময়ে মণিবন্ধস্থ ধমনীতে অঞ্জুলি  
সংস্থাপন করিয়া দেখিবে সিষ্টালিক হইলে নাড়ীস্পন্দনের সমবর্তী  
হইবে এবং হৃৎপিণ্ডের অগ্রভাগে স্পষ্ট হইলে তাহা মাইট্রাল  
পীড়ার পরিচায়ক ডায়াষ্টালিক হইলে নাড়ী স্পন্দনের সমবর্তী  
হয় না এবং বুকাস্থির মধ্যস্থল ও হৃৎগমনীর অবস্থান প্রদেশে স্পষ্ট  
শ্রুত হয়, তবে তাহা একটিক ডিজিজ বা হৃৎগমনীর জ্ঞাপক

চিকিৎসা —এই বোগের চিকিৎসার প্রথম উদ্দেশ্য এই  
যে, হৃৎপিণ্ড প্রাচীরে বল প্রদান ও তাহার অস্বাভাবিক ক্রিয়া ক্ষান্ত  
করণার্থ বলকাবক ও অবসাদক ঔষধ যথা—ডিজিটেলিস ; বেল-  
ডোনা , গ্যামেবিকান্ ওয়াইল্ড চেরি ; হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ;  
একোনাইট , কোনিয়ম ; হেনবেন , হপ ও গফিয়া ব্যবহার্য  
এই সকল ঔষধ বিশেষতঃ সর্কশেষোক্তটী বিশেষ সাবধানতাব



সঠিত ব্যবহাৰ কৰা কৰ্তব্য কাৰণ শ্বাসকষ্ট, কামতে কষ্ট ও নাভী ক্ষীণ থাকিলে উহাতে সাংঘাতিক ফলোৎপত্তি হইতে পাবে এই সকল ঔষধেৰ মধ্যো ডিজিটেলিস সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে, অন্ত্যন্ত প্ৰকাৰ আনুৰাগিক গীড়া ( ফুসফুসীৰ বক্তা-ধিকা, ফুসফুস প্ৰদাহ, বক্তপিত্ত, যকৃৎ ও মূত্ৰগ্ৰন্থিতে রক্তসঞ্চয় ও উদৰী ) যাহাতে উৎপন্ন না হব, তাহাৰ চেষ্টা কৰা তজ্জন্ত পুষ্টি কৰ খাদ্য, বিবেচক, মূত্ৰকাৰক ও যন্ত্ৰাদিব ক্ৰিয়াৰ স্বশৃঙ্খলা বিধা-য়ক ঔষধ ও উপায় সকল অবলম্বন কৰা বিধেয় তৃতীয় উদ্দেশ্য—হৃৎপিণ্ডকে বল ও শক্তিপ্ৰদান কৰা তজ্জন্ত কডলিভ অয়েল, উত্তেজক ঔষধ, বিশুদ্ধ বায়ু সেৱন, উষ্ণবস্ত্ৰ পৰিধান, প্ৰত্যুষে গাত্ৰো-থান, অগ্নি অগ্নি ব্যায়াম, শীতল বা ঈষৎ জলে স্নান ; ডিজিটেলিস, ষ্ট্ৰোফান্তাস ও বিবিধ প্ৰকাৰ নোঃঘাটী ঔষধ সেৱন কফিইন, স্পাৰ্টিন, কনভালাৰিয়া, মেজোন্টিস, স্কুইল, ষ্ট্ৰীকনিন, আৰ্চিনিক, এডোনিম্ ভাৰ্ণেলিস ও কোৰাইড অব্ বেবিয়ম প্ৰভৃতি হিতকৰ

### হাইপাৰট্ৰফী অব্ দি হাৰ্ট—হৃৎপিণ্ডেৰ বিবৃদ্ধতা

পূৰ্ণবয়স্ক পুৰুষেৰ হৃৎপিণ্ড ওজন ৯০ আউন্স ও স্ত্ৰীলোকদেৰ ৮০ আউন্স ৬০ বৎসৰ বয়সেৰ পৰা বাৰ্দ্ধক্য হৃদয়েৰ প্ৰাচীৰেৰ পুৰাত্ন বৰ্ণতঃ ওজন কিঞ্চিৎ বেগী হয় এক বা ততোধিক গহ্বৰেৰ পৈশিক প্ৰাচীৰ পুৰ হইতে পাবে ; কিন্তু তদ্ব্যতীত গহ্বৰেৰ পৰিমাণ কমে না ইহাকে সিম্পল হাইপাৰ ট্ৰফি বলে আৰ প্ৰাচীৰ পুৰ ও তৎসঙ্গে গহ্বৰ প্ৰসাৰিত হলে তাহাকে হাইপাৰট্ৰফি উইথ্ ডাইলেটেসন্ কহে অথবা

প্রাচীর পুরু হইয়া গহ্বর ছোট হইতে পারে ; তদ্রূপ হইলে তাহাকে কনসেন্ট্রিক হাইপারট্রফি বলে । বিবৃদ্ধি অনেক সময় উপকারী ইহাতে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত দূরীভূত বা ইহার স্বাধীন ক্রিয়া সম্পাদনের সাহায্য হয় । বাম হৃৎদর বিবৃদ্ধি ও তৎসহ কপাটের পীড়া অতি সাধারণ । বাম হৃৎদর বিবৃদ্ধি সঙ্গে রক্তসঞ্চালনের অবরোধ জন্মে না এরূপ প্রায়ই ঘটে না, কিন্তু কখন কখন প্রাচীন ব্রাইটোথ্য পীড়ায় দৃষ্ট হয় দক্ষিণ হৃৎদরের প্রসারণ সম্বলিত বিবৃদ্ধি—সাধারণতঃ প্রাচীন ফুসফুস পীড়ায় রক্তসঞ্চালনে বাধা জন্মিলে উৎপন্ন হয় ।

লক্ষণ । —বিবৃদ্ধির পরিমাণানুসারে সমুজ্জ্বল হয় । সতত হৃৎবেগ, শ্বাসকষ্ট, দ্রুত পাদচারণে কষ্ট, হৃৎপ্রদেশে বেদনা ও অস্বখবোধ, শিরঃপীড়া, বারমার নিরোধূর্ণন । স্বশ্বাবস্থা অপেক্ষা হৃৎপিণ্ডেব প্রথম শব্দের সুস্পষ্ট শ্রুতিব হ্রাস জন্মে । হৃৎপিণ্ডেব সঞ্চালনশক্তি দ্রুত ও ক্ষমতনের প্রসাবতা হয় । কপাটেব পীড়ায় মন্দর শ্রুত হয়

চিকিৎসা । —রোগীকে উৎকৃষ্ট ও উত্তেজিত হইতে দিবে না এবং লক্ষণানুসারে ঔষধ ব্যবস্থা করিবে । অত্যন্ত দৌর্বল্য থাকিলে কুইনাইন ও ঈল ১৭২, ১৭৬, ১৭৮, ১৮৭, ২০১, ২০৪, ২০৫ । বার্ক ১৮৩, ১৮৫, ১৯৩ গিনারেল এসিড্‌স ১৬৯ ; ১৭০ । যদি হৃৎপিণ্ডেব বেগ অত্যন্ত অধিক হয়, তবে একোনাইট ২৭২ । ডিজিটেলিস ২৬৯ শ্বাসকষ্ট অধিক থাকিলে উত্তেজক মিশ্র ২, ৩, ৫ । হৃৎপিণ্ডের গহ্বর প্রমাণ বোগ উপস্থিত হইলে আক্ষেপনিবারক, লৌহঘটিত বসকর ঔষধ ও পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া বিধেয়

## য়্যাট্রফী এণ্ড ফ্যাটি ডিজেনারেসন অব্ দি হার্ট।

হৃৎপিণ্ডের হ্রস্বতা ও মেদাপকৃষ্টতা

এই বোগ দ্বিবিধ। প্রথম প্রকারে হৃৎপিণ্ড শীর্ণ ও উহার লম্বা বিধান ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। দ্বিতীয় প্রকারে পৈশিক স্রাব আক্রান্ত হয় ও তৎফলে অল্প বা অধিক মেদ পদার্থ সঞ্চিত হইয় থাকে।

১. সিম্পল এট্রফি বা সহজ হ্রস্বতা। ককটিকা, গুটিকা, বহুমূত্র প্রভৃতি অবসাদক পীড়ার সঙ্গে জন্মে। হৃৎপিণ্ডের আকৃতি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পাবে হৃৎপিণ্ড ওজন ৫ আউন্স দূর্ধ্ব হয়। বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে পৈশিক স্রাব ফেকাসে ও কোমল—কিন্তু অত্যন্ত বিধেয় স্রব দেখায়। সার্বসঙ্গিক অবস্থানুসারে চিকিৎসা কর্তব্য। এই বোগ অল্প অল্প বোগেব লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

২. ফ্যাটি ডিজেনারেসন বা মেদাপকৃষ্টতা। স্বভাবতঃ বা বক্র, মূত্রযন্ত্র ও চক্ষু আদির মেদবোগ সহ উপস্থিত হয়। ইহার সহিত কপাটের পীড়া কদাচ বিদ্যমান থাকে। যদি কখন থাকিতে দেখা যায়, তবে মাইটাল অপেক্ষা হৃৎকমনীর কপাটের ক্ষয় স্বাভাবিক দৃষ্ট হয়।

লক্ষণ। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্ষীণ, নাড়ীস্পন্দন কখন কখন ৫৩ বৃদ্ধ হয় যে, প্রতি মিনিটে কেবল ৪৫ বা ৫০ বাব স্পন্দিত হইয়া থাকে। সার্বসঙ্গিক দুর্বলতা। স্বলক্ষণস্থায়ী শিথিলতা বা মূর্ছা। শারীরিক অবসন্নতা ও বলহানি। হৃৎক

হৃৎকল, শ্বাসকৃচ্ছতার আক্রমণ হৃৎশুলের অনেক লক্ষ্য বিদ্যমান থাকিতে পাবে চক্ষুর কালক্ষেত্রে মেদাপকৃষ্টতা জন্ত একটা ট্যাং উৎপন্ন হয়, তাহাকে আর্কস সেনিলিস বলে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষদের উহা অধিক হয়। বৃদ্ধ বয়সেই ইহা অতি সাধাৰণ আকস্মিক মৃত্যু সংঘটিতে পাবে—সম্ভবতঃ হৃৎপিণ্ডের বিদারণ বশতঃ হয়

চিকিৎসা — সার্ভাঙ্গিক লক্ষণানুসারে চিকিৎসা করিবে আর অধিক মেদ সঞ্চিত হইতে না পারে তাহাব চেষ্টা করিবে ওজ্জ্বল পুষ্টিকর খাদ্য, মাংস, বিশুদ্ধ বায়ুসেবন, প্রত্যয়ে শয্যাত্যাগ, মৃদু ব্যায়াম মৃদু লৌহঘটিত ঔষধ, বার্ক, পানার্থ সোডা ওয়াটর, ব্রাণ্ডি বা শেরী অন্ত পবিমাণে সল্ট ওয়াটর স্পঞ্জিং, তামাকাদির ধূমপান করিবে না কডলিভর অয়েল দেওয়া যাইতে পাবে কোন কোন চিকিৎসক তৈল ও মেদাক্ত দ্রব্য ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন

### সায়ানোসিস—নীলরোগ

হৃৎপিণ্ডের গঠনের বৈলক্ষণ্য বশতঃ প্রধানতঃ উৎপন্ন হয়, ইহাতে চর্ম নীলবর্ণ হয় ফোবেমেন ওভেলি বা হৃৎ কর্ণদ্বয়ের মধ্যবর্তী ডিম্বাকার ছিদ্র স্থায়ী হইলে এই রোগ হয়। হৃৎকল বা হৃৎকর্ণের প্রাচীরে অস্বাভাবিক ছিদ্র, এক হৃৎকল হইতে হৃৎকমণী ও ফুসফুসীয় ধমনীর উৎপত্তি অথবা হৃৎকমণী দক্ষিণ ও ফুসফুসীয় ধমনী বাম হৃৎকল হইতে উৎপন্ন হইলেও এই বোগ জন্মে।



লক্ষণ। — চর্ম্মের বিবর্ণতা, শরীর শীতল, মুখগহ্বরের উষ্ণতা ৭৭ ডিগ্রি পর্য্যন্ত হ্রাসিত হ্রবেপন, শ্বাসকৃচ্ছ, উও-জনম্ম মুচ্ছ' হস্ত ও পদের অঙ্গুলি সকল অধিক পুরু ও উন্নত নথ বক্রীভূত জনেন্দ্রিয় অসম্পূর্ণভাবে বর্দ্ধিত হয় আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকলে রক্তাধিক্য ও শোথ শিশুদের হইলে সম্ভব মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় কখন কখন অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষদের এই বোগ অধিক হয়

চিকিৎসা। — পুষ্টিকর পথ্য, উষ্ণ বস্ত্র পরিধান, ক্রান্তি ও মানসিক উওজনা পবিহাব, বিশুদ্ধ বায়ুপূর্ণ স্থানে বাস ইত্যাদি উপায় অবলম্বনীয়

### য়্যান্জাইনা পে ক্টোরিস—হৃৎশূল।

বোগী হৃৎপ্রদেশে তীব্র বেদনা ও তৎসহ অবরোধ বোধ ও সাতিনয় উৎকর্ষা অমুভব করে। অধিক বয়সেই এই রোগ জন্মে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষেবা এই পীড়ায় অধিক আক্রান্ত হয়। করোনাবি ধমনীর পীড়া ও হৃৎপিণ্ডের মেদাপকৃষ্টতা বর্ত্তমানে এই রোগ জন্মে।

লক্ষণ। — হৃৎপ্রদেশে তীব্র বেদনার প্রকোপ, শ্বাসরোধ-বোধ, আসন্নমৃত্যুর আশঙ্কা রোগাক্রমণ ১২ মিনিটের অধিক স্থায়ী হয় না সকল সময়েই বোগাবেশ উপস্থিত হইতে পারে বোগাবেশকালে নাড়ীর গতি মৃদু ও ক্ষীণ, শ্বাস ক্ষুদ্র ও দ্রুত, মুখাকৃতি পাণ্ডুবর্ণ ও উৎকর্ষাব্যঞ্জক, দেহ শীতল, সম্ভবতঃ শ্বেদাতি-

যুক্ত। জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয় না। রোগাবশেষ তিরোহিত হইলে রোগী স্বস্থ বোধ করে। প্রথমাক্রমণ কালে উহা সংঘটিত হয়।

**চিকিৎসা।**—আর্সিনিক দ্বারা রোগাবশেষ তীব্রতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। মর্ফিয়ার অধস্তাচ প্রক্ষেপ ফসফরস দ্বারা উপকার দর্শে। নাইট্রো গ্লিসিবিণ ১ মিনিম মাত্রায় তিন ঘণ্টান্তর সেবনে উপকার দর্শে। ইহার শতমিক দ্রব (ওয়ান্ পার্সেন্ট সলিউশন) ব্যবহার্য। রোগাবশেষ সময়ে উত্তেজক যথা—এমোনিয়া; ওয়াইন; ব্রাণ্ডি আক্ষেপ নিবারক ঔষধ যথা ইথর; ক্লোরোফর্ম, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড্, ইত্যাদি,—২, ৩, ৯৫, ১৩১, ১৩৪ নাইট্রেট অব্ অ্যামিল ২৩ ফোঁটা আত্মাণ কবিত্তে হয়, ইহাতে শীঘ্রই রোগোপশম হয়। সিনাপিজম; টর্পেন্টাইন ঔষ্ম; হট্ ফোমেণ্টেসন, বেনেডোনা ও ক্লোরোফর্ম লিনিমেন্টে বক্ষঃস্থলে মর্দন। রোগাবশেষ পুনরায় যাহাতে না হয়, তজ্জন্তু সার্বস্বাস্থিক স্বাস্থ্য উন্নত কবিত্তে চেষ্টা কবিবে। খাদ্য দ্রব্যেব প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত, বলকারক ঔষধ সেবন ও হৃৎপিণ্ড প্রদেশে বেনেডোনা প্রাষ্টব সংলগ্ন রাখা বিধেয়। উত্তেজক ঔষধাদি, প্রবল ব্যায়াম; আহারান্তে ভ্রমণ ও মানসিক উদ্দীপনা নিষিদ্ধ

### ফংসনাল ডিরেঞ্জমেন্ট অব্ হার্ট।

( হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিশৃঙ্খলা )

হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পীড়ার লক্ষণেব অনুরূপ লক্ষণাদি ইহাতে প্রকাশ পায়, তদ্ব্যতীত ইহাকে যান্ত্রিক পীড়া বদিয়া এম হইতে পারে। গুল্মবায়ু বোগে ডিম্বাধার বা ভবায়ু উদ্দীপনা, শ্বাসশূল, ও রক্তহীনতা পীড়ার সঙ্গে উৎপন্ন হয়। জীৱের বয়ঃসন্ধি অর্থাৎ

আর্ন্তর্য্য বিগমকালেও এই বোগ অসাধারণ নহে সান্তিময় পাঠ, উৎকর্ষ ও রক্তিক্রিয়া আদি হইতে স্বাভাবিক অবসন্নতা প্রাপ্ত হওত এই পীড় জন্মে বসন্ত, প্রটিন যক্ষ্ম পীড়া, অজীর্ণ ও তাম্বকুট বা উগ্র চা ব্যবহার বশতঃও এই বোগ জন্মিতে পারে।

লক্ষণ । —নাড়ীৰ গতি অনিয়মিত, হৃৎবেগ ৩৫সহ সম্ভব ও রক্তহীন ব্যক্তিদের চক্ষের নীচে শোথ হৃৎপাদদেশে অতীব ক্লান্তিকর কনকনে বেদনা, সময় সময় ছুবিকা বেধবৎ বেদনা বেদনা বশতঃ বামপার্শ্বে শয়ন করিতে অশক্তি মানসিক অবসন্নতা, অজীর্ণ, উদবাহান ও অল্প উদগার সলাম গুণবায়ু বোগবৎ ভাটা সঞ্চালন সাময়িক শিবোদ্বৃগ্নন, কর্ণনাদ, মুখমণ্ডল বক্তপূর্ণ স্বকমণীতে প্রবল স্পন্দন

চিকিৎসা । —এমোনিয়া, ইথর, সম্মল, হেনবেন, বেলেন-ডোনা, ওপিয়ম, হপ ইত্যাদি ২ ৫, ১৫, ৮৮, ৯৯, ১৩৫। বেলেন-ডোনা ও ডোভস্‌ পাউডর ১০১, একষ্ট্রা ক্যানোবিস ও বেলেনডোনা। হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে বেলেনডোনা বা ওপিয়ম প্রাপ্তি ডিজিটেলিস ১০২, ২৬৯, কোষ্টবক্‌ থাকিলে বিবেচক বাতবোগেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইলে ভাইনম কলচিকম ও শ্রালাইন্‌ এফাবেসিং ড্রাফ্টস আদি অজীর্ণ ও অল্প উদগার উঠিলে বিসমথ, মোড়া; পটাশ; হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, লাবন্স ওয়াটর তৎপবে নাইট্রো-মিউরিয়েটিক এসিড ডিল ও তিত্ত বলাকবোষধ ফাণ্ট। পেপ-সিন ৪১৭ তামাক ও চ নিষিক্ত অল্প পরিমাণে ব্রাণ্ডি ও বরফ মিশ্রিত জল স্বাভাবিক দুর্বলতা বা রক্তহীনতা উপস্থিত হইলে সাইট্রেট অব্‌ আধরণ এণ্ড এমোনিয়া ১৮০, ১৮৮;

ফিব্রম রিডক্টম ২০৪, ২০৫। কুইনাইন এণ্ড আয়রন ১৭২, ১৭৩, ১৭৬, ১৭৭, ২০১

হৃৎপিণ্ডের সাধারণ চিকিৎসা।—ডিজিটেলিস বিশেষ উপকারী। শোথ, শ্বাসকষ্ট, নীলিম মুখমণ্ডল, মতও অনিয়মিত নাড়ী ও বাম হৃৎদ্বার প্রসারণ বর্তমানে তরুণ প্রাপ্ত ফাণ্ট প্রয়োজ্য এই বোগে মদ্য আবশ্যক, উহাদেব মধ্যে জিন শ্রেষ্ঠ কপাটের পীড়া ব্যতীত বাম হৃৎদ্বারের বিরুদ্ধি ও প্রসারণ ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে হৃৎগমনীর পীড়া থাকিলে ইহা অব্যবহার্য্য নহে অনিয়মিত নাড়ী স্পন্দন ডিজিটেলিস ব্যবহাবেব শ্রেষ্ঠ চিহ্ন হৃৎপিণ্ড বিশৃঙ্খল ও প্রাবল্যবেগে স্পন্দিত, কিন্তু নাড়ী দুর্বল ও অতিশয় শ্বাসকষ্ট থাকিলেও ইহা ব্যবহার্য্য সামান্য হৃৎস্পন্দন—সর্দি দ্বারা বন্ধিত হয়, একগ অবস্থা ডিজিটেলিসেব দ্বারা আরোগ্য হয় সময় সময় ইহা অপেক্ষা একো-নাইট শ্রেষ্ঠ কপাটের পীড়া বা পৈশিক ক্রিয়াধিক্য বশতঃ হৃৎপিণ্ড বিরুদ্ধিতে ২ মিনিম মাত্রায় টিংচব ডিজিটেলিস সেবন দ্বারা উপকার হয়, কিন্তু ওকপাবস্থায় একোনাইট অনেক সময় শ্রেষ্ঠ। আর্সিনিক দ্বারা শ্বাসরোধ বোধ নিবাবিত হইতে পারে ডয়, বক্ত্রাব বা আকস্মিক ঘটনাদি বশতঃ হৃৎপিণ্ড দুর্বল হইয়া পড়িলে ব্রাণ্ডি আদি মদ্য প্রয়োজ্য প্রাচীন প্রদাহে কডলিওব অয়েল শিবোঘূর্ণন—হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতাজনিত হইলে কডলিওব অয়েল ও কুইনাইন শ্বাসকৃচ্ছ, মর্মিয়ার অধস্তাচ প্রফেপ নাইট্রেট অব্ এমিল আভ্রাং দ্বারা হৃৎপিণ্ড প্রসারণ ও বিরুদ্ধিও নিত শ্বাস-কষ্ট নিবাবিত হয় হৃৎপিণ্ডে বলবিধানার্থ অল্প মাত্রায় স্ট্রীকনিয়া দ্রুত অনিয়মিত নাড়ী, দ্রুত শ্বাস, নীলিম মুখাকৃতি ও উদরী, হৃৎ-



স্পন্দন ও শয়ন করিতে অসামর্থ্য থাকিলে ভিবাট্রিয়া অয়েন্টমেন্ট স্থানিক প্রয়োজ্য

হুংপিওর আকস্মিক ক্ষীণতায় স্ট্রীকনিয়া, ইথর ও এথোনিয়া সেবন ও তাহাদের হাইপোডার্মিক ইন্জেক্সন বিধেয় । একট্রা কোকি লিকুইডও হুংপিওর উত্তেজক, আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম সহ ভ্যালুভিনাব পীড়ায় প্রয়োজ্য আইয়োডাইড দ্বারা হুংপিওর ক্রিয়াধিক্য নিবাবিত হইয়া উহাব বলবিধান কবে হুংপিওর পীড়াজনিত অনিদ্রাব সল্ফোনাল মহোগকাবী হুংপিওর পীড়াজনিত উদরী ও শোথে আইয়োডাইড ও ডিজি-টেলিস বিশেষ উপকারী

### এথোর্টাইটিস হৃৎধমনী প্রদাহ

হৃৎধমনীর প্রদাহ অতি বিরল । সম্ভবতঃ ইহা বক্তেব পীড়া—  
হাতেব সদৃশ হৃচ্ছদ প্রদাহেব অনুরূপ

লক্ষণ ।—অত্যন্ত অস্পষ্ট, সার্বাস্মিক অসুস্থতা, শীত পবে জ্বর শ্বাসকৃচ্ছ, তৎসহ দত্ত শ্বাসরোধ বোধ ধমনীতে অত্যন্ত স্পন্দন ও বেদনা সাতিনয় হৃৎবেগন নাড়ী অনাক্রান্ত থাকে । ধমনীব পর্দাব বিধানবিকার জন্মিতে পারে বৃদ্ধ বয়সে উহাতে নানাবিধ অগুরুত্ব জন্মে

চিকিৎসা ।—ওয়ার্ম বাথ, পৃষ্ঠবংশে ড্রাই কপিং, ব্রিষ্টার্স । সেবনার্থ আইয়োডাইড, অব্ পটাসিয়ম ও আইফেন কলচিকম দ্বারা উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা শ্বাসকৃচ্ছ ইথর দ্বারা উপশমিত হয় ।

### এয়োটিক য্যানিউরিজম—স্বংধমন্যর্কুদ ।

এই বোগ অধিক বয়সেই হয় অনেক সময় ধমনীর বিবিধ অপকৃষ্টতা জন্ম এই পীড়া উপস্থিত হয় । অর্কুদ ছোট হইলে অনেক সময় বোগনির্গম করিতে পারা যায় না কোষ বিদীর্ণ হইয়া বক্ত্রস্রাব হওতঃ মৃত্যু সংঘটিত হয় । বিবাবণ ভিন্ন সহসা শ্বাসবোধ হইয়াও মৃত্যু হইতে পাবে অথবা ক্রমশঃ বহুদিন স্থায়ী অসুস্থতা জন্ম শরীর দুর্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে ও তদন্তে রোগী পঞ্চাঙ্গ পায় ।

লক্ষণ — প্রথমাবস্থায় অস্পষ্ট অর্কুদ বড় হইলে স্বং-  
পিণ্ডের ক্রিয়া বিশৃঙ্খল ও নাড়ীস্পন্দনও পবিবর্তিত হয় গ্রীবা  
ও বক্ষেব চর্মনিম্নস্থ শিরাসমূহ রক্তপূর্ণ, এক বা উভয় উর্দ্ধশাখা  
শোথবিশিষ্ট, কাসি, শ্বাসকৃচ্ছ, রক্তোৎকাস, গিলিতে কষ্ট এবং  
বক্ষে ও পৃষ্ঠে বেদনা পৃষ্ঠবংশ বা বক্ষেব অস্থিতে ক্ষত হইতে  
থাকিলে বেদনা তীব্রতর হয় । অর্কুদ অত্যন্ত বড় ও স্পন্দনশীল  
এবং বক্ষেব বাহ্যদিকে আসিলে বুদ্ধাস্থি ও পশ্চক উন্নত বা আচু-  
ষিত হয় । একপ অবস্থায় রোগনির্গম সহজ অর্কুদকোষ দ্বারা  
বায়ুনলী চাপিত হইলে কাসি ও শ্বাসকষ্ট; শ্ববযন্ত্রস্থ নায়ু চাপিত  
হইলে স্বরাভাব ও ক্লেশকর কাসি, শ্বাসবোধবোধ ও সময় সময়  
বেদনা । অন্তবহানালী চাপিত হইলে গিলিতে কষ্ট বা নলীব অব-  
রোধ থোবেসিক ডক্ট চাপিত হইলে পবিপোষাণের অভাব ও  
আচুষকগণ্ডল পূর্ণ ইত্যাদি । উদবস্থিত বৃহৎ ধমনীতে এই বোগ  
হইলে কটিদেশে তীব্র বেদনা এবং উহা উদবেব উভয়পার্শ্ব হইতে  
উরু ও অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে কোষ্ঠবদ্ধ দ্বারা  
বেদনার বৃদ্ধি এবং উবুড় হইয়া শমন করিলে হাস হয় বিশেষকপে

পৰীক্ষা কবিলে অৰ্কুদ দেখিতে পাওযা যায়। হস্তে সতত  
প্রবল স্পন্দন অনুভূত হয়

চিকিৎসা — পাবীলিক ও মানসিক উদ্দীপনা পৰিহার  
কৰ্তব্য। বেদনা, কাসি, অজীৰ্ণ ও অন্ত্রাঘাত লক্ষণেৰ উপশমনার্থ  
তদুপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার্য। পুষ্টিকর পথ্য, অল্প পৰিমাণে ত্রাণ্ডি ও  
জল আইয়োডাইড্ অব্ পটাশিয়ম এসিটেট অব্ লেড,  
টিংচৰ অব্ পাবক্লোবাইড্ অব্ আয়রন; এমোনিযেটেড্  
আয়রন স্যালিন স্থানিক ববফ, ইলেক্ট্ৰিসিটি, ইলেক্ট্ৰো  
পংচাব, বেলেডোনা প্লাষ্টার যন্ত্রণাদি উপশমেৰ জন্ত ওপিয়ম,  
মর্ফিয়া, সবকিউটিনিয়ম্ ইনজেক্শন অব্ মর্ফিয়া, বেলেডোনা,  
ডিজিটেলিস্, ক্যান্ফৰ, ইণ্ডিয়াম হেম্প, স্পিৰিট ইথৰ বা ক্লোৰো-  
ফর্ম বক্ষঃস্থল ও উদর প্রদেশে ছাৎধমনীৰ যে অংশ থাকে  
তাহাতে এই বোগ প্রায়ই হইয় থাকে এই বোগেৰ বিবিধ  
প্রকাৰ অল্প-চিকিৎসা আছে, তাহা এস্থলে অনাবশ্যক বোধে লিখিত  
হইল না

ডিজিজেন্স অব্ দি থোরেসিক ওয়াল্‌স্ ।

( বক্ষঃপ্রাচীরেৰ পীড়া )

প্লুবোডিনিয়া—( উবঃপেনী বাত )

বক্ষঃপ্রাচীরেৰ পার্শ্বে বেদনা এই বেদনা সময় সময় এত  
প্রবল হয় যে, প্লুরিসী বা পেরিকার্ডাইটিস্ বলিয়া ভ্রম জন্মিতে  
পারে।

লক্ষণ । সাক্ষাৎসিক স্বাস্থ্যহীনতা, ক্ষুধাভাব, অপ্রফুল্লতা

মূত্রে যুবেট ও ফস্ফেটের আধিক্য কখন কখন পক্ষিবাত তীক্ষ্ণ বেদন' সত্ত্বে অকস্মাৎ উপস্থিত হয়, শুনের নিম্নপ্রদেশে তালু-ভুত হয় এবং দীর্ঘশ্বাস বা যে কোন প্রকার সঞ্চলনে পেশীতে টান পড়ে, তাহাতেই বেদনা বর্ধিত হয় বক্ষের বামপার্শ্বেব পৈশিক ও সৌত্রী' তন্তুই কেবল আক্রান্ত হয়

চিকিৎসা ।—জ্বাযুর ক্রিয়াবিশৃঙ্খলা জনিত বোগে এক-টিয়া বেসিমোজা ক্লোরাল ও ক্যাম্ফর বা মেথল ও ক্যাম্ফর সম-ভাগে মিলাইয়া মর্দন করিবে ইথর স্প্রে ব্যবহারে বেদনার শান্তি হয় কোমেণ্টেসন, হট্ পুলটীস, ঈয়ছফ জলো স্নান বেলে-ডোনা ও একোনাইট লিনিমেন্ট ১৫২ ; লিনিমেন্ট ক্লোরোফর্ম ও ওপিয়ম, ১৫৩ একোনাইট ও বার্ক, ১৮৪ ; অ'ইং'ডাইড্ অব্ পটাসিয়ম বা সোডিয়ম ও ভাইনম কলচিকম, ৪০৪ কড্-লিভর অয়েল ৪১০ , ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম, ৪০৯ , হাইড্রেট অব্ ক্লোরাল, ৪২৪ মর্ফিয়ার সবকিউটিনিয়স পীচকারি কপিং, ব্রিষ্টাবিং প্রভৃতি তাদৃশ উপকারী নহে স্ট্রালিসিলেট অব্ সোডি-য়ম উপকারী

## ইন্টার কর্টাল নিউরালজিয়া—পশু'কা-

### মধ্যস্থ শ্বাসশূল

শরীরের অন্যান্য স্থানের শ্বাস্য গ্রাস পশু'কা মধ্যশ্বাসযুতে শূল-জন্ম গুল্মবায়ু ও রক্তহীন বোগগ্রস্তা স্ত্রীবা ইহা দ্বারা অধিক আক্রান্ত হয় ইহা যক্ষ্মা ও ব্রাইটাধ্য পীড়া সহ সময় সময় জন্মে । শ্বাস প্রদাহ বা ফুসফুসবেষ্ট প্রদাহেব সহিত এম না হয়, তজ্জন্ত সতর্ক হওয়া উচিত ।



লক্ষণ ।—বেদনা অতীব ও সতত স্থায়ী কনকনে প্রকৃতিক বা তীক্ষ্ণ ও সময় সময় বৃদ্ধিশীল । কখন কখন কয়েক সপ্তাহ থাকে সাধারণতঃ বামদিকে ৬, ৭, ৮ বা ৯ম স্নায়ু আক্রান্ত হয় । স্নায়ুর গতি অবলম্বন করত বেদনা কশেরুকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় । সময় সময় শুন ও তৎনিম্নপ্রদেশে বোধাভিশয়া । দুর্বলতা । জ্বর থাকে না । স্ত্রীলোকদের আর্ন্তব-বিশৃঙ্খলা ও খেতপ্রদব

চিকিৎসা ।—কুইনাইন, আয়রন, সিনকোনা, কডলি-ডর অয়েল, পুষ্টিকর খাদ্য । স্থানিক—বেলেডোনা ও একোনাইট লিনিমেন্ট । বেলেডোনা প্লাষ্টিক, মর্ফিয়ার অধস্তাচ প্রক্ষেপ । আই-য়োডাইড্ ও ব্রোমাইড্ অব্ পটাসিয়ম; বোগ বাত সংশ্লিষ্ট হইলে ইহাব সঙ্গে ভাইনম কলচিকম ও টিংচর হায়সায়ামাস বা মোডা স্যালিসিলেট দিবে

### ডায়াফ্রাগ্‌মাইটিস—উদরবক্ষঃ ব্যব-

ধায়ক পেশীর প্রদাহ ।

উদর-বক্ষ-ব্যবধায়ক পেশীর প্রদাহ—সন্নিহিত যজ্ঞাদিব প্রদাহ বশতঃ উপস্থিত হয় । সন্ধিবাত জনিত রক্তের অবিপুলকাবস্থা হইতেও এই বোগ হইতে পারে । আঘাত, সন্দ্রাবণ, পশুরকা ভঙ্গ আদি কাবণেও এই পীড়া জন্মিতে দেখা যায় । অত্যাশ্র প্রদাহের স্থায় লক্ষণাদি প্রকাশিত হয় । উদর ও পৃষ্ঠে টানবোধ ও বৃদ্ধাশ্র ও নিম্নস্থ পশুরকাতে বেদনা, কাসিতে, হাঁচিতে বা দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণে অসুভূত হয় । অগ্নাধিক শ্বাসকৃচ্ছ, গিলনকষ্ট, মুখাকৃতি উৎকণ্ঠা-

প্রকাশক, হিকা, দীর্ঘশ্বাস, উদরস্থ পেশীতে আক্ষেপ শ্বাসপ্রশ্বাস প্রধানতঃ পশুকামধ্য পেশীবর্গ দ্বারা সম্পাদিত হয়।

চিকিৎসা —কোমব বেড়িয়া গসিনার পুলটীস, পুল-টীসেব সঙ্গে একষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা বা পপী দেওয়া যায় বমন নিবারণার্থ ববফ ও সোডা এসিড; বিসমথ ও হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ৯৩, বিসমথ ও সোডা ৩৯৪; সোডা ও গর্ফিয়া ৩৯৬ ক্লোবোফর্ম ও ইথেরেব আত্মাণ দিনে প্রায়ই হিকা নিবারিত হয়। গর্ফিয়া বা এট্র'পানের অধস্তাচ প্রক্ষেপ অত্যাগ উপসর্গ থাকিলে সাধাবণ নিয়মানুসারে তাহার চিকিৎসা কবিবে।

### ডিজিজেস্ অব্ ব্লড ভেসেল্‌স এণ্ড লিম্ফাটিক্‌স্।

( শিবা, ধমনী ও শোষক শিরা প্রদাহ । )

### আর্টাইটস—ধমনীপ্রদাহ।

ধমনীতরুণ প্রদাহ অতি বিবল আঘাত বা অস্ত্র চিকিৎসায় ধমনী আহত হওয়ায় সময়সময় তরুণ প্রদাহ সমুপস্থিত হয়। প্রাচীন প্রদাহ অপেক্ষাকৃত সাধাবণ; ধমনীতে চাপ পড়া বশতঃ হয় গাউট ও ব্রাইটাখ্য পীডাদিতে কৈশিক ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধমনীতে বক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত জন্মিবায় প্রাচীন প্রদাহ সমুদ্ভূত হইতে পারে

চিকিৎসা —ইহার চিকিৎসায় ডিজিটেনীস ও ক্যালো-মেল ব্যবহার্য আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম, কার্বনেট অব্ এমোনিয়া হিতকর।

### ফিবারাইটিস—শিরাপ্রদাহ ।

বক্তের অসুস্থাবস্থা বশতঃ শিরা প্রদাহ জনে আক্রান্ত শিবাভ্যন্তবে রক্ত জমিয়া যাইতে পারে

লক্ষণ ।—বেদনা—চাপে বৃদ্ধি হয় । ক্ষীণতা, আনন্দতা ও কার্টিজ—শিবার গতি অভিসুখে দৃষ্ট হয় পুষোৎপত্তি হইলে কম্প ও নানা স্থানে ক্ষণস্থায়ী বেদনা অনুভূত হয় অতিশয় সার্ভান্সিক অসুস্থত থাকে । বক্তের সহিত পুথ বা অল্প অসুস্থ দ্রব্য মিলিত হওয়ায় রক্ত জমিয়া যায় এবং জমা রক্তখণ্ড দ্বারা শিবা পবিপূর্ণ থাকে । অসুস্থ পদার্থ দেহ হইতে বিদূরিত হওয়া আবশ্যক হইলে যোজক তত্ত্বতে প্রদাহ ও পুথ হইয়া ফে'টক'ক'ব হয় অনন্তর শির'ব পদ'য় ক্ষত হইয়া ফে'ট-কেব মধ্যে জমা রক্তাদি আসিয়া পড়ে এবং তথা হইতে দেহ মধ্য দিয়া দূরীভূত হয় পক্ষান্তরে যদি উক্ত বিযাক্ত পদার্থ দ্বারা রক্ত না জমে, তবে উহা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া সমস্ত দেহ আক্রান্ত হয় এবং ফুস্ফুস্ যকৃৎ, গ্ৰীহা, চক্ষু, সন্ধিস্থান ও যোজক তত্ত্ব আদিতে সঞ্চিও হয় ।

চিকিৎসা । প্রদাহিত চর্ম্মাধঃ শিরাব উপরে ব্লিষ্টাব দিলে উপকার দর্শে ফোমেটেসন, পুলটীস বিরেচক দৌর্ব্বল্য প্রকাশিত হইলে বলকাবক ও উত্তেজক ঔষধ—যথা এমোনিয়া ; বার্ক ; পোর্ট ওয়াইন ; ব্রাণ্ডি , মাংস যুষ । বেদনা ও অস্থিবতা নিবাবণার্থ ওপিয়ম আক্রান্ত অংশেব সম্পূর্ণ বিশ্রাম হিতকর টিংচর আইয়োডিন স্থানিক প্রয়োজ্য তুলা দ্বারা স্কাবৃত করত ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে



### ফেগ্‌মেসিয়া ডোলেন্স

এক বা উভয় অধঃশাখার বেদনাম্বিত পৈশিক ক্ষীণতা (ক্ষীণতা শোধবৎ মহে) ও তৎসহ অবসন্নতা উপস্থিত হয় সম্ভবতঃ ইলিয়াক ও ফিমবেল শিবাভ্যন্তরে আপনাপনি বহু জমিয়া গিয়া ঈদৃশ অবস্থায় পবিণত হয় কোন প্রকার বিষ বা বক্তের হীনতা ও অবিগুহতা বশতঃও উহা হইতে পাবে লসীকাগ্রাহি এবং শিবাও আক্রান্ত ও অবকদ্ধ হয় প্রসবের পর, বিশেষতঃ যে সকল স্ত্রীলোকদেব অধিক বক্তাব হইয়াছে, তাহাদেব সাধারণতঃ এই বোগ হইয়া থাকে জরায়ুকর্কট বোগেব অবসানে প্রায়ই এই বোগ জন্মে দক্ষিণ অপেক্ষা বাম দিক অধিক আক্রান্ত হয়

লক্ষণ ।—প্রসবের পর ১ হইতে ৫ সপ্তাহেব মধ্যে বোগ উপস্থিত হয় জ্বর ; শিবোবেদনা, তৃষ্ণা, বমনেচ্ছা ; বেদনা । সময় সময় শীত বা কম্প, আক্রান্ত শাখা ক্ষীত হয় ও রোগী উহা নাড়িতে চাড়িতে পাবে না আক্রান্ত অঙ্গ সাতিশয় উষ্ণ, বেদনাম্বিত ও ক্ষীত, তজ্জন্ত স্বাভাবিক আকাবেব দ্বিগুণ হয় ; কিন্তু ঐ ক্ষীততা শোধের জায় নহে । উহা পাণ্ডুব শ্বেতবর্ণ, চিকণ বা উজ্জল থাকে ও উহাতে সাতিশয় টানবোধ হয় তরুণ লক্ষণাদি তিরোহিত হইলে কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত অঙ্গবিরুদ্ধি থাকে

চিকিৎসা ।—টংচব হ'য়া'মিলিস ভর্জিনিক' ১২ মিনিম মাত্রায় ২৩ ঘণ্টান্তর সেবনে এই বোগ উপশমিত হয় প্রসবের পর স্ত্রীলোকদিগেব উরুদেশেব শিরাতে প্রদাহ উপস্থিত হইয়া ক্ষীততা ও বেদনাদি লক্ষণ প্রকাশিত হইলে জলৌকা দ্বারা বক্ত-মোক্ষণ ; ব্লিষ্টার ; শৈত্যকারক লোশন ১১৮ ; ফোমেণ্টেসন ;



টিংচর অব্‌ আইয়োডিন ডিজিটেলিস ও স্লুপিল বেদনা নিবার-  
ণার্থ অহিফেন এক পাউণ্ড বাইকার্বনেট অব্‌ সোডা ও এক  
আউন্স একট্রাঃ পপী এক গ্যালন জলে গুলিয়া উষ্ণ করিবে,  
পবে সেই জল দ্বাৰা ফ্লানেল সহযোগে সেক দিবে। কার্বনেট  
অব্‌ এমোনিয়া এসিডেব সঙ্গে উচ্ছলনাবস্থায়; সলফেট অব্‌  
সোডা বা ম্যাগনিসিয়া; হাইড্রোক্লোবিক এসিড; একোনাইট;  
আইয়োডাইড অব্‌ পটাসিয়ম, কুইনাইন, লঘু পথ্য বোগ পুরা  
তন হইলে আইয়োডাইড অব্‌ আয়রন, কডলিভর অয়েল; আই-  
য়োডাইড অব্‌ পটাসিয়ম ও বার্ক, এমোনিয়া ও বার্ক; ফস্ফেট  
অব্‌ আয়রন, পুষ্টিকাবক খাদ্য, দুগ্ধ, মদ্য উত্তেজক ও বেদনা-  
নিবারক লিনিমেন্ট ফ্লাইং রিষ্টার তুলা দ্বাৰা আচ্ছাদিত করতঃ  
তত্পৰি ভাল করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া রাখিলে বিশেষ উপকার  
হয়। আক্রান্ত অঙ্গ নাড়িতে চাড়িতে না দিয়া বিশ্রামাবস্থায়  
রাখিবে।

ম্যান্‌জিওলিউমাইটীস—শোষক-নিরা প্রদাহ।

ইনফ্যামেশন অব্‌ লিম্ফাটিক ভেসেল্‌স

বাহ্যিক আঘাত বা অসুস্থ পদার্থ আশোষণ অর্থাৎ শবচ্ছেদ-  
কালে হস্তাদি ক টিয়া গেলে বিষ আশোষিত হওয়ায় এবং  
অসুস্থ কার্বংকল বা পটনশীল বিস্ফাটকের বিষ বশতঃও আচুষক  
শিবার প্রদাহ উৎপন্ন হয় ইহাব সঙ্গে রসীকা গ্রন্থি আক্রান্ত  
হইয়া থাকে

লক্ষণ — উজ্জল লালবর্ণ বজ্জুবৎ দাগ, আহত স্থান হইতে

শিরাব গতি অভিমুখে উর্দ্ধগামী হয় অর্থাৎ যে গ্রন্থি মধ্যে শিরা শেষ হয়, ততদূর পর্য্যন্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ দাগ দৃষ্ট হয়। আক্রান্ত অঙ্গ শীত ও বেদনাবিশিষ্ট অত্যন্ত সার্কারিক উপ-  
দ্রব, শীত বা কম্প, বিবমিষা ও কোষ্ঠবদ্ধ, জ্বর, অস্থিৰতা, মানসিক ও দৈহিক অবসন্নতা সহজে আরোগ্য হইতে পাবে অথবা পাকিয়া উঠে, বা অধিক দিন পর্য্যন্ত কঠিনাবস্থায় থাকে কখন বা সাংঘাতিক অবসন্নতা বা পূষাক বক্তৃপীড়া (পাইমিগিয়া) প্রাপ্তভূত হইয়া রোগীকে শমনসদনের অধিনি করে

চিকিৎসা — সল্ফেট অব সোডা কিম্বা ম্যাগনিসিয়া  
৩৩১, ৩৩৪, ৩৩৯ ক্লোবেট অব পটাশ ২৯৬; ম্যাগনিসিয়া কার্ব  
ও বার্ক ১৮৩, কুইনাইন—১৯৩, ১৯৪; হাইড্রোক্লোরিক এসিড  
ডিল, ব্রাণ্ডি এণ্ড এগ্ মিকশ্বর হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও  
ক্লোবেট অব পটাশ ২৯৪ ফোমেন্টেসন; লিনসিড পুলটিস;  
একট্রাঃ বেলডোনা ও পপী; ওয়াটার ড্রেসিং; কষ্টিক লোশন  
সোডা সল্ফো কার্বলাস আদি পচননিবারণক কুইনিন ও টিং  
ঈল বিবিধ এন্টিসেপ্টিক স্থানিক প্রয়োজ্য।

ইনফ্লামেশন অব লিম্ফাটিক গ্লান্ড।

শোষক গ্রন্থি-প্রদাহ।

ইহা স্বতন্ত্রভাবে বা আচুষক শিবার প্রদাহ সহ উপস্থিত হয়।  
স্ফোট জরের পর গ্রন্থিপ্রদাহ সাধারণ গণ্ডমালাধাতু-এক-  
তিক ব্যক্তিদেব সাধাবণতঃ সপ্তটিক গ্রন্থি প্রদাহ হইয়া থাকে।

লক্ষণ । — তরুণ প্রকারে অস্বস্থতা বোধ, সামান্য শীত, লক্ষণিক জ্বর এক বা ততোধিক গ্রন্থি ক্ষীত, উষ্ণ, কঠিন ও বেদনাম্বিত হয় ক্ষীততা বৃদ্ধির সঙ্গে গ্রন্থি উপরিস্থ চর্ম্ম আরক্ত বা নীলিম হয় রোগ সহজে আবোগ্য বা প্রাচীন অবস্থায় পরিণত না হইলে পুষ্ণোৎপত্তি হইয়া থাকে । গ্রন্থি মध्ये বা চতুষ্পার্শ্বস্থ যোজক তন্তুতে ফোটক উৎপন্ন হয় বোগ প্রাচীনাংকার ধাবণ করিলে গ্রন্থিবৃদ্ধির সঙ্গে উহাব কাঠিগ্র, বেদনা ও উত্তাপ সামান্য প্রকার হয় চর্ম্ম স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট যোজক তন্তু আক্রান্ত না হওয়ায় গ্রন্থি নাড়িতে চাড়িতে পাবা যায় গণ্ডমালাধাতু-প্রধান ব্যক্তিদের গ্রীবা আদি স্থানের গ্রন্থি ক্ষীত থাকে ; সম্ভবতঃ বালকদের হয়, কিন্তু পূর্ণবয়সেও বিলম্ব নহে গ্রন্থিক্ষীততাব হ্রাসবৃদ্ধি অনেক দিন পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায় না । পুষ হওয়াব উপক্রমে সার্বজ্ঞিক স্বাস্থ্যহানি হয় ।

চিকিৎসা — পূর্কোক্ত বোগেব স্থায় বোগী গণ্ডমালায় ধাতুবিশিষ্ট হইলে সার্বজ্ঞিক স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল হয়, তদনুরূপ উপায় অবলম্বন করিবে কুইনাইন ও আয়বল ১৬৭ ; আইয়োডাইড্ অব্ এমোনিয়ম ও বার্ক ৪২৭ কডলিভব অয়েল, পুষ্টিকর খাদ্য । স্থানিক বেলাডোনা ও পপীব সাব, পুলটীস, টিংচব অব্ আইয়োডিন, রেড্ আইয়োডাইড্ অব্ মার্করী অয়েন্টমেন্ট স্পিরিট নোশন ( ১ ভাগে ৩ ভাগ ) দ্বাবা বস্ত্র খণ্ড আর্দ্র করতঃ আক্রান্ত অংশে লাগাইয়া তত্পরি কলাব পাতা দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিবে

## টেবিস্ মেজেন্ট্রিকা — মধ্যান্ত্রিক লসীকা

গ্রন্থি বিরুদ্ধি ।

অন্ত্রযোজক ঝিল্লীস্থ লসীকা গ্রন্থির প্রদাহ ও তাহার গুটিকা-  
কষ্টতা। গুটিকা সঞ্চিও হইয়া গ্রন্থিবিধান বিনষ্ট হয় এবং তদ্ব্যক্ত  
রসবাহি শিরা দ্বারা আনীত অন্তরস উহান মধ্য দিয়া গমন করিতে  
পারে না। শিশু ও বালকদেবই সাধারণতঃ এই রোগ হয়।  
অনেক সময় গুটিক অন্ত্রচ্ছদ প্রদাহেব সহিত ইহা বর্তমান থাকিতে  
দেখা যায়।

লক্ষণ ।—অন্ত্রে অল্প বা অধিক বেদনা সতত বিদ্যমান  
থাকে। সময় সময় বেদনা এত প্রবল হয় যে, রোগী জজ্বাদয়  
সংকুচিত কবিয়া বাথে। ওষ্ঠ ঘোব লালবর্ণ, মুখেব কোণে ক্ষুদ্র  
ক্ষুদ্র ক্ষত বা ওষ্ঠ বিদারিত। অন্ত্রের ক্রিয়া অনিষমিত, মল  
জলবৎ ও দুৰ্গন্ধ এবং ঘন ঘন নিঃসৃত হয়। উদর ক্ষীত ও  
টানবিশিষ্ট। সার্কান্সিক শীর্ণতা ক্রমশঃ উপস্থিত হয়। শবীব  
পাণ্ডুবর্ণ, সার্কান্সিক দৌৰ্বল্য ও তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধমান থাকে।  
গ্রন্থিব ক্রিয়া বিনষ্ট হওয়ার পূর্বে বোগোপশম হইতে আবস্ত হইয়া  
বোগী আবেগা হইতে পারে। ইহার সঙ্গে যক্ষ্মা, গুটিকা সঞ্চয়  
ও মস্তিস্কের সগুটিক প্রদাহ উপস্থিত হইতে পারে।

চিকিৎসা।—মূহ পুষ্টিকাবক পথ্য ; ছাগ, গর্দভ প্রভৃতির  
দুগ্ধ, সোডা ওয়াটার ও দুগ্ধ ; পোর্ট ওয়াইন ও ম্যাংগন য়ুর,  
কডলিভ অয়েল ; মর্ট একষ্ট্রাক্ট ; আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়াম ;  
এগোনিয়ো সাইটেট অব্ আয়রন ১৮০। হাইপোফস্ফাইট অব্  
সোডা বা লাইম ও বার্ক। উদবাস্য হইলে মার্করী ও চক বা  
ডোভার্স পাউডর অতি অল্প মাত্রায়। পদ্ম ক্রিটী ম্যারোমেটিক ;



সংকোচক মিশ্র উদর প্রদেশে সোপ বা ওপিয়ম লিনিমেন্ট,  
মসিনার পুলটাস, মিনারেল ওয়াটারস বিগুন্ধ বায়ু পরিপূর্ণ  
স্থানে বাস সমুদ্রবায়ু সেবন, স্থান পরিবর্তন সিরপ ফেরি  
আইয়োডাই, ফস্ফেট অব্ লাইম, ক্লোরাইড অব্ লাইম উদর-  
প্রদেশে কডলিওর অয়েল মর্দন ও তরুপরি ফ্ল্যামেল ব্যাণ্ডেজ  
ধ্বনন বিশেষ স্মৃফলপ্রদ

---

ডিজিজেস অব্ দি এলিমেন্টরী ক্যানাল ।

( অনবহা প্রণালীব পীড়া )

---

ডিজিজেস অব্ দি টং । ( জিহ্বার পীড়া )

গ্লান্ডাইটিস—জিহ্বা প্রদাহ ।

এক্ষণে জিহ্বার প্রদাহ একটি বিবল পীড়া হইয়াছে, কারণ  
মুখ আনার জন্ত এক্ষণে কদাচ পাবন ব্যবহার হয় অত্যাগ  
রোগের সঙ্গে এই পীড়া উপস্থিত হইতে পারে

লক্ষণ ।—জ্বর, সার্বাজিক অসুস্থতা, দৌর্বল্য, উৎকর্ষা,  
জিহ্বাতে বেদনা ও উষ্ণতা এবং লাল নিঃসরণ জিহ্বার বর্ণ  
খোরাল হয় ক্ষীণতা সময় সময় এত বাড়ে যে, মুখগহ্বরে  
জিহ্বা না ধবায় বাহিব হইয়া পড়ে মধুর গতিতে ক্ষীণতা  
বৃদ্ধি হইতে পারে অনেক সময় এতদ্বারা সাতিশয় শ্বাসকষ্ট  
সমুপস্থিত হয় কখন ইহাতে পুণ জন্মে

চিকিৎসা ।—প্রথমে বিবেচক পীচকারি, তৎপরে কুই-  
নাইন—১৯৩, ১৯৪ । জিহ্বাতে বরফ লাগান ; জিহ্বার উপরে

লম্বালম্বিভাবে চিরিয়া দিবে। ক্লোরেট অব্ পটাশ ; ক্যাপ্টর অয়েল।  
নাইট্রেট অব্ সিল্ভর স্থানিক ঔষ জলের বাষ্প লাগান হিতকর।  
বোরাসিক বা কার্বলিক সোশনের কুলি করোসব সল্লিমেট ১ গ্রেন  
ও জল ১ আউন্স, মিলাইয়া ১০ মিনিট মুখে রাখিয়া ফেলিয়া  
দিবে সে সময় নাক দিয়া নিশ্বাস টানিতে উপদেশ দিবে, ইহাতে  
বিশেষ উপকার হয়।

### অল্ সার্স অব্ টং—জিহ্বার ক্ষত।

জিহ্বাতে নানাপ্রকার ক্ষত হয় উহা অধিকাংশ অত্যন্ত  
বেদনাবিশিষ্ট এবং তাহা আবোগা হইতে বিলম্ব হয় কখন কখন  
জিহ্বার উপরে অগভীর ক্ষত হয় উহা বেদনাযুক্ত ও তৎসঙ্গে  
পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়াবিশৃঙ্খলা থাকে ইহা অবসন্নকব পীড়ার  
সঙ্গে জন্মে সামান্য প্রদাহ হইতে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত  
হয়। উপদংশ আদির বিষ বশতঃও জিহ্বার ক্ষত প্রকাশিত  
হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—বোবাক্স গার্গল, গ্লিসিৰিন অব্ বোরাক্স  
২৫৮; সলফেট অব্ কপার; কষ্টিক সোশন, গ্যালম ও জিহ্ব  
গার্গল বিসমথ, পেপসিন, ক্লোরেট অব্ পটাশ; আইয়ো-  
ডাইড অব্ পটাসিয়ম উপদংশীর ক্ষতে স্বেযোক্ত ঔষদ বিশেষ  
উপকারী ক্লোরেট অব্ পটাশ ও টিংচর সব গার্গল নাইট্রিক  
এসিড ১ ড্রাম, জল ৮ আউন্স—গার্গল। কডলিভর অয়েল,  
সামুদ্রিক বায়ু সেবন ইত্যাদি বোরাসিক এসিড মধু সহ স্থানিক।

### ক্যান্সার অব্ টং—কর্কট পীড়া ।

যে প্রকার ক্যান্সার হউক, উহাতে ক্রমশঃ ক্ষত হইতে থাকে । ক্ষত পচনশীল, দুর্গন্ধ এবং ধার বন্ধুর ও বিপর্যাস্ত হয় সাতিশয বেদনা, অত্যন্ত লালান্দ্রাব ; কর্কটিক শীর্ণতা বাক্যকথনে ও গিলিতে সমূহ কষ্ট, রক্তদ্রাব, জিহ্বা অত্যন্ত ক্ষীণ । কখন কখন পচন সংঘটিত হয় জিহ্বাধঃ ও হৃদযঃ গ্রন্থিতে কর্কটিক গুস্তি প্রায় উন্নত ক্ষতযুক্ত মাংসপিণ্ড দ্বারা পূর্ণ হইয়া যায় ও তজ্জন্ত শ্বাসবোধের আশঙ্কা হয় অবসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যু হয় ।

চিকিৎসা ।—বেদনা নিবারণার্থ ওপিয়ম ও শরীরের শক্তি রক্ষার্থ বলকারক ঔষধ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োজ্য রক্তদ্রাব নিবারণার্থ ম্যাটিকো পত্র চূর্ণ, পারক্লোরাইড অব্ আয়রন বা বরফ—স্থানিক । শস্ত্রোপচার দ্বারা পীড়িত বিধান পৃথগ্ভূত করিলে অনেক সময় যন্ত্রণার লাঘব হয় ।

### ক্রাকট টং—জিহ্বার বিদারণ ।

জিহ্বা বিদারণ বা ফাটা একটা ক্লেশকর পীড়া আহাবে ও বাক্য কথনে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয়

চিকিৎসা ।—বোবাক্স ও গ্লিসিরিন অথবা শুদ্ধ গ্লিসিরিন ; বিসমথ ও রেজ ওফটব দ্বারা প্রস্তুত ধৌত স্থানিক প্রয়োজ্য সেবনার্থ আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম, ষ্টীল বা মার্সাপ্যারিলা ; ক্রোবেট অব্ পটাশ অত্যন্ত বেদনা থাকিলে কোকেইন ও গ্লিসিরিন প্রয়োজ্য

## ইনফ্যামেশন অব্ দি মাউথ ।

( মুখগহ্বরের প্রদাহ )

### ফলিকিউলার ষ্টমাটাইটিস্ ।

মুখগহ্বরস্থ শৈল্পিক ক্ষুদ্রগ্রন্থি ( ফলিকল্‌স ) প্রদাহ, আপনা  
পনি বা স্ফোটজবাবসানে উৎপন্ন হয় বাস্তাবস্থায় এই পীড়া  
সাধারণ ।

লক্ষণ ।—স্তনপানে কণ্ঠ, অতিশয় লালতাব, হৃদয় গ্রন্থি  
অল্প ক্ষীণ ও বেদনাম্বিত অস্থিৰতা সহ জ্বর, ক্ষুধাভাব, দুৰ্গন্ধি  
মলযুক্ত উদরাময় মুখগহ্বর, জিহ্বা ও তালুব পশ্চাচ্চাগে জলপূর্ণ  
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁফোঁ হয়, পরে তাহা ফাটিয়া গিয়া ক্ষত হয়, ক্ষতেব  
উপরে মলিন ধোঁ বা পীতবর্ণ মামড়ী পড়ে

চিকিৎসা ।—কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ক্যাষ্টর অয়েল বা কম্পা-  
উও বিউবার্ব পাউডর দ্বারা বিবেচন করাইবে ক্লোরিট অব্  
পটাশ ৩০৮ ; ক্লোরিট অব্ পটাশ ও আয়রন ১৮৯ । বোরাক্স ও  
গ্লিসিরিন, কার্বলিক এসিড ও গ্লিসিবিগ কষ্টিক লোশন,  
সলফেট অব্ জিঙ্ক ও গ্যালম গার্গল ইত্যাদি প্রযোজ্য ।

### অল্‌মাবেটীভ্ ষ্টমাটাইটিস্ ।

মাড়িতে ক্ষত হইয়া মাড়ি বিনষ্ট ও দন্ত মূলচ্যুত হয় অস-  
ম্পূর্ণভাবে পরিপোষিত বালকদেব সাধারণতঃ এই রোগ হয়  
এই বোগকে পাবদঘটিত পীড়া বলিয়া প্রম হইতে পারে

লক্ষণ ।—মুখগহ্বর উষ্ণ, লালতাব, শ্বাস দুৰ্গন্ধ, ওষ্ঠ  
ক্ষীণ, হৃদয় গ্রন্থি ক্ষীণ ও বেদনাম্বিত মাড়ি ক্ষীণ, আরক্ত



বা ঘোর লালবর্ণ এবং উহা কোমল হরিতাঃ পদার্থ দ্বারা আবৃত  
দেহায় বোগ বৃদ্ধি হইলে ক্ষত হইয়া মাড়ি নষ্ট, দন্ত ক্ষিণিক  
বা পতিত হয় কপোলাভ্যন্তরও আক্রান্ত হইতে পারে । বিশৃঙ্খল  
ও শাটিত ক্ষতও হয়

চিকিৎসা — সেবনার্থ ক্লোবেট অব্ পটাশ এবং তাহাব  
কবল এই বোগেব মহত্বপকানী ঔষধ এই ঔষধ ৫ গ্রেণ মাত্রায়  
অল্প চিনি ও জলের সঙ্গে, একবৎসর বয়স্ক শিশুকে ৪৬ ঘণ্টান্তর  
দেওয়া যাইতে পারে ছুগ্ধ, মাংসেব যুষ ক্ষত আরোগ্য হইলে  
বার্ক, কুইনাইন ১৯৩, ১৯৪ স্থানিক—কষ্টিক লোশন,  
বিবিধ কবল ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮ ।

### গ্যান্‌গ্রিনিস্ ফটমাটাইটিস বা মুখরোগ ।

ইহা একটা ভয়ানক পীড়া দুর্বল বালকদেব ২ হইতে  
৫ বৎসর বয়সেব মধ্যেই এই বোগ হয়

লক্ষণ । —দৌর্বল্য, এক দিকেব কপোলদেশে কঠিন  
ক্ষীততা । মুখগহবর দেখিলে কপোলদেশেব ঠিক মধ্যস্থলে শ্বেতাভ  
বা পাংশুবর্ণ মামড়ী দৃষ্ট হয় । তৎপবে পচন আরম্ভ হইয়া  
কপোলাভ্যন্তর, ওষ্ঠ ও মাড়িতে ক্ষত প্রসারিত হইয়া পড়ে ।  
অত্যধিক ও ভয়ানক দুর্গন্ধ লালান্সাব । অতিশয় সার্বাস্থিক  
অসুস্থতা । ফুস্‌ফুসীয় উপসর্গ সমুপস্থিত হইতে পারে । এই বোগ  
প্রায়ই সাংঘাতিক হয় কেহ কেহ বলেন, পাবদ ব্যবহাব  
বশতঃ এই বোগ জন্মে কিন্তু পারদ ব্যবহার ব্যতীতও প্লীহা-  
বৃদ্ধি ও রক্তেব অবিপ্লবাবস্থা হইতে এই পীড়া জন্মে ।

চিকিৎসা ।—সমস্ত মুখ প্রদাহে গ্লিসিবিণ অব্ ট্যানিন ।  
 অ্যান্টিসিন্টিক এসিড ১ ভাগ, গ্লিসিবিটে দ্রব করিয়া, তৎসহ ২৫০  
 ভাগ জল মিশ্রিত করতঃ তাহাব কবল ব্যবহার করিলে সর্দিজনিত  
 মুখপ্রদাহের বেদনা উপশমিত হয় ক্লোরিণ গলিউসন লাইকর  
 আর্সিনিকেলিস সেবনে উপকার হয় স্থানিক—ফটকিবি চূর্ণ;  
 নাইট্রেট অব্ সিন্ধব, কখন কখন নাইট্রিক এসিড ; ক্লোবাইড  
 অব্ জিঙ্ক ; বা ক্লোবিনেটেড অব্ সোডা, পাবমান্গানেট অব্  
 পটাশ ; বোবিক ও কার্বলিক এসিড প্রভৃতি পচন নিবাবক ও  
 দুর্গন্ধহাবক ঔষধেব ধাবন প্রস্তুত কবিয়া ওদ্বাবা মুখগহবর পিচ-  
 কাবী দ্বারা পবিকার কবিয়া দিবে সেবনার্থ মাংসেব যুষ, দুগ্ধ,  
 কাঁচা ডিম, ব্রাণ্ডি, কডলিভ অব্ অয়েল ক্লোরট অব্ পটাশ—  
 ডিককমন সিনকোনা অথবা টিংচব ফেবি পাবক্লোবাইডের সঙ্গে ।  
 কুইনাইন ১৯৩, ১৯৪ আইয়োডাইড অব্ পটাশিয়ম মিথি-  
 লিন ব্লু ১ ভাগ ও জল ৪ ভাগ একত্রে স্থানিক লাগাইলে উপ-  
 কার দর্শে । ক্লোবেট অব্ পটাশ সূক্ষ্ম চূর্ণ স্থানিক মৃদু  
 ভাবাপন্ন রোগে কবোসিব সল্লিমেট লোশন ( ১ গ্রাে ২ ৩  
 আউন্স জল ) উপকারী

এপথি অব্ দি মাউথ—থ্রুশ

জাড়ি ক্ষত

জিহ্বা ও মুহগহবরে লিপ্ত শৈথিলিক বিদ্যীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলা-  
 কার, দীর্ঘ উন্নত ও খেওবর্ণ ক্ষত শৈথবাবস্থায় সাধারণতঃ হয় ।  
 পূর্ণবয়স্কদেবও সম। সমগ্র হয় অবসন্নকব পীড়ার সঙ্গে জনে ।

লক্ষণ ।—অস্থিভংগ, দৌর্বল্য, কাসি, গিলিতে কষ্ট, বমন, উদবাসয় । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতগুলি সংযুক্ত হইয়া, বৃহদাকার হয় ও ঝিল্লী দ্বারা আবৃত বলিয়া বোধ হয়

চিকিৎসা —নাইট্রিক এসিড ডিল্ অল্প মাত্রায় সেবন করিলে এই বোগ আবেগ্য হয় স্থানিক—ফটকিবি চূর্ণ; বোবাক্স ও গ্লিসিবীন, কার্বনিক এসিড ও গ্লিসিবীন ২৮ । ইন্ফিঃ ক্যাটিকিউ ও বোবাক্স সলিউশন অব্ সলফাইড অব্ সোডা ( ৬০ গ্রেণ, জল এক আউন্স ), কষ্টিক লোশন । ক্রোরেট অব্ পটাশ বাহ্যিক ( কলরূপে ) বা আভ্যন্তরিক—ডিক্কসন মার্কেট সহিত কুইনাইন ১৯০, টিংচব ফেবি পাবলোবাইড, জাইযোডাইড অব্ পটাসিয়ম । ছোটব সঙ্গে ২১ গ্রেণ বোবিক এসিড সেবনার্থ দিনে উপকার হয় অল্প মাত্রায় গ্রে পাউডর

### ইনফ্লুয়েন্স অব্ দি টন্সিল্‌স ।

( তালুপার্শ্বগ্রন্থি প্রদাহ । )

ভরণ প্রদাহ—সাধারণতঃ সর্দি বা অন্য কোন দৈহিকাবস্থা হইতে উৎপন্ন হয় একবার এই বোগ হইলে পুনরায় হইবার প্রবণতা জন্মে । যৌবনাবস্থাতে এই প্রদাহ উপস্থিত হইয়া থাকে

লক্ষণ ।—শীত বা কম্প, তীব্র জ্বর তালুপার্শ্ব গ্রন্থি ও এলিহিত স্থান স্ফীত ও আবৃত । গিলিতে বেদনা ও কষ্ট । তরল পদার্থ গিলিবার চেষ্টা করিলে তাহা নাসাবন্ধু দিয়া বাহির হইয়া যায় । ইউষ্টেথিয়ান প্রণালীতে বেদনা । অনেক সময় পুয়োৎ-

পত্তি হয়, আবার কোন কোন সময় বিনা পুষ্কোৎপত্তিতে রোগ  
আবোগা হয়

**প্রাচীন বিরুদ্ধি** তখন প্রদাহেব অবসানে বা গণ্ড-  
মালা প্রকৃতিক বালক ও দুর্বল স্ত্রীলোকদেব আপনাপমি হয়  
বিরুদ্ধি অধিক হইলে গলকোষ অববদ্ধ হইবাব ঞ্চায় বোধ হয়।  
কথা অম্পষ্ট, অল্পাধিক বধিরতা, গিলিতে কষ্ট, পূর্ণ ও দীর্ঘশ্বাস  
গ্রহণে বাধা

**চিকিৎসা** — টিংচব একোনাইট অর্ধ বা এক মিনিম  
মাত্রায় ৪ বার ১৫ মিনিট অন্তর ও ৩৭পবে এক ঘণ্টান্তর ব্যবহার  
কবিলে প্রদাহ উপশমিত হয় ফটকিরি চূর্ণ বা দ্রব স্থানিক  
প্রযোজ্য টাটাব এমিটীক ৬ গ্রেণ মাত্রায় প্রতি ঘণ্টান্তর  
অত্যন্ত প্রদাহ ও ক্ষীণতা বর্তমানে একোনাইটের সঙ্গে বা পর্যায়-  
ক্রমে বেলডোনা ব্যবহার্য্য ক্যাপসিকম গার্গল। গ্রে পাউ-  
ডর ৬ গ্রেণ, ৩ ৪ ঘণ্টান্তর প্রযোগে উপকার দর্শে স্ফালাইন পর্গে-  
টিওন্‌ ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৯ সিডলীজ পাউডর ৩৫৩।  
গলায় উষ্ণ স্বেদ ও মসিনাব পুলটিস ওপিয়ম মিশ্রিত কবল,  
গলাভ্যন্তবে উষ্ণ জলের বাষ্প লাগান এবং ঐ জলের সঙ্গে বেল-  
ডোনা, কোনাথম বা ওপিয়ম গুলিয়া দিবে ববফ খণ্ড চুষিতে  
দিলে বোগী অনেক সময় বিশেষ আবাম বোধ কবে কণ্ঠে  
ব্লিষ্টার, বা কম্পাউণ্ড ক্যাম্‌ফব লিনিমেন্ট। গলায় একষ্ট্রাক্ট অব  
বেলেডোনা মাখাইয়া তদুপরি পুলটিস সেবনার্থ গোয়েকম  
লোজেঞ্জ, এমোনিয়া ও বার্ক ১৮৩, ১৮৪ বুইনাইন ও মিনারেল  
এসিড্‌স ১৬৭, ২৭৭, ১৯৩, ১৯৪। পুষ্কোৎপত্তি হইলে বিশেষ  
সাবধানতায় তাহা অঙ্গ কবা কর্তব্য টনসিলের বিরুদ্ধি হইলে



কডলিভ অয়েল, কুইনাইন, আইয়োডাইড অব আয়রন ও ফক্‌টে  
অব লাইম প্রভৃতি সেবা বষ্টিক লোশন ( ১০—১৫ গ্রেণ,  
পবিত্র জল ১ আউন্স )

এন্টিপাইবিং ৫ গ্রেণ মাত্রায় সেবন উপকারী সোডা স্ট্রালি-  
সিনেটও প্রযুক্ত হয় বিবিধ সঙ্কোচক ও পচন নিবাবক ঔষধেব  
কবল বা লোজেন্‌জেস্ টিংচর ষ্টীল ১ ভাগ ও গ্লিসিবিণ ৩ ৪  
ভাগ স্থানিক, অথবা উহাতে জল মিঃইয়া কবলরূপে প্রয়োজ্য।  
বেদনাতিশয্যে কোকেইন ও গ্লিসিবিণ স্থানিক পবে ক্ষীতি  
নিবারণার্থ গ্লিসিবিং অব্‌ টানিন কার্বলিক এসিড, বোরিক  
এসিড প্রভৃতির স্প্র ইন্‌হেলেন্স গ্লিসিবিণ ও এলগ্‌।

ডিজিজেস্ অব্‌ দি ফ্যারিংস ।

( গলকোষের পীড়া )

ফ্যারিংজাইটিস্ ।

( এরিসিপেলোটন্‌ ইন্‌ফ্লামেসন্‌ । )

গলকোষের প্রদাহ সচবাচর হইতে দেখা যায় না সময় সময়  
আতুবালায় আদিতে এই প্রদাহ বিসর্প আকাবে পবিণত হয়।  
তৎসঙ্গে মৃদুভাবে অর প্রকাশ পায়, কিন্তু তাহাতে বোগী অবসন্ন  
হইয়া পড়ে গিলিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। প্রদাহ অবশেষে কোথে  
( পচন ) পবিণত হইতে পারে মাতিশয় অবসন্নতা প্রাপ্তভূত  
হইয়া মৃত্যু সংঘটিত হওয়া অসাধারণ নহে প্রাচীন প্রদাহান্তে  
উপজিহ্বা শিথিল ও দীর্ঘ হইতে পারে এতদ্বাৰা গলকোষে  
ডিজিজেস অব্‌ দি ইসোফেগস—অলসার অব্‌ ইসোফেগস ২৩৩

উদ্দীপনা সমুপস্থিত হইয়া কষ্টকর কাশি ও তৎসহ সময় সময়  
বমনোদ্বেক হয় ও গলার মধ্যে কাসিব পূর্বে জুড় জুড় করে

চিকিৎসা।—এমোনিয়া ও বার্ক ১৮৩, ১৮৪ ওয়াইন্  
ব্রাডি, মাংসের যুষ, ছাঙ্গাদি। বেদনার উপশমেব জন্ত ওপিয়ম  
দিবে কার্বলিক এসিড ১ ড্রাম, গ্লিসিরিণ অব বোবাক্স ৪ ড্রাম  
ও জল ১২ আউন্স মিশ্রিত করত তাহাব ববল বা স্ট্রো ইন্-  
হেলেনসন বেদনা নিবারণার্থ ইহাব সঙ্গে কোকেইন মিশাইয়া  
দেওয়া যাইতে পারে স্ববযন্ত্রেব পীড়াতেও ব্যবহার্য্য

ফলিকিউলাব ডিজিজ — শৈথিল্য বিলীল্য গ্রন্থি সকল  
সুড় বড় হয় অইয়েডিন ও স্কেচক ঔষধ অত্যন্ত জলে দিল্য-  
ইয়া, তাহা হইতে যে বাষ্প উঠে, তাহা গলাভ্যন্তরে লাগাইবে  
সেবনার্থ বনকারক ঔষধ ক্ষত হইলে কষ্টিক লোশন উগ্রতা  
নিবারণার্থ এমোন ব্রোমাইড সেবন অথবা গ্লিসিরিণ কার্বলিক  
সহ স্থানিক অথবা জল সহ কবল উপকারী

উপজিহ্বাব বিবৃদ্ধি স্কেচক কবল, লৌহবাটিত বনকবো-  
ষধ কষ্টিক লোশন, গ্লিসিরিণ অব্ ট্যানিক এসিড

ডিজিজেস অব্ কি ইসোফেগাস্।

অলসার অব্ ইসোফেগাস্—ক্ষত।

ইহাতে গিলন কষ্ট থাকে; সময় সময় উহা এতদূর বদ্ধিত  
হয় যে, বোগী একেবাবেই কোন দ্রব্য গিলিতে পারে না পাকা-  
শরোপরি বা বুদ্ধাঙ্গির উপবিভাগে বেদনা বোধ হয় বিবমিষা,  
উৎকর্ষা, শীর্ণতা ও দুর্বলতা

চিকিৎসা । কষ্টিক লোশন ( ২০ গ্রেণে এক আউন্স জল ) । বাহিবে টর্পেন্টাইন ও গ্লিসিরীন একত্রে মর্দন । ট্যানিক এসিড ; বোবাক্স , আইয়োডিনের বাষ্প আশ্রাণ । বরফ চুষিতে দিবে সেবনার্থ—বার্ক ; কুইনাইন , ঈল , কডলিভর অয়েল ; আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম্ ; পুষ্টিকর পথ্য ।

### ক্যান্সার অব্ ইমোফেগস্ ।

এক অংশে বা সমস্ত নলীতে এই বোগ উপস্থিত হইতে পারে । রোগেব সুত্রপাত হইতে এক বৎসরের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয় ।

লক্ষণ ।—গলাবেদনা, গিলিতে কষ্ট, সময় সময় কণ্ঠ কর্তনবৎ বেদনা । মতত বমনোদ্বেক বা বমন । নলী প্রায় অবরুদ্ধ । কিছু সময়ান্তে বোগী একেবাবেই আহাব কবিত্তে অক্ষম হয় । নলীতে ও পৃষ্ঠে জ্বালাবিশিষ্ট বেদনা । কাসি বা হিকা, রক্তস্রাব, শীর্ণতা, দুর্বলতা ।

চিকিৎসা ।—ইহা আবোগ্য হয় ন বেদনা ও যন্ত্রণাদি নিবারণার্থ ওপিয়ম ও বেলেডোনা প্রভৃতি মাদক ঔষধ ব্যবহার্য্য । কোকেইন উৎকৃষ্ট বেদনাহর ।

### ষ্ট্রিক্চর অব্ ইমোফেগস্ ।

যান্ত্রিক অবরোধ ।—সাধারণতঃ দাহক বিষ গলাধঃকরণ বশতঃ হয় । প্রথমে বমন । অন্তবহানলীতে বেদনা ও তাহা স্বকৃদয়ের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে । বিশ্রাম, এবং সহজ



ও স্নিগ্ধকাষক দ্রব্য আহাব করিলে কিছু দিন বোগ সাম্য হয় ।  
তৎপবে ৯ বা ১২ মাসান্তে সান্তিশয় গিজন কষ্ট সমুপস্থিত হয় ।  
ভাল কবিয়া আহার না করিতে পাবা বশতঃ ক্রমশঃ শরীর শীর্ণ  
ও দুর্বল হইতে থাকে অবশেষে রোগী মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় ।

চিকিৎসা ।—দাহক দ্রব্য গিলিয়া ফেলিলে ক্ষত হইয়া  
নলীর পবিসর সংকুচিত হইয়া যায় । বৃজি ব্যবহার দ্বারা ইমোফে-  
গসেব প্রণালীর পবিসর বিস্তৃত করার চেষ্টা করিবে আহাৰ্য্য  
দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে রোগী অসমর্থ হইলে পীচকারি দ্বারা  
মলদ্বাবে প্রবেশ করাইবে ।

### স্প্যাজ্‌ডমিক ষ্ট্রীকচর বা আক্ষৈপিক অবরোধ ।

মূত্রমার্গ আদির দ্বার ইহাতেও আক্ষৈপ উপস্থিত হওত নলের  
পবিসর কুঞ্চিত হইয়া থাকে । গুল্মবায়ু বোগগ্রস্তা যুবতীদের  
এই রোগ হইতে দেখা যায় । গিলিতে কষ্ট, কোন প্রকার  
উত্তেজনা বশতঃ শ্বাসবোধ, গাত্রগোবব, রক্তহীনতা ইত্যাদি ।  
ইহাতে ক্ষণকাল পবেই আক্ষৈপ তিরোহিত হয় ।

চিকিৎসা ।—আক্ষৈপ নিবাবক —৫, ৯৫, ৯৮, ১৩০ ।  
ভেলিবিয়ানেট অব্ কুইনাইন ; সল্‌ফেট অব্ জিঙ্ক ; শীতল জলে  
স্নান অবায়ুব ক্রিয়া বিশৃঙ্খলা থাকিলে তাহার প্রতীকার করা  
কর্তব্য । ব্রোমাইড অব্ পটাশিয়াম ।



## ডিজিজেস্ অব্ দি ষ্টমাক ।

( পাকস্থলীর পীড়া )

## ডিসপেপ্সিয়া—অজীর্ণ, মন্দাগ্নি ।

পাকাশয় ও অন্ত্রের নৈসর্গিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত সমুপস্থিত হইলে অজীর্ণ বা মন্দাগ্নি জন্মে ।

লক্ষণ — ক্ষুধাভাব, পাকাশয়প্রদেশে বেদনা, ভার ও পূর্ণতা বোধ—বিশেষতঃ আহাৰান্তে অনুভূত হয় । বমন ও বিবমিষা পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় । জিহ্বা সমল ও শ্বাস দুর্গন্ধ হৃৎস্পন্দন, শিবোবেদনা, কটি ও অঙ্গাদিতে বেদনা, বুকজ্বালা, পাকাশয়ে আক্ষেপ বা খাল । মুখ দিয়া জল উঠে । বিমর্ষ পাকাশয়িক রসের যথোচিত স্রাব না হইলে পরিপাক ক্রিয়া যত্ন ভাবে সম্পন্ন হয় । তৎসময় বাম উদরোর্কি প্রদেশে—পাকাশয়োপরি পূর্ণতা ও ক্ষীতি বোধ এবং তাহা আহাৰান্তে অনুভূত হয় উদবাধান, অম্ল উদগাব, দুর্গন্ধ উদগাব, কোষ্ঠবদ্ধ, মলবৃত্ত জিহ্বা, হৃৎস্পন্দন ও ক্রিয়া বিশৃঙ্খলা, শিবোবেদনা ও মানসিক অবসন্নতা ।

চিকিৎসা ।—উগ্রতাসম্পন্ন অগ্নিমান্দ্য ও যে প্রকার অজীর্ণে আহাব দ্বারা উদবাময় জন্মে, তাহাতে লাইকর আর্সিনিকেলিস ১ ফোটা, আহাৰের পূর্বে সেবন করিলে উপকার দর্শে জিহ্বা অত্যন্ত পরিষ্কার, চিকণ, লালবর্ণ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি উন্নত থাকিলে আর্সিনিক প্রয়োগ বিধেয় । কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে একট্রা বেলেডোনা  $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$  গ্রাঃ দিনে এক বাব সেব্য । আধান-যুক্ত অজীর্ণে বিসমথ ও উদ্ভিজ্জ অঙ্গার । লডেনম ১ ফোটা ও

টিং নক্সভমিকা ২ ফোটা একত্রে দিনে ৩ ৪ বার সেবনে উপকার দর্শিতে পাবে জিহ্বা মলাবৃত ও সমুৎপন্ন বৃষাবর্ণ হইলে পাডাফিলিন ৩. — ২. গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োজ্য তৎসঙ্গ নাইট্রিক এসিড ও নক্সভমিকা মিশ্র ব্যবহারে সমূহ স্মৃফল উপলব্ধি হয় । সল্ফোকার্বনেট অব্ সোডা বা টেবিলিন দ্বাখা আশ্বান নিবাবিত হয় উহা ১০ বা ১৫ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার্য আহাবেষ অনতিবিলম্বে উদরাশ্বান জন্মিলে ক্ষম্বস উৎকৃষ্ট । পবিসিত খাদ্য নিয়মিত সময়ে সেবন কর্তব্য প্রত্নাষে গাত্রোথান ; বিশ্রাম ; অধ্যয়ন অধিক না কবা ও মানসিক উৎকর্ষাদি পবি- হাবেব চেষ্টা কবা কর্তব্য । ১০ ১২ ঘণ্টা উপবাস কবিয়া থাকিলেও উপকার হয় । তৎপরে লঘু পথ্য, গর্দভী ও গাভীর দুগ্ধ, চুণের জল, মণ্ড, সাণ্ড, এবাকট বা চিকেন্ ব্রথ সেব্য এই সকল খাদ্য দ্রব্য ক্রমশঃ সহ হইতে থাকিলে উহা অপেক্ষা গুরুপাক দ্রব্য সেবনেব বিধান কবিবে পাকাশয়ের উগতা থাকিলে সোডা ওয়াটব প্রভৃতি হিতকর আহাবকালে খাদ্য দ্রব্য উত্তমরূপে চর্কণ কবিয়া গলাধঃকরণ করা উচিত ঔষধের মধ্যে পেপ্সিন্ সর্বপ্রধান, ৪১৭ ডাইলিউট হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও পেপ্সিন্ । কখন কখন পেপ্সিনের সঙ্গে মর্ফিয়া ব্যবহার হয় । লাইকর ট্রীক্লিন ২৩ মিনিম, বা ৫ মিনিম মাত্রায় টিংচর অব্ নক্সভমিকাও উক্ত ঔষধেব সঙ্গে ব্যবহার কবিলে বিশেষ উপকার দর্শে সোডা, টিউবার্, ইলিক্যাক ও জিঞ্জর । মুখ দিয়া যদি অম্লান্ত জল উঠে, তবে এবোমেটিক সল্ফিউরিক এসিড ; বিসমথ ২২৪, ২৩৪, ২৩৫ ; নাইটেট অব্ সিল্ভর ; কোনিয়ম ; বেলেডোনা ; কম্পাউণ্ড কাইনো পাউডর, হাইড্রো-

সিয়ানিক এসিড। বমন ও বেদনা নিবারণার্থ বরফ, মর্ফিয়া ;  
 সোডা এসিড, কোকেইন, হাইড্রেট ক্লোবাল ইত্যাদি  
 পাকশযেব মধ্যে যদি অধিক পরিমাণে অন্ন বা অল্প উগ্ৰ দ্রব্য  
 থাকা বশতঃ বেদনাদি উপস্থিত হয়, তবে বমন কবান কর্তব্য  
 তৎপরে সোডা, মর্ফিয়া ও হাইড্রোসিয়ানিক এসিড আদি সেব্য  
 ৯৩, ৯৮, ২৯০, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬ পরিপাক ক্রিয়াব ক্ষণতঃ  
 স্বর্তমানে উদ্ভিজ্জ বলকবোষণ ও মিনাবেল এসিডস ১৬৯, ১৭০,  
 ১৯৩, ১৯৪ ; শ্যালিসিন বা কার্বলিক এসিড। মূত্র বিবেচক—  
 গ্রে পিউডব, পিলবিয়াই কম্পাউণ্ড ৩৪৯, ট্যাবাক্সেসেকম্ ও  
 সোডা ৩৩৯, এসিড নাইট্রিক ডিল ও ট্যাবাক্সেসেকম ৩৭০  
 মূত্র লোহঘট ৩ ঔষধ ১৭৪, ১৭৯, ১৮০, ১৮২, ১৮৭, ১৮৮, ১৯৯,  
 ২০১, ২০৪, ২০৫ বমন নিবারণার্থ ১/৪ গ্রেণ মাত্রায় মর্ফিয়া ;  
 ক্রিয়েজোট ১ মিনিম, টিং আইয়োডিন ১ মিনিম, ক্লোবোফর্ম  
 ১ মিনিম, কোকেইন ১/৪ গ্রেণ প্রয়োজ্য সার্সিনী নামক উদ্ভিজ্জাণু  
 পাকশযে থাকা বশতঃ বমন হইলে সল্ফবস এসিড, সলফাইট  
 অব্ সোডা, শ্যালিসিলিক এসিড, অয়েল ইউক্যালিপ্টাই বা  
 মেথ পিপ্ ব্যবস্থেয় পেপসিন ও ফিবম্ বিডক্টম একত্র।  
 পানদোষ জনিত মন্দাগিতে সল্ফেট বা অক্সাইড অব্ জিঙ্ক  
 ব্যবহার্য্য মদ্যাদি অন্ন মাত্রায় দিবে অগ্নাধিক্যে ক্ষাব ঔষধ  
 ব্যবহান করা উচিত হইলেও তাহা লাত্যাদিক না হয়, তৎপ্রতি  
 দৃষ্টি রাখা কর্তব্য বোগেব কাবণ ঠিক করিতে পারিলে চিকিৎসা  
 সার সুবিধা হয় বিবিধ গীড়ার ইহা একটী উপসর্গ মাত্র।  
 প্যাপেইন ২ গ্রেণ মাত্রায় আহাবের পব সেব্য



একিউট্ গ্যাষ্ট্রাইটিস্—তরুণপাকায় প্রদাহ ।

পাকায়স্থ শৈল্পিক বিলম্ব তরুণ প্রদাহ কদাচ বা কখনই প্রায় আপনাপনি জন্মে না মিনাবেল এসিড্ দাহক ক্রাব বা আর্সিনিক আদি দ্বারা বিষাক্ত হইলেই সাধারণতঃ তরুণ প্রদাহ উৎপন্ন হয় । সময় সময় ক্ষুটিত জলপান, অধিক মাত্রায় এন্টিগনি বা বমনকারক মাত্রায় সর্বদা সেবনে এই পীড়া উপস্থিত হয়

৫ নং — উগ বিষ দ্বারা প্রদাহ সমুপস্থিত হইলে পাকায় প্রদেশে বৃদ্ধি জ্বালাযুক্ত বেদনা, চাপিলে বৃদ্ধি হয় ক্লেশকর বিবমিষা, প্রবল বমনোদ্বেক শ্বাস ও নাড়ী স্পন্দন দ্রুত সাতিশয পিপাসা, শীতল জলপানে ইচ্ছা, কিন্তু তাহা পান মাত্রই বমন হইয়া যায় কোষ্ঠবদ্ধ, শ্বল ও বক্তবর্ণ মূত্র বোগী শীঘ্রই অবসন্ন হইয়া পড়ে তদ্ব্যতীত মৃত্যু সংঘটিত হয়

চিকিৎসা ।—ওপিয়ম, ববফ, বার্লি ওয়াটর, ছফ, ক্রিম, এবাকট, গ্রায়েল নিউট্রিসম অর্থাৎ পুষ্টিকর দ্রব্যেব পীচকারি ফোমেন্টেসন, ববফ স্থানিক । বোগ উপশমিত হইলে আহার্য্য দ্রব্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক বিবেচক পীচকারি, ওপিয়ম সপোলিটনী, পুগটীস । বমনকারক ঔষধ ও ষ্টমাক পম্প ব্যবহার নিষিদ্ধ ।

সব্ একিউট্ গ্যাষ্ট্রাইটিস্ বা গ্যাস্ট্রিক ক্যাটার ।

অজীর্ণ, জিহ্বা গলাবৃত, পাকায়প্রদেশে অস্বাভাবিক বোধ, শিথিল বমন, শিবোধূনি, শিরোবেদনা চর্ম্ম উষ্ণ, নাড়ী দ্রুত ও পৃষ্ঠ, পাকায়বেদনা, মূত্র শ্বল

চিকিৎসা — সলফাইট অব্ সোডা ৩০—৬০ গ্রেণ, বিসমথ ২০৩, ২২৪, ২৩৪, ২৩৫, ৩৯৪ স্যাবোমেটিক সল্ ফিউবিক এসিড; আয়ব যালম, স্ফাকেরেটেড সলিউশন অব্ লাইম ও লুক, ক্যালেমেল, এরাকট, ২৩, পাউকটী, সোডা ওয়াটর, সেবি স্মিথ পানীয়—৩৩৩, ৩২৪, ৩২৬ মুছ বিবেচক। মোমেন্টেন; টর্পেন্টাইন ষ্টুপ; পুশটীস, সিনা-পিজম্স বমন নিবারণার্থ হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ডিল আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম ও বাইকার্বনেট অব্ সোডা একত্রে এই পীড়ায় বিশেষ উপকার করে। হাইড্রোক্লোরিক এসিড বা প্যাগেইন হিওকব

### ক্রনিক গ্যার্ট্রাইটিস্—ক্রনিক গ্যাস্ট্রিক ক্যাটার।

অত্যন্ত অধিক দিন স্থায়ী না হইলে ইহাকে এক প্রকার মুছ পীড়া বলা যায় পাকায়ের পর্দা পুষ্ক ও কঠিন হয় পাকায়ের অধোমুখ সংকুচিত বা শৈথিল্যে বিলম্বিত হইতে পারে ক্ষুধাত্তাব, পাকায় প্রদেশে ও বুদ্ধিস্থিতে বেদনা আহারাঙ্গে বেদনা ও বমন পিপাক ক্রিয়া বিলম্বে সম্পন্ন হয় পেট বেদনা, মুখ দিয়া জল উঠা, অল্পে ক্রিয়া বিশৃঙ্খলা।

চিকিৎসা। সলফাইট অব্ সোডা ৩০—৬০ গ্রেণ মাত্রায় ইনফিঃ কোয়াসিয়ার সঙ্গে বিসমথ ২২৪, ২৩৪, ২৩৫, ৩৯৪। অক্সাইড বা নাইট্রেট অব্ সিলভর বাটিকাকাবে একষ্ট্রাঃ হায়গায়া-মাসেব সঙ্গে অগ্জেনেট অব্ সিলিয়ম ২৩ গ্রেণ, হেনবেন বা জেনিয়ানেব সাব সহ ৬৮ ঘণ্টান্তর কাইনো ও লগউড ইনফিঃ ম্যাটিকা, ফেবি এমোনিয়া সলুফেটীস ৫ গ্রেণ মাত্রায়।

কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ক্যালোমেল ও গ্রেন ও বিয়াই ১০ গ্রে° ;  
এফাবেসিং সাইটেট অব্ ম্যাগ্নিসিয়া ; ফ্রেডবিক্সাল ওয়াটার ;  
কম্পাউণ্ড বিউবার্ভ পাউডর মদ্য সেবন জনিত বোগ হইলে  
ওপিয়ম ও নর্স ব্যবহার্য্য উপদংশজনিত হইলে মার্কবী ও আইয়ো  
ডাইড অব্ পটাসিয়ম । আহাব সম্বন্ধে ষোণীকে বিশেষ সতর্ক  
করা কর্তব্য । প্রথমে দুগ্ধ ও চূণের জল এক বা দুই দিন সেবন  
করাইয়া পবে ম্যারাকট, দুগ্ধ, সাণ্ড, অন্নমণ্ড, ডিম্ব, মৎস্ত ও মাংস-  
যুগ ইত্যাদি দিবে ষিদ্ধকাবক পানীয়াদি বিধেয়

### ইন্ডিউবেশন্ অব্ দি পাইলোবস

পাকশযেব অধোমুখে শৈথিল্যক বিল্লীব নিম্নস্থ সৌত্রিক বিল্লী  
অত্যন্ত পুরু হয় । তৎক্বে উক্ত মুখের অববোধ, তৎসঙ্গে সম্ভবতঃ  
পাকশযে বিস্থতি ও উহার পৈশিক আবরণ বর্ধিত হয়

লক্ষণ । শীর্ণতা ও বর্ধিত দুর্দ্বলতা মুখ দিয়া জল  
উঠে বমন ; কোষ্ঠবদ্ধ ; মানসিক দৌর্দল্য ক্ষুধা অত্যন্ত  
অধিক হইতে পাবে অধিক আহার করিলে যন্ত্রণাব বৃদ্ধি হয়  
সময় সময় অধোমুখ অর্কদবৎ প্রতীষমান হয় নিদ্রাব ব্যাঘাত  
জন্মে । অবসন্নতা, পবিপোধণেব হীনতা বশতঃ মৃত্যু হয়

চিকিৎসা । লঘুপাক পথ্য যথা—দুগ্ধ, ক্রিম, কাঁচা  
ডিম্ব—সেবীষ মাজ, মাংসেব যুষ, চা, কজ্জলিতব অম্বল । কুই-  
নাইন ও ষ্টীল । বোগেব প্রবলতাব সময় ১২ দিন পাকশযকে  
বিশ্রাম দিয়া পিচকাবি দ্বারা বাদ্য দ্রব্য মলদ্রাবে ওনেশিত  
করান উচিত । পাকশযেব উগতা বেনেডোনা পাষ্টর দ্বারা

নিবাসিত হয় আইয়োডাইড্ অব্ পটাসিয়ম, আইয়োডাইড্ অব্ এমোনিয়ম, বা এমোনি ক্লোরাইড্ ফলপ্রদ

অন্সার অব্ দি ষ্টমাক—পাকাশয়ের ক্ষত ।

সাধারণতঃ পুষ্ক্যাপেক্ষা স্ত্রীলোক এবং ধনী অপেক্ষা দরিদ্র ব্যক্তিদের এই রোগ অধিক হয় যৌবনাবস্থার পূর্বে কদাচিৎ হয় ক্ষত গোল বা ডিম্বাকার পশ্চাৎ প্রদেশ, স্বল্প বক্রদেশ বা অধোগুণ্ঠের নিকট ক্ষত প্রকাশ পায় রক্তস্রাব, বিদারণ বা অবসন্নতা দ্বাবা মৃত্যু হয়

লক্ষণ ।—পাকাশয় প্রদেশে বেদনা, উহা আহাবের পর বৃদ্ধি পায় পৃষ্ঠেও বেদনা থাকে হৃদয়মণীর প্রবল স্পন্দন । অমোদগার, রমন ও নিবমিতা শীর্ণতা যুগ্মতীনের আর্ন্তবাব্ধাব—বিশেষতঃ পাকাশয় হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে ক্ষত ডাবোগ্য হইতে থাকিলে বেদনা হ্রাস প্রাপ্ত হয় বিদারণ (পারফোবেসন) সংঘটিত হইলে প্রচণ্ড বেদনা—সমস্ত উদরে প্রসাবিত হইয়া পড়ে । উদবাধান, সাতিশয় উৎকর্ষা, ক্ষত বর্ধিত অবসন্নতা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বেদনাবিহীন হিমান্ন প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যু হয়

চিকিৎসা ।—ক্ষত শুষ্ককরণ ও দৈহিক পোষণ যাহাতে উন্নতরূপে সম্পাদিত হয়, তৎপ্রচেষ্টা করা উচিত পাকাশয়কে বিশ্রাম দিয়া পুষ্টিকর খাদ্য দ্রব্য মজ্জারবে পিচকবি দিবে খুব জল যাত্রায ওপিয়ম, মর্ফিয়া, কোডিইন বা কোকেইন সেবন চরিতে দিলে বিশেষ উপকার হয় রোগীকে শয্যায়া শয়ন করাইয়া রাখিবে আহাবার্থে কঠিন দ্রব্য দিবে না ; কেবল দুগ্ধ, চুণেব



জল বা সোডা ওয়াটার সহ উপকারী ইহাও অল্প মাত্রায় ঘন ঘন দেওয়া আবশ্যিক ঔষধেব মধ্যে বোরিক এসিড ও বিসমথ একত্রে হিতকর লাইকর এট্রিনি অর্ধ মিনিম মাত্রায় সেবনে বেদনা ও ষমন উপশমিত হয় বাইক্রমেট অব্ পটাশিয়ম বেদনাব আতিশয্যে ফোমেণ্টেশন, সিনাপিজম্, টর্পেন্টাইন ষ্টিপ্ অত্যন্ত ষমন ও বক্ত্রাব হইলে শৈত্য অর্থাৎ ববফাদি পাকশয়োপরিস্থানিক প্রযোজ্য ওপিয়ম বা উহাৰ সঙ্গে হেনবেন্, ইণ্ডিয়ান হেম্প । বিসমথ ১০ গ্রেণ, কম্পাউণ্ড কাইনে পাউডর ৫ গ্রেণ, দিনে তিন বার । উদবাধান সহ বিবমিষা থাকিলে আইয়োডাইড্ অব্ পটাশিয়ম, বাইকার্বনেট্ অব্ পটাশ ও ইনফি ক্যালক্স একোয়া লবোসিবেসাই ৫ মিনিম, ববফ মিশ্রিত জল অর্ধ আউন্স অথবা এফারভেসিং ড্রাফ্ট ; স্তাম্পেন্ বা সোডাওয়াটার দ্বারা ষমন ও বিবমিষা নিবারিত হয় । বেদনা ও বিবমিষা অল্প থাকিলে মৃদু লৌহঘটিত ঔষধ ১৭৯, ১৮০, ১৮২ । রোগী সহকৰিতে পাবিলে কুইনাইন ও আয়রণ ১৭২, ১৭৪, ২০১, ২০৮ । বিরেচক আবশ্যক হইলে অল্প মাত্রায় ক্যাষ্টর অয়েল ও এনিমা দিবে । লঘুপাক পথ্য অর্থাৎ দুগ্ধ, চুণেব জল, স্ন্যাবাকট, যবেব মণ্ড ইত্যাদি দিবে । ক্রমশঃ উহা সহ হইলে অগ্ন্যাগ্নি খাদ্য দ্রব্য বিশেষ বিবেচনা ও সাবধানতাব সহিত দেওয়া কর্তব্য চা, কফি, অসিদ্ধ ফল, চিনি, উদ্ভিজ্জ পদার্থ, বিয়ার ও ব্রাণ্ডি আদি নিষিদ্ধ । বিশেষ আবশ্যক হইলে অল্প মাত্রায় ব্রাণ্ডি জলেব সহিত মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পাবে পাকশয় ছিদ্রীভূত হওয়াব উপক্রম হইলে ওপিয়ম সেবন করাইবে ও বোণীকে কিছুই সেবন করিতে দিবে না



### ক্যান্সার অব ফটমাক ।

সাধারণতঃ পাকানশযেব অধোগুথ, উর্দ্ধগুথ ও স্বল্প বক্রদেশে উৎপন্ন হয় অতঃ স্থানে এই বোগ না জন্মিয়া কেবল পাকানশযে জন্মিতে পারে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষদেব অধিক হয় ৫০ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে কদাচ হয় বোগলক্ষণ আবস্ত হইবার দুই বৎসরের অধিক প্রায়ই বোগী জীবিত থাকে না

লক্ষণ — পাকানশযদেশে জালাযুক্ত, ছুবিকাবেধৎ বা চর্কণ-কর বেদনা, উহা চাপিলে ও আহায়াস্তে বর্দ্ধিত হয় উদর-প্রাচীর কুঞ্চিত, পুতিগদযুক্ত বায়ু উদ্গাব বিবমিষা, সতত খাদ্য দ্রব্য এবং শ্লেষ্মা বমন, সবক্ত বমন কোষ্ঠবদ্ধ, দৌর্বলা, শীর্ণতা । যখন হৃৎধমনীর উপর কর্কটাকর্ষদ স্থিতি করে, তখন অর্কদুন্দস্পন্দনশীল হয় পাকানশয বিদীর্ণ হইয়া তন্মধ্যস্থ দ্রব্যাদি অন্ত্র-চ্ছদে প্রবিষ্ট হয় অথবা বহির্দিকে বা অন্ত্রান্ত্র দিকে এই বিদাবণ সংঘটিত হইতে পারে ।

চিকিৎসা — এই বোগ আনোণা হয় না, তবে যন্ত্রণাদি নিবারণার্থ ঔষধ ব্যবহান করা উচিত । ওপিয়ম সেবন, মলদ্বারে পিচকারি দেওয়া ও সবকিউটিনিয়স ইনজেক্সন্ । অত্যন্ত বমন হইতে থাকিলে মলদ্বারে খাদ্য দ্রব্যের পিচকারি দিবে পাকানশযে সহ্য হইলে দুগ্ধ ও ডিম্ব দেওয়া যাইতে পারে পেপসিন্ ও কডলিন্ডব অয়েল দ্বারা অনেক সময় উপকার হয় দুর্গন্ধ উদ্গাব উঠিলে ক্রিমোজোট বা চাব্‌কোল বিস্কুট সেবা এক-ষ্ট্রাক্ট বেনেডোনা বা টিংচর ওপিয়ম উষ্য করিয়া উহাতে লিণ্ট ভিজাইয়া পাকানশযপ্রদেশে সংস্থাপন করিলে বোগী আরাম বোধ করে । মর্ফিয়ার অধস্তাচ ওফেপও দেওয়া যায় একখানি ক্ষুদ্র

ব্লিষ্টাব দিয়া পবে তাহাব ক্ষত মৰিয়া দ্বাৰা ড্ৰেন কৰিবে ক্লোৰেট অব্ সোডা উপকাৰী অম্ল ও অভিষব (ইথেষ্ট) যুক্ত বসনে ক্ৰিয়োজোট, হাইপো সল্ফাইট অব্ সোডা, কাৰ্বলিক এসিড্, ইউ-ক্যালিপটাই অয়েল ।

### কাৰ্ডিয়ালজিয়া—বুকজ্বালা ।

পাকানয় ও অন্নবহনলীতে অতৃপ্তিকৰ জ্বালাবোধ, থাকিয়া থাকিয়া প্রকুপ্ত হয় । অজীৰ্ণেব একটী সাধাবণ লক্ষণ

চিকিৎসা ।—এমোনি কাৰ্ব—৪, ৯, ১১, ১৫, ১৮৩ ।  
এমোনি ক্লোরাইড্, স্পিঃ এমন য়াবোমেটীক ২, ১০, ৩৯৫  
য়ামিগ্‌ডেলি ৩২৬ ; লাইকব ক্যাল্‌সিন্ ৩৯৭ সন্ধস লিমনিম  
হাইড্ৰোসিয়ানিক এসিড ৯২, ৯৩, ১৩৭, ২৭০, ৩৯৬ ম্যাগ্-  
নিসিয়া কাৰ্ব ৩৫৪, ৩৯৩ নাইট্ৰিক্ এসিড্ ডিল ১৬৯ ফস্ফ-  
বিক এসিড্ ডিল ২৯৫ অগ্ৰাণ্ণ কাৰ ড্ৰব্যো উপকাৰ না হইনে  
বিসমথ ; লাইকৰ পটাশ ১৮৭, ৩৯৭ ; সোডি বাইকাৰ্ব ২৯০  
৩৯৪, ৩৯৬ স্ফাৰ্কেবেটেড্ সলিউশন্ অব্ লাইম এমোনিয়া  
সাইটেট অব্ আয়বণ, পেপ্সিন্

### হিমাৰ্টিমিসিন্—বক্তবমন ।

পাকানয় হইতে বক্তবমন, তৰুণ ও প্রাচীন দ্বিবিধ আকাৰে সমুপস্থিত হয় । প্রাচীন বোগ প্রায়ই সাংঘাতিক হয়, ক বণ ইহা উদব গহ্বৰস্থ অন্তঃকোষ্ঠেব গীড়া-পৰিচায়ক

লক্ষণ ।—অধিক পৰিমাণে বক্তবমন হয় । বক্ত সফেম

হয় না, বস্ত্র কৃষ্ণবর্ণ ও আহাৰ্য্য দ্রব্য মিশ্রিত বস্ত্র ভেদ সাধা-  
বণ পাকায় বা ক্ষুদ্রাঙ্গেব প্রথমান্তের অস্বস্থতা জনিত লক্ষ-  
ণাদি হৃৎ বা সাংঘাতিক ক্ষত, রক্ত কঠিন, ধমন্তকর্কশ ইত্যাদি

চিকিৎসা।—কোন কঠিন দ্রব্য সেবন করিবে না  
আহাৰ্য্য কেবল জলীয় দ্রব্য, শীতল ও অল্প মিশ্রিত পানীয়,  
বরফ, মাংসেব যুগ, হৃৎগেবিধান বা বৌর্জো দেশীয় সংকোচক  
মদ্য সেব্য বোগী শয়ন করিয়া থাকিবে বোগী অত্যন্ত  
তুর্কল হইয়া পড়িলে বিফ্টিব পিচকাবি, তৎসঙ্গে পোর্ট, ব্রাণ্ডি,  
টিংচব ওপিয়ম দিবে ঔষধার্থ গ্যালিক এসিড ও ম্যাবোমেটিক  
সল্ফিউবিক এসিড্ ২১৮, ২৩১ অয়েল টর্পেণ্টাইন ২১৭  
এসিটেট্ অব্ লেড্ ও ওপিয়ম ২২৫ একজন বোগীকে লাই-  
কব ফেবি পাবক্লোবাইড্ ১ ড্রাম জল সহ সেবন করানতে আবোগা  
হয় পাকায় পোদেণে শৈত্য প্রয়োগ হেজিলিন বা হামা-  
মেগিস সেবন উপকারী বোগ পুবাওন হইলে সল্ফিউবিক্  
এসিড্ ডিল্ ও ডিকক্সন্ বার্ক ১৭০। কুইনাইন ও আয়রণ  
১৭৬, ১৭৭, ১৯৩, ১৯৪ ক্রিম, কাঁচা ডিম্ব, এসেন্স অব্ চিকেন,  
বিবিধ মাংসেব যুগ ও কডলিওর অয়েল বস্ত্রভেদ হইলে যদি  
পাকায় কেবল কোন পীড়া না থাকে, তবে জেলাপ বা পডফাইলিন  
দ্বারা বিবেচন বরান কর্তব্য তৎপবে সল্ফিউবিক এসিড্  
ডিল্ ও ডিকক্সন্ সিন্ফোনা ১৭০ অনেক সময় পাকায়ের  
ক্ষত জন্ত উৎপন্ন হয়। বোগীকে স্থির ভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে  
উপদেশ দিবে আহাৰ বস্ত্র করিয়া পাকায়কে বিশ্রাম দিবে।  
বরফ খণ্ড চুষিতে দেওয়া ও পাকায়োপরি স্থানিক প্রয়োগ করা  
উচিত। খাদ্য দ্রব্য ও উত্তেজক ঔষধ মনদ্বাবে পিচকাবিকপে প্রয়োগ



কবিবে ওপিয়ম ও মর্ফিয়া এনিমা ও হাইপোডার্মিক মিরিঞ্জকপে  
প্রয়োজ্য আর্গটিনের অধস্তাচ গ্রফেপ

## ডাইলেটেশন অব্ দি স্টমাক—

### পাকাশয়ের প্রসারণ

পাকাশয়েব অধোগুথেব কোন পীড়া বশতঃ ক্ষুদ্রাজ্জৈ ভুক্ত  
দ্রব্য যাওয়াব ব্যাঘাত জন্মে তদ্ব্তে পাকাশয় প্রসারিত হইয়া  
পড়ে অধোগুথেব সংকোচন বশতঃ প্রসারণ সংঘটিত হয়।

লক্ষণ ।—পাকাশয়ে খাল, বুকজ্বালা, মুখ দিয়া জল উঠা,  
উদবাত্তান, কোষ্ঠবদ্ধ ও সময় সময় বমনাক্রমণ। ক্ষুধা অপরিমিত  
হইতে পারে। বমন হইলে অধিক পরিমাণে ভুক্ত দ্রব্য নিঃসৃত  
এবং উহা অম্লাক্ত হয় অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে উহাতে সার্সিনী  
ভেন্ট্রিকিউলী নামক কীটাণু দৃষ্ট হয় পাকাশয়ে অধিকক্ষণ  
পর্যন্ত ভুক্ত দ্রব্য থাকা বশতঃ উক্ত উদ্ভিজ্জ কীটাণুর উৎপত্তি  
হইয়া থাকে

চিকিৎসা ।—এই রোগে অত্যন্ত বমন হইয়া থাকে, সেই  
বমন প্রধানতঃ এক প্রকার উদ্ভিদ কীটাণুজনিত হইয়া থাকে  
ইহা নিবারণার্থ সলফাইট অব্ পটাশ, সলফাইট অব্ সোডা  
হাইপো সলফাইট অব্ সোডা ৫—২০ গ্রে° দিনে তিনবার পথ্য  
বাতিমত দিবে।

## এন্টবাইটিস—অন্ত্রপ্রদাহ।

ক্ষুদ্রাজ্জের প্রদাহেব প্রবলতার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। অস্ত্রের  
সমস্ত পর্দা বা কোন একটা পর্দা ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে।  
সাধারণতঃ শ্লেষ্মিক পর্দাই আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ।—নীত, চর্ম উষ্ণ, ত্বগা 'কঠিন ও দ্রুত  
নাড়ী; উদবে বিশেষতঃ নাভির চতুর্দিশে বেদনা, চাপিলে  
বর্ধিত হয় বমন ও বিবমিষা রোগী টিং হইয়া শয়ন  
করিয়া থাকে, তাহাতে উদব প্রাচীরস্থ পেশী সকল নিখিল  
হয় অত্যন্ত অস্থিভা, প্রবল জ্বর, অবসন্নতা, মুখাকৃতি উৎ-  
কর্ষাব্যগ্রক। অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ, প্রলাপ। তাবৎ বা অস্পষ্ট  
নাড়ী বমিত দ্রব্য সাত্বিক দুর্গন্ধবিশিষ্ট। সময় সময় মল-  
বমন হয়।

চিকিৎসা।—অহিফেন এই বোগের অত্যাধিকৃত ঔষধ।  
অহিফেন ও বেলেডোনা ১০১ উদব প্রদেশে উষ্ণ জলের  
ও তাপিলে স্বৈদ অথবা লিনসিড পুলটীস। শয্যাতে নিশ্চিন্ত  
ভাবে শয়ন করিয়া থাকা কর্তব্য বিরেকক ঔষধ আদৌ  
ব্যবহার করিবে ন। অল্পে যদি মল আবদ্ধ থাকে, তবে  
ঈষদুষ্ণ জলের পীচকারি দ্বারা তাহা নিঃসরণ করাইবে। প্রদাহ  
উপশান্ত হইলে মৃদু বিরেকক ব্যবহার্য। তৎপরে ইনফিঃ ক্যাস্-  
কেবিলা; টিংচর বার্ক প্রভৃতি উত্তীর্ণ বলকারক প্রযোজ্য  
গুণগান্য ধাতুপ্রকৃতিক লোকদিগের সঙ্গে কড়লিতর অয়েল;  
মিসিরিণ; টিং অব পীল বা সিবপ ফেবি আইয়োডাইড লঘু-  
পাক দ্রব্য পথ্যার্থ দিবে, সিদ্ধপানীয়, বরফ, নীতল জল, মাংসেব  
যুষ, দুগ্ধ ইত্যাদি। অবসন্নতার লক্ষণ প্রোদ্বর্তিত হইলে উত্তে-  
জক ঔষধ। বালকদিগের এই প্রকার বোগে ওপিয়াম বিশেষ  
সাবধানে ব্যবহার করা কর্তব্য। ঈষদুষ্ণ জলে স্নান, উষ্ণজল  
স্নেদ, লিনসিড পুলটীস; ক্রোবেট অব পটাশ ও জল বা চাব  
কাণ্টের সঙ্গে সংকোচক ঔষধ আবশ্যক হইলে টিংচর কাইনো,

টিংচব কটো বা 'ডিককমন লগ্‌উড' দিবে ছাগছক ও মাতৃ-  
স্তনছক পান কবাইবে কখন কখন মাংসেব পাতল ঝোল  
দেওয়া যায় অত্যন্ত দৌর্বল্য থাকিলে ছক, ম্যারারট প্রভৃতিব  
সহিত ঐতি ১০—৩০ মিনিম ম'ত্র' দিবে তন্ম ম'ত্র'য়  
লডেনম, স্পিরিট ক্রোবোফর্ম বা ইথর ও ডিল ওয়াটার একত্রে  
মিশ্রিত কবিয়া ব্যবহার্য্য। মর্টার পাষ্টব, ব্লিষ্টাব; অহিফেন বা  
বেলেডোনা এ প্রতিও স্থানিক ব্যবহার্য্য

### ইনফ্রামেশন অব্ সিকম—অন্ধার প্রদাহ ।

অন্ধার প্রদাহ কঠিন আবদ্ধ মল বা ফলেব বীজ বা  
খোসা অথবা পিত্ত বা অন্ত্রশিলা অথবা কুশি আদি আবদ্ধ  
থাকায় সমুপস্থিত হয়

লক্ষণ ।—তরুণ প্রকৃতি—জ্বর, বিবক্ষিষ', কে'ষ্ঠবদ্ধ,  
দক্ষিণ কুক্ষিদেগে বেদনা ও পূর্ণতাবোধ । চাপে বেদনা অত্যন্ত  
বর্দ্ধিত হয় রোগী দক্ষিণ দিকে শয়ন করে ও জানুদয় উন্নত  
বাখে, কাবণ তদ্রূপভাবে থাকিলে বেদনাবিশিষ্ট তন্তু সমূহ শিথিল  
থাকে । অন্ত্রচ্ছদ প্রদাহিত হইলে উহার সার্ভাস্টিক লক্ষণাদি  
প্রকাশিত হয় ফোটক ও পুষ জন্মিতে পাবে । ভর্মিফর্ম  
এপেন্ডিক্স প্রদাহিত হইলে অত্যন্ত বাৎনাদায়ক শূন উদবাগ্মান,  
হিক, প্রচণ্ড বমন অন্ত্রাববোধ এবং বেদনা দক্ষিণ ডিম্ব  
কোষ বা অণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও উরুদেশেব অত্যন্তব দিকেও  
প্রসাৰিত হইয়া পড়ে পচন বা অন্ত্রচ্ছদ প্রদাহ বশতঃ মৃত্যু  
হয় অন্ত্রেব কতক অংশ পচিয়া পড়িয়া গিয়াও বাঁচিতে  
পারে



প্রাচীন প্রদাহে—লক্ষণাদি ক্রমশঃ ও অস্পষ্টভাবে প্রকাশ  
পায় স্বাস্থ্যহানি, দুর্বলতা, শীর্ণতা । দক্ষিণ কুক্ষিতে শূল,  
উদবাগান, ক্ষুভাভাব পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদবাসম।  
শৈল্পিক পর্দায় ক্ষত হইলে শ্লেষ্মাস্রাব ও বক্ত্রাস্রাব অবসন্নতা  
দ্বারা প্রায় মৃত্যু সংঘটিত হয়

চিকিৎসা ।—বিবেচক ব্যবহার নিষিদ্ধ কারণ  
ইহাতে অপকার ভিন্ন উপকার হয় না বেদনা নিবারণ  
দ্রব্য জলে গুলিয়া, সেই জল উষ্ণ করিয়া তদ্বারা সেক ; পুল-  
টিস অহিফেন আভ্যন্তরিক সেবনার্থ দিবে বোগীব বেদনা-  
দির উপশমার্থ ইহা পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করা যাইতে পারে । উষ্ণ  
জলের দ্বারা কটি স্নান দিলে অনেক উপকার হয় । বিবিধাদি  
নিবারণার্থ সোডা এসিড, সোডা ওয়াটার বা লিমনেড ; বিসমথ ;  
হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ড্রিং, লবেল ওয়াটার ও বরফ দিবে ।  
যদি বিবেচন করান বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়, তবে  
ক্যাষ্টর অয়েলেব পীচকারি দিবে । বোগীকে শয্যায় রাখিবে ।  
পথ্যার্থ কেবল তরল পদার্থ দিবে । পুষোৎপত্তি বা অবসন্নতা  
উপস্থিত হইলে দুগ্ধ, ডিম্ব, মাংসের যুষ, বার্ক, ব্রাণ্ডি বা পোর্ট ।  
প্রাচীন বোগে সহজ ও লঘু পথ্য ; কডলিভ অয়েল, কুই-  
নাইন ও চিনারেল এসিড্‌স, আইওডাইড অব্‌ এমোনিয়ম ও  
বার্ক দিবে স্থানিক প্রয়োগার্থ বেদনানিবারণ ঔষধ

### ডিসেন্ট্রী—রক্তামাশয় ।

বৃহৎ স্ফুল্লেখের শৈল্পিক বিলীল প্রদাহ ও ক্ষত—তৎসঙ্গে  
জ্বর, প্রবল বেদনা ( কামড়ান ), আম ও রক্তমিশ্রিত মল

নিঃসরণ                      অবসন্নতা । শৈল্পিক বিলী বাতীত অগ্রাণু  
 পর্দাও                      তে পারে সাধারণতঃ বৃহৎ শূলান্ত্রেব  
 ( কোলন                      ংশ ও সবলান্ন প্রদাহিত হয় । শৈত্য,  
 আর্দ্রতা,                      ংক্রমণ, দু্যিও জল ও অপবিমিততা প্রভৃতি  
 কারণে এ                      ত পাবে ।

লক্ষণ ।—৩য় বোগে উদরে বেদনা ও অসুখ বোধ ।  
 পেট কামডায় ও শূলায়, তদ্বৎ বন ঘন মলত্যাগ কবিত্তে  
 বোগী বাধ্য হয় । ক্ষত আবন্ত হইবার সময় হইতে সতত  
 মলত্যাগ কবিত্তে ইচ্ছা হয় মলত্যাগের পর রোগী ক্ষণ-  
 কাল আরাম বোধ কবে সমুৎসর্গ স্বপ্ন, পাতলা এবং আম ও  
 বক্ত মিশ্রিত, কখন কখন উহাব সঙ্গে গুটলে বাহিব হয় ।  
 এই অন্ন মলত্যাগ ক'লে সমূহ য'তন' হয় সময় সময় কেবল  
 পেট কামডায়, শূলায় ও কোতানি হয় অথচ মল নিঃসৃত হয়  
 না মল অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ, তৎসহ বক্ত, আম ও পূষাদি  
 বিমিশ্রিত থাকে সতত মূত্রত্যাগ, মূত্র লালবর্ণ কখন কখন  
 মূত্রত্যাগ কালে জ্বালা ও যাতনা সমুপস্থিত হয় । সার্বাঙ্গিক  
 অসুস্থতা ও অবসন্নতা ইহা অন্ন বিদাবণ বা অন্নচ্ছদ প্রদাহে  
 পবিণত হইতে পাবে । অথবা ফোটক বা শূষাক রক্তপীড়া  
 জনে । ক্ষত আনোগ্যেব পব অন্ত্রেব সংকোচন বশতঃ কোষ্ঠ-  
 বদ্ধ হয় ।

প্রাচীন রোগ ।—হৃদয় শৈল্পিক বিলী বা শীর্ণতা ও  
 গ্রন্থিব অপকৃষ্টতা বা ক্ষত অসম্পূর্ণ ভাবে আরোগ্য হইয়া  
 থাকে । অনেক বোগী আবোগ্য হয়, আবার কোন কোন  
 বোগী ক্রমশঃ জীর্ণ শীর্ণ ও বোগ এক দিন হাস, এক দিন বৃদ্ধি



এবং উহাৰ চৰ্ম্ম শুষ্ক ও সশক্‌ হয় মলসহ দুৰ্গন্ধ পূৰ্ণ ও বক্ত্‌ মিশ্ৰিত থাকে অবসন্নতা ও যন্ত্ৰাদি এত অধিক হয় যে, সময় সময় মৃত্যু বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়ে

চিকিৎসা।—অধিক বক্ত্ৰজাবে হায়ামিলিস টিংচর ১ বা ২ মিনিম মাত্ৰায় ব্যবহার্য্য বাই ক্লোবাইড অব্‌ মার্করী ১০ গ্ৰেণ এক বা দুই ঘণ্টান্তৰ ব্যবহার কবিলে তৰুণ ও প্রাচীন উভয়বিধ রোগেই উপকাৰ দৰ্শে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত গৃহে বোগীব শয়ন করিয়া থাকা কৰ্ত্তব্য । শিথ্পানীয়, ববক, দুগ্ধ, পাঁচলা যুয, অন্নমণ্ড, চুণেব জল, বেলেব সববৎ প্রভৃতি দিবে উষ্ণ জলে স্নান, উদরে উষ্ণজল সেক ; তার্গিন তৈল মর্দন, উষ্ণ উষ্ণ পুলটীশ অথবা ওয়েট কম্প্ৰেস অত্র মধ্যে গুটিক' থাকা অনুমিত হইলে ক্যাপ্টর অয়েল অথবা সলফেট অব্‌ ম্যাগনিসিয়া ১ ড্রাম ও টিংচব অব্‌ হায়সায়ামাস ১৫—২০ মিনিম মাত্ৰায় ৩৪ ঘণ্টান্তৰ ; ৭১৬ ডোৰ্স পাউডব সেবনীয় অল্প পবিকৃত হইলে ইপিক্যাক প্রয়োগ কবিলে । ইহা অপেক্ষা এই বোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ আব নাই এই ঔষধ ৫ ১০। ১৫ বা ২০ গ্ৰেণ মাত্ৰায় দিবে ; ঔষধ সেবনের পূৰ্বে পাকায়োপরি ব্ৰেড্‌ ও জ্বয়দুগ্ধ লিন্সিড পুলটীস ও এক মাত্ৰা ওপিয়ম সেবন কবিতো বা মর্ফিয়ার সপো-জিটাবী বা হাইপোডমিক ইন্‌জেক্‌সন দিবে তাহাব ২৩ ঘণ্টা পূৰ্বে বা পবে কোন পকাব তবজ পদার্থ পান নিষিদ্ধ এক আশ্রয় উপকাৰ না হইলে ৬, ১২ বা ২৪ ঘণ্টাল পব আব এক মাত্ৰা দিবে কেহ কেহ উক্ত ঔষধেব সঙ্গে বিসমথ ৫ গ্ৰেণ ও মর্ফিয়া ৬ গ্ৰেণ দেন কেহ কেহ আবার ইপিক্যাক মূলেব কাথ সেবনের বিধান কবেন । ইপিক্যাকেব বীৰ্য্য এমি-

টীন্ ব্যবহারেও সময় সময় উপকার হয় যখন প্রদাহ অত্যন্ত বর্ধিত হওয়া প্রযুক্ত অত্রের বিধানবিকৃতি সমুৎপাদিত হয়, তখন শারীরিক শক্তি বক্ষার্থ ও বিকৃত বিধান স্থিতিভাবে রাখিতে চেষ্টা করিবে তজ্জন্ত ইপিক্যাক ব্যবহারের পর বলকারক ও সংকোচক ঔষধ ও অহিফেন ব্যবহার্য। ম্যালিসিন, কুইনাইন, বার্ক; ক্যাসকারিলা ও লৌহের মৃদু মৃদু প্রয়োগরূপ মন অধিক সবল ও ফেণযুক্ত থাকিলে বিসমথ, গ্যালিক এসিড; কাইনো; লগউড, আয়বন গ্যালম বা সলফেট অব্ কপার অহিফেন সেবন ব্যতীত মলদ্বাবে উহার বর্ধি বা পীচকাষি প্রয়োগ করিবে তেজবর্দ্ধক মাংসেব যুগ, সুপক ড্রাক্সা, কাঁচা ডিম্ব ও পোর্টোদি মদ্য। শীতাদ বোগেব কোন লক্ষণ থাকিলে লেবুর রস ইপিক্যাক অল্প মাত্রায় ঘন ঘন প্রয়োগ করিলেও উপকার হয়। টিংচর কটো স্বতন্ত্র বা লাইকো হাইড্রাজ্জ পারক্লো-নাইড সহ প্রয়োগে অনেক সময় বিশেষ উপকার পাওয়া যায় বোগেব তবৎ অবস্থায় টিং একোনাইট ১ মিনিম মাত্রায় ৩ ও ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিলে জ্বর, বেদনা ও শূলুনি নিবারিত হয়।

রোগ পূর্বাভাবকার ধারণ করিলে স্থান পরিবর্তন করিবে বেলের বিবিধ প্রয়োগরূপ সেব্য বেলপোড়া ও ইগুগুড়, বেলের সবদং, লিকুইড একট্রাক্ট অব্ বেল। অষ্ট্রালিয় দেশস্থ লালবর্ণ গঁদ ইহার সঙ্গে দিলে সমধিক উপকার লক্ষ হয় হাইড্রোক্লোবেট অব্ মর্ফিয়া, স্পিবিট এমল ম্যাবোমেটিক ও নাইট্রস ইথর একত্রে মিশ্র প্রস্তুত করিয়া দিবে এসিটেট অব্ লেড ও ওপিয়ম বটিকা ২২৫। সলফেট অব্ কপার ও ওপিয়ম ২৩০ গ্যালিক এসিড ২১৮, ২২১, ২২৬, ২২৭, ২৩৩

বিসমথ ২২৪, ২৩৪, ২৩৫ টিং ষ্টীল, বিডিউসড্ জায়রন,  
পেপ্সিন, কডলিওর অয়েল শূল ও কোতানি নিবাবণার্থ  
মলদ্বাবে অহিফেনেব পিচকারি ইয়ং গুলের ফাণ্ট, দাড়িমের  
ত্বকেব কাথ, মাজুফল, আকন্দমূল কুটজেব ছানের কাথ শুদ্ধ  
বা টিংচব ওপিয়মের সঙ্গে বালকেব জন্তু আকেবেটেড সলিউ-  
শন অব্ বাইম দাবচিনির কাথ সেবনে উপকাব হয়।  
বোবিক এসিড, কার্বলিক এসিড, অয়েল ইউক্যালিপ্টাই, গ্রাপ্-  
থালিন, ক্রিয়োজোট প্রভৃতি আভ্যন্তরিক ও মলদ্বারে পিচকারি

### ডায়ারিয়া ।

জন্মের এক প্রকার গাঢ়ল অবস্থা, তদন্তু মত পাতলা মল  
নিঃসৃত হয়, কিন্তু তৎসঙ্গে প্রায় কোন প্রকাব প্রদাহ বর্তমান  
থাকে না, কিন্তু উগ্রতা থাকে ।

লক্ষণ ।—ভেদ, বিবমিধা, জিহ্বা মলারূত, শ্বাস দুর্গন্ধ,  
উদরাগ্নান, মোচড়ান বেদনা অল্প উদ্গাব। কোতানি, দুর্গন্ধ  
গল—উহা ওবল বা সফেন। কেবল পিও ভেদ হইতে পারে।  
আম গিশিত মল অজীর্ণেব লক্ষণাদি থাকিতে পারে

চিকিৎসা ।—ইহা বিবিধ পীড়ার লক্ষণরূপে প্রকাশিত  
হয় বোগেব কাবণ জানিতে পারিলে তাহার প্রতিবিধানের  
চেষ্টা কর' সর্ব্বশ্রে কৰ্ত্তব্য। অত্রে অধিক তন্ন সন্ধিত হওয়া বশতঃ  
বোগ হইলে বাই কার্বনেট অব্ পটাশ ও সোডা বা ম্যাগ্নিসিয়া।  
জাইকর জার্মিনিকেলিস ১ ঘোটা মাণায় প্রাচীন উদরাময়ে।  
ক্যামোগাইল ইনফিউজন সেবনে বালকদেব দন্তোদ্ভেদ কালীন  
উদরাময় ও পূর্ণবয়স্কদেব গ্রীষ্মকালীন উদরাময় নিবাবিত হয়।

প্রাচীন বোগে পরিপাক ক্রিয়া দুর্বল হইলে ক্লোরাইড অব্ ক্যালসিয়াম। বালকদের বোগে গ্রে পাউডর ৬ গ্রেণ পূর্ণবয়স্ক-দের বোগে কবোমির সল্লিমেট এক গেলের মত ডাগের এক ভাগ। প্রাচীন বোগে ফস্ফেট অব্ লাইম নাইট্রিক এসিড ও টিং নক্সভমিকা গ্রীষ্মকালীন ভেদ বসনে ভিবেট্রম ভিরিডেব টিংচর খুব অল্প মাত্রায়। বেজিন অব্ পডোফিলিন ১ গ্রেণ, স্পিরিট ২ ড্রাম একত্রে দ্রব করিয়া তাহাব ২৩ মিনিম মাত্রায় দিনে ৩৪ বার ব্যবহারে প্রাচীন উদবাময় উপশমিত হয়। বালকদের উদবাময়ে অব্ সাইড অব্ জিঙ্ক ২ গ্রেণ মাত্রায় ৩ ঘণ্টান্তর। বালকদের সরঞ্জ মল নিঃসরণে ভাইনম ইপিক্যাক ১ ফোঁটা মাত্রায় প্রয়োগে উপকার দর্শে পিপারমেন্ট অয়েল ব্রাণ্ডি সহ প্রয়োগে অন্তের বেদনা ও উদবাময় উপশমিত হয়। উদবাময় বোগে বিশেষ বিবেচনা সহকারে সংকোচক ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত গ্রীষ্মকালীন উদবাময়ে স্পিবিট ক্যাম্ফর। অজ্ঞাতান্তরে উগ্র পদার্থ থাকা বশতঃ ভেদ হইতে থাকিলে ৫১০ গ্রেণ বিউবার্ক চূর্ণ বা ২ ড্রাম টিংচর বিউবার্ক বা অর্ধ জাউন্স ক্যাপ্টর অয়েল, কয়েক ফোঁটা লিকুইড একষ্ট্রাক্ট অব্ ওপিয়ম সহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। যদি অগ্রে উগ্র মলাদি না থাকে, তবে ইথর ও ওপিয়ম ১৩১, ১৩৪। ক্যালোমেল ও ওপিয়ম ৪১৪, ৪১৬। চকমিক\*চর ২১৪। সল্ফিউরিক এসিড ও ওপিয়ম। ট্যান্টিক এসিড—২১৬, ২২১, বিসমথ ও সিনকোনা ২২৪; বিসমথ ও ইপিক্যাক ২৩৪, ২৩৫। ম্যাবোমেটীক চকু পাউডর ২৩২; কপার ও ওপিয়ম ২৩০; লোড ও ওপিয়ম ২২৫, ২২৮। গ্যালিক এসিড ২২৭, ২৩৩। সল্ফিউরিক এসিড



ডিল ও সিরপ অব্ প্যাপেভেরিস ২১২ ; কোন কোন রোগীর  
অল্প ঈষৎ জলের পিচকারি দ্বারা ধোত কবিলে উপকার হয় ।  
উও পিচকারি দেওয়ার পব ওপিয়ম এনিমা বা মপোজিটবী  
১৬৩, ১৬৬ মল পচিয়া বাষ্প উদ্ভূত হওয়া বশতঃ রোগীবোগে  
বিলম্ব হইতে থাকিলে উদ্ভিজ্জাদার বা সোডা সল্ফো কার্বলাস ।  
বালকদিগের পীড়ায় ইপিক্যাক ও খুব অল্প মাত্রায় ওপিয়ম ।  
পূর্ণবয়স্কদিগেরও এই পীড়ার সঙ্গে অল্পে বক্রাধিক্য হইলে ইপি-  
ক্যাক ও ওপিয়ম দিবে । আহারের পক্ষে বিশেষ সাবধান হওয়া  
কর্তব্য । স্নিগ্ধ পানীয়, ট্যাপিয়োকা, মাংসের যুষ, জলমিশ্রিত  
ব্রাণ্ডি উদর প্রদেয় ফ্রান্সেল দ্বারা আবরণ ইষপ্গুলের শীতল  
ফাণ্ট, ক্যাটিকিউ ২৩২ স্ফ্রাক্বেটেড সলিউসন অব্ লাইম ।  
ক্লোবোডাইন, ক্লোরোফর্ম ও মর্ফিয়া ৯৮ বালক ও শিশু-  
দিগের ওপিয়ম ব্যবহার না করা ভাল, বিশেষ প্রয়োজন হইলে  
অতি অল্প মাত্রায় ও সাবধানে প্রয়োগ করা কর্তব্য টিং কটো  
ও হইতে ১৫ মিনিম মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে বিশেষ উপকার হবে ।

### কলিক—অস্ত্রশূল ।

উদবে মোচড়ানবৎ বেদনা বিশেষতঃ নাভির নিকটে অনুভূত  
হয় থাকিয়া থাকিয়া এই বেদনা বৃদ্ধি পায় । চাপিলে বেদনা  
উপশমিত হয়, কিন্তু কখনই বর্দ্ধিত হয় না । সতত বমন, মাধা-  
রণতঃ কোষ্ঠবদ্ধ । প্রদাহ ও জ্বর থাকে না যুগ্মকৃতি উৎকর্ষা  
জ্ঞাপক, শরীর শীতল ও নাভী স্পন্দন মৃদু ভাবাপন্ন । অজীর্ণ  
সহ উদরাধান হইলে এই বেদনা হয় বমন, ভেদ বা উদগার  
বা বায়ু নিঃসরণ হইলে বেদনা উপশমিত হয় । অস্ত্রের উদ্দীপনা—

অন্ত্রে অস্বস্থ্যাব না মল আবদ্ধ থাকিলে হয় । ভয়, নৈত্য,  
হাত, গুল্মবায়ু হইতে বেদনা জন্মে

চিকিৎসা ।—প্রথমে রোগের কাবণ অনুসন্ধান ও বিদূষণ  
চেষ্টা কর্তব্য হাইড্রেট ক্লোবাল । বেনেডোনা । বিবেচক—  
ক্যাষ্টর অয়েল ৩২৯, ৩৩০ ; গ্যাগ্না কার্ব ও ইনফিঃ রিয়াই ৩৩৩ ।  
আবশ্যক হইলে বমনকারক । বেদনা নিবারণ ও বায়ুনাশার্থ স্প্রিঃ  
ইথর ও ওপিয়াই ১৩৫, ১৩৬, ৩৯৩ । বেনেডোনা ও ক্লোরো-  
ফর্ম ৯৫ ; ক্লোরোফর্ম ও মর্ফিয়া ৯৮ ; মর্ফিয়া ও হাইড্রোসিয়ানিক  
এসিড ডিল । অয়েল ক্যাজিপুটী বা মেছ পিপ্ ১২ । স্প্রিঃ  
এমন গ্যাবোমেটিক ১০ , সোডি বাইকার্ব ও মর্ফিয়া ৩৯৬ ;  
ব্রাণ্ডি ও উষ্ণজল । উষ্ণ জলের স্বেদ, তার্পিন তৈল দ্বাৰা স্বেদ,  
মর্টার্ড প্লাষ্টব ; ক্লোরোফর্ম লিনিমেন্ট ১৫৩ । সোপ ও ওপিয়ম  
লিনিমেন্ট ১৪৪ ; ক্লোরোফর্ম ও বেনেডোনা লিনিমেন্ট ১৪৬ ;  
টার্পেন্টাইন এনিমা ৮১, ১৬২, ৩৬০ । উদবাস্থানে সোডা সল্ফ  
কার্ব, টেরিবিन, পিপারমেন্ট অয়েল, ক্যাজিপুট অয়েল ; এনিসিড  
অয়েল ও সোডা ; একাবভেসিং ড্রাপ্ট ; টিংচর অব্ জিজর ;  
টিং নক্স ; স্পিরিট এমোনিয়া গ্যাবোমেটিক ও ক্লোরোফর্ম ও ।  
স্পিরিট ইথর ও ভেলিবিয়ান ১৩৫ । ডিল ও ক্যারাওয়ে ওয়াটব ;  
এসাকেটিডা ; টার্পেন্টাইন , টিংচর কার্ভেগম কং ; টিং ভেলিবিয়ান  
এমোনিয়েটা , ক্যাষ্টর অয়েল ও টার্পেন্টাইন এনিমা ; ক্যাজিঃ  
পুটী অয়েল ও ক্যান্ফর লিনিমেন্ট ; ক্যাজিপুটী অয়েল ও টার্প-  
েন্টাইন ৫২ । স্পিরিট ইথর সল্ফ কম্পাউণ্ড ও উৎকৃষ্ট বেদনা-  
নিবারণক । বেদনার আতিশয্য থাকিলে মর্ফিয়া সহযোগে  
প্রয়োজ্য ।

### কলিকা পিক্টোনম বা লেড কলিক—সীসশূল ।

\*রীবে সীস ধাতু এবিষ্ট হওয়া বশতঃ শূল, বমন ও কোষ্ঠবদ্ধ জনে পিক্টোনে পক্ষাবাত উৎস্থিত হইতে পারে নাতির চতুর্দিকে মোচড়ান বেদনা, পৃষ্ঠে বেদনা উদবেব চর্ম পৃষ্ঠের দিকে কুঞ্চিত হয় । মাড়ীতে নীলিম বেথা

চিকিৎসা ।—রাগাক্রমণকালে ক্যালোমেল ও জেলাপ ; ম্যাগ্না সল্ফ ৩৩১, ৩৩৪ সল্ফেট অব্ ম্যাগনিসিয়া ও সল্ফিউরিক এসিড ১৭৭ সল্ফিউরিক এসিড ১৭০, সল্ফেট অব্ সোডা ৩৩৯, ইথার সঙ্গে সল্ফিউরিক এসিড ক্যাষ্টর অয়েল ; ক্রোটন অয়েল উষ্ণ জলের পিচকাবি, উষ্ণজলে স্নান । বেদনা-নিবারণার্থে মর্ফিয়া, ক্লোবোফর্ম বা ইথর ১৩৪, ১৩৫ বেলোডোনা ও ক্লোবোফর্ম ৯৮ ওপিঃম ও বেডোডোনা ১০১ বিবাকালে সীস ধাতু \*বীব হইতে বহিস্কৃত কবিষাব জন্ত আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম ৩৯৯, ৪০১ । সল্ফর বাথ । সল্ফেট ও কার্বনেট অব্ ম্যাগনিসিয়া ৩৩১ ।

প্রতিষেধক ।—সল্ফিউরিক এসিড, ম্যানম ইত্যাদি ।

### কনস্টিপেসন্—কোষ্ঠবদ্ধ ।

এই বোগ স্বঘট্ট বা বিবিধ তরুণ ও প্রাচীন পীড়ার সময় উৎপন্ন হইতে পারে অধিক দিন পর্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ থাকিল তাহাকে অভ্যস্ত ( ছাবিচুয়েল ) কোষ্ঠবদ্ধ বলে ।

লক্ষণ ।—পীকাশয়, যকৃৎ ও ক্লময়ন্ত্রের ক্রিয়া অসম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয় মানসিক ও শাবীবিক ক্লেশবোধ মুখমণ্ডল



ঈষৎ পীতবর্ণ, চর্ম শুষ্ক, মুত্র স্বল্প মল আদৌ নিঃসৃত হয় না অথবা অল্প পরিমাণে হয়। দুর্দগা বোঁগে শ্রমবিমুখতা, শিরোবেদনা, হৃৎস্পন্দন, শ্বাসশূল ও অবসাদ বায়ু

চিকিৎসা।— $\frac{1}{2}$  হইতে  $\frac{1}{4}$  গ্রেন একষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা দিনে ১ বা ২ সেবন করিলে বোঁগ উপশান্ত হয় অথবা এক বা দুই গ্রেন সপোজিটবী কপে মলদ্বাবে দিয়া রাখিলেও উপকার দর্শে ১ গ্রেন ইপিক্যাক চূর্ণ প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে উপকার হয় পডফিলিন বেজিন ১ গ্রেন, স্পিরিট ১ ড্রাম, দ্রব করিয়া উহার ১ বা ২ ফোটা দিনে ২৩ বা ২৪ সেবন করিলে বালকদেব ও ৫—১৫ ফোটা পূর্ণবয়স্কদেব কোষ্ঠবদ্ধ উপশান্ত হয় মলের ক্রমবর্ধতা—এই ঔষধ ব্যবহার-পরিজ্ঞাপক। ইহা ব্যবহার কালে নাইট্রিক এসিড ও নক্সটমিকা ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে য্যালোজ—৩২৭, ৩৩৫, ৩৪০, ৩৪৬ গ্যাথোজ ৩৪৫; টিংচর কলটিকম ১০ মিনিম মাত্রায় দিনে তিনবার। কলসিহু ৩৪১, ৩৪২; ক্যালোমেল—৩৪১, ৩৪৩, ৩৫১; জেলাপ ৩৩৭, ৩৪৪, পল্ড জেলাপ কং; পল্ড লিকরিস কং; ম্যাগ্নিসিয়া সলফাস ৩৩১, ৩৩৪ সলফেট অব্ সোডা ও ট্যারাকসেকম ৩৩৯, অক্সগল; পডফিলিন ৩৪৫; নক্সটমিকা ও পিল রিয়াই কং ৩৪৯; অয়েল টর্পেন্টাইন ও ক্যাস্টর অয়েল ৩৩০, ৩৩৬। বেজিনা স্বাগনী ও কলসিহু ৩৪৪ সলফর ও ম্যাগনা কার্ব ৩৫৪; গ্লিসিট্রিন এনিমা, ক্যাস্টর অয়েল ও টর্পেন্টাইন এনিমা ৩৬০; ক্রোটন অয়েল এনিমা; সলফেট অব্ ম্যাগ্নিসিয়া এনিমা কন্ফেকসন অব্ সেনা ও এসিড টার্ট্রেট অব্ পটাশ ৩৫৭, পল্ড রিয়াই কং, পল্ড স্বাগনী কং। একষ্ট্রাক্ট



ক্যাস্কেবা লিকুইড ৫ হইতে ৩০ গিনিম মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে কোষ্ঠবদ্ধ বিদূরিত হয়। শয়ন কালে ১ ড্রাম জল সহ সেবন করিলে প্রাতে এক বা দুইবার মল নিঃসৃত হয়।

অভ্যস্ত কোষ্ঠবদ্ধ।—বেল, অলিভ অয়েল, ক্যাস্টর অয়েল, রিউবার্ক ও স্যারোমেটিক পাউডর ৩৫০ নক্সডমিকা ও পিল বিয়াই কং ৩৪৯; সলফেট অব্ সোডা ৩৩৯; পেপ-সিন ও স্যালোজ ৪১৭, ষ্টীল এণ্ড স্যালোজ ২০৪, নাইট্রিক এসিড ও ট্যারাকসেকম; সলফেট অব্ ম্যাগ্নিসিয়া ও আয়-স্রণ ১৭৭ সিড্‌লিজ পাউডর ৩৫৩। কুইনাইন ও নক্সডমিকা ১৭৩, ১৯৫ জিঙ্ক, আয়রন ও ষ্টীল ১৭৩, ১৮৮। সলফেট অব্ জিঙ্ক, ১৯৭, তেলিবিয়ানেট অব্ জিঙ্ক ও বেলেডোনা ৪১৮। কডলিভর অয়েল, নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিক এসিড ডিল্ পুষ্টিকর ও সহজ পাচ্য খাদ্য সুপক ফল, প্রাতে বা শয়নকালে মীতল জলপান, ব্যায়াম, অত্যধিক নিদ্রা পরিহার, সহজ ধাবা স্নান, উদবে জলমিত্ত বস্ত্র খণ্ড সংস্থাপন, উদর প্রদেশ হস্ত দ্বারা মর্দন, গ্যাল ভ্যানিজন ক্যাস্কেবা, হাইড্রাস্টিস উপকারী সল্‌ফর ২—১ গ্রো মাত্রায় সোপ সপোজিটরী উষ্ণ জলের গীচকারি

অবষ্ট্রক্সন অব্ দি বাউয়েল্‌স—অন্ত্রাবরোধ।

অন্ত্রাবরোধ বিবিধ কারণে সম্ভূত হয়। ১ম, মধ্যবর্তী কারণ—অন্ত্রপ্রাচীরের শৈল্পিক ও পৈশিক পর্দাতে বোগাদিব উৎপত্তি। ককটিকা, ক্ষত আবোগ্যেব পর সংকোচন, প্রদাহাদি বশতঃ অন্ত্র প্রাচীরেব সংকোচন, এক অন্ত্র অংবাজের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া।

২য়, বাহ্য কাবণ—অস্ত্রের বাহ্য প্রদেণ বা মাস্তক ঝিল্লীতে যে সকল কাবণ উৎপন্ন হয় লসীবাংকবণ বণতঃ সংযোগ, স্থানচ্যুতি বা মোচড়ান, অর্কুদ, ফোটক, অস্ত্রবৃদ্ধি ৩য়, আভ্যন্তর কাবণ—বাহ্যবস্তুর সংস্থান বাহ্যবস্তু কঠিনীভূত মল, পিত্তাশ্মা ইত্যাদি ।

লক্ষণ ।—সতত বমন, প্রথমে পাকায়স্থিত দ্রব্য ও ক্ষেমা, তৎপবে মল বমন হয় বেদনা ও যই প্রচণ্ড উদরা-  
গান ও অস্ত্রকুজন ক্ষুদ্রাদ্বেব উর্দ্ধাংশে অববোধ থাকিলে সাধাবণতঃ হিকা জন্মে মানসিক অবসাদ । কোষ্ঠবদ্ধ হাত দিয়া দেখিলে অববোধের উপরি অংশে পূর্ণতা বোধ হয় শীঘ্রই বোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে । কয়েক দিনেব মধ্যে তরুণ অস্ত্রচ্ছদ প্রদাহ উপস্থিত হয় । পচনও সংঘটিতে পারে অববোধ যত নিম্নদিকে হয়, বমনও তত কম প্রবল হয় যত অধিক উর্দ্ধে অববোধ জন্মে, ততই প্রস্রাবের পরিমাণ কমিয়া যায়

চিকিৎসা ।—ক্যাপ্টব অয়েল ; ক্যাপ্টব অয়েল ও টর্পে-  
ন্টাইন এনিমা । ওপিয়ম ১ গ্রাঃ মাত্রায় ৪ ৬ বা ৮ ঘণ্টাস্তব ; ওপিয়ম ও বেলেডোনা বটিকাকাবে ; এট্রোপিনের অধস্তাচ প্রক্ষেপ ; উষ্ণ জল স্বেদ ; বেলাডোনা ও ওপিয়ম সহ মসিনাব পুলটীস ; ববফ ; হট্ বাথ । লাইম ওয়াটব ও দুগ্ধ , এসেন্স অব্ চিকেন ; ডিম্ব, ব্রাণ্ডি ইত্যাদি আহারাদি অতি অল্প মাত্রায় দিবে অধিক পরিমিত জলীয় পদার্থবিশিষ্ট পীচকারি দিনে ২ ৩ বা ৪ দিবে । ঔষধাদিতে উপকার না হইলে অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা অব-  
বোধ বিদূষিত করিতে হয় ।

আক্কেপিকাস্থস্থতা—ওলিয়ম ক্যাবউই, টিং সিনেমেন

কং, ইথর ১১, ১৩৪, ১৩৬ স্পিট বা অয়েল, জুনিপার, অয়েল  
মেস্টিপিপ, মর্ফিয়ান অধস্তাচ প্রাক্কেপ, মর্টার্ড পাষ্ট্রব। ভেলিবিয়ান  
১৩০, টর্পেন্টাইন ষ্ট্রুপ্‌স ও এনিমা; টিংচর ও ইমবিঃ জিঞ্জব,  
যিবেচক ঔষধ, বেল ইত্যাদি

### ইন্টেস্টাইনেল ওয়ার্মস—অন্ত্র কৃমি ।

তিন প্রকার কৃমি অজ্ঞাতান্তবে সাধারণতঃ অবস্থিতি করে।  
মহীলতা, ফিতা ও সূত্রবৎ কৃমি

লক্ষণ — শূলবেদনা ও উদবক্ষীতি নাগাকণ্ডুয়ন, মল  
দ্বাব কণ্ডুয়ন শ্বাস দুর্গন্ধ, অস্ত্রের বিশৃঙ্খলা রাত্রিতে দগু  
কিড়মিড়, সদা সর্বদা অস্বস্থতা বাধা ক্ষুধা হানি বা অপরিমিত  
ক্ষুধা মলসহ কৃমি নিঃসৃত হইলে বোগ নির্ণয়ে সন্দেহ থাকে না।  
প্রতিক্ষিপ্ত উদ্দীপনা হইতে অণুাণু বোগ জন্মে।

চিকিৎসা। ফিতা ও মহীলতাব গ্রায কৃমিতে অয়েল  
অব্ টর্পেন্টাইন ৩৭৯, স্ট্রাণ্টোনাইন ৩৮১, কুসো, ক্যামিলা ৩৮৪  
ক্যালোমেল ও স্ক্যাগনী বা জেলাপ, লিকুইড্ একষ্ট্রাক্ট অব্ মেল  
ফার্ণ প্রথমে ক্যাপ্টব অয়েল ও সীডলিজ পাউডর দ্বাবা বিরেচন  
করাইয়া তবে পূর্বোক্ত ঔষধ সমস্ত প্রযোজ্য। যাহাতে পুনরায়  
কৃমি না জন্মিতে পাবে, তজ্জন্ত টিংচর ষ্টীল ও ইনফিঃ কোয়াসিয়া  
বা তদ্রূপ পদার্থে লবণ সেবন তাহার্য্য দ্রব্য উত্তমকণে  
সুপাচিত হইবে কডলিওব অয়েল সূত্রবৎ কৃমিতে মলদ্বারে  
শীতল জলের পীচকারি বা ইনফিঃ কোয়াসিয়া বা লবণ মিশ্রিত জল  
বা চুণের জলের পীচকারি সল্ফিউরিক ইথর ও জল পীচকারি-  
রূপে ব্যবহার্য্য পাবদ ঘটিত বিরেচক, স্ট্রাণ্টোনাইন ও বিয়াই।



দেশীয় ঔষধের মধ্যে দাড়িম মূলেব ত্বক, পলামেব বীজ, পেঁপেব আটা, সোমরাজ ইত্যাদি উপকারী ন্যাপথালিন, থাইমল প্রয়োগেও উপকার দর্শে

ডিজিজেস্ অব্ দি রেক্টম—সবলাস্ত্রের পীড়া ।

প্রক্টাইটিস-রেক্টাইটিস ( সবলাস্ত্র প্রদাহ )

সবলাস্ত্র ও মলদ্বাবেব প্রদাহ, একটী বিবল পীড়া কারণ পূর্বাপেক্ষা একগে জনবৎ ভেদকব ঔষধ আদি ব্যবহার কমিয়া গিয়াছে বাহ্যিক আঘাত বা মলদ্বাবেব মধ্যে কোন বাহ্যবস্তু প্রবিষ্ট হইলে এই বোগ জন্মিতে পারে

লক্ষণ মলদ্বাবেব চতুষ্পার্শ্বে মৃতিময় উত্তান বোব তীব্র বেদনা, ত্রিকাস্থি ও পৃষ্ঠ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয় মলদ্বাবাবাধক পেশীব আক্ষেপিক সংকোচন ও সাতিশয় বোধাতিশয় । কোষ্ঠানি সহ কৃষ্ণবর্ণ আঠাবৎ আয় নিঃসৃত হয় মূদাশয়েব উগতা সার্বাজিক অসুস্থতা

চিকিৎসা—শয্যাষ শযিত থাকা, দুগ্ধ ও অন্নাদি পথ্যার্থ ব্যবহার, অবসাদক পীচকাবি ১৬৩, ১৬৪ উষ্ণ জলে কটি স্নান । বক্তাশাশয়েব লক্ষণ থাকিলে ইপিক্যাক পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার্য উষ্ণ পুল্টিস, উষ্ণ জলেব ফোন্টেসন । ওপিয়ম, কোনিয়ম, বেলেডোনা ও ববফ প্রভৃতি স্থানিক প্রয়োজ্য

রেক্ট্যাল অল্‌সার সবলাস্ত্রের ক্ষত ।

সবলাস্ত্রের উগ্র ক্ষতে অভ্যন্ত ঘূর্ণণা হয় ক্ষত অগভীর থাকে মলদ্বাবেব মধ্যে জন্মে ইহাকে ফিসার অব্ এনাসও বলে

দ্বীলোকের মধ্যে অতি সাধারণ, সময় সময় এতদ্বারা ডিম্বকোষে বেদনা, যুক্রামের উগ্রতা ও সঙ্গমকালে অতিশয় বেদনা হয়। মলনিঃসরণ দ্বারা ক্ষত উদ্দীপিত হয় এবং মলদ্বার সংকেচক পেণীতে আক্ষেপ জন্মে তীব্র জ্বালাযুক্ত বেদনা অধিকক্ষণ পর্যন্ত থাকে।

লক্ষণ ।—প্রাচীন ক্ষত ও সবদায়েব প্রাচীর পুরু হওয়া, উপদংশ বিধেব গৌণিক ফল গুটিকা সঞ্চয়, বর্কটিকা বা অশ্বাস্ত্য বশতঃও ইহা জন্মিতে পারে।

চিকিৎসা ।—ক্ষত আরোগ্য কবিত্তে হইলে উগ্র রেচক দ্বারা ক্ষতেব উদ্দীপনা বৃদ্ধি না হয়, তজ্জন্তু ক্যাষ্টর অয়েল, একট্রা বেলেনডোনা, কন্ফেক্সন অব্ সেনা দিবে, অথবা পেপসিন ও একট্রাঃ ম্যালোজ

স্থানিক ।—মার্কিউবিষেল অয়েন্টেমেন্ট ২ আউন্স ও একট্রাঃ বেলেনডোনা ২০ গ্রেণ একত্রে মিশ্রিত কবিয়া ২ ইঞ্চ বাস নিশিষ্ট বর্তীতে মাখাইয়া প্রয়োগ করিবে নাইটেট অব্ সিল ভর এ যোগে ব্যবহার করা উচিত নহে। সার্কাস্টিক স্বাস্থ্যের উন্নতি চেষ্টা করা কর্তব্য। পুরাতন ক্ষতে বেদনানিবারক ঔষধের সপজিটবী মলদ্বাবে দিবে। আইসোডফর্ম ও ভ্যাসিলিন, কোকে-টিন ও গ্লিসিবিগ প্রভৃতি স্থানিক উপকার দর্শে অধুনা ইথ্রিয়ল প্রযোগে সফল লক্ষ হইয়াছে

## ট্রিকচর অব্ দি রেক্টম্—সরলাস্ত্রের ব্যাস-

### সংকোচন ।

সরলাস্ত্রের ব্যাস সংকোচ এক স্থানে হয় স্ত্রাবোগ্যেব পৰ সংকোচন বশতঃ এই বোগ জন্মে সমস্ত সরলাস্ত্র পৃথক ও অববধ হইতে পারে অৰ্ধাদি জনিত অববোধ হইতে প্রভেদ কৰা উচিত এবং উগ স্ত্রাদি হইতে যে আগ্রাপ উপস্থিত হয়, তাহা হইতও প্রভেদ কৰিতে হইবে ।

লক্ষণ ।—কোষ্ঠবদ্ধ, অল্প অল্প মল ; কঠিন বা গাঢ় মল ভাগকালে সাতিনয় বৃষ্ট কোতানি, আশান, বাট ও ঠিক দেশে বেদনা আম নিঃসৃত হয় ও কখন কখন তৎসঙ্গে বত্র স্ফিত থাকে সর্কাস্টিক স্ত্রাহনি ক্ষত হইলে অর্ধাদি বেদনা, ত্রিকদোশ স্পর্শসহতা পুষ ও বত্র নিঃসব সর্কাস্টিক অন্ত্রস্থতা ।

চিকিৎসা ।—ব্রোমাইড অব্ পটাশিয়ম ১ ভাগ ও গ্লিসিৰিন ৫ ভাগ একত্রে স্থানিক প্রয়োগে উগ্র স্ত্র আদি উপশমিত হয় । আইডোফর্মের সপোজিটরী দিলে বেদনাজনক পীড়ায় উপকার দর্শে প্রাচীন প্রদাহে ফক্ষরস সেবা বৃদ্ধি দ্বারা প্রসারণ কৰিতে চেষ্টা কৰিবে স্পঞ্জ টেন্ট উত্ত উদ্দেশে ব্যবহৃত হয় বেদনা নিবারণার্থ ওপিয়ম ও ক্লোডোনা সপোজিটরী । মতবলকবণার্থ ৩৫৬, ৩৫৭

## প্রোল্যাপ্সাস্ অব্ দি রেক্টম্—ঔদভ্রংশ ।

সরলাস্ত্রের স্ত্রৈশ্বিক পর্দা বা স্ত্রের সমস্ত পর্দাগুলিই বহির্গত

হয় মলদ্বাবরোধক পেশীর দুর্বলতা, কোষ্ঠবদ্ধ, মলত্যাগ কালে  
ওতিশয় কোতানি, অধিক দিবস স্থায়ী উদরাময়, কুমির উদ্দীপনা,  
মূত্রযন্ত্রের পীড়া, মূত্রাশয়ে অশাবী ইত্যাদি কাৰণে এই পীড়ার  
উৎপত্তি হয়।

**লক্ষণ** প্রথমতঃ মলত্যাগেব পরই সবলান্ন নিঃসৃত হয়  
কিছুকাল পরে কোনরূপ শ্রমে, দাঁড়াইলে বা কাসিলে বাহিব  
হইয়া পড়ে সতত বাহিব হইলে শৈল্পিক বিদ্যী পুরু ও সময়  
সময় তাহাতে ক্ষত হয় মলদ্বাবরোধক পেশী অত্যন্ত শিথিল  
হইয়া পড়ে বক্ত বঞ্জিত আম নিঃসরণ শরীরে ভার ও কষ্ট  
বোধ, মলত্যাগ কালে সমূহ কষ্ট

**চিকিৎসা**। মলদ্বারের যে অংশ বাহিবে আইসে, তাহা  
উত্তমকপে ধোত কবিয়া, তাহা মলদ্বাব মধ্যে প্রবেশ কবাইয়া একটা  
লিণ্ট প্যাড্ বা বস্ত্রখণ্ড দ্বারা চাপ দিয়া রাখিবে অথবা উভয়  
নিতম্ব দেশ একত্রিত কবিয়া বেজিন প্লাষ্টার দিয়া রাখিবে সার্বা  
ঙ্গিক স্বাস্থ্য যাহাতে উন্নত হয়, তাহাব চেষ্টা কবিবে এতদর্থ  
পুষ্টিকর খাদ্য, কড্‌লিওব অয়েল মল তবল রাখিবাব জন্ত  
ও স্বাভাবিক নিঃস্রব নিঃসৃত করণার্থ গ্রে পাউডব, ট্যাৰাক্-  
সেকম, ম্যাগনিসিয়া বা ক্রিম অব্‌ টাৰ্টার ব্যবহার্য্য প্রতিবাব  
মলত্যাগেব পৰ শীতল জল বা সংকোচক ধোত দ্বারা মলদ্বাব  
ধোত কবিয়া মধ্যে প্রবেশ কবাইবে এলম ১০ গ্রেণ, ডিকক্-  
সন্ ওক বার্ক ও আউন্স বা টিং ষ্টীল ২০ ২৪ গিনিম, জল ও  
আউন্স একত্রে ধাবন প্রস্তুত ববিবে কখন কখন ট্যানিক  
এসিডেব সপোজিটবী ব্যবহাবে উপকাব হয় সেবনার্থ টিং ষ্টীল,  
টিং নক্সডমিকা, কুইনাইন ; টিং সিনকোনা কং প্রভৃতি বলকারক



ঔষধ ব্যবহার্য্য , ঔষধে উপকার না দর্শিলে শস্ত্রোপচার কবিব  
টিং পডোফিলিন অর্ধ বা এক মিনিম মাত্রায় সেবন কবাইয়া স্মৃৎনা  
লক্ষ হইয়াছে

### প্রবাইটিস্ এনাই—মলদ্বার কণ্ডূয়ন ।

মলদ্বার কণ্ডূয়ন একটী ক্লেণকর পীড়া অর্শ, অঙ্গীর্ণ ও  
কুমিরোগে প্রায়ই মলদ্বারে কণ্ডূয়ন হয় বৃদ্ধ ব্যক্তিদেরই ইহা  
হয় পূর্ণগর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদের ও যাহাদের জবাযুগ পীড়া  
থাকে, তাহাদেরও বিগতার্ভব সময়ের অব্যবহিত পবেও ইহা  
উপস্থিত হয় মলদ্বার অত্যন্ত চুলকায় এবং তাহা উত্তাপে ও  
উষ্ণ দ্রব্যাদি ভোজনে বৃদ্ধি পায় অনেক সময় নিদ্রাস ব্যাধিতে  
হয় ঘর্ষণ দ্বারা সন্নিহিত তন্তু পুরু হয় ।

চিকিৎসা । শীতল জলে স্নান ও মলদ্বার শীতল জল দ্বারা  
ধোত করণ, বিশুদ্ধ বায়ুতে প্রত্যহ ভ্রমণ । উষ্ণ মসলা, কফি  
ও মদ্যাদি সেবন নিষিদ্ধ অস্ত্রেব ক্রিয়া যাহাতে ভাল হয়, তাহার  
চেষ্টা করা কর্তব্য তজ্জন্তু বিরেচক অবলোহ ৩৫৫, ৩৫৬ ।  
রিউবার্ব ও লুপিল, বিবেচক পিচকারি । কবোসিবি মলনিমেট  
ও প্রসিক এসিড লোশন ১১৭ । বোরাক্স ও গ্লিসিগ ১৫৮ ।  
সেবনার্থ লাইকব আর্সেনিকেলিস ও ইনফিঃ চিবতা আইমো-  
ডাইড্ অব্ আয়রণ ও সালফা ৪০৩ ৮ হল, কোকেইন বা  
কার্বলিক এসিড, গ্লিসিবিঃ, অলিভ অয়েল বা ভ্যামিগিন সহ স্থানিক  
প্রয়োগে উপকার হয় । এসিড স্ট্রাঙ্গিমিলিবি ও জিঙ্ক অক্সাইড  
কোনিয়ম অয়েন্টমেন্ট



## ফিষ্টিউলা ইন্‌ এনো—ভগন্দর ।

ফোটিক উৎপন্ন হওয়া পবে সরলাস্ত্রের পার্শ্বে নালী হয় । ইহা দ্বিবিধ—( ১ ) সম্পূর্ণ ভগন্দর, ইহাতে শলাকা দিলে সরলাস্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় (২) অস্থবাহু ভগন্দর—যখন সরলাস্ত্রের শৈল্পিক পর্দা ছিদ্রীভূত না হয় ।

লক্ষণ । দ্বিবিধ বোগেই বাহু ছিদ্র ক্ষুদ্র ও অনেক সময় তাহা কঠোর সহিত দৃষ্ট হয় সাধাবণতঃ মলদ্বাবেব নিকট, কখন কখন ২ ১ ইঞ্চি দূবেও নালী অবস্থিতি কবে সম্পূর্ণ ভগন্দর অত্যন্ত ক্লেশকর বায়ু, ওবল মল ও আম উক্ত নালীব মধ্য দিয়া বহির্গত হয়, তাহাতে উদ্দীপনা ও মলদ্বাররোধক পেশীর বেদনায়িত আক্ষিপিক সংকোচন উপস্থিত হয় ক্ষয়-কাস বোগের সঙ্গে ভগন্দর প্রায়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে সম্ভবতঃ সরলাস্ত্রে গুটিক প্রদাহ উৎপন্ন ও তদবসানে ক্ষত ও ছিদ্র সংঘটিত হয়

চিকিৎসা । পুলটিস, বিশ্রাম, \*স্নোপচার, তৎপরে কার্কলিক এসিড অয়েল ২৮, ৬৩ । সংকোচক ধৌত—২৩৬, ২৪০, ২৪২, ২৪৩ মার্কাসিক স্বেদন উন্নতি বিধানার্থ কডলিভ অয়েল ; আয়বণ , আইয়োডাইড অব্‌ পটা সয়ম ; সালসা প্রভৃতি বলকারক ও পরিবর্তক ঔষধ সেবন কবান কর্তব্য টিং আইয়োডিন্‌ বা টিং বেন্‌জইন্‌ কং নালীব মধ্যে প্রবিষ্ট করাইলে উপকার হয়

## হেমরইড্‌স বা পাইল্‌স—অর্শ ।

ইহা বাহু ও অভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ । মলদ্বারবোধক পেশীব

বাহে ও অভ্যন্তরে অর্শ জন্মে । অনেক সময় দ্বিবিধ প্রকার অর্শ এক ব্যক্তিতে থাকিতে দেখা যায় ।

**বাহ্যার্শ ।** প্রসারিত শিরা বা উন্নত চর্ম দ্বারা গ্রন্থিবৎ উচ্চতা বা বলি উৎপন্ন হয় । শিরাতে তবৎ রক্ত থাকিতে পারে, কিন্তু অনেক সময় উহা জমিয়া যায় ও উহা ক্ষীণ হয় । চর্ম ও যোজক তন্তুর অতি বর্ধন দ্বারা প্রায়ই বলি নির্মিত হয় ।

**লক্ষণ ।** অনুরূপ হইলে বিশেষ কষ্ট হয় না, তবে বলি বড় হওয়া বশতঃ অসুখ হয় । উহা বা প্রদাহিত বা উহাতে বর্জ্যাদিক্য হইলে অতিশয় বেদনা উপস্থিত হয়, তৎসঙ্গে উষ্ণতা ও দব্ দব্ বোধ হয় ও কোতানি, পৃষ্ঠ বেদনা, সূত্রাশয়েব উগ্রতা, সম্ভবতঃ মূত্রস্রব ও স্ত্রীলোকের ভ্রূর্যুর উদ্দীপনা বর্তমান থাকে ।

**চিকিৎসা ।** বাহ্যার্শ—বিবেচনার্থ কন্‌ফকসন অব্ পেপার, কন্‌ফকসন্ সেনা ও সল্‌ফব—৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭ সল্‌ফর ও ম্যাগনিসিয়া, পেপসিন ও য্যালোজ ; ক্যাষ্টর অয়েল স্থানিক—ট্যানিক এসিড বা য্যালম লোশন, গল অয়েন্টমেন্ট, গদ এণ্ড ওপিয়ম অয়েন্টমেন্ট সহজ পাচ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য উত্তেজক মসলাদি নিষিদ্ধ । ঔষধেব দ্বারা আরোগ্য না হইলে শার্জোপচার করিবে ।

**আভ্যন্তরীণ অর্শ ।** এক বা অধিক সংখ্যক হইতে পারে । স্পঞ্জবৎ রক্তময় বলি, শিরা প্রসারণজনিত বলি ও মৌত্রীণমাণ্ডক তন্তুময় বলি ।

**লক্ষণ ।** প্রথম প্রথম কেবল মলত্যাগ কালে বলি নিঃসৃত হয় । তদনন্তর উহাদেব চাপে মলদ্বারবোধক পেশী প্রসারিত ও বক্তস্রাব বশতঃ শিথিল হইয়া পড়ায়, বলি সতত বাহির

হইয়া পড়ে, কেবল চিং হইয় শয়ন কৰিয়া থাকিলে বাহিব  
হইতে পাৰে না। বক্তৃতাৰ কথন অতি ভাল ও কথন অধিক  
হয়। সবদান্ধে অসুখবোধ, কোতানি, মূনাশযেব উগ্রতা ও  
শীঘ্ৰোবদেব জবাযুব উদ্দীপনা। আম পুৰাভাৰ শীর্ণতা,  
গুণহীনতা, মুখাকৃতি পীতাও যক্ৰুৎ, পাকশয় ও অজ্ঞাধিৰ  
ক্ৰিয়া বিশৃঙ্খলা।

চিকিৎসা।। ব্ৰোমাইড্ অব্ পটাশ, ৫ ভাগ গ্লিসিৰিন্ সহ  
দব কবতঃ স্থানিক প্ৰয়োগে বেদনা নিবাবিত হয়। হামাগিলিস  
সেৱন ও বাহিক ধোত বা পিচকাৰ আকাৰে প্ৰযোজ্য। বিৱেচ-  
নাৰ্থ বাহাৰ্শে যে সকল ঔষধ উক্ত হইয়াছে তাহা ব্যৱহাৰ্য্য  
যক্ৰুৎ ও পাকশযেব ক্ৰিয়াৰ প্ৰতি দৃষ্টি বৰ্খা কৰ্তব্য। কুইনাইন,  
টিং নক্ৰামিকা, নাইট্ৰোমিউৰিয়েটিক এসিড্, সল্ফৰ, আৰ্চি-  
নিক কন্ফেক্‌সন্ অব্ পেপাৰ ও সল্ফৰ, পেপ্‌সিন্ মলদ্বাৰে  
ঈতল জলেৰ পিচকাৰি, গ্যালিক এসিড্; এমোনিয়া আয়ৰণ  
ম্যালম্; টিং ষ্টীল্ জলে গুলিয়া মলদ্বাৰে পিচকাৰি দিবে। লিগে-  
চৰ, এল্‌কোপচাৰ ও কষ্টিক ঔষধ দ্বাৰা দাহন ক্ৰাইসাবোবাই-  
নাই ১ গ্ৰেণ, আইয়োডিন ১/২ গ্ৰেণ, একষ্ট্ৰাক্ট বেলেডোনা ১/২ গ্ৰেণ,  
অষেল থিয়োব্ৰোমা ৩০ গ্ৰেণ, ও গ্লিসিৰিন যথাপ্ৰয়োজন, একত্ৰে ১  
বৰ্টি, মলদ্বাৰাভ্যন্তৰে লাগাইলে উপকাৰ হয়।

ডিজিজেন্স অব্ দি লিভাৰ (যক্ৰুৎ পীড়া)

কন্‌জেষ্টন অব্ দি লিভাৰ (যক্ৰুতেৰ বক্তাধিক্য)

প্যাসিভ্ কন্‌জেষ্টন বা শৈথিল্য বক্তাধিক্য যক্ৰুৎ ও পিণ্ডোৎ-

গাদিকা শিবাতে রক্তসঞ্চালনেব অবোধ জন্মিলে এই প্রকার রক্তাধিক্য উপস্থিত হয়। হৃৎপিণ্ডের কপাটের পীড়া, ফুস্ফুসের অসুস্থাবস্থা বশতঃ ফুস্ফুসীয় ধমনীতে রক্ত গমনেব ব্যাঘাত ও যে সকল পীড়ায় বক্ষোগহ্বরেব পবিত্র হ্রাস হয়, তাহাতে নৈমিক রক্তাধিক্য জন্ম প্রাপ্তি হয়। হৃৎপিণ্ডের পিত্তপ্রাণী বক্তাধিক্য হইতে পারে। এতদ্বারা পিত্তপ্রাণী হ্রাসিত পিত্তপ্রাণী সমুদ্র পিত্তপূর্ণ (বিলিফারি কন্‌জেস্টন) হয়।

লক্ষণ । দক্ষিণ উদবোধ প্রদেলে ডান ও টান বোধ অনেক সময় সাগাথ প্রবাব কামলা, বিবমিষা, অতীর্ণ মূত্র ও বক্তবর্ণ এবং তাহাতে পিত্তের বর্ণদ পায় ও হৃৎপিণ্ডের অপ্রতিষ্ঠিত পদার্থ হ্রাসিত, অর্থাৎ পিত্তপ্রাণী বক্তাধিক্য প্রতীতিতে যকৎের ডান দিক অধিক হান বাণী হয়। হৃৎপিণ্ড ও ফুস্ফুসাদি পীড়ার লক্ষণ বর্তমান থাকিতে পারে।

একটিভ বা ধাতনিক রক্তাধিক্য যকৎধমনীর কৈশিক শাখা সকলে রক্তাধিক্য জন্মে। বক্তের অবিশুদ্ধ অবস্থা; অভ্যন্তরীণ অবরুদ্ধ অর্থাৎ ভ্রমরভ্রমর ও হৃৎপিণ্ড তাহা; গায়ত্রী মস্তিষ্ক, ধমনীর পীড়ায় পীড়াবশতঃ উহাদেব দুর্বলতা, অপরিমিত পানাহার, অপরিমিত স্নানাপান ও নিশ্চিন্ততা প্রভৃতি ইহাব কারণ।

লক্ষণ । দক্ষিণ উদবোধ প্রদেলে ডান ও টান বোধ প্রাপ্তি সাগাথ বিবমিষা দক্ষিণ দিকে বেদনা, শিথিলতা, ফুস্ফুস-লোপ, মানসিক অবসন্নতা, বিবমিষা, অনেক বিবমিষা ও পিত্ত-ময় মল। এই সকল লক্ষণ দ্বিপ্রতিভিত হয়, কিন্তু কারণ বিদূষিত না হইলে পরিণামে বিধান পীড়া জন্মে ও তৎপরে



কামল ও সম্ভবতঃ পুষ্যোৎপাদক জ্বর, উদরী, ইত্যাদি উৎপন্ন হইতে পারে

চিকিৎসা      স্ট্রালাইন পথগেটিভ্‌স ৩২৭, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৯, ৩৫৩      মার্কিউবিয়েল রেচক ৩৪১, ৩৪৩,      মিনারেল এসিড্‌স ১৬৯, ১৭৪      এমোনিয়া ইথর ১৮৩, ১৮৪      সিরপ ফেরি আইয়োডাইড্‌ ও টাটাকসেকম ১৮২      বেনজোয়েট অব্‌ এমোনিয়া বা সোডা      হাবোগেট, কার্লস্বাড্‌ প্রভৃতি মিনারেল ওয়াটার্‌স      বিশুদ্ধ বায়ুতে ব্যায়াম ; মদ্য সেবন নিষিদ্ধ      সহজ পাচ্য পথ্য      কারণ নির্কাবিত হইলে তাহা নিবারণেব চেষ্টা করিবে      যকৃৎ প্রদেশে ফোমেন্টেশন, পুন্টীস্‌ বা গঠার্ড প্রযোজ্য      এমেন ক্লোরাইড, ইউনিজিন বা পডোফিলিন সহ ব্যবহারে উপকার দর্শে

### হিপেটাইটিস [ যকৃৎ প্রদাহ । ]

সচরাচর যকৃৎেব বিধানে প্রদাহ জন্মে, সময় সময় যকৃতের পর্দা ও গ্লিসনকোষেও প্রদাহ হয়      এই শ্রেণীভুক্ত প্রকার প্রদাহকে পেরি হিপেটাইটিস কহে      যকৃতের সমস্ত বিধানে প্রদাহ হইতে পারে এবং এতদ্বারা যকৃতের কোমলতা, তরুণ হ্রস্বতা বা কাঠিষ্ঠ জন্মিবাব সম্ভাবনা      সাধারণতঃ প্রদাহ একস্থানে আবদ্ধ থাকে ও পরিণামে স্ফোটক জন্মে

লক্ষণ — যকৃৎেব উপর বেদনা, অঙ্গচ্ছদ আক্রান্ত হইলে বেদনা অতিশয় তীব্র হয়      প্রবল জ্বর, তাহা সময় সময় মৃদু ও দুর্ব্বলাকার ধারণ করে      দক্ষিণ উদরোর্ধ্ব প্রদেশে পূর্ণতাবোধ ; প্রতিঘাতে ডল্‌ স্ক্‌দের বিস্তৃতি      চাপ, কাসি, দীর্ঘ শ্বাস দ্বাবা বেদনা বৃদ্ধি পায়      বাম পার্শ্বে শ্বাসে অশক্তি      চক্ষু পীতভ,

কদাচ কামল , শ্বাসকষ্ট, বাসি, বমন, শিবাবেদনা, হিকা  
দক্ষিণ স্কন্ধ ও জত্রুস্থিতে বেদনা ; সম্ভবতঃ যক্ষ্মেব বাম অংশ  
আক্রান্ত হইলে বাম স্বঘে বেদনা হয় ফোটক জন্মিলে শীত  
বা কম্প হয়। বিলেপী জ্বর ( হেকটিক ফিবার ), পাখাস্মের  
বিশৃঙ্খলা, বেদনা ও সাতিশয় স্পর্শাহতা যক্ষ্মে ভাববোধ,  
হস্ত দ্বাৰা দেখিলে উদবস্থ পেশী সটান বোধ হয় শীর্ণতা, অব-  
সন্নতা, উদবাসয় বা বক্তামাশয়

চিকিৎসা এই বোগে অত্যন্ত দুর্বলকর ঔষধ ব্যবহার  
করা উচিত নহে সলফেট অব্ সোডা ও ট্যারাকসেকম ৩৩৯ ,  
ম্যাগ্নেজ ও পটাশ ৩২৭ , ক্যালোমেন ও কলসিথ ৩৪১ , পড-  
ফাইলিন ৩৪৭ , নাইট্রিক ও ইপিক্যাক ৩৪৯ , এসিড টাট্টেট  
অব্ পটাশ ২৯৩, ৩৫৭ ম্যাগ্না সল্ফ ৩৩১, ৩৩৪ সিড্ৰীজ  
পাউডর ৩৫৩ ব্লুপীল ও ইপিক্যাক চূর্ণ রক্তামাশয় উপস্থিত  
থাকিলে ইপিক্যাক, মর্ফিয়া ও অগ্নাত সংকোচক ঔষধ দ্বারা  
চিকিৎসা করিবে ওদাহেব দমনার্থ উষ্ণ জল স্বেদ, পুণ্ডীস,  
মষ্টার্ড প্লাষ্টর, ওয়েট কস্ট্রেস ওভতি ব্যবহার্য নাইট্রোমিউ-  
রিয়েটিক এসিড ডিল, ট্যারাকসেকম, এমোনি ক্লোরাইড ১৬৯,  
১৭৪, ৪১২। কুইনাইন ১৯৩, ১৯৪ ; কুইনাইন ও জায়রন  
বেদনা নিবারণার্থ ওপিয়ম, মর্ফিয়া, বেলে ডোনা ও হামসামাস  
দৌর্বল্য অধিক থাকিলে মদ্যাদি দেওয়া বিধেয় পুথোৎপাও  
হইলে এমোনিয়া ও বার্ক ১৮৩ ; কুইনাইন, জায়রন ও ট্যারাক-  
সেকম ১৭৪ কুইনাইন ও জায়রন ১৭৩, ১৭৬, ১১১ পুষ্টিকন  
খাদ্য পুথোৎপাও অধিক হইলে টোকাব ও ক্যানিউকা দ্বারা  
শস্ত্রোপচাব ও এস্পিবেটার যোগে পুষ নিঃসারিত করিবে

## সিরোসিস্—[ পুরাতন প্রদাহ । ]

যক্‌তেব অভ্যন্তরস্থ ও আববক যোজক তন্তুতে প্রাচীন প্রদাহ ও উহাৎসেব বিবৃদ্ধি হয় যক্‌ৎ অস্থ্যভাবিক কঠিন ও অবশ্যে সংকুচিত হয় কঠিনীভূত যোজক তন্তুব সংকোচন বশতঃ যক্‌ৎ কোষ অভ্যন্তর দিকে নীত হওয়ায়, যক্‌তের বাহ্য প্রদেশে দেখিতে হব্‌নেল বা চর্মপাত্তকাব পুরু মস্তকযুক্ত কাটায ছায় দেখায় এই প্রকাব পীড়া সুবাপান বশতঃ জন্মে

লক্ষণ —সৌত্রীণ ক্ষবণ বশতঃ পিত্তোৎপাদক রক্তের গতি ও পিত্ত্যাব এবং তাহ নিঃসবণেব ব্যাঘাত না জন্মিলে লক্ষণাদি সামান্য প্রকার ও অস্পষ্ট থাকে যক্‌ৎ অল্প বিবৃদ্ধ যেমন সৌত্রীণ তন্তুব সংকোচন ও উপদংশ হসিত হইতে থাকে, সেইরূপ যক্‌তেব আকৃতি ছোট হয় প্লীহা বিবৃদ্ধি, দক্ষিণ উদরোর্দ্ধ প্রদেশে বেদনা, অজীর্ণ, উদবাধান, কোষ্ঠবদ্ধ, সাময়িক জ্বব, শুক ও কর্কশ চর্ম, অস্থস্থ পীতাভ মুখাকৃতি কিছুকাল পবে দৌর্বল্য ও শীর্ণতা ক্ষরিত লসীকা দ্বাবা সংকোচনের আধিক্য জন্মিলে পিত্তোৎপাদিকা শিষায় বক্ত সঞ্চাদনের অববোধ উপস্থিত হয় ও তন্ধেতু উদবী ও কামল জন্মে উদব প্রাচীরস্থ শিষা প্রসারিত পাকায় ও অন্ত্রে রক্তস্রাব ক্রমশঃ উদরী বর্দ্ধিত হয় অবসন্নতা বা ফুসফুস-প্রদাহ, অন্ত্রচ্ছদ-প্রদাহ, কামল ও বক্ত অবিশুদ্ধ হইয়া মৃত্যু হয়

চিকিৎসা ।—ইহাতে যক্‌ৎ কঠিনীভূত হয় ও তৎসঙ্গে প্রাচীন প্রদাহ বর্দ্ধমান থাকে ইহা সহজে আরোগ্য হয় না সুরাপান এককালীন নিষিদ্ধ ; কফি, অধিক মসলা যুক্ত খাদ্য দ্রব্য সেবনও অবিধেয় সহজ পাচ্য অথচ পুষ্টিকর, একরূপ খাদ্য

প্রয়োজ্য কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে মৃদু বিরেচক যথা—সলফেট অব্  
সোডা ৩৩৯, বেজিনা পডফাইলাই ৩৪৭; এসিড টার্টেট অব্  
পটাশ ও ট্যারাকসেকম। কার্লসবাড্ ওয়াটার পানে উপকার  
হয় কোন কোন চিকিৎসক যকৃৎ প্রদেশে ভ্রূকো দিতে ও  
কপিং কবিত্তে বলেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্লিষ্টাব পুনঃ পুনঃ দিযেও  
অনেক সময় উপকার হয়। \* রীবে উপদংশা বিষ থাকিলে  
আইয়োডাইড্ অব্ পটাসিয়াম ৩৯৯ তৎপবে আইয়োডাইড্  
অব্ আয়রণ ও কুইনাইন পরিপাক ক্রিয়া যাহাতে স্মৃদ্ধ  
ভাবে সম্পন্ন হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য তৎপ্রতি নাইট্রো-  
হাইড্রোক্লোরিক এসিড ডিন্, পেপসিন ও নঃ ৩মিক, টিংচর  
রিয়াই ও ইনফিঃ জেনসিয়ান যকৃতোপবি আইয়োডিন বা  
রেড্ আইয়োডাইড্ অব্ মার্কবী ডায়েটমেন্ট মর্দন উপকারী  
বক্তব্য হইলে গ্যালিক এসিড, টার্পেন্টাইন অয়েল ব্যবহার্য।  
উদবী বোগ এতৎসঙ্গে উপস্থিত থাকিলে মৃদু মুত্রকাবক, বিরেচক  
ও বলকাবক ঔষধ ব্যবহার্য এসিড নাইটিক ট্রিং ই ড্রাম,  
এসিড মিউরিয়টিক ট্রিং ১ ড্রাম, জল ২০ আউন্স একত্রে মিশাইয়া  
ও তাহাতে বঙ্গ খণ্ড ভিজাইয়া যকৃতোপবি সংস্থাপন কনিবে  
ফুস্কুড়ি বাহিব হইলে আর দেওয়া উচিত নহে ইহাতে প্রদাহিত  
বেদনাদি উপশান্ত হয় সেবনার্থ নাইট্রো মিউরিয়টিক  
এসিডেব সঙ্গে ট্যারাকসেকম ও নয়া মিশাইয়া ব্যবহারে উপকার  
হয় এবং ইহাব সহিত মিনকোনা বা টেরভা মিশাইয়া  
ব্যবহার করা যায়।



## সিফিলিটীক হিপেটাইটীস উপদংশীয়-যক্ৰৎ প্রদাহ ।

সাধারণতঃ উপদংশের অত্যাধিক গোণিক লক্ষণের সহিত যক্ৰৎ-প্রদাহ সংগৃহীত হয় যক্ৰতের বিধান মধ্যে বা বাহিরে প্রদাহ হইতে পারে যক্ৰতের একাংশ পীড়িত হওয়ায় অপবাংশ দ্বারা ইহার নৈসর্গিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয় এইরূপ হওয়ায় স্নৃষ্ণ অংশের কোষ সমূহ বর্ধিত হয় উপদংশজনিত শরীরের অস্বাস্থ্য প্রীহা বিরুদ্ধি, সময় সময় আণ্ডালিক মূত্রবোণ

চিকিৎসা — আইয়োডাইড্ অব্ পটাসিয়ম ৩৯৯, মার্কি-উবিয়েল ৬০৭র বাথ ; শারীরিক ও মানসিক শ্রম হইতে বিরতি ইহার সঙ্গে মূত্রগ্রন্থি পীড়ার লক্ষণ থাকিলে আইয়োডাইড্ অব্ আয়বণ প্রযোজ্য

## একিউট এট্রুফি অব্ দি লিভর

এই পীড়ায় যক্ৰতের সমস্ত অংশের কোষ সমূহ স্তবিত ও সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকেবা এই পীড়ার অধিক আয়ত্ত গর্তাবস্থা—এই পীড়া উৎপত্তির অনুরূপ। শোক, উৎকর্ষা, সহসা ভয় পাওয়া, ক্রোধ, অপবিমিত মৈথুন, উপদংশ, অপবিমিত পাবন ব্যবহার, স্রবাপন, লাম্পাট্য, পুতিবায়ু আদি ইহার উৎজক কারণ পীতজরের সহিত এই পীড়ার অনেক বিষয়ে সোসাদৃশ্য আছে ।

লক্ষণ । —পূর্বরূপ—শিরোবেদনা, ক্ষুধাবিলোপ, তৃষ্ণা, তন্দ্রা, মানসিক ও শারীরিক অবসাদ, অস্ত্রের বিশৃঙ্খলা, উদরে বেদনা । তৎপবে চক্ষু পীতবর্ণ ও চর্ম্ম ঈষৎ পীতবর্ণ হয় এই পূর্বরূপ কয়েক দিন হইতে ৩৪ সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকিতে পারে

অথবা পূর্বরূপে আদৌ উপস্থিত হয় না বোগ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইলে কামল, চর্ম্মে রক্তবর্ণ ফোঁকা ও বড় বড় কামনিবা দাগ বমন—প্রথমে শ্বেতা পরে রক্তবৎ হয় । উগ্রতা, সাত্বিকায় নৈরাশ্র, প্রলাপ, আক্ষেপ, তন্দ্রা ও গাঢ় অচেতনাবস্থা দ্রিহ্বা ও দন্তে কৃষ্ণবর্ণ মল সঞ্চয় । পাকায় ও দক্ষিণ উদবোধ প্রাদেবে বেদনা যকৃতের ডল্‌ শব্দের ক্রমতা ও প্লীহার উগ্র শব্দের বিস্তৃতি ছদ্‌ম্য কোষ্ঠবদ্ধ, বিরেচক ঔষধ দ্বারা কঠিন মুণ্ডিকাৎ মল নিঃসৃত হয় শেষে বক্তমিশ্রিত থাকায় মল কৃষ্ণবর্ণ হয় প্রস্রাব ত্যাগে কষ্ট, মূত্র পিত্তের বর্ণদ পদার্থ দ্বারা পূর্ণ । কামনা বৃদ্ধি পায় শয্যাঙ্কত । নাসা, পাকায়, অন্ন ও দুগ্ধসং দি হইতে রক্তস্রাব রোগ পূর্ণাবস্থায় নীত হওয়ার এক সাতাহীন মধ্যে মৃত্যু হয়, কখন কখন ১৮ বা ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু সংঘটিতে পারে

চিকিৎসা ।—এই রোগেব প্রকৃত অবস্থা কল্পিত ভাষা স্থিরীকৃত না হওয়ায় ইহাব চিকিৎসাও বিশেষ সফলপ্রদ নাহ উগ্র বিবেচক, আকবিক অন্ন সমূহ ও অবসন্নতা বর্তমানে উদ্বেতক বিধেয় । বমন নিবারণার্থ বরফ কুইনাইন ও মিনাবেন এসিডস

### ক্লিনিক এট্রফি অব্‌ দি লিভর ।

তখন বোগের সঙ্গে ইহাব কোন প্রকার সংযোগ নাহ যে কোন কারণে যকৃতের মধ্যে কৈশিক বক্তসঞ্চালনের অববোধ জন্মিলে এই পীড়া জন্মে

লক্ষণ ।—ক্রমশঃ মূছ ও অস্পষ্টভাবে রোগ বর্জিত হয় । অসম্পূর্ণ পরিপাক, উদরাধ্বান, পর্যায়ক্রমে উদবায় ও

কোষ্ঠবদ্ধ, মল ফেকাসে বর্ণ চর্ম শুষ্ক পীতভ বলহানি ও শরীর শীর্ণ। রক্তহীনতা, উদরী পবিণামে সাংঘাতিক অবসন্নতা

চিকিৎসা।—পথা লঘুপাক ও পুষ্টিকর। গবম মশলা ও তৎসহযোগে প্রস্তুত খাদ্য, চিনি ও সুবা সেবন নিষিদ্ধ উষ্ণ বস্ত্র পরিধান করিবে শরীরের ক্লান্তি বোধ না হয় একপ শ্রম করিবে। পবিপাকের সাহায্যার্থ পেপ্সিন; বিগুন্ধ বৃষপিও, ইপিক্যাক ও কুইনাইন; বার্ক ও গিনাবেল এসিড্‌স; লৌহযটিত ঔষধ দ্বারা সময় সময় যক্লতে বক্রাধিক্য উপস্থিত হয়, অতএব উহা সাবধানে ব্যবহার করা কর্তব্য বিবিধ আকরিক জল—হারোগেট, মেবিয়েন বার্ড ও কার্লস বার্ড ইত্যাদি উদরী প্রাচুর্ভূত হইলে মূত্রকারক ও উগ্র রেচক প্রয়োজ্য।

ইনফ্লুয়েন্স অর্ বা দি বিলিয়্যারি প্যাসেজেস্।

( পিত্তপ্রণালীর প্রদাহ । )

পিত্ত প্রণালী ও পিত্তাশয়ে বিবিধপ্রকার প্রদাহ জন্মিতে পারে সর্দিজনিত প্রদাহে অধিক শ্লেষ্মাস্রাব ও তাহা পরে আঠা ও পুষ্ণবৎ হয় সময় সময় সিষ্টিক ডক্ট শ্লেষ্মা দ্বারা অবরুদ্ধ থাকে ক্ষবণশীল প্রদাহ হইলে সোত্রীঃ পদার্থ জন্মে। ইহাতে প্রণালী অবরুদ্ধ ও প্রসারিত হয় পুষ্ণোৎপাদক প্রদাহ হইলে পুষ্ণ ও শ্লেষ্মা স্রাব হয় ও তৎসঙ্গে পিত্ত মিশ্রিত থাকে ক্ষত জন্মিতে পারে। পিত্তশিলাব সঙ্গে পিত্তাশয়ে ক্ষত প্রায়ই দৃষ্ট হয়। পিণ্ডশিলা না থাকিলেও পচন বশতঃ ক্ষত উৎপন্ন হইতে পারে।

লক্ষণ । , সর্দিজনিত প্রদাহে—সামান্য প্রকার বেদনা, পাকাক্ষয়োপার ও দক্ষিণ উদবোর্ধ্ব প্রদেশে টান বোধ, বিবমিষা, শূল জ্বর ও কোষ্ঠবদ্ধ আঠাবৎ শ্লেষ্মা দ্বারা অধিক সংখ্যক পিত্তপ্রণালী অবরুদ্ধ হইলে কামল হয় উদনাময় উপস্থিত হওত বোঁগাবসান হয়। অবরুদ্ধ পিত্ত ক্ষুদ্রাঙ্গে প্রবিষ্ট হওয়ায় ক্ষীণ ঘটনা হয়। যে কোন কারণে পিত্তাশয়ে অধিক দিবস পিত্ত সঞ্চিত থাকিলে তাহা পচিয়া উদ্দীপনা, প্রদাহ ও পুষ্পকতাাদি সমুৎপন্ন হয় বিবিধ কারণে পিত্তবাহিকা নলী সমস্ত প্রসারিত হইয়া থাকে

চিকিৎসা । বিশ্রাম, উষ্ণ জলে স্নান ; শ্বেদ ; বেদনা-নিবারণক ও অবসাদক ঔষধ ; স্নিগ্ধ পানীয় ; এমোনিয়া ও বার্ক ; পিত্তপ্রণালী যদি শ্লেষ্মা দ্বারা রুদ্ধ থাকে, তবে ইপিক্যাক বমনকারক মাত্রায় নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিক এসিড ডিল ; এমোনি ক্লোরাইড্

গলষ্টোন বা পিত্তশিলা—বিলিয়ারি ক্যালকুলাই ।

পিত্তাশয়ে উৎপন্ন হয়, যকৃৎ বিধানে বা পিত্তপ্রণালীর উপশাখায় কদাচ জন্মে

লক্ষণ । উপশাখায় পিত্তশিলা জন্মিলে যকৃৎজ্বর উপন্য অতীক্ষ বেদনা, সম্ভবতঃ উহা ক্ষয় পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হয় বিবাম-শীল জ্বর লক্ষণ, বিবমিষা সহ পাকাক্ষয়েব অস্বস্থতা এতদ্দ্বারা পিত্ত নিঃসরণের ক্ষণস্থায়ী ব্যাঘাত জন্মিবায় কামল উপস্থিত হয় না পিত্তপ্রণালী শিলা দ্বারা কদাচ অবরুদ্ধ হয় যদি হয় তবে বিবামশীল বেদনা, পিত্ত বমন, কামল, যকৃৎ বিগ্ধি পিত্তা-



শয়ে শিলা জন্মিলে অনেক সময় বিশেষ অস্বস্থতা উৎপাদিত হয় না। পিত্তাশয় হইতে স্ফিষ্টিক ডক্টে পিত্তশিলা প্রবিষ্ট হইলে অসহ্য শূল বেদনা, দক্ষিণ উদবোর্ধ্ব প্রদেশে সাতিশয় বেদনা বমন, বিবমিষা, কোষ্ঠবদ্ধ ও উদবাধান। শীত, নাড়ী-স্পন্দন মৃদু হয়। পিত্তাশয়ে যদি শিলা পুনঃ প্রবিষ্ট হয়, তবে লক্ষণাদির বিরাম হয়। যদি উক্ত স্থানে স্থায়ী হয়, তাহা হইলে পিত্তাশয়ে বস সঞ্চয় বা শোথ ও ডক্টে ক্ষত ও পচন সংঘটিতে পারে। শিলা অগ্রসর হইয়া ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবিষ্ট হইলে বেদনাব শান্তি হয়। অধিক দিন পিত্তনালী অবরুদ্ধ থাকিলে কামল জন্মে যকৃৎ বর্ধিত, পিত্তাশয় বিস্তৃত ও পরিশেষে মৃত্যু সংঘটিত হয়।

**চিকিৎসা।** বেদনা নিবারণার্থ—বেলেডোনা ও পপী একষ্ট্রাক্ট উদরোপবি প্রলেপ দিবে। উষ্ণ জল, স্বেদ; মসিনার পুলটীস; ওপিয়ম বা মর্ফিয়া পূর্ণ মাত্রায় ৮৮, ৯৮, ১০৩, ১৩১, ১৩৩, ১৩৫। বেশী বমন হইতে থাকিলে আফিংয়েব পীচকারি ১৬৩, ১৬৪। মর্ফিয়া ও এট্রপিনের অধস্তাচ প্রক্ষেপ ক্লোরোফর্ম, ইথর ইন্‌হেলেসন। পিত্তশিলা নিঃসৃত করণার্থ ক্যাষ্টর অয়েল; অলিভ অয়েল, সিড্‌নিজ পাউডর; জেলাপ; কলসিন্ড ও হেনবেন বটীকা। পথ্য ছন্ধ, মাংসযুষ; তবল খাদ্য দ্রব্য। নূতন পিত্তশিলা উৎপন্ন না হইতে পারে, তজ্জন্তু লবণ ঘটিত রেচক মধো মধো ব্যবহার্য্য। গরম জলের সঙ্গে বাইকার্বনেট অব্ সোডা ২০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। এক পাইন্ট গরম জলে ১ ড্রাম সোডা ও ২০ গ্রেণ স্যালিসিলেট অব্ সোডা মিশাইয়া বেদনার সময় এক এক চুমুক পান করিলে উপকার হয়। অনেক সময় বমনে উপকার হয়।

## জাতিস—কামল—ম্চাবা ।

ইহা বিবিধ বোগের লক্ষণ কপে উৎপন্ন হয় কামল বিবিধ—  
১ম, পিত্তস্রাব আদৌ না হইলে রক্তে উহা সঞ্চিত থাকিয়া বোগ  
জন্মে ২য়, ক্ষুদ্রাত্রে পিত্ত আসিয়া পড়ায় কোন অবরোধ  
ঘটিলে উহা পুনরাশোষিত হইয়া কামল জন্মে অবরোধ  
অধিক দিবস স্থায়ী হইলে যকৃতের মধ্যে কৈশিক রক্ত সঞ্চা-  
লনের ব্যাঘাত জন্মে, তদ্ব্যতীত পিত্তস্রাব হইতে পারে না

লক্ষণ । চর্ম্ম ও চক্ষু পীতবর্ণ । মুত্র পীতবর্ণ বা দুসন্নাভ  
কৃষ্ণবর্ণ । মল শ্বেত বা মৃত্তিকা বর্ণ চর্ম্ম কণ্ঠরূক্ষ । অবসন্নতা,  
তন্দ্র, শিবোঘ্নন, উগ্র প্রকৃতি, তিক্তাস্রাদ, নাড়ীস্পন্দন মুহু  
অজীর্ণ বিষেষতঃ মেদান্ত পদার্থ দ্বারা মনস্তাপ্তি জন্মে চক্ষু ভিত্ত  
বেব অংশও কোন কোন বোগীৰ পীতবর্ণ হওয়ায় সমস্ত বাহ্যবস্ত  
দেখিতে পীতবর্ণ দেখায় এই বোগ অধিক দিন স্থায়ী হইলে  
তন্দ্র, প্রলাপ ও অন্তান্ত মাস্তিষ্ক বিকাৰ জন্মে অসম্যক পবি-  
পোষণ বশতঃ দুৰ্ব্বলতা ও শীর্ণতা রক্তস্রাব প্রবণতা পিত্ত-  
স্রাব আদৌ না হইলে মুত্রে কেবল রক্তস্থিত পিত্তের উপাদান  
থাকে আব অবরোধ বশতঃ বোগের মুত্রে, যকৃতে উৎপন্ন পিত্ত  
আদি বর্তমান থাকে ২ ডাম মুত্র অর্দ্ধ ডাম মাসিউরিব এমি ৬  
ট্রুং ও একটু চিনি সংযোগ করিলে উক্ত পিবিধ তবল এবং র  
সংযোগস্থল লালবর্ণ হইলে পিত্তম্ন আছে স্থির করিতে হইবে ।

চিকিৎসা । কারণোন্ময়ী চিকিৎসা করা কর্তব্য । পিত্ত-  
স্রাব অবরোধে মার্কনী—ক্যালোমেণ্ড ; ৩ ডার্মিন, ইউনিমিন,  
আইবিডিন, সলফেট অব্ সোডা ও ট্যাবাকমেকম, ৩৪১, ৩৪৪,  
৩৪৭, ৩৩৯ । বেন্‌জোইক এসিড, মিনালেল এসিডস, শূণ্য পাক-

হুলীতে অল্প মাত্রায় ক্ষাব সেবন    নাইট্রিক্‌ বা .নাইট্রো-হাইড্রো-  
ক্লোরিক্‌ এসিড ও ট্যাবাকসেকম ৩০০ ; পটাসী টার্ট এসিড ৩০১ ,  
হাইড্রোক্লোবেট অব্‌ এমোনিয়া ৪১২ ; পডফিলিন রেজিন্‌ ও  
ইপিকাক ৪১৩ , এসিড টার্টেট অব্‌ পটাশ ২৯৩ , সলফেট অব্‌  
ম্যাগ্নিসিয়া ৩৩১    শিও প্রাবিত হইয়া অদ্রাভান্তবে আসিবাব  
ন্যাঘাত প্রাপ্ত হইলে কম্পাউণ্ড ডিকক্সন অব্‌ ম্যানোজ ৩২৭ ;  
ম্যানোজ পিদ্‌স ৩৪০ ; সলফেট অব্‌ ম্যাগ্নিসিয়া ৩৩১, ৩৩৩,  
৩৩৪    এসিটেট অব্‌ পটাশ ও ট্যাবাকসেকম ৩৬৩ ; সোডি এট  
পটাসী টার্ট ৩৬৪    পথ্য লঘু ও সহজ পাচ্য হইবে    সুবাদি পান  
ও ঘৃত চিনি নিষিদ্ধ    যকৃতোপরি ডাইজিউটেড নাইট্রো-হাইড্রো-  
ক্লোরিক্‌ এসিড স্থানিকও উপকাৰী    সোডা ফক্স, সোডা বেন্-  
জোয়ান, কার্লসবাড্‌ সল্ট উপকাৰী    পথ্যার্থ মাটা তোলা  
দুগ্ধ

—

### ডিজিজেস্‌ অব্‌ প্যানক্রিয়াস

ইহা একটী বিরল পীড়া    এই পীড়া জন্মিলেও তাহা নির্ণয়  
করা সুকঠিন    বত্বাধিকা, পদাহ, নিবৃদ্ধি, পুষ্ণোৎপত্তি, কাঠিষ্ঠ  
ও কোমলতা প্রভৃতি হইতে পাবে    মেদাপকৃষ্টতা ও বিবিধ অর্কদুও  
সময় সময় উৎপন্ন হয়

লক্ষণ    ক্রমশঃ বর্ধিত ও বেদনাবিহীন হয়    পাংশয়ো-  
পরি বেদনা, পূর্ণতা ও কাঠিষ্ঠ, উষ্ণতাবোধ ও টানবোধ । বমন,  
নিবৃদ্ধি, দালাল্যাব, ক্ষুধানোপ ৫ ধবিহীন উদগার ' মেদাক্ত মদ  
মানসিক অবসন্নতা, দৌর্বল্য ও শীর্ণতা    এতদ্বারা পিওনলী চাপিত  
হইলে কামল জন্মে

চিকিৎসা।। প্যানক্রিয়াস বা ক্লময়ড্‌ব পীড়ায় প্যানক্রিয়ে-  
টিক্ ইমল্‌সন, অহিফানব পীচকাবি এই রোগ নিৰূপণ করা  
বড় কঠিন ও ইহাব চিকিৎসায় বিশেষ সূক্ষণ উপাদান হয় না।

## স্পিলিনিক ডিজিড্—পীহার পীড়া।

অগ্রাণু গ্রন্থিব ন্যায় পীহাতে বর্জ্যাব্যক্তি, ওদাহ, কোমলতা,  
ফোটক, পচন, গুটিকা ও সাংঘাতিক বোগ আদি জন্মিতে পারে  
তন্মিন্ন বিবিধ অৰ্কুদ ও পীহাবিবৃদ্ধি। শৈথিল্য বোগ সচরাচর  
ম্যালেরিয়াস অব সহ উপস্থিত হয়।

লক্ষণ। পীহা বিবৃদ্ধিতে বৈশিষ্ট্য মুখ্যতঃ ফেক্‌শন বা  
পীতাভ হয়। মাড়ি আদি স্থান বক্তৃহীন, রক্তস্রাব ও বর্ণতা, অধীর্ণ,  
দৌৰ্বল্য ও শীর্ণতা।

চিকিৎসা।। পীহার পীড়ার মধ্যে সচরাচর বিবৃদ্ধি  
সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহা জবেদ পবে বা সঙ্গে প্রকাশিত হয়।  
বিরোচক ঔষধ, কুইনাইন ও আয়ব ১৭২, ১৭৩, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮  
কুইনাইন ও টিংচর সিনকোনা ১৯৩, ১৯৪। প্রোগাইড্ অব্ পটা-  
সিয়ম ৪০৯, সিবপ ফেবি আইয়োডাইড্, সিবক ফেবি হ্যাঙ্ক-  
টাস ও ফস্‌ফেটাস, টিংচর ফেবিপারোবাইড ও টিংচর আইয়ো-  
ডাই ১৭৫। ফেবিটাট ও ইনফঃ কোয়াসিয়া ১৭৯; ভাইনম  
ফেবি ও আর্সিনিক ১৯১। ফেবি সল্ফ ও ইনফিঃ বার্কলিস  
লিসিয়ম ৪১৯। পীহা বিবৃদ্ধিতে টিংচর সিয়েনোথস ১২ গিনিম।  
স্থানিক—টিংচর অব্ আইয়োডিন, লিগ্‌মেন্ট ভব্ আইয়োডিন,  
অক্সুয়েন্টম আইয়োডিন, অক্সুয়েঃ পটাঃ আইয়োডিডাই, রেড আই-



য়োডাইড্, অব্ মার্কবী অয়েন্টমেন্ট, লিনিমেন্ট পটানী আইয়োডি-  
ডাই কম্ সেপোনি ।

### উদরচ্ছদ ও উদরপ্রাচীরের পীড়া ।

ডিজিজেস্ অব্ পেরিটোনিয়ম এণ্ড এব্‌ডোগিনেল ওয়াল

### একিউট পেরিটোনাইটিস—( উদরচ্ছদ প্রদাহ ) ।

অস্ফচ্ছদের তৎ প্রদাহ একটি গুরুতব পীড়া

লক্ষণ ।—বেদনা ক্রমশঃ সমস্ত উদবে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে  
সময় সময় শীত ও কম্প প্রবল জ্বর, উদরে সাতিশয় স্পর্শসহতা,  
সামান্য স্পর্শে বা চাপে বর্দ্ধিত হয় নড়িতে চড়িতেও বেদনাব  
বৃদ্ধি হয় । বোগী চিৎ হইয়া ও জালুপদ উন্নত বাখিয়া শয়ন করিয়া  
থাকে উদবে টানবোধ, উষ্ণতা ও অনেক সময় উদরাধ্বান  
থাকে কোষ্ঠবদ্ধ, বমন, বিবমিগা, চর্ম্ম শুষ্ক ও জালাযুক্ত, দ্রুত ও  
ক্ষীণ নাড়ী, শ্বাস দ্রুত, অনেক সময় হিকা ও জিহ্বা গাঢ় মলান্বিত  
হয় মুখাকৃতি উৎকর্ষা ও ক্লেণব্যঞ্জক কিছু কাল পবে আধ্বান  
তিরোহিত হইয়া উদব বসন্তাব হেতু বিস্তৃত হয় বোগ সাংঘা-  
তিক হইবার উপক্রমে উদব অত্যন্ত বিস্তৃত ও পূর্ণ, নাড়ী তাববৎ ও  
অত্যন্ত দ্রুত, মুখাকৃতি মৃতবৎ, শীতল শ্বেদজাব এবং অবশেষে  
বোগাক্রমণেব ৮ ১০ দিনেব মধ্যে মৃত্যু সংঘটিত হয়

চিকিৎসা ।—অবসাদক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা এই রোগে  
বিশেষ সফল উপলব্ধি হয় না ইহার সর্বপ্রধান ঔষধ ওপি-  
য়ম ইহা এক গ্রেণ মাত্রায় ৩ ৪ ঘণ্টান্তর দিবে অর্থাৎ যতক্ষণ

ক্রনিক পেরিটোনাইটিস—উদরচ্ছদের পুরাতন প্রদাহ। ২৮৫

বেদনার শাস্তি না হয় ওপিয়ম সপোজিটরী ১৬৬। ওপিয়ম ও একোনাইট। ওপিয়ম ও বেলেডোনা ১০১। পলীহেড্ ফোমে ন্টেসন, উদরপ্রদেশে বেলেডোনা ও ওপিয়ম এব ষ্ট্রাক্ট মর্দিন করিয়া পরে তত্পরি ফোমেণ্টেসন। হেম্লক, লিনসিড প্রভৃতির পুণটীস, টর্পেন্টাইন্ ষ্ট্রুপ্, অস্ত্রে সঞ্চিত মল থাকিলে ঐষদ্রব্য জলে মাবান গুলিয়া পীচকারি দিবে এবোণে বিরেচক ঔষধ অপকারী রোগীকে প্রথমে টি, য়াবাক্রট, দুগ্ধ, জল, বরফ, যবেব মণ্ডাদি দিবে। অবসন্নতাব লক্ষণ প্রকাশিত হইলে ত্রাণ্ডি, মাংসের যুষ, য়ারোমে-টীক স্পিবিট অব্ এমোনিয়া, স্পিবিট ইথর প্রভৃতি দিবে রোগীকে শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখিবে বোণির গৃহ বিশুদ্ধ বায়ুপূর্ণ হওয়া কর্তব্য ইহা বিবিধ রোগের সঙ্গে আনুযজিক ভাবে সমুপস্থিত হয়, ইহা স্মরণ রাখিয়া কারণানুযায়ী চিকিৎসো-পায় অবলম্বনীয়। বমন বেশী হইতে থাকিলে অন্ন মাত্রায় মর্ফিয়া ষ্ট্র গ্রেণ ক্ষুদ্র বটিকাকারে দেওয়া যায়। বমনেব ভর না থাকিলে টিং ওপিয়ম ব্যবহার করা যায়

---

ক্রনিক পেরিটোনাইটিস — উদরচ্ছদের পুরাতন  
প্রদাহ।

সময় ২২৩ তরণ প্রদাহ ৩ বসানে ও অনেক সময় আত্মনাশনি উপস্থিত হয় অন্ত্রচ্ছদে গুটিকা সঞ্চিত হইলে এক প্রকার প্রাচীন প্রদাহ জন্মে, তাহাকে টুবরকিউলার পেরিটোনাইটিস বলে।

লক্ষণ। —কিছু অস্পষ্ট উদববেদনা সামান্য প্রকার শূলবেদনাক্রমণ, জ্বর সহ দুর্দমা উদরায়ণ উদর শীত ও

স্পর্শসহ বিবমিষা, বজ্রহীনতা ও শীর্ণতা, রসজ্ঞাব হেতু উদর ক্ষীতি সঞ্চারিত পদার্থের সঞ্চার অন্তর্গতক বিলীপ্ত গ্রন্থি-পীড়া ও যক্ষ্মাকাসাদি বর্তমান থাকিতে পারে। বোগ সহস্রই সাংঘাতিক হয়।

চিকিৎসা। —পরিপাকক্রিয়া বাহ্যে সৃষ্টজলভাবে সম্পাদিত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত সহজ পাচ্য অংচ পুষ্টি-কারণক খাদ্য, তৃষ্ণ, মাখম, ভিষ ও মাংসেব যুষ দিবে উদর প্রদেশে উত্তেজক মর্দন ৪১, ৪৩, ৫০, ৫২ পেপসিন ৩১৭; আইয়োডাইড্ অব্ আয়ব ১৮১, ৪০৩ ফস্ফেট অব্ আয়বণ বা লাইম ১৮৭, ৪৩০ কডলিওব অয়েল, কুইনাইন, বার্ক আইয়োডিন নিমেন্ট উদবপ্রদেশে মর্দন সামুদ্রিক বায়ু সেবন কোষ্ঠবদ্ধ, উদবাধান, বমন, উদরাময় ও অন্ত্রাণ উপসর্গ সাধারণ প্রণালী অবলম্বনে চিকিৎসা করা কর্তব্য

### র্যাসাইটিস—উদরী

ইহাতে উদর গহ্বরস্থ মাস্তক বিলীপ্তে জলীয় রস সঞ্চিত হইয়া উদর ক্ষীত ও সটান হয় প্রাচীন অন্ত্রচ্ছেদ প্রদাহ, যক্ষ্ম কাঠিণ, কর্কটকা, পিত্তোৎপাদিকা শিবার অববোধ, যক্ষ্মেব মেদাপকৃষ্টতা, মূত্রগ্রন্থির পীড়া, হৃৎপীড়া, প্লীহা বিবৃদ্ধি ও অন্ত্রাণ কারণে এই বোগ জন্মে

লক্ষণ। —শরীরের উর্দ্ধাংশ শীর্ণ, মুখমণ্ডল কুঞ্চিত, মুখা-কৃতি উৎকর্ষাজ্ঞাপক, উদর অতিশয় ক্ষীত, চর্ম চিকণ, চর্মনিয়ন্ত্র শিবা প্রসারিত উদবাভ্যন্তবে জল সঞ্চলন অনুভূত হয় বর্দ্ধিতাবস্থায় শ্বাসকৃচ্ছ, শাখাদিতে শোথ ও মূত্রগ্রন্থিব পীড়াজনিত

উদরীতে মুখমণ্ডল ও বাহ্যতে শোথ । মূত্র স্বল্প ও ঘূৰ্বেট পূর্ণ ।  
সিবোসিস বোগজাত মূত্রে পিত্ত থাকে সার্কাসিক স্বাস্থ্য বিনষ্ট,  
দুৰ্বলতা ও শীর্ণতা । ক্ষুধা লোপ, ও অনিদ্রা । শয়ন করিতে  
অপাবগতা, সাতিশয় অবসন্নতা । যান্ত্রিক রোগজাত উদরী অব-  
শেষে সাংঘাতিক হয় ।

চিকিৎসা ।—উদরাত্যন্তবে সঞ্চিত রস শোষণার্থ উগ্র  
বিবেচক ও মূত্রকাবক ঔষধ প্রয়োজ্য বিবেচনার্থ—কম্পাউণ্ড  
জেলোপ পাউডব ; ইলিটেব্রিয়ম ৩৩৮, ৩৪৮ ; প ডিফিলিন ২৪৭ ,  
গ্যাংগোজ ৩৪৫ ; ক্রোটন অয়েল ৩৪৬ মূত্রকরণার্থ এসিটেট  
অব্ পটাশ ও ডিজিটেলিস ৩৬৩ , নাইট্রিক ইথর ও জুনিপার  
৩৬৮ , ট্যারাকসেকম ও স্কোপেনিয়াই ৩৬৪ , জুনিপার ও স্কোপে-  
রিয়াই ৩৬৫ ; পটাশী নাইট্রস ও বুকু ৩৬২ । ক্লোরাইড অব্ এমো-  
নিয়ম ও ট্যাবাকসেকম ৪১২ আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম ও  
এমোনিয়া সাইটেট অব্ আয়রন ডিজিটেলীম পএর পুঙ্খটীম  
উদবোপরি দিলে অত্যন্ত প্রস্রাব হয় মূত্রগ্রন্থি পীড়া প্রযুক্ত  
উদরী হইলে মূত্রকাবক ঔষধ প্রয়োগ হিতকর নহে বলকরণার্থ  
কুইনাইন ; আয়ব ; নাইট্রিক এসিড ডিল প্রভৃতি, তিষ্ঠ বহুকাবক  
ঔষধের ফাণ্ট সহ প্রয়োজ্য ট্যাপ্ কব্রিয়া জলীয় পার্থ নিঃসারিত  
করিলেও উপকার হয় কেহ কেহ মার্কবী খাটত ঔষধ সেবনের  
অল্পমোদন করেন ঈষৎক্ষণে মল ও বাত মল প্রয়োজ্য ।



ডিজিজেন্স অব্‌ দি ইউরিনারী অর্গ্যান্স ।

( মূত্রযন্ত্রাদির পীড়া । )

সপিউরেটীভ্‌ নিফ্রাইটিস্‌ ।

( সপুষ্মমূত্রগ্রন্থি-প্রদাহ )

এই রোগ সচবাচর উৎপন্ন হয় না । গণ্ডমালা ধাতুপ্রকৃতিক লোকদেব বিশেষ কোন উত্তেজক কারণ অবর্তমানেও উপস্থিত হইতে পারে শৈত্য, আর্দ্রতা, অশ্মরী, আঘাত, অপরিমিততা, অধিক মূত্রকাবক ঔষধ ব্যবহার প্রভৃতি কাবণে মূত্রগ্রন্থি-প্রদাহ জন্মিতে পারে । প্রদাহ শান্তি বা উহা পূষোৎপত্তিতে পরিণত হয় ন'ন'ক'বেব স্ফোটক জন্মিতে পারে, তদ্বৈতু সময় সময় সমস্ত গ্রন্থি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়

লক্ষণ ।—কটিদেশে তীব্র বেদনা, চাপে বা শ্রমে বর্দ্ধিত হয় বেদনা অনেক সময় মূত্রপ্রণালীতে বিস্তৃত হওত মূত্রাশয়ের গ্রীবা পর্য্যাপ্ত আগত হয় এবং তথা হইতে কুচ্কী, অণ্ডকোষ বা মুখে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে উরু অবশ, মুক্‌ কুঞ্চিত । সাতিশয সার্কাস্টিক অশ্রুত্বতা, কম্প, জ্বর, বমন ও বিবমিষা নাড়ী কঠিন, পুষ্ট ও দ্রুত ; কোষ্ঠবদ্ধ, উদবাধান সতত প্রবল মূত্রত্যাগেচ্ছা ; মূত্র রক্তবর্ণ, অনেক সময় উহাতে মূত্রগ্রন্থির ছাঁচ ও পুষ্মরক্তাদি মিশ্রিত থাকে কখন কখন মূত্রশ্রাব আদৌ হয় না, তদ্বৈতু যুরিমিয়া বা মূত্রান্নুৎপত্তি-জনিত বিকার সমুপস্থিত হইয়া থাকে । আক্ষেপ ও অট্টেতন্যাবস্থা প্রাহুভূত হইতে পারে । রোগ আরোগ্য হইলে পুনবায হইবার প্রবণতা থাকে স্ফোটক জন্মিলে ক্ষত হয় ।

চিকিৎসা। —কোমরে পুঃ টীস, ফোমেটেসন, উষ্ণজলে কোমব ডুবাইয়া রাখা, উষ্ণ জলে একষ্ট্রাক্ট পপী, ওপিয়াম বা বেলেডোনা গুলিয়া দিবে মূছ বেচক ও স্নেদজনক ঔষধ সহ ডোঃস পাউডব মূত্রগ্রস্থির ক্রিয়া বিগাম বাথিয়া শরীবস্থ অবি-  
জ্ঞ পদার্থ চর্ম ও অন্তের দ্বাৰা নিঃসারিত কবিবে বিবেচনার্থ রেজিন অব্ জেলাপ ২ ও গ্রেণ ও তৎসঙ্গে পডফিলিন বেজিন অর্দ্ধ গ্রেণ মিশ্রিত কবিয়া দিবে পথ্য লঘু হইবে বমন থাকিলে পাকাক্ষয়োপশ্লি মর্টার্ড প্লাষ্টব অবসন্নতা বা পুঃোৎতিব লক্ষণ প্রকাশিত হইলে বোগীব শারীরিক বল সংবক্ষণেব চেষ্টা কবিবে ;  
এতদর্থে ছুফ, মাখম, ডিম্ব, মাংসেবযুষ, কড্‌লিওব অয়েল, লিকুইড্ একষ্ট্রাক্ট অব্ বর্ক লবিপাকক্ষতি ওল থাকিনে গাট্‌ জব্য সেবনার্থ দিবে

### একিউট্ ব্রাইট্‌স ডিজিজ বা য়্যাল্‌বিউ- মিনিউরিয়া ।

অপরিমিততা, অনাহার, শৈত্য ও আর্দ্রতা, আরক্ত জ্বর প্রভৃতি কাৰণে মূত্রগ্রস্থিব জৈব বোগ জন্মে ইপিথিলিয়েল কোষ ও স্ক্‌ম স্ক্‌ম মূত্রপ্রণালীত পীড়া হয় স্বাভাবিকাবস্থায় মূত্রগ্রস্থি হইতে যে পদার্থ দূবীভূত না হয়, এরোগে ইপিথিলিয়েল কোষ ও স্ক্‌ম স্ক্‌ম মূত্রপ্রণালী দ্বাৰা তৎকার্য সম্পাদিত হওয়ায় উহার পীড়াক্রান্ত হয় । কোষ সমূহেব ক্রিয়া পরিবর্তিত হওয়ায় উহাদেব আকার হ্রাসিত বা নষ্ট হয় এই ব্রিত্ত ধ্বংস বস্তুঃ মূত্রপ্রণালী অবকল হইয়া শ্রাব অল্প হয় মাল্‌পিজিয়ান টফ্টেব রক্তাধাৰেব ভিতর রক্ত সঞ্চালনেব ব্যাঘাত জন্মিবায় প্রণালীর মধ্যে মাস্তক ও

সৌত্রীণ ক্ষরণ হইতে থাকে এই মাস্তক বস মুত্রের সহিত মিশ্রিত হইয়া উহাকে আঙুলালিক কবে সৌত্রীণ পদার্থ গাঢ় হওত পবিত্যক্ত কোষে জড়ীভূত হয় এবং প্রস্রাব সহ নির্গত হইয়া যায় কোন রক্তাধার ফাটিয়া গেলে তৎসহ রক্তকণা দৃষ্ট হয় মুত্রের নীচে কৃষ্ণবর্ণ স্থিতি পড়ে ইপিথিলিয়ম পতিত না হইলেও সময় সময় উদবী, শোথ ও আঙুলালিক মুত্রপীড়া জন্মে

লক্ষণ । শীত, কক্ষ, উত্তাপ, শিবোবেদনা, তৃষ্ণা, অস্থিরতা, কটিদেশে বেদনা ও স্পর্শসহতা বমন, উদবী, মুখমণ্ডল প্রথমে ক্ষীত হইয়া পরে সর্ব শবীরে শোথ প্রকাশিত হয় মুত্র স্বল্প ধূস্রবর্ণ, উহাতে আঙুলালিক পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকে শোথ ক্রমিতে অরক্ত হইলে রোগীরোগের সম্ভাবনা, মুত্রের পরিমাণাধিকা ও মুত্র আঙুলালিক পদার্থের হাসতা শুভকর। অমঙ্গলকর লক্ষণযুক্ত রোগীর মূত্রান্তপত্তি হইয়া বিকার জন্মে

চিকিৎসা . লবু পথা, তুষ্ক, যোল, চা, লীতল জল, যবোদক, লিমনেড, বরফ উষ্ণজলে স্নান, ব্লান্কেট বাথ, উষ্ণ বাষ্প স্নান, কোমরে ড্রাই কপিং ও লিনসিড্ পুলটীস কম্পাউণ্ড জেলাপ পাউডর, সলফেট ও কার্বনেট অব্ ম্যাগ্নিসিয়া ৩৩১ ; সলফেট অব্ ম্যাগ্নিসিয়া ও ভাইনম এন্টিমোনিয়েলীস, বেজিন অব্ পডফিলিন ৩৪৭, ইলিটেব্রিয়ম ৩৪৮, ৩৩৮ ; সলিউশন অব্ এসিটেট অব্ পটাশ বা এমোনিয়া নাইট্রেট অব্ পটাশ ও নাইট্রাস ইথর ২৮৯, ৩৬৮, তৎপরে টিংচর অব্ পারক্লোরাইড্ অব্ আয়রন ১৭১, ফস্ফেট অব্ আয়রন ১৮৭ আয়রন এলম ; কুইনাইন, গাত্রে ফ্লানেল বা অন্য কোন পশমী বস্ত্র ধারণ করিবে স্পিৰিট ও বিয়ার পান নিষিদ্ধ। আবশ্যক স্থলে পোর্ট ও ক্লাবেট

সেবা । মাংস, ডিম ও উদ্ভেজক ব্যবহার অহিতকর তরণাবস্থা  
বিগত হইলে অল্প পথ্য দেওয়া যায় সাইট্রেট অব্ পটাশ্,  
ও টিংচর একোনাইট—জব সবে ডিজিটেলিস অহিতকর মূত্র  
কাবক তরণাবস্থান্তে কথিইন সাইটস এই পীড়ায় পটাশ  
সল্ট অপেক্ষা সোডা সল্ট অধিক হিতকর, কারণ পটাশে ম্যুরিমিয়া  
হওয়ার আশঙ্কা থাকে ছুফে পটাশ সল্ট বেশী না থাকায় এই  
পীড়ায় বিশেষ উপযোগী

### ক্রনিক ব্রাইটস ডিজিজ ।

এই বোগে মূত্রগ্রন্থি হইতে ইপিথিলিয়াম বা উপত্যক পরিপুষ্টিত  
হইয়া থাকে ও তাহা মূত্রে দৃষ্ট হয় মূত্রনালীতে লিথু উপত্যক  
ক্রমশঃ বিনষ্ট ও শুষ্ক হয়, কখন বা উহা অপর বিধান দ্বারা পরি-  
পূরিত হয় মূত্রগ্রন্থি সংকুচিত ও দানাগয় দৃষ্ট হয় মূত্র আণু-  
লালিক এই বোগ তরুণ প্রদাহের পর অথবা প্রাচীন গোট বা  
তরুণ রোগের সহিত সমুপস্থিত হইতে পারে

লক্ষণ । মূহভাবে উপস্থিত হয় । শ্বাস্থ্য ক্রমশঃ বিনষ্ট,  
দৌর্বল্য, শীর্ণতা রক্তে বিশেষ পরিবর্তন সংঘটিত হয় শোথ,  
উদবী, মাস্তক বিল্লীত প্রদাহ, হৃৎপিণ্ড বিবৃদ্ধি, সম্ভবতঃ হৃৎকণাটের  
পীড়া শ্বাসুকেজের বিধান বিকাব ও জিয়াঘটিত উপসর্গ

চিকিৎসা । —মূত্রগ্রন্থির প্রদাহের প্রথমদর্শন টিংচর  
একোনাইট ব্যবহার্য্য । আক্ষেপে ব্রোমাইড অব্ পটাশিয়াম ।  
টিংচর ক্যানেনবিস ইণ্ডিকা সবক্ত প্রস্রাবে বিশেষ উপকারী ।  
তরুণ প্রদাহ কথঞ্চিৎ উপশান্ত হইলে টিংচর ক্যানথানাইডিস  
১ মিনিম মাত্রায় তিন ঘণ্টাওর সেবনে রক্ত প্রস্রাব নিবানিত হয় ।



কোন কোন বোগে ডিজিটেলিস বিশেষ উপকারী । লক্ষণানুসারে চিকিৎসা করিবে । পুষ্টিকারক পথা, চর্ম্মের ক্রিয়া যাহাতে সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন হয়, তৎপ্রতি দৃষ্ট রাখিবে । গাউট বা বাতবক্ত বোগ থাকিলে তাহার চিকিৎসা করিবে । লৌহঘটিত বলকবোষধ সেবন, বায়ু পবিত্তন, সমুদ্র বায়ু সেবন । শরীর উপদংশ বিষে দূষিত থাকিলে আইয়োডাইড্‌ অব্‌ পটাশিয়াম ও আইয়োডাইড্‌ অব্‌ আয়রন্‌ বোগীৰ শরীর ফ্রান্স দ্বারা আবৃত রাখিতে উপদেশ দিবে । ঠাণ্ডা লাগাইতে নিষেধ করিবে । সময় সময় প্রাচীন পীড়া-ক্রান্ত ব্যক্তিদেরও তৎকালক্রমণ উপস্থিত হয় । প্রাচীন পীড়ায় মূত্রকারক ব্যবস্থায় ডিজিটেলিস, ট্রোফাইস, কফিন সাইট্রস, ডাই-যুবিটিন, কোপেবা, টর্পেন্টাইন, পাইলো কার্পিন ইত্যাদি ব্যবহার্য্য নাইট্রো গ্লিসিবিণ ১ পার্সেণ্ট সলিউশন  $\frac{1}{2}$  মিনিম মাত্রায় মূত্রকারক হয়, ৪ ঘণ্টান্তর সেবা । বেনজোয়েট অব্‌ সোডা ১৫ গ্রেণ মাত্রায় সেবনে যুবিমিয়া নিবাবিত হয় । ল্যাক্টেট অব্‌ ট্রুনসিয়া ১৫ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগে উপকার দর্শিয়াছে ।

### ডায়ুরেসিস —মূত্রাবিক্য ।

অধিক পরিমাণে প্রস্রাব নিঃসৃত হয়, কিন্তু তাহাতে শর্করা বা অপব কোন অনৈসর্গিক পদার্থ থাকে না ।

লক্ষণ । —অতৃপ্তিকর তৃষ্ণা, তৎসঙ্গে অধিক পরিমিত প্রস্রাব নিঃসরণ । মূত্রেব কেবল জলীয় অংশ বর্দ্ধিত হয় । সার্বী-জিক স্বাস্থ্যাব অপকৃষ্টতা জন্মে । কখন কখন শোথ উপস্থিত হয় ।

চিকিৎসা । —টিংচর পাবক্লোরাইড্‌ অব্‌ আয়রন্‌ ১৭১, ১৭৬ এমোনিয়ো আয়রন্‌ স্যালিস । রাত্রিতে শয়নকালে এক

মাত্রা ওপিয়ম। চর্মের ক্রিয়া রুদ্ধ থাকিলে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান।  
ভেলিরিয়ান চূর্ণ ১০—১৫ গ্রেণ দিনে তিনবার শরীর দুর্বল  
হইতে থাকিলে কডলিভর অয়েল, ফ'ফ'রিক এসিড ও নক্সভমিক',  
মাংসের যুগ।

### হিমাচিউরিয়া—রক্তপ্রস্রাব।

মূত্রগ্রন্থি, মূত্রাশয় বা মূত্রমার্গস্থ মৈথিক বিধ্বী হইতে রক্ত ক্ষবিত  
হইয়া মূত্রেব সঙ্গে নিঃসৃত হয়

লক্ষণ।—মূত্র কৃষ্ণ বা ধূসবর্ণ; মূত্রে আণুলালিক পদার্থ  
মূত্রগ্রন্থি হইতে বক্তপ্রাব হইলে মূত্রেব সহিত রক্তমিশ্রিত থাকে।  
মূত্রাশয় বা মূত্রমার্গ হইতে রক্তপ্রাব হইলে পরিষ্কার প্রস্রাব ত্যাগের  
পর রক্ত বাহিব হয়

চিকিৎসা।—ক্যাথেরাইডিস বা তার্পিন তৈলাদি সেবন  
বশতঃ রোগ জন্মিলে ক্যান্ফব ২—৫ গ্রেণ ওগোজ্য ক্যানেনবিস  
ইণ্ডিকা ব্যবহারে সফল উপলব্ধি হয়। হামাগিলিস টিংচব বা ইহাব  
সার হেজিলিন ব্যবহারে উপকার হয় অতি অল্প মাত্রায় তার্পিন  
তৈল সেবন টিংচর অব্ পারক্লোরাইড অব্ আয়ক ১৭১ ;  
গ্যালিক এসিড ২১৮, ৪৩১ ; এসিড মল্ফিউবিক ডিল্ ২১২ ;  
ইনকিঃ ম্যাটিকো , টর্পেন্টাইন্ অয়েল ২১৭ , ক্রিমোডোটি ; আগট  
অব্ রাই ; ওপিয়ম বা মর্ফিয়া কোমরে বনফ স্থাপন ও টার্পিন  
তৈলের সেক, লিনসিড ও মর্টার্ড প্রাষ্টর উষ্ণ বাষ্প স্নান, ঈষদুষ্ণ  
জলে স্নান মূত্রমার্গ দিয়া রক্তপ্রাব হইতে থাকিলে বনফ স্থানিক  
সংলগ্ন করিবে। মূত্রাশয় হইতে রক্তপ্রাব হইতে থাকিলে ম্যালম ;  
ট্যানিক এসিড ( ৩০ গ্রেণ, জল ১০ আউন্স ) পীচকারি দিবে

টিংচর জেবোরাণ্ডি প্রয়োগে যিনেল রক্তস্রাব নিবারিত হয়  
ম্যালেরিয়া জনিত রক্তস্রাবে কুইনিন হিতকর ।

## কাইলস ইউরিণ—দুগ্ধবৎ মূত্র ।

### কাইলিউরিয়া ।

অণুমাত্রায় মেদাক্ত পদার্থ থাকি বশতঃ মূত্র দুগ্ধবৎ হয় তদ্ব্য-  
তীত মূত্রে বক্তকণা, সৌত্রীণ ও আঙুলালিক পদার্থ থাকিতে  
পারে

লক্ষণ ।—গাত্রগুরুতা, কাটিদেশে ও পাকাস্রয়োপরি বেদনা,  
মানসিক উৎকর্ষা, দুর্বলতা, শীর্ণতা । বোগ পর্য্যায়শীল অর্থাৎ মূত্র  
ছুই এক মাস স্বাভাবিক থাকিয়া পরে আবাব দুগ্ধবৎ হয় ।

চিকিৎসা ।—গ্যালিক এসিড ২০—২৪ গ্রেন দিনে তিন-  
বার ; টিংচর অব্ ষ্টীল ; কুইনাইন ও ষ্টীল ; এমোনিয়া সাইট্রেট  
অব্ আয়রণ ; কডলিভর অয়েল ; ওপিয়ম । বাষ্প স্নান, লবণ-  
মিশ্রিত জলে স্নান, পুষ্টিকর পথ্য, বায়ু পরিবর্তন আইয়োডাইড  
পটাসিয়ম, সিরপ ফেরি আইয়োডাইড বিশেষ উপকারী সোডা  
বেনজোয়াস ।

## রিনেল ক্যাল্কিউলাই—মূত্রগ্রন্থিক ক্ষুদ্রাশরী ।

এই প্রকার অশরী মূত্রগ্রন্থি ও মূত্রাশয় প্রভৃতি স্থানে থাকে ।  
সময় সময় মূত্রগ্রন্থালীতেও দৃষ্ট হয় । মূত্রগ্রন্থি বা মূত্রাশয় হইতে  
আসিয়া মূত্রমার্গে স্থিত হয় । ইহারা বিবিধ উপাদান সংযোগে  
গঠিত হয় । তন্মধ্যে যুবিব এসিড, যুবেট অব্ এমোনিয়া, ফস্ফেট

অব্ লাইম, ফস্ফেট অব্ ম্যাগ্নিসিয়া, এমোনিয়া, অক্সেলেট  
/ অব্ লাইম, কার্বনেট অব্ লাইম ইত্যাদি প্রধান । ইহাদের  
আকার কখন ক্ষুদ্র ও কখন বড় হইতে পারে

মূত্রগ্রস্থিতে অশ্মরী থাকিলে—সতত পৃষ্ঠবেদনা, সরক্ত মূত্র,  
দুর্বলিত যন্ত্র প্রাণিষ্ঠ উদ্দীপনা, স্নায়বীয় উগ্রতা অবশেষে শ্বাস-  
হানি, বলহানি ও শীর্ণতা । এতদ্বারা গ্রস্থি প্রসারিত বা উহার  
মধ্যে পুষ্টিপত্রের ব্যাঘাত জন্মিবায় রক্ত অনিশুদ্ধ ও তদ্বৎ বিকার  
সমুপস্থিত হইতে পারে

মূত্রাশয়ে অশ্মরী থাকিলে—মূত্রাশয় ও বিটদেশে তীব্র বেদনা,  
পরিশ্রমে বেদনা বৃদ্ধি ও পুনরাবিভূত হয় সতত  
মূত্রত্যাগ করিতে হয়, কখন বা অনৈচ্ছিক ভাবে প্রস্রাব নির্গত  
হয় । মূত্রে শ্লেষ্মা থাকে বশতঃ উহা ঘন দেখায় সময়  
সময় উহাতে পুষ্টি বা বক্ত মিশ্রিত থাকে মূত্রাশয়েব গ্রীবাদেশে  
অশ্মরী আসিয়া আবদ্ধ হইলে প্রস্রাব বদ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু উহা  
আবাব সরিয়া গেলে প্রস্রাব হইতে থাকে কোতানি ও  
গুদপ্রদেশে উপস্থিত হয়

চিকিৎসা ।—সার্ভাস্থিক লক্ষণ নিবারণ ও অশ্মরীর পুন-  
রুদ্ধব নিবারণ কবাব চেষ্টা করিবে সার্ভাস্থিক শ্বাস উন্নত  
করাব জল শুষ্ক মাংস, মাংস ও ডিম্ব সেবনার্থ দিবে । মদ্যপান  
অর্থাৎ হুইকী ১—২ আং জলসহ পান বিশেষ উপকারী ।  
কডলিভর অয়েল সেবন হিতকর বেদনা নিবারণার্থ কোমবে  
বেলেডোনা পাষ্টর রক্তপ্রাব নিবারণার্থ টিংচর ষ্টীল ; টিংচর  
হামামেলিস , আয়রন স্যালাইন ও গ্যালিক এসিড । অধিক  
পরিমাণে জল, মিনাবেল ওয়াটার্স ইউরিক এসিড ডায়াবিসিসে



উদ্ভিজ্জ দ্রব্য আহাৰ, নিষ্ক পানীয়, মৃৎ ব্যায়াম, ভিসি ও কার্লস  
 মাড ওয়াটব, সল্টস অব্ পটাশ ( সাইট্রেট ও বাইকার্বনেট অব্  
 পটাশ ), লাইকব পটাশ ফস্ফেটীক ডায়াথিসিসে নাইট্রো  
 মিউবিয়েটীক এসিড ডিল, বার্ক ; আয়ব ; ওপিয়ম । রিনেল  
 ক্যালকিউলাই নিঃসরণের সময় বেদনার আতিশয় নিবারণার্থ  
 হট বাথ উপকারী ½ গ্রো মর্ফিয়ার অধস্তাচ প্রক্ষেপ । কোমবে  
 উষ্ণ জলপূর্ণ বোতল সংস্থাপন মলদ্বারে গৰম জলের পিচকাবি  
 বা মফিয়া সপোজিটরী । কোমবে উষ্ণ পুলটীস ও স্বেদ প্রয়োজ্য ।  
 অক্সিজেনেট অব্ লাইম ষ্টোনেও সাইট্রেট অব্ পটাশ উপকারী ।

**ইরিটেবিলিটী অব্ দি ব্লাডর—মূত্রাশয়ের উদ্দীপনা ।**

মূত্রাশয়ের উগ্রতা ও ঘন ঘন প্রস্রাব ত্যাগ এই পীড়ার পবি-  
 চায়ক । মূত্রগ্রস্থি, মূত্রাশয়, মুখশাযী গ্রস্থি বা মূত্রমার্গেব বৈধানিক  
 পীড়া বশতঃ এই পীড়া জন্মিতে পারে স্ত্রীলোকেব মূত্রমার্গে  
 রক্তাক্তবুদ, স্থানচ্যুত বা বিবৃদ্ধ জবাযুব চাপ, অর্শজনিত উদ্দীপনা  
 বা অন্ধকুমি, মূত্রাশয়েব মধ্যে অর্কবুদ বা অশ্মবীৰ সংস্থিতি কিম্বা  
 মূত্রগ্রস্থি, মূত্রাশয়, পাকশয় বা স্নায়ুমণ্ডলেব ক্রিয়া-বিশৃঙ্খলাও এই  
 পীড়ার কারণ মধ্যে পরিগণিত

**লক্ষণ ।**—অকস্মাৎ ঘন ঘন প্রস্রাব ত্যাগ কবিবার ইচ্ছা  
 হয় ১৫ বা ৩০ মিনিট অন্তর প্রস্রাব কৰিতে হয় রোগী  
 প্রস্রাব না করিয়া থাকিতে পারে না, অর্থাৎ মূত্রেব বেগ ধাবণ  
 কবিলে অল্পখ ও কণ্ঠকণে বেদনা বোধ হয় । মূত্র সমষ্টি কবিলে  
 পৰিমাণাধিক হয় ন মূত্রাশয়েব আকৃতি ছোট হইয়া পড়ে  
 ক্লেণকব উদ্দীপনা বশতঃ সার্বাস্থিক স্বাস্থ্য হানি হয় মূত্র

পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত, কাবং এতদ্বারা বোগ নির্ণয়ের অনেক সাহায্য হয়

চিকিৎসা । —উৎকর্ষক পানীয় (সুৰ, কফি প্রভৃতি) নিষিদ্ধ । ছন্ধ, কোকোয়া, মিউসিলেজযুক্ত পানীয়, ঈষদুষ্ণ জলে স্নান উপকারী । ডাইলিউট নাইটো হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও ডিকক্সন অব্ প্যাবেরা এবং তৎসঙ্গে টিংচর বেলোডোনা । মূত্র অল্পযুক্ত থাকিলে নাইটর পটাশ অথবা সাইট্রেট অব্ পটাশ ও ইনফিঃ বকু কাউচ্ হ্রাসেব ডিকক্সন, ওপিয়েট সপোজিটবী । টিংচর হেনবেন বা বেলোডোনা, গিন্সিড্ ইনফিউ-জনের সঙ্গে মর্ফিয়া ১ গ্রেণ, জল ১ আউন্স মূত্রাশয়ে চিকিৎসা সার্বসঙ্গিক দুৰ্দ্ধলতা থাকিলে লৌহগটি ও বসবনোষধ টিংচর ক্যাহেবাইডিস ও ষ্টীল স্ট্রীলোকদের জন্ত বেলোডোনা ও অক্ সাইড্ অব্ জিঙ্কেব পেসারী । রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় শয্যাতে মূত্রতাগ করিলে টিংচর অব্ ষ্টীল ও বেলোডোনা । কটিদেশের নিয়ে স্পিষ্টাব, কটিদেশে ও তল্লিয়ে বেলোডোনা গাষ্টব, বেলোডোনা লিনিমেন্ট লবণ মিশ্রিত ঈষদুষ্ণ জলে স্নান, কড্‌লওব অয়েল অস্ত্রের উদ্দীপনা বশতঃ এইরূপ বোগ হইলে তাহাব প্রতিবিধান করা কর্তব্য প্রথমে বোগেব কাবং অনুসন্ধান ও নির্দ্ধাব করতঃ তদুপযোগী চিকিৎসোপায় অবলম্বনীয়

স্প্যাজম অব্ দি ব্লাডর মূত্রাশয়ের আক্ষেপ ।

মূত্রাশয়ে আক্ষেপিক বেদনাক্রমঃ । মূত্র শায় অগ্নাবা বা অর্ধদুদ, সরগাস্ত্র ও ক্ষরায়ুর পীড়া, মূত্র গ্রন্থিতে স্ফোটক, মূত্রাশয়ে ক্ষত বা অথ প্রকার বৈধানিক পীড়া, মুখাশ্মা গ্রন্থিব পীড়া, মূত্রের

অস্বাভাবিক অম্লত্ব, অপরিমিত মৈথুন, গুণনায়ু ও ক্যাঙ্সেবাইডিস  
জাদি উগ মূত্রকারক ঔষধ ব্যবহার, এই প্রকার পীড়ার কারণ

লক্ষণ । উদবেব নিম্নভাগ হইতে মূত্রমার্গ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ  
ভীত বেদনা। অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ, সময় সময় মূত্রাবরোধ ও  
প্রবল প্রস্রাবত্যাগেচ্ছা। কোতানি অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে  
প্রস্রাবানুৎপত্তি বশতঃ মৃত্যু সংঘটিত হয় ।

চিকিৎসা । উষ্ণজলে স্নান ; শ্বেদ ; মাদক সেবন ও  
শলদ্বারে প্রয়োগ। বোগেব কারণ গাউট বা প্রস্রাবে ইউবেটস  
থাকিলে কলচিকম, সোডা বা পটাশ বা লিগিয়া ওয়াটার ।  
মূত্রগস্থিতে পুয়োৎপত্তি হইয়া তাহা মূত্রাশয়ে আগত হওয়া প্রযুক্ত  
আক্ষেপ উপস্থিত হইলে কার্বলিক এসিড, বোরিক এসিড ও  
মর্ফিয়ার ধাবনেব চিকিৎসা দ্বারা মূত্রাশয় শোত করিবে। বোগীকে  
পুষ্টিকারক খাদ্য ও কল্‌লিওব অয়েল দিবে। অশ্রাবী থাকিলে  
অস্ত্র কবিত্তে হয়। ক্যাম্ফর, লিন্সিড্‌ পুলটীসেব সঙ্গে গুহদ্বারেব  
উপরে দিবে। মর্ফিয়া ও বেলেডোনা সেবনার্থ বা উহাব অধস্তাচ  
প্রক্ষেপ ও মপোজিটরী পুষ্টিবর খাদ্য, দুগ্ধ, চিউসিলেজযুক্ত  
পানীয়। উত্তেজক ঔষধ, স্ত্রীসংসর্গ ও অশ্বারোহণ নিষিদ্ধ ।

প্যারালিসিস অব্‌ দি ব্লাডর—মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত ।

মূত্রাশয়েব পৈশিকাবরণ পক্ষাঘাতাক্রান্ত হয়। মূত্রাশয়েব  
পীড়া, শাযুকেজ্বেব বোগ বা সার্কালিক দুর্বলতা হইতে এই  
পীড়া জন্মে ।

লক্ষণ ।—মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাতে মূত্র উহাব মধ্যে থাকে  
যখন মূত্র দ্বারা উহা অত্যন্ত পূর্ণ হয়, তখন মূত্রমার্গ দিয়া ফোঁটা

ফোঁটা কবিতা প্রস্রাব নির্গত হয় । প্রস্রাবে শ্লেমা, ক্ষার ও এমোনিয়ার গন্ধ থাকে মূত্রাশয়ের গ্রীবাদেশে বেদনা ; বিজুতি অধিক হইলে মূত্রাশয়ের প্রাচীরের বোধহীনতা ও সার্কাটিক অস্বস্থতা সাধাবণতঃ অচেতন্যাবস্থা বা অবসন্নতা বশতঃ মৃত্যু হয়

চিকিৎসা ।—মূত্রাশয় মূত্রপূর্ণ থাকিলে শলাকা দ্বারা তাহা নিঃসারিত করিবে ঈষৎ জলে কয়েক ফোঁটা কার্বটিক এসিড মিশ্রিত কবিতা তদ্বাৰা মূত্রাশয়ে পিচকাবি দিবে মূত্রাশয়ের পৈশিক স্রাব সবল করণার্থ নীতলা জলেব পিচকাবি । অল্প মায়ায় ষ্ট্রীকনিয়া ও আর্গট অব্ বাই অথবা টিং ষ্ট্রীক সেবন গ্যালভানিজম, নীতলা জলেব ধাৰা, কটি স্নান, পৃষ্ঠবংশের অধোভাগে ব্রিষ্টার, কুইনাইন ও আয়বণ, যালোজমুক্ত বেচক । আর্গটিন ১ গ্রেণ, একট্রাঃ নক্স ৬ গ্রেণ, বিডিউস্ড আয়বণ ২ গ্রেণ একত্রে দিন ৩ বাব সেবন উপকারী

একিউট সিস্টাইটিস্—মূত্রাশয়ের তরুণ প্রদাহ ।

ইহা একটা গুরুতব পীড়া, আপনাপনিই উপস্থিত হয় অথবা প্রাচীন প্রদাহ, অশ্রুগীর উদ্দীপনা, বাহ্যিক আঘাত, বস্তিগতবস্ত্র যন্ত্রাদিব পীড়া বশতঃ এই বোগ গুণিতে পাবে মূত্রাশয়ের গ্রীবা ও অধঃ প্রদেশস্থ শৈল্পিক বিহী অত্যন্ত পৰ্ণ অপেক্ষা অধিক অক্রান্ত হয়

লক্ষণ ।—কম্প, মূত্রাশয়ে বেদনা, মূত্রদানে উত্তেজিত । মূত্রত মূত্রত্যাগেচ্ছা, কিন্তু প্রতিবাবে অল্প পরিমাণে হা প্রবল ক্ষণ, বিবমিষা, সার্কাটিক অস্বস্থতা, মানসিক অবসন্নতা বস্তিদোষ



শক্ত ও বেদনাবিত্ত হয়    তীব্র বেদনা বিটপ ও উক দেশ পর্যন্ত  
বিস্তৃত হইয়া পড়ে    কোষ্ঠানি, অসহ্য বেদনা । মূত্রাবরোধ ও  
বিন্দু বিন্দু মূত্র পতন    মূত্রে রক্ত পুষ্টিমিশ্রিত থাকে    সাতিশয়  
অবসন্নতা, শীতল স্বেদ, প্রলাপ

চিকিৎসা ।—মূত্রাশয় প্রদেশে মসিনার বড় রকম পুলটীস, পপী ফোমেণ্টেসন, উষ্ণ জল কটিনান    ক্যাষ্টর অয়েল আদি  
মৃদু বিরেচক দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার কবাইবে    প্রস্রাব অবরুদ্ধ  
থাকিলে শলাকা দ্বারা মূত্র নিঃসৃত কবিবে । গাউট জনিত  
পীড়ায় স্থালাইন পর্গেটিও ও তৎপরে কলচিকম ও পটাশ বাইকার্ব ।  
কোন স্থানে ক্যাথারাইডিসেব ব্লিষ্টার দেওয়ার ভয় পীড়া হইলে  
ব্লিষ্টার তুলিয়া দিবে ও তৎস্থানে উষ্ণ লিনসিড পুন্টস ও মল  
দ্বাবে ওপিয়মেব পিচকাবি দিবে ও সেবনার্থ হায়সায়ামাস ব্যবস্থা  
করিবে    বোগীকে লঘু পথ্য, বার্লি ওয়াটার, লিনসিড টি, ছন্ধ,  
ম্যাভারট, মিউসিলেজ ট্রাগাকান্থ বা গম এবেরিক দিবে    টি,  
কফি ও মদ্যপান নিষিদ্ধ    ওপিয়ম ও বেলডোনা সেবনার্থ  
ও মলদ্বারে সপজিটবী দিবে    যদি অশ্রবী থাকা বশতঃ প্রদাহ  
উৎপন্ন হয়, তবে শস্ত্রোপচার দ্বারা তাহা বাহির কবিবে । রোগীকে  
স্থিরভাবে শয্যাশয়ন কবাইয়া রাখা উচিত । বেদনা উপশমার্থ  
অর্ক প্রেণ মর্ফিয়াব বা বেলডোনার সপোজিটবী লিনসিড  
টিব সঙ্গে লাইকব পটাস, টিং হ'য়স'য়াম'স বা ওপিয়ম প্রযোজ্য  
বোবিক এসিড লোশন দ্বারা দ্রোতকরণ ।

ক্লনিক সিফটাইটস—মূত্রাশয়ের পুরাতন প্রদাহ ।

এই প্রাচীন প্রদাহ সাধ বৎ সময় সময় তরুণ প্রদাহান্তে,

অনেক সময় ষাত, মূত্রস্তম্ভ, উগ্রতা, বাহ্য বস্তুর সংস্থান বা সরল্যায় বা জরায়ু আদির প্রদাহ প্রসারিত হওয়া প্রযুক্ত এই পীড়া উপস্থিত হয় ।

লক্ষণ ।—অনেক সময় সামান্য প্রকার থাকে । অল্প-স্থতাবোধ মূত্রাশয়ের প্রাচীরেব বোধাত্মক্য সত্তত মূত্র-করণেচ্ছা মূত্র স্রব ও তৎসহ পুয় বা শ্লেষ্মা চিশিত থাকিতে পারে

চিকিৎসা ।—সম্ভব হইলে ক্রিয়াশীলস্বাসন ও তাহার চিকিৎসা করিবে টিংচর ক্যান্থেরাইডিস ১ হইতে ৫ ফোটা দিনে তিন বার সেবনে উপকার দর্শে আইরোডোমর্শের যৎ বর্জি বা সাপাজিটরী তার্গিন তৈল স্রব সাক্রায় প্রাচীর প্রদাহে উপ-কারক মূত্রের অল্পত্ব বিদূরনার্থ সাইট্রেট বা লাইকার্বনেট পটাশ বা লাইকর পটাশ বোগের কারণ বিদূরিত করিতে সর্বোত্তম মচৈ-ষ্টিত হওয়া কর্তব্য অধিবক্ষণ মূত্র থাকা বশতঃ মূত্রাশয়ের উগ্র ও না জন্মে, তদার্থে মধ্যে মধ্যে ববাবেন শলাকা দ্বারা মূত্র নিঃসৃত করিবে মধ্যে মধ্যে ৩৪ আউন্স ঈথর জল দ্বারা মূত্রাশয়ে পীচকাবি অথবা ৬ বা ৮ আউন্স জল, ২০ গ্রেণ একট্রী হান সায়ায়াস ও ৪ গ্রেণ ওপিগ অথবা ১৫ ২০ গ্রেণ বোবিক এসিড একত্রে গুলিয়া পীচকাবি দিবে তৎপরে প্রায় ১০ট অব্ ১ গিন্স ই ১ গ্রেণ, জল ২ ডাউন্স পীচকাবি দিবে, ১২ ডাউন্স তৎপরে বাহির না করিয়া কিছুক্ষণ মূত্রাশয়ের মধ্যে রাখিবে সংকোচক ঔষধের প্রয়োজন হইলে এসিটেট অব্ ৬ বা ট্যানিক এসিড ঈথর জলের সঙ্গে গুলিয়া পীচকাবি দিবে । সেবনাথ ইন যৎ ইউডা অর্সাই ও বকু অথবা ডিকক্সন অব্ ১০ প্যাবেনা ও ক ৬৮

গ্রাস স্নিগ্ধপানীয়, লিন্সিড্ ইনফিউজন, বার্লি ওয়াটার, আইস্-ল্যাণ্ড মস ডিককসন । ওপ্লিম ও বেলেডোনা সপোজিটবী ১৬৬ ; জীলোকদের জন্ত আইয়োডাইড্ অব্ লেড বা অক্সাইড্ অব্ জিঙ্ক ও বেলেডোনা পেসারি কটিদেশের অধোভাগে বেলেডোনা প্লাষ্টর বা ক্রোটন অয়েল লিনিমেন্ট বা আইয়োডিন লিনিমেন্ট । পথ্যার্থ পুষ্টিকারক খাদ্য দিবে চা ও কফি সেবন অনিষ্টকর । রোগী বৃদ্ধ, মদ্যপানে অভ্যস্ত, বা অভ্যস্ত দুর্বল হইলে অল্প পরিমাণে মদ্যপান করিতে দেওয়া বিধেয় । বিপাক শক্তির দুর্বলতাতে পেপ্সিম ইণ্ডিয়া রবারের শলাকায় তৈল না মাখাইয়া গ্লিসিবিণ অব্ বোরেসিস্ মাখান উচিত । বোরিক এসিড সেবনও হিতকর, ৫—১৫ গ্রেণ দুগ্ধ বা জলের সঙ্গে সেবন করিলে মূত্রের পচন নিবারণ কবে বেদনা নিবারণার্থ হায়সায়ামাই, বেলেডোনা এমোন ক্লোরাইড এই পীড়ায় বিশেষ উপকারী অয়েল স্ট্রাণ্টাল উপকারী বেদনা ও জ্বর নিবারণার্থ ফিনাসিটিন ও এন্টিপাইবিন উপযোগী ইউক্যালিপ্টাই, কোপেবা ও টর্পেন্টাইন অল্প মাত্রায় প্রয়োজ্য ।

### স্পার্মেটোরিয়া—শুক্রমেহ ।

সতত অনৈচ্ছিক ভাবে শুক্রক্ষরণ হওয়া বশতঃ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিশৃঙ্খলাবস্থা হস্তগৈথুন ইহার একটি সাধারণ কারণ

লক্ষণ । সার্বজিক দুর্বলতা, স্নায়বীয় উদ্দীপনা, জন্ত মনস্কতা, উদরাধান, কোষ্ঠবদ্ধ দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির হীনতা স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা হৃৎস্পন্দন, নিরোবৃণন, নিবোধেদনা,

শ্বাসশূল অত্যন্ত বর্ধিত রোগেব পরিণামে অস্মার, যক্ষা, ধ্বজভঙ্গ ও উন্মাদ'রোগ জন্মিতে পারে।

চিকিৎসা — ব্রোমাইড অব্ সোডিয়ম বিশেষ সফলপ্রাপ্ত মানসিক অবস্থাব উন্নতি বিধান আবশ্যক একট্রা বেলেডোনা ৬ গ্রেণ ও সলফেট অব্ জিঙ্ক দেড় গ্রেণ একত্রে এক বটিকা করিয়া দিনে ৩ ৪ বার সেবনে স্বপ্নদোষ নিবারিত হয় টিং ষ্টীল ও ক্যান্থে বাইডিস ডিজিটেলিস ইনফিউজন ১ বা ২ ড্রাম মাত্রায় সেবনে উপকার দর্শে হাইপোফস্ফাইট অব্ সোডা বা লাইম শুক্র-ক্ষরণ জনিত শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতায় ফস্ফরাস এই রোগেব সঙ্গে ধ্বজভঙ্গ থাকিলে প্রীকনিয়া অথবা ক্রিয়াব স্রুশু জ্বলা সম্পাদন'র্থ মূত্র বিবেচক ঔষধ সেবা সম্বন্ধীয় নৈর্দোষ বর্তমানে ফস্ফরিক এসিড ডিল ও টিংচর নক্সভমিকা ৪৩২ ; সলফেট অব্ জিঙ্ক ও একট্রাষ্ট নক্সভমিকা টিংচর অব্ ষ্টিল, কুইনাইন ও আয়রন। লবণ মিশ্রিত ঈষদুষ্ণ জলে স্নান কড়-লিভার অয়েল ; অল্প পরিমাণে তিত্ত এলু আসব। দুগ্ধ, চা ও কফি সেবন নিষিদ্ধ ক্যাম্ফর ও কোনিয়ম বা বেলেডোনা। ক্রিমি থাকিলে স্ট্রাণ্টোনাইন। পরিমিত শারীরিক ও মানসিক শ্রম, কঠিন শয্যা ৮ ঘণ্টাকাল নিদ্রা তামাক ও মদ্য সেবন নিষিদ্ধ। ফস্ফেট অব্ জিঙ্ক ৪২৯ ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়ম। মূত্রে অত্যন্ত অম্লান্বিত থাকিলে ক্ষার প্রয়োগে তাহা নিবারণ করিবে স্থানিক কাবণ অর্থাৎ প্রিপিউসেয় দীর্ঘতা, ফিমুর অব্ রেক্টম, অর্শ বা হেমবইড্‌স, ব্যালানাইটিস, ফাইমোসিস ইত্যাদি থাকিলে তাহা বিদূরণের চেষ্টা কর্তব্য।



## অর্কাইটিস্—মূক্ষ বা অণ্ড প্রদাহ ।

তরুণ মূক্ষ-প্রদাহ —প্রমেহ বোগের প্রদাহ মূত্রমার্গ হইতে প্রস্রাবিত হইয়া অণ্ড প্রদাহ জন্মে উগ্র ঔষধের পীচকারি, স্রাব-পান, অতিশয় শারীরিক শ্রম বা অণ্ডকোষ কোণীন দ্বারা উত্তো-লিত না রাখা ইত্যাদি কারণ বশতঃ প্রমেহজাত প্রদাহ মুক্ষে প্রস্রাবিত হইয়া থাকে । অণ্ডের মধ্যভাগ ও উহাব আবরণ আদিও প্রদাহিত হয় ।

লক্ষণ ।—বেতঃ বজ্জু ও অণ্ড বেদনা ও ভাববোধ ; কটিতে, কুচকীতে ও উরুর উপবংশে অসুখ বোধ ঘন ঘন পশ্রাব, প্রমেহের পূর্ণক্ষয় হ্রাসিত । অণ্ড ক্ষীত, অণ্ডকোষ দৃঢ় ও সটান, রেতঃবজ্জু ক্ষীত সাতিশয় স্পর্শসহন, চাপে বেদনার বৃদ্ধি জ্বর, বমন, বিবসিষ, কোষ্ঠবদ্ধ কদাচ ফোটক উৎপন্ন হয় ।

প্রাচীন অণ্ড প্রদাহ তরুণ প্রদাহাবসানে বা আপনাপনিই সমুপস্থিত হয় মূত্রমার্গাববোধ, প্রাচীন প্রমেহ, উপদংশবিষ বা গণ্ডমানীয় ধাতুপ্রকৃতি বশতঃ এই বোগোৎপত্তি হইতে পারে

লক্ষণ ।—অণ্ডের উপবংশে প্রদাহ জন্মিলে পরে সমস্ত অণ্ড বিস্তৃত হইয়া পড়ে ক্ষীততা ও কাঠিলতা ও চাপে স্পর্শসহন, ভাববোধ সময় সময় অণ্ডের আবরণ পর্দাব মধ্যে মাস্তক রস সঞ্চিত হয় । উপদংশ বিষ জনিত পীড়া হইলে গাত্রে পীড়কা, সশক উত্তেজ, বাত বেদনা ও তাহাব বাজিতে বৃদ্ধি, জিহ্বা বা কণ্ঠে ক্ষত, শ্বাস্রাহানি ও সময় সময় উপতাব প্রদাহ সমুপস্থিত হয়

চিকিৎসা ।—স্থানিক—রক্তমোক্ষণ অর্থাৎ একখানি

জ্যান্সেটেব অগ্রভাগ দ্বারা স্থানে স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে অগ্নি-  
 বাত কবির', ৩৭২ রে 'কছুক্ষণ' উষ্ণজলেব যেন দিলে তৎক্ষণে প্ৰ-  
 মাণে বত্ত নিঃসৃত হইয়া প্রদাহেব শান্তি হয় রোগীকে ১ ঘণ্টা  
 শয্যায়া শান্তি বাখিবে অণুকোষ একটি ছোট কাগি দ্বারা উঃ ও  
 কবির' বাখিবে পণী ফোমেটেসন প্রদাহ বিধিৎ অপগত  
 হইলে ট্রাপিং করিবে লিনিমেন্ট বেলেডোন ১২৯ প্রদাহেব  
 তৎপারস্থায় লাইকব প্রমাই সব এসিটেটীস লোশন ৪২৬, এবং,  
 পর্যায়ক্রমে উষ্ণ ও শীতল জলধাৰা সেবনার্থ—এণ্টননা,  
 শ্রালাইন ও হেনবেন ২৬৭, ৪২৫ ডোভর্স পাউডব ও ব্যানো-  
 মেল ব্রোমাইড ও ওপিয়ম কনোসিব সল্লিমেট ও ডি. মাজি  
 ৪০২ বোগ বাতজনিত হইলে কলাচকম ৩৩১, আইগোডাইড  
 অব্ পটাসিয়ম ৪০৪ সলফেট অব্ সোডা ও ট্যাবাক্সেসকুম ৩৪৯,  
 একোনাইট ১০৭, ২৭২ বেদনানিবাবক মাত্রায় অহিফেন  
 বেলেডোনা ও গ্লিসিরিন, লিনসিড পল্টাশ মস্‌পেম্‌সরী ব্যাণ্ডেজ  
 ব্যবহার আবশ্যক চাপ প্রয়োগ উপকারী ওলিমেট অব্  
 মার্কবী এণ্ড মর্ফিয়া লাইকব এমোনি এসিটেটীস ট্রি, ভিনেট্রুম  
 ভিবিড, টিংচব পলসেটিলা হিতকর প্রথমে এক মাত্রা ক্যানো  
 মেল ৩৭২ বে শ্রালাইন বিবেচক

পুৰাতন বোগে এম্পাষ্টম এমোনিমেসাই ক হাইড্র জিনাচ  
 ও সোপ পাষ্টব দ্বারা ট্রাপিং ক্যানোমেলেব দুঃ প্রয়োগ বজ্র-  
 খণ্ড দ্বারা অণুকোষদয় উত্তোষিত বাখিবে ওলিমেট অব্ মার্কবী,  
 টিংচব আইয়োডিন, অগ্নুমেঃ হাইড্রার্জ আইয়োডিডম্ বজ্রম ১ ভাগ,  
 মোমেব মলম ৭ ভাগ লিনিঃ পটাসা আইয়োডিডাই কম্‌সেগানি  
 সেবনার্থ আইয়োডিড অব্ পটাসিয়ম ৩১৯, ৪০৪ কনোসিব

সল্লিমেট ও সার্জা ৪০২      গাউট জনিত পীড়ায় স্ট্রালিফিটেট অব্  
সোডা ও কলটিকম ।

### ইম্পোটেন্স এণ্ড ষ্ট্রিলিটি—ধ্বজভঙ্গ ও বন্ধ্যাত্ব

যে কোন প্রকার অস্বস্থাবস্থা হইতে পূর্যেব শুক্র, স্ত্রীলোকের ডিম্বাণুব সহিত সংযোজিত হইতে না পাবে, তাহাকে ইম্পোটেন্স বা ধ্বজভঙ্গ বলে । তজ্জপ, যে প্রকার অবস্থা বশতঃ শুক্রেব স্পর্মাটোজোয়া বা কীটাণু বা স্ত্রীলোকের ডিম্বাণু নিঃসৃত না হয় অথবা নিঃসৃত হওয়ার অনতিবিলম্বে উহাদের জীবনী বিনষ্ট হয়, তাহাকে ষ্ট্রিলিটি বা বন্ধ্যারোগ বলে ।

পুরুষদের ধ্বজভঙ্গ ।—বিবিধ কারণে বোগী স্ত্রীসঙ্গম কৰিতে অসমর্থ হয় । পুংস্বেব বর্ধনাভাব বা বিকৃত বর্ধন আদি, মানসিক শোক, ক্রোধ, অতিশয় উত্তেজিত ইচ্ছা, উৎকর্ষা, দুঃখ, বিবর্তি ইত্যাদি জ্বর ও প্রবদ পীড়ান্তে পুংলিঙ্গেব দৌর্বল্য জন্মে মস্তকেব পুচ্ছাঙ্গাগে ব হিক আঘাত প্রাপ্তি বশতঃ ধ্বজভঙ্গ হয় । পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জাব পীড় বা আঘাত, অপবিমিত তাম্রবুট ব্যবহার বশতঃ পরিপাক ক্রিয়া ও স্নায়ু এবং পৈশিক মণ্ড দুর্বল হইয়া পড়ে, তজ্জপ অত্যধিক অহিফেন ব্যবহার এই বোগের কারণ । মধ্য পরিগণিত মূত্রমার্গেব সংকোচ বশতঃ শুক্র মূত্রাশয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে । মূত্রমার্গে অস্বাভাবিক ছিদ্র থাকে বশতঃ শুক্র যথাস্থানে প্রবিষ্ট হইতে পারে না ।

স্ত্রীলোকদের ।—বাহু জননেত্রিমের বিকৃতি, বোনিদ্রাবের আক্ষেপ, অর্কুদ, জবাণু গ্রীবা দীর্ণ, জবাণুব স্থানচ্যুতি, প্রদাহাদি,

ফালোপিয়ান নলীতে অবরোধ প্রভৃতি কারণে পুণ্য সংসর্গ করিতে অসামর্থ্য জন্মে

পুরুষদেব গুটিকারোগ, যক্ষ্মা, আণুলানিক প্রভাব, কোন কোন প্রকার অজীর্ণ দ্বারা বক্ষ্য বোগ জন্মে পীড়ান বর্দ্ধিতাবস্থায় গুরুপ্রাব বদ্ধ হইয়া যায় মস্তিষ্কের কোন কোন পীড়া বশতঃ অণ্ডেব যথোচিত ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় অণ্ডে অর্কুদ, কর্কট, পুনঃ পুনঃ প্রদাহ, অস্বাভাবিক অবস্থান প্রভৃতি কারণে গুত্রের জীবনী শক্তি নষ্ট হয় গুত্রনিঃসরণ পথে বাধাপ্রাপ্তি, তাগাক, অহিফেন ও স্নবাব অপরিমিত ব্যবহার ও উপদংশ বিষ দ্বারা গুত্রের জীবনী বিনষ্ট হইয়া থাকে

স্ত্রীলোকেব—বক্ষ্যাজ পীড়ার কারণেব মধ্যে এই গুত্র প্রধান —আর্ন্তবাতাব, অবসন্নতা বা সাতিশয় সার্বাঙ্গিক দুর্বলতা, মত্ততা বা অসম্পূর্ণ সঙ্গমেচ্ছা, ডিম্বকোষেব পীড়া বা বর্দ্ধনাভাব যেহেতু প্রদর অত্যধিক ও উগ্র হইলে গুত্রস্থ কীটাবু নষ্ট এবং উপদংশীয় বিষ প্রভাবে ডিম্বাবু জীবনী পায়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে

চিকিৎসা —কাবগানুসাবে চিকিৎসোপায় অবলম্বন কৰা বিধেয় লৌহঘটিত ঔষধ, নক্সভমিকা, সন্ধন, ফসফরাস, মঙ্গলিক এসিড ডিম, ক্যাঙ্সেরাইডিস, ইন্ডিয়ান হেম্প, হাইপোফসফাইট অব্ লাইম ও সোডা মণ্ডক বা পৃষ্ঠবংশে আঘাত বর্জিত পীড়া উপস্থিত হইলে অল্প মাত্রায় পালকোবাইড্ ও নু মার্কাব হস্ত কর আইয়োডাইড্ অব্ পটাশিয়াম ও উলকাবা সমুদ্র সৈন্য স্নান, পুষ্টিকারক খাদ্য, পৃষ্ঠবংশে গাঢ় ভ্যানিজম বা উভেজম মদন লাইকব্ ট্রীকনিয়া ও টিংচব অব্ টিন এব দ্বাঃ ডোমিনেবা



লিকুইড ১ ড্রাম মাত্রায় দিনে ২ ৩ বার সেব্য ইহার সহিত  
টিংচর নব্যভগিকা প্রয়োগ হিতকর ।

### ডিজিজেস্‌ অব্‌ দি আইজ—চক্ষুরোগ ।

অপ্‌থালমিয়া ক্যাটাৰাল—সর্দি বা শৈত্য-

জনিত চক্ষুউঠা

সর্দিজনিত চক্ষুউঠা অতি সাধারণ ইহাতে চক্ষুব যোজক-  
ত্বক অর্থাৎ তাহাব শৈল্পিক বিলীতে সামান্য প্রকার এদাহ  
জন্মে

লক্ষণ । সামান্য বেদনা বা জ্বালা বোধ টান ও শুষ্কতা  
বোধ, চক্ষুতে বালি পাড়লে যেরূপ কর্কর কবে, ইহাতেও তদ্রূপ  
বোধ হয়, যোজক তন্তুস্থ শিবা দি ক্ষীত থাকায় স্পর্শাতিশয়া  
বিশিষ্ট চক্ষুব পাতা উহাতে ঘর্ষিত হওয়ায় ঈদৃশ বোধ হয় এই  
সমস্ত রক্তাধাব উজ্জল, ও লালবর্ণ দেখায় ও বিশৃঙ্খলভাবে  
অবস্থিতি করে স্ক্লিবোটাইটিস বোগে উহাবা আবওবর্ণ ও  
চক্রেব অব্‌ সকলোব স্থায় ধজু ও স্মৃঙ্খলভাবে থাকে চক্ষুতে  
অধিক পিচুটী আব হয় সময় সময় উহা পুযবৎ হয়

চিকিৎসা —এবপ রোগ সচবাচর সহজেই আরোগ্য হয়  
অনেক সময় কোন প্রকার ঔষধাদি প্রয়োগেব আবণ্ডক হয়  
না রোগেব প্রাবন্তে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ক্যালোমেল, জেলাপ  
বা স্কাগনী সহ, ৩৫১, ৩৫২, অথবা বাত্রিতে ক্যালোমেল ৩৪১ ;  
ও প্রাতে ব্লাক্‌ ড্রাফট্‌, ৩৩১ যদি সার্কাস্টিক স্বাস্থ্য মন্দাবস্থায়  
থাকে, তবে বদাকারক ও উত্তেজক ঔষধ সেবন বিধেয় যদি  
সার্কাস্টিক রক্তাধিক্য বর্তমান থাকে, তবে ২১৩ দিন বিরেক ও

লঘুপথ্য বিধান করিবে রোগ মহাজ আরোগ্য প্রাপ্ত দৃষ্ট না হইলে কর্ণের পশ্চাতে বা শঙ্খদেশে স্থিতি দিবে আক্রান্ত চক্ষুকে আলোক ও সূর্যোত্তাপ হইতে রক্ষা করিবান তত্ত্ব হরিৎ-বর্ণ চক্ষু বা বস্ত্রখণ্ড দ্বারা চক্ষু আবৃত রাখিবে ঈষৎ জল বা পোস্তাচুড়ির কাথ দ্বারা চক্ষু ব্যবস্থাব ধোত করিবে প্রয়োজ নান্নমারে সংকোচক অক্ষি ধোত বিধান করিবে অর্থাৎ ভাইনগ ওপিয়ম ২৫১, স্যালিস বা নাইট্রেট অব্ সিলিকার ধোত ২৫০। যদি রাত্রিতে চক্ষু আঁটিয়া থাকে, তাহা হইলে বসা, ঘুত বা সিঙ্গল অয়েন্টমেন্ট চক্ষুপাতাদ্বয়ের মধ্যে মাখাইয়া দিবে হাইড্রার্স পারক্লোরাইড লোশন এক গ্রোণে ১৬ বা ৮ আউন্স জল বোরিক এসিড লোশন ৫—১০ গ্রেণ, জল ১ বা ১ ০ আউন্স

### অপথ্যালমিয়া ক্রনিক—অধিক দিন স্থায়ী চক্ষু উঠা।

চিকিৎসা — স্থানিক—উত্তমজনক কার্য সর্ব প্রথমে বিদূরিত করিবে সার্বস্বদিক স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল হয়, তদ্বি-  
ষয়ে মনোযোগ দিবে এতদর্থে নিয়মিত ব্যবস্থা মত্ত ঔষধ সেবন বিধেয় ১৭৬, ১৮১, ১৮২, ১৮৯, ১৯৪, ৩১৯ ভাইনম ওপিয়ম সম পবিত্র বিশুদ্ধ জল সহ অক্ষি ধোতরূপে প্রয়োজ্য অথবা সলফেট অব্ জিংক, নাইট্রেট অব্ সিলিকার ও স্যালিস প্রভৃতি ২৫০, ২৫১, ২৫৪ ইহাতেও পূর্বোক্ত মত হাইড্রার্স পার-  
ক্লোরাইড লোশন ও বোরিক এসিড লোশন প্রয়োগ চিত্তব্য

## অপথাল্মিয়া পুরুলেন্ট—সপুষ্ট চক্ষু উঠা ।

ইহা পুরুলেন্ট বোগের অনুরূপ, কিন্তু তদপেক্ষা প্রবলতররূপে প্রকাশিত হয় ; তৎকালে এতদ্বারা চক্ষুর অধিক অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে

লক্ষণ ।—পূর্ণবয়স্কদের সপুষ্ট চক্ষু পদাহে প্রবল প্রদাহ উপস্থিত হয় তৎসঙ্গে প্রচণ্ড বেদনা ও অধিক পরিমাণে গাঢ় ও পীতাত্মক পুষ্ণাব হয় চক্ষুপাতাদ্বয় অত্যন্ত ক্ষীত হওয়ায় চক্ষুর ভিতর ভালরূপে দেখিতে পাওয়া যায় না যোজক ও ক্লিরোটিক পর্দার মধ্যে মাস্তকবস সঞ্চিত হওয়ায় চক্ষু ক্ষীত হয়, ইহাকে কিমোসিস্ বলে চক্ষু ও কপালে প্রবল বেদনা । জ্বর, অবসন্নতা । বোগেব সমতা না হইলে প্রদাহ বর্দ্ধিত হইয়া কর্ণিয়া ও সময় সময় আভ্যন্তর বিধানাদি আক্রান্ত হওয়ায় ক্ষত ও পচন সমুপস্থিত হয় অবশেষে চক্ষুর দৃষ্টি নষ্ট হইয়া যন্ত্রণার অবসান হয় এই রোগ স্পর্শাক্রামক । সময় সময় ইহা বহুব্যাপীকরূপেও প্রকাশ পায়

চিকিৎসা ।—এই রোগে চক্ষুর ভিতর ক্ষত বা পচন উপস্থিত হইতে পারে । অতএব তৎপক্ষে বিশিষ্ট দৃষ্টি রাখা কর্তব্য রোগেব প্রাবল্যে যদি জিহ্বা গলাবৃত থাকে, তবে বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে ৫ গ্রেন ক্যালোমেল ও ১৫ গ্রেন জেলাপ একত্রে সেবন করাইয়া তৎপরে সলফেট অব্ ম্যাগ্নিসিয়া ৩৩১, ৩৩৪, বা সিড্‌লীজ্ পাউডর ৩৫৩ ; বা ক্যাপ্টর অয়েল ৩২৯, ৩৩৬ প্রযোজ্য । তৎপরে সার্কাসিক দুর্বলতা থাকিলে এমোনিয়া ও বার্ক ১৮৩, ১৮৪ ; কুইনাইন ১৯১, ১৯৪ ; কড্‌লি-

ভর অয়েল ১৯২, ৪১০ আহারার্থে, মাংস, বিয়ার বা পোর্ট-ওয়াইন, ছুঙ্ক। যাতনা নিবারণের জন্ত রাত্রিতে হেনবেন ১০৪ ; ওপিয়ম ৮৮, ১০৩ ; পল্ড ইপিক্যাক কং ১০৮ চক্ষু মদা সর্বদা ঈষদুষ্ণ জল, পণী ডিক্কসন বা হরিদ্রাক্ত বস্তথও দ্বারা পরিষ্কার করিবে। তৎপবে সঙ্কোচক অক্ষিধৌত প্রয়োগ্য ২৫০, ২৫১, ২৫৪ চক্ষুপাতা অত্যন্ত ক্ষীত হওয়া বশতঃ অক্ষিধৌত ব্যবহারের অন্তবিধা হইলে পীচকারি দ্বারা উহা দিবে চক্ষুপাতা পরস্পর আঁটিয়া না থাকে, তজ্জন্ত অগ্নয়েঃ সিট্রন ডিল ৬৭। ব্লিষ্টার ও জলোকা ব্যবস্থা অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকের অনুমোদনীয় নহে চক্ষু খোলার সময় চিকিৎসকেব সাবধান হওয়া কর্তব্য, যেন চক্ষু-গোলকে চাপ না লাগে কেবল চক্ষুপাতায় হাত দিয়া মৃদুভাবে টানিলে চক্ষু খুলিবে। অক্ষিগোলকে চাপ লাগিলে নানা অনিষ্ট সংঘটিতে পারে অর্থাৎ কর্ণিয়াতে ( চক্ষুরে কাল ক্ষেত্র ) যদি পুয়োৎ পত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে চাপ প্রযুক্ত উহা বিদীর্ণ হইয়া যায়। কর্ণিয়ায় ক্ষত প্রকাশিত হইলে সময়ে সময়ে তাহা নাই-ট্রেট অব্ সিল্ভবের বাতি স্থানিক প্রয়োগ ববিলে আবোগ্য হইতে পারে অথবা ২—১০ গ্রে° নাইট্রেট অব্ সিলভর ও ১ আউন্স পবিশ্রুত জল একত্রে ধৌত প্রস্তুত করিয়া দিনে ২৩ বার প্রয়োগ করিবে জিক্স ও স্যাং ম লোশন দ্বারাও বারম্বার চক্ষু ধৌত করিবে অত্যন্ত বেদনা উৎপন্ন হইলে অহিষেৎ মিশ্রিত জল উষ্ণ করিয়া চক্ষুর উপরে ফেঁক দিবে শতাদেশে ব্লিষ্টার দিলেও বেদনা ও যন্ত্রণাদির শান্তি হয় ১৫ অয়েন্টমেন্ট ও ওপিয়ম একত্রে জ্বর উপরে মর্দন করা কর্তব্য হাইড্রার্জ পারক্লোবাইড্ ও বোরিক লোশন বেদনায় আতিশয়ো এট্রপিও ও



কোকেইন প্রযোজ্য একষ্টাঃ বেলেডোনা ১০-১৫ গ্রেণ, ল্যানো-  
লিন ২ ৪ ড্রাম, একত্রে চক্ষুর্দ্রব তৈরী ও ক্রুর উপর মর্দনীয়

### গনোরিয়েল অপথালমিয়া—প্রমেহ জনিত চক্ষুউঠ ।

কয়েকটী বিষয়ে ইহা পূর্ববর্ণিত পীড়া হইতে স্বতন্ত্র ইহা প্রবলতর আকারে উপস্থিত হয় । কদাচ এক চক্ষু স্থায়ী থাকে, কিন্তু একটী চক্ষুতে প্রদাহ হওয়ার ২৩ দিবস পবে অপরটী আক্রান্ত হয় । প্রমেহ পীড়ায় যে পুষ্ণ্যাব হয়, তাহা কোনকপে চক্ষুতে লাগিলেই এই পীড়া ভগ্নে শ্বেতপ্রদবেব আব চক্ষুতে লাগিলেও এইরূপ প্রদাহ জন্মিতে পাবে সাধারণতঃ এই বোগে কর্ণিয়াব পচন সংঘটিত হয় ।

চিকিৎসা ।—ইহাতেও পূর্বোক্ত চিকিৎসা অবলম্বনীয় এই রোগে চক্ষু তনবরত পরিষ্কার করিবে বেদনাব আতিশয্য নিবারণার্থ পূর্বপীড়ায় বিহিত উপায়াদি ব্যতীত এব উপরে ও শজা দেশে নু অয়েন্টমেন্ট ও অহিফেন ১২৬, মালিশ করিবে । শজা দেশে ও কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে স্নিষ্টাব ও জলোকা নাইট্রেট অব্ সিল্ভবেব অক্ষিধৌত বিশেষ উপকারী ইহা সচরাচর ৫ ১০ গ্রেণ এক আউন্স জলে দ্রব করিয়া ব্যবহার্য্য কেহ কেহ ২০।৩০ গ্রেণ এক আউন্স পরিষ্কৃত জলে দ্রব করিয়া ব্যবহার করিতে বসেন, কিন্তু উহা দিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইয়া থাকে চক্ষুের তারা প্রসারিত বাধিবার জন্ত ও বেদনা নিবারণার্থ লাইকব এটপিয়া ২ ১ ফোটা মধ্যে মধ্যে চক্ষু দেওয়া আবশ্যক ।

অপথাল্‌মিয়া নিয়োনেটোরম শিশুদের সপুষ চক্ষু উঠা ৩১৩

কোকেইনও এই জন্য ব্যবহৃত হয় হাইড্রার্জ পাবক্লোরাইড্ ও  
বোরিক লোশন এই গীড়ায় উপকারী ।

### অপথাল্‌মিয়া নিয়োনেটোরম—শিশুদের সপুষ চক্ষু উঠা ।

সাধাবণতঃ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পৰ তৃতীয় দিবসে এই বোগ  
জন্মে ইহাতে অক্ষিপুটাদি স্থলৈঙ্গিক ঝিল্লীতে প্রদাহ উৎপন্ন  
হয় অক্ষিপুট জোড়া লাগে, উহা খুলিলে ঘন পুষ বাহির হয় ।  
চক্ষুর লৈঙ্গিক ঝিল্লীতে প্রদাহ প্রসারিত হইয়া পড়িলে চক্ষুপাতা  
ক্ষীত হয় পুষস্রাব বর্ধিত ও শিশু ক্ষীণ, অস্থির ও উগ্র প্রকৃতি-  
বিশিষ্ট হয় এইরূপ ভাবে গীড়া ৮-৯ দিন থাকিতে পাবে  
প্রদাহের শান্তি না হইলে কর্ণিয়াতে ক্ষত হইয়া চক্ষু নষ্ট হইয়া যায় ।  
উভয় চক্ষুই সাধাবণতঃ আক্রান্ত হয় এক সময়ে বা কয়েক  
দিন ব্যবধানে দুই চক্ষু গীড়িত হইয়া থাকে ইহাব পুষ  
স্পর্শাক্রমক

চিকিৎসা ।—গ্যাংনিমিয়া ৩৫৪, ক্যাপ্টব অয়েল ; হাই-  
ড্রার্জ কমক্রিটা আইয়োডাইড্ অব্ পটাশিয়ম পথ্যার্থ ৫০  
ও ছাগ দুগ্ধ মাতৃগুণ দূষিত হইলে স্তন্য ও দুগ্ধবতী দ্বারা  
নিয়োজিত করিবে অতি অল্প মাত্রায় ও বিশেষ সাবধান  
সহকারে ডোভার্ম পাউডর ব্যবহার করিতে বেহ কেহ বলেন,  
কিন্তু নিতান্ত শিশুকে উহা দেওয়া উচিত নহে কর্ণিয়ায় ক্ষত  
হইলে হাইড্রার্জ পাবক্লোরাইড্ লোশন, বোরিক এসিড লোশন  
ভারা প্রসারিত করণার্থ লাইকব্ এট্রপিয়া বা কোকেইন ব্যবহৃত

হয় চক্ষের পাতা জোড়া না লাগে তজ্জন্তু আইয়োডোফর্ম ১ গ্রেণ ও ভেসিলিন ২০ গ্রেণ একত্রে লাগাইবে কুইনাইন ১৯৩; ফেবি আইয়োডিডাই ১৮০ টিংচর ফেরি পাবক্লোরাইড্ ১৭১। ঈষ-দুগ্ধ জলে চক্ষু ধোও কবিবে ম্যালম, সলফেট অব্ জিঙ্ক বা কষ্টিক লোশন ২৫০, ২৫৪ চক্ষে দিবে চক্ষু সতত পরিষ্কার রাখা উচিত এতদর্থ ঈষদুগ্ধ জল হিতকর অথবা মৃদু বোবিক এসিড লোশন ব্যবহার্য্য

### অপথালমিয়া স্ফিউলস—গণ্ডমালীয়া চক্ষু উঠা ।

গণ্ডমালা ধাতুপ্রকৃতিক ও অগ্ন্যাগ্নি বালকদের স্তনদুগ্ধ ভাগ কবিবার সময় হইতে ৯ বা ১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই পীড়া হইয়া থাকে

লক্ষণ —চক্ষু অল্প বক্তবর্ণ, পুষ্পপূর্ণ উদ্ভেদ বা কখন কখন কর্ণিয়াতে ক্ষত হয় অত্যন্ত অশ্রুশ্রাব, নাসা ও কপোলাভ্যন্তবস্থ শ্লেষ্মিক বিল্লীর উদ্দীপনা আলোকাতঙ্কা, তৎসঙ্গে অক্ষিপুটের আক্ষেপিক সংকোচন। ওষ্ঠ ক্ষীণ, কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে উদ্ভেদ, আঙ্গিক শ্রাবের বিশৃঙ্খলা উভয় চক্ষুই সাধারণতঃ আক্রান্ত হয় উষ্ণ অশ্রুশ্রাব কপোলদেশ বাইয়া পড়ায় তৎস্থানে সপুষ্প উদ্ভেদ বাহিব হয়

চিকিৎসা —পুষ্টিকর পথ্য দুগ্ধ; বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, উষ্ণ বস্ত্র পরিধান। সময়ে সময়ে মৃদু বিরেচক। কুইনাইন, আর্সিনিক; ষ্ট্রীল ও কডলিডব অয়েল আইয়োডিড্ অব্ আয়বণ; আইয়োডিড্ অব্ পটাশিয়ম উষ্ণজল স্বেদ, হরিৎ-বর্ণ বস্ত্রখণ্ড বা চস্মা দ্বারা চক্ষু আবরণ ভাইনম ওপিঘাই

ড্রপ সল্‌ফেট অব্‌ জিঙ্ক ও ম্যালম লোশন কর্ণ ও গ্রীবাৎ  
পশ্চাতে বিষ্টার ' অত্যন্ত বেদনাজনক এটপিন ও কোকেইন  
প্রয়োজ্য অক্সাইড্‌ অব্‌ মার্করি ৮ গ্রাঃ ও ভেসিগিন  
এক আউন্স একত্রে মিলিত করত অক্ষিপুটে লাগাইবে  
চক্ষুতে ক্যালোমেল ডিষ্টিল উপকাৰী করিয়াতে ক্ষত থাকিলে  
অব্যবহার্য্য

### অপথাল্‌মিয়া গ্রানিউলার ।

অক্ষিপুটেব অধঃশ্লেষিক বিলীতে সাধাবণতঃ দালবর্ণ ও  
কর্কশ দানা দানা দৃষ্ট হয় শ্লেষিক বিলীস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি  
প্রদাহিত হওয়ায় ঐকপ দেখা দেয় উহাদের দাল যখন অত্যন্ত  
উদ্দীপনা জগে, তখন করিয়া অস্বচ্ছ হয় ।

চিকিৎসা ।—চক্ষের পাতার অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা  
এবং উহা আবণ্ড ও কর্ণ হইলে কুইনাইন, আর্সিনিক ও ষ্ট্রল  
২৮৯ । পুষ্টিকর খাদ্য উন্নত দানাতে সল্‌ফেট অব্‌ কপার  
বা নাইট্রেট অব্‌ সিল্‌ভর স্থানিক প্রয়োজ্য কনোসিব সল্লিমেট  
লোশন, ১ গ্রাঃ ও জল ১ আউন্স, তুলিকা সহযোগে লাগা-  
ইতে হয় । সপুষ্ট এদাহ উপস্থিত হইলে তদনুরূপ চিকিৎসা  
কর্তব্য বেদনা নিবারণার্থ কোকেইন প্রয়োজ্য তৎপনে উন্নত  
দানা গুলির উপর সল্‌ফেট অব্‌ কপার বা কষ্টিক সাবদানে  
লাগাইতে হয়

### অপথাল্‌মিয়া টার্মাল ।

অক্ষিপুটেব ধাব ও তৎসংলগ্ন শ্লেষিক বিলীব প্রদাহ, তৎ



সঙ্গে চক্ষুপাতার লোমেব নিকট সপূর্ণ উদ্ভেদ বাহির হয় এবং তাহা হইতে পুয়স্রাব হইয়া লোম সকল পবম্পাব সংলগ্ন হইয়া যায় ।

লক্ষণ ।—তরুণাবস্থায় মাতিম্য বেদনা ও প্রাচীনাবস্থায় কণ্ডুয়ন, লোমোৎপাদক তন্তু বিনষ্ট হয় চর্ম্ম ও চক্ষুর যোজক তন্তু সম্মিলিতভাবে লাল উজ্জ্বল ক্ষতচিহ্নবৎ দেখায় অত্র প্রণালী অববদ্ধ হয়

চিকিৎসা । সাধাবণ স্বাস্থ্যোন্নতি বিধায়ক, বলকর ও পবিবর্তক সেবা আর্গিনিক, ষ্টীল, কড্‌নিভব অয়েন ইত্যাদি । পুষ্টিকর খাদ্য, দুগ্ধ, মাংসাদি বায়ু পবিবর্তন চক্ষু সতত পবিস্কাব রাখিবে নাইট্রেট অব্‌ মার্কবি অয়েন্টমেন্ট ১ ভাগ, সিম্পল অয়েন্টমেন্ট ৭ ভাগ একত্রে মিশাইয়া স্থানিক প্রয়োগ কবিবে

টার্জাব এমিটিক ১১ ২২.৫ গুট্ট গ্রোন মাআয় দিনে ৩ ৪ বার সেবন কবিতে দিলে গণ্ডুমানোর চক্ষু পদাহ উপশমিত হয় । কার্ব-নিক এসিড্‌ গ্যাস চক্ষুতে লাগাইলে গণ্ডুমানীয় চক্ষু-প্রদাহেব বেদনা ও আলোকাভঙ্কা নিবাবিত হয় বেদনা ও আলোকাভঙ্কা উপশমার্থ কোকেইন ও এট্রপিন বিশেষ উপযোগী ।

### আইরাইটিস -উপতারা প্রদাহ ।

কেবল আইবিস বা উপতারা কদাচ আক্রান্ত হয় । ইহাব সঙ্গে স্ক্লিবোটিক ও চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ অন্যান্য বিধানও পীড়িত হইয়া থাকে

লক্ষণ —প্রথমাবস্থায় উহাব সোত্রো বিধান অম্পষ্ট থাকায় উপতারার আকৃতি পবিবর্তন হয় অর্থাৎ উহাব আকুঞ্চন শক্তি নষ্ট ও বর্ণের পরিবর্তন হইয়া থাকে স্ক্লিবোটিক পর্দা অভ্যন্তর বক্তপূর্ণ হয় তৎপরে উপতারার গাত্রে মাস্তকরস ক্ষরিত হইয়া

থাকে। প্রদাহ জ্বরও বর্ধিত হইলে কনীনিকা অবরুদ্ধ বা উহার ধার লেন্সেব ক্যাপসিউলের সঙ্গে সংযুক্ত হয় অথবা কর্ণিয়া অস্বচ্ছ হইয়া পড়ে অথবা লেন্স ও ক্যাপসিউলের স্থায়ী অস্বচ্ছতা জন্মে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশবৎ বর্ণাধার সকল চক্রেব অববৎ আকাবে কর্ণিয়ার কিনারার দিকে স্থিতি করে আইরিসেব বর্ণ পরিবর্তন; প্রাভাবিক নীলবর্ণ হইলে হরিৎ, ও কৃষ্ণবর্ণ থাকিলে আবক্ত বর্ণ হয় কনীনিকাব সংকোচন, বিশৃঙ্খলা ও সঞ্চরণশীলতার অভাব কনীনিকায় ও পোষ্ট্রিয়ার চেষ্টবে লসীকা প্রাব উপতাবা ও কনীনিকাব ধার লেন্সেব কোষ সহ সংযুক্ত হয় উপতাবায় গুটিকা, পুথবটী বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোটক উৎপন্ন হয় গুটির অস্পষ্টতা ও কখন কখন সম্পূর্ণ দৃষ্টিলোপ চক্ষুতে বেদনা ও তাহা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় সকল রোগীবই যে পূর্বোক্ত লক্ষণ সমস্ত থাকিবে, একপ নহে উহাদেব মধ্যে কতকগুলি বর্তমান থাকিলেই তদ্বারা বোগ নির্ণীত হইতে পারে সার্ভাস্টিক অস্বস্থতা থাকে প্রদাহেব শান্তি না হইলে চক্ষুেব অন্ত্রাণ্ত্র বিধান বোগাক্রান্ত হয় অবশেষে চিবকানের জন্ত দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে মৈত্র্য, অর্জিত, উপদংশবিষ, আঘাত, বাত ও গণ্ডগালীয় ধাতু প্ৰভৃতি এই বোগেব কারণ উপদংশ বিষজাত উপতাব প্রদাহ সাপাবক সকল বয়সেই ইহা হইতে পারে এংসম্ভে সার্ভাস্টিক উপদংশের অন্ত্রাণ্ত্র লক্ষণ উপস্থিত থাকে

চিকিৎসা —বেদনাব আতিশয়্য মাদক ঔষধ সেবন দ্বারা নিবাবিত কবিবে কোকেইন, বেণেডোনা ও এট্রপিয়ায় দ্রৌত দ্বারা চক্ষুেব তাবা প্রসাবিত বাধিবে ১৫৯, ১৬০ কোকেইন ৪ পার্সেন্ট সলিউশন ১ বা ২ ফোট অথবা লাইকন এট্রপিয়া

২৩ ফোটা চক্ষুতে দিলে বোঁন উপশমিত ও কলীনিকা প্রসারিত থাকে । ইহা আবশ্যকানুসারে ২৩ ঘণ্টাস্তর প্রয়োজ্য । কলীনিকা প্রসারিত থাকিলে বোঁন সত্তর উপশমিত হয় মার্করী এই বোঁগের মহোষধ, মুখ না আইসে একপ পরিমাণে ব্যবহার্য্য । বোঁগীকে অন্ধকাব গৃহে থাকিতে উপদেশ দিবে ওপিয়ম, পপী বা বেলেডোনা উষ্ণ জলে গুলিয়া তদ্ধাবা সেক । বিরেচক ৩৩১ ৩৪১ আইয়োডাইড্‌ অব্‌ পটাশিয়ম ৩৯৯, ৪০১ উপদংশ-জনিত বোঁগে উহা ব্যতীত কবোসিব সল্লিমেট ৩৯৮, ৪০২ দৌৰ্ব্বল্য প্রাচুভূত হইলে এমোনিয়া ও বার্ক ১৮৩, কুইনাইন ১৯৩ । চক্ষের উপরিভাগে (এব উপব) ওপিয়ম ও মার্কুবিয়েল অয়েন্টমেন্ট ১২৬, মর্দন শজ্ঞদেশে ব্লিষ্টার, অবসাদক অক্ষি ধৌত পুষ্টিকাবক পথ্য একত্ৰাঃ বেলেডোনা ও ল্যানোলিন একত্রে এর উপব ও শজ্ঞদেশে মর্দন কর্তব্য অয়েল টর্পে ন্টাইন সেবনার্থ বিধান করিলে ক্ষবিত মস্ত বা এগ্জুডেশন আশো যিত হইবার বিশেষ সাহায্য হয় । বাতসংশ্লিষ্ট পীডাম স্থালিসিলেট অব্‌ সোডা, উপকারী

স্কি রোটা ইটীস—অক্ষি গুল্ল প্রদাহ ।

রিউমেটীক অপথালমিয়া ।—শৈত্য, বাত বা প্রমেহ জাত প্রদাহ অগভাব দালবর্ণ রক্তাধাব সকল চক্রেব অরবৎ আকাবে শ্রেণীবদ্ধ এবং যোজক তন্তুর নিয়ে অবস্থিত প্রবল বন্ধনে বেদনা চক্ষুগোলক, এ ও শজ্ঞদেশে অনুভূত হয় ব্যত্ৰিতে বেদনা বৃদ্ধি পায় সময় সময় আলোকাসহতা, দৃষ্টির অস্পষ্টতা, অব ও অন্ত্রান্ত সার্কাস্টিক অস্বস্থতা

কর্ণিযাইটীস, কিবোটাইটিস—চক্ষের কৃষ্ণক্ষেত্রের প্রদাহ ৩১৯

চিকিৎসা।—সোডা স্যালিসিট, আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম, আইয়োডাইড অব্ আয়রন, কডলিভ অয়েল, কল্‌চিকম, হেনবেন, মর্ফিয়া বিবেচক, উষ্ণ জলে স্নান, কর্ণ ও গ্রীবার পশ্চাত্তানে ব্লিষ্টার কপালে বেলেডোনা বা ফ্লোবোফর্ম লিনিমেন্ট মর্দন অগ্নিধৌত না দিলেও চলে বেশী বেদনায় চক্ষে লাইকব এট্রপিয়া ২১ ফোটা। কপালে একষ্ট্রা বেলেডোনা ও ম্লিসিবিং মর্দন

ক্যাটারো রিউমেটিক অপথাল্মিয়া ।

ইহা বিবল পীড়া নহে। স্ক্লিভোটিক ও কন্জংটাইভাব প্রদাহ বিমিশ্রিত ভাবে থাকে। চক্ষুতে বালি পড়িলে যেকপ কর্ণ কবে, ইহাতেও তদ্রূপ হয় অগ্নি কোটবেব চ্যুর্দিকে বেদনা চক্ষু ঘোব লালবর্ণ চক্ষুগোলকেব অভ্যন্তর বদ অন্নণ বশতঃ ক্ষীততা, আলোকাঙ্ক্ষা প্রদাহ আরোগ্য ন হইলে ক্ষত হইতে পাবে

চিকিৎসা।—বার্ক ও আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম। ওপিয়ম, কডলিভ অয়েল, অবসাদক অগ্নিধৌত, উষ্ণ জলেব সেক কনোমিব সল্লিমেট বা বোবিক এসিড গোলন বেদনা উপশমার্থ কোকেইন প্রয়োজ্য

কর্ণিযাইটীস, কিবোটাইটিস— চক্ষের কৃষ্ণ-

ক্ষেত্রের প্রদাহ ।

এতদ্দ্বারা স্বচ্ছ বর্ণিমা অস্বচ্ছ, ঘোলা ও কর্ণন হয়

লক্ষণ —কর্ণিযাব ধাবে স্ফা স্ফা বক্রাধাব সকঃ শ্রেনী.



বদ্ধভাবে থাকে কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা, অতিশয় অস্বাস্থ্য, আণো কাতক্স। গণ্ডমালীয বালক ও বিংশতি বর্ষের ন্যূনবয়স্ক যুবাগে এই বোগে অধিক আক্রান্ত হয় এক বা উভয় চক্ষু আক্রান্ত হইতে পারে বোগ অধিক দিবস স্থায়ী হইতে পারে ও কর্ণিয়ার স্থায়ী অস্বচ্ছতা জন্মে। কখন কখন পূয়োৎপত্তি হয়।

চিকিৎসা।—ইহাতে অত্যন্ত প্রদাহ, পূয়োৎপত্তি ও ক্ষত হইলে লাইকর এট্রিগিয়া দ্বারা চক্ষুতারা প্রসারিত বাখা কর্তব্য এতদ্ব্যতীত ও বেদনা উপশমার্থ কোকেইনও প্রয়োজ্য। অত্যন্ত টান ও বিদাবণ নিবারণার্থ এসিবিণও ব্যবহার্য্য অস্ত্রের ও যকৃতের ক্রিয়ায় স্ফূজনা সম্পাদন করিবে বিউবার্ব ও গ্যাগ্নি-সিয়া ; মার্কবী ও চক ; ক্যানোমেল বা ক্যাপ্টর অয়েল আই-যোডাইড অব্ পটাসিয়ম ও বার্ক আইয়োডাইড অব্ আয়ব , কডলিভ অব্ অয়েল কুইনাইন , টিংচব ষ্টীল শঙ্খদেহে ও কর্ণের পশ্চাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্লিষ্টাব উষ্ণ জলের স্বেদ, চক্ষে উষ্ণ জল ও ছপ্পের বাষ্প প্রদান চক্ষের পাতাব উপবে টিংচব আইয়োডিন , উত্তেজক ও উগতাকাবক অগ্নিদ্রব নিষিদ্ধ। পুষ্টিকর পথ্য বাণ্ডেজ দ্বারা চক্ষু বাধিয়া রাখা উচিত চক্ষুপাতা ও জ্বর উপব বেলেডোনা ও পিসিবিণ বা ব্যানোলিন মর্দন কর্তব্য বোবিক এসিড বা পারক্লোবাইড অব্ মার্কবী লোশন ব্যবহার্য্য। বোবিক এসিড ১ ড্রাম ও জল ১০ আউন্স অথবা কেরোসিন সল্লিমেট ১ গ্রেণ ও জল ১০ আউন্স ইয়েলো অক্সাইড অব্ মার্কবী অয়েন্টমেন্ট ৪—৮ গ্রেণ, ভ্যাসিলিন ১ আউন্স সহ চক্ষের পাতাব ভিতর দিতে হয় ক্যানোমেল ডপ্টিং দিনে ২ বার চক্ষের পাতাব ভিতর দিলে বিশেষ উপকার হয় ইহাতে ক্ষতের উপকার হয়

কোকেইন দেওয়াৰ পৰ নাইটেট অব্ সিনাভৰ প্ৰয়োগ কৰা যায়  
১০ গ্ৰেণ্ডে ১ আউন্স জল, লোশন ঠিক ক্ষতৰ উপৰ লাগাইতে  
হয় এসিবিণ্ড প্ৰযোজ্য কোকেইন আদি দ্বাৰা বেদনা  
উপশমিত না হইলে সেবনार्थ ক্ৰোটন ক্ৰোবাৰ ব্যবহার্য।

### সিফিলিটিক কিৰেটাইটিস।

মার্কাস্জিৰ উপদংশ ওহু এই পীড়া জনে শিশুদেব কৌলিক  
উপদংশ বিয় পড়ানে এই পীড়ার উৎপত্তি হয়। এই বোগ প্রাচীন  
আকার ধারণ কৰে

লক্ষণ।—কৰ্ণিফান মধ্যস্থানে অৱস্থিত হওত অক্ষুণ্ণ  
সমস্তাংশে ব্যাপ্ত হয় ক্ষত প্ৰবণতা থাকে না কয়েক সপ্তাহ  
পৰে উভয় কৰ্ণিফা আক্ৰান্ত হয় এই পীড়াক্ৰান্ত ব্যক্তিদেব চৰ্ম  
কৰ্কশ ও স্থূল, মুখমণ্ডলে ব্ৰণ, মুখের কোণে ক্ষতচিহ্ন ও স্থায়ী দন্ত  
ছোট ও বিবৰ্ণ থাকে

চিকিৎসা।—উপদংশজনিত বোগে অল্প পৰিমাণে মার্কবী  
দিবে, কিন্তু মালাশ্ৰাব না হয় তৎপক্ষে সাবধান হওয়া কৰ্তব্য।  
করোসিব সল্ফিমেট ও টিংচৰ সিনকোনা ৩৯৮ কৰ্ণেৰ পশ্চাৎ  
ভাগে বুলু অগেণ্টমেণ্ট ২৬৬। আইয়োডাইড অব্ পটাশিয়াম ৩৯৯,  
৪০১ আইয়োডাইড অব্ আমবণ ১৮১, ১০১ কৰ্ণিফান  
অয়েল, পুষ্টিকৰ ০৭। ইয়েনো অক্সাইড অব্ মার্কবী অগেণ্ট-  
মেণ্ট স্থানিক।

### অল্‌সার অব্ কর্ণিয়া—কর্ণিয়ার ক্ষত ।

অসম্মক অহর, গুণ্‌ম্‌লী'র পীড' অ'দি ব'তঃ জীবনী'ক্তি  
 দুৰ্দ্ধল হইয়া পড়িলে এই বোগ জন্মে সকল বয়সের ব্যক্তি-  
 দেৱই ইহা হইতে পাবে কর্ণিয়া ছিদীভূত হইয়া যাইতে পাবে

চিকিৎসা। —স্থানিক নাইটেট অব সিল্‌ভ'ব সার্কি-  
 জিক সাস্থ্য উন্নত কাঁবাব ড'ল বদকাবক ও, পুষ্টিকাবক ঔষধ ও  
 পথ্য বিধান কবিবে উগ্র অক্ষিধৌত প্রয়োগ নিষিদ্ধ বেদনা  
 নিবাবণার্থ মাদক ঔষধ সেবন ; শঙ্খ দেশে ব্লিষ্টার অবসাদক  
 অক্ষিধৌত প্রভৃতি ব্যবহার্য্য অন্যান্য চিকিৎসাব জন্ত কর্ণিয়াইটিস  
 দ্রষ্টব্য

### ওপাসিটি অব কর্ণিয়া—অব্রণ শুক্ল ।

প্রদাহ হেতু লম্বীকাস্রাব হইয়া অস্বচ্ছতা জন্মে ক্ষতাবে-  
 গ্যের পরও এইরূপ হয় কর্ণিয়াতে ক্ষত থাকার সময় এসিটেট  
 অব্ লেডের ধৌত প্রয়োগ করিলেও অব্রণ শুক্ল জন্মে ।

চিকিৎসা। —এমোনি ক্লোরাইড ৪০ গ্রেণ, এসিটেট অব  
 কপার ৪ গ্রেণ, একোয়া কালসিন্ ৪ আউন্স, মিলাইয়া চক্ষে ফুট  
 দিবে এমোনিয়াই ব্রোমাইড'ম ব্যবহার হিতকর হাইড্র'জ  
 পারাক্সাইড লোশন ব্যবহারে উপকার দর্শে .

### রেটিনাইটিস—রেটিনার প্রদাহ ।

রেটাইনা অর্থাৎ কোমল স্নায়ুগণ বিল্লী'ব প্রদাহ, চক্ষের অন্যান্য  
 পীড়ার সঙ্গে সমুপস্থিত হয় ।

লক্ষণ ।—অগ্নিগোলকে তীব্র গভীর বেদনা, উহা শঙ্খ  
দেখ ও কপাল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে, মাতিয়া আলোকাতঙ্কা,  
দৃষ্টির অস্পষ্টতা বা ম্লোপ, সতত চক্ষুর সম্মুখে আলোক-শিখা বোধ ।  
কনীনিকা সংকুচিত, উপতান্না অনুজ্ঞন ও স্থিবি, চক্ষু লালবর্ণ ।  
সার্বাস্থিক অসুস্থতা অতিশয় হয় প্রবল জ্বর ও প্রদাহ । তরুণ  
অবস্থা তিবোহিত হইলে অগ্নিবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে রেটাইনাতে  
বক্তাধিক্য দৃষ্ট হয় এবং উহাব স্বচ্ছতা ধ্বংস ও বক্তাক্ষবৎ দেখা  
যায় কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ সঞ্চিত হইলে এবং তন্তুব হাসতা জন্মিলে  
সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তির হানি জন্মে

চিকিৎসা —অন্ধকার গৃহে বিশ্রাম করিবে নীতল জল  
বা অগ্নিদ্বিত বা উষ্ণ জল স্বেদ, রোগীর যাহা ভাল লাগে, তাহা  
দেবে মৃদু বিবেচক বেদনা নিবারণার্থ মাদক ঔষধ জ্বর  
উপব বা পশ্চাৎগীবায়া মৃদুভাবে উগ্রতাসামক ঔষধ ব্যবহার্য  
যে সার্বাস্থিক পীড়া বশতঃ ইহা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাব অনুসন্ধান  
ও চিকিৎসা কর্তব্য উপদংশ জাত পীড়ায় লাইকব হাইড্রোজ  
পারক্লোরাইড ও আইয়োডাইড অব্ পটাশ এণবুমিনোরিয়া জাত  
পীড়ায় সূত্রগ্রন্থিব অবস্থানুসারে চিকিৎসা কর্তব্য •

### য্যামোরোসিস—তিমির—লিঙ্গনাশ ।

মাস্তিক পীড়া, দর্শন শাযু বা রেটাইনার পীড়া বশতঃ সম্পূর্ণ বা  
আংশিক তিমির দৃষ্টি দস্তোভেদ, অঙ্গস্থ ক্রমি, শুবায়ু বা ডিম্ব-  
কোষের পীড়া ও গর্ভাবস্থা প্রভৃতি জাত উদ্দীপনা প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া  
এই বোগ জন্মিতে পারে । অধিক তাম্রকূট সেবন, মণ্ড পান প্রভৃ-  
তিও ইহাব কারণ মধ্যে পরিগণিত



লক্ষণ ।—রোগীর গুতি ও মুখাকৃতি বিশেষ প্রকার হয় অনিশ্চিত ভাবে গমন কবে । চতুর্দ্বারস্থ বাহ্য বস্তু দ্বারা দৃষ্টি থাকে না । চক্ষু এক প্রকার বিশেষ আকার ধারণ করে অসম্পূর্ণ বোগে উপত্যার সঞ্চালন মুহূ, কনীনিকা প্রসারিত সম্পূর্ণ অন্ধতা প্রাপ্ত হইলে কনীনিকা অতিশয় প্রসারিত ও উপত্যা অচল হয় । যখন উভয় চক্ষু আক্রান্ত হয়, তখন উহার অস্বাভাবিক উন্নত ও বিবর্ণ স্ফোটিক পর্দা পীত ও তাহাতে প্রসারিত রক্তাধার থাকিতে দেখা যায় অক্ষিবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে বেটাইনা ও কোবইড পর্দাতে বক্র ক্ষরণ, মাস্তক রসস্রাব আদি দৃষ্ট হয় । বোগের প্রাবল্যে দৃষ্টিহীনতা সময় সময় অল্পভূত হয় ; যথা চক্ষুর অত্যন্ত শ্রমাদিব পর কখন কখন দৃষ্টি কেবল অস্পষ্ট থাকে, তাহাকে এম্বিলিয়োপিয়া বলে কখন একটী বস্তু দুইটী বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে ডিপ্লোপিয়া ও কখন একটী বস্তুকে অর্ধেক দেখায় তাহাকে হেমিয়োপিয়া বলে সতত শিবোবেদনা, চক্ষুর সম্মুখে মক্ষিকা ও অগ্নিশিখা দর্শন । আর এক প্রকার অসম্পূর্ণ অন্ধতায় বোগী কেবল উজ্জল আলোতে দেখিতে পায়, তন্নিম্ন অব সমস্ত সময় দেখিতে পায় না, ইহাকে হিমাবালোপিয়া বলে ইহার বিপরীতকে নিক্টালোপিয়া বলে, তাহাতে বেবল অল্প আলোতে অর্থাৎ সূর্য উদয় ও অস্তের কিঞ্চিৎ পর পর্যন্ত দেখিতে পায়

চিকিৎসা ।—রোগের কারণানুসারে চিকিৎসা করা কর্তব্য ক্রিমি ও ক্ষয়িত দস্ত-জনিত রোগে তদনুরূপ চিকিৎসা করিবে একোনাইট নেপিলস ( বাত জনিত ও প্রাদাহিক বোগে ), টাটাব এমিটিক , আর্পিকা ; গোয়েকম ; ক্যালোমেল ৪১৬ রেটাই-

নার পক্ষাঘাত থাকিলে আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম, ৩৯৯, ৪০১।  
টিং নক্স ভমিকা, 'লাইকব' প্রীকনিয়া। স্নায়বীয় ও ধামনিক দুর্ব্ব-  
লতা জনিত রোগে আয়বণ, বার্ক, সমুদ্র বায়ুগেবন, শীতল জল  
স্নান স্থানিক—টিং একোনাইট (কপালে); লাইকব এমো-  
নিয়াব বাষ্প (স্নায়ু বোধাতিয়া জনিত রোগে), ক্যান্সব ফিউ-  
মিগেশন; শস্ত্র দেশে স্থিষ্টাব দিয়া তাহাব চক্ষোত্তোলন করণানন্তর  
৬ গ্রেণ প্রীকনিয়া দিনে এক বার স্থানিক প্রয়োগ। যদি ইহা দ্বারা  
অত্যন্ত উদ্দীপনা হয়, তবে ওপিয়মেব সহিত মিশাইয়া দিবে।  
বেটাইনাব দৌর্ব্বল্যাবস্থায় টিংচর নক্সভমিকা চক্ষুব পাতা ও শস্ত্র-  
দেশে মর্দন করিবে। উপদংশজ পীড়ায় লাইকব হাইডার্জ পাব-  
ক্লোবাইড, পটাস আইয়োডাইড ও সার্সি ব্যবহার্য্য। লাইকব  
আর্সিনিকেলিস, প্রীকনিনের হাইপোডর্মিক ইন্জেক্সন, অথবা  
ক্লোবাইড অব্ গোল্ড ও মোডিয়ম  $\frac{1}{8}$  গ্রেণ বটিকাভাবে ব্যবহাবে  
সময় সময় উপকার দর্শে। স্ট্রাণ্টোনিন ব্যবহাবে কোন কোন সময়  
উপকার হয়।

### মাইয়োপিয়া—নিকট দৃষ্টি

নিকটের বস্তু বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। লেন্স বা কর্ণীয়  
অত্যধিক কুঞ্চিতা বশতঃ সাধারণতঃ নিকটদৃষ্টি পীড়া জন্মে। বয়ো-  
বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে ইহার হ্রাস হয় না, এই রোগ ক্রোমিক। স্নায়ু-  
প্রধান ব্যক্তিদেব উপত্যার ও স্বাভাবিক উদ্দীপনা বা সংকোচন  
বর্তমান থাকে।

চিকিৎসা — অত্যন্ত শ্রম ও স্থগ্ন স্থগ্ন কার্য্য হইতে বিরাম  
ডবল কনকেভ্ গ্লাসের চসমা চক্ষের উদ্দীপনা থাকিলে বেনে-

ডোনা আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়াম, ক্যারোমিড সলিমেট  
টিংচর জিঞ্জর ও পিপারিস জন্ম উপব মর্দিতব্য এসিরিরের মুছ  
সলিউসন ১ ফোটা প্রতি বাত্রিতে দুই মাস পর্যন্ত দিলে উপকার  
হইতে পারে চক্ষুকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া এই পীড়ার বিশেষ  
হিতকর । সময় সময় এট্রপিও ব্যবহাবও আবশ্যক হইতে পারে

### প্রেস্বাইয়োপিয়া—দূর দৃষ্টি ।

বৃদ্ধ বয়সের প্রারম্ভে উপস্থিত হয় । চল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্বে  
প্রায় ইহা হইতে দেখা যায় না চক্ষুর আলোক প্রতিক্ষেপণ  
ক্ষমতার পরিবর্তন বশতঃ এই পীড়া জন্মে নিকটেব বস্তু ভাল  
দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু দূরস্থ বস্তু স্পষ্ট দৃষ্ট হয় অনেক  
সময় দর্শন শক্তির দুর্বলতা বর্তমান থাকে ।

চিকিৎসা —কনভেক্স গ্লাসেব চস্মা রক্তহীনতা  
বর্তমানে কুইনাইন ও লৌহঘটিত ঔষধ, চক্ষু শীতল জল সেচন  
হিতকর

হিমারালোপিয়া—দিনাক্ষ র্যামোরোসিস্ বোগ জষ্টব্য  
নিক্টালোপিয়া—রাত্র্যাক্ষ র্যামোরোসিস্ রোগ দেখ

### ফটে'ফে'বিয়'—অ'লো'ক'তক্ষ' ।

আলোকাতক্ষা—বিবিধ চক্ষু পীড়ার লক্ষণ

চিকিৎসা —চক্ষু হরিৎবর্ণ চস্মা বা বস্ত্রখণ্ড দ্বারা  
আচ্ছাদিত রাখিবে । অন্ধবার গৃহে অবস্থিতি । উষ্ণজলেব

বাষ্প, জলে বেলেডোনা বা পণী একষ্ট্ৰাক্ট গুলিয়া সেই জল উত্তপ্ত কৰিয়া উছাব বাষ্প বা স্বেদ চক্ষে দিবে চক্ষুৰ উপৰি হেমলক পুলটীস, ২০ ৩০ ফোটা ক্লোৰোফৰ্ম হস্তে বাখিয়া উছাব ভাব চক্ষে দিবে কৰ্ণেৰ পশ্চাৎ ও \*জ্ঞ দেশে ছোট ছোট ব্লিষ্টাব। চক্ষুৰ পাতায় টিং আইয়োডিন সার্জিক চিকিৎসার্থ যেকপ ৰোগেৰ সঙ্গে ইহা বৰ্তমান থাকে, তদনুৰূপ উপায়াবলম্বন কৰিবে কোকেইন সলিউশন

চক্ষুপীড়ার সাধাৰণ চিকিৎসা -আলোকাতঙ্কায় চক্ষুৰ সন্নিহিতে ক্লোৰোফৰ্মেৰ বাষ্প লাগাইলে উপকাৰ দৰ্শে। বেলেডোনা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্ৰয়োগে আইবাইটিস, কন-জংটাইভাইটিস আদি প্ৰদাহ উপশমিত হয় উগ্র পদার্থ চক্ষে পড়িলে ১ ফোটা ক্যাপ্টেৰ অয়েল চক্ষুতে ঢালিয়া দিলে যজ্ঞণৰ শান্তি হইয়া থাকে বেদনা নিবারণার্থ এট্ৰপিয়া বা কোকেইন চক্ষু-তারা প্ৰসাৰিত করণার্থ এট্ৰপিয়া ও সংকোচনার্থ এসিৰিং প্ৰয়োজ্য চক্ষুৰ পাতা জুড়িয়া না যায়, তজ্জন্ত ডাইনিউট সিট্ৰিন অয়েন্টমেন্ট বা মৃদু ইয়েলো অকসাইড অব্ মার্করী অয়েন্টমেন্ট

ডিজিজেস্ অব ইয়ার—কৰ্ণ ৰোগ।

ওটাইটিস একফোৰ্ণাল—বাহ্যকৰ্ণ প্ৰদাহ।

কৰ্ণকুহলেন্ৰ স্পৰ্শাতিশায়াবিশিষ্ট ত্বক প্ৰদাহিত হয় কৰ্ণ-উগ্রকব দ্ৰব্য প্ৰবিষ্ট হওন, কৰ্ণমলসঞ্চয়, মস্তকেৰ পাৰ্শ্বে আঘাত, শৈত্য, বাতধাতু ও বত্ৰহীনাবস্থা প্ৰভৃতি

লক্ষণ।—অতীব কৰ্ণকণে বেদনা, হঠাৎ নাড়িলে বৃদ্ধি



পায় কৰ্ণকুহব ক্ষীত ও রক্তাক্ত, ক্ষীততা দ্বারা কৰ্ণকুহব অবরুদ্ধ ও তদ্ব্যতীত অল্প কালের জন্ত বধিবতা আক্রান্ত দিকের গ্রীবাংশ গ্রন্থি ক্ষীত এক বা দুই দিনে পাণ্ডলা ও প্রচুর পরিমিত শ্লেষ্মাশ্রাব প্রাচীনাংশায় পুষ্করণ কৰ্ণকুহরস্থ চর্ম্ম অগ্নাধিক ক্ষীত উপস্থক পবিপুটন হই। প্রণালীতে সন্ধিত ও তাহা রুদ্ধ হইতে পারে শ্রবণ শক্তিব হ্রাস, অত্যন্ত কণ্ডুয়ন ও সার্বজ্ঞিক দৌৰ্বল্য। কৰ্ণকুহবে ক্ষুদ্র ফোটক জন্মিলে তীক্ষ্ণ দন্দবে বেদনা, প্রণালী সংকুচিত ও শ্রবণশক্তিব হ্রাস জন্মে

চিকিৎসা — একোনাইট আভ্যন্তরিক ব্যবহার কবিলে অবিলম্বে প্রদাহ শান্তি হয়। ফোমেণ্টেসন, পুলটিস; সর্বদা ঐষদুগ্ধ জল দ্বারা ধোত করণ; কর্ণের পশ্চাতে জলোকা এসিটেট অব্ লেড ৫ গ্রেণ, জল ১ আউন্স পীচকারি কর্ণের পশ্চাতে টার্টার এমিটীক অয়েন্টমেন্ট কর্ণের ভিতর গ্লিসি-রিণ; অলিভ অয়েল; প্যাপেভাব অয়েল প্রয়োগ বিবিধ প্রকার সংকোচন ধাবন দ্বারা পীচকারি কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে যুত্বেচক পরিবর্তক ও বলকাবক ঐষদ যথা ক্রোবেট অব পটাশ; আইয়োডাইড অব পটাসিয়ম; কুইনাইন; আয়রন কডলিভ অয়েল পুষ্টিকর খাদ্য। তদন প্রদাহের বেদনা উপশমনার্থ কোকেইন, তৈল ব গ্লিসিবিণেব সঙ্গে গিলাইয়া কানের ভিতর দিবে হাইড্রার্জ পারক্লোরাইড ১ গ্রেণ, বেক্টিফায়েড গ্লিবিট ৩ ড্রাম ও পরিষ্কৃত জল ১ ০ আউন্স তুলি দ্বারা কর্ণের ভিতর লাগাইলে উপকার হয়। এতদ্বারা ঘন ঘন ব্রণাদি হওয়া নিবারিত হয়

## ওটাইটিস ইন্টার্নাল—আভ্যন্তর কর্ণ প্রদাহ ।

ইহা অপেক্ষাকৃত গুরুতর পীড়া \*মেম্ব্রেনা টিম্পেনমেব অভ্য-  
ন্তর পর্দাব প্রদাহ, ইহার সঙ্গে সংমিলিত থাকায় এই পীড়া অধিক  
গুরুতর আকার ধারণ করে শৈত্য, বাত পীড়া ও গণ্ডমালা ধাতু  
হইতে এই বোগ উৎপন্ন হইতে পারে শৈশবাবস্থায় ইহা অসা-  
ধারণ নহে । বালকদের কর্ণশূল অনেক সময় এই পীড়া বশতঃ  
উপস্থিত হয়

লক্ষণ —নাক দিয়া নিশ্বাস ত্যাগ ও গলাধঃকরণ কালে  
কর্ণেব মধ্যে অসুখ বোধ হয় অল্পকালেব মধ্যেই উক্ত অসুখ-  
বোধ সতত বর্তমান থাকে । প্রবল শিবোবেদনা ও তদব-  
সানে কর্ণের ভিতর তীব্র, তীক্ষ্ণ ও ক্রমশঃ বর্ধিত বেদনা এবং  
তৎসঙ্গে উচ্চ বা দব্দবে শব্দ অনুভূত হয় তৎপরে কর্ণেব  
মধ্যে বিদাবণ বা পূর্ণতাবোধ হয় অগ্নাধিক বধিবতা জন্মে ।  
চক্ষু লালবর্ণ, মুখাকৃতি ঔৎকণ্ঠিত, চর্ম উষ্ণ, নাড়ী দ্রুত, মূত্র-  
গ্রাস্তি ও অজ্ঞেব ক্রিয়া বিপৃজ্ঞানা, অনেক সময় প্রলাপ বা  
বালকদের আক্ষেপ সতত আভ্যন্তর অবসন্নতা ও গুরুতর  
পীড়াব পূর্বকপ বদিয়া বোধ হয় । মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত  
উপস্থিত হইতে পারে, স্নায়ু পর্গান্ত প্রদাহ প্রসাবিত হইয়া  
এতাদৃশ ঘটনা হয় প্রদাহ আপনাপনি আবেগ্য অথবা  
প্ৰযোৎপত্তি হয়

চিকিৎসা ।—বিবেচক ও স্বেদজনক ঔষধ সেবন ও  
বোণীকে \*ম্যায় শয়িত রাখিবে । লাইকর এমোনিয়া  
এসিটেটস ২৮৩, ২৮৯, টৈত্যানীয়—২৯০, ২৯৩, ২৯৪  
ক্লোবেট অব্ পটাশ ২৯৬ বাত সংশ্লিষ্ট রোগে মোডা স্টাডিসিলেট

বা জাইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম্ ও ভাইনম কলচিকম ৪০৪।  
ওপিয়ম; মর্ফিয়া ৮৮, ১০১, ১০৫, ১০৯ 'একোনাইট ২৭২,  
২৮৮ ক্ষুটিত জলেব বাষ্প, পপীহেড বা ক্যামোমাইল পুস্প  
দ্বাবা সিদ্ধ জলের স্বেদ লিনসিড; ওপিয়ম ও গার্লিক পুলটীস  
কর্ণের পশ্চাত্তাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্লিষ্টাব; টার্টার এমিটীক অয়েন্টমেন্ট  
গরম জল দ্বাবা কর্ণে পীচকারী দিবে তৎপবে গ্লিসিরীণ; কার্ব-  
নিক এসিড অয়েল বা লডেনম দিবে কর্ণপটাহ ছিদ্রীভূত  
হইলে নাইট্রেট অব্ মিল্ভব স্থানিক প্রয়োগ করিয়া ছিদ্র বন্ধের  
চেষ্টা করিবে

### ওটোরিয়া—কর্ণ হইতে পুয়স্রাব।

কর্ণ হইতে পুয় বা শ্লেষ্মা মিশিত পুয় নিঃসৃত হয় কর্ণেব  
বিবিধ পীড়ায় ইহা একটী লক্ষণ মাত্র অনেক সময় ইহা  
অনিদিষ্ট কারণ বশতঃ শিশুদের দন্তোদ্ভেদকালে উৎপন্ন হয়  
গাণ্ডমালা ধাতুপ্রকৃতিক ব্যক্তিদের চর্ম্মস্থ উদ্ভেদ তিরোহিত হওয়ার  
পর এই পীড়া জন্মিতে পাবে শরীরেব অবসন্নাবস্থা হেতু পূর্ণ-  
বয়স্কদের কর্ণস্রাব উৎপন্ন হইতে পারে। কর্ণ হইতে যে স্রাব  
নিঃসৃত হয়, তাহা প্রধানতঃ উগ্র ও দুর্গন্ধ এবং কিছুদিন পবে উহা  
সরস্ক হয়

লক্ষণ। —সচবাচর বয়েক দিন পবেই কর্ণ হইতে স্রাব  
বদ্ধ হয় সময় সময় ইহা প্রাচীন আকারে পবিণত হইয়া  
বহুদিন স্থায়ী হইয়া থাকে। রোগ অধিক দিবস স্থায়ী হইলে  
মেঘেণা টিম্পেনাই ও অস্থি বিনষ্ট ও ক্ষত হয় মস্তিষ্ক ও  
উহার ঝিল্লী আদিও প্রদাহিত হইতে পারে। এতদ্রূপ ঘট-

নায় শীত, জ্বৰ ও স্ফুৰ্ত্ত মাস্তিষ্ক লক্ষণ উপস্থিত হয় অবশেষে আক্ষেপ বা অচেতনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়

চিকিৎসা — প্রদাহ থাকিলে একোনাইট সেবা গ্লিসিৰীণ অব্ ট্যানিন স্থানিক লাইম ওয়াটবের পীচকারী ঈষদ্বষ জলে সাবান গুলিয়া তদ্বাৰা পীচকারী পুষ্টিকর খাদ্য, কুইনাইন ও ষ্টীল ১৭৬ ষ্টীল ও পেপসিন ফস্ফেট অব্ আয়বণ ১৮৭ মিনাবেল এসিড্‌স ও বার্ক ১৭০ আইয়ো-ডাইড অব্ আয়বণ আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম ও সার্জা ৩৯৯ কডলিভর অয়েল য়াদম ২৫০, জিঙ্ক ২৪২, সলফেট অব্ ক্যাডমিয়ম বা ট্যানিক এসিডেব ধাবন দ্বাৰা পীচকারী অলিভ অয়েল; গ্লিসিৰীণ, কার্বলিক এসিড (১ ভাগে ১৬ ভাগ), কষ্টিক লোশন ব্যালসম পেরু ও অক্সগল একত্রে সমভাগে কর্ণে দিবে লাইকর সোডি ক্লোবেটী, ৮০ আইয়োডোফর্ম ও গ্লিসিৰীণ, থাইমল ও গ্লিসিৰীণ বা অমণ্ড অয়েল বোবাসিক বা পারম্যাঙ্গানেট অব্ পটাসের ধাবন হাইড্রার্জ পারক্লোরাইডের মৃদু ধাবন। বোরিক এসিড ও আইয়োডোফর্ম একত্রে একটা কাগজের নলের মধ্যে পুৰিয়া কর্ণেব ভিতর ফুৎকার সহযোগে প্রবিষ্ট করাইলে পুষ্টি নিঃসরণ নিবারণিত হয়

### ওট্যাল্জিয়া—কৰ্ণ শূল ।

প্রদাহ, বাহ্য বস্তুর অবস্থান, তালুপার্শ্ব-গ্রহি প্রদাহ, পনিপাক-যন্ত্রের বিশৃঙ্খলা, ও বাত রোগ প্রভৃতি কাৰণে উৎপন্ন হয় অডিটরী নৰ্ভেব বা শ্রবণ স্নায়ুত স্নায়ুশূল আপনাপনিও উপস্থিত হইতে



পারে স্নায়ুশুলের আক্রমণ সময়ে সাতিশয় যন্ত্রণা হয় প্রদাহের বেদনার স্থান তীব্র বেদনায় হয় ন' ও জ্বর থাকে ন', এই বেদনা সহসাই তিরোহিত হয় পাকায় ও যকৃতের ক্রিয়া বৈযম্য বশতঃ কর্ণের স্নায়ুশূল উৎপন্ন হয়। জরায়ুর ক্রিয়া বিশৃঙ্খলা ও ক্ষরিত দস্ত বশতঃ এই বোগ জন্মিতে পাবে সময় সময় বেদনা অত্যন্ত প্রবল হইয়া থাকে এতদ্বারা বোগী অস্থির হয় ও সমূহ ক্লেশ পায়

চিকিৎসা।—মুত্র বিবেচক; কুইনাইন, ওপিয়ম; ইণ্ডিয়ান হেম্প ক্লোবোফর্ম ও ইথর ভেপার; একোনাইট লিনিনেট; লডেনম তুলায় ভিজাইয়া পোস্ত টেড়িব কাথের বাষ্প, মসীনার পুনটীস, পেয়াজ বা রসুনের কোয়া স্থানিক প্রয়োজ্য। কর্ণে মল থাকিলে ঈষৎ জল বা কার্বনেট অব সোডা সোলিউশন ( ১০ গ্রাং, জল ১ আং ) দ্বারা পীচকানি

### ডেফ্‌নেস—বধিরতা

বাতপীড়া ও স্নায়ুশক্তির হ্রাস বশতঃ এই পীড়া জন্মিতে পাবে বাতজনিত রোগ সাধাবণতঃ হয় সন্ধিস্থানের প্রদাহান্তে এই পীড়া প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে করোটি, \*জ, চুচুক প্রবর্তন, হ্রু ও দস্ত ( আকান্ত দিকের ) বেদনাযুক্ত হয় যন্ত্রণাদায়ক কর্ণনির্নাদ বাত্রিতে বৃদ্ধি ও অস্বাভাবিক শব্দস্রাব অস্থিচ্ছদের প্রদাহ ও ক্ষত উপস্থিত হইলে বোগ অত্যন্ত গুরুতব হইয়া উঠে সময় সময় পুষ্ণাব হয় ও তদ্বারা অস্থিতে ক্ষত জন্মিতে পারে কর্ণে গাউটাকা বাত হইলে ছিঁড়ে ফেলাব প্রায় বেদনা, জ্বালায়ুক্ত উত্তাপ, কর্ণনাদ, ক্ষীণতা ও আব-

ভ্রুতা, তীক্ষ্ণ বেদনা, সময় সময় জ্ঞানহীনতা, প্রলাপ বা আক্ষেপ হয় স্নায়ুগুণের পীড়া বশতঃ একরূপ বধিবতা হয়, তাহাকে নর্ভস ডেফেন্স বলে

চিকিৎসা । আইয়োডাইড অব পটাশিয়াম, ওপিয়াম, উষ্ণ জলে স্নান, উষ্ণ জলস্নেদ বাতজনিত বোগে ক্ষাব্যটিত বিবেচক ; সোডা সালিসিয়েট ; কলচিকম ইত্যাদি স্নায়বীয় বাধিৰ্য্য বোগে হয়ার টম্পেট নামক যন্ত্র কর্ণে ধাবণ করিবে । গ্লিসিরিন, অমণ্ড তৈল কর্ণাভ্যন্তরে ২৩ ফোটা দিয়া কাণের ছিদ্রে তুলা দিয়া বাধিবে কর্ণনির্নাদে কুইনিন, ব্রোমাইড, সালিসিন্ ও সালিসিয়েটস প্রয়োজ্য পাইলোকার্পিনের হাই-পোটাস্টিক ইন্জেক্শন হিতকারী

কর্ণের পীড়ার সাধারণ চিকিৎসা —কর্ণের পাঠায় বা কর্ণকুহরে একজিমা হইলে লাইকব পল্‌মাই ৬০ মিনিম ও ভেসিলিন ১ আউন্স একত্রে মিশাইয়া লাগাইবে অথবা কয়েক ফোটা লেড লোশন ( ১ ভাগে ৪০ ভাগ ) কর্ণের ভিতর ঢালিয়া দিবে । তর্কণাবস্থা অপগত হইলে উক্ত অয়েন্টমেন্টের সঙ্গে লাইকব কার্বনিস ডিটার-জেন্স মিশাইয়া ব্যবহার করিবে সময় সময় অমণ্ড অয়েল একটু গবম করিয়া কাণের ভিতর দিলে উপকার হয় তুলি দ্বারা কাণ পরিষ্কার করিবে কর্ণের মধ্যস্থ খইল আদি গবম জলের পীচকাবি দ্বারা নিঃসৃত হয় কর্ণের পাঠা উপর ও পশ্চাৎ দিকে টানিয়া ধরিলে পীচকানির জল সহজে প্রবিষ্ট ও নিঃসৃত হইয়া যায় । এতদর্থে সাধারণ ইঞ্জিয়া ববার এনিমা সিরিঞ্জ ব্যবহৃত হইতে পারে লাইকার্বনেট অব সোডা সলিউশন ( ১ ড্রামে ১ ০ গ্রে ) ব্যবহার করিলে সহজে কর্ণমল নিঃসৃত হয় ।

কর্ণের পশ্চাতে ফুলিলে ফোমেণ্টেসন ও পুন্ড্রীস ব্যবহার্য্য  
পাকিলে কাটা দিতে হয়

কর্ণমধ্যস্থ মলাদি ও পুষের কডকডি নিঃসৃত কবণার্থ প্যাথো-  
ইন সলিউশন্ (শতকবা ৫ ভাগ) ১০ ১৫ ফোটা কর্ণের ভিতর  
ঢালিয়া দিতে হয়, একঘণ্টা পরে ঈষৎক্ষণ বোবিক গোলনের  
পীচকারী দিলে কর্ণ পরিষ্কৃত হয়

কর্ণ নিম্নাদে সোডা ব্রোমাইড সেব্য ও কোকেইন স্থানিক  
প্রযোজ্য

## ডিজিজেস্ অব স্কিন চর্ম পীড়া ।

### ইরিথিমিয়া

এক প্রকার অসংক্রামক চর্মপীড়া ইহাতে শরীরের স্থানে  
স্থানে আবদ্ধ মণ্ডল বাহির হয় উহা চর্মনিম্নে বিশৃঙ্খলভাবে  
নির্গত হয়। সাধারণতঃ মুখমণ্ডল, বক্ষঃ ও শাখাদ্বয়ে এই  
বোগ দৃষ্ট হয়

প্রকারভেদ — ইরিথিমিয়া ফিউগ্যাক্স—ইহা ক্ষণস্থায়ী  
প্রকৃতি বিশিষ্ট এবং সাধারণতঃ পরিপাক যন্ত্রেব বিশৃঙ্খল  
জনিত। ইরিথিমিয়া ইন্টবট্রাইগো চর্মের ভাঁজ মধ্যে ঘর্ষণ  
হেতু জন্মে, ঐ সকল স্থানের স্রাব ধৌত করিবে বিদূরিত হয়  
না ইরিথিমিয়া সার্সিনেটম্ গোলাকার (অক্ষুণ্ণ সদৃশ) ও  
ঈষৎ উন্নত রক্তমণ্ডল; তরুণ বাত সহ উৎপন্ন হয় ইরিথিমিয়া  
লিভি—অধঃ অঙ্গে প্রকাশ পায়, তৎকালে উহাতে শোথ জন্মে  
ইরিথিমিয়া নোডোসম—ইহাতে উদ্ভদ অণুকৃতি ও উন্নত হয় এবং  
তাহা জজ্বার অগ্রভাগেই প্রকাশ পায়

চিকিৎসা। স্নায়ুটিত মৃদু বিরেচক ; এফাবভেসিং  
সাইট্রেট অব ম্যাগনিজিয়া ; কম্পাউণ্ড বিউবার্ক পাউডর  
ঐষজ্ঞ জলে স্নান, বাষ্প স্নান ; লঘু পথ্য ; কুইনাইন ১৯৩  
পরিপাক, মূত্রযন্ত্র ও জ্বায়ুব কোন বিশৃঙ্খলা বর্তমান থাকিলে  
বিদূরিও করিবে সব এসিটেট অব লোড লোশন ৪২৬ গ্লিসি-  
রিন লোশন ১৫৫ বেদনা থাকিলে ভিরাট্রিয়া অয়েন্টমেন্ট  
বেলেডোনা ও গ্লিসিরিন বোবিক এসিড, ঈর্চ, জিঙ্ক অক্সাইড,  
স্থানিক প্রয়োজ্য আক্রান্ত অংশ তুলা দ্বারা ঢাকিয়া ও তদু-  
পরি ব্যাণ্ডেজ বাধিয়া রাখিবে শীতল জল, শৈতাপানীয়, লিম-  
নেড ; সোডাওয়াটার। কার্বনেট অব জিঙ্ক। বাইকার্বনেট অব  
সোডা লোশন ১ ভাগে ৪০ ভাগ বোবাক্স বা বোরাসিক  
লোশন ও ৩৭সহ হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ডিল মিথাইয়া স্থানিক  
প্রয়োগ করিলে উপকার হয় ওডিকোলন, অক্সাইড অব জিঙ্ক  
ও জল স্থানিক প্রয়োজ্য

### রোজিযোলা—পাটলিকা।

চর্মেব এক প্রকার অসংক্রামক প্রদাহিক অসুস্থতা অঙ্ক-  
ক্ষণস্থায়ী বক্তবর্ণ উদ্ভেদ উহাদেব আকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থাকে,  
ও উহাবা বিশৃঙ্খলভাবে প্রকাশিত হয় শরীরেব সর্ব স্থানেই  
অল্প বা অধিক পরিমাণে বাহির হয় সময় সময় স্বতন্ত্র ও  
ক্ষুদ্র দাগবৎ রক্তবর্ণ উদ্ভেদ প্রকাশ পায় কখন কখন বক্ত,  
মণ্ডলবৎ হইয়া থাকে স্থিতিকাল এক হইতে সাত দিবস  
ইহাকে কখন কখন হাম ও আরক্ত জ্বব বলিয়া ভ্রম হইতে  
পারে, কিন্তু ইহাতে সর্দির লক্ষণ থাকে না অনেক সময়



উদ্ভেদ প্রকাশের পূর্বে শীত ও জ্বর হয় গলাবেদনা ও  
বিবম্বিয়া আদি থাকিতে পূর্বে বালকদের দন্তোদ্ভেদ কালে  
এই পীড়া জন্মিতে পারে

চিকিৎসা।—মূত্র বিবেচক ও পরিবর্তক ঔষধ দ্রব্য  
পথ্য, লিমনেড মিনাবেলায় ও তিত্ত উদ্ভিজ্জব কাথ—১৬৯,  
১৭০ ভিনিগার ও জল স্পঞ্জিং লাইকব এমোনিয়া এসি-  
টেটীস ও নাইট্রস ইথর বাসকদের দন্তোদ্ভেদ হইতে থাকিলে  
মাড়ি চিড়িয়া দিবে চক্ষোপরি অলিভ অয়েল বা লার্ড  
লাগাইবে

আর্টিকেরিয়া—আমবাত, শীতপিত্ত ।

এক প্রকার অসংক্রামক চর্মপীড়া চুলকাইতে চুল-  
কাইতে স্থানে স্থানে ফুলিয়া উঠে, তাহা আবাব ক্ষণকাল  
পবেই তিবোহিত হয় এবং নূতন বাহিব হয় তৎসঙ্গে উত্তাপ,  
জ্বালা ও চিন্ চিন্ ও সাতিশ কণ্ঠয়ন উপস্থিত হয় সময়  
সময় সার্বসঙ্গিক লক্ষণাদি প্রকাশ পায় জ্বর, ক্রোদাবৃত্ত জিহ্বা  
ও অস্বস্থ নিঃশ্রাবাদি রোগ প্রাচীন ও বিরামশীল হইতে  
পাবে এবং কয়েক মাস পর্য্যন্ত থাকে পরিপাক যন্ত্রের বিশৃ-  
ঙ্খলা, বাত, জ্বায়ুর উদ্দীপনা ও দন্তোদ্ভেদ আদি কারণে এই  
বোগ জন্মিতে পাবে তাপ্নিন তৈল ও কোপেবা আদি সেবন  
দ্বারাও এইরূপ উদ্ভেদ উৎপন্ন হইতে পাবে

চিকিৎসা।—কণ্ঠয়ন নিবারণার্থ চক্ষোপরি টিংচর  
বৈন্জইন কং প্রলেপ দিবে ক্রোবোফর্ম আধ ড্রাম, মোমের  
মলম, চর্বি বা তৈল ১ আউন্স, একত্রে মিশ্রিত করতঃ স্থানিক

প্রয়োগ করিলে কণ্ঠস্থান নিবাবিত, হয় পাকশায়েব ক্রিয়া  
বিশৃঙ্খলা হইলে বমনকারক ও সক্ষার বিবেচক ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৪ ।  
রিয়াই ও ম্যাগ্নিসিয়া ; সিডনীজ পাউডর । লাইকব পটাশ ৩৯৭ ।  
এমোনি কার্ব ৯, ১৮৩ ষ্টীল ১৭১, ১৮৯ ফেরি এট্ কুইনী  
সাইট্রস ও এসিড হাইড্রোক্লোরিক ডিল ১৭৩ । ফেরি এট্  
এমোনি সাইট্রস ১৮০ নাইটো হাইড্রোক্লোরিক এসিড  
ডিল ১৬৯ আইওডাইড অব পটাসিয়ম ১৯২ জার্মিনিক ;  
কুইনাইন ; কডলিভর অয়েল স্থানিক—লেড দোশন ১১২,  
১১৬ ভিনিগার ও জল সমভাগ স্পঞ্জিং টিং জার্মিকা ;  
গ্লিসিবিণ ও গোলাপ জল সমভাগ শীতল বা ঈষদুষ্ণ জলে  
ম্নন ; সহজে প্বিৎক হয় একপ থাৎ বিসদ বস্তু সেবন  
ও ব্যায়াম বোরাক্স ও গোলাপ জল ১৫৮ ; লাইকব পটাশ ও  
একোয়া স্ত্রাখিউকাই ১৫৫ ; ইহাতে কণ্ঠস্থান নিবাবিত হয় ।  
ইবিধিমা দ্রষ্টব্য ।

## হার্পিস—ইন্দ্রবিদ্ধ ।

প্রদাহিত চর্ম্মের উপর জরপূর্ণ উদ্ভেদ সমূহ বাহির হয় ।  
ইহা অল্পদিন স্থায়ী ও অসংক্রামক চর্ম্মপীড়া উদ্ভেদের স্থিতি-  
কাল ৩৪ দিবসেব অধিক নহে আবোগ্যাণ্ডে দাগ থাকে  
না সর্দি বা জ্বর বশতঃ ওষ্ঠেব বোনে যে জ্বরচূঠা বাহির  
হয়, তাহাকে হার্পিস লেবিয়েলিস বলে শিশু ককেও এই  
উদ্ভেদ জন্মে, উহাকে হার্পিস ট্রিপিউসিয়েলিস বলে দেহকাণ্ডেব  
অর্দ্ধ দিক ব্যাপী ও গোলাকাবে একরূপ উদ্ভেদ প্রকাশিত হয়,

তাহাকে হার্পিস্ জষ্টার বলে উহা ক্লেশদায়ক পীড়া ও উহাতে প্রবল বেদনা (ছলবেধবৎ) বোধ হয় ।

চিকিৎসা ।—কোষ্ঠ পবিষ্কারার্থে বেচক । সব এসিটেট অব্ লেড লোশন দ্বারা স্পঞ্জিঃ অক্সাইড অব্ জিঙ্ক বা সব এসিটেট অব্ লেড অয়েন্টমেন্ট ১২১, ২২৬ । বেলে-ডোনা বা একোনাইট লিনিমেন্ট । সেবনার্থ কুইনাইন ও আর্সিনিক ওলিয়েট অব্ মর্ফিয়া, কলোডিয়ন, আইয়োডিন লিনিমেন্ট, এসিটিক এসিড, নাইট্রেট অব্ সিলভর—স্থানিক অক্সাইড অব্ জিঙ্ক, ক্যালোমিনা প্রোপেয়ারেটা, বিসমথ, ক্যালো-মেল, ষ্টার্চ ইত্যাদি চূর্ণাকারে স্থানিক প্রয়োজ্য । ইকুথিয়ল জলের সঙ্গে মিশাইয়া উদ্ভেদোপরি প্রয়োজ্য । বেদনা নিবারণার্থ কোকেইন

### একুজিমা—পামা ।

ইহা এক প্রকার অসংক্রামক চর্মপীড়া—সচবাচর জন্মে ; ইহাব উদ্ভেদ প্রথমতঃ জলপূর্ণ, পরে সপুষ হয় চর্মের কতক অংশ লালবর্ণ, প্রদাহিত ও ক্ষত হয় ; উপরক উঠিয়া যায় ও মস্ত বা রসস্রাব হইয়া থাকে । ভার্জ ক্ষত হইয়া ও তাহা মামডী দ্বারা আবৃত থাকে । সার্কাজিক স্বাস্থ্যহীনতা, ক্ষুধালোপ, উগ্রতা ও অস্থিৰতা জন্মে রোগ তক ও প্রাচীন দ্বিবিধ আকাবে প্রকাশিত হয় ।

চিকিৎসা । কণ্ডুগন নিবারণার্থে টিংচর বেনজইন কং স্থানিক প্রলেপ দিবে । বোবেসিক এসিড ১ ড্রাম, উষ্ণ জল ২০ আউন্স একত্রে ধৌত কর্পূর্ব চূর্ণ ছড়াইয়া দিলে

কণ্ডুয়ন নিবারিত হয় গ্লিসিরিং অর্থাৎ ট্যানিন অয়েল অব্  
কেড, সাবান ও স্পিরিট সমভাগে, সলফাইড বাথ সলফর  
সেবনে উপকার দর্শে স্থানিক—যবোদক; মসিনাব ফান্ট,  
লেড, লোশন; সফার জলে ধোত করণ। গ্লিসিরিং অব্ ষ্টার্চ;  
গ্লিসিবিণ ও জল; লাইম লিনিমেন্ট; বোরাক্স ও গ্লিসিরিং  
১৫৮, প্রম্বাই এসিটাস ও হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ১২১;  
করোসিব সল্লিমেট ১১৭ অঙ্গুযেঃ হাইড্রার্জ নাইট্রেটস ৬১, ৬৭  
সল্ফব অয়েন্টমেন্ট—৬৫, ৬৮, ৬৯, ৭০ উত্তমরূপে পবিকার  
করিবে অনিভ অয়েল, লার্ড বা লিনসীড পুলাটীম স্থানিক  
প্রয়োগে স্ফোট সকল উঠিয়া যাইতে পারে জৈষদুষ্ণ জলে  
স্থান ক্রিয়েজোট ও বেড অক্সাইড অব্ মার্কবী অয়েন্টমেন্ট  
সার্কাসিক—শালাইন পর্গেটিভস অর্থাৎ সলফেট অব্ ম্যাগ্নিসিয়া  
ও সোডা রিউবার্ব ও ম্যাগ্নিসিয়া; রিউবার্ব ও ব্লুপীল  
ষ্টীল ও সলফেট অব্ সোডা কুইনাইন ও ষ্টীল ১৭৫, ১৭৬  
ভাইনম ফেরি ১৯১ আর্সিনিক—১৬৮, ১৬৯, ১৯১ কড-  
লিভর অয়েল। করোসিব সল্লিমেট ৩৯৮, ৪০২ বেড আইয়ো-  
ডাইড অব্ মার্কবী ওপিয়াম; হেনবেন, ক্রোবাল, সল্ফোনাল,  
সোডা ব্রোমাইড, ইণ্ডিয়ান হেম্প ছগ্ন, ঘৃত, মাংস, শেরী, ক্লারেট  
প্রভৃতি পথ্য ও বিগুন্ধ বায়ুসেবন ও ব্যায়াম আইয়োডাইড  
অব্ পটাসিয়াম ও আইয়োডাইড অব্ আয়ব্র ক্রাইসোফানিক  
এসিড অয়েন্টমেন্ট ১৫—২০ গ্রোণ ও ১ আউন্স চর্কি বা মোমের  
মলম সেবনার্থ অল্প মাত্রায় ( ১৬ গ্রোণ ) টার্টারেট অব্ এন্টিমনি  
কিছু দিবস পর্য্যন্ত দিনে ৩ ৪ বার সেবন করাইলে বিশেষ উপকার  
পাওয়া যায়। স্থানিসিলিক এসিড, ক্রাইসোফানিক এসিড,



বোবিক এসিড, ইকুয়িমল, গ্রাইকর কার্বনিস ডিটারজেন্স, হাইড্রোজ' এসন ক্লোরাইড, কার্বলিক এসিড, থাইমল, ক্যালোমেগ প্রভৃতি, মলম বা তৈল সহযোগে স্থানিক প্রয়োগ করা যায়।

### পেম্ফাইগম—বিস্মিকা।

ইহাতে বড় বড় গোল বা অণ্ডাকার ফোঁসা উৎপন্ন হয় উহার ব্যাস ২৩ ইঞ্চি হয়। উহা দেহের এক বা অধিকাংশ জন্মে ফোঁসার মধ্যে ক্ষাবধর্মী মস্ত থাকে, উহা শীঘ্রই অস্বচ্ছ, অন্ন ও পুষ্ক হয় ইহার সঙ্গে সামান্য প্রকার জ্বাদি উপস্থিত হইতে পারে।

চিকিৎসা :—এমোনিয়া ও বার্ক ১৮৩, ১৮৪ নাইটো হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও তিত্ত ফার্ট কুইনাইন ও আয়রন ; কডলিভর অয়েল কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে মৃদু রেচক ছর্দমা রোগে আর্গিনিক ; কুইনাইন ও ষ্টীল ১৮৯, ১৯১ গালিয়া দিয়া কষ্টিক লোশন দিবে। অকসাইড অব্ জিঙ্ক, ক্যালেমিনা প্রিপে-য়ারেটা, কার্বলিক এসিড, থাইমল, বোবিক এসিড লোশন বা চর্কির সঙ্গে মলমাকাবে প্রয়োজ্য

### রুপিয়া—মলিনিকা।

ইহা এক প্রকার অসংক্রামক চর্মরোগ উপরি বর্ণিত পীড়ার অনুরূপ ; দুর্বল ব্যক্তি, বিশেষতঃ যাহাদের দেহ উপদংশ বিধে জর্জরীভূত, তাহাদের এই রোগ জন্মে ইহার ফোঁসা চ্যাপ্টা-কার হয়, প্রথমে উহাতে মাস্তক রস থাকে, পবে উহা সপুষ

বা রক্তবৎ হয়। অবশেষে শুষ্ক হইয়া কৃষ্ণবর্ণ মামডীকপে পবিত্রিত হইয়া থাকে। সন্নিহিত চর্ম্মের দ্বারা প্রদাহিত, মাগ্গক জ্বাব, মামডী পুষ্ণ ও বিস্তৃত হয়। মামডী বিদূষিত হইলে গোলাকার ক্ষত প্রকাশ পায় অনেক দিন পবে এই ক্ষত আবোণা হয়। কটিদেশ ও অধঃশাখায় সাধাবণতঃ এই পীড়া জন্মে যোগেব স্থিতি কাল ২৩ সপ্তাহ হইতে কয়েক মাস জীবনী শক্তি নিতান্ত ক্ষীণ না হইলে এই পীড়া হইতে জীবনের কোন আশঙ্কা নাই।

চিকিৎসা। — ঈষদ্রুক্ষ জলে স্নান, পুষ্টিকর খাদ্য, কডলিভর অয়েল; পবিত্রিত মদ্যপান নাইটিব এসিড ও ইনফিবার্ক কুইনাইন ও টিংচর সার্পেন্টরী; আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম বা সোডিয়ম ৩৯১ আইয়োডাইড অব্ আয়রন, কডলিভর অয়েল। স্থানিক—কষ্টিক লোশন, মার্কিউরিয়েল অয়েন্টমেন্ট; আইয়োডাইড অব্ ঈচ, মার্কিউরিয়েল ভেপার বাথ। ডনোভান্স সলিউশন স্থানিক আইয়োডোফর্ম অয়েন্টমেন্ট, কার্বলিক অয়েল

### একুথিম — বৃহদাকার পুষ্পবটী।

এক প্রকার অসংক্রামক চর্ম্ম প্রদাহ। ইহাতে উন্নত গোলাকার ও বড় বড় পুষ্পপূর্ণ পীড়কা দেহের সর্ব্বাংশেই বাহিব হইতে পারে। পীড়কা ক্ষতজ ডাব থাকে, উহার মূলস্থ চর্ম্ম কঠিন ও প্রদাহিত হয় পবে পাতলা ও কৃষ্ণবর্ণ মামডী পড়ে এবং অবশেষে উহা বিদূষিত হইলে অগভীর ক্ষত চিহ্ন থাকে। ইহা তৎক ও প্রাচীন আকারে উপস্থিত হইতে

পারে অসম্যক পরিপুষ্ট শিশুদের মস্তকে সাধাবণতঃ এই পীড়া জন্মে

চিকিৎসা। —মৃদু বিবেচক ; সামান্য ; পুষ্টিকর খাদ্য। ওয়াটার ড্রেসিং, সব এসিটেট অব্ লেড লোশন ; বোরিক এসিড লোশন। এল্ডব ফ্লাউদার অয়েন্টমেন্ট ; জিঙ্ক অয়েন্টমেন্ট। সেবনার্থ কডলিভর অয়েল ; কুইনাইন ও আয়রন স্ফিছিয়া বা উফা জলে দান। আর্সিনিক ও আয়রন ১৯১।

### ইম্পিটাইগো—চর্মদল।

এক প্রকার প্রবল ও সময় সময় সংক্রামক চর্ম প্রদাহ সহ অর্ধ গোলাকৃতি বা চ্যাপ্টা পুষ্পপূর্ণ উদ্ভেদ বাহিন হয। প্রায়ই উদ্ভেদ পুঞ্জাকারে উপস্থিত হয় ইহাতে পুরু ও স্ফিৎ পীতবর্ণ মামড়ী পড়ে, উহার নিম্ন হইতে পুষ্পাব হয়। মামড়ী পড়িয়া গেলে ক্ষত দৃষ্ট হয়। মুখমণ্ডল, কপোল ও মস্তকাদি স্থানে সাধাবণতঃ জন্মে। ইহার সঙ্গে সার্বাস্থিক অসুস্থতা থাকিতে পারে। উদ্ভেদ সকল গোল বা অণ্ডাকারে অবস্থিতি করে শিশুদের মস্তকে ও মুখমণ্ডলে এই প্রকার চর্ম-পীড়া হইলে তাহাকে ত্রিষ্টা ল্যাকুটিয়া বলে

চিকিৎসা। —স্থানিক গ্লিসিরিন অব্ ট্যানিন সেবনার্থ সল্ফর, স্ট্রালাইন পরগোঁড়স—৩২৭, ৩৩১, ৩৩৪, ৩৩৯ একট্রাক্ট পপী ও লেড ব অক্সাইড অব্ জিঙ্ক অয়েন্টমেন্ট, ক্রিয়েজোট ও গ্লিসিরিন ২৭ ; কার্বলিক এসিড ও গ্লিসিরিন ২৮ সলফর ও টার অয়েন্টমেন্ট ৫৮ অগ্নুযেঃ হাইড্রাজ্ নাইট্রেটস ৬১। আইয়োডাইড অব্ সল্ফর অয়েন্টমেন্ট ৬৯, ৭০

লাইকর পটাশ ; মর্ফিয়া ও গ্লিসিবিণ ১৫৫ বোরাক্স ও গ্লিসিবিণ ১৫৮ কার্বনেট অব্ জিঙ্ক ভেপ্পাব বা ওয়ার্ম বাথ স্ফোট সকল বিদূষিত করণার্থ পুলটীস ; ওয়াটব ডেসিং ও মলম ব্যবহার্য্য স্ফোট পড়িয়া গেলে ক্রিয়েজোট অয়েন্টমেন্ট সার্বস্বাস্থ্যিক ঔষধের মধ্যে আর্সিনিক, কডলিভর অয়েল, কুইনাইন। বোরিক লোশন, হোয়াইট প্রিসিপিটেড অব্ মার্করী অয়েন্টমেন্ট

### ট্রিফিউলস—অলজিকা ।

এই বোগে ক্ষুদ্র, কঠিন, সময় সময় অল্প লালবর্ণ পীড়কা মিলিত বা বিচ্ছিন্ন ভাবে উপস্থিত হয় ইহা শিশু ও বালকদিগের হয়। ইহা শবীরেব এক স্থানে প্রকাশ প ইয়া সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইতে পারে ইহাতে সামান্য প্রকার উদ্দীপনা থাকে এই রোগ প্রকাশয় ও অল্পেব ক্রিয়া বিশৃঙ্খলা, অনুপযোগী জাহাব বা দন্তোদ্ভেদকালীন উদ্দীপনা বশতঃ সমুৎপন্ন হয়

চিকিৎসা । শিশুর পানীয় ছুৎকের সহিত কার্বনেট অব্ সোডা বা বাইকার্বনেট অব্ পটাশ অল্প মাত্রায় মিশাইয়া দিবে কোষ্ঠবন্ধে রিউবার্ব ও ম্যাগনিসিয়া ও ডিল ওয়াটার দন্তোদ্ভেদে বিলম্ব হইলে মাড়ি চিবিয়া দিবে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন হইতে থাকিলে অক্সাইড অব্ জিঙ্ক অয়েন্টমেন্ট, গ্লিসিবিণ ও বোজ ওয়াটব, ষ্টার্চ, অক্সাইড অব্ জিঙ্ক বা ক্যালোমাইন পাউডর স্থানিক প্রয়োজ্য সেবনার্থ—কডলিভর অয়েল ও সিরপ ফেরি আইয়োডাইড ঈষৎ জলে মিশ্রন করাইবে ও পবিত্রাব পরি-  
চ্ছন্ন রাখিবে



### লিচেন—অমসক, পদ্মিনীকণ্টক ।

ইহা দুর্দম্য ও ক্রোমোফর চম্পীড়া । ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, কঠিন, লালবর্ণ, উন্নত পীড়কা বা উদ্ভেদ—স্বতন্ত্র বা পুঞ্জাকারে প্রকাশিত হয় । ইহাতে উদ্দীপনা থাকে ও চিন্ চিন্ বোধ হয় এবং অবশেষে সামান্যরূপে চর্ম উঠিয়া যায় । ইহাতে অত্যন্ত কণ্ডুযন হয় । হস্ত, বাহু, গ্রীবা, মুখমণ্ডল ও শরীরের অন্যান্য অংশেও জন্মে । ইহা প্রাচীন ও তৎকাল বিবিধ আকারে প্রকাশ পায় । সাতিশয় উদ্ভাপ, অল্প ও পাকায়ের ক্রিয়া বিশৃঙ্খলা ও বালকদেব দন্তোদ্ভেদ বৎ তঃ এই বোগ উৎপন্ন হয় ।

চিকিৎসা ।—ক্যালেক্সাইডিস অল্প মাত্রায় আভ্যন্তরিক ব্যবহার্য্য । ক্লোরোফর্ম অয়েন্টমেন্ট স্থানিক প্রয়োগে কণ্ডুযন নিবারণিত হয় । লাইকর কার্বনিস ডিটাজেন্স বা অয়েল অব্ কেড ( ১ ড্রামে ১ আউন্স ) অথবা টর অয়েন্টমেন্ট । বাইকার্ব নেট অব্ সোড ১ আউন্স ও জল ৩০ আউন্স ধাবন আকারে প্রয়োজ্য । হাইড্রার্জ পাবকোরাইড ৩ গ্রাঃ, এসিড কার্বলিক ১ ড্রাম ও সিম্পল অয়েন্টমেন্ট ৩ আউন্স একত্রে মলম আকারে প্রয়োজ্য । নাইটেট অব্ সিল্ভর ২০ গ্রাঃ ও নাইট্রিক ইথর ১ আউন্স মিলাইয়া লাগাইলে কণ্ডুযন নিবারণিত হয় । ঈষ-ছষঃ জলে স্নান, মৃদু বেচক, অন্তস্তেজক পথ্য ; সামান্য পানীয় স্থানিক—লাইকর পলমাই সব এসিটেটস লোশন ২৪০, ২৪১ হাইড্রোসিল্যানিক এসিড ও পলমাই এসিটাস ১১৬ কবোসিব সল্লিমেট ১১৬ গ্লিসিরিঃ ১ আঃ, কবোসিব সল্লিমেট ৬ গ্রাঃ, ক্লোরোফর্ম ২০ ফোটা, জল ৭ আউন্স একত্রে ধৌতার্থ প্রয়োজ্য । পরিবর্তক ঔষধ—আইয়োডাইড্ অব্ পটাসিয়ম ও বার্ক, কবো-

সিব সল্লিমেট ও বার্ক ৩৯৮ । আর্সিনিক ১৯১ । মার্কিউবিয়েট  
ভেপার বাথ, সল্ফর বাথ কডলিভর অয়েল, ফস্ফেট অব  
আয়রন ; কুইনাইন ও ষ্টীল বিন আইয়োডাইড অব মার্কবী এই  
গ্রেণ বটিকাকাবে আহাবের ৭ ব সেব্য

### প্রাইগো—অরুণিকা ।

অসংক্রামক প্রাচীন চর্মপীড়া ; ইহাতে ছোট ছোট পীড়কা  
বা উদ্বেদ বাহিব হয় । ইহাতে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন হয় ও তদ্বৎ  
বোণীর সাতিনয় সমৃদ্ধতা জন্মে কণ্ডুয়ন, কখন কখন \* বারে  
পিপীলিকা সঞ্চবণবৎ অনুভূত হয় ।

চিকিৎসা —ক্লোবোফর্ম অয়েন্টমেন্ট বা আইগোডোফর্ম  
অয়েন্টমেন্ট ( ১ ড্রামে ১ আউন্স ) ক্যাথেরাইডিস্ টিংচর  
আভ্যন্তরিক প্রয়োজ্য সল্ফর বাথ ৪০ ; ম্যালকেলাইন বাথ,  
কোনিয়ম ও ক্রিয়েজোট বাথ ৩৮ ঈথর জলে স্নান, বাষ্প  
স্নান । স্থানিক—ভিনিগার, লাইম ওয়াটার, কারাসিব সল্লিমেট  
লোশন, কার্বলিক এলিড্ লোশন, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ১১৬ ।  
লাইকর পটাশ ও হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ১১১ পটাশি সায়ো-  
নিডাই অয়েন্টমেন্ট ১২২, একোনিসিয়া অয়েন্টমেন্ট ১২৫ ; টাব  
অয়েন্টমেন্ট ৫৮ অজে ক্রিমি বা ও বায়ুল ক্রিয়া বিশৃঙ্খল থাকিলে  
তাহা বিদূরিত করিবে অজুয়েঃ সল্ফর সি ট্রিন্ অয়েন্টমেন্ট  
ডিল, এমোনি ক্লোবাইড্ লোশন  $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$  গ্রেণ মাত্রায় হাইড্রো-  
ক্লোরেট অব কোকেইনের হাইপোডমিক ইন্জেক্শন কণ্ডুয়ন  
ও বেদনার আশু প্রতিকারক । সার্কাসিক—অনুভেজক পথ্য, মূত্র  
বিবেচক, বদকাবক ঔষধ সিনকোনা ও বিফাই ১৮৫ এসি-

টেট্ অব্ পটাসিয়ম, আইয়োডাইড অব্ পটাশ ও সার্সা ; আর্সিনিক, ষ্ট্রিকনিয়া ; আইয়োডাইড্ অব্ আয়বণ ; কডলিভর অয়েল । অস্থিরতা নিবারণার্থ এক্‌ষ্ট্রাক্ট পপী বা টিংচর বেলেডোনা সেবা মর্ফিয়া ও এটপিয়াব অধস্তাচ গ্রাফেণ হাইড্রার্জ পাবক্লোরাইড্ অতি অল্প মাত্রায় ত্ই গ্রেণ মাসাবধি পর্য্যন্ত ব্যবহার কবিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়

### সোরাযেসিস্ বিচর্চিকা ।

ক্লেদায়ক ও দুর্দম্য চর্মপীড়া । ইহার উদ্ভেদ সশক্ক হয়, ইহা সংক্রামক নহে লালবর্ণ সশক্ক চক্র বা মণ্ডল, বিবিধ আকারে শবীবেব নানাস্থানে প্রকাশিত হয় সাধাবণতঃ জালু ও কুর্পর সন্ধিব নিকটবর্তী অংশে উদ্ভেদ বাহির হইতে দেখা যায় ক্রমঃ উহাদের আকৃতি ও সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সমস্ত দেহে বিস্তৃত হইয়া পড়ে উপদংশ বিযজাত উদ্ভেদের বর্ণ ভাস্কর্য দেখায়

চিকিৎসা ।—আর্সিনিক ; কডলিভর অয়েল, আইয়োডাইড্ অব্ পটাসিয়ম ; কুইনাইন ; আয়বণ অজুযেঃ পাইসিস লিকুইড উপদংশজনিত বোগে মার্কিউরিয়েল ভেপার বাথ ও মার্করী সেবনার্থ বিধান কর্তব্য । আইয়োডিন অয়েন্টমেন্ট ও লিনিমেন্ট স্থানিক প্রয়োজ্য ডানাভান্স সলিউশন সেবনে অনেক উপকার হয় আর্সিনিক সেবন সময়ে অল্প ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ ফেবি আর্সিনিয়াস ত্ই গ্রেণ বাটিকাকাবে । ক্রাইসোফানিক এসিড বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োজ্য, ইহা সেবনার্থ ত্ই গ্রেণ মাত্রায় বাটিকাকপে ব্যবহার্য টাব অয়েন্টমেন্ট,

লাইকব কার্বনিস ডিটার্জেন্ট অয়েন্টমেন্ট ৭ বম জলে স্নান, উক্ত জলে বাইকার্বনেট সোডা বা পটাশ মিশাইয়া দিলে বিশেষ উপকার হয় সিট্রিন অয়েন্টমেন্ট ডিল বিন্ আইয়োডাইড্ ও কবোসিব সল্লিমেটের যুগ্ম মলম ।

### পিটীবায়েসিস ।

চর্মের অসংক্রামক, প্রাচীন সশক প্রদাহ একতঃ সহ সামান্য আরওতা ও সাতিশয উদ্দীপনা থাকে সূক্ষ্ম ও শ্বেতবর্ণ শল অধিক পরিমাণে জন্মে দেহেব সকল অংশেই জন্মিতে পাবে, কিন্তু মস্তক ও অন্ত্রাণ কেশাবৃত স্থানেই সাধারণতঃ উৎপন্ন হয় অধিক পরিমাণে ও সতত খুস্কি বা উৎস্রক উঠিয়া যায়

চিকিৎসা ।—গ্লিসিরিন ও বোবাক্স বা সোহাগার উগ্র দ্রব বা কার্বলিক লোশন লাইকব প্লম্বাই সব এসিটেটস ও গ্লিসি-  
বিরের ধাবন সল্ফবস এসিড ও গ্লিসিবির । মধ্য মধ্য বিবে-  
চক ; বলকাবক তিও ফাণ্ট । অবসাদক ও সম্ভাব দ্রোত সমূহ,  
নাইট্রেট অব্ মার্কবী অয়েন্টমেন্ট এমোনিয়োটড্ মার্কবী  
অয়েন্টমেন্ট ; গ্লিসিবির আর্সিনিক ১৮৯, ১৯১ টিংচর অব্  
পাবক্লোরাইড অব্ আয়ব । হাইড্রার্জ পাবক্লোরাইড লোশন, ১ ০  
গ্রে° ও ১ অউন্স জল, তুলি দ্বারা লাইকব ইহঁর সঙ্গে ১ ০  
বা ২ গ্রেণ এমোন ক্লোরাইড মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে ।  
কার্বলিক সোপ ব্যবহার্য অয়েল ইউক্যালিপ্টাই বা ক্রিয়েজোট  
মলম আকারে প্রযুক্ত হয়



### ইকথাইয়েসিস—এককুষ্ঠ ।

অসংক্রামক সশল্ক চর্ম্মীড়া । ইহা আতি বিরল । দেহের এক বা অধিক স্থানে পুর, কঠিন ও শুষ্ক শল্ক উৎপন্ন হয়, ইহা-দেব বর্ণ মলিন ধূসর উত্তাপ, বেদনা বা কণ্ডুয়ন থাকে না সশল্ক উদ্ভেদ বশতঃ বোগীবে কদাচিৎ দেখায় ।

চিকিৎসা —ঈষৎক্ষণে হলে বা সফল হলে স্নান, বাষ্প স্নান স্নানের পর অলিভ অয়েল, কোকোনিট অয়েল, ল্যানোলিন, ইউক্যালিপ্টাই অয়েল পীড়িত অংশে লাগাইলে উপকার হয় স্ফালিসিলিক এসিড বা লাইকর পটাস জল সহ লাগাইলে চর্ম্মের কাঠি দূর হয় গ্লিসেরিন, ক্রিমেজোট লোশন, কার্বলিক এসিড অয়েল ও লোশন ইকথিয়াল, বিসবসিন শতকরা ১০ ভাগ ও ত্রাপথল ৫ ভাগ, তৈল বা মলম সহ স্থানিক প্রয়োজ্য আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম ১০ গ্রেণ, জলে দ্রব করত ১ আউন্স ল্যানোলিনের সঙ্গে মিশাইয়া স্থানিক ব্যবহার্য্য । সেবনার্থ—আর্সিনিক, ডনোভাস মলিউসন ; কডলিভর অয়েল ; কবোসিব সবলিমেট । লাইকর পটাস ও মার্সা প্যাবিণা আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম

### একনি—মুখদূষিকা ।

প্রাচীন গুটিক চর্ম্মবোগ ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোটক বাহির হয়, উচ্চাধেব মূল গাঢ় লালবর্ণ থাকে । যৌবনাবস্থায় হয়, ইহাকে বয়স ফোড়াও বলে ফেটক পাকিয়া ফাটিয়া যায়, তৎপবে ছোট ও শক্ত লালবর্ণ অর্কুদবৎ অবশিষ্ট থাকে এবং তাহা ক্রমশঃ

মিশাইয়া যায় কিন্তু প্রায়ই দাগ থাকে ইহাদেব উৎপত্তি স্থান চর্ম্মস্থ মিবেসম্ ফলিকল্‌স বা মেদ গ্রন্থি কপাল ও দুই কপোলদেশেই সাধারণতঃ জন্মে নাসিকাতেও হয়।

চিকিৎসা। ব্রোমাইড্ অব্ পটাশিয়ম্ আভ্যন্তরিক প্রয়োগে উপকার দর্শে ক্রিয়েজোট ৬৬, ৬৮ হাইড্রার্জ এমোনিয়টম ৬৫ সল্‌ফিউরিম্ আইয়োডিডম ৬৯, ৭০। ঈষ-দুষ্ণ জলে স্নান, করসিব সল্লিমেট ৪ গ্রো, অমণ্ড মিক্‌চর ৮ আউন্স, একত্রে লোশন অঙ্গুয়েঃ হাইড্রার্জ নাইট্রেটিম্ ডিল গ্লিসিবোল অব্ এলোজ, বোরাক্‌স্ ও গ্লিসিরিণ, মিল্ক অব্ রোজ, পটাশি সায়ানিডাই সেবনার্থ আর্দিনিক ১৮৯, ২৯১, পেপ্‌-সিন, কুইনাইন, বিবিধ আয়বণ; সল্‌ফর; সল্‌ফাইড্ অব্ ক্যাল-সিয়ম কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে মার্কিউরিয়েল বা স্‌ফালাইন বিবে-চক। সল্‌ফর ৩০ গ্রো, ক্যালেমিনা ৩০ গ্রো, কার্বলিক্ এসিড্ ১৫ ফোটা ও ক্যালোনিন ১ আউন্স একত্রে মিশাইয়া ব্রণোপবি মর্দিব্য।

## প্যারাসাইট—পরাজপুষ্টি।

### টিনিয়া টন্সিউরান্স—রিং ওয়ার্ম।

এক প্রকার প্রাচীন সংক্রামক চর্ম্ম পীড়া, ইহাতে কেশ বিবর্ণ ও পতনশীল হয়। ইহার উদ্ভেদ শব্দ ও পীড়িত অংশ গোলা-কার হয় সাধারণতঃ মস্তকে জন্মে ইহাতে একরূপ পরাজপুষ্টি জন্মে ও তাহা কেশমূলে অবস্থিতি করে।

### টিনিয়া ক্রেভোজা—ফেভস্ ।

অতি বিবল পীড়া সৃষ্টাবণতঃ মস্তকে উৎপন্ন হয় মধু-  
চক্রবৎ আকারে ইহাব উদ্ভেদ বাহির হয় । উহার মধ্যস্থলে প্রায়ই  
এক একটী কেশ থাকে উহাতে শুষ্ক ও গীতবর্ণ মামড়ী পড়ে ;  
ইহাতে সাতিশয় কণ্ডুয়ন জনে কেশ পতিত হয় দুর্গন্ধ বাহির  
হয় । ইহাও এককপ পরাঙ্গপুষ্টজ পীড়া ।

### টিনিয়া ডিক্যালভান্স ।

ইহাও এককপ পরাঙ্গপুষ্টজ পীড়া মস্তকাদি কেশাবৃত স্থানে  
জন্মে কেশ পতিত হইয়া গোল বা অণ্ডাকার টাক দৃষ্ট হয় তৎ-  
স্থান চিক্ণ দেখায় এইকপ গোল বা অণ্ডাকার টাক এক বা  
ততোধিক হইতে পারে

ইহাদেব চিকিৎসা টিনিয়া সাইকোসিসেব সমান ।

### টিনিয়া সাইকোসিস্ ।

হেয়াব ফিলিকলুস বা কেশগ্রন্থিতে প্রদাহ হইয়া সম্পূর্ণ, তীক্ষ্ণগ্র  
উদ্ভেদ বাহির হয় ডুমুরাকৃতি দেখায় দাড়িতেই সচবাচর এই  
রোগ জন্মে, তন্নির অন্ত্যান্ত কেশাবৃত স্থানেও হইতে পারে । ইহাও  
পরাঙ্গপুষ্টজ পীড়া

চিকিৎসা ।—সর্বদ পবিত্রত কবিবে মামড়ী উত্তোলন  
কবার জন্ত তৈল, মোমেব মলম ও পুলটীস কেশ উত্তোলন  
কবিবে সার্কাস্টিক স্বাভ্যাস্তি কবণার্থ কডলিভব অয়েল, বার্ক  
বা স্টীল সল্ফরস এসিড লোশন ; ক্রিয়েজোট ২৭, ৫৪ ; কার্ব-

লিক এসিড ও জল গ্লিসিৰীণ ও কার্বলিক এসিড ( ১ ভাগে ৮ ভাগ ) ; কবোসিব সল্লিমেট লোশন ১১৭ । অম্লয়েঃ হাইড্রার্জ এমোনিয়োট ও সল্ফর ৬৫ ; অয়েল ক্রিয়েজোট ও অম্লয়েঃ হাইড্রার্জ অক্সাইড রুব্রাই ৬৬ , ক্রিয়েজোট ও সল্ফর ৬৮ ; আইয়োডাইড অব্ সল্ফর ৬৯, ৭০ অম্লয়েঃ হাইড্রার্জ নাইট্রেটীস ৬১, ৬৭ বিং ওয়ার্মতে ষ্ট্রং এসিটিক এসিড ; লিনিমেন্ট অব্ টর্পেন্টাইন ও এসিটিক এসিড অম্লয়েঃ হাইড্রার্জ আইয়োডাইড রুব্রম ( মোমেব মলমেব সঙ্গে মিশ্রিত কবিয়া ) কবোসিব সল্লিমেট অয়েন্টমেন্ট ; আইয়োডিন ১০০ গ্রাঃ, অয়েল পিটোলিয়ম ১ আউন্স স্থানিক প্রযোজ্য । ক্রাইসোফানিক এসিড ১৫ ২০ গ্রেণ, মোমের মলম, লার্ভ বা ঘৃত ১ আউন্স, একত্র মলমাকার দ্রবস্থানে মর্দিতব্য বোবিক ও শালিমিলিক এসিড ঐরূপ ভাবে ব্যবহাবে উপকার দর্শে । থাইয়ল, ইকথিয়ল, টিংচব আইয়োডিন, বোরাক্স, গ্রাপথল, ওলিয়েট অব্ মার্কবী, অয়েল ইউবালিপটাই প্রভৃতি প্রয়োগেও উপকার দর্শে

### টিনিয়া ভার্সিকোলার ।

সাধারণতঃ বক্ষঃ বা উদরের সম্মুখ দিকে প্রকাশ পায় পীতাদ উদ্ভেদ, গমেব ভূসিব গ্রাম শল্ক দ্বারা আবৃত থাকে ইহাও এককপ পরাঙ্গপুষ্টজাত পীড়া

চিকিৎসা ।—সল্ফরস এসিড লোশন, গ্লিসিৰীণ অব্ কার্বলিক এসিড ; টর্পেন্টাইন লিনিমেন্ট, কবোসিব সল্লিমেট লোশন সেবনার্থ আর্সিনিক সদা সর্বদা পৰিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন-তাব প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । পিটিবায়েসিস্ দ্রষ্টব্য



## স্কেবিজ্—পাঁচড়া ।

কেশদায়ক সংক্রামক চর্ম পীড়া ইহাতে অত্যন্ত কণ্ডুয়ন হয় উত্তাপ দ্বারা উদ্দীপনা বর্ধিত হয় । প্রথমে ছোট ছোট ফুসুড়ি বাহিব হয়, তাহা কখন জলপূর্ণ ও কখন পুষ্পপূর্ণ দেখা যায় হস্তের অঙ্গুলিব ভিতর সাধারণতঃ হয় । জান্তব পরান্নপুষ্ট হইতে উৎপন্ন হয়

চিকিৎসা ১ ভাগ চূণ, ২ ভাগ গন্ধক ও ১০ ভাগ জল, যতক্ষণ একত্রে মিলিত না হয়, ততক্ষণ ফুটাইবে ; তৎপরে উপ-রিস্থ স্বচ্ছ জল ঢালিয়া লইবে স্নানের পব তুলি দ্বারা এই জল স্থানিক প্রয়োগ করিবে উষ্ণ জল ও সাবান দ্বারা ধোত করিবে । সল্ফর অয়েন্টমেন্ট, সল্ফর বাথ ; সল্ফর সোপ ষ্টোবাক্স ও অমণ্ড অয়েল একত্রে কার্বনিক এসিড অয়েল ( ১ ভাগ, ৮ ১৬ ভাগ তৈল ) ; সল্ফরস এসিড গ্যাস দ্বারা ফিউমিগেশন ; দ্রব গন্ধকে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া তাহা জ্বলাইলে উক্ত বাষ্প নির্গত হয় কার্বনেট অব্ পটাশ ও আউন্স, পবিস্রত জল ও আউন্স, সল্ফাইম্‌ড সল্ফর ও আউন্স, লার্ড ২৩ আউন্স একত্রে মলম ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করিয়া পবে উপর্যুক্ত মলম লাগাইবে আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম ১ ড্রাম, জল ৮ আউন্স একত্রে ধাবন প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা ভিজাইয়া নাহিলে উপকার দর্শে সেবনার্থ সল্ফর অন্ন মাত্রায় প্রযোজ্য

---

য়্যালোপেসিয়া—বল্ডনেস—দারুনক—টাক ।

কেশপতন স্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী হইতে পারে প্রথমতঃ মস্ত-

কের উপরের বা শব্দাদেশের ও মস্তকেব সম্মুখ দিকেব কেশ পাঁতলা হইতে থাকে তৎপরে টাক পুড়ে বলহানি বশতঃ কেশগ্রন্থি পীড়িত হয় পোষণ ক্রিয়াব সার্বাস্থিক দুর্বলতা বশতঃ কেশগ্রন্থি পীড়িত হয় কেশগ্রন্থি বিনষ্ট হইলে আবোগ্যেব সম্ভাবনা থাকে না। দৌর্ধলা, বক্ত্রাব, জ্বর, গণ্ডমালা ও উদংশ আদি কাবণে টাক পড়িলে কেশগ্রন্থি বিনষ্ট না হইয়া অকর্মণ্য হইয়া থাকে তৎক্ষণ বোগ আবোগ্য হইতে পারে

চিকিৎসা।—পুষ্টিকর খাদ্য, কুইনাইন ও টিন ১৭২, ১৭৩, ১৭৬ কডলিওব অয়েল ৪০১ লাইকব এমোনিয়া এসিটেটস; লাইকব এমোনিয়া ২৯, ব্যালসম পেক, ব্যালসম টলু ৬০ গ্লিসিবিং ২৯ নাইট্রিক এসিড, অয়েল ও'ব্রেনাই; অয়েল বোজমেবিনাই ২৯, ৬০ সল্ফিউরিস আইয়োডিডম অয়েন্টমেন্ট ৬৮ ক্যাঙ্কেবাইডিস ২৯, ৪২ ক্রিয়েজোট ও সল্ফর অয়েন্টমেন্ট, ডাইডি উটেড আইয়োডিন লিনিমেন্ট; টর্পেন্টাইন ও এসিটিক এসিড লিনিমেন্ট টিং জেবোবাণ্ডি ও গ্লিসিবিং বোবেসিস। অয়েল নটমেগ ও অলিভ অয়েল বিবিধ এন্টি-সেপ্টিক ঔষধ ব্যবহৃত হয় অধিক দিবস ধরিয়া লাইকব আর্গিনিকেলিস সেবনে হিতফল দর্শে। প্যাবাফিন অয়েলেন স্থানিক প্রয়োগ উপকারী মৃদু গ্যালভানিওম; ইলেক্ট্রোড এণ ব্যবহান স্নফলদায়ক মস্তক মৃণ্ডন মব্যো মদ্যো কবিলে উপকার হইতে পারে নাথিকেল তৈলেব সম্মে অয়েল বোজমেনি, ইউবালিপ-টাই, লাইকব এমোনিয়া ও টিং ক্যাঙ্কেবাইডিস

### ওয়ার্টস—কর্ণস্—আঁচিল ও জাম্‌ড়ো ।

চিকিৎসা ।—নাইট্রেট অব্‌ সিল্ভর, গ্লেসিয়েল এসিটিক এসিড ; এসিড সলিউশন অব্‌ নাইট্রেট অব্‌ মার্করৌ কাঁচি দ্বারা কর্তন কার্বলিক এসিড ; ক্রমিক এসিড, নাইট্রিক এসিড স্থালিসিলিক এসিড অর্দ্ধ হইতে ১ ড্রাম ও মোমের মলম ব লার্ভ ১ আউন্স ; লাইকব আর্গিনিকেলিস স্থানিক প্রয়োজ্য

### বর্ণস্ ও স্কল্‌ডস্—অগ্নি ও অত্যাধ জলদাহ ।

দক্ষ স্থানেব পবিত্র, বিধান বিধবৎ, রেণীর বয়স ও দৈহিকা-বস্থাব উপর বিপদাশঙ্ক্য তাবতম্য হইয়া থাকে

লক্ষণ —দেহেব মধ্যে এরূপ অভিঘাত বা শক্‌ লাগে যে, তাহাতে সাংঘাতিক মূর্ছ সমুপস্থিত হইতে পারে \*বীৰ ও শাখাদি শীতল ও পাণ্ডুবর্ণ কম্প, নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত অসম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়া ও অবসন্নতা অথবা প্রবল প্রতিক্রিয়া সহ জ্বর ও মস্তিষ্ক, ফুফুস্‌ বা অগ্নে বতাদিক্য উপস্থিত হয় অথবা সাতিশয় পুষাদি স্রাব ও ক্ষতাবোগ্য হইতে বিষ হওয়ায় বিনোপী জন ( হেক্টিক্‌ ফিবর ) সমুপস্থিত হয় ক্ষতাবোগ্যেব পর অঙ্গাদি সংকুচিত বা বিকৃত হইতে পাবে

চিকিৎসা —বেদনা নিবারণ ও প্রতিক্রিয়া আনয়নার্থ ওপিওম ও বেলেডোনা এবং ব্রাণ্ডি আদি উত্তেজক ব্যবস্থায় ক্লোবোফর্ম্‌ আত্মা কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ক্যাষ্টর অয়েলাদি বিবেচক আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদিতে রতাদিক্য ও প্রদাহ হইলে স্থালা-

ইন ঔষধ ২৮৩, ২৮৮, ২৮৯ ; ববফ ; এগানিয় ও বার্ক ১৮৩, ১৮৪ পোর্ট, ব্র'ণ্ডি, দুগ্ধ, ডিম, ম'ংসযুষ স্থানিক দগ্ধ স্থানে বায়ু প্রবেশ কবিত্তে না পারে, তজ্জন্তু সতর্ক হওয়া কর্তব্য অল্প পবিমিত স্থান দগ্ধ হইলে কয়েক ঘণ্টা তাহা শীতল জলে ডুবাইয়া রাখিতে কেহ কেহ বলেন বাইম লিনি-মেন্ট বা ক্যাব' অয়েল, ২৩৭ । মিউসিলেজ অব্ গম একে-সিয়া ; এসিটম বা ভিনিগাব ; স্যাল্কোহল্ ; অলিয়ম পোবম ( শূকরের চর্কিসহ ) ; আজেন্টাই নাইট্রাম্ ৫ ১৫ গ্রোণ, জল ১ আউন্স , কলোডিয়ন্, ক্রিয়েজোট ৫৪ ক্রিটা প্রিপেয়াবেটা ২৬৩ ; ষ্টার্চ , ময়দা বা চাউল চূর্ণ দগ্ধ স্থানে ছড়াইয়া দিবে , উহাব সহিত বোরিক এসিড মিলাইয়া দিবে স্লিমি বন, গাধাই কার্বনাস, ট্রিকল অক্সুয়ঃ সল্‌ফিউবিস, অয়েল টর্পেন্টাইন, সিরেট ক্যালেমিনা, অক্সাইড অব্ জিঙ্ক অয়েন্টমেন্ট বা চূর্ণ সল্‌ফেট অব্ জিঙ্ক লোশন ফোফা হইলে তাহ গালিয়া দিবে দ্রুত শুষ্ক হওয়াব কালে অল্প সঙ্কুচিত বা অল্প কোন অঙ্গের সহিত সংযুক্ত না হইতে পাবে, তদর্থ সতর্কতা প্রয়োজন মুছ কার্বলিক্ অয়েল, অথবা ক্যারন অয়েলের মধ্যে কয়েক ফোটা বিশুদ্ধ কার্বনিক এসিড মিলাইয়া দিবে বাইকার্বনেট অব্ সোড সলিউশন ষ্ট্রং লাগাইলে তৎনগাৎ বেদনা ও কোথা নিবাবিত হয় বেদনায় অল্প অল্প মাত্রায় কোকেইন লোশন লাগান যাইতে পাবে সেব'ার্থেও দেওয়া যায় আহত অংশ তুল্য দ্বারা আবৃত ও ব্যাণ্ডেজ বান্ধিয়া রাখা কর্তব্য



## ডিজিজেন্স্ অব্ উইমেন ।

জীবোগ

ভল্ভাল প্রৱাইটীস্—যোনি কণ্ডূয়ন ।

বাহু জীজননেঞ্জিমেব উদ্বীপনা ইহা আপনাপনি বা অন্তাণ্ড  
গীড়াব সঙ্গে উৎপন্ন হয় প্রোচ বয়সেও এই বোগ অসাধারণ  
নহে সময় সময় গৰ্ভাবস্থায় উপস্থিত হয়

লক্ষণ । কণ্ডূয়ন, বিন্‌বিন্, পিপীলিকাগতি বা জালা বোধ  
হয় উত্তাপ ও উত্তেজনা দ্বাবা উহা বৃদ্ধি পায়, চুলকাইতে  
চুলকাইতে চৰ্ম্মাদি হাজিৰ যায় ও মাগড়ী পড়ে ক্ষুধাভাব,  
বাত্ৰিতে অস্থিৰতা ও সার্বস্নানিক উগ্রতা আদি, যন্ত্ৰণা হেতু  
উপস্থিত হয়

চিকিৎসা ।—গৃহ বিবচক সল্‌ফেট্ অব্ সোডা ও  
সল্‌ফৰ, সল্‌ফৰ ও ম্যাগ্নিসিয়া ৩৫৪, সল্‌ফৰ ও ক্রিম অব্  
টাৰ্টাৰ ৩৫৫; ক্যালোমেলা ও বিয়াই ৩৪৩ পেপ্লিন্ ৪১৭;  
নাইট্ৰো মিউবিমেটিক এসিড্ ও তিত্ত ফাণ্ট পথ্যার্থ ছন্ধ,  
ভিথ, মাংস, অন্ন চা, কফি ও স্নাননিষিদ্ধ কুইনাইন  
ও বেলেডোনা বটিকাকাৰে, কবোসিব সল্‌নিমেট ও সার্মা  
৪০২, লাইকৰ আৰ্গিনিক ও আয়ৰণ ১৯১ স্থানিক—সব-  
এসিটেট্ অব্ লেড্, লোণন ৪২৬, সল্‌ফেট্ অব্ এটোপিয়া  
সলিউসন্ ১ ড্রাম্ ও এক পাইন্ট্ এল্ডৰ ফ্লাউয়াব ওয়াটাৰ;  
একোনাইট ও বেলেডোনা লিনিমেণ্ট সমভাগে লইয়া মৰ্দ্দন,  
এসিটেট্ অব্ লেড্ ও হাইড্ৰোসিয়ানিক্ এসিড্ ১১৬, মৰ্ফিয়া  
ও লাইকৰ পটাশ ১৫৫; বোৰাক্স ও মৰ্ফিয়া ১৫৮, অমণ্ড

অয়েল, লাইম্‌ লিনিমেন্ট ; গ্লিসিবিণ ৯১ ভাগ ও গোলাপ জল ৮ ভাগ ; কালোমেল অয়েন্টমেন্ট সর্বদা পরিষ্কার রাখিবে ।  
বেলেডোনা পেসাবি, অম্ল্যেঃ হাইড্রাজ্‌ নাইট্রেটস বোগের কারণ জানিতে পাবিলে তদনুসারে চিকিৎসা করিবে লাইট কার্বলিক অয়েল কোকেইন লোশন

### ভল্‌ভাইটস সিম্পল ও ফলিকিউলার ।

অপবিষ্কৃততা, অপ্রিয়িত পুরুষসঙ্গম, উপদংশ বিষ বা সন্নিহিত যন্ত্রের ( মলদ্বার ও জবাযু ) উদ্দীপনা বশতঃ এই প্রকার প্রদাহ উপস্থিত হয়

লক্ষণ —বেদনা ও স্পর্শসহ্য । ক্ষীততা, শ্লেষ্মাস্রাব, প্রস্রাব করিতে উষ্ণতা ও জ্বালা বোধ কষ্ট, কুচকী ও উরুতে কনুকের বেদনা বোধ হয় সার্বসঙ্গিক লক্ষণাদিও সমুপস্থিত থাকে

চিকিৎসা .—কুইনাইন, আয়বন, মদ্য, পুষ্টিকর খাদ্য, ক্ষত পটিতে থাকিলে নাইট্রিক বা হাইড্রোক্লোরিক এসিড স্থানিক, কষ্টিক লোশন, কার্বলিক অয়েল ফলিকিউলার প্রদাহে—মর্ফিয়া ও হাইড্রোসিয়ানিক এসিড লোশন ১৫৫, গ্লিসিবিণ ও লাইম ওয়াটার, আইয়োডাইড অব্‌ লেড ও বেলেডোনা অয়েন্টমেন্ট, একোনাইটিন অয়েন্টমেন্ট, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ও এট্রপিয়া অয়েন্টমেন্ট ১২৮ উষ্ণ জলে কটিমান, উষ্ণ জলে একট্রা পনী গুলিয়া দিবে পথ্য—অনুভেজক ও লঘুপাক । চা, কফি, মত্ত নিষিদ্ধ খাসিনিক ও বার্ক ১৬৮ ; এসিড নাইট্রিক ও ইন্ফিঃ ক্যালস্‌ ১৬৯ ; কুইনাইন্ ১৯৩ ; কেরোসিন সব-

লিমেট ও সার্জা ৩৯৮, ৬৩২ কডলিভর অয়েল, বায়ু পরি-  
বর্তন। গ'বম জলের ডুন্ ব' পীচকাবি পটান পাবমাদ্‌নাম  
বা কার্বলিক লোশন অথবা বোরাসিক লোশন

### ইন্ফ্যান্টাইল লিউকোরিয়া—শৈশব শ্বেতপ্রদর।

বালিকাদেব যোনিদ্বারস্থ শৈল্পিক গ্রন্থি হইতে এক প্রকার  
স্রাব হয়, তাহাকে শৈশব শ্বেতপ্রদর বলে সময় সময়  
যোনির মধ্য হইতে স্রাব নিঃসৃত হয় প্রস্রাব করিতে উষ্ণতা  
ও বেদনা বোধ সন্নিহিত শৈল্পিক বিলী হাজিয়া যাওয়ার  
জায় দেখায়। ইহা আপনাপনি সমুপস্থিত হইয়া থাকে  
সময় সময় কণ্ঠয়ন উপস্থিত হয় সার্বাঙ্গিক স্বাস্থ্য ভাল  
থাকে না।

চিকিৎসা।—সংকোচক ধাবন দ্বারা যোনিদ্বার সৰ্বদা  
পরিষ্কার করিবে। ফটকিরি মিশ্রিত ঈষদ্রব্য জলে কটমান  
বোবিক এসিড বা পাবমাদ্‌জানেট অব্ পটান লোশন দ্বারা  
ধোত কর্ণ হিতকর সেবনার্থও অল্প মাত্রায় বোবিক এসিড  
ব্যবহৃত হইতে পারে মধ্যো মধ্যো বিবেচক ও পরিবর্তক ঔষধ  
বেদনা থাকিলে পপীহেড ফোর্মেটেসন কুইনাইন ও ষ্টীল ১৭৬,  
কডলিভর অয়েল, সামুদ্রিক বায়ুসেবন সিবণ ফেবি আইয়োডাইড,  
ফস্ফেট অব্ আয়বণ বা লাইগ

### ইউরিথ্রাইটিস—মূত্রমার্গ প্রদাহ।

প্রমেহ ব্যতীত আপনাপনি উপস্থিত হইতে পারে

লক্ষণ ।—মূত্রমার্গে উষ্ণতা বোধ, প্রস্রাব কবিত্তে জালা, মপুষ শ্লেষ্মাক্ষরণ, মূত্রাশয়ের উদ্দীপনা মূত্রমার্গ স্ফীত ও আরক্ত

চিকিৎসা ।—উষ্ণ জলে কটিনান, উষ্ণ জল স্বেদ, বিশ্রাম, অনুভোজক খাদ্য, স্নিগ্ধ পানীয় ওপিয়াম ও বেলোডোনা ১০১ বেলোডোনা ও বিস্মথ নির্মিত পেসাবি প্রতি বাত্রে দিয়া বাথিবে ক্যালসম কোপেবা নাইট্রেট অব্ সিল্ভার লোশন স্ফাণ্ডাল উড্ অয়েল মিউসিলেজ সহ লিন-সিড টি অল্প মাত্রায় অর্থাৎ সিকি হইতে ১ মিনিম মাত্রায় টিং ক্যাস্‌হাবিস্ সেবন হিতকর

### ভ্যাজাইনাইটিস—যৌনভ্যন্তর প্রদাহ ।

৩৮ ও প্রাচীন ভেদে এই প্রদাহ দ্বিবিধ শৈল্পিক বিল্লী ব্যতীত অন্যান্য তত্ত্বও আক্রান্ত হইতে পারে আঘাত, অপরিষ্কৃততা ও এণ মস্তকেব দ্বারা চাপ লাগা আদি কাবণে তকণ প্রদাহ জন্মে

লক্ষণ ।—যোনিতে বেদনা ও উত্তাপ বোধ যোনি-দ্রাব কণ্ডুয়ন, মূত্রাশয়ের উদ্দীপনা প্রথমে শৈল্পিক বিল্লী শুষ্ক ও স্ফীত থাকে এবং শ্লেষ্মাশ্রাব কম হয় তৎপরে ঘন শ্লেষ্মা ও পুষ নিঃসৃত হয় ও বেদনা কম পড়ে পৃষ্ঠবেদনা, উরু ও নিতম্বে বেদনা ৭৮ দিবস পবে রোগ প্রাচীনা-কার ধাবণ কবে যদি শৈল্পিক বিল্লীর নিম্নস্থ বিধান আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে শীত জ্বর, শিরোবেদনা প্রভৃতি প্রকাশ পায় দব্দবে বেদনা ও পুষোৎপত্তি হয় প্রাচীন প্রদাহে



শ্বেতপ্রদরবৎ স্রাব নির্গত হয় ক্ষুধাভাব, কোষ্ঠবদ্ধ, অজীর্ণ ও উদবাগ্নান, মানসিক অবসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ বর্তমান থাকে। প্রাচীন প্রদাহকে ভ্যাজাইনাল ক্যাটারও বলে

চিকিৎসা।—গ্লিসিরিন অব্ ট্যানিন লাইম ওয়াটার ধাবনার্থ উষ্ণ জলে অধিকক্ষণস্থায়ী কটিনান; বোগ প্রবল হইলে উক্ত জলে একটী পপী ও কার্বনেট অব সোডা মিশ্রিত করিয়া দিবে অল্প পরিমাণে কবণার্থ ক্যাষ্টর অয়েল, ক্যালোমেলা ও জেলাপ, জেলাপ ও সোডা ৩৩৭ ঈষৎক্ষণ জলের পীচকারি, বেদনানিবারক ধৌত দ্বাবাও পীচকারী দিবে। অক্সাইড অব্ জিঙ্ক ও বেলেডোনা বা ওপিয়ম ও এসিটেট অব্ লেড নির্মিত পেসারি প্রযোজ্য লবু অন, মংশ, ছন্ধ, ডিম্ব ও স্নিগ্ধ পানীয় উত্তেজক দ্রব্যাদি নিষিদ্ধ পুয়োৎপত্তি হইলে ওপিয়ম ও হেনবেন; এমোনিয়া ও বার্ক ১৮৩, ১৮৪, স্পষ্টিকর খাদ্য উদবাগ্ন: প্রদেশে উষ্ণজল স্নেদ, মসিনাব পুলটীস দিবে। পারম্যাঙ্গানেট অব্ পটাশ, বোবিক এসিড বা কার্বলিক এসিড প্রভৃতি এন্টিসেপ্টীক ঔষধের মৃদু ধাবনের পীচকারি বা ডুশ; গরম জলের ডুশ ব্যবহাবে উপকার দর্শে

### ভ্যাজাইনাল ক্যাটার — যোনিসর্দি।

লক্ষণসমূহ শ্বেতপ্রদরবৎ স্রাব

চিকিৎসা।—বোগের কারণ নিরূপিত হইলে সর্বোত্তম তাহা বিদূরিত করিবে চিনারেল এসিডস ও বার্ক ১৬৯, ১৭০; কুইনাইন ১৯৩, পেপারিন ৪১৯, এবং মিশ্রিত শীতল জলে কটিনান, সংকোচক ঔষধ (২৪৪) দ্বারা যোনি মধ্যে পীচকারি

দিয়ে শীতল বা ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা প্রত্যাহ পীচকারি মলফেট অব্ জিক, ট্যানিন পেসবি কেস্টুব বেদন ঈকিঙ্ক তৎস্থানে বেলেডোনা প্লাষ্টর পুষ্টিকর খাদ্য, বলকবোধধ, বায়ু পবিত্রন। টিং ষ্টীল ও নক্স-ভমিকা, সিএপ ফেরি আইয়োডাইড ও কড-লিভর অয়েল, ফেরি ফস্ফ ও লাইম ফেবি এট্ এমোন সাই-টস. তিও ফাণ্ট সহযোগে ব্যবহার্য্য।

### প্রোলাপ্সস্ ভ্যাজাইনা এণ্ড ইউটেরিস—যোনিভ্রংশ বা জরায়ুভ্রংশ।

ইহা স্বতন্ত্র ভাবে বা জরায়ুভ্রংশের সঙ্গে মিলিতভাবে সমুপস্থিত হয় যদি যোনি পণালীর সমস্ত পরিধিবাণ্ড শৈল্পিক বিলী নির্গত হয়, তবে তাহা যোনিদ্বাবে একটী অর্ধদুবৎ দেখায় প্রদাহ ও হাজিয়া যাওয়া বর্তমান থাকে মূত্রাশয় উগ্র ও মূত্রকৃচ্ছ। আংশিক ভ্রংশ অর্থাৎ শৈল্পিক বিলীর কতক অংশ সাধারণতঃই বাহির হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—বহির্গত ভ্রংশ উত্তোলিত করিবে সংকোচক পেসারি ব্যবহার্য্য। কিছুদিন বোগীকে শয়ন কবাটয়া রাখিবে বিনা আয়াসে মল নির্গত হয়, একপ উপায়াবলম্বন করিবে। সার্বস্রিক স্বাস্থ্যের উৎকর্ষসাধন ও পৈশিক স্রষ্ট্রের বলবিধানকর ঔষধ প্রযোজ্য পুষ্টিকর খাদ্য, প্রত্যাহ লবণ মিশ্রিত শীতল জলে কটিমান কুইনাইন; ষ্টীল ও ষ্ট্র কনিয়া ১৭৩, ১৭৮ ফস্ফরিক এসিড ও নক্সভমিকা ৪২৯, ৪৩২ সংকোচক ধাবনের পীচকারি, ট্যানিন ও ক্যাটীকিউ নিম্মিত পেসানি।

ডিক্‌সন অব্ ওক বার্ক বা এলম লোশনের পীচবারি।  
মিসিরিণ অব্ বোবাক্য সহ্ এব্‌সক্‌ক্‌ট তুলা প্রবেশিত করাইয়া  
বাথিলে রক্তাধিক্য নিবাবিত হয়। বিবিধপ্রকার পেসারী  
প্রযোজ্য

### পেল্ভিক সেন্সুলাইটিস বা প্যারা- মিট্রাইটিস।

বন্তিগহ্বরস্থ অন্ত্রচ্ছদ-প্রদাহ; সাধাবতঃ প্রসবে কষ্ট ও  
গর্ভপ্রাবধাতঃ উপস্থিত হয় বাহ্যিক আঘাত, জরায়ুর পীড়া বা  
গণ্ডমালীয়া ধাতুপ্রকৃতিও এই পীড়ার কারণ

লক্ষণ।—অস্ত্রাত্মক সমুপস্থিত হয় এবং, মস্তকে  
বেদনা ও অস্থিরতা দি সার্বাস্থিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রবল  
দব্দবে ও কণ্‌কণে বেদনা উকব নীচে পর্য্যন্ত বাপী শ্বায়ু  
শূল অঙ্গাদিতে কণ্‌কণে বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ, কোতানি, বমন  
ও বিবমিষা বেদনাবিত ক্ষীততা উদরাধঃ প্রদেশে অনুভূত  
হয় পুয়োৎপত্তি হইলে লক্ষণাদি প্রবলতর হয় নীত ও তীব্র  
বেদনা

চিকিৎসা। বোগীকে স্থিরভাবে শয়ন করাইয়া রাখিবে  
অত্যন্ত কম্পসহ বোগ উপস্থিত হইলে উত্তেজক সেবন ও পদ-  
দ্বয়ে উত্তেজ পূর্ণ বোতল সংস্থাপন কর্তব্য। উদরাধঃ প্রদেশে  
জলোকা, মূত্র ব্যবচক, লিন্‌সীড বা ব্রান পুলটীস অল্প পবি  
ষ্কার করণার্থ জৈষজ্জ্য জন্মেব পীচকারি বা একমাত্রা শ্যালাইন্  
পেট্‌টিভ্ দেওয়া যাইতে পারে বীণ্ডিস সলিউশন, বোবিক  
এসিড বা কবো সব সল্লিমেট লোশন গাঁস জল সহ পীচকারি

ধা ডুশ পণী ফোমেন্টেসন ; বেলেডোনা ও কোনিগমেব পেসারি ,  
উপদংশ-বিষ শবীরে থাকিলে উক্ত পেসাবিতে রু অয়েন্টমেন্ট  
দিবে ওপিয়েট এনিমা, সফিয়ার অধস্তাচ প্রক্ষেপ উদরে  
অত্যন্ত বেদনা থাকিলে একষ্টাঃ বেলেডোনা ও পণীর প্রলেপ  
দিয়া, তত্পরি লিনসীড পুলটীস বা উষ্ণ জলের স্বেদ উষ্ণ  
জলে কটিমান, উষ্ণ জল দ্বারা যোনিতে পীচকাবি রোগীকে  
উত্তানভাবে শয়িত বাধিবে ছগ, মাংসযুষ, ডিম্ব, বিফ্টি প্রভৃতি  
পথ্যার্থ পাকায়ের উপর মষ্টার্ড প্লাষ্টর দিবে তরুণ অবস্থা  
অতীত হইলে আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম সেবনার্থ ও ব্লিষ্টাব  
দিতে কেহ কেহ বলেন উষ্ণজলে একখণ্ড স্পঞ্জিয়োপিলিন বা  
২৭ পুক বস্ত্রখণ্ড গরম জলে ভিজাইয়া ও তাহা নিঙড়াইয়া  
তত্পরি ২০ ৩০ ফোটা লডেনম ছড়াইয়া দিয়া তলপেটে সং-  
স্থাপন কবত ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে এতদ্বারা বেদনা ও  
প্রদাহ প্রশমিত হয় সেবনার্থ ওপিয়ম প্রয়োগ হিতকর  
প্রথমে একটু বেশী দিয়া পরে বেদনা উপশমিত না হওয়া  
পর্যন্ত অল্প মাত্রায় দিবে, ইহাব সঙ্গে মুনকাবব, চর্ম উষ্ণ ও  
শুক থাকিলে ব্যবহার্য লাইকব হাইড্রার্জ পারক্লোরাইড

### পেল্ভিক পেরিটোনাইটিস ।

জরায়ু ও তৎসম্বন্ধিত স্থানাচ্ছাদিত অঙ্গচ্ছদ-প্রদাহ জবা-  
যুর প্রদাহাদি কারণে ও প্রসবান্তে বা প্রমেহাদিব বিষহেতু এই  
শীড়া জন্মিতে পারে

লক্ষণ ।—শীত, পরে বেদনা উদরাধঃ প্রদেশে স্পর্শা-  
সহন ও বেদনা, ও তাহা চাপে বৃদ্ধি । চর্ম উষ্ণ, নাড়ী দ্রুত



ও মুখাকৃতি উৎকর্ষাজ্ঞাপক । পৃষ্ঠে ও কটিতে বেদনা ও তাহা উরদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় বমন, বিবমিষা, উদবাগান ও কোষ্ঠবদ্ধ পুয়োৎপত্তি হইতে পারে

চিকিৎসা ।—সম্পূর্ণ বিশ্রাম ; বেদনানিবারক মাত্রায় ওপিয়ম সেবন ; লিনসীড পুলটাস, ওপিয়ম ও বেলেডোনা পেসারী । বেচক ঔষধ এককালীন নিষিদ্ধ । যদি সঞ্চিত মল বৃহদন্ত্রেব অধোভাগে থাকে, তবে ঈষৎ অলিভ অয়েল ও আউন্স ও ক্যাপ্টর অয়েল ১ আউন্স একত্রে পীচকাবি দিবে মূত্রভাগে অত্যন্ত কষ্ট ও বেদনা অনুভূত হইলে ক্যাথিটার দ্বারা মূত্র নিঃসারিত করিবে পথ্যার্থ—ছন্ধ, মাংসযুষ, ডিম্ব, ববফ পুয়োৎপত্তি হইলে মদ্য দিবে বোগ পুনরায় না হয় ভজ্জন্তু আর্ন্তবস্ত্রাব বালে বোগীকে শয্যায় শয়ান করিয়া থাকিতে বলিবে । পুষ্টিকর পথ্য, কডলিভর অয়েল কুইনিন ও টিং ষ্টীল । পূর্ববর্ণিত পীড়া দ্রষ্টব্য । উপসর্গাদি সাধারণ নিয়মে চিকিৎসা কর্তব্য

### পোল্ভিক য়াব্‌সেস্ ।

উষ্ণ জলস্বেদ ; লিনসীড পুলটাস, উষ্ণ জলে কটিমান । ইহা প্রায় আপনাপনি বিদীর্ণ হইয়া থাকে, চর্ম্মের নিকট মুখ হইলে অঙ্গ করিবে সেবনার্থ এমোনিয়া ও বার্ক ১৮৩ ; কুইনাইন ও এসিড ১৯৩ ; কুইনিন ও ষ্টীল ; কডলিভর অয়েল মর্ফিয়ার অধস্তাচ ওক্লেপ পুষ্টিকর খাদ্য, পোর্ট, ক্লাবেট, ব্রাণ্ডি, ও মোডা ওয়াটার, ছন্ধ, মাংসযুষ ইত্যাদি ।

## স্যামিনোরিয়া—আর্তবাতাব ।

লক্ষণ ।—ইহা দ্বিবিধ ১ম প্রকারে আর্তব আবিত হইয়া জ্বায়ুর অভ্যন্তরে সঞ্চিত থাকে ; কোন প্রকার অবরোধ থাকা বশতঃ বাহির হইতে পারে না জরায়ুর মুখ বা যোনিপ্রণালীর অবরোধ দ্বারা ইহা সংঘটিত হয় রক্ত সঞ্চিত থাকায় তলপেটে অর্ধদবৎ ক্ষীণতা অনুভব হয় ইহাতে অল্প চিকিৎসার প্রয়োজন

২য় প্রকারে আদৌ আর্তবস্রাব হয় না । এই প্রকার পীড়াই সচরাচর জন্মে ঋতু প্রকাশ হওয়ার পূর্বে কিছুকাল নিয়মিতভাবে হইয়া পূর্বে অসময়ে বিলুপ্ত হয় মানসিক অভিযাত বশতঃ হঠাৎ ঋতু শোণিত ক্ষরণ অবরুদ্ধ হয় বিবিধ তরুণ পীড়া জন্মিলে এবং সর্দি ও আর্দ্রতা বশতঃ এই বোগ উৎপন্ন হইতে পারে শোণিতস্রাব প্রমথঃ কমিয়া অবশেষে একবারে বদ্ধ হয় সার্কারিক লক্ষণাদি বর্তমান থাকিতে পারে আকস্মিক অববোধেই ইহা সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় গর্ভাবস্থা বলিয়া এম না জন্মে, তৎপ্রতি সতর্ক হওয়া উচিত

চিকিৎসা ।—হঠাৎ ঋতু বিলোপে একোনাইট ব্যবহার্য্য এন্টিয়া বেসিমোজা সাধারণতঃ বিশেষ উপকারী নাই-ট্রুক এসিড ও ট্যানাক্সেসেবম ৩৭০, পটাসী টার্ট ও স্যাংলোজ ৩২৭ ; গ্যাংলোজ ৩৪৫, স্যাংলোজ ৩৪০, পডোফিলিন ও স্যাংলোজ আইওডাইড অব্ পটাসিয়াম ৫ গ্রেণ ও টিংচর আইওডিন ৫ মিনিম ৷ একোনাইটম ; এমোনি ক্লোরাইডম লাইকর এমোনিয়া ১ ড্রাম, দুগ্ধ ১ পাইন্ট যোনিধারাত্মক

পীচকাবি এপিয়ল এক এক মাত্রা দিনে ও রাতে ঋতু উপ-  
স্থিত হওয়াব সময়ে ৫৬ দিন ব্যবহার্য টিং কাঙ্খেবাইডিস  
১৯০, ৩৬৭, ফিরম রিউক্টম ২০৪, ২০৫, ২০৬; ফেবি এ্রোমাই-  
ডম; ফেবি আইয়োডিডম ১৮১, ১৯৯, ৩৮৮; গণ্ডমাণীয় ব্যক্তি-  
দের পক্ষে। মিঃ ফেবি কং ১৯০; ফেরি সম্ফাস ১৭৮, ফেবি  
এট এমোনি সাইটম ১৮৮, ৩৮৫; গোসেকম ২৮৬; আইয়োডো-  
ফর্ম, স্ত্রাবাইনা ৩৮৭, মব ৩৮৬; পটানী নাইট্রস, পটানী  
এ্রোমাইড ৪০৮ ফোলিয়ো বিগিনী স্তনোপবি স্থানিক বোজ-  
মেবি; রিউটা গ্রাভিয়োলেন্স ৩৮৬। সিকেলি কর্ণিউটম ৩৯০,  
৩৯১, ৩৯২ হিপ বাথ, স্তনে সিনাপিজম বোরাক্স ৩০২,  
ষ্ট্রীকনিয়া ১৬, ১৭, ১৭৩, ৩৮৮ সম্বল ১০ হইতে ২০ গ্রে°  
মাত্রায়, অয়েল অব্ টর্পেন্টাইন এনিমা ৮১, ৮৩ ইলেক  
ট্রিসিটি নাইট্রস ইথর ও স্পিরিট জুনিপার ৩৬৮ পারমাঙ্গা-  
নেট অব্ পটাশ ২ গ্রে° মাত্রায় বটিকাকাবে। পল্‌সেটিল ও  
কলোকাইডম সেবন করিলে আর্তব সমুপস্থিত হয় ইলেকট্রি-  
সিটিও ও যুক্ত হয়।

### ডিস্মিনোরিয়া—কঠরজঃ।

স্নায়ুশূলজ কঠরজঃ।—শারীরীয় ও ক্ষীণ শরীরবিশিষ্ট  
স্ত্রীলোকদিগেব যৌবনাবস্থায় কঠরজঃ সমুপস্থিত হয় কয়েক  
বৎসর বেদনাবিহীন ঋতু হওয়ার পর এই পীড়া জন্মিতে পারে।  
বিশেষতঃ যাহাদের গর্ভ না হইয়াছে, তাহাদের এই রোগ হয়।  
মৃদুক বেদনা, তলপেটে ও কোমবেব নীচে বেদনা। উন্নর  
উপরাংশেব অভ্যন্তর দিকে বেদনা বোধ নিম্নগমনশীল বেদনা

ও বস্তিদেশে ভারবোধ ঋতুস্রাব যথেষ্ট পরিমাণে হইলে যন্ত্র-  
ণার উপশম হয়। সাধারণতঃ ঋতু শোণিত অতি অল্প পরিমাণে  
নিঃসৃত হওয়ায় যন্ত্রণাদি বর্জিত হয় বেদনা একবার কমিয়া  
পুনরায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় শুষ্কবায়ু, উদরাগ্নান, কোষ্ঠবদ্ধ, ডিম্ব  
কোষে বেদনা আদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়

রক্তাধিক্যজ কষ্টরজঃ — ইহা অধিক বয়সে হয়  
ঋতু প্রকাশের ৪৫ দিন পূর্বে হইতে যন্ত্রণা আবন্ত হয় পৃষ্ঠ  
বেদনা, ক্রান্তিবোধ ও অস্থিরতা, বস্তিদেশে ভারবোধ, মূত্রা-  
শয়েব উদ্দীপনা, অর্শ, জ্বায়ুতে দব্দবে বেদনা ক্রমশঃ ঋতু  
প্রকাশ পায়, প্রথমে শোণিত ক্ষবঃ অতি অল্প পরিমাণে হইতে  
থাকে শোণিত স্রাব অধিক হইলে যাতনাব উপশম হয়  
অমা বক্ত বা বিল্লী নিঃসৃত হয় ডিম্বকোষ ও শুন বেদনা-  
ধিত থাকে

যান্ত্রিক কষ্টরজঃ — বাহ বা আভ্যন্তর অস্ ইউটিবা-  
ইতে অববোধ বশতঃ বা জ্বায়ুতে অর্কুদ, উহাব স্থানচ্যুতি  
প্রভৃতি কারণে এই পীড়া জন্মে ঋতু অল্প, স্রাব এক এক  
বার অধিক পরিমিত তৎসঙ্গ বেদনা থাকে পৃষ্ঠ বেদনা,  
মূত্রাশয়েব উদ্দীপন, ডিম্বকোষে বেদনা ও রক্তাধিক্য পরীক্ষা  
দ্বারা অস্ ইউটিবাই ছোট পোতার ঋতু শোণিত নিঃস্রব কালে  
উদারত আক্ষেপ উপস্থিত হয়

চিকিৎসা। এন্ট্রিয়া রেসিমোজাব টেংচর বিল্লী  
নিঃসৃত হইতে থাকিলে আর্গেনিক ব্যবহার্য মাগুশুলজ  
বোগে ক্রোটন ক্লোবা ব্যবহার্য বেদনা নিবারণার্থ উষ্ণ  
অলে কটমান, তৎপূর্ব অকুমাইড অব জিঙ্ক ও বেলেডোনা



পেসারি বেদনা নিবারণে জল ইঞ্জিয়ান হেম্প ও ইথর ৯৮ ;  
 মর্ফিয়াব অধজাচ প্রক্ষেপ ; ওপিয়ম ১৩৩, ১৪১ । একষ্ট্রা বেলে  
 ডোনা ও ডোভর্স পাউডর ১০১ ক্লোবোডাইন মধ্যবর্তী  
 কালে স্নায়বীয় বলকারক ঔষধ প্রযোজ্য ফস্ফরিক এসিড  
 ও বার্ক ; কুইনাইন ও গিনাবেণ এসিডস ১৯৩, হাইপোফস্ফা-  
 ইট অব মোডা ৪৩০, কডলিভ অয়েল । বাত রোগ থাকিলে  
 তদনুরূপ ঔষধ প্রয়োগ বিধায় কোষ্ঠবদ্ধে মুছ বিরেকক—  
 পিল্ নিয়াই কং, এফাবডেমিং সাইটেট অব ম্যাগ্নিশিয়া,  
 ক্যামেগাইল টি পথ্যায় ছুট, টি, কফি, মদ্য, মাংসযুষাদি  
 বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, জল অথবা ব্যায়াম পুরুষ সহবাস কয়েক  
 সপ্তাহ বন্ধ রাখা কর্তব্য ক্লোবেট অব পটাশ ও ডিঃ বার্ক

রক্তাধিক্যজ কষ্টবজ্জে লবু ও অন্ত্রভেজক খাদ্য, সামান্য  
 ব্যায়াম, বিশুদ্ধ বায়ুত প্রাণ আইয়োডাইড অব লোড ও বেলে-  
 ডোনা পেসাবি আইয়োডাইড অব পটাসিয়ম, কলচিকম,  
 কডলিভ অয়েল, উফজগে স্নান, মার্কিউবিয়েল ভেপার বাথ  
 কারণানুযায়ী চিকিৎসা করা কর্তব্য বেদনাকালেব চিকিৎসা  
 পূর্ববৎ । মধ্যবর্তীকালে পুর্নোন্নিখিত ঔষধ ব্যতীত বোমাইড  
 অব পটাসিয়ম, কবোসিব সল্লিমেট

অত্যন্ত যন্ত্রণা দায়ক বেদনায় এন্টিপাইবিন বা ফিনাসিটিন,  
 কফিন সাইটস সহ প্রযোজ্য । ১৫।২০ মিনিম লডেনম, মিউ-  
 সিলেজ সহ মলদ্বাবে পীচকানি জেলসিমিয়ম ৩—৫ মিনিম  
 মাত্রায় ও টিং পল্‌মেটিল ১২ মাত্রায় প্রযোজ্য

## মিনোরেজিয়া ও মিট্রোরেজিয়া ।

রক্তোদ্যম ও জ্বরবীর রক্তস্রাব

ইহাতে ঋতুকালে অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব হয় টুবর-কিউলোসিস, ব্রাইটাখা পীড়া, প্লীহা বোগ, অপরিমিত শুক্রদান, মাসিক ঋতু প্রকাশকালে উত্তেজনা, অপরিমিত সংসর্গ, ও ভিষকোষের প্রদাহ, জরায়ু তন্তুব শিথিলতা ও অর্কুদাদি এই পীড়ার কারণ

জ্বরাত ক্যান্সার, অর্কুদ ও পলীপস এণ্ডোমিট্রাইটিস, জ্বরাত গ্রীবার প্রাদাহিক পীড়া, ভিষকোষে রক্তোদ্যম আদি কারণে জ্বরাত হইতে রক্তস্রাব হয় গর্ভস্রাবের পূর্বেও শোণিত নিঃসৃত হইয়া থাকে

চিকিৎসা ।—রক্তোদ্যম সহ শিরোবেদনা থাকিলে একুটিয়া রেসিমোজা নবযুবতীদের পক্ষে ব্রোমাইড অব্ পটাশিয়াম বা সোডিয়াম বিশেষ উপযোগী ঋতু প্রকাশের এক সপ্তাহ পূর্বে হইতে সেবন আরম্ভ করতঃ রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার পরও দিন কয়েক ব্যবহার করিবে। যদি ২৩ সপ্তাহ অন্তর রক্তস্রাব হইতে থাকে, তাহা হইলে ১০ গ্রেণ মাত্রায় ব্রোমাইড অব্ পটাশিয়াম রোগাবোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত নিয়ত ব্যবহার করিবে শিঃপীড়া বিদ্যমানে ক্লোরাইড অব্ এমোনিয়াম অয়েল সিনেমেন উপযুক্ত মাত্রায় রক্তোদ্যমজনিত রক্তহীন ভায় ফস্ফেট অব্ লাইম ও আয়রন সংকোচক—গ্যালিক এসিড ও সিনেমেন একত্রে বা স্বতন্ত্র, ২১৮, ২২৩, ২২৭, ২৩৩, ৪৩১ এসিটেট অব্ লেড ২/৫, ২২৮ কেরোসিন সল্লিমেন্ট ৩৯৮ জার্গট অব্ রাই ৩/১২ এমোনিয়ো সলফেট অব্ আয়রন ;

পারক্লোরাইড অব্ আয়ড, ইনফিঃ ডিজিটেসিস অর্জ আউন্স  
মাত্রায় টর্পেন্টাইন ২১৭, লাবব ফেবি পাব নাইট্রেটস  
২১৯ ; ওপিয়ম, ইণ্ডিয়ান হৈম্প টিংচন ৫ ফোটা মাত্রায় দিন  
তিন বাব ভাইনম ইপিকাক, শ্রাবাইনা, অক্সাইড অব্  
সিল্ডর, আর্সিনিক । হামামেলিস বা হেজিদিন । স্থানিক—  
উদরাদঃ প্রদেশে ববফ, যোনিদ্রাবেব মধ্য ববফ, ট্যানিক এসিড্  
বা ম্যাটিকোব ধাবন দ্বাবা পীচকাবি, সংকোচক পেসাবি, অস্-  
ইউটিবাইয়েব মুখ স্পঞ্জ, যোনিদ্রাব তুল্য দ্বাবা অবরদ্ধ কবা,  
শীতল জলের পীচকাবা । অত্যন্ত অধিক বক্তব্যবে একট্রী আর্গট  
লিকুইডে উপকাব না হইলে উহাব সাব ১২ গ্রেণ অর্থাৎ  
আর্গটিনের হাইপোডর্মিক ইন্জেকশন এবষ্ট্রাঃ, হাইড্রাষ্টিস  
লিকুইঃ ৫—১৫ মিনিম্ মাত্রায় ।

### ইউটিরাইন ক্যাটার—লিউকোরিয়া ।

শ্বেত পদর

যোনিব ও জবায়ুবব শৈল্পিক ঝিলীতে সর্দি-প্রদাহ জন্মে  
ইহাতে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মাশ্রাব হয় বিবিধ কারণে উপ-  
স্থিত হয়

লক্ষণ ।—অগ্নাধিক জর, সার্বাস্থিক উদ্দীপনা, ক্ষুধাতাব ;  
তলপেটে, বাট, বিটপ ও উরাদেশে বেদনা, বস্তিতে উত্তাপ ও  
পূর্ণতাবোধ, সতত মূত্রত্যাগেচ্ছা গর্ভাশয় ও ডিম্বকোষ সবে-  
দন ষোণ প্রাচীন হইলে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মাশ্রাব হয়  
ঋতুক্রিয়া বেদনাসহ সম্পাদিত হয় পাব্যক ক্রিয়া বিশৃঙ্খলা,  
পৃষ্ঠবেদনা, শিবোবেদনা, গাত্র শুষ্কতা, ক্রমশঃ বলক্ষণ

ইনফ্লুয়েন্স ও এণ্ডোমিট্রাইটিস—জ্বৰাযু প্ৰদাহ । ৩৭১

চিকিৎসা — তৰণ বোগে • বিশ্রাম, শ্লিষ্ণপানীয়, লঘু  
পথ্য প্ৰায়ে কোষ্ঠ্য নিষ্কাৰ্থ কম্পাউণ্ড ড্ৰেজাণ্ড পাউডাৰ  
১ ড্ৰাম ও ৫ গ্ৰেণ ক্যানোমেল দিবে প্ৰাতে ও বাক্ৰিতে উষ্ণ  
জলে কটিনান (ৰক্তশ্ৰাব থাকিলে নিষিদ্ধ) উষ্ণ জলেব  
পীচকাৰী যোনিমধো মাৰ্কবী ও বেলেডোনাৰ পেমাৰি উদ  
ৰাধঃপ্ৰদেশে লিনসিড পুলটীস পুৰাতন বোগে গ্ৰিঃ আইয়ো-  
ডাইড অব্ মাৰ্কবী, বেড আইয়োডাইড অব্ মাৰ্কবী, ডনো-  
ভান্স সলিউশন; কবোৰিচ মল্লিমেট ৪০২ আইয়োডাইড  
অব্ পটাশিয়ম ৩৯৯, ৪০১ কডলিভ অমেল ৪১০ পেপ্-  
সিন্ ৪১৭, টিং ফেৰি পাবক্লোৰাইড ফক্ফেট অব্ জিঙ্ক ও  
অম্বৰণ ৪২৯ পুষ্টিকৰ ষ্ট্ৰ'চ, স্ট্ৰ'চ, ছক্ক, ডিষ্ট, মল্ল অৰ পৰি-  
মাণে বিশুদ্ধ বায়ুতে এমণ সল্ফেট অব্ বিবিবিয়া বলকৰ-  
ণাৰ্থ বায়ু পৰিবৰ্ত্তন ফেৰি ফক্ক ও ক্যাল্‌সি' ফক্ক ফেৰি  
এট্ এমোনি সাইট্ৰ'স, মিৰপ ফেৰি আইয়োডাইড ও টিং নব্বা বা  
লাইকব ষ্ট্ৰীক্‌নিয়া বিবিধ সংকোচক ও পচননিবাৰক ঔষধেব বা  
শুদ্ধ উষ্ণ জলেব পীচকাৰি বা ডুণ

ইনফ্লুয়েন্স অব্ দি ইউট্ৰি'স—মিট্ৰাইটিস ও

এণ্ডোমিট্ৰাইটিস্ — জ্বৰাযু প্ৰদাহ ।

যাহাদেব গৰ্ভ না হইয়াছে, তাহাদেব জ্বৰাযুৰ বিধানপ্ৰদাহ  
একটী বিবল গীডা জ্বৰাযুৰ মধ্যস্থানেব, গ্ৰীবাৰ বা সমস্ত  
যন্ত্ৰেব পৈশিক তন্ত্ৰ আক্ৰান্ত হয়

লক্ষণ । — তৰণ প্ৰদাহ হঠাৎ শীত হইয় আবদ্ধ হয়



কিছু সচরাচর ক্রমশঃ উপস্থিত হয় বস্তিগহ্বরের পূর্ণতা, ভাব ও উষ্ণতা বোধ হয় তলপেট, কুচকী ও মদাঙ্গারে বেদনা ও দব্দব করে মূত্রাশয়ের উদ্দীপনা, বমন, বিবমিয়া কোতানি সহ উদবাসয়। প্রথম দিনের পর জরায়ুতে তীব্র বেদনা জন্মে ও থাকিয়া থাকিয়া উঠাব প্রকোপ হয়। শ্লেগ্না বা সরক্ত স্রাব নির্গত হয়, উত্তানভাবে শয়ন করিলে যজ্ঞ-ণার উপশম হয় এক সপ্তাহের মধ্যে ৩৬° লক্ষণাদি তিবো-হিত হয় প্রায়ই সহজে আবোগ্য হয়, তবে কখন কখন পুয়োৎপত্তি হইয়া থাকে।

চিকিৎসা — তরুণাবস্থায় সম্পূর্ণ বিশ্রাম, লঘু পথা, স্নিগ্ধ পানীয়, উষ্ণ জলে স্নান, ওষিধ ও বেলেডোনা পেসাবি, ওপিয়েট এনিমা ও সপোজিটবী মৃদু করোসিব সল্লিমেট লোসন বা কডিউস সলিউশনের ডুশ বা পীচকারি স্নিগ্ধ জলের পীচকারি গ্লিসিবিণ ও একট্রাঃ বেলেডোনা তলপেটে লাগাইবে গগের ভূমীর বা মসিনার পুলটীস, উষ্ণ জলস্বেদ জ্বর থাকিলে তাহার চিকিৎসা সাধারণ উপায়ে করিবে রোগের তরুণাবস্থা উত্তীর্ণ হইলে আইয়োডাইড অব্‌ পটাশিয়ম ও ডিকক্সন অব্‌ বার্ক, কডলিন্ডর অয়েল, পুষ্টিকর খাদ্য, আইয়োডাইড অব্‌ গ্লেড ও কোনিয়ম পেসাবি। সার্জিক্যাল স্বাস্থ্য যাহাতে উন্নত হয়, তাহাব চেষ্টা করিবে করোসিব সল্লি-মেট ও বার্ক বা সার্জা ৩৯৮, ৪০২

অল্‌সারেমন অব্‌ দি সারভির্বা ইউটিরাই।

রক্তাদিক্য ও প্রদাহবশতঃ ক্ষত উৎপন্ন হইতে পারে। কখন

কখন হাজিরা যাওয়াব ছায়া বোধ হয়। উপদংশ বিষ বশতঃ ক্ষত জন্মিতে পারে।

লক্ষণ।—কটিদেশে ও নিতগে'বেদনা, ডিম্বকোষের উদ্দীপনা, শ্বেতপ্রদব, অপাক, উদরাগ্নান জরাযুর ক্রিয়া বিশৃঙ্খলা, সার্বাস্থিক স্বাস্থ্যহানি রক্তস্রাব, শিরোবেদনা, বক্তহীনতা, দৌর্বল্য দাঁড়াইলে বা সোজা হইয়া বসিলে সময় সময় বেদনান্বভূত হয়।

চিকিৎসা।—ম্যালগ ও জিক ইন্ডেক্সন ২৪৪, ২৪৫। সংকোচক ও অবসাদক পেসারি এসিড সলিউশন অব নাইট্রেট অব মার্কবী স্থানিক পুষ্টিকর পথ্য, ক্লাবেট, সেরি, স্যাম্পেন বা ত্রাণ্ডি ও জল পেপ্সিন, কুইনাইন, বিউবার্ব, নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও তিক্ত ফার্ট, স্যালিসিন আইয়োডাইড অব পটাসিয়ম ও আর্গিনিক, কডলিভর অয়েল। গ্লিসিরিন ৯০ ভাগ ও ইকুথিয়ল ১০ ভাগে একত্রে তুলা সহযোগে স্থানীক প্রয়োজ্য। আইয়োডিন ১ ভাগ ও কার্বলিক এসিড ৪ ভাগ একত্রে প্রয়ো-  
গার্থ ব্যবহৃত হয়

### ক্যান্সার অব্‌ দি ইউটিউটিস।

জরাযুর গ্রীবাতেই সচবাচর ভগ্নে ৪০ বৎসর বয়সের পর প্রায় এই বোগ জন্মে।

লক্ষণ।—হৃগম, গীতাত, মলিন জলবৎ স্রাব। আকস্মিক বক্তফবণ যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, প্রথম প্রথম রাত্রিতে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, অবশেষে নিয়তই বেদনা প্রবল থাকে বমন ও বিবসিধা, উদরাগ্নান অজ্ঞেব ক্রিয়া বিশৃঙ্খলা, অরুচি বেদনা-

স্থিত মানসিক অবসন্নতা ০ দিন দিন শরীর দুর্বল ও জীর্ণ শীর্ণ হইতে থাকে। মুখাকৃতি পীতভা ও উৎকণ্ঠাব্যঞ্জক বস্তু-গ্ৰহণে অসমর্থ অচলাভাওে বঁধ দেখা যায় ছই বৎসরের মধ্যে অবসন্নতা প্রাক্তিত হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়

চিকিৎসা। —পুষ্টিকর খাদ্য, ছন্ধ, মাংস, ডিম্ব, ঘৃত, মাংস প্রভৃতি। উদ্ভেজক পানীয়—এাণ্ডি, সেবি বলকাবক—এমোনিয়া ও বার্ক ১৮৩; ফস্ফেট অব্ আয়বন ও ফস্ফরিক এসিড ডিগ ১৮৭; কুইনাইন ও বেনেডোনা; কডলিভন অয়েল। পাকায় উগ্র থাকিলে পেপ্সিন ৪১৭; নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিক এসিড, এমোনি কার্ব ও হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ৪, স্প্রিঃ এমন স্যাবোমেটিক ১০। ক্রেবট তন্ পটাশ ড্রিঙ্ক ২৯৪। পক্ষ্ময়ে একষ্টাঃ বেনেডোনা প্রলেপ ক্যার্ব অয়েল, কনফেকমন্ অব্ সেনা, ক্যার্ব অয়েলের পীচকাবী বেদনা নিবাবণার্থ হেনবেন ও ক্যাম্ফব ১৪১, ক্যাম্ফব ও বেনেডোনা ৪২০; ওপিয়ম ও মর্ফিয়া পূর্ণ মাত্রায় মর্ফিয়ার অধম্বাচ প্রক্ষেপ ক্লোরোফর্ম ও ইণ্ডিয়ান হেম্প ৯৮ মূত্রাশয়ে উগ্রতাতে বেনেডোনা স্থানিক ব্যবহার্য বক্তল্যাব নিবাবণার্থ গ্যালিক এসিড, মিনা-বেন এসিড্‌স, গিনেমন, এসিটেট অব্ লেড, টর্পেন্টাইন গ্যালিক এসিড ও স্যাবোমেটিক সল্ফিউরিক এসিড ৪৩১ স্পেকুদাম ব্যবহার কবাব সুবিধ হইলে লিট ও টাষ্ট ও সিসিরিণ স্থানিক ব্যবহার্য। বিবিধ প্রকাব সংকোচক ঔষধের পীচকারি ছর্গন্ধ নিবাবণার্থ পাবমান্‌গানেট অব্ পটাশ ৩০ গ্রেণ, অল ১ পাইন্ট পীচকাবি দিবে। এতার্থে ক্রিয়েছোট, ক্রোবাইড অব্ জিঙ্ক, বা ক্লোরিনিক এসিড জলমিশ্রিত কবিয়া পীচকারিক্রমে প্রযোজ্য

বৌবিক লোশন রক্তস্রাব নিবারণার্থ হ্যাগামেলিস বা হেজিলিন,  
একষ্টাঃ আর্গট লিকু, বা হাইড্রাষ্টিস লিকু ব্যবহার্য্য

০

### ফাইব্রাইড টিউমার্স অব্ দি ইউট্রুস ।

জ্বাযু তন্তু অতি বর্ধিত হইয়া এই প্রকার অর্কুদ উৎপন্ন  
হয় এক ব বহু অর্কুদ জন্মিতে পাবে অর্কুদ কখন ছোট  
ও কখনও অত্যন্ত বড় হয়

লক্ষণ —ঋতু বিশৃঙ্খলা, বজোদিক্য, কণ্ঠকণ্ঠে, দব্দবে  
বেদনা, ভাববোধ উকতে খাল ধবে বা উহা অবশ বোধ  
হয় মুত্রত্যাগে কষ্ট, কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শ, স্তন বর্ধিত ও বেদনা-  
শ্রিত, রক্তস্রাব অর্কুদ ছোট থাকিলে লক্ষণাদি সুস্পষ্ট প্রকাশ  
পায় না তলপেটে হস্ত দ্বারা পরীক্ষা করিলে অর্কুদেব সত্তা  
অনুভূত হইতে পাবে

চিকিৎসা ।—ঔষধ সেবনে সচরাচর এই বোগ আবোগ্য  
হইতে দেখা যায় না ক্লোরাইড অব্ ক্যালসিয়ম, তৎসঙ্গে  
কোনিয়ম ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়ম যখন যেরূপ লক্ষণ  
উপস্থিত হয়, তখন তজ্জপ চিকিৎসা করিবে। অধিক রক্ত-  
স্রাব হইলে কবোসিব সল্ফিমেট, গ্যালিক এসিড, স্যাবোমটীক  
সল্ফিউরিক এসিড ও সিনেগন, অক্সাইড অব্ মিলভল ও  
ইণ্ডিয়ান হেম্প, আয়রন স্যালম, হ্যাগামেলিস, আর্গট বা আর্গ-  
টিন বেদনা—রক্তাধিক্য জনিত হইলে ব্রোমাইড অব্ পটা-  
সিয়ম ও টিংচর হায়সায়ামাস



## একিউট ওভেরাইটিস—ডিম্বকোষের

ওরুণ প্রদাহ ।

আঘাত, জ্বাযুর ওষ্ঠে দাঁহক ঔষধ প্রয়োগ, হঠাৎ ঋতু অধ-  
রূপ, প্রমেহাদি কারণে ডিম্বকোষের ওরুণ প্রদাহ উপস্থিত হয় ।  
দক্ষিণ অপেক্ষা বাম ডিম্বকোষ অধিক আক্রান্ত হয় উভয়  
দিকেব ডিম্বকোষ প্রদাহ এক সময়ে হইতে প্রায় দেখা যায় না।

লক্ষণ ।—বেদনা কখন অত্যন্ত তীব্র ও কখন প্রসব  
বেদনার স্থায় থাকিয়া থাকিয়া বাড়ে সতত অতীব কণ্-  
কণে বেদনা থাকে ও সময় সময় তীক্ষ্ণ ছুরিকা বেধবৎ বোধ  
হয় তলপেটে বেদনা কুচকী, উরুর অভ্যন্তর দিকেও  
বেদনা, যে দিকেব ডিম্বকোষ প্রদাহিত হইয়াছে, সেই দিকের  
উরুতে বেদনা করে । পেরিটোনিয়ম বা অঙ্গচ্ছদ আক্রান্ত হইতে  
পারে । মূত্রাশয় উগ্র, মূত্র স্বল্প ও লালবর্ণ এবং উহা ত্যাগ-  
কালে জ্বালাবোধ । কোতানি, কঠিন মল নিঃসরণ কালে  
চাপ পাওয়া প্রযুক্ত ডিম্বকোষে অত্যন্ত বেদনা শুন্যে জ্বর,  
নাড়ী দ্রুত, বিবমিষা, অস্থিরতা, আহারে অনিচ্ছা । পরীক্ষা  
দ্বারা ক্ষীত ও অত্যন্ত স্পর্শাতিশয়াবিশিষ্ট ডিম্বকোষ সহজে অনু-  
ভব করা যায় পূয়োৎপাত হইলে কম্প, নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ,  
জিহ্বা উজ্জ্বল লালবর্ণ, স্নাত্তিশয় যমল, বস্তিগহবরে ভাব ও  
দব্দব্ বেধ । সেন্টক অঙ্গচ্ছদের ভিতর ফাটলে অঙ্গচ্ছদ-  
প্রদাহ সমুপস্থিত হয় । সরলান্ন বা যোনিদ্বাব দিয়া পুথ বাহির  
হইলে শুভ ।

চিকিৎসা ।—সম্পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক । জলোকা, হট্-  
হিপ বাথ প্রভে ও সন্ধ্যার পর ২০।৩৫ মিনিট পর্যন্ত । জন্ম

পরে বেলেডোনা ও ওপিয়মের পেসাবি কন্ট্রোলকালে যদি মূর্ছা হয়, তাহা হইলে পোর্ট বা অল্প মাত্রায় ত্রাণ্ডি দিবে । পারদ ব্যবহার আবশ্যক বিবেচিত হইলে পেসাবির সঙ্গে দিবে । কিন্তু লাল নিঃসরণ না হয়, তজ্জন্ত সতর্ক থাকা কর্তব্য । সাধারণতঃ আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম ও ক্লোবট অব্ পটাশ একত্রে ব্যবহার বিশেষ উপকার হয় । উদবাহঃ প্রদেশে উষ্ণ জলস্বেদ, মসিনাব পুলটীস বা গমের ভূসিব পুলটীস । ইহাতে বেদনা নিবাসিত না হইলে একষ্ট্রাঃ ওপিয়ম ১ গ্রো মাত্রায় তিন চাবি ঘণ্টান্তর প্রয়োজ্য । গোয়েকম ও একোনাইট কোষ্ঠ-বদ্ধ থাকিলে বিবেচক একষ্ট্রাঃ বেলেডোনা ও গ্লিসিবিং

### ক্লিনিক ওভেরাইটীস—ডিম্বকোষের প্রাচীন প্রদাহ ।

যৌবনাবস্থায় ইহা একটি সাধারণ পীড়া । অতিশয় পুরুষ সংসর্গ, স্ফারপ্রয়োগাদি, বাত ও উপদংশীয় বিষ প্রভৃতি কারণে এই পীড়া উৎপন্ন হয় ।

লক্ষণ ।—ডিম্বকোষ ও নিত্য প্রদেশে নিয়ত অতীক্ষণ কণ্ঠে বেদনা । এক বা দুই দিকেব উক্ত উপবাংশে স্পন্দন সহজ স্নায় ও কষ্টরজঃ সংসর্গকালে বেদনা পাকায়ের উগ্রতা—বিবসিধা, অজ্ঞান, কোষ্ঠবদ্ধ ও উদবাগ্নান । গুল্মবায়ুর আবেশ মূত্রাশয়ের উগ্রতা । এক বা উভয় দিকের স্তনে বেদনা ও স্ফীতি বোধ । কামোন্মাদ বা অন্ত প্রকার উন্মাদ বোগ উপস্থিত হইতে পারে ।

চিকিৎসা ।—বিশুদ্ধ বায়ুসেবন, উষ্ণ জলে কটিনান, কোবোট অব্ পটাশ ২০ গ্রেণ মাত্রায় দিনে তিন বার; আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম ও ডিক্লো ফাণ্টে ব ৩৩৯ অত্যন্ত বেদনা থাকিলে উহার সঙ্গে টিংচার একোনাইট ৩—৫ মিনিম মাত্রায় সংযোগ করিবে কডলিভ অব্ অয়েল, পেপ্সিন, হাইড্রোক্লোরিক অব্ এমোনিয়া; এমোনিয়া ও বার্ক; কুইনাইন ও বেলেডোনা আইয়োডাইড অব্ লেড ও বেলেডোনা পেসাৰি কটিনানে বা তরিয়ে বেদনাব আতিশয়া থাকিলে বেলেডোনা প্লাষ্টিক ব্রোমাইড অব্ এমোনিয়া ৪২৭, ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়ম বা সোডিয়ম ৪২২ কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ক্যাস্থেবা সেবন বা ক্ষয়দুষ্ক জলের পীচকারী ব্রোমাইড ও আইয়োডাইডের সঙ্গে বেলেডোনা বা কোনিয়ম সংযোগ মহোপকারী হাইড্রাষ্টিস ও পল্‌সেটিল উপকারী উষ্ণ জলের ডুশ বা পিচকারি যোনিদ্বাবে দিবে

### ম্যামারী য়াব্‌সেস্—স্তন-ক্ষোণ্টিক ।

ভকণ্ডি প্রাচীন দ্বিবিধ । ক্ষোণ্টিক গ্রন্থি মধ্যে বা গ্রন্থি ও চর্ম্মা ভ্যন্তবে অথবা গ্রন্থি ও বক্ষঃপ্রাচীরেব মধ্যে জন্মিয়া থাকে

লক্ষণ ।—ভকণ্ডি ক্ষোণ্টিকে প্রদাহ বৃদ্ধিব সময় নীত বা বম্প, স্তন পূর্ণ, গভীর বা অধিক দুৰ্ব্ব্যাপী জালিযুক্ত বেদনা, দব্দব্ ও ভাববোধ প্রাচীন ক্ষোণ্টিকে আন্তে আন্তে পুষ্য গ্রন্থি গণ্ডমান বা মার্কাসিব স্বাস্থ্যেব অপকৃষ্টতা বশতঃ উৎপন্ন হয়, উহাতে প্রদাহেব লক্ষণ বর্তমান থাকে না স্তনের অগ্রভাগে কাঠিহ ও বেদনা বোধ হয় ।

চিকিৎসা ।—উষ্ণ জল স্বেদ, পুষ্টিম, বলকারক ও উত্তেজক ঔষধ প্রয়োজ্য । অর থাকিলে জরৈব চিকিৎসা করিবে টিংচর আইয়োডিন শুদ্ধ বা বেনেডোমার সঙ্গে স্থানিক । থাকিলে অঙ্গ কবিবে । পুষাদি নিঃসৃত হইলে রেজিন প্রাষ্টব দ্বারা ঝাঁপীং কবিবে । পুষ্টিকর পথ্য রোগেব প্রাবন্তে ব্রাই-ওনিয়া টিং বা একোনাইট টিং অল্প মাত্রায় সেবনার্থ বিধান কবিলে উপকার দর্শে । পুষ্য নিঃসরণেব পর এন্টিসেপ্টীক লোশন দ্বারা ধৌত ববত কার্বলিক অয়েলাদি প্রয়োজ্য

### ইনফ্ল্যামেশন অব্ নিপল—চুচুকাগ্র প্রদাহ ।

স্তন্যদান কালের প্রাবন্তে চুচুক প্রদাহ অতি সাধারণ । উহাতে অত্যন্ত বেদনা ও ক্ষত হয়, বা উহা ফাটিয়া বা হাজিয়া যায় । ইহাতে অত্যন্ত ক্লেশ হয়, তদ্ব্তে সার্বাদিক স্বাস্থ্যেব অপকৃষ্টতা জন্মিতে পাবে

চিকিৎসা ।—আর্নিকা সিবেট, ব্রাণ্ডি ও জল ধৌত-কপে, লাইম ওয়াটর, কালোডিয়ন । উষ্ণ জলস্বেদ, টিংচর আইয়োডিন, কষ্টিক লোশন, পুষ্টিম । তৎপরে ক্ষত হইলে লেড বা জিঙ্ক লোশন, গ্লিসিবিণ, অগু অয়েল, অক্সাইড অব্ জিঙ্ক, লিনিমেন্ট ক্যালসিন্, বোবাক্স ও গ্লিসিবিণ লোশন ১৫৮ ।

স্ফ মাসিটি জয়েন্টমেন্ট

### মেমাইটিস—স্তন প্রদাহ ।

স্তন প্রদাহ তরুণ ও প্রাচীন ভেদে দ্বিবিধ । শিশুকে স্তন্য পান করণ কালে উপস্থিত হয় । মর্দি, চুচুকক্ষত বসতঃ উদ্দীপনা,



বাহ্যিক আঘাত, অপুষ্টিকর খাদ্য, মার্কাসিক দৌর্জল্য, বা পাকশয়, অঙ্গ, যকৃৎ, জরায়ু, ডিম্ববোঁয় বা মূত্রগ্রন্থির উদ্দীপনার সহানুভূতি দ্বারা প্রোক্ত প্রদাহ জন্মিতে পারে

লক্ষণ ।—তরগাবস্থায়—অতিশয় বেদনা, ক্ষীণতা, কাঠিগ্রীত, অর ক্রম নাড়ী, ক্রোবৃত্ত জিহ্বা, প্রলাপ দুগ্ধস্রাব বন্ধ হইয়া যায় সাধাবণতঃ ইহাতে পুষ্টিপত্তি হয় ।

প্রাচীণাবস্থা তরগঃ অজ্ঞাতসাবে উপস্থিত হয় স্তন বিবৃদ্ধ ও শত্রু অনেক সময় পুষ্টি জন্মে তরগ প্রদাহাবস্থানে হইতে পারে গণ্ডমানা ধাতু ও কৃত্তিক জ্বীলোকদেব সম্ভান না জন্মিয়াও এই বোগ উপস্থিত হইতে পারে

চিকিৎসা ।—মুত্র বিবেচক, আইয়োডাইড অব্ পটাশিয়াম, একোলাইট, ওপিয়াম ফোমেটেসন, হেমলক পুচ টীস, লিনসিড পুচ টীস, ও একষ্ট্রাঃ বেলেডোনা । জলোকা দুগ্ধ পূর্ণ হইলে দুগ্ধ নিঃসারিত করিবে, শিশুকে উহা খাইতে দিবে না বলকাবক ঔষধ ও পুষ্টিকর পথ্য রোগের প্রাবল্যে টিংচর ব্রাইওনিয়া সিকি বা অর্ধ মিনিম মাত্রায় সেধনার্থ ২ ৩ বা ৪ ঘণ্টান্তর বিহিত হইলে প্রদাহ আশু প্রশমিত হয় বেদনা নিবারণার্থ লিনিমেন্ট বেলেডোনা মর্দন কর্তব্য । অথবা উহা জলের সঙ্গে মিশাইয়া লোশনাকারে ব্যবহৃত হয় । স্তন ঝুলিতে ও সঞ্চালিত হইতে না পার, তজ্জন্ত তুলার প্যাড দিয়া বাঁধে

পুরাতন বোগে এমোনিয়া ও বার্ক ১৮৩, ১৮৪ । কুইনাইন ও মিনাবেল এসিড্ ১৬৭, ১৯৩ কডলিভর অয়েল পুষ্টিকর পথ্য বেলেডোনা প্লাষ্টর দ্বারা ঝাপিৎ লিনিমেন্ট পটাশী আইয়োডাইড কম্‌সেপোনি । ওলিয়েট অব্ মার্কবী ।

## ম্যাচোডিনিয়া—স্তনের স্নায়ুশূল ।

স্তনের বিধানগত গীড়া ব্যতীত এক প্রকার ক্লেমাটায়ক বেদনা উপস্থিত হয় আক্রান্ত অংশ অস্বাভাবিক ক্ষীণ ও ঈষৎ উষ্ণ । কণ্ঠে বেদনা, ইহা অত্যন্ত তীব্র বা সময়ে সময়ে উপস্থিত হয় । এই বেদনা স্নায়ুশূলের মত । জরায়ু বা ডিম্বকোষের উদ্দীপনা বশতঃ জনো ঋতু কালে অনেক স্ত্রীলোকের স্তনের উদ্দীপনা থাকে । ক্ষুধাভাব, কোষ্ঠবদ্ধ, অস্থিরতা, উৎকর্ষ প্রভৃতি বর্তমান থাকিতে পারে ।

চিকিৎসা ।—কারণ জানিতে পাবিলে বিদূরিত করিবে । কুইনাইন ১৯৩, এমোনিয়া ও বার্ক ১৮৩, ১৮৪ একোনাইট, কুইনাইন ও বেলেডোনা, কডলিভর অয়েল, পোপুসিন কাষ্টর অয়েল বেলেডোনা লিনিমেন্ট ।

## গর্ভাবস্থার গীড়া সমূহ ।

## ইডিমা অব্ দি লেবিয়া ।

যখন চাপবশতঃ ক্ষীতি উৎপন্ন হয়, তখন যুদ্ধ বিবেচক—ব্যাণ্টর অয়েল, বিশ্রাম, ঈষৎ উষ্ণ দুগ্ধ ও জল দ্বারা তৎস্থান ধোত করিয়া ষ্টার্চ বা গয়দা ছড়াইয়া দিবে । অত্যন্ত অধিক ক্ষীতি থাকিলে স্নান স্নান চিবিয়া দিবে উক্ত স্থান প্রদাহিত হইলে পুলটীস, এসিটেট অব্ লেড লোশন, পপীহেড ফোমেন্টেশন ।

### ট্রিথিক—দন্তশূল ।

অথেনা অব্ ক্লোভ্‌গ, পিপাবমেন্ট ও সিনেংন, ম্যাগকোইল, ক্রিমোজোট ও পিয়ম, ফোমেন্টেসন সেবনার্থ টিংচর ভেলিবিয়ানা এমোনিয়োট ও বার্ক, কুইনাইন, একোনাইট, আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম পল্ড বয়াই কং

### ফ্রান্সিডেসন—লালাসাব ।

মুছ বিবেচক—৭৫৬ বিয়াই বং নাইট্রেট অব্ পটাশ ১০ গ্রেণ, জল ২ আউন্স, ৪ ঘণ্টাস্থব । গ্রীবার পশ্চাতে প্রত্যুগ্রতা-সাধন ক্যামোগাইল ফ্লাউয়ার বা স্পিয়ারমেন্ট ইনফিউজনের গার্গল, অথবা মিউসিডোজ একেসিয়া ৮ আউন্স, অয়েল টর্পেন্টাইন ২ আউন্স কবলার্থ প্রয়োজ্য

### নসিয়া এণ্ড ভগিটিং—বিবমিয়া ও বমন ।

মুছ বিবেচক, পাকায় প্রদেশে মর্টার্ড গার্টব ও টর্পেন্টাইন, বেলেডোনা অমেন্টমেন্ট সোডা এসিডেব সঙ্গে লডেনম । লডেনমে স্থাকড়া ভিটাইয়া পাকায় প্রদেশে সংস্থাপন । চার্কোম ও অচান্ন ক্ষানৌদধ ক্ষাবে উপকার না হইলে লেবুব বস প্রয়েণ্ড ইনফিঃ ক্যাম্পক ও সেন্ট ব' বিসমথ, বরফ, বরফ মিশ্রিত জল পেপিন, বনু পথ্য ডাইম ওয়াটার, সোডা-ওয়াটব, ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব এসিড হাইড্রোক্লোরিক ডিল ও ইনফিঃ জেলুমিয়ান কং বা ইনফিঃ ক্যাটিনা টিংচর ন্যা-ভমিকা ১—৩ মিনিম মাত্রায় হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ডিল, অগুজ্জেলোট

অব্‌ সিবিয়ম, কার্বলিক এসিড, ক্রিয়েজোট, কোকেইন, ব্রোমাইড  
অব্‌ পটাস, লাইকর ডাউনিকেলিস, ভাইনম ইন্ডিকা ক অন্ন  
মায়া প্রয়োজ্য

### পাইরোসিস্—মুখ দিয়া জল উঠা ।

পথ্য পবিবর্তন, পাকাশ্যোপরি ঈষৎ প্রত্যাগ্রাসাধন,  
ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব লাইম ওয়াটব, চব, লাইকব পটাস,  
চক মিকশের ও মিউসিলেজ, সোডা ওয়াটর সময়ে সময়ে  
বমন উপকারক কোষ্ঠ পবিবর্তনার্থ বিউবার্ক, ম্যাগ্নেসিয়া,  
একট্রাঃ কলসিহু কং বেদনা নিবাবন্থ স্পিবিট এমোনিয়া  
ম্যারোমেটিক, ওপিয়ম উদবে এনোডাইন বা ক্যান্‌ফর  
লিনিমেন্ট

### হিমাটিমিসিস্—রক্ত বমন ।

পাকাশ্যোপবি ব্লিষ্টাব, গ্যালিক এসিড ও ম্যারোমেটিক মল্-  
ফিউবিক এসিড ববফ, লেবুব বস গিল্লিব সববক্তের সহিত  
হেমামেলিস বা হেজিলিন

### কনষ্টিপেসন কোষ্ঠবদ্ধ

ম্যাগ্নেসিয়া ; বিউবার্ক ; ক্যান্‌ফর অয়েল, কম্পাউণ্ড একট্রাঃ অব্‌  
কলসিহু ঈষৎ ও বের পীচকাণী কোষ্ঠবদ্ধি বাথে একপ  
পথ্য দিবে একট্রাঃ ক্যান্‌ফরা লিকুহড



## ডায় রিন্সা—উদরাময় ।

উদরাময় সহসা বহু করা উচিত নহে। চক্ মিক্চর ও টিং কাইনো ও ক্যাটিবীউ; ডোভার্স পাউডর ও হাইড্রাজ্ কম জিটা ওপিয়ম ও দোড ক্যাষ্টর অয়েল ও লডেনম— যদি অল্প পরিমাণে বাব বার মল নিঃসৃত হয়। পথ্য লঘু ও পুষ্টিকারক হইবে টিং বটো, বাইকব হাইড্রাজ্ পারাক্লাবাইড

## জুডিস্ কামল ।

অল্প মাত্রায় ব্লুপিন দিয়া পরে মৃদু বিবেচক—কল্লাউ ও রিউবার্ব পাউডর, ক্যাষ্টর অয়েল বা সিড্ জ পাউডর দিবে।

## প্যালপিটেশন অব দি হার্ট—অংশুমান ।

স্পিরিট এমোনিয় ম্যাগনেটিক, ক্লোরিক ইথর, ক্যাম্ফর, ওপিয়ম, ভেলিবিয়ান, এনাকোটডা ১৩০, ১৩২, ১৩৫ ওপিয়ম বা বেলেডোনা প্লাষ্টর, অংশুপিও প্রদেশে রোগাবেশ তিবোহিত হইলে টিং-ষ্ট্রিন, টিং ভেলিবিয়ান সেবনার্থ ও পৃষ্ঠবংশে ক্যাম্ফর লিনিমেন্ট মর্দন লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য

## ফেণ্টিং—মূচ্ছা ।

রোগাবেশকালে স্পিনিট এমোনিয় বা রোকেটীক সেবন করা- হইবে রোগীকে উত্তানভাবে শয়ন করাইবে ও পাখার বাতাস দিবে মুখে ও বক্ষে শীতল অলশেচন। অচেতনতা শীঘ্র বিদূষিত না হইলে উষ্ণ অলপূর্ণ বোতল পদে ও কক্ষে ধরিবে

বোগাবেশ তিবোহিত হইলে কুইনাইন ও ইনফিঃ অবৈজ পীদ  
কোষ্ঠ পবিষ্কাব করাইবে

—

### ডিস্পিনিয়া—শ্বাসকৃচ্ছ

ভেলিবিয়ান, য়াবোমেটীক স্পিরিট অব্ এমোনিয়া, ইথব  
ইত্যাদি ২, ১৩০, ১৬২ বলকারক ও বিবেচক ঔষধ

—

### কফ্—কাসি ।

ইহা দ্বারা গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা থাকায় শীঘ্র আবোগ্যেব চেষ্টা  
করিবে বক্ষে প্রত্যাগ্রতাসাধক লিনিমেন্ট দিবে ভাইনম ইপি-  
ক্যাক, টিংচব ক্যাম্ফর কং, টিং হায়সায়ামাস ৩০৪, ৩১২, ৩১৮,  
৩৩২ । এমোনিয়া ও ক্যাম্ফব ১৫ ক্যাম্ফব ও মস্ক ১৪ । ক্যাম্ফর  
ও হায়সায়ামাস

—

### হিমপ্টিসিস—রক্তোৎকাস

প্রথমে কাবণ বিদূরিত করিবে এসিটেট অবু লেড ও  
ওপিয়ম, গ্যালিক এসিড ও য়াবোমেটীক সল্ফিউরিক এসিড,  
টিংচব অব্ ইণ্ডিয়ান হেম্প বক্ষে প্রত্যাগ্রতাসাধক মর্দন

—

### স্লিপ্লেস্‌নেস্—অনিদ্রা ।

শয়নকালে এক গ্লাস শীতল জলপান, উষ্ণ জলে পাদ-  
ধোত—কিন্তু গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা থাকিলে দিবে না যুদ্ধ বিরো-  
চক, নিদ্রাকারক ঔষধ—টিং হায়সায়ামাস, ওপিয়ম, ডোডার্স

পাউডার । চা ও কফি সেবন নিষিদ্ধ হাইড্রেট ক্রোমাল, ব্রো-  
মাইড অব্‌ পটাশিয়াম বা সোডিয়াম, সল্‌ফোনাল

---

### হেডাক—শিরঃপীড়া ।

ভেলিব্রিয়ান, স্পিরিট এমোনি ব্যাবোগেটীক সেবন ইডি-  
কোলন ও শীতল জল মস্তকে দিবে তীব্র ও কর্ণের পশ্চাতে  
লিষ্টার । বিরেচক গোলাপ জল, ভিনিগার ও জল অথবা  
লাইকর এমোনিয়া এসিটেটস লোশন ১১৯ । ক্লোরোফর্ম ও  
ওপিয়াম লিনিমেন্ট, ফোমেণ্টেশন । ব্রোমাইড অব্‌ সোডা বা  
পটাশ অথবা ফিনাসিটিন ও কফিইন একত্রে

---

### হেমরইড্‌স—অর্শ ।

মৃদু বিরেচক তৎপবে এনোডাইন এনিমা ; ঈষৎ উষ্ণ জলের  
পীচকাবি অগ্নুয়েঃ প্লাসাই, অগ্নুয়েঃ গল, ডিকক্সন অব্‌  
ওক বার্ক সল্‌ফর ও ডিম অব্‌ টাটার, ইলেক্‌চুয়াবি অব্‌  
সেনা ।

---

### প্রসবাত্তের পীড়া ।

টেটনস্‌ বা ধনুষ্ঠকার ও কন্‌ভল্‌সন্‌স বা বিকম্প—শায়ু-  
মণ্ডলে পীড়াতে বর্ণিত হইয়াছে

---

### য়োগালাক্‌টিয় — দুগ্‌দ্রাবাভাব ।

সুগ্‌দায়িনী জীলোকাদিগণ দুগ্‌দ্রাব' হ্রাস বা অভাব নিম্ন  
লিখিত কারণে সমুদ্ভূত হয়, যথা—সার্বাঙ্গিক দুর্বলতা, বহুদিন

স্থায়ী মানসিক উৎকর্ষা, দৌর্ভাগ্যাকবু গীড়া, সার্বক্ষিক রক্তাধিক্য, স্তন ও চুচুকের ব্যাধি, স্তন্যদানকালে আর্ন্তব প্রকাশ ইত্যাদি। রক্তাধিক্যজনিত হইলে বিরেচক—ক্যাপ্টব অয়েল। সূরা ও আসব নিষিদ্ধ। উত্তিজ্জ খাদ্য সহ মাংস দুগ্ধ ও সোডাওয়া-টব বক্তহীনতাজনিত হইলে মাংস, পোর্টার, দুগ্ধ, ডিম্ব; এমোনিয়া ও বার্ক, অসংকোচক ঔষধ, কডলিভর অয়েল এবং বৃক্ষের পত্র স্তনোপরি স্থানিক প্রয়োজ অথবা ঐ পত্রের কাথ দ্বারা স্তনে স্বেদ একোয়া এনিথী, অয়েল এনিথী, অয়েল ফেনিকিউলাই প্রভৃতি ব্যবহাবে সময় সময় উপকার হয়। কাল জিরা সেবনেও দুগ্ধস্রাব বর্দ্ধিত হয়

### গ্যালাক্টোরিয়া—দুগ্ধস্রাবাধিক্য।

স্তনে বেলেডোনা প্লাষ্টর দ্বারা চাপ দিবে বেলেডোনা, আইয়োডাইড অব পটাসিয়ম, কলচিকম ও ক্যাম্ফর

### গ্যাফ্টার পেন্স—হেতাল বেদনা।

প্রসবান্তে জ্বায়ুর সংকোচন বশতঃ একরূপ বেদনা হয় ইহাকে প্রসবান্তিক বেদনা কহে। প্রসবের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে এই বেদনা আরম্ভ হইয়া ৩০ ৪০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বা ততোধিক কাল থাকিতে পাবে এই সময় জরায়ু হইতে জমা রক্ত থণ্ড বাহিব হয়

চিকিৎসা। —ক্যাম্ফর ৬০ গ্রেণ, মিউসিলেজ একেসিয়া ৬ আউন্সেব সহিত মিশাইয়া ১ কাঁচা পরিমাণে ১১২ ঘণ্টান্তর বেদনা নিবারিত না হওয়া পর্য্যন্ত সেব্য হায়সায়ামাস ১০—



২০ মিনিম বা টিংচর ওপিয়ম ১৫—২০ মিনিম, স্লগন্ধি জলে  
মিশ্রিত করিয়া সেব্য, ৮৮ ওপিয়ম লিনিমেন্ট উদর ও স্তনো-  
পরি মর্দন। টিং আর্নিকা ১ ফোটা ও প্রিট ইথর কম্পাউণ্ড  
১০ ১৫ মিনিম মাড়ায় ২ ৩ বাব ২ ১ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে  
বিশেষ উপকার হয় ব্রোমাইড্‌সও স্লফদায়ক।

### মন্তব্য।

পিউয়ারপাবেল ফিবরের সঙ্গে প্রায়ই পেরিটোনাইটিস থাকে,  
অতএব পেরিটোনাইটিস ও টাইফয়েড ফিবরের স্থায় চিকিৎসা  
করিবে। অগ্নাশ্রী পীড়ার চিকিৎসা যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

## বিবিধ রোগাবলী।

### য়্যাবর্মন—গর্ভস্রাব।

উপদংশ, আণ্ডলানিক মুণ, জবাযু ও শ্লেষ্মিক বিল্লীর পুরাতন  
প্রদাহ বা অপববিধ পীড়িতাবস্থা, জবাযুর স্থানচ্যুতি বর্তমানে  
গর্ভস্রাব সম্ভব।

রোগী অস্থির, ক্লান্তি ও গর্ভকণ্ডিত অল্পভব করে, তৎসঙ্গে  
কটি ও পৃষ্ঠে বেদনা থাকে। এইরূপ বেদনা কতক সময়  
থাকিয়া, পরে প্রসব বেদনা ভাবস্ত হয় যোনি হইতে রক্তা ও  
রক্তস্রাব হয় বেদনা কটি ও তলপেটে ও তথা হইতে উন্নদেশ  
পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়। পাকাশয় উগ্র থাকায় বমন হইয়া যায়।

অবশেষে ভ্রূণ নির্গত হয় । অথবা বেদনাদি উপশান্ত হইয়া গর্ভ সঞ্চিত হয় ।

চিকিৎসা ।—গর্ভস্রাবের উপক্রমে তন্নিবারণার্থে ওপিয়ম আভ্যন্তরিক ও খেতসাব সহ মলদ্বারে পিচকারি ২৮, ১৩৩, ১৬৪ ; বা মর্ফিয়া আভ্যন্তরিক সিকেলি কর্ণিউটম ; খণ্ড খণ্ড ববফ গলাধঃকরণ ভ্রূণেব গীড়া বা অসম্পূর্ণাবস্থা বশতঃ গর্ভ স্রাবেব উপক্রম হইলে ওপিয়ম প্রয়োগ নিষিদ্ধ । অধিক বক্ত-স্রাব হইতে থাকিলে লাইকব আর্সিনিকেলিস ১০—২০ মিনিম মাত্রায় ১৫ ২০ মিনিট অন্তর সেবা ; স্যাবাইনা, প্লস্বাই এসিটাস ও ওপিয়ম ২২৫ গর্ভস্রাবেব প্রবণতা নিবারণার্থ উপদংশবিষ-দ্রুষ্ট রেপ্লির অল্প মাত্রায় গ্রে পুউডব বা লাইকব হাইড্রার্জ পারক্লোরাইড অথবা পটাশ আইয়োডিড সেবা পটাশ ক্লোরাইড উপকারী অভ্যন্ত গর্ভস্রাব—জরায়ুর শক্তিব দুর্বলতা বশত ; হইলে স্যাবাইনা ২—৪ ড্রাম, উষ্ণ জল ও আউল, ফাণ্ট প্রস্তুত করিয়া এক কাঁচা পবিমাণে দিনে দুইবার বা ভাইবব-নম বা হিং সেবা গর্ভস্রাবান্তে বক্তস্রাব হইলে অয়েল টর্পেন্টাইন এনিমা ৮৩ ; টিংচর অব্ ক্যানোবিস ইণ্ডিকা ৫ ফোটা মাত্রায় বা ভাইববনমেব ফ্লুঃ একট্রাঃ ১ ড্রাম অঃ ঘণ্টান্তর । জরায়ু উত্তমরূপে সঙ্কুচিত হইতে না পাবিলে তাহাতে শীতল জল বা ববফ চিত্রিত সীতল জলের পিচকারি হাইড্রাষ্টম ও উপকারী মেনরেজিয়া ও মিটোবেজিয়া দেখ

র্যাভসেস্—ভ্রূণশোথ—স্ফোটক ।

\* রীর তন্তু বা যন্ত্র মধ্যে পুয়োৎপত্তি হইয়া একটী কোষ

দ্বারা আবৃত থাকে। তখন ক্ষোটকে দ্রববেবে বেদনা, উক্ত স্থান উজ্জল চার্বণ, উষ্ণ ও ক্ষীণ তৎপবে পুষ জন্মে পুষ জন্মিলে বর্ণ ও বেদনারি প্রকৃতি পরিবর্তন হয়। প্রাচীন ক্ষোটক অধিক দিন স্থায়ী হয় ও শীঘ্র থাকে না।

চিকিৎসা।—বেডোনা সেবনে ও বাহ্যিক প্রয়োগে ক্ষোটকে পুয়োৎপত্তি রহিত ও প্রদাহ উপশমিত হইতে পাবে ওলিয়েট অব্ মার্করী এণ্ড মর্ফিয়া স্থানিক বৃহৎ ক্ষোটকে ফক্সেট অব্ লাইম সেবা ক্যাম্ফবেটেড এলকোহল স্থানিক। সলফাইড অব্ লাইম ১০ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহারে সত্তর পুয়োৎপত্তি হয়। এমোনি ক্লোরাইডম ( ১২০ গ্রেণ, জল ১ আং ) স্থানিক প্রয়োজ্য লিনসিড ও রেড পুলটীস পীতবর্ণ সাবান ও চিনি সমভাগে, জলোকা, জলপটী ইত্যাদি গণ্ডমালীব ক্ষোটকে আইয়োডিন কষ্টক পটাশ ও কুইক লাইম সমভাগে স্থানিক প্রয়োগ কবিনে অল্প কবিবাব আবশ্যকতা থাকে না কিন্তু এতৎ প্রয়োগে অতিশয় উদ্দীপনা হয় সেবনার্থ গণ্ডমালায় বর্ণিত ঔষধ বিধেয় পাকিলে কাটিয়া দিবে ও ক্ষতের ভিতর কার্বলিক ত্যেল, লিণ্ট বা অন্তবিধ এণ্টিসেপ্টীক ঔষধ প্রয়োগ কর্তব্য। পুষ নিঃসারিত করণার্থ পুণ্টীস প্রয়োগও হিতকর

### বেড্‌মোরি—শল্যাক্ত।

বিবিধ গুরুতর পীড়ায় রোগী নিয়ত শয়ন কবিয়া থাকে, তাক্তু নিতম্বদেশে চাপ পাওয়া বশতঃ ক্ষত হয় এই ক্ষত পচিতে পারে ও উহা হইতে দুর্গন্ধ প্রাব নিঃসৃত হয়

চিকিৎসা।—ব্যাল্‌সম বেভিগ্যানম ( ২ ড্রাম, চর্বি ১

আউন্স ) ; ক্যাম্ফর স্পিবিট দ্বারা ধৌত , কলোডিয়ন , ক্রিয়ে-  
জোট ৫৪ ; প্রথমে ট্যান্ড ( ২ ড্র'স, চর্কি ১ ত'ং ), অয়েল  
রিসিনী ২ ভাগ ও ব্যালসম পের ১ ভাগ একত্রে ; সিরেট  
ক্যালেমিনা, অক্সাইড অব্ জিঙ্ক অয়েন্টমেন্ট, রেজিন অয়েন্ট-  
মেন্ট সহ টর্পেন্টাইন, কার্বলিক এসিড অয়েল ও অয়েন্টমেন্ট  
ত্রাণ্ডি ও জল দ্বারা ধৌতকরণ, গ্লিসিরি ইউডিকোলন, বোবা-  
সিক অয়েন্টমেন্ট নিম্নে ক্ষত দেখ

### অলসার—ক্ষত রোগ ।

প্রদাহ থাকিলে তাহা সর্বোত্তম সাধাবণ উপায়ে নিবারণ  
করিবে । ক্ষতের কিনারা উচ্চ থাকিলে তাহাতে নাইট্রেট  
অব্ সিল্ভর বা সল্ফেট অব্ কপার লিনসিড ও ব্রেড পুলটীস ।  
নিম্নের পাতা ও ময়দার পুলটীস, এমপ্লাষ্ট্রম বেজিন, অক্সুয়েঃ  
বেজিন । নাইট্রেট অব্ সিল্ভর লোশন । বিশেষ বেদনাদি  
থাকিলে লেড ও ওপিয়ম লোশন ও অবসাদক মর্ষ ২৪০,  
২৪১, ২৬৬, ৪২৬ সংকোচক ধাবন, ২৩৬, ২৩৮, ২৪২, ২৪৩,  
২৪৫ সংকোচক ও উত্তেজক মলমাদি ৫৩, ৫৪, ৬৩,  
৬৪, ২৬১, ২৬৪ কার্বলিক এসিড ও গ্লিসিরি বা অলিভ  
অয়েল ( ১ ভাগ ৮ ১৬ ভাগ ) ক্ষতের অবস্থানুসারে প্রযোজ্য ।  
কার্বলিক এসিড দৌত ( ১ ভাগ, জল ১০ ১৬ ভাগ ) ; শীতল  
জলে তুলা বা লিট ভিজাইয়া দিবে সার্বাঙ্গিক স্নান যাহাতে  
ভাল হয়, শুষ্ক চেষ্টা বলা কর্তব্য এতদর্থ বডলিভর অয়েল,  
আইয়োড ইড অব্ আয়ব, আইয়োডাইড অব্ পটাশিয়ম ও  
গার্জা, অনন্তমূহ, মিন্‌কোন, কার্বনেট অব্ এমোনিয়া প্রভৃতি



বলকাবক ঔষধ সেবা ক্ষীত ধৌতকরণ জন্ত বোরিক এসিড, হাইড্রার্জ পারক্লোরাইড লোশন, কণ্ডিস সলিউশন প্রভৃতি ব্যবহার্য। প্যাপেইন প্রয়োগে ক্ষতের পুঁকু কিনাবা ক্ষয় পায়। উগ্র ক্ষতে কার্বলিক লোশনে উপকার না হইলে অল্প মাত্রায় কোকেইন লোশন প্রযোজ্য। শাটত ক্ষতে কার্বলিক লোশন, কবোসিব সলিউশন লোশন, পাবমাস্থানেট অব্ পটাশ লোশন স্থানিক ধৌতাকাবে ব্যবহার্য।

### অস্টিইটিস—অস্থি প্রদাহ।

অস্থিচ্ছদ-প্রদাহ যে যে কারণে উৎপন্ন হয়, ইহাও সেই সেই কারণে জানা অস্থিচ্ছদ-প্রদাহ অধিক দিন স্থায়ী হইলেও এই পীড়ার উৎপত্তি হয়।

লক্ষণ।—সাতিশয স্পর্শসহ্যতা, গভীর বেদনা, ব্যথিতে উদ্ভাব বৃদ্ধি। আক্রান্ত অস্থি বিবৃদ্ধ হয়।

চিকিৎসা।—জলৌকা, উষ্ণ জলস্বেদ, পুণ্ডীস ক্যালোমেল ও অহিফেন আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম, কডলিভর অয়েল, আইয়োডাইড অব্ আয়বণ পোবি অস্টিই-টিস দেখ

### পেরি অস্টিইটিস—অস্থিবেষ্ট প্রদাহ

আঘাত, উপদংশ বিষ, পারদাপব্যবহার আদি বাবণে অস্থিচ্ছদ প্রদাহ উপস্থিত হয়।

লক্ষণ।—বেদনা—সাধারণতঃ ব্যথিতে বাড়ে সন্নিহিত অস্থি আক্রান্ত হইলে বেদনা অতি তীব্র হয়। স্পর্শসহ্যতা, প্রদা-

হিত অংশে লসীকা স্রাব হেতু পুরু হয় ও গোলাকার ক্ষীততা  
জন্মে সার্বাস্থিক, অসুস্থতা অব, বাত্বিতে অস্থিৰতা, মানসিক  
অবসাদ। পুয়োৎপত্তি হইলে কম্প হয়।

চিকিৎসা।—বোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম কবাইবে বেড়াইতে  
দিবে না আক্রান্ত অংশ স্পিৰিট লোশন দ্বারা ভিঙাইয়া তত্পরি  
অয়েল সিল্ক বা কচি কলাপাতা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে। ক্যালো-  
মেল ও ওপিয়ম ৪১৪, কবোসিব সল্লিমেট ৩৯৮, ৪০২ বেড  
আইয়োডাইড অব্ মার্কবী আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম  
৩৯৯, ৪০১, ৪০৪। সিবপ অব্ আইয়োডাইড অব্ আয়বণ ও  
কডলিওর অয়েল গফিয়া, ইণ্ডিয়ান্ হেম্প স্থানিক—জলৌকা,  
উষ্ণ জলস্বেদ, পুটীস, আইয়োডিন লিনিমেন্ট, ব্লিষ্টার, বেলেডোনা  
ও মার্কবী লিনিমেন্ট সমভাগে অল্প চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে  
এন্টিসেপ্টিক প্রণালী অবলম্বন করা কর্তব্য

### কেরিজ—অস্থিক্ত।

অস্থিতে প্রদাহ হইয়া উহা কোমল এবং উহাতে ক্ষত ও পু্য  
উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ কশেককা, ক্ষুদ্রাস্থি, দীর্ঘস্থিৰ শাখা  
আক্রান্ত হয় গড়মালা, উপদংশ, পারদাপব বহাবও ইহার  
কারণ

লক্ষণ।—প্রথম প্রথম অস্পষ্ট থাকে। গভীর বেদনা,  
আক্রান্ত স্থানের আরক্ততা ও ক্ষীততা। পু্য নিঃসরণের পর  
মালী থাকিয়া যায় ও অস্থিতে ক্ষত হয় পু্যের সঙ্গে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র  
অস্থি-খণ্ড নির্গত হইয়া থাকে সার্বাস্থিক শাস্থ্য হানি

চিকিৎসা।—ফস্ফেট অব্ ক্যালসিয়াম সেবনে উপকার

দর্শে আইয়োডিন আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক, ২৬, ১৭৫ ওলিয়ম  
 গর্হি ৪, ১০, ১৯২ নাইটিক এসিড দ্রব (২ ড্রাম, জল ২০ আং),  
 ফসফিক এসিড ডিল দ্রব (১ ভাগে ৮ ভাগ জল) সেবনার্থ  
 পটাসিয়াই আইয়োডিডম ৩৯৯, ৪০১ আইয়োডাইড অব্  
 আয়ব ১৮১, ৪০৩ কডগিভর অয়েল প্রভৃতি কাঞ্চ দাক এসিড  
 ধাবন দ্বারা পীচকাবি কম্পাউণ্ড টিংচর অব্ বেনজাইন্ ক্ষত  
 মধ্যে প্রবিষ্ট করণ নালী থাকিলে অঙ্গ প্রয়োগে তাহা দ্বিখণ্ডিত  
 করত বিবিধ এন্টিসেপ্টিক লোশন দ্বারা দ্রব ও তৎপরে  
 এন্টিসেপ্টিক অয়েল দ্বারা ড্রেস্ করিবে

### কক্সিডিনিয়া—কোকিল চঞ্চুস্থির

#### স্নায়ুশূল

কোকিল চঞ্চুস্থিতে স্নায়ুশূল বেদনা জন্মে। পতন, আঘাত,  
 প্রসবাস্ত প্রভৃতি কাবণে জন্মে। অধিক ঘোটকারোহণ বশতঃও  
 এই পীড়া উপস্থিত হইতে পারে

লক্ষণ ।—বসিতে বা চৌকি হইতে উঠিবার সময় বেদনা,  
 প্রমৎ বা মেলত্যাগাদি সময়েও বেদনা হয় সংসর্গ ও আর্ন্তব  
 শ্রাব বশতঃ জীলোকদের এই বেদনা বর্জিত হইয়া থাকে। চাপে  
 বেদনা ও স্পর্শসহতা সময়ে সময়ে জ্বায়ু বা ডিম্বকোষের  
 পীড়ার সঙ্গে বর্তমান থাকে

চিকিৎসা ।—জ্বায়ুব পীড়া থাকিলে তদারোগ্য করণে  
 চেষ্টা করিবে। কুইনাইন, আয়ব, আর্সিনিক, জিঙ্ক, ব্রোমাইড  
 অব্ পটাসিয়ম, আইয়োডাইড অব্ পটাসিয়ম, বেলেডোনা,  
 হায়সামামাস, ক্লোরাল উষ্মজলে কটিমান, জলৌকা, বেলে-

ডোনা ও মার্কিউবিয়েল লিনিমেন্ট ১৫০০। বেলডোনা ও ক্লোবো-  
ফর্ম লিনিমেন্ট ১৫৩। মর্ফিয়াব অংস্টাচ প্রক্ষেপ। একষ্টাঃ  
বেলেডোনা  $\frac{1}{2}$  গ্রেণ, আইয়োডোফর্ম  $\frac{1}{2}$  গ্রেণ, একষ্টাঃ হায়সায়্যা  
মাই  $\frac{1}{2}$  গ্রেণ, অয়েল থিওব্রোমেটীস ২০ গ্রেণ এবজে ১ সপো-  
জিটবী মলদ্বারে দিবে

### টুথেক—দন্তশূল।

ইহা বিবিধ কারণে জন্মে। দন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত, দন্তমধ্যস্থ পদার্থে  
প্রদাহ, গর্তাবস্থা, পাবদ ব্যবহার, অজীর্ণ ও নিঃশ্রবের অপকর্ষতা,  
সর্দি, বাত, শায়শূল প্রভৃতি কাবণে দন্তশূল উপস্থিত হয়

চিকিৎসা ক্লোরাল ও ক্যাম্ফর সমভাগে মিশ্রিত  
কবতঃ ক্ষয়িত দন্তের গহ্বর মধ্যে স্থানিক প্রয়োজ্য। ২৩  
ফোটা ক্লোবোফর্ম তুলায় ভিজাইয়া দিলে বেদনা উপশমিত  
হয় ক্রোটন ক্লোরাল, জেলসিমিয়ম সেবনার্থ ব্যবহার্য। ক্ষয়িত  
দন্ত থাকি জন্ম হইলে দন্ত তুলিয়া ফেলিবে অথবা ক্রিয়োজোট,  
অয়েল ক্লোভস বা মেথপিপ প্রভৃতি তুলা সহ দন্ত গহ্বর মধ্যে  
স্থানিক দিবে। প্রদাহ থাকিলে বিরেচক। বাই কার্বনেট অব্  
সোডা ও উষ্ণ জল দ্বারা কুলি। টিং একোনাইট, ক্যাজিপুটী  
অয়েল, ক্লোবোফর্ম, ক্যাম্ফর ও তার্পিণ ১৩০, ট্যানিক এসিড  
ও ইথর, তুলায় ভিজাইয়া দন্তে দিবে হর্সারডিস, জিঞ্জর বা  
পাইরিগুম দন্তে চর্ষক কবিবে কার্বলিক এসিড, নাইট্রেট অব্  
সিল্ভার ইত্যাদিতেও উপকার হয় মেথন ও ক্যাম্ফর। কোকে-  
ইন ও ক্যাম্ফর বা কার্বলিক এসিড। এন্টিপাইবিগও স্থানিক  
প্রযুক্ত হইয়াছে



## হিক্‌—হিকা ।

ইহা একটা মুজ, আফেপিক ও ১ শব্দ শ্বাস । উহার অনতি-  
বিলম্বেই প্রশ্বাস হয় উদর বক্ষঃব্যবধায়ক পেশীর ( ডায়া-  
ফ্রাগ ) আকস্মিক, অনৈচ্ছিক ও সাময়িক আকুঞ্চন বশতঃ ও  
তৎসঙ্গে থাটস অর্থাৎ বায়ু নদীৰ মুখ অবরুদ্ধ হওয়ায় হিকা সমু-  
পস্থিত হয় অনেক সময় ইহা পোষণ পীড়ায় বিপদাশঙ্কা পরি-  
চায়ক অনেক সময় ১ বিপাক যন্ত্রেব উদ্দাপনা বা ওদাহ জন্তু,  
সময় সময় গুল্মবায়ুজ ও কখন কখন আপনাপনি উপস্থিত হয়  
শৈশব ও বৃদ্ধাবস্থায় অতি সাধাবৎ আফেপিক শ্বাস জন্তু হৃৎ-  
প্রদেশে বেদনা বোধ হয় হিকা দ্বাবা রেণী অত্যন্ত অব-  
সন্ন হইয়া পড়ে ইহার প্রকোপ থাকিয়া থাকিয়া হয় অর্থাৎ  
কিয়ৎকাল বিবাম থাকে, তৎপবে আবার হিকা সমুপস্থিত হয়

চিকিৎসা ।—কাবৎ জানিতে পারিলে তাহা নিবারণের  
চেষ্টা করিবে অল্পমুত ইকাতে কয়েক মিনিট শ্বাস বন্ধ করিয়া  
বাথিলে উপকাব হয় হাঁটীকারক ঔষধ নাকে দিবে এমো-  
নিয়া, মস্ক, পিপারমেন্ট তয়েল, ক্যান্‌ফর, ইথর, ক্লোরোফর্ম চিনি  
সহ । একোয়াইট, বেলেডোনা সেবা ক্লোরোফর্ম বা ইথর আঞ্জাণ ।  
ওপিয়ম, হেনবেন, হাইডোসিয়ানিক এসিড, বরফ, বরফ মিলিত  
জল । ব্লিষ্টার, মষ্টার্ড, টর্পেন্টাইন ষ্ট্রুপ, শুষ্ক কপিং, ওয়েট কম্প্রেস ।  
বেলেডোনা, একোয়াইট, ক্লোরোফর্ম বা ওপিয়ম টিনিমেন্ট, পৃষ্ঠ  
ও বক্ষঃস্থলের উভয় পার্শ্বে ( উদরবক্ষঃব্যবধায়ক পেশীর সমস্ত্র )  
মর্দিতব্য । অজীর্ণ জনিত রোগে—বমনকারক ও মুহুরেচক ও  
ক্যাষ্টর অয়েলের এনিমা এমোনিয়া, বাইকার্বনেট অব্‌ পটাশ  
ও পিপারমেন্ট ওয়াটর বিসমথ, ক্রিয়েজোট, ম্যাসাফেটিডা, মধবা,

মস্ক, ভেলিরিয়ানেট অব্ এমোনিয়া, ব্রোমাইড অব্ পটাশিয়ম, হাইড্রেট ক্লোরান, সহস্র ধাতা ধান শিশুদেব হইলে ডিল ওয়াটব, ১০—১৫ ফোটা ত্রাণ্ডি ও মিশ্রিত ওণ, ঈষদ্রব্য জল, দুগ্ধ ও চুণের জল খাণ্ড জব্য ও দুগ্ধ বিশুদ্ধ হওয়া কর্তব্য । মর্ফিয়া, কোকেইন সেবনে সময় সময় হিকা নিবাবিত হয় ফেলি-নস্ এণ্টাইকস্ প্রদেশে জায়ুব উপ চাপ প্রয়োগ ।

### ব্রজেস্ এণ্ড স্প্রেন্স—ঘৃষ্ট ও মচ্কান ।

ম্যালকোহল ১ ভাগ, জল ৮ ভাগ ; লাইকর এমোনিয়া এসিটেটস ও ম্যালকোহল ১১৯ আর্নিকা লোশন ১৪৯, ১৫৭ এমোনি ক্লোবাইডম ১১৮, ১২০ । গ্লিসিরিন, অয়েল ওবিগেনাই ও অলিত অয়েল, সোপ লিনিঃ, অয়েল টেবিবিহ্বিনী । জলপটী, লেড লোশন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ভিজাইয়া দেওয়া, ব্রাই-য়োনিয়া নাইগ্রা পুলটীস । ক্যাম্ফব লিনিমেন্ট ফোমেন্টেসন, ঈষদ্রব্য জলধারা বরফ ক্যাম্ফব ও ক্যাম্পিকম ; ওপিয়ম । লাইকর প্লাম্বাই সব এসিটেটস ও টিং ওপিয়ম লোশন স্থানিক প্রয়োজ্য শীতল লোশন অতৃপ্তিকর বোধ হইলে, উহা উষ্ণ করতঃ প্রয়োগ করিবে । আহত অংশকে সম্পূর্ণ স্থিতিবাবস্থায় রাখিবে । প্রয়োজনমত আহত অংশে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে । সোপ বা লেড পাস্টাব দ্বারা পীড়িত অংশ ট্রাণ্ডিং করিয়া দিবে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় একটা জয়েন্ট প্রবর্তন ভাবে মচ্কাইয়া গেলে পূর্কোণ্ড ট্রাণ্ডিং বিশেষ ফলোপদায়ক ।

## বিষাবলী ।

যে কোন দ্রব্য বক্তে আশোষিত হইয়া প্রাণ সংহার করিতে পারে, তাহাকে বিষ বলা যায় । বিষ সমূহ ক্রিয়ানুসারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । উগ্র, মাদক ও মাদকোগ্র ।

উগ্র বিষ ক্রিয়ার লক্ষণ ।—পাকশয় ও অস্ত্রে বেদনা, বমন ও ভেদ হয় । মল সহ রক্ত মিশ্রিত থাকে, নাড়ী শীর্ণ ও অনিয়মিত, চর্ম্ম নীতল হয় । মুখগহ্বর, গলাভ্যন্তর ও পাকশয়ে জ্বালাবোধ ও যেস্থানে বিষ সংস্পর্শিত হয়, তাহা দগ্ধ হইয়া যায় । হিমাঙ্গ, আক্ষেপাদি ও প্রবল প্রদাহ উপস্থিত হইয়া রোগী মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় । ওলাউঠা, প্রবল অতিসার, শূল বেদনা, পাকশয় ও অস্ত্র প্রদাহ ও ভূতি রোগের লক্ষণের সহিত উগ্র বিষ ক্রিয়ার লক্ষণের বিশেষ সাদৃশ্য আছে ।

মাদক বিষক্রিয়ার লক্ষণ ।—মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জাতে ক্রিয়া দর্শায় । শিরোবেদনা, তন্দ্রা, শিরোবুর্ণন, অচেতনতা, খেঁচুনী ও সময়ে সময়ে পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়, বমন ও ভেদ কদাচিৎ হয় । সংশ্রাস, অশ্রুস্রাব ও মূত্রাস্রুৎপত্তিজনিত বিকারের লক্ষণের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে ।

মাদকোগ্র বিষ ক্রিয়ার লক্ষণ ।—অত্যন্ত পিপাসা, গলায় ও পাকশয়ে বেদনা, ভেদ ও বমন, প্রণোপ, খেঁচুনী কখন কখন ধনুর্ভঙ্গার ও সংজ্ঞাহীনতা ইত্যাদি প্রকাশিত হয় ।

চিকিৎসা ।—চিকিৎসকের প্রথম কর্তব্য এই যে, পাকশয় হইতে ষ্টমাক পম্প বা বমনকারক ঔষধ দ্বারা বিষ উত্তোলিত



করিয়া ফেলা। মিনারেল এসিড আদি দাহক বিষ ভক্ষণের পর ষ্টমাক পম্প ব্যবহার সকল সময় নিবাপদ নহে, কারণ তাহাতে তত্ত্ব আদি ছিন্ন হইতে পারে, অতএব ঐরূপ ক্ষেত্রে ষ্টমাক পম্প ব্যবহার কবিবে না। কার্বলিক এসিড আদি দাহক বিষভক্ষিত হইলে খুব সাবধানে কোমল রবাবেব নল পাকায় প্রবিষ্ট করাইয়া বিষ উত্তোলিত করা যাইতে পারে। অজ্ঞানাবস্থাপন্ন রোগী দিগের ষ্টমাক পম্প সতর্কতা সহকাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।  
বমনকবণার্থ—সলফেট অব্ জিঙ্ক ২৭৭, মর্টার্ড ২৭৯, সলফেট অব্ কপার ২৭৮; ইপিক্যাকিউয়ানা ২৭৬; ২৮১ ইপিক্যাক ও এমোনিয়া ২৮০। লবণ যুক্ত উষ্ণ জল পান করিয়া ও গলায় অঞ্জুলি দিয়া বমনের সহায়তা করিবে। বিষ অজ্ঞাতান্তরে গেলে জল ও লবণেব পীচকারী, বার্লি ও সোপ ওয়াটব। ক্যাষ্টর অয়েল ও টর্পেন্টাইন বা ক্রোটন অয়েলের পীচকারী। চিকিৎসকের দ্বিতীয় কর্তব্য যে, প্রতিবিষ অর্থাৎ বিয়নাশক দ্রব্য সেবন করাইয়া ভক্ষিত বিষের ক্রিয়া শাস্তি করা। সকল প্রকার বিষের প্রতিবিষ স্বতন্ত্র। বিশুদ্ধ জাত্তব অঙ্গাব সেবনে মর্ফিয়া, ষ্ট্রীকনিয়া ও আর্সিনিকের বিয়ক্রিয়া উপহত হয় •  $\frac{1}{8}$  গ্রেন এপোমর্ফিন্ অধস্তাচ প্রক্ষেপ আকাবে ব্যবহৃত হইলে বমন হয়। ইহা অবসাদক

মিনারেল এসিডস—বা আকবিক অম্ল সমূহের বিধে — কার্বনেট অব্ সোডা, লাইম, পটাশ, ক্যালুমাইন্ড ম্যাগ্নিসিয়া বা কার্বনেট অব্ ম্যাগ্নিসিয়া, জল সহ, দুগ্ধ বা গিউসিলেজেব সঙ্গে সাবান ও জল, অলিভ অয়েল, মসিনার ফার্ট, মণ্ড, দুগ্ধ, যবোদক ইত্যাদি পাকায় বিদীর্ণ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা না থাকিলে দিবে।

তৎপরে পাকানয় প্রদাহ নবোৎপন্ন হ্রাস চিকিৎসা করিবে ।  
আহার্য্য অব্য মলদ্বারে গীচবাণি যোগে দেওয়া যায়

উদ্ভিভজ্ঞানের বিধে—বমনকারক ঔষধ ও ষ্টমাক পম্প  
ম্যাগ্নিসিয়া, সোডা ও চক্ ; শৈত্য পানীয় ও মিউসিলেজ সহ ক্ষাব  
—সোডা, পটাশ ও তাহাদেশ কার্বনেটস ।

ফস্ফরাস ।—ষ্টমাক পম্প । মিউসিলেজ ও ডিম্বের শ্বেতাংশ-  
যুক্ত পানীয় অধিব পবিমাণে পান করাইয়া বমন করাইবে ;  
পূর্ণ মাত্রায় ম্যাগ্নিসিয়া তৈল ব্যবহাব নিষিদ্ধ সলফেট  
অব্ কপার ঘন ঘন প্রযোজ্য ইহা বমনকারক ও প্রাতিবিষ ।  
বহু পুরাতন তর্পিণ তৈল বিরোধক, মিউসিলেজ ও ডিম্বের  
শ্বেতাংশ ।

আইয়োডিন ।—বমনকারক ঔষধ, ম্যানোকট, ষ্টার্চ,  
লাইম ওয়াটার, স্নিগ্ধ পানীয় ও অন্ন মণ্ড । যতক্ষণ আইয়োডাইড  
ষ্টার্চবৎ বমন না হয়, ততক্ষণ ষ্টার্চ সেব্য আবশ্যক হইলে খুব  
সাবধানে ষ্টমাক পম্প

এমোনিয়া, পটাশ, সোডা ও তাহাদেশ  
কার্বনেটস —ভিনিগার ও জল, বার্লি ওয়াটার ও লেবুর রস  
বিবিধ প্রকার তৈল (বাদাম ও জলপাই) পান করাইবে  
[ নাইট্রেট, সলফেট ও এসিড টার্টেট অব্ পটাশ—বমন  
করাইবে, স্নিগ্ধ পানীয় ।

ব্যারইটা ও তৎসল্ট ।—সলফেট অব্ সোডা বা  
ম্যাগ্নিসিয়া । বমনকারক ঔষধ ও ষ্টমাক পম্প ।

আর্সিনিক ।—ষ্টমাক পম্প, বমনকারক, মিউসিলেজ ও

ডিম্বেব শ্বেতাংশ মিশ্রিত পানীয় সেৱন দ্বাৰা বমন কৰাইবে ।  
 দুগ্ধ ও কাঁচা ডিম্ব, চুণেৰ জল, অলিভ অয়েল ও লাইম ওয়াটৰ ।  
 ক্যাপ্টেব অয়েল অধিক পৰিমাণে সেৱন কৰাইয়া অল্প পৰিমাণ  
 কৰিবে জাল্ফাৰ অক্সাইড, ক্যালসাইড ম্যাগ্‌নেসিয়া, হাইড্ৰেটেড  
 অক্সাইড অব্‌ আয়ৰ, লাইকৰ ফেবি ডায়াবাইজড উত্তেজক,  
 ওপিয়ম, কোনিয়ম, হেনবেন ত্ৰাণ্ডি আদি উত্তেজক সেৱন বা  
 মলদ্বাৰে পীচকাৰী

করোসিব সলিমেট ।—বমন উত্তেজিত কৰিবে অথবা  
 সাবধানে ষ্টমাক পম্প ব্যৱহাৰ কৰিবে ম্যাগ্‌নেসিয়াম ও পুটেন—  
 ডিম্বেব শ্বেতাংশ, ময়দা, দুগ্ধ ও জল, মিক্সপানীয়, বৰফ । অয়েল  
 সেৱন ও গৰ্মিন হাইপোডাৰ্মিক । ম্যাগ্‌নেসিয়াম ও মব্‌ গাৰ্গল, ট্যানিন,  
 বোৰাক্স ও ক্লোৰিনিটেড সোডা গাৰ্গল ওপিয়েটস, ক্লোৰেট  
 অব্‌ পটাশ, আইয়োডাইড অব্‌ পটাশিয়াম

ক্যান্‌থৰাইডিস । ষ্টমাক পম্প, বমনকাৰক, মিউসি-  
 লেজযুক্ত পানীয়, অয়েল, চক অল্প মাত্ৰায় অহিফেন সেৱন বা  
 গৰ্মিন সপোজিটৰী

সল্‌ফেট অব্‌ লেড ।—সল্‌ফেট অব্‌ জিঙ্ক বমনকাৰক, সল্‌ফেট  
 অব্‌ সোডা বা ম্যাগ্‌নেসিয়া বা ডাইলিউট এমিড সল্‌ফিউৰিক ।  
 দুগ্ধ, অথবা দুগ্ধ ও কাঁচা ডিম্ব বমনকাৰক ঔষধ ও ষ্টমাক পম্প  
 ক্লোৰিন অয়েল

সল্‌ফেট অব্‌ কপাৰ ও কপাৰ সল্‌ফেট ।—উষজল  
 পান দ্বাৰা বমন উত্তেজিত কৰিবে ডিম্বেব শ্বেতাংশ, দুগ্ধ, মিউ-  
 সিলেজযুক্ত পানীয় ষ্টমাক পম্প—বমন না হইলে । ময়দা ও জল  
 ৩৭সহ ডিম্বেব শ্বেতাংশ । ওপিয়ম



টার্টারেটেড অব্ এণ্টিমনি — দুগ্ধ ও জল পান দ্বারা  
বমন উত্তেজিত করিবে ডিমের শ্বেতাংশ, টি, ডিককুমেন অব্  
ওক বার্ক, গাটিক এসিড বা ট্যানিক এসিড, টিংচর অব্ পপাস,  
টিংচর সিনকোনা ও চিনকোনা চূর্ণ এণ্ডি সহ অল্প মায়ায় ডিজি-  
টেলিস ও ঈকনিন মগধাবে পীচকানো বা অধঃপাত প্রক্ষেপ

ক্লোরাইড অব্ এণ্টিমনি । — দুগ্ধমহ মাগ্নিসিয়া,  
টি ডিককুমেন অব্ ওক বার্ক, গাটিক এসিড

সলফেট অব্ জিঙ্ক । — দুগ্ধ ও ডিমের শ্বেতাংশযুক্ত  
পানীয় দ্বারা বমন উত্তেজিত করিবে কার্বনেট অব্ পটাশ বা  
সোডা, ডিককুমেন অব্ ওক বার্ক, ট্যানিক এসিড

ক্লোরাইড অব্ জিঙ্ক । — বমনকারক ঔষধ, মাগ্নিসিয়াম  
জিঙ্ক বা ডিমের শ্বেতাংশযুক্ত পানীয় ট্যানিনযুক্ত ঔষধ

কলটিকম । — ঈমাক পম্প, বমনকারক, মিউসিগেল,  
ট্যানিন, বিরেচক আবশ্যক হইলে উত্তেজক ।

নাইটেট অব্ সিলভর । — গরু, বমন না হইতে থাকিলে  
বমনকারক ঔষধ । ডিমের শ্বেতাংশ, মগধা

বিসমথ । — স্নিগ্ধ পানীয় দিবে ও বমন করাইবে ।

সলফেট অব্ আয়রন । — মাগ্নিসিয়া, স্নিগ্ধ পানীয়

কার্বলিক এসিড । — সাবধানে ঈমাক পম্প দ্বারা বিশুদ্ধ  
গ্লিসিবিণ বা এপ্‌সম স্টের এর সহযোগে পাকায় ঘূহী  
ফেলিবে ডিমের শ্বেতাংশ, মিউসিগেলযুক্ত পানীয় উত্তেজক,  
কাউন্টন ইবিটেসন

ওপিয়াম । — ঈমাক পম্প, সলফেট অব্ জিঙ্ক ২৭৭ ;

মলটেট অব্ কপার ২৭৮ ; মর্টার্ড ২৭৯ । মলদ্বার মধোও বমন কারক ঔষধ প্রযুক্ত হইতে পারে । নিজা ঘাইতে দিবে না ও বোগীর বক্ষে ও মস্তকে শীতল জলসেচন করিবে । পৃষ্ঠবংশে ইলেকট্রিসিটি । চা, কফি, সুবা প্রভৃতি উত্তেজক । ২০ - ৩০ মিনিম মাত্রায় টিং বেভেডোনা প্রতি বন্টায় দিবে সবম জলেব সাস্থ এবণ মিশ্রিত করতঃ পান করাইলে বমন হইতে পারে পাবমাস্থানেট অব্ পটাশ সেবনার্থ । কফিইন ও ষ্ট্রীক-নিনেব অধস্তাচ প্রক্ষেপ গলাধঃকরণেব শক্তি না থাকিলে এপোমর্ফিন ১০ গ্রেণ অধস্তাচ প্রক্ষেপ উত্তেজক ও কৃত্রিমশ্বাস

হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ।—ক্লোরিন ও অক্সাইড অব্ আয়ব, সলিউসন অব্ কার্বনেট অব্ পটাশ, শীতল জল সেচন, বক্ষে ও উদরে উত্তেজক মর্দন, নাসিকায় এমোনিয়া ধরিবে, কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস করাইবে বমনকারক ঔষধ, ব্রাণ্ডি, ষ্ট্রিং কফি সময় পাওয়া গেলে ষ্ট্রমাক পম্প এট্রপিনের হাইপোডর্মিক ইনজেক্সন উক্ত গ্রেণ

নাইটে। বেনজোল ।—ষ্ট্রিং কফি, ব্রাণ্ডি, এমোনিয়া, টর্পেন্টাইন এনিমা, শীতল জলসেচন গ্যাব্বানিজম, কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস

ক্লোরে ফর্ম ও ইথর ।—ষ্ট্রমাক পম্প ( ঔষধ পাকায়ণে থাকিলে ) ব্রাণ্ডি, এমোনিয়া, ষ্ট্রীকনি অধস্তাচ প্রক্ষেপ আঘাতেব পব বিষাক্ত হইলে বিশুদ্ধ বায়ুতে বোগীকে রাখিবে শীতল জলসেচন, গ্যাব্বানিজম, কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস, এমোনিয়ার দ্রাণ নাইটেট অব্ এমিল আঘাৎ ।

র্যালুকোহল ।—অবিলম্বে ষ্ট্রমাক পম্প দ্বারা পাকায়ণ



ধৌতকবৎ, শীতল জ্বাশেচন, মলিউসন অব্ এসিটেট অব্ এসো-  
নিয়া জল সহ, উত্তাপ বহান উপায়াবলম্বন, পদদমে ও বক্ষ-  
স্থলে মর্টার্ড প্লাষ্টর ইং কফি বমনকারক, নাইটেট অব্  
এমিল আদ্যঃ, ইলেকট্রিসিটি ষ্টীকনিনের অম্বাচ প্রক্ষেপ ।

হেনবন ।—বমনকারক, পূর্ণমাত্রায় ক্যাষ্টর তৎবে

ক্যানাবিস ইণ্ডিকা ।—ষ্টমাক পম্প, বমনকারক বিবে-  
চক ও উত্তেজক প্রযোজ্য

ক্যাম্ফর ।—ষ্টমাক পম্প, বমনকারক, অধিক জলপান,  
তীব্র ম্যালাইন বিরেচক শীতল ও উষ্ণ জলধাবা

নক্সভমিকা, ষ্ট্রিকনিয়া ও ক্রসিয়া ।—ষ্টমাক পম্প, বমন  
কারক বোমাইড অব্ পটাসিয়ম অধিক মাদাম ইফিৎ,  
ক্লোবাল, ক্যালোবাব বিং ও ইথর প্রভৃতি প্রযুক্ত হয় তদিক  
পরিমাণে ব্রাণ্ডি, ক্লাংগ খাস বিবেচক পীচকারি, তণ্ডিত অয়েল  
ট্যানিন, এনিমেল চাবকোল স্নেদ জন্মানব চেষ্টা ও উষ্ণতা  
বক্ষা ববিবে ক্লোরোফর্ম আঘাল দ্বাবা আক্ষেপ নিবারণ  
কবিবে

বেলেডোনা ও এট্রপিন —বমনকারক ওষধ, ক্যাষ্টর  
অয়েল, জাস্তব অম্বাচ এসিরিৎ বা পাইলোক্যাপিনের অম-  
বাচ প্রক্ষেপ বিবিধ উত্তেজক, কনিম খাসপখাস, কাউন্টার  
ইব্রিটমেন ষ্টমাক পম্প মর্কিয়ান অম্বাচ প্রক্ষেপ

একোনাইট ও হেলিবোক বা ভিরাট্টিন ।—  
এমিটীক, ক্যাষ্টর অয়েল, জাস্তব অম্বাচ, ইং কফি, এসোনিয়া,  
ব্রাণ্ডি, ডিজিটেলিস, শাখাদ্বয় মর্দন, কৃত্রিম খাসপ্রধাম । ষ্টমাক

পম্প। লাইকন এট্রিঃ ২ ফোটা অধস্তাচ প্রক্ষেপ। প্রীকনিব  
৩০ বা ৬০ .

ডিজিটেলিস, ষ্ট্রাক পম্প, এমিটাক্স, ক্যাপ্টর অয়েল,  
ট্যানিন ঘটিত ইনসি, টি, ডিকক্সন ওকবার্ক টিং গল, ট্যানিক  
এসিড ও জল, ষ্ট্রং কফি, এণ্ডি। ওপিয়ম। রোগীকে স্থিতিভাবে  
চিৎ করিয়া শয়ন করাইবে

সল্ফিউরেট অব পটাসিয়াম।—ডাইলিউট সলিউশন  
অব্ ক্লোরাইড অব্ সোডা ও লাইম

ফটোমোনিয়াম।—বমনকারক ঔষধ, ক্যাপ্টর অয়েল, শঙ্খ  
দেশে জলোকা। ট্যানিন, উত্তেজক, মর্ফিয়াব অধস্তাচ প্রক্ষেপ।

হেমলক বা কোনিয়াম।—বমন করাইয়া ক্যাপ্টর অয়েল  
দ্বারা বিরোচন করাইবে পবে উত্তেজক বিধান করিবে প্রথমে  
ষ্ট্রাক পম্প।

টোবাকো ও লোবিলিয়া—তামাক।—উত্তেজক  
ঔষধ প্রয়োগ, বমনকারক ঔষধ যদি আগ্নি বমন হইতে  
থাকে, তবে বমনকারক ঔষধ সেবন করাইবে না। তদভাবে  
ষ্ট্রাক পম্প। এণ্ডি আদি উত্তেজক, প্রীকনিব অধস্তাচ  
প্রক্ষেপ

ক্লোরাল হাইড্রেট।—ষ্ট্রাক পম্প, বমনকারক প্রীক-  
নিব, এট্রিঃ বা কফিইনের অধস্তাচ প্রক্ষেপ। এমোনিয়া,  
ইথর, ও ল্যাণ্ডি দ্বারা উত্তেজন। বাহ্যিক উষ্ণতা প্রয়োগ, কৃত্রিম  
শ্বাস, ইলেকট্রিসিটি। কফি লাইকন পটাস।

কার্বনিক এসিড গ্যাস।—বিগত বায়ু সংকলিত স্থানে

রোগীকে লইয়া যাইবে, শীতল জলসেচন, হস্তপদাদি মর্দিন, শরীর-  
বের উষ্ণতা বন্ধা করিবে ক্রিমি খামপ্রখাম, গ্যালবানিজম,  
অক্সিজেন বাষ্প আশ্রয় ।

সল্ফিউরেটেড্ হাইড্রোজেন গ্যাস ।—বিশুদ্ধ বায়ুতে  
রোগীকে রাখিবে, উত্তেজক ঔষধ, ক্লোরিন আশ্রয় ক্লোরিনেটেড  
লাইম ও সোডা ।

কার্বিউবেটেড্ হাইড্রোজেন গ্যাস ।—রোগীকে অতি  
সব্বর বিশুদ্ধ বায়ুপূর্ণ স্থানে লইয়া যাইবে, শীতল জলসেচন, উত্তে-  
জক ঔষধ ।

অন্তান্ত প্রকার বিষের চিকিৎসা সাধাবণ প্রণালী অবলম্বনে  
করিতে হইবে এস্থলে কেবল প্রধান প্রধান বিষের চিকিৎ-  
সা দি বর্ণিত হইল

### সর্পদংশন স্নেক বাইট্ ।

দংশিত স্থানের উপরে লিগেচার অর্থাৎ দৃতা বা দড়ির দ্বারা  
দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবে এবং ঐ স্থান চিরিয়া দিয়া উষ্ণ জল-  
সেচন করিবে । চুম্বিত বিষ উঠাইয়া ফেলা যাইতে পারে, কিন্তু  
যে চুম্বিবে তাহার মুখে যেন কোনরূপ ক্ষত না থাকে ; তৎপরে  
নাইট্রিক এসিড, নাইট্রেট অব্ সিলভর, লাইকব এমোনিয়া বা  
জলোষ্ণ লৌহ দ্বারা দধি করিবে সেবনার্থ লাইকব এমোনিয়া,  
ব্রাণ্ডি প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ ১০ ১৫ বা ২০ মিনিট অন্তর  
দিবে ষ্ট্রীকনিং হাইপোডার্মিক ইন্জেক্সন ও পাইবম্যাঙ্গানেটের  
হাইপোডার্মিক ইন্জেক্সন অধুনা ব্যবহৃত হইতেছে এন্টিভিনি-  
সিগম হাইপোডার্মিক ইন্জেক্সন উপকারী বলিয়া কথিত হয় ।



### বিষধর জন্তু দংশন ।

দংশিত স্থানের চর্মাটা উত্তোলন করিয়া ফেলিবে ও তৎস্থান নাইট্রেট অব্ সিলভর বা নাইট্রিক এসিড্ বা ট্রিং কার্বলিক এসিড্ দ্বাৰা পোড়াইয়া দিবে । পোড়াইয়া দিবার পূর্বে উক্তস্থ জলসেচন করা কর্তব্য । তৎপরে সেবনার্থ সল্ফাইট অব্ ম্যাগ্নিসিয়া ১০ ৩০ গ্রেণ মাত্রায় দিবসে ২ ৩ বার সেবা এই ঔষধ ১৫ দিন হইতে এক বা দেড় মাস পর্যন্ত সেবন কবান উচিত করোসিব সল্লিমেট ১ গ্রেণ ও জল ১ আউন্স, দ্রব করতঃ তদ্বারা ক্ষত স্থান লিণ্ট, তুলা বা বস্ত্রখণ্ড সহযোগে ভিজাইয়া রাখিবে ।

### ব্যবস্থাবলী ।

ঔষধ ব্যবস্থাকালে বোগীর বয়স, লিঙ্গ, ধাতু, প্রকৃতি, অভ্যাস, শরীর-অবস্থা ও স্থানীয় জলবায়ুৰ গুণ প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য এই ব্যবস্থাবলীর মধ্যে ঔষধে যে মাত্রা লিখিত হইয়াছে, তাহা পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের উপযোগী । পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীলোকদিগের জন্য উহা অপেক্ষা মাত্রা কিছু হ্রাস করা কর্তব্য । অল্পবয়স্ক বালক বালিকাদের জন্য নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে মাত্রা হ্রাস করিতে হইবে এই ব্যবস্থাবলীর মধ্যে অনেক স্থলে ঔষধ সেবনের নিয়মাদি লিখিত হয় নাই বোগের অবস্থানুসারে ১ ২ ৩ ৪ ঘণ্টান্তর অথবা দিনে ২ ৩ ৪ বার চিকিৎসক বিবেচনা করিয়া ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করিবেন ।

|                        | গ্রেণ | মিনিম । |            |
|------------------------|-------|---------|------------|
| পূর্ণবয়স্কদের জন্ত    | ৬০    | বা ১    | হইবে       |
| ১৪ বৎসর বয়স্কের পক্ষে | ৩৭    | বা ৫    |            |
| ৭ " " "                | ২০    | " ৬     |            |
| ৫ " " "                | ১৫    | " ৮     |            |
| ৩ " " "                | ১০    | " ৬     |            |
| ১ " " "                | ৬     | " ৩     |            |
| ৬ মাস " "              | ৩     | " ২     |            |
| ৩ " " "                | ২     | " ৬     | হওয়া উচিত |

### সার্বস্মিক-উত্তেজক মিশ্র ।

১ —এমোনি কার্বনাস ৩০ গ্রেণ, স্পিরিটস্ ইথরিস ৩ ড্রাম, টিং ল্যাভেণ্ডর কং অর্ক আউন্স, একোয়া ক্যাম্ফর ৫ ০ আং । মিশ্রিত কর ইহা ৬ বা ৮ মাত্রা হইবে

২ —স্পিরিটস্ এমোনি এরোমেটিক্‌স, ২ ড্রাম, স্পিরিটস্ ইথরিস ২ ড্রাম, টিং কার্ডেমম কং ৩ ড্রাম, টিং ডিজিটেলিস ২০ মিনিম, ক্যাম্ফর ওয়াটব ৬ আং মিঃ, ৬ মাত্রা

৩।—স্পিরিটস্ এমোনি এরোমেটিক্‌স, ক্লোরিক ইথর বা স্পিরিট ক্লোবোফর্ম—এত্যেক ২ ড্রাম, স্পিরিটস্ ভাইনাই গ্যালি সাই ১ আং, টিং অরানসিয়াই ২ ড্রাম, ডিকক্টাই মিনকোনী ৪ ০ আং মিঃ, ৬ মাত্রা

৪।—এমোনি কার্বনাস ১২০ গ্রেণ, এসিড্ হাইড্রোসিয়া-নিক ডিল ২০ মিনিম, টিং কার্ডেমম কং ৫ ড্রাম, ইনফিঃ অবানসিয়াই—৮ আং । মিঃ, ৬ বা ৮ আংশ, ৪ ড্রাম জম্বীব রস বা

বা ১৮ গ্রেণ সাইট্রিক এসিড সহ উচ্ছলনাবস্থায় প্রয়োজ্য । অব-  
সন্নতা সহ পাকশযের উগ্রতা বর্তমান থাকিলে ব্যবহার্য্য

৫ পিবিট এমোনি এবোমেটীকস, ক্লোরিক ইথর, টিং  
মস, ও টিং ভেনিবিয়ান্ প্রত্যেকে ২ ড্রাম, ক্যান্ফর ওয়াটার ৫  
আং মিঃ, ৬ মাত্রা

৬ —এসিড্ হাইড্রোক্লোরিক ডিল ১ ড্রাম পিবিট ইথ-  
রিস ৩ ড্রাম, সিরপ অরানসিয়াই ৪ ড্রাম, ইনিফিঃ অরানসিয়াই  
৮ আং মিঃ, ৬ অংশ ৪—৬ ঘণ্টাস্তর একজরে এবং প্রশ্বাস  
নিঃসৃত বায়ুতে এমোনিয়ার গন্ধ থাকিলে ব্যবহার্য্য

৭।—লাইকব সোডি ক্লোরেট ১ ড্রাম, টিং সিনকোনি-  
ক ৬ ড্রাম পিবিট ভাইনগ গ্যালিসাই—২ আং, জল ৮ আং ।  
মিঃ জরের অবসন্নাবস্থায় প্রয়োজ্য । ৮ মাত্রা

৮।—পিবিট ইথরিস নাইট্রোসাই, স্পিঃ ক্লোবোফরমাই  
প্রত্যেক ১ আং, মিঃ ( সিরপ ) টলুটেনাই—৪ আং মিঃ,  
কাশির উগ্রতা । নব্যার্থ্য অবলেক্রূপে ব্যবহার্য্য মাত্রা ১ ড্রাম ।

৯ —এমোনি কার্বনাস্ ৩০ গ্রেণ, স্পিঃ মিনিষ্ট্রী—২ ড্রাম,  
টিং কার্ডেগম কং ৬ ড্রাম, ইনিফিঃ ক্যারিফোফাইলাই ৮ আং ।  
মিঃ, ৬ অংশ ৪ ৬ ঘণ্টাস্তর, দুর্বলতা সহ বিবমিষা ও উদরা-  
গ্নান, বিসর্প ( এ বসিপেলাস্ ), তালুপার্শ্বগ্রস্থি প্রদাহ ইত্যাদিতে  
ব্যবহার্য্য

১০ স্পিঃ এমোনি এবোমেটীকস ৩ ড্রাম, একোয়া লবো-

তরদা পদার্থ মনেই পরিমাণ স্থলে যুইড্, জাম ব তাউগ ধরি লইতে  
হইবে । আভ্যেব পরিণতে আং, মিশ্রিত কর=মিঃ, অংশ—অং, টিংচব=টিং,  
বঙ্গ ডণ্ড=বং, ও ভূতি মাত্তিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইল



সিরেসাই ১ ড্রাম, সোডি বাইকার্ব ৬০ গ্রেণ, টিং কলম্বা ৬ ড্রাম, একোয়া এনিথি ৮ আং। মিঃ, ৬ অংশ, দিনে ২ ও বাব, বমন, বিন্দিয়া ও বুক-জাল' নিব'নগার্থ ব্যবহ'র্য।

১১ —এমোনি কার্কনাস ৩০ গ্রেণ, স্প্রিঃ ইথিনিস্ ৩ ড্রাম, ইনফিঃ ক্যাবিয়োফাইলাই ৮ আং। মিঃ, ৬ অংশ দিনে তিনবাব, দৌর্সলা সহ উদবা দান থাকিলে প্রয়োজ্য।

১২ —ওলিয়াই ক্যাজিপুটী ৪ মিনিম, স্যাক্‌কেবাই ল্যাক-টিস্ ২০ গ্রেণ উত্তমরূপে মিলাইয়া, ডিঃ স্যালোজ কম্পজিটী ১০ আং সংযোগ করিবে প্রাতে সেবা, উদবা দান ও কোষ্ঠ-বন্ধেব প্রবণতা থাকিলে বিধেয়।

১৩ —স্প্রিঃ ইথিনিস্ ৩ ড্রাম, স্প্রিঃ ভাইনাই গ্যালিসাই ১০ আং, ইনফিঃ মিনবেলা ৮ আং মিঃ, অর্ধ আং ৪ ৬ ঘণ্টান্তর বিবিধ তরুণ পীড়া আরোগ্যোন্মুখ কালে ব্যবহার্য।

### সার্বসামিক উত্তেজক চূর্ণ।

১৪ —ক্যাম্ফর ও মস্ক প্রত্যেকে পাঁচ গ্রেণ, একত্রে মিশ্রিত করিয়া যবোদক সহ গুণাবায়ুরোগে ও বিবিধ পীড়ার অবসন্নাবস্থায় প্রয়োজ্য।

১৫ —এমোনি কার্কনাস ৫ গ্রেণ, ক্যাম্ফর ২ গ্রেণ, জিলাব-গাউডর ২ গ্রেণ, একত্র ১ পুরিমা

### শায়বীয় ও পৈশিক উত্তেজক।

১৬ —লাইকর ট্রীকনিয়া অর্ধ ড্রাম, একোয়া মেসি পিপ ৬ প্লাং মিঃ, অর্ধ আং মাত্রায় ৩৪ ঘণ্টান্তর প্রয়োজ্য।

১৭ — লাইকর ট্রীকনিয়া ১২ বা ১৫ মিনিম, টিং জেন্সিয়ান্  
৩ ড্রাম, কুইনী সল্ফ ৯ গ্রেণ, এসিড হাইড্রোক্লোরিক ডিল্  
১৫ মিনিম, একোয়া সিনেগোমাই ৬ আং মিঃ, ১ অং

### উত্তেজক ধাবন ।

১৯ — এসিড নাইট্রিক, এসিড হাইড্রোক্লোরিক, প্রত্যেকে  
২০ মিনিম, জল ৮ আং, মিঃ । লিচেন্ ও ক্রনিক একজিয়া  
নামক চর্ম রোগে ব্যবহার্য

২০ । — ক্যালোমিলেনাস্ ৫০ গ্রেণ, লাইকর ক্যালসিস্ ৬  
আং, মিঃ । ইহাকে ব্র্যাকওয়াশ বলে উপদংশে প্রযোজ্য ।

২১ । — এসিড সল্ফিউরিক্ ডিল্, একোয়া ডিষ্টিলেটা প্রত্যেক  
আদ আং ফেভস্ নামক চর্ম রোগে প্রযোজ্য

২২ — পটাসী কষ্টিকা ৫০ গ্রেণ, একোয়া ডিষ্টিলেটা ৪ আং,  
মিঃ । ঐ রোগে স্থানিক প্রযোজ্য ।

২৩ — লাইকর এমোনিয়া ফোর্ট ২ আং, স্পিঃ বা অয়েল  
রোজমেরী আদ আং, স্পিঃ ক্যান্ফর ২ আং, মিঃ, সাতিনাম  
স্থানিক উত্তেজক । টাকে ব্যবহার করিতে হইলে তৈল মিলা-  
ইয়া দেওয়া উচিত ।

২৪ । — হাইডার্জ কবোসিব সল্লিমেট পাঁচ বা দশ গ্রেণ, লাই-  
কর ক্যালসিস্ ৬ আং, মিঃ । ইহাকে ইয়োমো ওয়াশ কহে, উপ-  
দংশীয় ক্ষতে প্রযোজ্য

২৫ । — জিন্সাই সল্ফেটীশ ৬ গ্রেণ, স্পিঃ রোজমেরী, টিং  
লাভেণ্ডার কং প্রত্যেকে ১০ ড্রাম, জল ৫০ আং, মিঃ ইহাকে  
বেড ওয়াশ কহে । বিবিধ প্রকার ক্ষতে উত্তেজনার্থ ব্যবহার হয়



২৬ টিং আইয়োডিন ১ আং গ্লিসিরীণ ১ ০ আং, জল ৮ আং, মিঃ নিরধুন ও গওমালীয়া ক্ষতে প্রয়োজ্য

২৭ —ক্রিস্টাল ট ৩৫ ক্রিস্টাল, গ্লিসিরীণ ১ ০ আং, জল ৮ আং, মিঃ । বিবিধ চর্ম রোগে প্রয়োজ্য ।

২৮ —এসিড কার্বলিক ১ ড্রাম, গ্লিসিরীণ ১ আং, জল ৮ আং মিঃ, বিবিধ চর্ম রোগে ও ক্ষতাদিতে ব্যবহার্য্য

২৯ ।—স্প্রিঃ এমোনিয়া এবোমেটিক, স্প্রিঃ বোজামেরী, গ্লিসিরীণ প্রত্যেকে ১ আং, টিং কাঙ্কেনাইডিস ৩—৬ ড্রাম, একোয়া বোজি ৮ আং, মিঃ জরাদি বোমেব পর মস্তকের চুল উঠিয়া গেলে স্থানিক প্রয়োজ্য ।

### উত্তেজক অগ্নি ধৌত ।

৩০ —ম্যাগ্নিউমেন ৩—৫ গ্রেন, জল ১ আং, জন করিয়া লইবে ।

৩১ —আর্জেন্টাই নাইট্রস ১—৩ গ্রেন, পবিত্র জল ১ আং ।

৩২ ।—কুপ্রাই সল্ফ ৩—৫ গ্রেন, জল ১ আং

৩৩ —জিন্সাই সল্ফ ২ গ্রেন, ভাইনম ওপিয়াই ১ ড্রাম, জল ১ আং ।

৩৪ —হাইড্রার্জ কবোসিন সল্লিমেট সিকি বা ৬ গ্রেন, পবিত্র জল ১ আং । চক্ষুগীড়ায় ইহা অপেক্ষা মৃদু ভাবাপন্ন ধৌত প্রস্তুত হয় । ৬ গ্রেনে জল ১ আং ।

৩৫ ।—পটাসী আইয়োডাইড ৭ গ্রেন, আইওডিন ৩ গ্রেন, পবিত্র জল ১ পাইন্ট গওমালীয়া চক্ষু প্রদাহাদিতে ব্যবহার্য্য ।

### উত্তেজক স্নান ।

৩৬ —এসিড হাইড্রোক্লোরিক ২ হইতে ৪ আং, জল ২৩ গ্যালন  
বিবিধ চর্ম-রোগে

৩৭ ।—এসিড্ নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিক ডিল ৬ আং, ঈষদুষ্ণ জল ৮ গ্যালন

৩৮ ।—ক্রিমিজোট ২ ড্রাম, মিসিবীণ ২ আং, উষ্ণ জল ৩০ গ্যালন

৩৯ —আইয়োডিন্ ২ ড্রাম, লাইকর পটাশ ২ আং, উষ্ণ জল ২০ গ্যালন

৪০ ।—প্রিসিপিটেড সল্ফর ২ আং, হাইপোসল্ফাইট অব্ সোডা ১ আং, এসিড সলফিউরিক ডিল আদ আং, জল ৩০ গ্যালন, মিঃ ।

### উত্তেজক মর্দন ।

৪১ ।—লাইকর এমোনিয়া সিকি আং, সোপ লিনিমেন্ট ১ ০ আং  
অথবা অদিশ অয়েল ১ আং

৪৪ টিং ক্যাস্বেবাইডিন্ অর্ক ও সোপ লিনিমেন্ট ১ ০ আং ।

৪৩ —ক্যাম্ফর ১০০ গ্রেণ, অয়েল টর্পেন্টাইন অর্ক আং, লিনিমেন্ট ক্যাম্ফর অর্ক আং ।

৪৪ —মর্টার্ড পাউডার ১০০ গ্রেণ, এসিটিক এসিড আদ আং, অয়েল টর্পেন্টাইন ১।০ আং

৪৫ —এন্টিম টার্ট ৫০ গ্রেণ, একোয়া রোজি, ২ আং, টিং ক্যাস্বেবাইডিন্ ১ আং ।

৪৬ ।—অয়েল ক্রোটন ১ ড্রাম, সোপ লিনিমেন্ট ১ আং

৪৭ --এসিড সল্ফ ১০ ড্রাম, অয়েল টর্পেন্টাইন আদ আং, অয়েল-অলিভ ১০ আং,

৪৮ --অয়েল ক্যাজিপুটী ১০ আং, লিনি ক্যাম্ফর বং অদ আং ।

৪৯ --পল্ড ক্যাপসিকম্ ৩০ গ্রোন, লিনিঃ টেবিলিহিনি ও আং, লিনিঃ ক্যাম্ফর কং ৮ আং ব্রাইটিস বোগে বক্ষোপবি মর্দন কর্তব্য

৫০ ।—লিনিঃ সোপ, ওপিয়ম ও ক্যাম্ফর কং প্রত্যেকে ১ আং, টিং জার্বিকা ২ ড্রাম । মচকান ও আঘাত প্রাপ্ত স্থানে মর্দন করিতে হয়

৫১ —লিনিঃ ক্যাম্ফর কং ২ আং, টিং ওপিয়ম ও বেল্লেডেন' প্রত্যেকে ৪ ড্রাম উদরবেদনা, বমন ও বিবমিষাতে মর্দন কর্তব্য ।

৫২ —সোপ-লিনিমেন্ট ২ আং, ক্যাজিপুটী অয়েল অর্ধ আং, টর্পেন্টাইন ১ আং উদরাগ্নানে উদরোপবি মর্দন কর্তব্য ।

### উত্তেজক মলম ।

৫৩ ।—অর্জেন্টাই-নাইট্রস ১০ গ্রোন, সিম্পল অয়েন্টমেন্ট ৫০ গ্রোন ।

৫৪ —ক্রিয়েজোট অয়েল ৫ হইতে ৫০ মিনিম, এডিপিস বা চর্বি আদ আং । বিবিধ চর্মরোগে ও ছুষ্ঠকতে ।

৫৫ —ক্যাম্ফর ১৫ গ্রোন, গ্লিসিরীণ অর্ধ ড্রাম, এডিপিস ১ আং । সমস্ত চর্মপীড়ায় ।



৫৬ । ক্যানফর ২০ গ্রাঃ, অক্সুয়েঃ-হাইড্রাজ অর্ক আং ।

৫৭ পটালী কার্ব ১ আং, সল্ফিউবিস প্রিসিপিটেটাই ২ আং, এডিপিস ৪ আং পাঁচডায় প্রযোজ্য

৫৮ —পাইসিস্ গিকুইডী ৪ আং, সিবা ফ্লেবা অর্ক আং, সল্ফিউবিস ১ আং বিবিধ চর্মবোগে ।

৫৯ কুপ্রাই সল্ফ ৩০ গ্রাঃ, এসিড সল্ফ ডিল ১০ মিনিম, এডিপিস ১ আং ।

৬০ —ব্যালসম টলু ১২০ গ্রাঃ, অয়েল রোজমেরী ২০ মিনিম, টিং ক্যাম্বেবাইডিস্ ৪ ড্রাম, অয়েল রিসিনী ১ আং, এডিপিস্ প্রিপেয়ারেটা ১ আং টাকে ব্যবহার্য ।

৬১ অক্সুয়েঃ হাইড্রাজ্ নাইট্রেটস অর্ক অং, অক্সুয়েঃ স্টে-সিয়ম ২ আং ।

৬২ ।—অয়েল ক্রোটন ১৫ মিনিম, এডিপিস অর্ক আং । প্রভাভা সাধনার্থ ইহার এক চতুর্থাংশ মালিশ কর্তব্য ।

৬৩ —অক্সুয়েঃ রেজিনি ১ আং, এসিড কার্বলিক ১—২ ড্রাম ক্ষতে প্রযোজ্য

৬৪ । অক্সুয়েঃ রেজিনী ১ আং, অয়েল টার্পেন্টাইন ২ ড্রাম বহুদিন স্থায়ী ক্ষতে ব্যবহার্য

### পরাম্পূর্ণ বিনাশক মলম

৬৫ —অক্সুয়েঃ হাইড্রাজ্ এমোনিয়োট ১২০ গ্রাঃ, অক্সুয়েঃ মলফর ৩৬০ গ্রাঃ

৬৬ ।—অয়েল ক্রিয়েজোট ১০ মিনিম, অক্সুয়েঃ হাইড্রাজ্ অক্-সিডাই কপ্রাই ১২০ গ্রাঃ, অক্সুয়েঃ সিম্পল ৩৬০ গ্রাঃ ।

৬৭।—অজুয়েঃ হাইড্রাজ'নাইট্রেটস ৪০ গ্রেণ, অজুয়েঃ মিটে-  
সিয়াই ২৪০ গ্রেণ পুরাতন চর্ম্ম পীড়ায় স্থানিক উত্তেজক ৫  
পরিবর্তক চক্ষুপ্রনাহে বাত্রিতে চক্ষুর পাতায় লাগাইয়া দিলে চক্ষু  
জোড়া লাগে না।

৬৭।—অজুয়েঃ ক্রিয়েজোট ও সল্ফর প্রত্যেক অর্ধ আং

৬৯ —আইয়োডাইড অব্ সল্ফর ২০ গ্রেণ, সিঙ্গল অয়েন্ট-  
মেন্ট ১ আং কীটাপু জনিত বিবিধ চর্ম্মপীড়ায়

৭০ —আইয়োডাইড অব্ সল্ফর ১২ গ্রেণ, প্রিসিপিটেড সল্ফ-  
ফর ২০ গ্রেণ, অয়েল য়ামিগ্‌ডেলী আমাবি ৫ মিনিম, এডিপিস ১  
আং। ব্যবহার পূর্ব্ববৎ

### উত্তেজক পুন্টীস।

৭১ —সিগাপিস অর্ধ পাউণ্ড, এসিটিক এসিড আব-  
শুক নত

৭২ —লিনাই, সেগিমিস ৪ আং, উফজল ৮ আং, ক্রমশঃ  
মিশ্রিত করিয়া ব্যালসিস্ ক্লোরিনেটা ১০০ গ্রেণ সংযোগ  
করিবে

### উত্তেজক কবল।

৭৩ —টিং ক্যাপ্সিসাই অর্ধ হইতে ১ আং, সিঙ্গল সিঙ্গল ১  
আং, গোলাপ জল ৬ আং

৭৪ —এসিড হাইড্রোক্লোরিক ডিল অর্ধ আং, বা নাইট্রো-  
হাইড্রোক্লোরিক ডিল ৩ ড্রাম, মেলিস রোজি ১ আং, ডিককুটাই  
ল্ডিয়াই ৬ ০ আং

৭৫ — ইনফিঃ বোজি এসিডাই ১০ আং, টিং মব্ অর্কি আং, শুকেবাই এনাই অর্কি আং ।

৭৬ — মেলিস বোবিসিস ১ ০ আং, জল ৬ ০ আং মুখগহ্বর ও জিহ্বাব ক্ষতে ।

৭৭ — মিউসিলেজ একেসিয়া ৭ ০ আং, অয়েল টর্পেন্টাইন অর্কি আং লালীশ্রাবে ।

৭৮ — পটানী ক্লোবাস ১০০ গ্রোণ, এসিড হাইড্রোক্লোরিক ড্রিল ২ ড্রাম, জল ৭ ০ আং । কণ্ঠক্ষতে ও মুখগহ্বরের ক্ষতে

৭৯ — অয়েল ক্রিয়েজোট ২০ মিনিম, টিং ল্যাভেণ্ডর কং, টিং মব প্রত্যেকে ৪ ড্রাম, সিরম লিমন ১ ০ আং, জল ৮ আং । কণ্ঠাভ্যন্তরের পুরাতন প্রদাহে

৮০ — লাইকর সোডি ক্লোরেট ৬ ড্রাম, জল ৮ আং ।

### উত্তেজক বস্তুপ্রয়োগ

৮১ । অয়েল টর্পেন্টাইন ১ আং, একেসিয়া পাউডর আবশ্যক মত, একত্র মিশাইয়া, ডিঃ হর্ডিয়াই ১৯ আং, সংযোগ করিবে ছুর্নিবাব উদবাধানে মলদ্বারে পীচকাবি দিবে ।

৮২ । — টিং স্যাসাফেটিডা অর্কি আং, ডিঃ হর্ডিয়াই ১৯ আং ।

৮৩ । — অয়েল টর্পেন্টাইন, টিং স্যাসাফেটিডা প্রত্যেকে অর্কি আং, ডিঃ হর্ডিয়াই ১ পাইন্ট ।

### উত্তেজক চূৰ্ণ—( বাহ্যিক প্রয়োগার্থ )

৮৪ । এসিডাই ডার্মিনিয়োগাই ৮ গ্ৰেণ, ক্যালোমিলনানাম ১ আং লিউপম্ নামক ক্ষতে অল্প ২ মিমিত স্থানে ছডাইয়া দিবে

৮৫ —কুপ্ৰাই সব এসিটেটীম, পল্ড স্বেবাইনা প্রত্যেকে ১ আং ।

৮৬ পল্ড স্বেবাইনা ৫০ গ্ৰেণ, ম্যালিউমিনা অষ্টাই, হাই-ড্রাক্স অক্সিডাই ১৩ আই প্রত্যেকে ১৫ গ্ৰেণ ।

### উত্তেজক-ধূম-প্রয়োগ ।

৮৭ ।—সল্ফর অর্ধ হইতে ১০ আং, আইয়োডিন্ ২০ গ্ৰেণ, মিমিত কবিবে ইহাব ১২ আং এক এক বাবে ব্যবহান কবিবে দুর্নিবার চর্মাযোগে সল্ফর ও আইয়োডিনেব ধূম পৃথক্ৰূপে প্ৰযুত হইতে পারে ক্যালোমিলেরও ধূম প্রযুক্ত হয় ।

### মাদক, বেদনানিবারক ও অবসাদক মিশ্র ।

৮৮ —টিং ওপিয়াই ২২ মিনিম, একোয়া সিনেমোগাই, একোয়া পিউবা প্রত্যেকে ৬ ড্রাম । একমাআ নিজাকানে সেব্য

৮৯ ।—পটানী বাইকার্ভ ২০ গ্ৰেণ, একোয়া মেস্টি ভিনিডিম্ ১ আং, টিং ওপিয়াই ২৫ মিনিম, মিরপ টলুটেনাই ১ ড্রাম ; মিঃ, ৪ ড্রাম জন্মিব বসের সঙ্গে \* যন কালে সেব্য

৯০ ।—টিং ওপিয়াই ৩০ মিনিম, বাইকর এমোনিয়া এসি-



টেটস ১ ড্রাম, একোয়া মিনেমোমাই, সিবপাই টলুটেনাই প্রত্যেক  
অর্ধ আং মিঃ, ( অর্ধ ) শয়ন কালে সেবা

৯১ —এসিড সল্ফ ডিল্ ২ ড্রাম, টিং ওপিয়াই বা টিং  
হায়মায়ামাই ২ ড্রাম, টিং ডিজিটেজিস ২ ড্রাম, ইনফিঃ কোয়া-  
সিয়া ৬ আং মিঃ, ( ৬ ) ।

৯২ —এসিড হাইড্রোসিয়ানিক ডিল্ ২০ মিনিম, মিঃ গ্যামি-  
গুডেলী ৬ আং । মিঃ ( ৬ ) ।

৯৩ —বিস্মথাই গ্যান্‌বাই ১০ গ্রেণ, এসিড হাইড্রোসিয়া-  
নিক ডিল ৫ মিনিম, মিউসিলেজ একেসিয়া ১ আং, সিবপ অরান-  
সিয়াই ১ ড্রাম । মিঃ, ( পাকায়শুলে )

৯৪ —টিং ওপিয়াই ৩ মিনিম, মিউসিলেজ একেসিয়া, সিম্পল  
সিবপ প্রাক্যক অর্ধ আং, পবিত্র জল ১ আং মিঃ, শিশুদের  
নিদ্রাকরণার্থ মাত্রা এক চা চামচ পবিমান অর্ধ ঘণ্টা শুব, যতক্ষণ  
নিদ্রা না হয় ।

৯৫ —টিং বেলেডোনা ২—১ ড্রাম, সিবপ প্যাপেভেরিস  
৩—৬ ড্রাম, স্পিঃ ক্লোরোফর্ম ২ ড্রাম, একোয়া মেসি পিপ্ ৫  
আং মিঃ ( ৬ ) ।

৯৬ —পটাসী নাইট্রেটস ৫০ গ্রেণ, টিং ডিজিটেজিস ২—১  
ড্রাম, লাইকর এগোনিয়া এসিটেটস ১ আং, পবিত্র জল  
৪ ০ আং, সিবপ হেমডিস্‌মিস অর্ধ আং মিঃ, ৬ অংশ

৯৭ —পল্‌৩ ট্রাগাকাঙ্ক ১ ড্রাম, স্পিঃ ক্লোরোফর্ম অর্ধ  
ড্রাম, ভাইনম ইপিক্যাক' ১০ মিনিম, সিবপ টলু ২ ড্রাম, জল ৬  
ড্রাম মিঃ, ছর্নিবার কামিতে

৯৮ —লাইকন মর্কী হাইড্রোক্লোবাস ২০ মিনিম, ক্লোরোফর্ম



১০ মিনিম, টিং ক্যানেনবিস ইণ্ডিকা ২০ মিনিম, পল্ভ টাণ-  
কাঙ্ ৩০ গ্রেণ, স্পিঃ ইথবিস ৪০ মিনিম, এসিড হাইড্রো-  
সিয়নিক ডিল্ ৪ মিনিম, ডল ১ ০ অং মিঃ, ২ ১/২ অংশ ।

৯৯ —স্পিঃ এমন্ এনোমেটিক ২ ড্রাম, টিং লোবিলি ইথি-  
রিয়া ১ হইতে ২ ড্রাম টিং একোনাষ্টট ১০ মিনিম, একোয়া  
কান্ফব ৮ অং মিঃ, এক আউন্স মায়া দিনে ২ ৩ বার, খাস  
কাসে বিশেষ উপকারী ।

মাদক, বেদনানিবারক ও অবসাদক বটিকা ।

১০০ । একষ্টাঃ কোনিয়াই ৩ গ্রেণ, বিস্মথাই ম্যাল্‌বাই  
৫ গ্রেণ । একত্রে এক বটিকা ।

১০১ একষ্টাঃ বেলেডোনা ৪ গ্রেণ, পল্ভ ইপিক্যাক ৩০  
২০ গ্রেণ । একত্রে ১৬ বটিকা ।

১০২ —পল্ভ ডিজিটেলিস, পল্ভ মিলি, একষ্টাঃ হায়সায়ামা-  
মাস প্রত্যেক ২০ গ্রেণ মিঃ, ১২ বটিকা কাস ও খাসকাসে ।

১০৩ ।—পল্ভ ইপিক্যাক, একষ্টাঃ ওপিয়াই প্রত্যেকে ১  
গ্রেণ, পটানী নাইট্রস্ ৮ গ্রেণ, মিসিবিল ছাবা ২ বটিকা শয়ন-  
কালে সেব্য

১০৪ —একষ্টাঃ হায়সায়ামাই ২ হইতে ৫ গ্রেণ, একষ্টাঃ  
কোনিয়াই ৩ গ্রেণ শয়নকালে সেব্য

১০৫ —একষ্টাঃ কোনিয়াই ৪ গ্রেণ, পল্ভ ইপিক্যাক ২ গ্রেণ,  
মর্ফি হাইড্রোক্লোবাস ১/২ গ্রেণ, একত্রে ২ বটিকা

১০৬ ।—একষ্টাঃ থ্যামোনিয়াই ১ গ্রেণ, একষ্টাঃ মিসারিজী  
৫০ গ্রেণ । একত্রে ৬ বটিকা দুর্নিবাব কানিতে প্রয়োজ্য ।

১০৭ ।—একষ্ট্রাঃ একোনাইট ১ ৩ গ্রো, একষ্ট্রাঃ থ্রিসাবিজী ২০ গ্রোণ । একত্রে ৬ বাটকা

### মাদক ও বেদমানিবারক চূর্ণ ।

১০৮ ।—পলুত ইপিক্যাক বং ১ গ্রোণ, শর্করা ২০ গ্রোণ, একত্রে ৪ পুরিয়া, ইহার এক এক পুরিয়াতে ৬ গ্রোণ অহিফেন আছে, মি শুদেব ৭ ফে ব্যবহার্য্য ।

১০৯ ।—ক্যাম্ফর ৩ গ্রো, থ্রিঃ ভাইনাই বেকটীফিকেটস্ ২ মিনিম, পলুত ইপিক্যাক কম্ ওপিয়া ৫ গ্রো । এক পুরিয়া, গগন কানো সেব্য ।

### অবসাদক বাহ্যিক প্রয়োগ—ধৌত ।

১১০ । পটাশী কার্ব ১২ গ্রো, টিং ওপিয়াই ৩০ মিনিম, জল ১ আং । মিঃ

১১১ ।—বাইকর পটাশ ২ ড্রাম, এসিড হাইড্রোমিয়ানিক ডিন্ ১০ আং, মিঃ ম্যামিগুডেলী ৬০ আং । মিঃ, হাইবাইগো নামক চর্মবোগে

১১২ ।—বাইকর পটাশই স্বেসিটেটস ১ ড্রাম, এসিড এসিটিক ডিন্, থ্রিঃ বেকটীফায়েড প্রত্যেকে অর্ধ আং, পরিশ্রুত জল ১১ আং মিঃ ।

১১৩ ।—একষ্ট্রাঃ বেনেডোনা ২ গ্রো, একষ্ট্রাঃ ওপিয়াই ২ গ্রো, জল ১ আং মিঃ

১১৪ —পটাশাই সায়ানিডাই ১০ গ্রোণ, মিক্ঃ ম্যামিগুডেলী ৬ আং মিঃ কণ্ডুযনশীল পুরাতন উদ্ভেদে

১১৫ —একষ্ট্রাঃ কোনিয়াই ১০ গ্রেন, একষ্ট্রা ওপিয়াই ৩ গ্রেন, জল ১ আং। মিঃ

১১৬ —এসিড হাইড্রোসিয়ানিক ডিল ৩ ড্রাম, প্লম্বাই এসি-  
টাস ৬০ গ্রেন, স্পিঃ বেকটিফায়েড ১ আং, একোয়া স্যাডিউসাই  
৮ আং মিঃ, বিবিধ চর্মবোগে

১১৭ —হাইড্রার্জ ক্যাসির সল্লিমেট ৩ গ্রেন, এসিড হাইড্রো-  
সিয়ানিক ডিল ১০ ড্রাম, মিকঃ স্যামিগডেলী ৮ আং মিঃ,  
বিবিধ চর্মবোগের উদীপনা নিবানার্থ

### নৈত্য-প্রয়োগ।

১১৮ —সোডি ক্লোবিডাই, পটানী নাইট্রেটস, এমোন হাই-  
ড্রোক্লোরেটস প্রত্যেক ২ ৩/৪ একত্রে মিশাইয়া ২০ বা ৩০  
আং ভল্যে দ্রব কর। অত্যন্ত নৈত্য প্রয়োগ আবশ্যক হইলে  
ইহা বিধেয়

১১৯ —লাইকব এমোনিয়া এসিটেটস ১ আং, স্পিঃ বেকটি-  
ফায়েড ২ আং, গোলাপ জল ৮ আং মস্তিষ্ক প্রদাহে ইহা  
দাবা জলপটা দিবে

১২০ - এমোনি হাইড্রোক্লোবেটস অর্ধ আং, স্পিঃ বেকটি-  
ফায়েড ২ আং, এসিটিক এসিড ডিল ১০ আং, জল ৮ আং মিঃ

### অবসাদক মলম।

১২১।—প্লম্বাই এসিটাস ৩০ গ্রেন, এসিড হাইড্রোসিয়ানিক  
ডিল ২ ড্রাম, সিম্পল অয়েন্টমেন্ট ৩ আং মিঃ, একুজিয়া  
সামক চর্মবোগে।

১২২ পটামি মায়ানিডাই ১২০ গ্রেণ, অয়েল স্যাগিন্‌ডেলী ২ ড্রাম, সিম্পল অয়েন্টমেন্ট ২ আং লিচেন ও প্রাইমো নামক চর্মরোগে ।

১২৩ ।—একট্রাঃ কোনিয়াই ২—৪ ড্রাম, এডিপিস ১ আং ।

১২৪ ।—পল্ড ওপিয়াই ৬০ গ্রেণ, এডিপিস ১ আং ।

১২৫ —একোনিমিয়া ২ গ্রেণ, স্প্রিঃ রেক্টিফায়েড ৬ ফোটাৰ মঙ্গে দ্রব করিয়া, এডিপিস ৬০ গ্রেণ সংযোগ করিবে মাখু-শূলে ব্যবহার্য্য ; কিন্তু ক্ষত বা চর্মনিঘর্ষণ থাকিলে দেওয়া অবিধেয় ।

১২৬ ।—অঙ্কুয়েঃ হাইড্রার্জ ১০ গ্রেণ, পল্ড ওপিয়াই ২ গ্রেণ । মিঃ ; চক্ষুতে বেদনা হইলে উহার চতুর্পার্শ্বে মালিশ কর্তব্য ।

১২৭ —অঙ্কুয়েঃ ভিরেট্টী, অঙ্কুয়েঃ পটামি আইয়োডিডাই প্রত্যেকে ১ আং । পুরাতন বাতাদিতে প্রয়োজ্য

১২৮ ।—এসিড হাইড্রোসিয়ানিক ডিল ১ ড্রাম, অঙ্কুয়েঃ এট্রোপী ১২০ গ্রেণ, অঙ্কুয়েঃ সিটেসিয়াই ১ আং চর্মপীড়াব বেদনা ও কণ্ডুয়ন নিবারণার্থ

১২৯ ।—লিনিঃ বেলেডোনা ২ ড্রাম, অঙ্কুয়েঃ পটামি আইডো-ডিডাই ১ আং মিঃ ।

উত্তেজক, বেদনা ও আক্ষেপনিবারক মিশ্র ।

১৩০ ।—টিং ভেলিরিয়ান এমোনিয়োট। অর্ক হইতে ১ ড্রাম, স্প্রিঃ ইথরিস ১ ড্রাম, টিংঃ হায়ামায়ামাই অর্ক ড্রাম, পটামি ব্রোমাইড ২০ গ্রেণ, একোয়া ক্যাম্ফর ১ আং । মিঃ ; গুল্মবায়ু রোগাদিতে । মাত্রা অর্ক আউন্স ।



১৩১ —মক্ষ ৩—৫ গণ। প্লিঃ ইথর, টিং ওপিয়াই প্রত্যেক ৩০ মিনিম, লোকামা সিনেমোমাই ১ আং । মিঃ, মাত্রা ২ আং

১৩২ । প্লিঃ ইথরিস, ০ টিং ক্যাম্ফর কং ওপিয়ো, সিবপ প্যাপেভেরিস প্রত্যেক ১ ড্রাম, ক্যাম্ফর ওয়াটার ৩ আং মিঃ, মাত্রা ১ আং

১৩৩ ।—একষ্ট্রাঃ ওপিয়াই নিকুইঃ ১০ মিনিম, বা টিং ওপিয়াই ৩০ মিনিম, ক্যাম্ফর ওয়াটার ১ আং মিঃ, একমাত্রা ।

১৩৪ প্লিঃ ইথরিস ২ ড্রাম, টিং ওপিয়াই ৪০ মিনিম, পল্ড মক্ষ ৪০ গ্রেণ, প্লিঃ এসন এবোমেটিক ১ আং, ক্যাম্ফর ওয়াটার ৫ আং মিঃ, ১ অংশ

১৩৫ প্লিঃ ইথরিস ২ ড্রাম, টিং ওপিয়াই ৩০ মিনিম, টিং ভেলিবিয়ান এসোনিয়ট অর্ধ আং, প্লিঃ সিনেমোমাই ১ আং, একোয়া এনিথি ৪ ০ আং মি, ১ অংশ এক মাত্রা, উদরাধান ও বুক জালাতে ব্যবহার্য্য ।

১৩৬ —প্লিঃ ইথরিস ৪০ মিনিম, একষ্ট্রাঃ ওপিয়াই নিকুই ১০ হইতে ১৫ মিনিম, টিং ক্যাম্ফর ১ ড্রাম, একোয়া মেছি পিপ ১ ০ আং । মিঃ একমাত্রা । উদরাধান ও আফেপে উপকারক ।

১৩৭ —প্লিঃ এসোনি এবোমেটিক ১ ০ ড্রাম, প্লিঃ ইথর ১ ড্রাম, টিং বেলেডোন ১২ মিনিম, এসিড হাইড্রোফ্লোরিক ডিল ৮ মিনিম, সিবপ ২ আং এক ড্রাম পরিমাণে অণোর মাত্র ৪ ঘণ্টান্তর ২ বৎসর বয়স শিশুর ছপিংক্ নামক কাস বোগে প্রয়োজ্য ।

১৩৮ ।—টিং লোবিগিয়া ইথিবিয়া ১।০ ড্রাম, ভাইনম্ ইপিক্যাক

২ ড্রাম, মিক্‌স্‌ য্যাগোনিয়েসাই ৬ আং । মিঃ, খাসকাসে আধ ছটাক পরিমাণে ৬ ঘণ্টান্তর

—————

উত্তেজক, বেদন ও আক্ষেপ-নিবারক বটিকা ।

১৩৯ ।—ক্যাম্ফর, মস্ক, য্যাসাফেটিডা প্রত্যেক ৩ গ্রেন, ওপিয়ম ১ গ্রেন, অয়েল এনিথি যথাপ্রয়োজন । একত্রে ২ বটিকা । গুল্ম-বায়ুরোগে ৩ ঘণ্টান্তর প্রযোজ্য ।

১৪০ ।—ক্যাস্টর ২০ গ্রেন, পল্ড ওপিয়াই ১ গ্রেন, ওলিয়াই মেসি পিপ যথাপ্রয়োজন । একত্রে ৬ বটিকা, গুল্মবায়ু রোগে প্রযোজ্য ।

১৪১ ।—ক্যাম্ফর ৮ গ্রেন, অয়েল ক্যাজিপুটী ৪ মিনিম, পল্ড ওপিয়াই ২ গ্রেন, একট্রাঃ হায়সায়ামাই ৬ গ্রেন । একত্রে ৪ বটিকা ।

১৪২ ।—অয়েল ক্রিঃ জোট ৪ মিনিম, পল্ড ওপিয়াই ২ গ্রেন, একট্রাঃ হায়সায়ামাই ৮ গ্রেন । একত্রে ৪ বটিকা ।

১৪৩ ।—সল্‌ফেট অব্‌ জিঙ্ক ৮ গ্রেন, একট্রাঃ বেলেডোনা ১ ০ বা ২ গ্রেন, একট্রাঃ জেন্সিয়ান যথাপ্রয়োজন । একত্রে ৮ বটিকা । গুল্মমেহ, হৃপিংকক আদি রোগে ব্যবহার্য্য ।

—————

উত্তেজক ও অবসাদক বাহ্যিকপ্রয়োগ—মর্দন ।

১৪৪ ।—লিনিঃ দেপোনিম্‌ কং ১১০ আং, টিং ওপিয়াই অর্ধ আং । মিঃ ।

১৪৫ ।—অয়েল ক্যাজিপুটী ১ ০ আং, টিং ওপিয়াই অর্ধ আং, লিনিঃ টেবিবিহিনি ২ আং । মিঃ ।

১৪৬। লিনিঃ ক্লোরোফর্ম ১ আং, লিনিঃ বেলেডোনা ১ আং মিঃ

১৪৭ —টিং ক্যাম্বেবাইডিগ অর্ধ আং, লিনিঃ ক্যাম্ফর, ১ আং, লাইকর এগোনিয়া ১ ড্রাম, টিং ওপিয়াম ৩ ড্রাম। মিঃ

১৪৮।—অমেল কোটন ১০ মিনিম, সোপ লিনিঃ ১ আং, টিং ওপিয়াম অর্ধ আং মিঃ

১৪৯ —টিং আর্গিকা ২ ড্রাম, টিং বেলেডোনা ১ আং, লিনিঃ সোপ ৮ আং। মিঃ

১৫০।—লিনিঃ হাইড্রার্জ ২ আং, লিনিঃ বেলেডোনা ও ওপিয়াম প্রত্যেকে ১ আং মিঃ, সিফিটিটিক টিউবকল্‌স ও নোডসেও মর্দন কর্তব্য।

১৫১ —অক্সুয়েঃ হাইড্রার্জ ১ আং, মিসিবিগ ১ আং আইসো ডিন ১২০ গ্রেণ, অয়েল অলিভ ২ আং মিঃ

১৫২।—লিনিঃ বেলেডোনা ও একোনাইট প্রত্যেকে ৪ ড্রাম, লিনিঃ ক্যাম্ফর ২ ৩ আং। প্লুগোডিনিয়া, পুবাওন বাত ও বেদনাদিতে মালিশ করিতে হইবে

১৫৩।—লিনিঃ ক্লোরোফর্ম, একোনাইট, বেলেডোনা ও ওপিয়াম প্রত্যেকে অর্ধ আং মিঃ, সানুশুদ ও বাতেব বেদনাতে মালিশ করিতে হইবে।

অবসাদক ও বেদনা নিবারণক ধৌত ।

১৫৪ —টিং একোনাইট ১।০ আং, জল ৪ আং। মিঃ, প্রবল বেদনাতে।

১৫৫ লাইকব মর্ফি হাইড্রোক্লোবাস ১০ আং, লাইকব পটাশ ২ ড্রাম, গ্লিসিবিং ১ আং, এবোয়া ব্রোমিনেসাই ১ আং, একোয়া স্ফাউকাই ৮ আং মিঃ, বণ্ডুয়ন নিবাবণার্থ ।

১৫৬ —এসিড্ এসিটীক ১০ ড্রাম, মর্ফি এসিটেটীম্ ১০ গ্রোণ, ভাইনাই কলচিসাই ৩ আং মিঃ, বাতরোগে লিষ্ট ভিজাইয়া ও যোজ্য ।

১৫৭ —টিং আর্গিকা ১—৬ ড্রাম, পবিস্কত জন ৮ আং । মিঃ ; অগ্নিদাহ, মট্ কান ও অন্যান্য আঘাতজনিত বেদনাতে দিবে ।

১৫৮ ।—বোবাক্স ২০০ গ্রোণ, মর্ফি হাইড্রোক্লোঃ ১০ গ্রোণ, গ্লিসিবিং ১ আং, বোজ জয়াটব ৮ আং । মিঃ ; বিবিধ চক্ষু-বোগে কণ্ডুয়ন নিবাবণার্থ ।

### অবসাদক অগ্নিধৌত ।

১৫৯ —এবধোঃ বেলোডোনা ৩ হইতে ১০ গ্রোণ, একট্রাঃ ওটিয়াই ২ হইতে ৩ গ্রোণ, মর্ফি হাইড্রোক্লো ১ বা ২ গ্রোণ ইহাদের অন্ততম, ও জন ১ আং মিঃ ।

১৬০ —এটলী সর্ক ১ গ্রোণ, পবিস্কত জন ৪ ড্রাম । মিঃ, কনানিবা পেসারিত চক্ষুগোলে ১২ সেন্টা চক্ষু নিঃ ৩ হয় । ইহাতে চক্ষুর বেদনাও নিবাবিত হয় ।

১৬১ ক ।—বোবেইন ৩৪ গ্রোণ, জন ১ আং গোশন ।



উত্তেজক, অবসাদক ও বেদনানিবারক বস্তু ।

১৬১ — টিং স্যামাফেটিডা অর্ক আং, টিং ওপিয়ম ১ আং, ডিঃ হর্ডিয়াই আদ পাইন্ট । মিঃ, উদরাখান ও আগানশুলে ব্যবহার্য্য

১৬২ ।— ক্যাফন ২০ গ্রেন, অয়েল টেরিবিবিনী ১ আং, ডিঃ হর্ডিয়াই আদ পাইন্ট । মিঃ, পুঙ্খোক্ত নোগে

১৬৩ — টিং ওপিয়ম ২০—৩০ মিনিম, ভাইনম ইপিক্যাক ৩০ মিনিম, মিউসিলেজ এমিলাই ২ আং । প্রথমে অল্প উষ্ণ জলের পীচকানি দ্বারা পাকার করিয়া, পরে ইহা প্রয়োজ্য উদরাময় ও পেট কামড়ানি ইত্যাদিতে ব্যবহার্য্য ।

১৬৪ ।— একট্রা ওপিয়াই লিকুই ২০ মিনিম হইতে ১ ড্রাম, টিং বেলডোনা ১৫—৩০ মিনিম, মিউসিলেজ এমিলাই ২ আং । জরায়ু ও মলদ্বারের ক্যান্সার বোগে প্রয়োজ্য ।

বেদনানিবারক সপোজিটরী ।

১৬৫ — জাইমোডোফ্যা ২—৬ গ্রেন, একট্রা কোনিগন ৪ গ্রেন ।

১৬৬ ।— পলুত ওপিয়াই ১—৩ গ্রেন, একট্রা বেলডোনা অর্ক গ্রেন, সাবান ১০ গ্রেন । মূত্ৰাশয় ও মলশয়ের পীড়ায় ব্যবহার্য্য ।

বলকারক, পর্য্যায়-নিবারক ও আশ্রয় মিশ্র ।

১৬৭ ।— কুইনী সল্ফ ১২ গ্রেন, টিং অরানসিয়াই ২ ড্রাম, ইনফিঃ রোজি এসিডাই ৬ আং । মিঃ ৬ অংশ ।

১৬৮ লাইকন আর্টিনিকের ম অঙ্ক ড্রাম, ডিঃ মিনকোলিন  
ফ্লোবী ও আং, মিঃ ১ ৫ অংশ।

১৬৯ —এমিড নাইট্রিক ডিঃ বা নাইট্রো উনিটারিক ডিঃ  
১ ড্রাম, ইনফিঃ ক্যানমা ১ আং মিঃ, ১ অংশ।

১৭০ —এমিড মার্শিয় উরিক ডিঃ ১ ড্রাম, ডিঃ মিনকোলিন  
ফ্লোবী ও আং। মিঃ, ১ বা ১ অংশ।

১৭১ —টিং ফেবি পানকোবাইড ২ ড্রাম ইনফিঃ কোমি-  
মিয়া ও আং। মিঃ, ১ অংশ।

১৭২ ফেরি এটুকুইনো সাইট্রম ৩ গ্রোণ, পিনা অনান-  
সিয়াই ও ড্রাম, একোমা সিনেমোমাই ৫ ০ আং মিঃ, ১ অংশ।

১৭৩ —ফেবি এটুকুইনো সাইট্রম ৩ গ্রোণ, এমিড নাইট্রিক  
হাইড্রোফ্লোরিক ডিঃ ৩০ মিনিম, লাইকন দ্যাবনিয়া ২০ মিনিম,  
ইনফিঃ কোমাসিয়া ও আং মিঃ, ১

১৭৪।—ফেরি এটুকুইনো সাইট্রম ৩০ গ্রোণ, এমিড নাইট্রিক  
বা নাইট্রো মিউরিএটিক ডিঃ ৩০ মিনিম, লাইকন ট্যাবাচাম ২  
ড্রাম, টিং কার্ডেনম কং ১ ড্রাম, ইনফিঃ ক্যানমা ১ আং। মিঃ, ১

১৭৫। টিং ফেবি পানকোবাইড ৩০ মিনিম, টিং আচমে-  
ডাই ও মিনিম, অল ও আং মিঃ, ১।

১৭৬ - টিং ফেবি পানকোবাইড ৩০ মিনিম, বুইনো ১ অংশ  
১৫ গ্রোণ, এমিড হাইড্রোফ্লোরিক ডিঃ ৩০ মিনিম, ইনফিঃ  
কোমাসিয়া ও আং মিঃ, ১।

১৭৬ ক। টিং ফেবি পানকোবাইড ৫ ড্রাম, বুইনো ১ অংশ  
৪০ গ্রোণ, মিনিরিং গিও ১ আং, জ। ৪ অংশ। ১ ড্রাম মিঃ  
২ বা ৩ বার সেব্য।

১৭৭।—ফেরি মল্ফ ১২ গ্রেণ; কুইনী মল্ফ ১২ গ্রেণ, এসিড্ মল্ফ ডিগ ১ ড্রাম, ম্যাগ্নেসিয়ামল্ফ ১ আং, একোয়া মেস্টিসিগ ৬ আং মিঃ, ঐ।

১৭৮ —ফেরি মল্ফ ১২ গ্রেণ, কুইনী মল্ফ ১২ গ্রেণ এসিড্ মল্ফ ডিগ্ ২০ গিনিম, লাইকর প্রীমিয়া ২০ গিনিম, ইনফিঃ ক্যালক ৬ আং মিঃ, ঐ।

১৭৯। ফেরি টাট ৩০ গ্রেণ, ইনফিঃ কোয়ামিয়া ৬ আং। মিঃ

১৮০ ফেরি এট্ এমোনি সাইটেটাম ৩০ গ্রেণ, স্পিঃ এসন ম্যানোমেটিক ৩ ড্রাম, ইনফিঃ কোয়ামিয়া ৬ আং মিঃ, ঐ।

১৮০ ক ফেরি এট্ এসন সাইটেটাম ২ ড্রাম, এসিড্ সাইটিক ৩ ড্রাম, জল ৮ আং। ৭টাশ বাইকার্ভ সহযোগে উচ্চপনাবস্থায় ব্যবহার্য।

১৮১ —ফেরি আইয়োডিডাই ২০ গ্রেণ, স্পিঃ মিনিষ্ট্রী ৩ ড্রাম, ইনফিঃ কোয়ামিয়া ৬ আং মিঃ, ঐ।

১৮২ —সিরপ ফেরি আইয়োডিডাই ৩ ড্রাম, সক্রম্ টারাকসেকম ৩ ড্রাম, টিং নক্স ভমিকা ৩০ গিনিম, ইনফিঃ ক্যালক ৫ ০ আং মিঃ, ঐ।

১৮৩ —এসন কার্ব ৩০ গ্রেণ, টিং ল্যাভেণ্ডার কং ১ আং, ইনফিঃ মিনকোনি ফ্লেবো ৭ আং। মিঃ, ২ আংশ।

১৮৪।—এসন্ কার্ব ৩০ গ্রেণ, টিং একোনাইট ২০ গিনিম, টিং মিনকোনা কং ৬ ড্রাম, একোয়া মেস্টিসিগ ৮ আং। মিঃ, ঐ।

১৮৫ —স্পিঃ এসন ম্যানোমেটিক ৪ ড্রাম, একষ্ট্রাঃ মিনকোনি ফ্লেবো লিকুইঃ ১ ০ ড্রাম, টিং রিগ্রাই ৪ ড্রাম, ইনফিঃ



সিয়াই ৮ আং মিঃ ৬ অংশ দিনে ২৩ বার। কোষ্ঠবদ্ধ সহ  
স্বাস্থ্যবদী অবসরভাৱে প্রয়োজ্য

১৮৬ লাইকর পটাশ ৩ ড্রাম, টিং সিনকোনা কং ৬  
ড্রাম, ডিঃ সিনকোনি ৮ আং। মিঃ ৬ অংশ দিনে ২৩ বার।  
লিখিক গ্যাসিড্ ডায়াগনিসিসের সহিত দুৰ্বলতা থাকিলে

১৮৭।—ফেবি ফল্‌স ৪০ গ্রেণ, এসিড্ ফল্‌স ১০  
ড্রাম, সিরপ অরানসিয়াই ১ আং, মিউসিলেজ ৮ আং। মিঃ  
৬ অংশ।

১৮৮ —ফেবি এট্‌ এমন্ সাইট্‌স্ ৪০ গ্রেণ, লাইকর ট্রীকনিয়া  
১ ড্রাম, ইনফিঃ কোয়াসিয়া ১০ আং। মিঃ ৬ অংশ।

১৮৯ —টিং ফেবি পারক্লোবাইড্ ১০ ড্রাম, পটাশী ক্লোবাস  
১২০ গ্রেণ, লাইকর আর্সিনিকেলিস ১৫ মিনিগ, জল ৮ আং।  
মিঃ ৬ অংশ দিনে ৩৪ বার। উপদংশিক বওহীনতা, চর্মপীড়া,  
ও বিসর্প ইত্যাদিতে ব্যবহার্য।

১৯০ —টিং ক্যাথোডাইডিস্ ১০ ড্রাম, গ্লিসিবিণ্ ১ আং,  
মিঃ ফেবি কং ৮ আং। মিঃ, জননেদ্রিমের দুৰ্বলতাতে ব্যব-  
হার্য মাত্রা ১ আং

১৯১ —ভাইনাই ফেবি ২ আং, লাইকর আর্সিনিকেলিস ৬  
২০ মিনিগ, সিবপ ডিঞ্জব ২ আং, ইনফিঃ কোয়াসিয়া ৪ আং  
মিঃ ৬ অংশ

১৯২ পটাশী আইয়োডিড্ ৩—৫ গ্রেণ, গ্লিসিবিণ্ ২  
ড্রাম, ভাইনাম ফেবি ৪ ড্রাম, ওলিয়াম মর্হি ৬ ড্রাম মিঃ, এক-  
মাত্রা, দিনে ২ বার পুষ্কাতন বাত, গৌণিক উপদংশ, গণ্ড-  
মাণ্ডীম চর্মপীড়া প্রভৃতিতে ব্যবহার্য

১৯৩।—কুইনী সল্ফ ১২ গ্রেণ, এসিড নাইট্রিক ডিগ ২০  
মিনিম, টিং সিনকোনা কং ২ ড্রাম, টিং কার্ভেমম কং ২ ড্রাম,  
ডিঃ সিনকোনা ৫ ০ আং মিঃ, ৬ অংশ

১৯৪ —কুইনী সল্ফ ১২ গ্রেণ, এসিড্ নাইট্রিক ডিগ ৩০  
মিনিম, টিং সিনকোনা কং ২ ড্রাম, ভাইনম কক্সম ১ ০ আং,  
ডিঃ সিনকোনা ৪ ০ আং । মিঃ, ৬ ।

### বলকারক, পর্যায় নিবারক ও অগ্নেয়— বটিকা ।

১৯৫ কুইনী সল্ফ ১৮ গ্রেণ, একষ্ট্রাঃ নক্সভগিকা ৩  
বা ৪ গ্রেণ, একষ্ট্রাঃ জেন্সিয়ান ৩৫ গ্রেণ একত্রে ১২ বটিকা  
দুর্লভতা ও বোটেবাক ।

১৯৬ —কুপ্রাই সল্ফ ৩ গ্রেণ, পিল্ সেপোনিম কং ১৫ গ্রেণ,  
একষ্ট্রাঃ ক্যালম ১৫ গ্রেণ একত্রে ১২ বটিকা

১৯৭।—জিন্সাই সল্ফ ২৪ গ্রেণ, একষ্ট্রাঃ কোয়ামিয়া ২৪  
গ্রেণ, একত্রে ১২ বটিকা ।

১৯৮।—জিন্সাই ভেনিবিয়ানাস ২৪ গ্রেণ, একষ্ট্রাঃ জেন্সিয়ান  
বা এন্থিমিডিস্ ২৪ গ্রেণ একত্রে ১২ বটিকা

১৯৯ —নেবি আইয়োডিড্ ৩৬ গ্রেণ, একষ্ট্রাঃ ক্যালম ২৪  
গ্রেণ । একত্রে ১২ বটিকা

২০০ —জিন্সাই সল্ফ ২৪ গ্রেণ, একষ্ট্রাঃ একোনাইট ১২  
গ্রেণ, একষ্ট্রাঃ কোয়ামিয়া ২৪ গ্রেণ । একত্রে ১২ বটিকা ।  
স্নায়ুশূল, সহ জগ্জাব এবং কটিবাত ইত্যাদিতে ব্যবহার্য্য

২০১।—কুইনী সল্ফ ১২ গ্রেণ, ফেবি ল্যাক্টাস ১২ গ্রেণ, একষ্ট্রাঃ জেনসিয়ান মথাপ্রয়োজন একত্রে ১২ বটিকা।

২০২ —আর্জেন্টাই নাইট্‌স ৬০ গ্রেণ, একষ্ট্রাঃ হায়সায়ামাস ৩৬ গ্রেণ। একত্রে ১৫ বটিকা।

২০৩।—বিস্মথাই ম্যাগাই ৩০ গ্রেণ, একষ্ট্রাঃ হায়সায়ামাস ৩০ গ্রেণ। একত্রে ১২ বটিকা।

২০৪ ফিবম বিউকটম ৩০ গ্রেণ, গিল এলোজ এট মথ ২৪—৪০ গ্রেণ, একষ্ট্রাঃ নক্সভমিকা ৪ গ্রেণ। একত্রে ১২ বটিকা। কোষ্ঠবদ্ধ সহ রক্তহীনতা থাকিলে ব্যবহার্য।

২০৫ —ফিবম বিউকটম ৪০ গ্রেণ, জিন্সাই ভেলিবিয়ানাস ২০ গ্রেণ, স্ট্রীকনিয়া ১ গ্রেণ, মিসিবিণেব সঙ্গে উত্তনধপে মিশাইয়া ২৪ বটিকা।

### বলকারক, পর্যায় নিবারক ও আর্শেয় চূর্ণ।

২০৬। ফিবম বিউকটম ৩ গ্রেণ, পল্ডা ম্যাবোমেটীক ৫ গ্রেণ। একত্রে ১ পুরিয়া।

২০৭ —ফেবি ফফেটীস ৩ গ্রেণ, পল্ডা ম্যাবোমেটীক ৫ গ্রেণ, পল্ডা ক্যালম্বা ও জিঞ্জব প্রত্যেকে ৩ গ্রেণ একত্রে ১ পুরিয়া।

২০৮। ফেবি ল্যাক্টাস ১২ গ্রেণ, কুইনী সল্ফ ৬ গ্রেণ, পল্ডা ক্যালম্বা ১২ গ্রেণ। একত্রে ৪ পুরিয়া।

২০৯ —ফেবি সল্ফ ১২ গ্রেণ, কুইনী সল্ফ ১২ গ্রেণ, জিঞ্জব ১২ গ্রেণ। একত্রে ৬ পুরিয়া।



২১০ —কুইনী সল্ফ, পল্ভ রিয়াই, জেলাপ, ক্যান্থা ও  
জিঞ্জব প্রত্যেকে ১২ গ্রেণ এবজে ৬ পুনিয়া।

### সংকোচক মিশ্র।

২১১।—গ্যালিউমিনিস্ ৫০ গ্রেণ, সিবপ প্যাপেভেরিস্ ১ আং,  
ইনফিঃ রোজি এসিডাই ৫ আং। মিঃ, ৬ অংশ।

২১২ —এসিড সল্ফ ডিল ৪ ড্রাম, ইনফিঃ রোজি এসিডাই ৬  
আং, সিবপ প্যাপেভেরিস ২ আং, জল ১২ আং মিঃ, পানীয়  
রূপে প্রযোজ্য।

২১৩ —এসিড্ নাইটো হাইড্রোক্লোরিক ডিল্ ২ ড্রাম, টিং  
বাইনো ৫ ড্রাম, ইনফিঃ ইউভা অবমাই ৫ আং মিঃ, ৬ অংশ।

২১৪ —মিষ্টিউরা ক্রিটা ৭ আং, সিবপ প্যাপেভেরিস ১ আং  
মিঃ, ৬ বা ৬ অংশ প্রতিবার তবল মলত্যাগের পর সেবা

২১৫।—পল্ভ ম্যানোমেটিক ২ ড্রাম, টিং ওপি যাই ৩ ড্রাম, মিঃ  
ক্রিটা ৬ আং। মিঃ, ৬।

২১৬ —এসিড ট্যানিক ৩০ গ্রেণ, এসিড নাইটিক ডিল্ ১ ড্রাম,  
টিং হপ্ ৪ ড্রাম, ইনফিঃ জেনসিয়ান ৮ আং মিঃ, ৬ অংশ।

২১৭।—অয়েল টার্পেন্টাইন ১০ —২০ মিনিম, মিষ্টিউরা ম্যামিগ্-  
ডেলি বা মিউসিমোজ একেসিয়া ১ আং ১ মাত্রা, বক্তৃতিতে  
ব্যবহার্য।

২১৮ এসিড্ ট্যানিক ৩০ গ্রেণ, এসিড্ সল্ফ ডিল ২ ড্রাম,  
ইনফিঃ কোয়াসিয়া ৬ আং। মিঃ, ৬ অংশ।

২১৯ —লাইকর ফেরি পারনাইটোটস ১ ড্রাম, সিবপ অরান-  
সিয়াই ফ্লোরিস ৩ ড্রাম, জল ৫১০ আং মিঃ, ৬

২২০।—সিরপাই রোজি গ্যালিস্ট ১ আং, ইনফিঃ কাটিকিউ ৫ আং। মিঃ, ঐ।

২২১ —এসিড্ ট্যানিক্ ১৮ গ্রেণ, টিং ওপিয়ম ৩০ মিনিম, ইনফিঃ বোজি এসিডাই ৬ আং। মিঃ, ঐ।

২২২ —টিং ক্রাসিসিয়া ১ আং, ডিঃ হিমেট্ বসিলাই ৫ আং। মিঃ, ঐ।

২২৩।—টিং মিনেমোমাই ৬ ড্রাম, এসিড্ নাইট্রিক্ ডিল্ ২ ড্রাম মিঃ, ইহার ৩০ ফোটা ১ ছটাক জলে মিশাইয়া ২ ঘণ্টাস্তব সেবা।—বিবিধ প্রকার রক্তস্রাবে উপকারক।

২২৪ —বিসমথ্ ৫ গ্রেণ, টিং সিনকোনা কং ৩০ মিনিম, টিং কাইনো ১ ড্রাম, টিং ওপিয়ম ৫ মিনিম, ইনফিঃ অবানসিয়াই ১ আং। মিঃ, একমাত্র।

### সংকোচক-বটিকা।

২২৫ —পাইলিউলী প্লম্বাই কম্ ওপিয়ো ২৪ গ্রেণ, কনফেক্সন রোজ ২৪ গ্রেণ। একত্রে ১২ বটিকা।

২২৬ —এসিড্ গ্যালিক ৩ গ্রেণ, প্লম্বাই এসিটাস ১ গ্রেণ, মিউসিলেজ একেসিয়া যথা প্রয়োজন। একত্রে ১ বটিকা।

২২৭।—এসিড্ গ্যালিক ২।০ গ্রেণ, মর্ফিয়া ১/২ গ্রেণ, কনফেক্সন অব্ রোজ যথা প্রয়োজন, একত্রে ১ বটিকা।

২২৮ —প্লম্বাই এসিটাস ১ গ্রেণ, পিল সোপানিস কম ওপিয়ো ২ গ্রেণ। একত্রে ১ বটিকা।

২২৯।—জিন্সাই সল্ফ ২ গ্রেণ, পল্ড ওপিয়াই ১/২ গ্রেণ, একট্রাঃ রিয়াই ৩ গ্রেণ। একত্রে ১ বটিকা।



২৩০।—কুপ্রাই মল্ফ, একষ্ট্রাঃ ওপিয়াই প্রত্যেকে  $\frac{1}{2}$  গ্রেণ, একষ্ট্রাঃ জেনসিয়ান ৩ গ্রেণ, এবল্ডে ১ বাটকা দুর্দমা উদরাময়ে দিনে তিন বার সেবা

### সংকোচক-চূর্ণ ।

২৩১।—পল্ভ সিনকোনি প্যাগিডী ৪০ গ্রেণ, এসিড গ্যালিক ১০ গ্রেণ একত্রে ২ পুরিয়া ।

২৩২।—পল্ভ ক্রিটী স্যারোমেটিক্‌ কন্‌ ওপিয়ো ১০ গ্রেণ, পল্ভ ক্যাটিকিউ কন্‌ ১০ গ্রেণ । একত্রে ১ পুরিয়া ।

২৩৩।—এসিড গ্যালিক ১২ গ্রেণ, পল্ভ ইপিক্যাক কন্‌ ওপিয়ো ৫ গ্রেণ । একত্রে ১ পুরিয়া ।

২৩৪।—বিসমথ্‌ ১০ গ্রেণ, পল্ভ ইপিক্যাক কন্‌ ওপিয়ো ৫ গ্রেণ, ট্যানিক এসিড ৫ গ্রেণ একত্রে ১ পুরিয়া ।

২৩৫।—বিসমথ্‌ ১৫ গ্রেণ, একেসিয়া পাউডর ১৫ গ্রেণ, পল্ভ ইপিক্যাক ৩ গ্রেণ, মর্ফিয়া  $\frac{1}{2}$  গ্রেণ একত্রে ৩ পুরিয়া ।

### সংকোচক ধৌত ।

২৩৬।—আর্জেন্টাই নাইট্রস ২ হইতে ২০ গ্রেণ, পরিষ্কৃত জল ১ আং মিঃ ।

২৩৭।—লাইকর ক্যালসিন্‌ ১ আং, অনিভ অয়েল ২ আং । মিঃ, অগ্নিদগ্ধ ক্ষতে প্রযোজ্য ।

২৩৮।—কুপ্রাই মল্ফ ৩ হইতে ২০ গ্রেণ, জল ১ আং মিঃ

২৩৯।—এসিড ট্যানিক ১০ গ্রেণ, এসিড হাইড্রোক্লোরিক ডিম অর্ধ ড্রাগ্‌, জল ১ আং মিঃ

২৪০ —লাইকর প্লম্বাই সব এসিটেটস ২০ মিনিম, গ্লিসেরিন  
১ ড্রাম, বোজ ওয়াটার ৭ ড্রাম মিঃ

২৪১।—লাইকর প্লম্বাই সব এসিটেটস ১০ হইতে ৩০ মিনিম,  
স্প্রিং সেকটীফায়েড ৩০ মিনিম জল ৭ ড্রাম মিঃ।

২৪২।—জিন্সাই সল্ফ ১৬ গ্রেন, জল ৮ আং, বিবিধ প্রকার  
ফতে

২৪৩ —৭ টানী ক্লোরাম ৮০ গ্রেন, জল ৮ আং, মিঃ দুই ফতে  
প্রয়োজ্য।

২৪৪ —জিন্সাই সল্ফ ৮ গ্রেন, লাইকর প্লম্বাই সব এসিটেটস  
১০ ড্রাম, জল ৮ আং। মিঃ, লামেহ রোগে পীচকারি দেওয়াব  
জন্ত ব্যবহার করা যাইতে পারে।

২৪৫।—গ্যালানম ১৬ গ্রেন বা প্লম্বাই এসিটাস ২৪ গ্রেন, জল  
৮ আং মিঃ (ঐ)

### সংকোচক বস্তু।

২৪৬।—ম্যালিউমিনিস্ ৫০ গ্রেন, ডিঃ কোয়ার্কস্, ১ পাইন্ট মিঃ।

২৪৭।—আর্জেন্টাই নাইট্রস ১০ গ্রেন, এসিড নাইট্রিক ডিল  
২ মিনিম, জল ১ আং মিঃ।

২৪৮।—লাইকর ফেরি পাবক্লোরাইড ৩ মিনিম, জল  
১ আং। রক্তপ্লাবে প্রয়োজ্য

২৪৯।—ওলিয়াই টেবিবিহিনী ৩০ মিনিম, টিং কাইনো ২ ড্রাম,  
একট্রাঃ ওলিয়াই লিকুই ২৫ মিনিম, মিউসিলেজ গ্যামিলাই ২ আং।  
মিঃ।

### সংকোচক অক্ষিধৌত ।

২৫০।—ম্যাগ্নিউমিনিম ৩ হইতে ১০ গ্রেণ, আর্ডে'টাই নাই-ট্রস ১—২ গ্রেণ, কুপ্রাই সল্ফ ১—৩ গ্রেণ, পম্বাই এসিটাস ২—৩ গ্রেণ হাইড্রাজ' কবোসিব সল্লিমেট ১½ হইতে ২½ গ্রেণ, বোবিক এসিড ৩—৮ গ্রেণ, ইহাদেব অশ্রুতম, জল ১ আং মিঃ, যেযোক্তে ছইটী সচরাচর ব্যবহৃত হয় ।

২৫১ —জিন্সাই সল্ফ ১ ৫ গ্রেণ, ভাইনাই ওপিয়াই ১ ড্রাম, জল ১ ডাম মিঃ

২৫২ —টিং আনিকা ৫—৩০ মিনিম, বা দাইকব পম্বাই সব এসিটেটাস ১০ মিনিম, জল ১ আং মিঃ ।

২৫৩।—পটাশী আইয়োডিড ৬—৮ গ্রেণ, জল ১ আং মিঃ, কষ্টিকেব দাশ থাকিবা গেলে তাহা তুলিতে ব্যবহার্য্য

২৫৪ —ম্যাগ্নিম ২—৬ গ্রেণ, জিন্সাই সল্ফ ১ বা ২ গ্রেণ, জল ২ আং মিঃ

### সংকোচক কবল ।

২৫৫ —ম্যাগ্নিউমিনিম ৬০ গ্রেণ, এসিড সল্ফ এনোমেটিক অর্ক ডাম, টিং মব ২ ড্রাম, ডিঃ সিনবোনা ৬ আং মিঃ

২৫৬ —এসিড ট্যানিক ৫০ গ্রেণ, প্রিঃ রেকটিফায়েড অল আং, ক্যাম্ফর ওয়াটার ৫ ০ আং উত্তেজক ও সংকোচক

২৫৭ —দগ্গ ম্যাগ্নিম ৮০ গ্রেণ, টিং মব ১ আং, জল ৮ আং মিঃ, পারদজনিও লাদাআবে এবং মুখ ও কণ্ঠ ক্ষতে ব্যবহার্য্য ।

২৫৮ বোবাজ ১৬০ গ্রেণ, টিং মব ১ আং, জল ৮ আং মিঃ, মুখগহ্বরের ক্ষতে প্রয়োজ্য



২৫৯।—জিন্সাই সলফ ২০ গ্রেণ, সিরপ মোরাই ৪ ড্রাম, মিসিরি ১ আং, ইন্ফিঃ ক্রাগিরিয়া ৮ আং মিঃ

২৬০ টিং আইয়োডিন ২ ড্রাম, জল ১২ আং। মিঃ, পারদজনিত লালানাবে

### সঙ্কোচক মলম

২৬১ —আর্জেন্টাই নাইট্রস ২০ গ্রেণ, এডিপিস ১ আং উপদংশে ব্যবহার্য।

২৬২ —এসিড সলফিউরিক অর্ধ ডাম, এডিপিস ১ আং

২৬৩।—চক ১ আং, অলিভ অয়েল ১ ডাম এডিপিস অর্ধ আং। অগ্নি ও অভ্রাঘ জলদাহে

২৬৪ —কুপ্রাই সলফ ৩০ গ্রেণ এডিপিস ১ আং

২৬৫ —হাইড্রোজ কবোসিব সলিমেট ৫ গ্রেণ, বা ক্যালোমেল ১৫ গ্রেণ, এডিপিস ১ আং; উপদংশে।

২৬৬ —লাইকব প্লমাই সব এসিটেটস ১ ড্রাম, এডিপিস ১ আং

### অবসাদক মিশ্র

২৬৭ —ভাইনাই এন্টিমোনিয়োস ৪ ড্রাম, ৮ বিস্কৃত জল ৫ ০ আং মিঃ ( ১ )

২৬৮।—টিং লোবিলিয়া ২ ড্রাম, একোয়া এনিথি ২ আং, জল ৪ ০ আং মিঃ ( ১ )

২৬৯।—টিং ডিজিটেটিস ২ ড্রাম, একোয়া সিনেমোমাই ২ আং, জল ৬ আং মিঃ ( ১ )

২৭০।—এসিড হাইড্রোগেনিক ডিগ অর্ক ড্রাম, মিটিউরা  
গ্রামিগডেলী ৬ আং। মিঃ ( ১ )

২৭১। ভাইনম ইপিক্যাক ৩ ড্রাম, একোয়া মিনেমম ১  
আং, জল ৪ ০ আং মিঃ ( ১ )

২৭২।—টিং একোনাইট ৩ ৫ গিনিম, জল ১ আং মিঃ  
একমাত্রা

### অবসাদক চূর্ণ ।

২৭৩।—এন্টিম টার্ট ১ গ্রেণ, শর্করা ৩১ গ্রেণ, একত্রে ৪  
বা ৬ পুরিয়া। নিশুদের প্রাদাহিক পীড়ায় বসমান্নসাবে মাতা  
বিবেচনা করিয়া দিতে হইবে।

২৭৪ —এন্টিম টার্ট ১ গ্রেণ, পল্ড ইপিক্যাক ২০ গ্রেণ  
৮ পুরিয়া, দিনে ৩ ৩ বার

২৭৫ —এন্টিম টার্ট ১ গ্রেণ, হাইড্রার্জ কম ক্রিটা ১২ গ্রেণ,  
শর্করা ৬০ গ্রেণ। একত্রে ৮ পুরিয়া দিনে তিন চারি বার।  
প্রাদাহিক চর্ম-পীড়া ও নিশুদের বায়নপীড়ায় প্রদাহে বাব-  
হার্য্য

### বমনকারক ।

২৭৬।—পল্ড ইপিক্যাক ২০ গ্রেণ, ভাইনাই এন্টিমোনি-  
য়েলিস ৪ ড্রাম, সিংগ প্যাপেভেবিস ২ ড্রাম, একোয়া মেছি পিপ  
১ ০ আং। মিঃ, ইহাতে এক বা দুই মাত্রা হইবে।

২৭৭।—জিনাই সলফ ২০—৪০ গ্রেণ, একোয়া মিনেমোমাই  
১ আং। মিঃ, ১

২৭৮ —কুপ্রাই মলক ১০ গ্ৰেণ, জল ১০ আং । ঐ

২৭৯ —গষ্টার্ড পাউডর ৪ ড্রাম, জল ৪ আং বিষ পানের পর  
ব্যবহার্য্য । ঐ

২৮০ ।—এমোনি কার্ব, পলভ ইপিক্যাক ৭০ ভোবে ২০ গ্ৰেণ,  
টিং ক্যাপসিকম ২ ড্রাম, একোয়া মেসি পিপ ২ আং । মিঃ,  
পাকামোব বোধ\*জিহীনতা ( অহিফেন দ্বারা বিষাক্ত হইলে যেরূপ  
হয় ) হইবে ইহা প্রযোজ্য

২৮১ —এন্টিমোনিয়াই টাট ১ গ্ৰেণ, পলভ ইপিক্যাক ২০  
গ্ৰেণ । একত্রে ১ পুবিয়া মধুর সহিত সেব্য ।

### স্বেদজনক ও শৈত্যকারক মিশ্র ।

২৮২ ।—লাইকর এমোনিয়া এসিটেটিস্ ৫—৬ ড্রাম, মিরপ  
অবান্সিয়াই ৪ ড্রাম, জল ৩ আং মিঃ ( ৬ )

২৮৩ —পটাশী নাইট্রেটিস্ ৫০ গ্ৰেণ, ভাইনাই এন্টিমোনি-  
য়েলিস ২ ড্রাম, লাইবর এমোনিয়া এসিটেটিস ৪ ড্রাম, একোয়া  
মেসি পিপ ৫ আং মিঃ, ( ৬ )

২৮৪ ।—প্রিঃ ইথরিস নাইটোসাই ৩ আং, লাইকর এমো-  
নিয়া এসিটেটিস ১ আং, মিরপাই হেমিডিস্‌মাই ১ আং, জল ৪  
আং । মিঃ ( ৬ )

২৮৫ ।—পটাশী নাইট্রেটিস ৪ ড্রাম, টিং ওপিয়াই ১১০ ড্রাম,  
গষ্টিউরা ম্যাগিগ্ৰুডেলী ৭ আং । মিঃ ( ৬ )

২৮৬ —টিং গোয়েমাই এমোনিমেটা ১ আং, টিং ওপিয়াই  
ড্রাম, একোয়া পাইমেণ্টা ৭ আং মিঃ, পুরাতন বাতে ব্যব-  
হার্য্য । মাত্রা ১ আং



২৮৭।—পটাসী নাইট্রেটস বা সাইট্রেটস ১২০ গ্রেণ, ভাই-  
নাই ইপিক্যাক ১ ০ ড্রাম, সিবপ হেমিডিস্‌গিস্ ১ আং, ডিঃ হর্ডি-  
য়াই ১ পাইন্ট মিঃ, ১ বা ২ ছটাক মাজায় ২১৩ ঘণ্টান্তর মার্জি  
ও গলা বেদনাদিতে ব্যবহার্য্য ।

২৮৮ পটাসী সাইট্রেটস ১২০ গ্রেণ, লাইকর এসোনিয়া  
এসিটেটস ৪ হইতে ৮ ড্রাম, স্পিঃ স্যামোনিয়া এরোমেটিক ৩ ড্রাম,  
টিং একোনাইট ১০ মিনিম, জল ৮ আং । মিঃ, ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ  
( নিউমোনিয়া ) ও অন্যান্য তরুণ প্রদাহে ব্যবহার্য্য ।

২৮৯ —পটাসী নাইট্রেটস ৩০—৬০ গ্রেণ, স্পিঃ ইথরিস নাই-  
ট্রোসাই ৩ ড্রাম, লাইকর এসোনিয়া এসিটেটস ৪ হইতে ৮ ড্রাম,  
একোয়া ক্যাম্ফর ৮ আং মিঃ, ১ । ৩৪ ঘণ্টান্তর জরাদিতে  
ব্যবহার্য্য ।

২৯০।—সোডী বাইকার্ব ২০ গ্রেণ, একোয়া লবোসিরেসাই  
১০ মিনিম, সিবপ অরানসিয়াই ১ ড্রাম, একোয়া ১ ০ আং ।  
মিঃ, ১৮ গ্রেণ সাইট্রিক এসিড্ সত্ত্ব পাत्रে দ্রব করিয়া  
ও ইহার সহিত মিঃ ইয়া উচ্ছলনাবস্থায় প্রযোজ্য । জরেব সঙ্গে  
বিবমিয়া থাকিলে ব্যবহার্য্য ।

২৯১ —সোডি কোরাইড ২০ গ্রেণ, পটাসী কোরাস ৭ গ্রেণ,  
সোডি কার্ব ৩০ গ্রেণ, জল ১ ০ আং মিঃ, একমাত্র । বিষটিকা  
রোগে অর্ধ ঘণ্টান্তর প্রযোজ্য

২৯২।—পটাসী বাইকার্ব ১২০—১৪০ গ্রেণ, সিবপ লিমন  
১ আং, জল ২ পাইন্ট সমস্ত দিনে সেব্য । তরুণ বাত ও  
ইউরিক এসিড ডায়াথিসিসে উপকারী ।

২৯৩।—পটাসী টার্ট এসিড ১ আং, অয়েল লিমন ১৫ মিনিম,

শর্করা ২ আং, উষ্ণ জল ২ পাইন্ট। জরের সহিত পিণ্ডাসা ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ইহা উত্তম নৈত্যপানীয়

২৯৪ —এসিড হাইড্রোক্লোরিক ডিল ২—৩ ড্রাম, পটাসী ক্লোবাস ১৮০ গ্রেণ, সিরপ জিঞ্জর ১ আং, ডিঃ হর্ডিয়াই ১ পাইন্ট। মিঃ, জবে পানীয়ার্থ ব্যবহার্য

২৯৫ —এসিড ফসফরিক ডিল ৩ ড্রাম, গ্লিসেরিন ১ আং, ডিঃ হর্ডিয়াই ৩ পাইন্ট মিঃ, সায়বীয় দোর্সুয়া ও গ্যুমেহ রোগে তৃক্ষা নিবারণার্থ প্রয়োজ্য

২৯৬ —পটাসী ক্লোবাস ১ আং, পটাসী বাইকার্ব ২ হহতে ৪ আং, একত্রে মিলাইয়া ৮ পুরিয়া। ইহার এক বেকটা ১ পাইন্ট বালি ওয়াটারেব সঙ্গে তরল বাত বোলে সমস্ত দিনে সেবা

### শ্বেদজনক ও নৈত্যকারক চূর্ণ

২৯৭।—পল্ভ ইপিক্যাক কম্ ওপিয়ো ৮ গ্রেণ, এন্টিগটাট ১ গ্রেণ একত্রে ৬ পুরিয়া।

২৯৮ পল্ভ ইপিক্যাক ১ গ্রেণ, পল্ভ এন্টিগোনিয়েলিস ১০ গ্রেণ, শর্করা ৬ গ্রেণ এববে ছই বা তিন পুরিয়া।

২৯৯ —পল্ভ এন্টিগোনিয়েলিস ৯ গ্রেণ, সোডি বাইকার্ব ১২ গ্রেণ, ইপিক্যাক ১ গ্রেণ, জিঞ্জর ৩ গ্রেণ একত্রে ৩ পুরিয়া।

৩০০ —পটাসী ক্লোরেট ২০ গ্রেণ, সোডি বাইকার্ব ২০ গ্রেণ, পটাসী ক্লোরেট ২০ গ্রেণ, সোডি বাইকার্ব ১০ গ্রেণ, জিঞ্জর ৪ গ্রেণ। একত্রে ৪ পুরিয়া।



কফ-নিঃসারক মিশ্র ।

৩০১ এমোনি কার্ব ৩০ গ্রো, স্ত্রি ক্লোবোফর্ম ২ ড্রাম, ডিঃ সেনেগী ৫ ০ আং । মিঃ, ( ৬ )

৩০২ ব্যাঃসম পের ৬ ড্রাম, গিমিবিণ ৬ ড্রাম, মিষ্টিউরা য্যামিগডেলি ৪ ০ আং মিঃ, ( ৬ ) ।

৩০৩।—এমোনি সেনজোয়াম, এমোনি কার্বনাম প্রত্যেক ৩০ গ্রো ভাইনম ইপিক্যাক ১ ড্রাম, ডিঃ সেনেগী ৬ আং । মিঃ, ( ৬ ) ।

৩০৪ —ভাইনম ইপিক্যাক ১ ড্রাম, সিবপ প্যাপেভেরিস ৬ ড্রাম, স্পিবিট এমোনি এরোমেটীক ৩ ড্রাম, ক্যাম্ফর ওয়াটার ৫ আং মিঃ, ( ৬ )

৩০৫ সিবপ সিলি ৪ ড্রাম, মিকঃ এমোনিয়েসাই ৫ ০ আং মিঃ, ৬

৩০৬ —সিবপ সিলি ৬ ড্রাম, লাইকব এমোনিয়া এসিটেটস ৬ ড্রাম, ডিঃ সেনেগী ৪ ০ আং মিঃ, ৬

৩০৭ —টিং ক্যাম্ফর কম্ ওপিথো ৪ ড্রাম, টিং লোবিগী ইথিরিয়া ১ ০ ড্রাম, সিবপ টলুটেনাই ১ আং, মিষ্টিউরা এমোনিয়েসাই ৪ আং মিঃ ( ৬ ) ।

৩০৮ —ভাইনম এন্টিমোনিয়েলিস সিকি আং, লাইবর এমোনিয়া এসিটেটস অর্ধ বা এক আং, অকুমিগল সিলি ১ আং, জল ৬ আং মিঃ ৮ অংশ

৩০৯।—ভাইনম ইপিক্যাক ৪ ড্রাম, পটানি বাইকার্ব ১০০ গ্রো, জল ৫ ০ আং । মিঃ, ৬ অংশ এক বা দুই কাঁচা জন্ধীর রসের সঙ্গে ব্যবহার্য

৩১০ — এমোনি কার্ব ৩০ গ্রেণ, স্প্রিঃ ইথরিস ৩ ড্রাম, টিং  
মিলি ১ ০ ড্রাম, স্ট্রিং ক্যাম্ফর কম ওপিয়ো ২ ৪ ড্রাম, টিং  
ল্যাভেণ্ডার কং ৪ ড্রাম, ইনফিঃ সেনেগা ৮ আং মিঃ, বৃদ্ধ-  
লোকদেব পুলাতন বায়ুনলাভুজ প্রদাহে ১ অংশ

৩১১ — স্প্রিঃ এমোনি এরোমেটিক ৪ ড্রাম, স্প্রিঃ ক্লোবো-  
ফর্ম ৩ ড্রাম, টিং বাইওনিয়া ৩ মিনিম, টিং সেনেগা ৬ ড্রাম,  
ক্যাম্ফর ওয়াটর ৮ আং মিঃ ১ অংশ, ৪ ৬ ঘণ্টাস্তব, বায়  
নগীভুজ প্রদাহে

৩১২ ভাইনগ ইপিক্যাক ২ ড্রাম, সিৰপ হেমিডিসমিস  
১ আং, ইনফিঃ লিনাই ৮ আং মিঃ, সর্দিতে ১ অংশ ।

৩১৩ টিং মিলি ১ ০ ড্রাম, একষ্ট্রাঃ ওপিয়াই লিকুইঃ  
২০ ৩০ মিনিম, সিৰপ টনু ৬ ড্রাম, মিষ্টিউবা এমোনিয়েসাই  
৬ আং মিঃ, ১ অংশ

### কাঃ নিঃসারক বটিকা ।

৩১৪ এন্টিম টার্ট এক গ্রেণেব আর্টিভাগের একভাগ,  
পল্ড ইপিক্যাক কম ওপিয়ো ৮ গ্রেণ, মিউসিলেজ একেসিয়া  
দ্বারা ২ বটিকা

৩১৫ । পিল্ মিলি কং, একষ্ট্রাঃ কোনিয়াই প্রত্যেকে ২৪  
গ্রেণ একত্রে ১২ বটিকা ।

৩১৬ ।—পল্ড মিলি, পল্ড ইপিক্যাক প্রত্যেকে ১০ গ্রেণ,  
একষ্ট্রাঃ কোনিয়গ ২৪ গ্রেণ একত্রে ১০ বটিকা

৩১৭ —পল্ড মিলি, পল্ড ইপিক্যাক প্রত্যেকে ১২ গ্রেণ,  
একষ্ট্রাঃ ষ্ট্রামোনিয়াই ৩ গ্রেণ । একত্রে ১২ বটিকা

৩১৮।—ক্যাম্ফর ১২ গ্রেণ, একষ্ট্রাক্ট হায়মায়ামাস ১২ গ্রেণ  
একত্রে ৬ বটিকা ।

### কফ-নিঃসারক চূর্ণ ।

৩১৯।—এন্টিম টাট ১০ গ্রেণ, পল্ড ইপিক্যাক ১২ গ্রেণ,  
পল্ড মিসিরিজী ১ ড্রাম একত্রে ১২ পুসিয়া ।

৩২০।—পল্ড সিলি ২০ গ্রেণ, পল্ড ইপিক্যাক ১০ গ্রেণ,  
পল্ড ওপিয়াই ২ গ্রেণ, পল্ড মিসিরিজী ৬০ গ্রেণ একত্রে  
১০ পুসিয়া ।

### কফনিঃসারক অবলেহ্ন ।

৩২১।—সিরপ সিলি, সিরপ পলী, সিরপ লিমন, মিউসি  
লেজ টাঙ্গাকাস্থ প্রত্যেক ৪ ড্রাম ।

৩২২।—সিরপ সিলি ১০ আং, টিং ক্যাম্ফর কম্ ওপিয়ো  
৪ ড্রাম । এক চা চামচ পরিমাণে অত্যন্ত কাশির সময়ে সেব্য

### সিদ্ধকারক ঔষধ ।

৩২৩।—সিটেশিয়াই ১০ গ্রেণ, ডিম্বের শ্বেতাংশ ( একটা )  
সিরপ টলু, একোয়া মিনেমন প্রত্যেক ১ আং, জল ৪ আং । মিঃ ।

৩২৪।—সিরপ হেমিডিস্‌ম্ ২ আং, ডিঃ হার্ডিয়াই ১৮  
আং মিঃ ।

৩২৫।—ডিঃ সিটেরী ১৮ আং, সিরপ মোরাই ২ আং মিঃ

৩২৬।—মিষ্টিউরা ম্যামিগুডেণী ১৬ আং, মিসিরিণ ৪ আং  
মিঃ ।

## বিরেচক—মিশ্র ।

৩২৭ —পটাসী টার্ট ১০০ গ্রেণ, ডিঃ স্যালোজ কং ১০  
আং এক মাত্রা

৩২৮ ।—অয়েল ক্রোটন ১ মিনিম, অয়েল রিসিনি ১ আং,  
এক মাত্রা মিঃ

৩২৯ ।—অয়েল রিসিনি ১ আং, লাইকর পটাশ ২০ মিনিম,  
সিরপ লিম্বন বা অবান্সিয়াই ১ ড্রাম, একোয়া মেস্টি পিপ ১ আং ।  
মিঃ, এক মাত্রা

৩৩০ অয়েল রিসিনী, অয়েল টেরিবিম্বিনী, মিউসিলেজ  
একেসিয়া প্রত্যেকে অর্ধ আং মিঃ, ঐ

৩৩১ —ম্যাগ্না সল্ফ ১২০—২৪০ গ্রেণ, ম্যাগ্না কার্ব  
১০ গ্রেণ, টিং জিঞ্জব ২০ মিনিম, একোয়া মেস্টি পিপ ১০০  
আং বাতে ইহার সহিত ভাইনম কলচিকম ১০ ২০ মিনিম  
মাত্রায় প্রয়োজ্য । এক মাত্রা ।

৩৩২ —পল্ড রিয়াই ১০ গ্রেণ, পটাসী টার্ট ২৪০ গ্রেণ,  
টিং সেনা ২ ড্রাম, ইনফিঃ সেনা ১০ আং । ঐ ।

৩৩৩ ।—ইনফিঃ রিয়াই ১০ আং, টিং কার্ডেমম কং ২ ড্রাম,  
ম্যাগ্না কার্ব ১০ গ্রেণ । এক বা দুই মাত্রা ।

৩৩৪ —ম্যাগ্না সল্ফ ১০ আং, সিরপ বোজ ১ আং,  
ইনফিঃ বোজি এসিডাই ৫ আং মিঃ ( ৬ অংশ )

৩৩৫ ।—টিং সেনা ২ আং, ভাইনম স্যালোজ ২ আং, সিরপ  
জিঞ্জব ১ আং, একোয়া মেস্টি পিপ ৩ আং মিঃ, ( ৬ অংশ )

৩৩৬ —ক্যাস্টর অয়েল ১০ আং, একটা ডিম্বের খেতাংশের



সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত কবিতা তাহাতে পিপারনেট ওয়াটন  
২ আং, ও মিরপ জাবঞ্জ ২ ড্রাম সংযোগ করিলে একমাত্রা ।

৩৩৭ —টিং সেনা ১ আং, টিং, ভেবাপ ২ ড্রাম, ভাইনম  
কলচিকম ১ ড্রাম, জল ২ আং মিঃ, ( অর্ধ )

৩৩৮ ।—লাইকর এমোনিয়া এসিটেটস ১ আং, স্পিঃ ইথ-  
বিস নাইট্রোসাই ৪ ড্রাম, ইটিটেবিসম ১ গ্রেণ, মিরপ জিব্রন  
৩ ড্রাম মিঃ, ১ ড্রাম পরিমাণে ১ ছটাক জলের সহিত ২  
ঘণ্টাস্তর, গত ক্ষণ ভেদ না হয় দিতে হইবে মুদ্রাঙ্কিত পীড়াজাত  
উদরী রোগে ব্যবহার্য্য ।

৩৩৯ সোডি মল্ফেটস ১২০ গ্রেণ, সকাই ট্যাবাক্সেসাই  
১০ ড্রাম, ডিঃ ট্যাবাক্সেসাই ২ আং মিঃ, এক মাত্রা, পিত্ত  
নিঃস্রবের স্বরূপা ও যুক্ত কোষ্ঠবদ্ধ হইলে প্রযোজ্য ।

### বিরেচক বটিকা ।

৩৪০ ।—পিল্ 'এলোজ এট্ মর ও কঠিন সাধান প্রত্যেকে  
৫ গ্রেণ একত্রে ২ বটিকা

৩৪১ ।—একষ্ট্রাঃ ক. মিহ কং ও হাইড্রাজ্ ক্যালোমেলা বা  
লুপিল প্রত্যেকে ৫ গ্রেণ । একত্রে ২ বটিকা

৩৪২ —একষ্ট্রাঃ কলমিহ কং ২০ গ্রেণ, এবষ্ট্রাঃ জেনমি-  
শান ২০ গ্রেণ একত্রে ১ বটিকা

৩৪৩ ।—ক্যালোমেলা ১ গ্রেণ, পল্ভ 'রিয়াই ৪ গ্রেণ, কঠিন  
সাধান ৪ গ্রেণ, জমেল এনিথি ১ মিনিম একত্রে ২ বটিকা

৩৪৪ ।—রেজিনা স্ক্যামনী, ক্যালোমিলেনাস, একষ্ট্রাঃ কল-

সিঙ্ক বং, একট্রাঃ জেলাপ প্রত্যেকে, ২০ গ্রেণ, অয়েল ক্যারাই  
যথা প্রয়োজন একত্রে ২ বটিকা

৩৪৫ — একট্রাঃ কলসিঙ্ক কং, বেজিনা জেলাপ, গ্যাঙ্গোল  
পত্যেকে ২০ গ্রেণ, রেজিনা পডোফিলিন সিকি গ্রেণ, অয়েল  
জুনিপাব যথা প্রয়োজন একত্রে দুই বটিকা

৩৪৬ — অয়েল ক্রোটন ১ মিনিম, গ্যাঙ্গোল ২ গ্রেণ, একট্রাঃ  
জেনসিয়ান দিয়া ১ বটিকা

৩৪৭ বেজিনা পডোফিলিন  $\frac{1}{2}$  গ্রেণ, একট্রাঃ হায়সায়ামা-  
মাস ৩ গ্রেণ একত্রে ২ বটিকা

৩৪৮ ইলিটেরিয়ম ১০ গ্রেণ, পল্ড ক্যাপসিকম ৯ গ্রেণ,  
ক্যালোমেস ১২ গ্রেণ, একট্রাঃ হায়সায়ামাস ১৮ গ্রেণ একত্রে  
১২ বটিকা

৩৪৯ — একট্রাঃ নদ্রামিকা ৩ গ্রেণ, পল্ড ইপিক্যাক ৬  
গ্রেণ, পিল নিয়াই কং বা পিল গ্যাঙ্গোল এট্ গ্যাগাফেটিডা ৪০  
গ্রেণ একত্রে ১২ বটিকা অস্ত্রের পৈশিক দুর্বলতা জনিত  
কোষ্ঠবদ্ধ উপকারক

### বিরেচক চূর্ণ ।

৩৫০ পল্ড নিয়াই ২০ গ্রেণ, পটাসী বাইট ট ৫০ গ্রেণ,  
পল্ড ম্যাগনেটিক ৫ গ্রেণ এক পুবিয়া

৩৫১ — পল্ড নিয়াই ১০ গ্রেণ, ক্যালোমেস ৩ গ্রেণ,  
পল্ড ম্যাগনেটিক ৫ গ্রেণ । এক পুবিয়া

৩৫২ । — পল্ড স্ক্যামনী কং ১০ গ্রেণ, ক্যালোমেস ৫ গ্রেণ  
১ পুবিয়া ।

৩৫৩ —সোডি বাইকার্ভ ৪০ গ্রেণ, সোডি এট্ পটাসী টার্ট ১২০ গ্রেণ, একত্রে এক পুবিয়া, ও সার্টিফিক্ বা টার্টাবিক্ এন্ডিড ৩৭ গ্রেণ, ১ পুবিয়া স্বতন্ত্র ২ পাত্রে উত্তম পুবিয়া ওল ওলিয়া, তৎপরে একত্রে মিশিত কবিয়া, উচ্ছলনাবস্থায় সেবা ইহাবে সিডমিঙ্ক পাউডব্ বাহ ।

৩৫৪ —ম্যাগ্না কার্ভ ২০ গ্রেণ, ম্যাগ্না পিচি পিটেড্ ২৫ গ্রেণ, সোডি বাইকার্ভ ১০ গ্রেণ, প্লেড ডিগ্ৰেব ৩ গ্রেণ, ১ পুবিয়া চুফেল সহিত সেবা ।

### বিরেচক অবলোহ ।

৩৫৫।—মল্লফ্র ট্রিসিপিটেড্, এন্ডিড টার্টেট অন্ পটাস অত্যেকে ১ আং, পল্ড ম্যাগ্নেটিক ১০০ গ্রেণ, মধু বা শুড যথা প্রয়োজন ১ কাচ্চ পবিয়াংে দিৱস ২ ও বার সেবা ।

৩৫৬।—পল্ড নাকমিয়া, কনফেক্শন সেনা, পটাসী বাইটার্ট অত্যেকে ১ আং, ব্লাক পেপার চূর্ণ ৫০ গ্রেণ, শুড যথা প্রয়োজন ।, তৎপরে গে ১ কাচ্চা মাত্রায় দিনে ২ ও বার সেবা ।

৩৫৭।—কনফেক্শন সেনা, পটাসী টার্ট এসিডা, মক্কা ট্যানাক্-সেকম্ অত্যেকে ১ আং মিঃ, যত্নেব ক্রিয়া ঐষমাগ্নিত বে ঈ বন্ধ ও কক্ষ বেগে ব্যবহৃত্ মান ২ ড়া ।

### বিরেচক-বস্তি ।

৩৫৮। একট্রাঃ কংসিহ্ কং ১০ —২০ গ্রেণ, ইনফিঃ সেনা ১২ আং । মিঃ ।

৩৫৯ অয়েল কাষ্টৰ ১—৭ আং, পটালী কাৰ্ব ২০ গ্ৰেণ, সাবান ৫০ গ্ৰেণ, ট্ৰিফল ১ পাইন্ট মিঃ

৩৬০ । অয়েল রিমিনি ১৫০, আং, অয়েল টেৰিবিহিনী ৪ ড্ৰাম, টি. ম্যাসায়েলিডা ২ ড্ৰাম, সোপ ওয়াটৰ ১২ আং মিঃ

### মূত্ৰকাৰক মিশ্ৰ ।

৩৬১ । —এসম নি বেন্‌জোয়েটাম্ ৫০ গ্ৰেণ, একষ্ট্ৰাঃ পেৰেটী লিকুই ৬ ড্ৰাম ডিঃ পোৰনী ৫ আং মিঃ, ( এক ষষ্ঠাংশ )

৩৬২ পটালী নাইট্‌টিস্ ৫০ গ্ৰেণ, পটালী বাইকাৰ্ব ১২০ গ্ৰেণ, স্পিঃ জুনিপাৰ কং অৰ্কি আং, ইনফিঃ বকু ১০ আং মিঃ, ( এক ষষ্ঠাংশ ) ।

৩৬৩ পটালী এচিটেটিন ১৫০ গ্ৰেণ, ইনফিঃ ডিজিটেলিস্ ১০ আং, স্পিঃ ইথৰিস নাইট্‌টোমাই ১ আং, ডিঃ ট্যাবাক্সেসেকম্ ৩ আং মিঃ, মাণা ৩ ড্ৰাম

৩৬৪ । সোডি এট্ পটালী টাৰ্ট ২০০ গ্ৰেণ, স্পিঃ জুনিপাৰ কং ৬ ড্ৰাম, সৰ্বম্ স্কোপেবিয়াই ৩ ড্ৰাম, ডিঃ ট্যাবাক্সেসেকম্ ৫ আং মিঃ, ( এক ষষ্ঠাংশ )

৩৬৫ মকাই ট্যাবাক্সেসাই, স্পিঃ জুনিপিৰাই ওত্যেক্ ৩ ড্ৰাম, ডিঃ সালি ৩ ড্ৰাম, ডিঃ নোশেনিয়াই ৪ আং । মিঃ, ( এক ষষ্ঠাংশ )

৩৬৬ —এমিড নাইট্‌ক ডি় ৪০ মিনিম, টিং হায়মাগামাস ২ ড্ৰাম, ডিঃ প্যারেনী ৮ আং মিঃ, ( এক ষষ্ঠাংশ )

৩৬৭ । —টিং ক্যাহেবাইটিস্ ৫—১ ড্ৰাম, স্পিঃ জুনিপিৰাই ৬ ড্ৰাম, ডিঃ প্যারেনী ৫ আং মিঃ [ এক ষষ্ঠাংশ ]



৩৬৮ ।—পটাসী নাইট্রেটীয় ৬০ গ্রেণ, স্পিঃ জুনিপিরাই ১—২ ড্রাম, স্পিঃ ইথার নাইট্রোস ই ৩ ড্রাম, ইনফিঃ বক্স ৮ আং মিঃ, [ ৬ ] উৎপাদে ব্যবহার্য্য ।

৩৬৯ —লাইকর পটাস ১—২ ড্রাম, স্পিঃ ইথারিগ্ নাইট্রোসাই ৪ ড্রাম, ইনফিঃ, ডিজিটেলাস্ ১ আং, বিবপ ৬ ড্রাম্ ওলা ৮ আং মিঃ, ৬ অংশ ।

৩৭০ —এসিড নাইট্রিক ডিগ ১ ড্রাম, সক্ষম্ ট্যাব কসেকম ৬ ড্রাম, ডিঃ ট্যাবাকসেকম ৮ আং । মিঃ, ( ৬ ) দিনে তিন বার যক্লৎ পীডায় প্রদাহ না থা কলে ব্যবহার্য্য ।

৩৭১ ।—পটাসী টার্ট এসিডা ১ ০ আং, একষ্ট্রাঃ ট্যাবাকসেকম ৩০ গ্রেণ, ডিঃ ট্যাবাকসেকম ৮ আং মিঃ, কামলা রোগে ব্যবহার্য্য মাত্রা ১ আউন্স

৩৭২ —ব্যালসম কোপেবা ২ ড্রাম, লাইকর পটাস ১ ড্রাম, স্পিঃ ইথারিগ্ নাইট্রোসাই ২ ড্রাম, টিং হায়সায়ামাস ১ ড্রাম, মিউসিনোজ একেসিয়া ২ আং, জল ৪ আং । মিঃ, ( ৬ ) প্রমেহে ব্যবহার্য্য ।

৩৭৩ অয়েল কোপেবা ২০ মিনিম, অয়েল কিউবেব্ ১৫ মিনিম, লাইকর পটাস ৫ মিনিম, টিং হায়সায়ামাস ২০ মিনিম, ক্যামফর ওয়াটব ১ আং । এক মাত্রা ।

### মূত্রকারক বটিকা ও চূর্ণ ।

৩৭৪ ।—পল্ড ডিজিটেলিস ১ বা ২ গ্রেণ, পিল্ হাইড্রাট ২ গ্রেণ, পিল্ মিলি কং ৬ গ্রেণ একত্রে ২ বটিকা ।

৩৭৫ —অয়েল কিউবেব্ ২০ মিনিম, কঠিন সাবান, পল্ড কিউবেব্ প্রত্যেকে ২০ গ্রেণ । একত্রে ১০ বটিকা ।

৩৭৬ — ২ টানা মাইট্রেটীম ১০ গ্রেণ, পটানা টার্ট এমিডা ২০ গ্রেণ, পল্ড কেকিমা ১০ গ্রেণ, শর্করা ৩০ গ্রেণ ১ পুনিয়া দিনে তিন বার যবোদক সহ সেবা

৩৭৭ — একটো ট্যাক্সেসকম অ। আং, পল্ড মি ৪০ গ্রেণ, কনফেক্শন অব্ টাশটাইন ৮ গ্রেণ আং, সকস চ্যাক্সেসকম যথা প্রয়োজন অবহে ববিবে। মাত্রা ১ — ২ ড্রাম

৩৭৮ কোপেবা ১ আং, বালসাইন্ড ম্যাগ্নিসিয়া ৩০ — ৪০ গ্রেণ, উভম কপে মিথাইগা ৮ গ্রেণ পর্যন্ত এবটী পাণ্ডে বাহিয়া দিবে, পবে উহাতে ১০০ বটিকা বাধবে প্রমেহে ব্যবহার্য।

### কুশিনাশক ।

৩৭৯ — ওলিয়াই টেবিলিখিনী ৪ আং, ডিঃ হুডিহাই ১ আং মিঃ, এব মাণা

৩৮০ — একটো মেগিসিম্ বিকুইঃ অর্ধ হইতে ১ ড্রাম, পল্ড ট্রাণাকাস্থ কং ৫০ গ্রেণ, এবোয়া মেস্থি পিপ্ ২ আং একমাত্রা ।

৩৮১ — স্ট্রাণ্টোনাইন ২ — ৫ গ্রেণ, পল্ড স্কামনী কং, রিয়াই বা শর্করা ইহাদেব অগ্নতম ৮ গ্রেণ ১ পুনিয়া

৩৮২ । মিঃ ইলানস অর্ধ হইতে এক ড্রাম ডিঃ এলনেটাই নেডিসিম্ ১ বা ২ আং এক মাণা তিন ঘণ্টাওন ৪ বা ৫ সেবা

৩৮৩ — ওলিয়াই বিচি নি ৪ ড্রাম, ওলিয়াই টেবিলিখিনী ১ ড্রাম, মিউমিড অ ৪ ড্রাম, মির্রণ অজর ১ ড্রাম, জল ৪ ড্রাম এব মাত্রা, প্রোডুমে সেবা

৩৮৪ — পল্ড ক্যামিনা ৬০ — ১৮০ গ্রেণ, অথবা টিং ক্যামিনা

২ ড্রাম, সিরপ অর্যান্থিমাই ২ ড্রাম, মিউসিলেজ ট্রাগাকাঙ্ক ১।০  
আং, জল ৩ আং এক মাআ, প্রত্যয়ে মেদা ও ৬ ঘণ্টা পরে  
একটি বিরচক প্রয়োজ্য

### রজোনিঃসারক ও জরায়ুসংকোচক।

৩৮৫ — ফেবি নট্ এমোনি সাইটোটিস ৩০ গ্রেণ, টিং সেবাইনী  
২ ড্রাম, একোয়া সিনেমোগাই ৬ আং। মিঃ, ( ৬ )।

৩৮৬ — অয়েল রিউটা ৪ মিনিম, পল্ড মব ৪ গ্রেণ, পল্ড  
ম্যালোজ ২ গ্রেণ একত্রে ২ বটিকা

৩৮৭। — অয়েল সেবাইনী ৪ মিনিম, পল্ড মব ৫ গ্রেণ, কোমল  
সাবান যথা প্রয়োজন একত্রে ২ বটিকা

৩৮৮ — ফেবি আইয়োডিড ১২ গ্রেণ, টিং নক্সভমিকা ৩ মিনিম,  
ইনফিঃ আর্গট ৬ আং মিঃ, এক যষ্ঠাংশ

৩৮৯ — টিং ফেবি পারক্লোবাইড ১০ ড্রাম, পটাসী ক্লোরোটিস  
৬০ গ্রেণ, টিং এক্টিভা বেসিমোজা ১ ড্রাম, ইনফিঃ সর্পেন্টরী  
৮ আং মিঃ, ১/৬ হইতে ৬ অংশ

৩৯০ — একষ্টাঃ আর্গট লিকুইঃ ৩ ড্রাম, টিং সর্পেন্টরী ৬ ড্রাম,  
৮ ডিঃ ম্যালোজ কং ৮ আং। মিঃ, ( ৬ )

৩৯১ — অয়েল নিউটা ১৫ মিনিম, একষ্টাঃ আর্গট লিকুইঃ  
২ ড্রাম, মিউসিলেজ ট্রাগাকাঙ্ক ৮ আং। মিঃ, ( ৬ )

৩৯২ — বোবাকুম ৬০ গ্রেণ, টিং আর্গট ৪ ড্রাম, একোয়া  
সিনেমন ৮ আং। মিঃ, ( ৬ )



অগ্নিশাক ।

৩৯৩ । ম্যাগ্নেসি কার্ব ৮০ গ্রেণ, একট্রাঃ ওপিয়াই লিকুইঃ  
৩০ মিনিম, স্পিঃ ইথারিস ৩ ড্রাম, ক্রোকায়া মেস্টি পিপ্ ৬ আং  
মিঃ, ( ১ )

৩৯৪ । বিস্মথাই ম্যাথাই ১৫ গ্রেণ, সোডি বাইকার্ব ১২৫গ্,  
পল্ভ একেসিয়া ৩০ গ্রেণ । একমাত্রা ।

৩৯৫ পটাসী বাইকার্ব ১২০ গ্রেণ, স্পিঃ এসন্ ম্যারো-  
মেটিক্ ৩ ড্রাম, টিং একোনাইট ১০ মিনিম, ইনফিঃ লিউপিউলাই  
৮ অং । মিঃ, (৬) দিনে তিন বার । পাকশয়শূলে উপকাঃক ।

৩৯৬ —সোডি বাইকার্ব ১৫ গ্রেণ, লাইকর মফি হাই-  
ড্রোক্রোঃ ১৫ মিনিম, এসিড হাইড্রোসিয়ানিক ডিল্ ৩ হইতে  
৫ মিনিম, জল ১আং মিঃ একমাত্রা ।

৩৯৭ । লাইকর পটাস ১৫ মিনিম, লাইকর ক্যালসিস  
২ ড্রাম । এক মাত্রা, ছপ্পের সহিত সেবা ।

পরিবর্তক মিশ্র ।

৩৯৮ । হাইড্রোজ কবোসিব সল্লিমেট ১ গ্রেণ, টিং সিনকোনা  
কং ৩ আং । মিঃ, মাত্রা ১ ড্রাম দিনে ছইবার সেবা

৩৯৯ পটাসী আইয়োডিড ৩০ গ্রে , ইনফিঃ হেমি-  
ডিম্ফিস বা ডিঃ সার্মাপ্যারিলা ৬ আং মিঃ, এক যষ্ঠাংশ

৪০০ ডিঃ সার্জি কঃ ৭ ০ আং, এসিড নাইটো হাইড্রো  
ক্লোরিক ডিল ২ ড্রাম, টিং কোনিয়াই ২ ড্রাম মিঃ, ( ১ ) ।

৪০১ । পটাসী আইয়োডিড ২০ গ্রেণ, পটাসী লাইকর

২ ড্রাম, টিং হামসামামাগ ৩ ড্রাম, ডিঃ সার্জি ৮ আং মিঃ, ৮ অংশ

৪০২ । হাইড্রাজ ববোমিব সলিডেট ১ গ্রেণ, একোনি ক্রোয়া-ইড ৫০ গ্রেণ, একষ্ট্রাঃ সার্জি ৫ কুইঃ ১ ০ আং, ডিঃ সার্জি কং ১২ আং মিঃ, মাণা অর্ধ আং

৪০৩ ফেবি আইডে ডিড ২০ গ্রেণ, ৩০ সার্জি ৬ আং মিঃ, মাণা অর্ধ আউন্স

৪০৪ পটানী আইমে ডিড ৩ ৫ গ্রেণ, ভাইনাই বগটি সাই ১৫ মিঃ টিং একোনাইট ২ ৫ মিনিম, ঠৈনাইঃ বিয়াই ১ আং । এবমাত্রা । পুনাচন গাউচ বোমো ন্য-হার্য্য

৪০৫ পটানী আইমোডিড ৩ ৫ গ্রেণ, মিনঃ নমুন ম্যাটনা মেটিক ৩০ মিনিম, টিং বেডোনা ৫ ১৫ মিনিম, টিং মিকোনা কং ১ ড্রাম, একোয়া মেস্টিপ্প ১ ০ আং এব মাণা খাম-কাণে বিশেষ উপকারী

৪০৬ পটানী আইমোডিড ৩০ ১২০ গ্রেণ, মিসিবিল ১ আং টিং একোনাইট ২০ মিনিম, ভাইনাই ইপিক্যাক ১ ০ ড্রাম, মক্কাই টাবাকসেসাই ৬ ড্রাম ডিঃ সার্জি কং ৮ আং মিঃ, (১) দিঃ তিন বাব, প্রমেহজানত বাত, সার্বাঙ্গিব উপদংশ, ১০৫ গু ৩৫ গু ৫৫ গু মালীয়া ক্ষত প্রভৃতিতে ব্যবহার্য্য

৪০৭ পটানী আইমোডিড ১৮ গ্রেণ, টিং ম্যাম মেটিড ১ ০ ড্রাম, টিং সেনেগা ৩ ড্রাম, মির। মোরই ৩ আং মিঃ, এক ড্রাম মাক্রাম শিশুদেব জুনা ও নিউমোনিয়া বোগে ব্যবহার্য্য ।

৪০৮ । পটানী ব্রোমাইড ৩০—৬০ গ্রেণ, টিং ভেলিবিয়ানো

এমোনিয়োটা ৬ ড্রাম, ক্যাম্ফর ওয়াটব ৮ আং মিঃ, গুল্যবায়,  
জরায়ুর ক্রিয়া-বিকাশ ও শুক্রমেহ রোগে ব্যবহার্য্য

৪০৯ — পটাশী বোমাইড ৩-৮ গ্রেণ, টিং সিনকোনা কং  
অর্ধড্রাম, জল ১ আং । একমাত্রা দিনে ৩ বার পীহা বিবৃদ্ধিতে  
ব্যবহার্য্য

৪১০ । ওলিয়াই মহি' ২ আং, লাইকর পটাশ ১ ড্রাম,  
টিং কার্ডেমম কং ২ ড্রাম, জল ৮ আং মিঃ মাত্রা ১ আং

৪১১ — লাইকর আর্সিনিকেলিস ৩০ মিনিম, টিং ক্যাস্চেবাই-  
ডিস্ ২ ড্রাম, টিং অবানসিয়াই ৬ ড্রাম, পটাশী আইয়োডিড  
১৮—৩০ গ্রেণ, ইনফিঃ অবানসিয়াই ৬ আং । মিঃ, ( ৬ )  
আহারবর অব্যবহিত পরে সেবা বিবিধ চর্ম্মরোগে ।

৪১২ । — এমন ক্লোরাইড ২০ গ্রেণ, একষ্ট্রাঃ ট্যারাকুসেকম  
১০ গ্রেণ, টিং জেনসিয়ান কং ১ ০ ড্রাম, ইনফিঃ সেনা ২ আং  
একমাত্রা, দিনে ২ ৩ বার, কামল, যকৃৎ-পীড়া-জনিত উদবীতে  
ব্যবহার্য্য

### পরিবর্তক বটিকা ।

৪১৩ — বেজিনা পডোফিলিন ৬ ৬ গ্রেণ, পল্ড ইপি ক্যাক  
অর্ধ গ্রেণ, একষ্ট্রাঃ জেনসিয়ান ৩ গ্রেণ একত্রে ১ বটিকা  
উপদংশ, কামল, গগুমাণা ও চর্ম্ম পীড়াদিতে ব্যবহার্য্য

৪১৪ — ক্যামোমে' ১ গ্রেণ, একষ্ট্রাঃ বোনিফাই ৩ গ্রেণ ব'  
ওপিয়াম ৬ গ্রেণ এক বটিকা ।

### পরিবর্তক চূর্ণ ।

৪১৫ — হাইড্রার্জ কম ক্রিটা ২০ গ্রেণ, এন্টিম টাট ১ গ্রেণ,  
শর্করা ৫০ গ্রেণ । একত্রে ১০ পুরিয়া

৪১৬ ক্যালোমেল ৩ গ্রাণ, পল্ড ওপিয়ম ১ গ্রাণ, পল্ড গ্লিসিবিজী ৫০ গ্রাণ । একত্রে ১২ পুরিয়া ।

### পারিশিষ্ট ব্যবস্থাবলী ।

৪১৭ ।—পেপ্সিনা পোসাই ৩২ গ্রাণ, একষ্ট্রা ড্যালোজ ৮ গ্রাণ, গ্লিসিরিন যথা প্রয়োজন লইয়া ৮ বটিকা করিবে আহাবকালে এক বটিকা সেব্য ।

৪১৮ ।—জিন্সাই ভেলিরিয়ানাস ১২—২৪ গ্রাণ, একষ্ট্রাঃ বেলেডোনা ৩—৪ গ্রাণ, একষ্ট্রাঃ জেনসিয়ান ২৪ গ্রাণ, একত্রে ১২ বটিকা । এক এক বটিকা দিনে তিন বার সেব্য ।

৪১৯ ।—ফেরি সল্ফ ১২ গ্রাণ, এসিড সল্ফ ডিল ১ ড্রাম, ইনফিঃ বাবুবেরিস লিসিয়ম ৬ ৩২ ; একত্রে মিশ্র মাত্রা ১ আং, দিনে তিন বার

৪২০ । ক্যাম্ফর ৫ গ্রাণ, একষ্ট্রাঃ বেলেডোনা ১ গ্রাণ, একষ্ট্রাঃ কোনিয়াই ৮ গ্রাণ, অম্ল স্পিরিট দিয়া ২টী বটিকা করিবে ।

৪২১ । টিংচর য়ানাকোটডা ২ ড্রাম, স্পিরিট এমোনি য়ানোমেটিক ১।০ ড্রাম, টিং হায়সায়ামাস ১ বা ২ ড্রাম, একোয়া ক্লোবোফর্ম ২ আং, একত্রে মিশ্র অর্ধ আউন্স মাত্রায় সেব্য ।

৪২২ —নোমাইড অন্ পটাসিয়ম ৩০ গ্রাণ, টিং ভেলিরিয়ান ৩ ড্রাম, টিং এসাকোটডা ৩ ড্রাম, স্পিঃ এমোনি য়ানোমেটিক ২ ড্রাম, ক্যাম্ফর ৬৪ টব ৫ আং, একত্রে মিশ্র ১ আং মাত্রা সেব্য ।

৪২৩ । এন্টিম টার্ট ১ গ্রাণ, টিং ওপিয়াই ৪০ মিনিম, অল ৬ আং, একত্রে মিশ্র । মাত্রা অর্ধ হইতে এক আং

৪২৪ —ক্লোবান হাইড্রেট ৫—১০ গ্রাণ, সিনপ অরানসিয়াই ১ ড্রাম, একোয়া মেসি পিপ্ ১ আং এক মাত্রা ।



৪২৫। ভাইনম এণ্টিগোনিয়েলিস্ ১০ মিনিম, গ্যাগ্‌না সল্‌ফ ১—২ ড্রাম, ষটিং হায়গায়ামাস ১৫—২৫ মিনিম, ক্যাম্‌ফর ওয়াটব ১ আং, একত্রে মিশ্র ; একমাত্রা ।

৪২৬ —ভাইকব গায়াই সব এমিটেটিস ২ ড্রাম, টিংচর ওপি-য়াই ৪ ড্রাম, স্পিরিট বেক্‌টিকায়েড ৩ ড্রাম, জল ২০ আং ; একত্রে লোশন ।

৪২৭ —এমোনি ব্রোমাইড ১২—৬০ গ্রেণ, ইনফিঃ অরান-মিয়াই ৮ আং, একত্রে মিশ্র মাত্রা ১ আং

এমোনিয়াই আইয়োডিডম্ ৩—১৫ গ্রেণ, ইনফি মিনকোনা ১ আং । এক মাত্রা ।

৪২৮ —টিংচর মিনকোনা কং ১ আং, টিং একোনাইট ২০ মিনিম, টিং মার্পেন্টেরী ৩ ড্রাম, একোয়া মেস্‌হি পিপ্ ৮ আং । একত্রে মিশ্র—মাত্রা ১ আং

৪২৯।—ফস্‌ফেট অব্‌ জিঙ্ক ১০—২০ গ্রেণ, এমিড ফস্‌ফরিক ডিল্ ১।০ ড্রাম, টিংচর মিনকোনা কং ৬ ড্রাম, টিং ফেরি পার-ক্লোরাইড ১০ ড্রাম, একোয়া মেস্‌হি পিপ্ ৮ আং, মাত্রা অর্দ্ধ হইতে ১ আং

৪৩০ —সোডি হাইপোফস্‌ফেটীস বা ক্যাল্‌সিস্ হাইপো ফস্‌ফেটীস ২০—৬০ গ্রেণ, ইনফিঃ চিরতা ৮ আউন্স মাত্রা অর্দ্ধ হইতে ১ আং

৪৩১।—সোডি হাইপোফস্‌ফেটীস ৮০ হইতে ২৪০ গ্রেণ, স্পিরিট বেক্‌টিকায়েড ১ আং, টিংচর মিনকোনা ২ আং, একত্রে মিশ্র মাত্রা—এক চা চামচ পরিমিত ।

৪৩২।—এমিড গ্যালিক ১৫—২৫ গ্রেণ, এমিড সল্‌ফিউরিক



ম্যাগনেটিক ১৫—২০ মিনিম, টিংচর সিনেম ২ ড্রাম, একোয়া ডিষ্টিলেট ২ আং ; একত্রে মিশ্র, এক বা দুই মাত্রা । ৪ ঘণ্টা পর বক্তৃতা নিবারণ না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজ্য ।

৪৩৩ এসিড ফসফরিক ডিল ১০—২০ মিনিম, টিংচর নকুমভমিকা ১—৩ মিনিম, ইনফিঃ কাক্ষা ১ আং এক মাত্রা ।

## নূতন ব্যবস্থা সংগ্রহ ।

১ বিস্মগ কার্ব ১০ গ্রেণ, ম্যাগনেস কার্ব ১০ গ্রেণ, প্যাপেইন ২ গ্রেণ, মর্ফি হাইড্রোক্লো ১ চ্চ গ্রেণ । একত্রে এক মাত্রা, এইরূপ ২৪ মাত্রা ; দিনে ২ ও বার সেব্য ইহাতে পাক্ষ্যের শৈথিল্য বিলম্ব অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া অম্ল ও শূলাদি উপশমিত হয় ।

২ সলফর প্রিসিপিটেড ২ ড্রাম, ক্যালোমিনা প্রিপেয়ারেট ২ ড্রাম, গোলাপ জল ৫ আউন্স, চুণের জল ৫ আউন্স, ইউডি কোলন ৩ ড্রাম । একত্রে লোশন । মুখমণ্ডলের একুনি ( বয়স ফোড়া ) আদি চর্ম পীড়ায় প্রয়োজ্য ।

৩। সলফর প্রিসিপিটেড ৩০ গ্রেণ, ক্যালোমিনা প্রিপেয়ারেট ৩০ গ্রেণ, ল্যানোলিন পিওব ১ আউন্স, কার্বলিক এসিড ১৫ মিনিম । একত্রে মলম ; একুনি আদি চর্ম পীড়ায় প্রয়োজ্য ।

৪। বিসমথাই কার্ব ৩ ড্রাম, এসিড হাইড্রোমিথানিক ডিল ১ ড্রাম, মিউসিলেজ সদ্য প্রস্তুত ১।০ আউন্স, লাইকব মর্ফিনী ২ ড্রাম, একোয়া ক্লোরোফর্মাই (  $ad =$  সর্বশুদ্ধ ) ৪ আউন্স । মিশ্রিত করত সেবনার্থ ১ অংশ বিধান করা যায় । অত্যন্ত মদ্যপান জনিত পাক্ষ্য প্রদাহ ও উগ্রতা এবং বমনাদি ইহা দ্বারা নিবারিত হয় ।

৫ প্লিনিট এসোন এবোমেট ১ আউন্স, টিং সিনকোনি ২ আউন্স, বাইবর লীকনাইমী হাইড্রোঃ ১ ড্রাম, টিং ক্যাপ্‌সি-সাই ১ অউন্স। একত্রে মিশ্রিত কর। এক চা চামচ বা ১ ড্রাম ম রায় অর্দ্ধ গ্লাস জল সহ ত্রিভি ঘটান্তর সেবনে স্ৱরাপান লালসা নিবৃত্তি পায়

৬ কুইনী সল্ট ২৫ গণ, এসিড নাইটে হাইড্রোক্লোরিক ডিল ৬ ড্রাম, একষ্ট্রাঃ সিনকোনি লিকুইঃ ৩ ড্রাম একোয়া ডিষ্টিলেটা ad ১০ আউন্স অর্দ্ধ আউন্স মাত্রায় দিনে ৩ বার আহাঁবেব পূর্বে সেবা

অধিক দিন স্থায়ী ক্ষুধাণোপ, উদামহীনতা সহ অস্থিৰতা, ব্যাহত নিদ্রা প্রভৃতি অধিক মদ্যপানের লক্ষণ বর্তমান থাকিলে ইহা উপযোগী

৭ লাইকব ফেবি ডায়ালিসিস ২ আউন্স গ্লিসিবিঃ টিওর ১ আং, টিং নব্যামিকা ৩ ড্রাম, একষ্ট্রাঃ ক্যাস্কেলী লিকুইঃ ৪ ড্রাম। একত্রে মিশ্রিত কর ইহাব ১ ড্রাম মাত্রায় ডল সহ দিনে ৩ বার সেবা। রক্তহীনতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য সংশ্লিষ্ট এসিনোব্রিয়া গীডায় ফলোপধানী।

৮। টিংচর ফেবি পারক্লোরাইড ৫ ড্রাম, লাইকব আর্সি-নিকেলিস ২ ড্রাম, গ্লিসিবিঃ পিউরিকিঃ ১ আউন্স, একোয়া ad ৪ আউন্স ১ ড্রাম মাত্রায় ২ আং জল সহ দিনে ২।৩ বার সেবা রক্তহীনতায় প্রয়োজ্য

৯। ফেনি এট্‌ এসোন সাইটস ২ ড্রাম, এসিড সাইট্রিক ৩ ড্রাম, জল ৮ আউন্স মাত্রা ১ আং পটাশঃ বাইকার্ব ৬ ড্রাম, জল ৮ আউন্স। ১ আং। উভয় মিশ্র একত্র মিলিত কর

উচ্ছলিত অবস্থায় সেবা অগ্নাশ্রুবিধ আয়ুর্গ অসহ্য হইলে ইহা সহজে সহ্য হয়।

১০ টিংচর ফেরি পারক্লোরাইড ৪ ড্রাম, লাইকর এমোন এসিটেট ৩ আউন্স, একোয়া ক্লোরোফর্ম ad ১২ আউন্স। সজ্জাবস্থা সমন্বিত বক্তৃহীনতায় এই ঔষধ অর্ধ আউন্স পরিমাণে সেবা

১১ এমিল নাইটস ১ ড্রাম, স্পিরিট ভাইনাই রেক্টিফিকেটস ১০ ড্রাম, গ্লিসিরিন ad ৪ আউন্স। এই ঔষধ এক টিম্পুন বা ১ ড্রাম, উষ্ণ জল সহ ক্ষুণ্ণ পীড়ায় সেবা।

১২ সোডিয়াই আইয়োডিডাই ৪ ড্রাম, লাইকর আর্সিনিকেলিস ১ ড্রাম, টিং ক্যালক ১ আউন্স, একোয়া ক্লোরোফর্মাই ad ৮ আউন্স অর্ধ আউন্স মাত্রায় দিনে ৩ বার, সাধারণতঃ গুরুতর প্রকারের ক্ষুণ্ণ বা এঞ্জাইনা পেরিকোরিস পীড়ায় ব্যবহার্য

১৩ পটাসিয়াই আইয়োডিডাই ২ ড্রাম, লাইকর আর্সিনিকেলিস ১ ড্রাম, ভাইনাই ইপিকাক ৪ ড্রাম, ১ ক্রস হায়সায়ামাই ৪ ড্রাম, একোয়া ক্লোরোফর্মাই ad ৮ আউন্স শ্বাসকাসের উৎকৃষ্ট ঔষধ - মাত্রা অর্ধ হইতে ১ আউন্স, দিনে ৩ বার সেবা।

১৪ ওলিয়াই বোজমেরিনাই ৪ ড্রাম, লাইকর ইপিম্প্যাষ্টিক সাই ২ ড্রাম, ওলিয়াই এমিগ্‌ডেলি ডন্স ২ আং, স্পিরিট ক্যাম্ফর ২ আং, গ্লিসিরিন বোরেসিস ১ আং, ওটো ডি রোজ ৮ ফোঁটা, টিংচর জেবোরাতি ১ আউন্স মিশ্রিত কর, প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে কেশমূলে উত্তমরূপে মর্দন কর্তব্য বিবিধ প্রকার টার্ক উপকারী।

১৫ পাইলোকার্পিন হাইড্রোক্লোর ২০ গ্রাং, একোয়া



ডিষ্টিলেট ২ আং, একত্রে মিশ্রিত ও জ্বলীভূত করত, তৎপরে  
ল্যানোলিন ১০ ড্রাম, ওলিয়াই পিটোলিয়াই ৬ ড্রাম, ওলিয়াই  
বর্গেমট আদ ড্রাম, ওলিয়াই ভার্ভিনী আদ ড্রাম একত্রে মিঃ ইয়া  
মসমাকার কর টাকে স্ফলপ্রাপ্ত

১৬। পল্ড ট্যালুমিস ১০ ড্রাম, বিস্মথাই সব নাইটেটিস  
১১ ড্রাম, পটাসিয়াই পারগ্যানিয়াই ৩ ড্রাম, সোডা সালিসিলেট  
অর্ধ ড্রাম উত্তমরূপে মিশ্রিত কর। পা খামায় এই চূর্ণ  
ব্যবহার্য্য

১৭ ভাইনাই এন্টিমোনিয়েল ১ ড্রাম, ভাইনাই ইপিক্যাক  
২ ড্রাম, লাইকর এমোন এসিটেট ৪ ড্রাম, সিরপ টলু ৪ ড্রাম,  
জল ad ২ আউন্স। বালকদিগকে ১ চা চামচে বা ১ ড্রাম মাত্রায়  
২১৩ ঘণ্টান্তর তরুণ বায়ুনলীভূজ প্রদাহে প্রযোজ্য।

১৮ ভাইনম এন্টিমোনিয়েল ৪ ড্রাম, স্পিরিট এমোন  
এনোমেটিক ১ আউন্স, স্পিরিট ক্লোবোফর্ম ৪ ড্রাম, লাইকর  
এমোন এসিটেট ২ আউন্স, একোয়া ad ৮ আউন্স একত্রে  
মিশ্রিত কর অর্ধ আউন্স মাত্রায় ২৩ ঘণ্টান্তর, বায়ুনলীভূজের  
শুদ্র ও ক্ষৌভাবস্থা বিদূষিত না হওয়া পর্য্যন্ত সেব্য।

১৯ টিং ডিষ্টিলেটিস ২ ড্রাম, স্পিরিট এমোন এরোমেটিক  
১ আউন্স, স্পিরিট ইথারিস ১ ড্রাম, স্পিরিট ক্লোবোফর্ম ২ ড্রাম।  
একত্রে মিশ্রিত কর ১ চা চামচে বা ১ ড্রাম পরিমাণে ১ আউন্স  
জল সহযোগে প্রতি ৩ ঘণ্টান্তর সেব্য তরুণ লক্ষাইটিস্ রোগে  
৭ ৩২সহ স্বপিত্তের কুপার্টের দীড়া বর্তমানে সফলদায়ক।

২০। ভাইনাই ইপিক্যাক ৪ ড্রাম, টিং সিলি ৪ ড্রাম, স্পিরিট  
এমোন এরোমেট ৬ ড্রাম, সিরপ টলু ad ৩ আউন্স। মিশ্রিত

কর, ১ ড্রাম পরিমাণে গুল মরু দিনে ৪৫ বার সে । 'স্বেপ্তা' তনয় হইলে ইহান ৭ মোঃ হিভকানী । ব্রফাইটিস ও নিউমোনিয়া পীড়ায় প্রযোজ্য

২১ ৭টাসিয়াই আ'মোডি'এই ৩৫ গ্রেন, ৭টান লাইকার্ন ৪ ড্রাম, এমোন ব্রোনিডাই ২ ড্রাম, লাইকর ১ স্কিনা ১ ড্রাম, একোয়া ক্লোবোফর্ম ৮ অউন্স তর্জ আউন্স মাত্রায় ৪ বা ৬ ঘণ্টাস্তর স্বেপ্তা শুষ্ক, শ্বাসবর্ধ, অত্যন্ত কানি কিম্ব স্বেপ্তা উঠিতে সমধিক বর্ধ ও সামান্য আঠাবৎ ঘন স্বেপ্তা উঠা পদ্ধতি ৬ মন বিদ্যমানে ক্রনিক ব্রফাইটিসে প্রযোজ্য ।

২২ এমোন ক্লো বাইড ১ আং, টিংচন ক্যামফর বং ১ আং, মিষ্টিউরা এমোনিবেসাই ২০ আউন্স এবএম মিশ্রিত কব অর্ধ আউন্স মাত্রায় দিনে ২-৩ বার সেবা বৃদ্ধ ও পৌঃ ব্যক্তিগণেব পুরাতন ব্রফাইটিস পীড়ায় দ্রবোপধায়ক

২৩ এমোন কার্ব'চ' গ্রেন, টিং ক্যামফর বং ৬ ড্রাম, টিং সেনেগা ৪ ড্রাম, ইনফিঃ সেনেগা ৮ আং অর্ধ আউন্স মাত্রায় সেবা । ক্রনিক ব্রফাইটিস পীড়ায় উপকারী

২৪ 'স্কিনী' ৪ গ্রেন, ক্লোবোফর্ম ২ ড্রাম, ভ্যামিলিন ১ আউন্স একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত কব মনমাকারে টিন্টেব উপর মাথাটয়া বেদনান্বিত কর্কটিক অর্ধদ্রু পদ্ধতিতে প্রযোজ্য

২৫ বিসমথ সবনাইট্রস ৬ ড্রাম, ৭৮৩, ৫ম এবেসিগা ২ ড্রাম, মর্ফিনী হাইড্রোক্লোরাইস ২ গ্রেন একত্রে মিশ্রিত কবত নষ্টাকারে তরুঃ সর্দিতে ব্যবহার্য ইহার সঙ্গে ২ গ্রেন কোকে-ইন সংযোগ করিলে আবও উপকার হয়

২৬ লাইকর কার্ব ডিটারজেঃ ১ • ড্রাম, হাইড্র'জ' এমোন

ক্লোরিইড্ ২৫ গ্রো, ক্যালোমিন ২ আউন্স একত্রে মিশাইয়া মলম প্রস্তুত কর যা দ্রব্যে মহকারে বাসিত হইলে কঠিনে চ্যাপ্‌ড হাওস বা হুও ফাটাম ও অন্যান্য চর্ম পীড়ায় বিশেষ উপকার দর্শে ।

২৭ ফেনি মলফেটিস্ ২৪ গ্রো, মোডি বাইকার্ব ২ ড্রাম, মোডি মলফেটিস ৬ ড্রাম, টিং জিন্‌জব ২ ড্রাম, স্পিরিট ক্লোরোফর্ম ১ ড্রাম, ইনফিঃ কোফাসিয়া ৮ আউন্স । ১ আউন্স বা ১ ভাগ দিনে ২ বার, ক্লোরোসিস্ পীড়ায় ব্যবহার্য্য ।

২৮ । ওলিয়াই বিসিনী ৬ ড্রাম, ক্লোরোফর্ম ২০ মিনিম, এসেন্স মেথি পিপ্ ৪০ মিনিম, সিবপ্ এট্ মিউসিলেজ ২ আউন্স । মিশ্রিত কর ৪ ড্রাম মাত্রায় ১৫ মিনিট অস্তব সমস্তটী সেবা । কলেবার প্রথমাবস্থায় উপকারী ।

২৯ একষ্ট্রাঃ ক্যান্‌কেবী লিকুইঃ ১ আউন্স, টিং নিউসিস ভগিনী ১০ ড্রাম, টিং ফোলিয়ো বেলেডোনি ১০ ড্রাম, মিসিরিণ সংযোগে ৪ আউন্স পূর্ণ কর ১ ড্রাম মাত্রায় জলসহ সেবা, কোষ্ঠবদ্ধে উপকারী ।

৩০ । এসোনিয়াই ব্রোমিডাই ৪৫ গ্রো, স্পিরিটস ইথিরিস নাইট্রোসাই ১ ড্রাম, ক্লোবাল হাইড্রেটিস ৩৫ গ্রো, সিবপ অরান-সিয়াই ফ্লোরিস ১ ড্রাম, একোয়া ব্রোবোফর্মাই ৩ আউন্স এক বা তদুৎপন্ন বৎসরের শিশুর পক্ষে মাত্রা ১ ড্রাম । বালক ও পূর্ণ বয়স্ক-দিগের কন্‌ভলসন্স রোগে ব্যবহার্য্য ।

৩১ এসিডাই 'স্ট্রাংসিলিসাই ১ ড্রাম, একষ্ট্রা ক্যামেনিস ইথিরি ১০ গ্রো, কলোডিয়াই য়েক্সিলিস ৬ ড্রাম, ইথরিস-মলফিউরিসাই ২ ড্রাম দ্রবীভূত ও মিশ্রিত কর ঝাঁটিল,

জামড়ো ( কপণ ) প্রভৃতির উপর তুলি করিয়া লাগাইলে উপকার হয়

৩২ ৫৫৬ই কার্বোম্যাগ্নি ১ ড্রাম, স্লিফিটিনাই বোরেসিস ১ আউন্স, একোয়া রোজ ৮ আউন্স । স্ত্রী আকারে অর্ধ বা এক ঘণ্টান্তর ক্রমে ব্যবহার্য্য ।

৩৩ লাইকর লীকনাইনী হাইড্রোক্লোঃ ১ ০ ড্রাম, টিং ডিজি-টেলিস ৪ ড্রাম, হায়গিন্ হাইড্রোক্লোম ৮ গ্রেণ, টিং কার্ভেসম কং ৫৮ ৩ আউন্স মিশ্রিত কর, ১ ড্রাম মাত্রায় জল সহ ডিলিরিসম ট্রিমেন্স পীড়ায় ব্যবহার্য্য

৩৪ এমোন সোমাইড্ ৩০ গ্রেণ, স্পিরিট ইথর নাইট্রোসাই ১ ড্রাম, লাইকর এমোণিয়া এসিটেটস ৪ ড্রাম, মিরপ সিম্পল ৪ ড্রাম, একোয়া ক্লোরোফর্ম ৫৮ ২ আউন্স ১ ড্রাম পরিমাণে ২ ৩ ঘণ্টান্তর ইহাতে শিশুদিগের দস্তোস্তেদকালীন জ্বর, অস্থিরতা, উগ্রতা, চম্কাইয়া উঠা আদি নিবারিত হয়

৩৫ । বিসমথাই কার্বোনেটিস ৪৫ গ্রেণ, টিং ক্যাম্ফর কং ১ ড্রাম, স্লিফিটিনাই ৪ ড্রাম, স্টিউমিঅ্যাজিনিম ৪ ড্রাম, একোয়া ক্লোরোফর্মাই ৫৮ ৩ আউন্স । বালকদিগের পক্ষে ( ২ ৩ বৎসর বয়স্ক ) এক চা চামচ মাত্রায় উদরাময় পীড়ায় প্রতিবার মলত্যাগের পর সেবা । তদুর্দ্ধ বয়সের বালকদের জন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করা আবশ্যক

৩৬ । টিং ক্যাটিকিউ ৪ ড্রাম, টিং কাইনো ৪ ড্রাম, টিং ওপিয়াই ২ ড্রাম, স্পিরিট ক্যাম্ফর ৩ ড্রাম, স্টিউমিঅ্যাজিনিম ৫৮ ৩ আউন্স । উদরাময় বোগে ২ ড্রাম মাত্রায় ৪ ঘণ্টান্তর সেবা ।

৩৭ ফিনাজোনাই ৫—১০ গ্রেণ, কফিইন সাইট্রাস ১—২ ০



গ্রেণ, স্পার্টিনী মল্ফ ১ গ্রেণ একত্রে মিশাইয়া ১ পুরিয়া  
ডিস্‌মেনোবিয়া বা কষ্টরজঃ পীড়ায় উপকারী

৩৮ টিং এবোনাইট ১০ মিনিম, লাইকর এমোনিয়া এসি-  
টেটস ১ আউন্স, টিং সিমিসিফিউগা ১ বা ১ ড্রাম, একোয়া  
ক্লোরোফর্মাই ৮ আউন্স ১ আউন্স মাত্রায় কষ্টরজঃ পীড়ায়  
প্রয়োজ্য উক্ত পীড়ায় রক্তাধিক্য ও প্রদাহ বর্তমানে মহোপকারী

৩৯ প্যাপেইন (ফিক্সার) ৩ গ্রেণ, বিসমথ কার্ব ১০ গ্রেণ,  
সোডা বাইকার্ব ১৫ গ্রেণ, কোডিইন  $\frac{1}{8}$  গ্রেণ একত্রে ১ পুরিয়া,  
আহাবাস্তে জল সহ সেবা এটনিক ও ইবিটেটভ ডিম্পেন্সিয়া  
পীড়ায় ব্যবহায্য

৪০ মর্ফিনী হাইড্রোক্লোঃ ৩ গ্রেণ, কোকেইন হাইড্রোক্লোঃ  
৬ গ্রেণ, টিং বেলেডোনা ২ ড্রাম, একোয়া এমিগ্‌ডেলি আমারি ad.  
১ আউন্স। ৫—১৫ মিনিম প্রতি ঘণ্টান্তর সেব্য। ডিম্পেন্সিয়া  
পীড়ায় পাকশয়ে বেদনা, উগ্রতা, বমন আদি বর্তমানে ব্যবহ্য

৪১। হাইড্রার্জ পারক্লোবাইড ২ গ্রেণ, স্পিরিট রেক্টিফিকে-  
টস ৬ ড্রাম, একোয়া ডিষ্টিলেটা ২ আউন্স। একত্রে মিশ্রিত করত  
উহা ২ ৪ ফোটা কর্ণের ভিতর দিনে ২ বার প্রয়োগ করিলে  
কর্ণের অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ আবোগ্য হয়। উক্ত দ্রবে তুলা  
ভিজাইনা তাহা কর্ণের ছিদ্রে দিয়া রাখিতে হয় এতদ্বারা পুনঃ  
পুনঃ প্রণ ৬৭পন্ন হওয়া রহিত হয়।

৪২ ক্রিয়োলিন ১ ড্রাম, আইমোডোফর্ম ৪ ড্রাম, ল্যানো-  
লিন ১০ ড্রাম একত্রে মিশাইয়া তাহা চর্মোপরি লাগাইবে বা  
লিণ্টে মাখাইয়া পীড়িত অংশে প্রয়োগ করিবে ইরিসিপেলাস  
রোগে ব্যবহার্য্য



৪৩ ইউডিকোনন ১ আং, জিন্সাই অক্সাইড ২ ড্রাম, লাইকর কার্বন ডিটার্জঃ ২ ড্রাম, পলিক্রত এল ৮। আউন্স। একত্রে লোশন প্রস্তুত করত ইরিথ্রিমা আদি চর্ম পীড়ায় স্জ বা বঙ্গথণ্ড ভিজাইয়া বাহ্যিক প্রয়োজ্য।

৪৪। অয়েল মেহপিপ্ ১ ড্রাম, স্পিরিট ক্লোরোফর্ম ৩ ড্রাম, স্পিরিট ইথর সল্ফ ২ ড্রাম, লাইকর মর্ফিনী হাইড্রোক্লোঃ ২ ড্রাম, টিং ক্যানাবিস ইণ্ডিকা ১ ড্রাম, স্পিরিট এগোন এবোমেটিক a.c. ১ ০ আউন্স। একত্রে মিশ্রিত কর ১ ড্রাম মাত্রায় অলসহ সেবা গলচ্যোন পীড়ায় বেদনা নিবারণার্থ ব্যবহার্য্য এক মাত্রায় বেদনা নিবারিত না হইলে অধ ঘণ্টা পরে আর এক মাত্রা দিবে তদনন্তর যোগোপশম না হওয়া পর্যন্ত প্রতি ৪ ঘণ্টাস্তব প্রয়োজ্য।

৪৫ পম্বাই এসিটেটস ১ ড্রাম, এসিড এসিটিক ডিল ১ ড্রাম, লাইকর মর্ফিনী এসিটেটস ২ ড্রাম একোয়া ডিষ্টিলেটা ৮ আউন্স অর্ধ আউন্স মাত্রায় রক্ত বগনে বিধান কর্তব্য।

৪৬। একট্রাঃ-ভার্গট লিকুইঃ ৬ ড্রাম, এসিড গ্যালিক ২ ড্রাম, লাইকর মর্ফি হাইড্রোঃ ২ ড্রাম, টিং হ্যাগমেডিস ১ আউন্স, একোয়া ডিষ্টিলেটা ৮ আউন্স। অর্ধ আউন্স মাত্রায় হিমপ্টিগিস্ রোগে ব্যবহার্য্য।

৪৭। ক্রাইসারোইনাই ১ গ্রেন, অাইডোক্সাই ৬ গ্রেন, একট্রা বেলেডোনা ৬ গ্রেন, অয়েল থিয়োক্সোমা ৩০ গ্রেন, মিসমিন প্রয়োজন মত ৫ইয়া একটী সপোজিটারী প্রস্তুত কর অর্ধ পীড়ায় ইহা মলদ্বারের মধ্যে দিয়া নাথিলে উপবান হয়।

৪৮ স্পিরিট এগোন এবোমেট ১ আউন্স, স্পিরিট ইথর

মল্ফ ২ ড্রাম, টিং ডিজব ফোর্ট ৩ ড্রাম, এসেন্স মেহিপিন্ ৩ ড্রাম, স্পিরিট ক্যান্ফর ৩ ড্রাম, টিং কার্ডেমম ফং act ৩ আউন্স ১ ড্রাম মাত্রায় ১ আউন্স আন্দাজ জলের সঙ্গে মিশাইয়া ১৫ মিনিট অন্তর, শ্বাসকষ্ট ও হৃৎবেগন নিবারিত না হওয়া পর্য্যন্ত সেবন করাইবে। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বৈষম্যে ব্যবহার্য্য।

৪৯ টিং ডিজিটেলিস ৩ ড্রাম, টিংচর ফেবি পারক্লোরাইড ৩ ড্রাম, এসিড ফক্ষ ডিল ২ ড্রাম, গ্লিসিরিন পিওব ১ আং, পবিন-স্কত জল ৪ আউন্স ১ ড্রাম মাত্রায় জল সহ সেবা। হৃৎপিণ্ডের গীড়ার সঙ্গে এনিমিয়া বিদ্যমানে এই ব্যবস্থা ফলোপধায়ক।

৫০ পটাসিয়াই আইয়োডিডাই ১ ড্রাম, স্পিরিট এমোন এরোমেটিক ৪ ড্রাম, সক্রস স্কোপ রিয়াই ১ আং, টিংচর ডিজিটেলিস ২ ড্রাম, ইনফিঃ সেনেগা ৬ আউন্স একত্রে মিশিত কর অর্ধ আউন্স মাত্রায় সেবা হৃৎপিণ্ডের গীড়া সম্বলিত উদরো ও শোথাদিতে প্রয়োজ্য। ইহার মূত্রকারক ক্রিয়া ব্যতীত এতদ্বারা হৃৎপিণ্ডের বলবিধান এবং বেদনা ও অন্যান্য কষ্ট নিবারিত হয়।

৫১। টিং ডিজিটেলিস ২।০ ড্রাম, পটাস্ অাইয়োডিড ৩ ড্রাম, একট্রাঃ কোকী লিকুইঃ ২ আউন্স, একোয়া এট্ গ্লিসিরিনাই ৪ আং একত্রে মিশিত কর মাত্রা ১ ড্রাম, ১ আ. জলে গুলিয়া সেবা। হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক ক্রিয়া সহ বেদনা থাকিলে ইহা অতি উপযোগী।

৫২ এসিড ট্যানিক ১ ড্রাম, গ্লিসিরিন বোরেসিস ২ ড্রাম, টিং ক্যান্ফসিয়াই ৩ ড্রাম, ইনফিঃ বোজি এসিডটি ১০ আং একত্রে মিশাইয়া গার্গল বা কবল করিবে। শ্ববভঙ্গ ও গলা বেদনাদিতে প্রয়োজ্য।

৫৩ জিন্সাই ভেলিরিয়ান, কুইনাইনী ভেলিরিয়ান ও ফেরি ভেলিরিয়ান প্রত্যেকে ১ গ্রেন, একষ্ট্রাঃ এলোস ই গ্রো । একত্রে ১ বটিকা ; এইরূপ ২৪ বটিকা । দিনে ২ ৩ বার সেব্য হিষ্ট্রিবিয়া ও জেনাবল নিউরালস্থিনিয়া পীড়ায় ব্যবহার্য্য

৫৪ একষ্ট্রাঃ ডেমিনো লিকুইড ১ আং, টিং নক্স ৩মিকা ১।০ ড্রাম, জল ৩ আং । মাত্রা ২—৩ ড্রাম, দুগ্ধ সহ সেব্য ধ্বজ-ভঙ্গে উপকারী

৫৫ এমোন বার্ব ৪ ড্রাম, টিং সিনকোনা ১।০ আং, পিপিট এমোন এরোমেটিক ৪ ড্রাম, ডিকক্সন সিনকোনা ১২ আউন্স মাত্রা ১ আউন্স, তর্ক আউন্স জেবুব রস সহ মিলিত করত ফুটিয়া উঠিলে তদনুসারে সেব্য । ইনফ্লুয়েন্জা ও অন্যান্য মর্দি কাসিতে উত্তেজক ও শ্লেষ্মানিঃসাবক ক্রিয়া দর্শইয়া উপকার কবে

৫৬ সক্রম ট্যানাক্সেসকম ২ আং, সোডি বার্বিকার্ব ৬ ড্রাম, টিং রিয়াই ১।০ আং, ইনফিঃ জেন্সিয়ান ১২ আং মিলিত কর । জড়িস পীড়ায় ১ লং মাত্রায় দিনে ২ ৩ বার সেব্য

৫৭ । কোকেইন হাইড্রোঃ ৫ গ্রেন, থিসিরিনাই এসিডাই কার্বলিসাই ২ ড্রাম, একোয়া রোজ ৫ আং । আট্রিন্জাইটীশ পীড়ায় শ্রে আকারে ব্যবহৃত হয় । ইহাতে মস্তক গলা বেদনা নিবানিত হয়

৫৮ এসিড কার্বলিক ২ ড্রাম ক্রিয়েজোট পিওব ১ ড্রাম, পিপিট ক্লোরোফর্ম ২ ড্রাম, থাইমল ৩০ গ্রেন, একোয়া ডিষ্টিলেটা ১৫ ড্রাম, পিপিট ভাইনাই বেক্টারিফিকেটস্ acd ৪ আং মিলিত ও সবীভূত কর । ভাঙ্গাণ ও শ্রে রূপ থ্যানিন্জাইটীশ আদি

গলাব ভিতরের পীড়ায় প্রয়োজ্য ব্রংকাইটিস আদি ফুস্ফুসীয় পীড়াতেও ইহার আত্মাণ ফলোপধায়ী

৫৯। হাইড্রাজ' পারক্লোরাইড ৩ গ্রেন্, এসিড কার্বলিক ১ ড্রাম, সিম্পল অয়েন্টমেন্ট ৩ আং একত্রে মিশ্রিত কর, লিচেন আদি বিবিধ চর্মপীড়ায় বাহ্যিক ব্যবহৃত হয়।

৬০ এসিড্ নাইটোহাইড্রোক্লোরিক ডিল ২ আং, একষ্ট্রাক্ট ট্যাবাক্সেসাই লিকুইঃ ২ আং, টিং নম্ব ভমিকা ৩ ড্রাম, একষ্ট্রাক্ট সিনকোনি লিকুইঃ ৩ ০ ড্রাম, ইনফিঃ চিরেতী ad ১২ অ উন্স ৪ ড্রাম মাত্রায় জল সহ দিনে ৩ ৪ বার, যকৎ পীড়ায় প্রয়োজ্য

৬১ ক্রিয়েজোটাই পিউরিফিকেটাই ৩ ড্রাম, মেম্বল ২ ড্রাম, থাইমল অর্ধ ড্রাম, স্পিরিট রেক্টিফায়েড ৪ আং মিশ্রিত কর আত্মাণ বা ইন্হেলেশন জন্য ব্যবহার্য ইহার কয়েক ফোটা লিণ্ট বা কটন উল বা তুলাব উপর ছড়াইয়া দিয়া তাহার আত্মাণ লইতে হয় বিবিধ ফুস্ফুসের পীড়ায় উপকারী

৬২ লিনিঃ বেলেডোনি ৩ ড্রাম, লিনিঃ একোনাইটাই ১ ড্রাম, স্পিরিট রেক্টিফায়েড ২ আং, একোয়া বোজ ad ৬ অ উন্স মিশ্রিত করত লোশন প্রস্তুত কর। ইহা লিণ্টে ভিজাইয়া প্রদাহিত স্থানে লাগাইয়া অয়েল সিঙ্ক দিয়া আবৃত রাখিলে উপকার দর্শে। চর্ম হাজিয়া গেলে ইহার প্রয়োগ অবিধেয়।

৬৩ কিনাসিটিন ৩ গ্রেন, কফিইন ১ গ্রেন্ কুইনী হাইড্রো-রোম ৩ গ্রেন। একত্রে ১ পুরিয়া, হেমিক্রেনিয়াম প্রয়োজ্য

৬৪। কিনাজোনাই ১—১।০ ড্রাম, পটানী ব্রোমাইড ২—৪ ড্রাম, কফিইন সাইটোটম ২০—৩০ গ্রেন্, স্পিরিট ক্লোরোফর্ম ২ ড্রাম, জল ৮ অ উন্স মিশ্রিত করত অর্ধ অ উন্স মাত্রায় শিরঃপীড়ার



আক্রমণ কালে সেবা এবং তদনন্তর বোণের বিনাম কালে ২ ড্রাম  
মাত্রায় প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় ব্যবহার্য।

৬৫ আর্গটিন ১ ০ গ্রেণ, একষ্ট্রাঃ ক্যানিবিগ ইণ্ডিকা ৬  
গ্রেণ, কুইনী সল্ফ ৩ গ্রেণ। একত্রে ১ বটিকা। ৪৬ ঘণ্টাস্তর  
মেনোবেজিয়া বোণে ব্যবহার্য।

৬৬ লাইকন মর্ফিনী বাইমেকোনেটিস, ও টিং ডিজিটেলিস  
প্রত্যেকে ৩ ড্রাম, টিং হ্যাগামেলিস অর্ক আউন্স, টিং হাইড্রাস্টিস,  
৬ ড্রাম, গ্লিসিবিগ পিওন acd ৩ আউন্স। মাত্রা অর্ক হইতে এক ড্রাম  
জল সহ ৩৪ ঘণ্টাস্তর সেবনে মেনোরেজিয়া পীড়ায় ফলোপদায়ী  
হয়।

৬৭। ফেরি রিডক্টাই ২ গ্রেণ, ফেরি আর্সিনিয়োটস ৬ হইতে  
১২ গ্রেণ, কুইনী সল্ফেটিস ১।০ গ্রেণ, পল্ভ রিয়াই ১।০ গ্রেণ,  
কার্বলিক এসিড অর্ক মিনিম। একটু জল দিয়া ১ বটিকা করিবে।  
এইরূপ ১২ বা ১৪ বটিকা প্রস্তুত করিয়া দিনে ২।৩ বার সেবা।  
নিউরালজিয়া বা স্নায়ুশূল এবং পুরাতন জ্বর, শীহা আদিতে  
ব্যবহার্য।

৬৮। ফিনেজোনাই ১ ড্রাম, একষ্ট্রাঃ কোকী লিকুইড ৬ আং,  
কোডেইন ৩ গ্রেণ, গ্লিসিবিগ এট্ একোয়া acd ২ আউন্স। ১ ড্রাম  
মাত্রায় জল সহ বিবিধ প্রকার স্নায়ুশূলে প্রয়োজ্য।

৬৯ একষ্ট্রাঃ বেগেডোনা ৬ গ্রেণ, ফেরি আর্সিনিয়োটস  
১২ গ্রেণ, কোডিইন ৬ গ্রেণ, এসিটানিলিডাই ৩ গ্রেণ। একত্রে  
১ বটিকা। বিবিধ, বিশেষতঃ অন্তঃকোষ্ঠস্থ স্নায়ুশূলে উপকারী।

৭০। এমোনি ব্রোমাইড, সোডি ব্রোমাইড প্রত্যেকে অর্ক  
ড্রাম, সিম্পল সিরপ ১ আং, একোয়া মেডি পিপ্ acd ২ আং।

১ ড্রাম মাত্রায় শয়নকালে, ১ ত্রিভুজমূকাইয়া উঠা ও নিজাবস্থায় ভয় পাওয়া প্রভৃতিতে ২।৩ বৎসর বয়স্ক বাগকেব পক্ষে উপকারী। বয়সানুসারে মাত্রা বৃদ্ধি করা কর্তব্য।

৭১ এমোনি ব্রোমাইড ১ ড্রাম, পল্ড রিসাই ৪৫ গ্রেণ, মোডি বাইকার্ব, ১ ০ ড্রাম, সিরপ জিঞ্জর ৪ ড্রাম, একোয়া মেসি পিপ ৪ আউন্স মাত্রা ২ ড্রাম, জল সহ ৮ ১০ বৎসবেষ বালককে দিবে নাইট টেবল অর্থাৎ রাত্রিতে ভয় পাওয়া ও কানিয়া উঠা প্রভৃতিতে উপকার দর্শে

৭২ একষ্ট্রাঃ সিনকোনি লিকুইড ১ আউন্স, একষ্ট্রাঃ কোকী লিকুইড ২ আং, টিং সিনকোনা ২ আং, স্পিবিট এমোন এবোমেট ২।০ আং, টিং ডিজিটেলিস ২ ড্রাম। একত্রে মিশ্রিত করত ১—২ ড্রাম মাত্রায় জল সহ সেবন করিলে অহিফেন অভ্যাস বিদূরিত করিবার সাহায্য হয় আবশ্যকানুসারে ১২ বা ৩ ঘণ্টাস্তর সেব্য

৭৩ ওলিয়াই হাইডার্জিরাই ১।০ ড্রাম, অক্সুয়েন্টম কোনিয়াই ২ আং, একষ্ট্রাঃ বেলেডোনা অর্ধ ড্রাম একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত কর। অর্কাইটিস ও ইপিডিডিমাইটিস পীড়ায় ঋহিক প্রয়োজ্য

৭৪। মোডি ব্রোমাইড ৩ ড্রাম, পটাশ ব্রোমাইড ৩ ড্রাম, পটাশ আইয়োডাইড ১ ড্রাম, টিং বেলেডোনা ৩ ড্রাম, একোয়া ক্লোরোফর্ম ৮ আউন্স মাত্রা ২ ড্রাম, জল সহ দিনে ৩ বার সেব্য। ওভেবির প্রদাহে উপকারী।

৭৫। পটাশ আইয়োডাইড ৮০ গ্রেণ, পটাশ ব্রোমাইড ১৪০ গ্রেণ, সিরাপ অবান্সিয়াই ১ আং, একোয়া ক্যান্ফর ৭ আউন্স অর্ধ আউন্স মাত্রায় দিনে ২৩ বার সেব্য ফেমিয়েল প্যারালিসিস প্রভৃতি পীড়ায় ব্যবহার্য

৭৬। হাইড্রাজ্জ এমোন ক্লোরাইড ৩৫ গ্রেণ ওলিয়াই পিটো-  
লিয়াই ২।০ ড্রাম, বালসম পেক ১ ড্রাম, ল্যান্ডোলিন বা ওর্ড ১  
আং একত্রে মিশ্রিত কর কেশমূক্ত স্থান কীট জন্মিলে বাহ্যিক  
প্রয়োজ্য। বিবিধ চর্ম পীড়াতেও উপকারী।

৭৭। পটাশ আইয়োডাইড ৮০ গ্রেণ, এনোনাইট টিংচর ২০—  
৩০ মিনিম, লাইবর এমোন এসিটেটিস ২ আং, মিবপ গলান্‌মিয়াই  
১ ০ আং, একোয়া ক্যাফন act ১০ আউন্স অর্ধ আউন্স মাত্রায়  
দিনে ৩ বা ৪ সেবা পেরি অষ্টাইটিস পীড়ায় উপকারী। বোম  
পূর্বাতন হইলে এনোনাইট বর্জন করিবে।

৭৮। ওলিয়াই ইউকালিপ্টাই ১ আং, ওলিয়াই টেনিবিধিনী  
২ আং, থাইমল অর্ধ ড্রাম স্পিরিটস ল্যাভাণ্ডিউলী act ৩ আং  
একত্রে মিশ্রিত কর ঐ কপে গৃহেব মনে ছড়াই দিবে।  
ইন্‌ফ্লেমেশন ও গলাব ভিতর স্প্রে আকারেও ব্যবহৃত হয় ছপিং  
কফ, ক্রপ ও ডিপ্‌থিরিয়া আদিতে ব্যবহৃত হয়।

৭৯। লাইকব গুটগিনী সল্ফ ১৫ মিনিম, ক্লোরাল হাইড্রেট  
৩০ গ্রেণ, লাইকর স্কিনী ১২ মিনিম, মিবপ সিম্পল ১ আং, জল  
২ আং মিশ্রিত কর মাত্রা ২ ৩ বৎসরের বালকের পক্ষে ১ ড্রাম।  
ছপিকফ পীড়ায় কাসিন উপা উপা উপা উপা উপা উপা উপা উপা উপা  
সাবধানে ব্যবহৃত করা উচিত।

৮০। এমোন ব্রোমাইড ১ ড্রাম, সোডা বোমাইড ১ ড্রাম,  
মিবপ ক্লোরাল ৪ ড্রাম, কিনাজোনাই অর্ধ ড্রাম, একোয়া ব্রোমোফর্ম  
৪ আং একত্রে মিশ্রিত কর ১—২ ড্রাম মাত্রায় ২ ৩ বা  
৪ বৎসর বয়স্ক বালকের উপযোগী ছপিকফ আদি পীড়ায়  
ব্যবহার্য।

৮১। এমোন ব্রোমাইড ২ ড্রাম, কোকেইন হাইড্রোক্লোরেট ৫-১০ গ্রেণ, গ্লিসিট্রিনাই এসিডাই কার্বলিসাই (অথবা বোরেসিস্) ৪ ড্রাম, একোয়া রোজ বা শুদ্ধ জল ১০ আং। মিশ্রিত করিয়া গার্গল বা স্পে আকাবে ফ্যাবিনজাইটিস ও ল্যারিনজাইটিস আদি গলাভ্যস্তবের পীড়ায় ব্যবহার্য্য।

৮২ হাইড্রাইডাই পানকোরিডাই ১ গ্রেণ, এমোনিয়াই ক্লোরিডাই ৭ গ্রেণ, গ্লিসিট্রিনাই এনিউমিনিস ১ আউন্স। মিশ্রিত কর, তুলিতে ভিঞ্জাইয়া গলাব মধ্যে বাগাইতে হয়। বিবিধ প্রকার গলাভ্যস্তবের পীড়ায় ব্যবহার্য্য।

৮৩ এমোন কার্ব ১ ড্রাম, স্পিরিট এমোন এবোমেট ৪ ড্রাম, পটাশ আইয়োডিড ১ ড্রাম, হেজিনি ১ আং, গ্লিসিট্রিনাই এট্ একোয়া ৬ আং মিশ্রিত কর। ২ ড্রাম মাত্রায় ১ বা ২ আং জল সহ দিনে ৪ বার সেব্য। ফ্লিবাইটিস রোগে থ্রুসিস দ্রবীভূত করিবাব জন্ত প্রযুক্ত হয়।

৮৪। পটাশ বাইকার্ব ৩ ড্রাম, লাইকব মফি' হাইড্রোক্লো ৩০ মিনিম, একোয়া লবোসিরেমাই ১ ড্রাম, একোয়া ডিষ্টিলেটা ৪ আং মিশ্রিত কর। ৪ ড্রাম মাত্রায় লেবুর বস সহ মিশাইয়া উচ্ছলনাবস্থায় সেব্য। জ্বর, কাসি প্রভৃতিতে ব্যবহার্য্য।

৮৫ ক্রিয়েটোটি পিওব ১২ মিনিম, স্পিরিট সিনেমেন ৩ ড্রাম, টিং অরান্সিয়াই ২ আং, গ্লিসিট্রিন ১ আং ৪ ড্রাম মাত্রায় জল সহ সেব্য। থাইসিস্, কক্ষক'স ও অন্যান্য কক্ষি বোগে ব্যবহার্য্য।

৮৬। লাইকব মফি' হাইড্রোক্লোঃ ৪০ মিনিম, টিংচব ভিবেট্রাই ভিবিড ১০ মিনিম, লাইকব এমোন এসিটেট ১০ ড্রাম, ভাইনম



এন্টিমোনিয়াম ১ ড্রাম, একোয়া ক্যাম্ফর ad ৪ আউন্স তর্ক  
আউন্স মাত্রা, তরল পুরাইটিস আদিতে ব্যবহার্য

৮৭ টিং ডিফ্রিটেবিলিস ২ ড্রাম, টিং সিলি ১ ০ ড্রাম, পটাশ  
আইবোডাইড ১ ড্রাম, ডিকব্রন গোল্ডেনবাই ৫ আং অর্ধ  
আউন্স মাত্রায়, দিবসে ৩ বা ৪ বার পূর্ণা পীড়ায় সিবস আশোষণার্থ  
প্রযুক্ত হয়

৮৮ সোডাই বা পটাশিয়াই আইগোডাইডাই ১ ড্রাম, পটা-  
শিয়াই কার্বনেটিস ৪ ড্রাম, টিং একটিয়া বেসিমোটা ২ ড্রাম,  
একোয়া ক্যাম্ফর ৬ আউন্স ৪ ড্রাম মাত্রায় দিবসে ৩ বার,  
প্লুরোডিনিয়া পীড়ায় ব্যবহার্য

৮৯ লাইকব ইফিই হাইড্রেট্রেং ১ ড্রাম, লাইকব  
এমোনিয়া এসিটেটন ২ আং, ভাইনাই এন্টিমোনিয়াম ২—৩  
ড্রাম, একোয়া ক্যাম্ফর ad ৮ আউন্স ১ আউন্স মাত্রায় নিউ-  
মোনিয়া পীড়ান প্রাপ্ত, কোষ্ঠ পরিধাবের পা, জ্বর, বেদনা ও  
কাসির উগ্রতা নিবারণার্থ প্রযোজ্য

৯০ স্পিরিট এমোন এবোমেট ১—১ ০ আউন্স, স্পিরিট  
ইথর মল্ফ ৬ ড্রাম, টিং ডিজিটেলিস ২—৩ ড্রাম, মল্ফ ৬০  
গ্রেণ, ভাইনম ইপি ক্যাক ৩ ড্রাম, টিং মিনকোনা ad ৬ আউন্স  
অর্ধ আউন্স মাত্রায়, ১ বা ২ আং জল সহ, পীড়ান অবস্থায় সারের ২ ৩  
বা ৪ ঘণ্টাস্থর সেবা নিউমোনিয়া পীড়ায় উত্তেজনার্থ প্রযোজ্য  
ইহার সঙ্গে লাইকব ক্লিকনিয়া ২ বা ২ ০ মিনিম বা টিং নল ৩ ৫ বা  
১০ মিনিম মাত্রায় দিলে বিশেষ উপকার হয়

৯১। ক্যাল্‌মাইণ্ড ম্যাগ্নিসিয়া, পাউডার উড্ চার্কোল,  
হাইড্রস পাবলিকাইড অব্ আয়রন প্রত্যেকে সম ভাগ অর্থাৎ অর্ধ

আউন্স, এক টম্ব্রাব পূর্ণ জল সহযোগে বিবিধ প্রকার বিষাক্ততায় প্রযুক্ত হয় ইহা পতিবিষ কপে কার্য্য করে

৯২ এসিড হাইড্রোসিয়ানিক ডিল ১ ড্রাম, লাইকব মফি' হাইড্রোক্লোঃ ২ ড্রাম, লাইকব বিষমথ ১ ০ আং ৩াইনম পেপ্সিন ad ৪ আউন্স ১ ড্রাম মাত্রায় পাকায় ক্ষতে, অজীর্ণে ও গর্ভাবস্থার বমনে উপকারী ।

৯৩ কোকেইন ১/২ গ্রেণ, বিসমথ কার্ব ১০ গ্রেণ, মফিনী ১/২ গ্রেণ, প্যাপেইন ১ গ্রেণ একত্রে ১ পুরিয়া আবশ্যকমত ২ ৪ ঘণ্টাস্থব গর্ভাবস্থাব বমনে প্রয়োজ্য অল্প কারণজাত বমনেও উপকার করে

৯৪ বিসমথ'ই ক'বো'নেটিস ৬ ড্রাম, ভিটলম্ ওভাই, ওটিয়াই অডি ভী প্রত্যেকে ২৪০ আং, এসিডাই কার্বলিসাই ৩০ গ্রেণ, হেজিলিন ad ৮ আং মিশ্রিত কব, ইহার অর্দ্ধ আউন্স, গ্লিসিবিং গ্লিসিবিং দ্বারা মলদ্বারে আবশ্যক মত পীচকারি দিবে সবদাজ প্রদাহে শৈশ্বিক বিলম্বী আবৃত করত বেদনা ও যন্ত্রণাদি উপশমিত হয়

৯৫ টিং নিউসিস্ ভগিনী ২ ৩ ড্রাম, এসিড বোবিক ২ ড্রাম, টিং বেলেডোনা ১ ০ ড্রাম, টিং হায়সায়ামাই ১ আং, ইনফি বকু ad ১০ আউন্স মাত্রা অর্দ্ধ আউন্স । ইহাতে মূত্রাশয়ের উগ্রতাবি উপশম, পদার বল বিধান ও মূত্রের পচন নিবারণ করে জলসহ দিবসে ২ ৩ বা ৪ বার প্রয়োজ্য ।

৯৬ কোকেইন ৩ গ্রেণ, হাইড্রাজ' এমোন ক্লোরাইড ১৫ গ্রেণ, গ্লিসাই অক্সাইড ১ ড্রাম, ভ্যাসিলিন এম্বাই ১ আউন্স একত্রে মলম । কণ্ডুয়ন উপশমার্থ বিবিধ চর্ম পীড়ায় প্রয়োজ্য

৯৭ এসিড স্যালিসিলিক ৯ ড্রাম, স্কিমাই অমাইড ৩ ড্রাম, গ্লিসিরিনাই এমিলাই ৩ আং ওয়াইটস্ পীড়ায় প্রযোজ্য

৯৮ হাইড্রাজ'সব ক্লোরাইড ৩০ গ্রেণ, আইয়োডিন পিওর ১—১ গ্রেণ, সিম্পল অয়েন্টমেন্ট ২ আং একত্রে মলম, মোরামে-সিস্ পীড়ায় বাহ্যিক প্রয়োগ উপকারী

৯৯ সোডি স্যালিসিলেট ৫ ১৫ গ্রেণ পটাশ বাইকার্ব ১৫ —২৫ গ্রেণ, লাইকব মর্ফি হাইড্রোক্লো ৫ ১০ মিনিম, কাম্ফর ওয়াটার ১ আউন্স একত্রে এক মাত্রা এইরূপ দিনে ৩ ৪ বার, রিউমেটিজম বা তরুণ বাত রোগে ব্যবহার্য

১০০। সোডি বা পটাশ আইয়োডিডাই ২ ড্রাম, সোডি বাইকার্বনেটিস ৪ ড্রাম, পটাশ বাইকার্ব ১ আং, লাইকব আর্সিনিকেলিস ১ ০ ড্রাম, ডিক্টাই সার্জি কং ad ২০ আং অর্ধ আউন্স মাত্রায়, আহাবেদ পব, দিবসে ২ ৩ বার সেব্য পুরাতন বাত পীড়ায় মহোপকারী

১০১ কুইনী সল্ফ ১ ড্রাম, এসিড হাইড্রোব্রোম ডিল ৪ ড্রাম, টিং এক্টিয়া ৪ ড্রাম, একোয়া ad ৬ আং মিশ্রিত কর মাত্রা ৩ ৪ ড্রাম জলসহ দিনে ৩ ৪ বার সেব্য গগোরিয়েল রিউমেটিজম পীড়ায় উপকারী।

১০২ এসিড স্যালিসিলিক, অয়েল টেবিলিহু ও ল্যানোলিন প্রত্যেকে ২ ০ ড্রাম, এডিপিস ৩ আউন্স একত্রে মলম বিবিধ বাত পীড়ায় স্থানিক মর্দনে বিশেষ উপকার দর্শে

১০৩। ওলিয়াই ফলোরেটাই ৩০ মিনিম, কডলিভ অয়েল ৬ আউন্স মিশ্রিত কর, ই বা ১ ড্রাম মাত্রায় ছন্ধ বা সর সহ আহাৰান্তে সেব্য। বালকগণেব রিকেটস্ পীড়ায় ব্যবহার্য।

১০৪। কোকেইন ২ গ্রেণ, হাইড্রাজ' অক্সিডাই ক্রাই ১০ গ্রেণ, ড্যামিলিন ক্রাই ৩ ড্রাম একত্রে মিশ্রিত করত ষ্টাই বা অঞ্জনীৰ উপর দিনে ৩ বাব লাগাইলে উপকার হয়

১০৫। সোডি আইয়োডাইড ১ ড্রাম, পটাশ আইয়োডাইড ২৪ গ্রেণ, এমোন আইয়োডাইড ২৪ গ্রেণ, লাইকর অসিনিকেলিস ৩০ মিনিম, মিসিরিণ পিওর ২ ড্রাম, ইনফিঃ ক্যালক্স ৫ আউন্স। অর্ধ আউন্স মাত্রায় অল্প জলসহ আহাবেব পব দিনে ২৪ বার সেব্য গৌণিক উপদংশে উপকারী

১০৬ টিং ফেরি পাবক্লোরাইড ২ ড্রাম, মিসিবিলাই এলিউ-মিনিস ৪ ড্রাম, জল ১২ আং একত্রে মিশাইয়া কবল করিতে দিবে তরুণাবস্থা একটু অগত হইলে ও গলান মধ্যে শৈল্পিক কিলী আবক্রিম থাকিলে এই সফোটক কবল বিশেষ উপকারী ইবিথিমেটস্ ও ফ্লোগমোনস্ টনসিলাইটিস পীড়ায় ব্যবহার্য।

১০৭ টিং আইয়োডিন বা টিং ষ্টিল ২ ড্রাম, মিসিবিণ ১ আং একত্রে মিশাইয়া তুলি দ্বাৰা টনসিল বিরুদ্ধিতে প্রয়োগে উপকার দর্শে

১০৮ এসিড ক্রাইসোফানিক ১ ড্রাম, হাইড্রাজ' এমোন ক্লোরাইড ২০ গ্রেণ, ল্যানোডিন পি ওব ১ ড্রাম, এডিপিস বেনজোয়েট ৬ ড্রাম, লাইকর কার্ব ডিটারজেন্স ১০ মিনিম একত্রে মিশ্রিত করত মটম, বিবিধ প্রকার চর্ম পীড়ায় বাহ্যিক প্রয়োগ্য টনিক বা রিংওয়ামে' বিশেষ উপকারী

১০৯ হাইড্রাজ' বিন আইয়োডাইড ৩ গ্রেণ, হাইড্রাজ' পাবক্লোরাইড ১৫ গ্রেণ, স্পিরিট রেকটিফায়েড ১০ ড্রাম, একোয়া ডিষ্টিলেটা ৮ আউন্স। একত্রে মিশ্রিত ও দ্রবীভূত কর।



বিংওয়ার্ম ও অন্যান্য চর্ম পীড়ায় তুলি সহ লাগাইতে ও মর্দন কনিত হয়

১১০। কালো ডিয়ন ২ ড্রাম, বার্বলিক এসিড ক্রিষ্টাল ১ ০ ড্রাম, কোকেইন ৫ গ্রেণ একত্রে মিশাইয়া সরু তুলী দ্বারা ক্ষয়িত দস্তে লাগাইয়া, তন্মধ্যে একটু কার্পাস তুলী দিয়া রাখিলে টুথেবু বা দস্তশূন্য নিবারিত হয়।

১১১। লাইকর মর্ফি হাইড্রোক্লোঃ ১ ড্রাম, সোডি ব্রোমাইড ৪৫ গ্রেণ, সিবপ অবান্সিয়াই ৩ ড্রাম, একোয়া ক্লোরোফর্ম ২ আউন্স। ইহাব ৬ অংশ বা অর্ধেক শয়ন কালে সেব্য। নিদ্রা না হইলে ২৩ ঘণ্টা পরে আর এক মাত্রা সেব্য টাইফয়েড প্রভৃতি জ্ববে নিদ্রা তখনন্যার্থ ব্যনহার্য্য

১১২ এসিড সল্ফ এবোমেট ৩ ড্রাম, টিংচব ওপিয়াই ২ বা ২ ০ ড্রাম, টিং ক্যাটিকিউ ৪ ড্রাম, একোয়া ক্লোরোফর্ম ১ ০ আং ১ আং মাত্রায় দিনে ৩ বার সেব্য টাইফয়েড জ্বাব উদরাময় নিবারণার্থ প্রয়োজ্য

১১৩। হেজিলিন ৩ আং, স্পিবিট বেকুটিফায়েড ২ ০ আং, একোয়া ডিষ্টিলেট ৪ ০ আউন্স একত্রে লোশন ভেরিকো-সিল পীড়ায় প্রত্যাহ প্রাতে এতদ্বারা স্ক্রোটম স্পঞ্জিং করিবে।

১১৪। লিনিমেন্ট ক্যালসিস্ ৭ ০ ড্রাম, অয়েল ইউ-ক্যালিপ্টাই ৪ ড্রাম, ক্যালেমিনা প্রিপেয়ারেট ১ ড্রাম মিশ্রিত কর, ক্যামেলস হেয়ার ব্রশ দ্বারা মুখমণ্ডলে চর্মে (বসন্ত বোগে) ২৩ ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিবে।

১১৫। সোডি বাইকার্ব ৭—১২ গ্রেণ, হাইড্রাজ'পারক্লোবাইড ৬—১০ গ্রেণ, একোয়া ডিষ্টিলেট ২ আং জ্বীভূত করত

১ বা ২ ঘণ্টাস্থব ইয়োগো ফিবরৈ সেবন করাইলে মহোপকার করে।

## ম্যাগ্নিটো ইলেকট্রি সিটির ব্যবহার।

নিম্নলিখিত পীড়া সমূহে ম্যাগ্নিটো-ইলেকট্রি সিটি প্রয়োগে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় যে যে পীড়ায়, যেকোন ভাবে উহার প্রয়োগ কবিত্তে হয়, তাহার সবিশেষ বিবরণ নিম্নে বিবৃত হইল

এক্ষিক্রিয়া বা শ্বাসাববোধ — জল মগন, বিষভক্ষণ, মস্তকে বা পাকায়ণে আঘাত, শ্রুতাপান জনিত গভীর মত্ততা প্রভৃতি কাবণে মনুষ্য মৃতবৎ প্রতীয়মান হইলে, তাড়িত গতি গ্রীবার পশ্চাত্তাগে, পাকায়ণে ও হৃৎপিণ্ডের উপর সঞ্চালিত করিবে। প্রথমে মধ্যম শক্তিতে তাড়িত প্রয়োগ আরম্ভ করিয়া, জীবনী শক্তির পুনরাবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত, উহার বেগ বা শক্তি বদ্ধিত করিবে রোগীকে উষ্ণ ও শুষ্ক বাথিবার উপায় সকল অবলম্বন করিতে অবহেলা করিবে না যখন বোগী যথেষ্ট পরিমাণে চেতনা লাভ করিবে, তখন তাহাকে এক টেবিল চামচ পূর্ণ (৪ ড্রাম) গরম জল ও ত্রাণ্ডি কয়েক মিনিট অন্তর, চর্ম্ম জল গরম ও আর্দ্র না হওয়া পর্যন্ত, দিবে তদনন্তর সম্পূর্ণ বিশ্রাম ও নিস্তকতা বোগীর আরোগ্য লাভের জন্য অতি আবশ্যিক

এপোপ্লেক্সী বা সংশ্রাম মস্তকের কোন চর্ম্ম পর্যন্ত জল দ্বারা আর্দ্র করিবে, তৎপরে উভয় পার্শ্বে এক একটা পোশ সংস্থাপন করত মৃদুগতি বা শক্তিয়ুক্ত তাড়িত প্রয়োগ করিবে।

ক্রমশঃ, রোগী যতদূর সহজে সহ্য করিতে পারে, ততদূর শক্তি বৃদ্ধি করিবে। এই প্রক্রিয়া দিবসে ৩ বার ১৫ মিনিট পর্যন্ত করিবে।

এজমা বা শ্বাসকাস।—মধ্যম পশুকার উপস্থিত উপর মুদ্র শক্তিমুক্ত অর্থাৎ পজিটিভ পোল সংস্থাপন করিবে। অপরটি অর্থাৎ তীব্র শক্তিবিশিষ্ট নিগেটিভ পোল টী গ্রীবার বাম ভাগে ব মধ্যস্থলে সংস্থাপন করিয়া ৫ হইতে ১৫ মিনিট পর্যন্ত মধ্যম শক্তিতে দিবসে কয়েক বার প্রয়োগ করিবে।

এফোনিয়া—স্বনাভাব —পজিটিভ পোল হস্তে ধারণ করান হইয়া, নিগেটিভ পোল দ্বারা কণ্ঠের উভয় পার্শ্ব ও সম্মুখ ভাগে তাড়িত গতি সংস্থাপন করিবে।

এন্জাইনা পেক্টোরিস বা হৃৎশূল গ্রীবার পশ্চাত্তাগে অথবা মেরুদণ্ড ( স্ক্লেব্র ঠিক নিম্নভাগ ) একটা পোল রাখিয়া অপরটি বক্ষের উপরে প্রথমে মধ্যম শক্তিতে প্রয়োগ করিবে এবং ক্রমশঃ উক্ত শক্তি একটু একটু করিয়া বৃদ্ধি করিবে। আক্ষেপ নিবারণ হইলেও অল্পক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োগ করিবে।

এনাসার্কি বা সার্কোজিক শোথ।—দক্ষিণ পোল পদের নিম্নে রাখিয়া, বাম পোল পাকশয়ে, যকৃত ও অস্ত্রের উপর দিয়া পদের নিম্ন পর্যন্ত ও পৃষ্ঠে লাগাইবে অর্থাৎ সংস্থাপিত করিবে। ও তি পিন প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্যন্ত মধ্যম শক্তি প্রয়োগ করিবে।

এবসন বা গর্ভশ্রাব রক্তস্রাব নিবারণের জন্য একটা পোল কাটিদেশে অর্থাৎ যেখানে রক্তনা অধিক অনুভূত হয়, সেইখানে সংলগ্ন করিবে এবং অপর ইন্সিউমেন্টেড পোল জরায়ুর মুখে সংলগ্ন করিয়া মুদ্র গতিতে অতি সাবধানে তাড়িত প্রয়োগ করিবে। উপকার হয়।

৫ ভবতী স্ত্রীলোকদিগের জরায়ুর উপর তাড়িত শক্তি লাগিলে  
৫ ভ্রূণাব হইতে পারে।

এমিসিয়ার বা স্পর্শহীনতা —পজিটিভ পোল দক্ষিণ হস্তে  
ধারণ কবিতা নিগেটিভ পোল বামপদে সংলগ্ন কবিতা তাড়িত  
গতি প্রয়োগ করিবে কয়েক বাব প্রয়োগের পর পজিটিভ পোল  
বাম হস্তে ধারণ কবিতা নিগেটিভ পোল দক্ষিণ পদে লাগাইবা  
তাড়িত শক্তি প্রয়োগ করিবে

এমিনোরিয়া বা রজোবোধ —একটি পোল ইণ্ডিয়া ববার  
দ্বারা আচ্ছাদিত কবিতা, জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শে, এরূপ ভাবে  
স্থাপন করাইবে ও তৎপরে অপর পোল ক্রমশঃ পাকায়ের নিম্নভাগ  
হইতে উরু, কোমর ও কুঁচকী প্রভৃতি স্থানে সঞ্চালন করিবে

নিভব এফেক্টন বা যকৃতের গীড়া —পদের নিম্নে দক্ষিণ পোল  
সংলগ্ন করিবে ও স্পর্শবিধা হইলে উহা অল্প গবম জলের ডিসে  
ডুবাইয়া রাখিবে, তৎপরে বাম পোল যকৃত ও সমস্ত উদর ও পৃষ্ঠের  
নিম্ন পর্য্যন্ত লাগাইবে। প্রত্যহ অর্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত মধ্যম শক্তি  
যোগে তাড়িত প্রযোজ্য।

এটিউ বা জ্বর। —গবম জলের ডিসে বোগীর পদ ও মেসিনের  
দক্ষিণ পোল সংস্থাপন করিবে, তৎপরে অল্প পোল দ্বারা সমস্ত  
শরীরে অর্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাড়িত সঞ্চালন করিবে বাহ্য বায়ু  
সংস্পর্শে শীত বোধ না হয়, তৎপরে সাবধানতা অবলম্বন কর্তব্য।

ব্রুসাইটিস্—জরকামি —দক্ষিণ পোল পৃষ্ঠের উপর অর্থাৎ  
স্কন্ধের মধ্যে সংস্থাপন কবিতা, অল্পটী সমস্ত বক্ষের উপরে ও  
কণ্ঠে মৃদু শক্তিতে প্রয়োগ আরম্ভ করত ক্রমশঃ উক্ত শক্তি  
বর্ধিত করিবে।



বিলিয়াম কম্পেন্টম্ বা টেক্সিকাস্থতা — বাম পোল যকৃৎ, পাকায় ও সমস্ত উদরে সংস্থাপন করিবে, তৎপরে দক্ষিণ পোল পৃষ্ঠের নিম্নদেশে এক হইতে দুই মিনিট পর্য্যন্ত বুদাইবে তদনন্তর দক্ষিণ পোল পদের নিম্নে রাখিয়া, অল্পটীক দ্বারা পৃষ্ঠ, যকৃৎ ও পাকায় প্রদেশে কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত তাড়িত প্রয়োগ করিবে প্রত্যহ ১ বার মধ্যম শক্তি প্রয়োগ

বোরিয়া বা তাণ্ডব বোগীকে দুই হাত দিয়া একটা পোল ধরিতে বলিবে, পরে অল্প পোল পৃষ্ঠবংশ, যকৃৎ ও উদরে বুদাইবে। বোগীব পদ গবম জলের পাत्रে ডুবাইয়া এবটী পোল তাহার মধ্যে ধরিয়া রাখিবে ও অল্পটী বোগীব পৃষ্ঠের মধ্যস্থলে সংস্থাপন করিবে। প্রত্যহ ১৫ মিনিট মৃদু শক্তিরোগে আবস্ত করত ক্রমশঃ উহা বর্দ্ধিত করিবে।

ক্যাটালেপ্সী-স্পন্দ বাহিত্য।—গ্রীবাব পশ্চাত্তানে একটা পোল রাখিয়া অল্পটী পাকায়ের উপর ও পদতলে প্রয়োগ করিবে।

ক্লোবোমিস্ বা নীলপ্রদব প্রথমে সাধারণ গতি প্রয়োগ করিবে তৎপরে রোগী ও তোক হস্তে এক একটা পোল ধরিবে তৎপরে জনৈক সাহায্যকারী উহার এক হস্ত ধরিয়া তদ্বারা পাকায়, ফুস্ফুস, অঙ্গ ও যে যে যন্ত্রের ক্রিয়া বিশৃঙ্খল থাকে, তাহাতে প্রয়োগ করিবে।

কনস্ট্রিকশন বা কোষ্ঠবদ্ধ।—বাম পোল পৃষ্ঠের মধ্যস্থলে রাখিয়া স্পাইনেল মার্ভের উপর স্থাপন করিয়া, অল্পটী পাকায়ের মধ্যদেশে হইতে নিম্নভাগে ও সমস্ত উদরে লাগাইবে প্রত্যহ দিনে এক বা দুই বার, যেক্ষণ শক্তি মৃদু হয়, সেইরূপ দিবে।

ধাম বা নিগেটিভ পোল জিহ্বাব অগ্রভাগে সংস্থাপন করত ও অন্তর্গত মলদ্বারে রাখিয়া মুহুঃ প্রতিযোগে তাড়িত প্রয়োগ আবশ্য করিয়া ক্রমঃ বর্দ্ধিত করিতে হয়। ইহাতে অবিলম্বে মল নিঃসৃত হয়। ঐলম্বিক বিদ্যুৎ সঞ্চারণ নিঃস্রবের তাড়িত ক্রিয়া বর্দ্ধিত হওয়ায় অস্ত্রের শক্তিহীনতা তিবোহিত হয়।

ক্রিটিক্যাল পিবিয়ড বা আর্চব বিলোপ কাল — দক্ষিণ কন্ডাক্টর বা পোল পৃষ্ঠের মধ্য দেশে বা বেদনান্বিত স্থানে সংস্থাপন করত অন্তর্গত দ্বারা কুচকোব উপর ও বাহ্য জননেজিয়ের উপবিভাগে ( পিউবিস অস্থির উপর ) এবং একটা ইন্সিউলেটেড পোলা জ্বায়ুব মধ্যে দিয়া তাড়িত প্রয়োগ করিবে। উষ্ণ জলে পদদ্বয় নিমজ্জিত রাখিয়া তাহাতে নিগেটিভ সংস্থাপিত করিবে এবং অন্তর্গত দুই হস্ত দিয়া ধরিয়া রাখিবে। এইরূপ ভাবে প্রত্যহ ৫-১৫ মিনিট পর্য্যন্ত তাড়িত প্রয়োগ করিতে হয়। শ্বেত প্রদ-বেও এই প্রক্রিয়া অবলম্বনীয়, কিন্তু যোনি বা জ্বায়ুতে ইন্সিউলেটেড কন্ডাক্টর দিবে না। অত্যধিক শোণিত স্রাব বা কষ্টরূপে পীড়ায়ও এই উপায় গ্রহণীয়। জ্বায়ুব উদীপনা বশতঃ আক্ষেপ ও গুল্ম বায়ু উপস্থিত হইলে পদ ও ক্রম পোল উষ্ণ জলপূর্ণ গামলায় স্থাপন করিবে এবং অন্তর্গত পোলা দুই হস্তে ধারণ করিবে। যতদূর সহ্য হয় তদ্রূপ ভাবে তাড়িত প্রয়োগ করা যায়। পৃষ্ঠবংশ আক্ষেপ দ্বারা আক্রান্ত হইলে দক্ষিণ পোল গ্রীবাব পশ্চাৎভাগে সংস্থাপন করত অন্তর্গত সমগ্র পৃষ্ঠে সঞ্চালন করিবে। যদি এইরূপ প্রয়োগে আক্ষেপ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে পোল বিপরীত ভাবে সংস্থাপন করত আক্ষেপ নিবারিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাড়িত প্রয়োগ করিবে।

উদর প্রদেশে ব পেনী সমুদ্র যদি অত্যন্ত তাপুষ্কিত হয়, তাহা হইলে দক্ষিণ পোল বোগীকে বাম হস্তে ধরাইয়া, অগ্রাটী পৃষ্ঠ-বংশের নিম্ন পর্য্যন্ত ও উদরের উপর বুলাইয়া তাড়িত প্রয়োগ করিবে। অবিবাহিত ফল না দর্শিলে ইহা ব বিপরীত আচরণ করিবে। কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত প্রয়োজ্য।

ব লক ল বেন — তাড়িত প্রয়োগ কোষ্ঠবদ্বের মত

ক্যান্সার বা কর্কটিকা — পজিটিভ বা পূর্ণণ পোল গ্রীবার পৃষ্ঠাভে রাখিয়া, এবং অগ্রাটী অক্ষুদের উপর রাখিয়া, এবং শক্তিশালী তাড়িত প্রয়োগ করিবে। প্রত্যহ একবার ৫০ মিনিট প্রয়োগ কর্তব্য।

ক্যাটার একনিক — প্রাচীন সর্দি দক্ষিণ কন্ঠবদ্বী বা ব দ্বর্তে ও অগ্রাটী নাসিকার উপরি ও পার্শ্বভাগে স্থাপন করত তাড়িত প্রয়োজ্য।

ক্লোপ বা বুংড়ি কামি — চোয়ালের নীচে গ্রীবার দুই দিকে দুইটী পোল রাখিয়া তাড়িত প্রয়োজ্য। ইহাতে স্ববয়স্ক সন্তোনে প্রসারিত হয়। ইহা ব পদে বাম পোল স্ববয়স্কের এক পার্শ্বে রাখিয়া, অগ্রাটী দ্বারা গ্রীবার নিম্নভাগ পর্য্যন্ত তাড়িত প্রয়োগ করিবে।

৮ ব লেনা — ওলাউঠা — একটী পোল পৃষ্ঠবংশের উপর রাখ ও অগ্রাটী উদরের উপরে প্রবল ভাবে সঞ্চালিত কর। ইহাতে সাধারণতঃ আক্ষেপ বা খান ধবা নিবানিত হয় এবং ৩৫ সময়ে অপরিমিত ভেদ উপশান্ত হয়।

শিশুগণের ওলাউঠায় — বাম বা নিগেটিভ পোল পৃষ্ঠের মধ্য ভাগে রাখিয়া অগ্রাটী দ্বারা সমস্ত উদর প্রদেশে তাড়িত প্রয়োগ

কর্তব্য পৃষ্ঠে বা কাটিতে বেদনা থাকিলে পোল বদলাইয়া দেওয়া বিধেয় ।

কন্ডাক্সসন্ বা ক্ষয়কাস ।—যোগীকে দুই হাত দিয়া দক্ষিণ কন্ডাক্টর ধরিতে বল, তৎপরে অন্য পোলটি আর্জ স্পঞ্জাবৃত কবতঃ জনৈক গাহাযাকারী দ্বারা গ্রীবার পশ্চাৎ ভাগ হইতে সমস্ত পৃষ্ঠবংশে সঞ্চালিত কর এবং যতদূর তাড়িত তেজ সহ হয় ততদূর ৫ মিনিট পর্য্যন্ত দেও তদনন্তর উক্ত পোলটি পাকায়, বক্ষে ও উদরে সঞ্চালন করত তাড়িত প্রয়োগ দিনে এক বা দুই বার ৫ মিনিট কবা কর্তব্য

ডায়াবিটিস বা বহুমূত্র —মূত্রগ্রন্থি অর্থাৎ কিড্‌নীর উপরে ও কাটির পার্শ্বে ও নিম্নদেশে তাড়িত প্রয়োগ কর্তব্য । তৎপরে দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ পোল ধারিয়া রাখিয়া, অন্যটি পীড়িত অংশে সঞ্চালন কবত তাড়িত প্রয়োগ বিধেয় অবশেষে পোল বদলাইয়া দিবে, প্রত্যহ ১৫ মিনিট । কিড্‌নীর ব্রাইটাখা পীড়াতেও এইরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বনীয় ।

ডিলিবিয়ম ট্রিমেন্স বা মদাত্মক মস্তক ভাল করিয়া জল দিয়া ভিজাইয়া লইয়া মুছশতীয়ুত তাড়িত প্রয়োগ্য । পোল ২টি দুই পার্শ্বে রাখিবে । ৫৬ মিনিট দেওয়া যায় । তদনন্তর দক্ষিণ কন্ডাক্টর গ্রীবার পশ্চাতে রাখিয়া অপরটি পৃষ্ঠবংশের নিম্ন পর্য্যন্ত এবং বক্ষঃ, উদর ও অঙ্গে সঞ্চালিত করিবে যতদূর শক্তি সহ করা যায়, ততদূর দেওয়া যায় ।

ডিস্‌পেপ্সিয়া বা অজীর্ণ —পৃষ্ঠের মধ্যদেশে পৃষ্ঠবংশের উপর দক্ষিণ পোল সংস্থাপন করত অন্যটি পাকায় ও অঙ্গোপরি বুলাইয়া তাড়িত প্রয়োগ করিবে প্রথমে মধ্যম শক্তি, দিনে দুই বার ২০ মিনিট পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে ।



ইরিসিপেল্যাস বা বিসর্গ।—অবঃ ও জল বা নিশাদল ও জল  
জ্বল দ্বারা পীড়িত অংশ আর্জ করত জনৈক গৃহাধ্যক্ষা দক্ষিণ  
কণ্ঠের টী তত্পরি বুলাইবে ও বোণী অণ্ড ১০ টি হই হস্তে পরিয়া  
রাখিবে। প্রত্যহ ৫—১৫ মিনিট এইরূপে তাড়িত প্রয়োগ  
বর্তব্য।

অপস্মার বা মৃগী —দক্ষিণ কণ্ঠের ও বোণীর পদ এক ডিম  
গরম জলে সংস্থাপন করিয়া, প্রয়োগকারী, তাহার বাম হাতে অণ্ড  
কণ্ঠের টী ধরিয়া বোণীর মস্তকে নিজ দক্ষিণ হস্ত বুলাইবে অণ্ডে  
স্পিরিট মিশাইয়া তদ্বারা মাথার চুল ভিজাইতে হয়। মধ্যম  
শক্তি ও কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য তৎপরে পৃষ্ঠবংশে,  
পাঁকায়, যকৃতে ও উদরে বাম কণ্ঠের সাধাবণতঃ প্রযুক্ত  
হইতে পাবে। বোণী যদি শীলোক হয় ও তাহার পীড়া অব্যবস্থিত  
বলিয়া আশঙ্কিত হয়, তাহা হইলে বাম কণ্ঠের জরায়ুর মুখে ও  
দক্ষিণ টী গ্রীবা হইতে পৃষ্ঠবংশের নিয়মের পর্য্যন্ত সঞ্চালিত করা  
যায়। মধ্যম শক্তি প্রতিদিন ১৫ মিনিট, বোণীবংশের মধ্যবর্তী  
সময়ে ব্যবহার্য্য।

ফিষ্টুলা ইর্ন এনো বা ডগনর।—বোণীকে প্রত্যেক হাতে  
এক একটা পোল ১০ মিনিট পর্য্যন্ত ধরিতে বলিবে, ইহাতে সর্ব্বাঙ্গে  
সীধাবণ ক্রিয়া প্রকাশ পায়, তৎপরে পীড়িত অংশে ও তাহার  
চতুর্দিকে প্রত্যহ ১০ মিনিট পর্য্যন্ত তাড়িত প্রয়োগ বিধেয়।

জেনিটাল ডিবিলাটি বা পুরুষদের দৌর্ব্বল্য —প্রত্যেক হস্তে  
এক একটা পোল ধারণ করাইয়া যন্ত্রটী ৪০ দার আন্দাজ বুলাইবে।  
তৎপরে দক্ষিণ পোল দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া, বাম পোল অণ্ড-  
কোষের নিম্নে রাখিবে ও যন্ত্রটী ৩ বা ৪ বুলাইবে। তৎপরে পোল

বদলাইয়া লইয়া ঐৰূপ কৰা আঙকোষেৰ নিম্ন হইতে পোৰা উঠাইয়া লইয়া, বামু খালি পায়েৰ নীচে রাখিবে এবং বাম হস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে ও দক্ষিণ হস্ত হইতে বাম হস্তে পোৰাটী পৰিবৰ্ত্তিত কৰাইয়া পূৰ্ণবৎ কৰিবে । অবশেষে দক্ষিণ কন্ডক্টৰ আঙকোষেৰ নীচে রাখিয়া, অৱ্ৰটী পৃষ্ঠবংশেৰ নিম্নে ও বক্ষের উপৰ বুলাইয়া তাড়িত প্ৰয়োগ কৰিবে । প্ৰথমে মৃদু শক্তি প্ৰয়োগ আৰম্ভ কৰিয়া ক্ৰমশঃ যতদূৰ সহ্য হয় বাড়াইবে । প্ৰাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া এইৰূপ কৰা কৰ্ত্তব্য ।

গ্যাংগ্ৰিন পচন —সমগ্ৰ দেহে মৃদু গতি তাড়িত প্ৰয়োগ কৰ ; বিশেষতঃ পাকানয়, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও পৃষ্ঠবংশে প্ৰয়োগ বিধেয় ।

হেড্যাক বা শিরঃপীড়া জল দিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে চুল ভিজাইয়া, দক্ষিণ কন্ডক্টৰ পায়েৰ নীচে ও অৱ্ৰটী মস্তকেৰ উৰ্দ্ধাংশে, অতি মৃদু শক্তিযুক্ত তাড়িত ২ ৪ মিনিট প্ৰত্যহ একবাৰ প্ৰয়োগ কৰ্ত্তব্য ।

পাকানয়েৰ ক্ৰিয়া বিশৃঙ্খলা জনিত শিবোবেদনায়া দক্ষিণ পোৰা পৃষ্ঠবংশেৰ মধ্যস্থলে অৰ্থাৎ পাকানয়েৰ পশ্চাভাগ যথায় স্থিত, তথায় সংস্থাপন কৰত অৱ্ৰটী মধ্যম শক্তিমোৰে পাকানয়েৰপৰি সঞ্চালিত কৰিবে । অবশেষে দক্ষিণ কন্ডক্টৰ পদেৰ নীচে ও অৱ্ৰটী মস্তকেৰ উপৰে সংস্থাপন কৰিবে, তৎকালে মস্তকেৰ চুল যেন আৰ্জ খাকে ।

মস্তব্য —মস্তকে ম্যাথ্ৰো ইলেকট্ৰিসিটী প্ৰয়োগ কৰিতে হইলে, প্ৰয়োগকাৰীৰ হস্ত যোগে ইলেকট্ৰিক ফ্লাইড্ প্ৰযুক্ত হওয়া শ্ৰেষ্ঠ ।

হেমৰেজ ক্ৰম দি ৫ংম বা ফুসফুস হইতে বক্তব্য ।—দক্ষিণ কন্ডক্টৰ গ্ৰীবাৰ পশ্চাতেৰ নীচে পৃষ্ঠবংশে সংস্থাপন কৰত বামটীৰ দ্বাৰা বক্ষের উপৰ নিম্নাভিগুণে সঞ্চালিত কৰিবে । বোণীকে লবণ

ଓ ଜଳ ଅଥବା ଫଟକିସି ଓ ଜଳ ଫାନ କବିତେ ଦିବେ ଲବଂ ଖଣ୍ଡେ  
ଅକ୍ଷେପ ଉପର କ୍ରିୟା ଦର୍ଶାୟିବା ଯଦ୍ୱା ସମ୍ଭବ୍ୟେବ ସମୁଦା ସିଦ୍ଧାନ କରେ ।  
ଅଥବା କଲୁଇୟେବ ଉପରେ ବାହୁଡେ ଓ ହାଟୁର ଉପରେ କ୍ଳମାଟ ବା ଡୋୟାଲେ  
ଦ୍ୱାରା ବାୟୁଞ୍ଜ ବାଧିବେ ଏହିକମ ଚିକିତ୍ସାମୟ ସଂସଦ ସଦ୍ୱା ଉଚ୍ଚା  
ନିଗାରିତ ହୟ ସ୍ନାୟୁ ମଞ୍ଜୁରେବ ନମତା ବିଧି ନାର୍ଥ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାଃ ଏକୋ  
ନାହିଟ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହୟ

ସନ୍ଧି ଓ ଅଳ୍ପ ସକଳ — ଉତ୍ତପ ଫୋଳ ସ୍ଥିତିର ଉପର ଓ ଚତୁର୍ଦିକେ  
ସନ୍ଧାନିତ କବିବେ

ଲେବର ବା ପ୍ରସବ ଦକ୍ଷିଂ କଞ୍ଚୁଟିବର ଭିତରେ ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ପଞ୍ଜ ଏବଂ  
ଧୂଳି ପୁସିଆ ଏବଂ ସେହି ଦିକ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପଞ୍ଜ ଧୂଳି ପୃଷ୍ଠବଂଶେବ ଅଧୋଭାଗେ  
ବେଦନାସିତ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାପନପୁରଃସବ, ଅଳ୍ପ କଞ୍ଚୁଟିବଟିର ଭିତରେ ଓ ପୂର୍ବୋକ୍ତ  
ଓ କାବେ ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ପଞ୍ଜ ପୁସିଆ ତାହା ଉଦବାଧଃ ପ୍ରାୟେନେବ ସମ୍ବୁଧ ଓ ନିମ୍ନ  
ଭାଗେ ବୁଲାଇୟା ତାଡ଼ିତ ଓ ଯୋଗ କରିବେ । ଅବାୟୁ ଓ ଯଦେଶେ ଓ ପୂର୍ବୋକ୍ତ  
ପୋକାବେ ତାଡ଼ିତ ଗତି ସନ୍ଧାନିତ କବିବେ ଦକ୍ଷିଂ କଞ୍ଚୁଟିର ପୃଷ୍ଠବଂଶେବ  
ଅଧୋଭାଗେ ସ୍ଥାପନ କରିତେ ହୟ ଅତି ସାବଧାନେ ଓ ଯୁକ୍ତଗତିବିନିଷ୍ଠ  
ତାଡ଼ିତ କ୍ଳେଶ ନିଶ୍ଚୟ ଯୁକ୍ତକେ ସନ୍ଧାନିତ କବା ସାହିତେ ପାବେ ସାଧାରଣ  
ତାଡ଼ିତ ପ୍ରୟୋଗ ଯୁକ୍ତଭାବେ ଆବସ୍ଥ କବତ କ୍ରମଃ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ରିୟା  
ତାଡ଼ିତ ବଳ ପରିମିତଭାବେ ବୁଦ୍ଧି କବିବେ

୮ ନିଉରାଲ୍‌ଜିଆ ବା ସ୍ନାୟୁଶୂଳ ଦକ୍ଷିଣ କଞ୍ଚୁଟିର ପଦେବ ନିମ୍ନେ ସ୍ଥାପନ  
କରତ ପ୍ରୟୋଗକାବୀ, ନିଜେବ ବାମ ହସ୍ତେ ବାମ କନ୍ଦୁକ୍ଟର ଏହି କବିୟା,  
ତାହାର ଦକ୍ଷିଂ ହସ୍ତ ଧୂଳିତ ଅଂଶେବ ଉପର ସନ୍ଧାନିତ କରିବେ ଏହାତ  
ସନ୍ଧାନ ଯୁକ୍ତ ତାଡ଼ିତ ପ୍ରୟୋଗ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦ୍ୱାରେ ବାମ କନ୍ଦୁକ୍ଟର  
ପୃଷ୍ଠବଂଶେର ସମଗ୍ର ଅଂଶେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଯଦିକେ ହୁଏ ହସ୍ତ ଦିଆ  
ଅପର କନ୍ଦୁକ୍ଟରଟି ଧରିତେ ବାଧିବେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ପ୍ରାୟଶ ଶାନ୍ତିଯୁକ୍ତ

তড়িত প্রয়োজ্য। প্রত্যাহ আদ্য ঘণ্টা সময় তড়িত প্রয়োগ কবিত্তে হয়।

রিউমেটিজম বা বাত —ইহা ত্রকণ ও প্রাচীন দ্বিবিধ। শীত, কম্প, উষ্ণতা, তৃষ্ণা, ও ক্রান্ত নাড়ী প্রথম প্রকাশ পায়, তদনন্তর বেদনা প্রাক্তভূত হইয়া সন্ধি স্থলে স্থায়ী হয়। প্রাচীন বাতে সন্ধিতে বেদনা থাকে, কিন্তু প্রায়ই জ্বর থাকে না। লম্বেরো বা কটিবাত এই শ্রেণীভুক্ত, সিয়াটিকা ও অন্যান্যবিধ সন্ধিবেদনা এই শ্রেণী বিশিষ্ট।

৩০° বা প্রদাহযুক্ত বাত পীড়ায় এক গামলা গরম জলে দক্ষিণ কণ্ঠকটক ও রোগীর পদ ডুবাইয়া রাখিয়া, অপন কণ্ঠকটক দ্বারা প্রকাশ্য, যকুৎ, গীহা ও পৃষ্ঠবংশেব নিয়ে সাধারণতঃ আদ্য ঘণ্টা, মধ্যম শক্তি বিশিষ্ট তড়িত প্রয়োগ কবিত্তে

প্রাচীন বাতে দক্ষিণ পোল ও রোগীর পদ গরম জলেব গামলায় ডুবাইয়া রাখিয়া অপরটী দ্বারা আক্রান্ত অংশে ও দেহে তড়িত প্রয়োগ কবিত্তে। অপেক্ষাকৃত প্রবল শক্তিক্রিয়ুত তড়িত দিনে ২৩ বাব অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে।

সোর থোট বা গদা বেদনা। ক্রপ, টনস্টিলাইটিস, ফ্যারিংস ও ব্যাবিংসের প্রদাহ, মম্পস, পিউট্রিড সোরথোট প্রভৃতিও এই নামে পরিগণিত। কণ্ঠকটক কঠে সাধারণতঃ প্রযুক্ত হয়, তদনন্তর দক্ষিণ পোল পদতলে রাখিয়া অপরটী পীড়িত অংশে বুলাইবে। দিনে একবার ৫ মিনিট কাল মধ্যম শক্তিক্রিয়ুত তড়িত প্রয়োজ্য।

স্ফিউলা বা গণ্ডমালা —দক্ষিণ কণ্ঠকটক পীড়িত অংশে স্থাপন পূর্বক অপরটী দ্বারা পৃষ্ঠবংশে অর্থাৎ পীড়িত অংশেব সন্নিহিত ভাগে মধ্যম শক্তি বিশিষ্ট তড়িত দিনে একবার ১৫ মিনিট কাল প্রয়োগ কবিত্তে।



ইতিমধ্যে তাড়িত প্রয়োগে পরিবর্তিত করা যাইতে পারে অর্থাৎ দক্ষিণ কণ্ডুকের পদতলে রাখিয়া অপরটী ধারা ৫ মিনিট কাল গীড়িত অংশে তাড়িত প্রয়োগ করিবে

স্পাইচাল কন্স্পিটস বা পৃষ্ঠবংশের গীড় — ব্যাটারের কন্ডেটরে দক্ষিণ কণ্ডুকের স্কীভ স্থানে ও অপরটী শীর্ষ স্থানে প্রয়োগ করিবে। দক্ষিণ স্বকের দিকে যদি স্পাইন বক্রীভূত হয়, তাহা হইলে ইহার নিম্ন ভাগও বামদিকে বাকিয়া যায় এইরূপ অবস্থায় দক্ষিণ কণ্ডুকের দক্ষিণ স্বকে, উন্নত বা স্কীভ পেশী সমূহে এবং বাম কণ্ডুকের বাম স্বকে ও স্বকদ্বয়ের মধ্যবর্তী পৃষ্ঠে প্রয়োগ করিবে। দক্ষিণ কণ্ডুকের বাম দিকে পৃষ্ঠেব নিম্নে ও বাম কণ্ডুকের দক্ষিণ দিকে পৃষ্ঠে প্রযুক্ত হয় প্রত্যাহ আদি ঘণ্টা, প্রথমে অল্প অল্প আবস্ত করত বোম্বি যতদূর সহ্য করিতে পারে ততদূর শক্তিয়ুক্ত তাড়িত প্রয়োগ করা যায়

পৃষ্ঠবংশের অগ্রাণু গীড়ায়, দক্ষিণ কন্ডুকের পদতলে স্থাপন করত বামটী পৃষ্ঠবংশের সমগ্র বক্রতা উপর সঞ্চালিত করিবে। যকৃতের উপরও প্রযুক্ত হয়, তৎকালে দক্ষিণ কন্ডুকের পদতলে বক্ষা করিয়া বামটী যকৃত প্রদেশে সঞ্চালিত করিবে। ৫ মিনিট পর্যন্ত মধ্যম শক্তিয়ুক্ত তাড়িত ও যোজ্য

ষ্ট্রেঙ্গ, স্প্রেঙ্গ মচকান, গেংলান।—পদ ও দক্ষিণ কন্ডুকের ৫ রমজলে রাখিয়া অগ্রটী আহত অংশে বা স্কীভের উপর ও চতুর্দিকে সঞ্চালিত করিবে। অথবা উভয় পদে আঘাত প্রাপ্ত অংশে রাখিয়া, সকল দিকে তাড়িত গতি সঞ্চালিত হইতে পারে, এরূপভাবে প্রয়োগ করা যায় মুহূর্ত্ত শক্তি ক্রমশঃ বাড়াইতে হয়, প্রত্যাহ ১০ হইতে ২০ মিনিট তাড়িত প্রয়োগ কর্তব্য।

টুথেক বা দস্তশূল ।—বেশমের, কুমাল খণ্ড বা শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড দ্বারা একটী চা চামুচের দীর্ঘ দিক আবৃত করিয়া ও অনাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র দিক দস্তোপরি ধারণ করিয়া, তৎপরে দক্ষিণ কন্ডাক্টরটি দস্তোপবিস্থ চামুচের উপর রাখিয়া একজন সাহায্যকারী অণ্টা ফেসিয়েল নর্ভে, নীচেব চোয়ালে, কর্ণের ঠিক নিম্নে, সংকালিত করত তাড়িত প্রয়োগ করিবে । মধ্যম শক্তি, সময় ৫ হইতে ২০ মিনিট । সময় সময় অবিলম্বে উপশমিত হয় আবার সময় সময় প্রবল শক্তিয়ুক্ত তাড়িত বেশীক্ষণ প্রয়োগ কবিত্তে হয়

অলসার্স বা ক্ষত — দুই হস্তে দক্ষিণ কন্ডাক্টর ধারণ করিয়া বামটী ক্ষতের উপর ও চাবি দিকে জনৈক সাহায্যকারী দ্বারা প্রয়োগ কর অথবা এক গামলা গরম জলে পদ ও দক্ষিণ কন্ডাক্টর স্থাপন করত অণ্টা ক্ষতোপবি লইয়া যাও প্রত্যাহ ১৫ মিনিট, মধ্যম শক্তি প্রযোজ্য

সম্পূর্ণ

---

# সূচীপত্র ।

—\*—

## জেনারেল ডিজিজেস ।

| বিষয়                                           | পৃষ্ঠা |
|-------------------------------------------------|--------|
| হাইপারেমিয়া—সার্ভাজিক রক্তাধিক্য               | ১      |
| এনিমিয়া ও ক্লোরোসিস—রক্তহীনতা, নীল প্রাব       | ২      |
| ডায়েবিটিস—মধুমেহ                               | ৪      |
| হেমবেজ—রক্তস্রাব                                | ৭      |
| থ্রম্বোসিস ও এম্বলিজম্                          | ৯      |
| ড্রুপী—উদরী                                     | ১১     |
| বেরিষেরি একরূপ সার্ভাজিক শোথ                    | ১৩     |
| ইনফ্লামেসন—প্রদাহ                               | ১৩     |
| বয়েল—বিষফোড়া                                  | ১৫     |
| কার্বঙ্কল—পচনশীল বিস্ফোটক                       | ১৭     |
| ক্যান্সার—কণ্টিকা                               | ১৮     |
| স্কুফিউলা, টুব্বিকিউলোসিস—গণ্ডমালা, গুটিক পীড়া | ২০     |
| ল্যুপস—একরূপ চর্মধ্বংসকর ক্ষত                   | ২২     |
| লেপ্রসী—মহাকুষ্ঠ                                | ২৩     |
| বিকেট্‌স—অস্থিকোমলতা                            | ২৫     |
| স্কর্ভি—শীতাদ                                   | ২৭     |
| ফাংগুস—একরূপ বক্তবিকারজ উদ্ভেদ                  | ২৮     |
| গাইটব, ব্রুকোসিল—গলগণ্ড                         | ২৯     |

| বিষয় ।                                          | পৃষ্ঠা । |
|--------------------------------------------------|----------|
| ওবিসিটী—মেদবেশ                                   | ৩০       |
| ইউরিমিয়া মূত্রাশুৎপত্তিজ বিকার                  | ৩২       |
| ম্যাকোলিয়া—পিডুজাবরোধজ বিকার                    | ৩৩       |
| গাউট—বাতবক্ত                                     | ৩৩       |
| সিউমেটীজম গেটে বাত                               | ৩৬       |
| ক্রনিক অষ্ট্রিয়া অর্থাইটিস                      | ৪২       |
| পাইমিগিয়া—পুষ্যাক রক্তবিকার                     | ৪৪       |
| ইরিসিপেলাস—বিসর্প                                | ৪৫       |
| ডিপথিরিয়া—ষিল্লীক প্রদাহ                        | ৪৭       |
| ইনফ্লুয়েন্জা—বহুব্যাপী সর্দি                    | ৫০       |
| হুপিংকফ—হুপশব্দক কাসি                            | ৫১       |
| মম্পস্, প্যারোটাইটিস—কর্ণমূলশোথ                  | ৫৩       |
| প্লাগুর্স এণ্ড ফার্সী                            | ৫৪       |
| ম্যালিগ্‌ন্যান্ট পম্‌টিউল—সাংঘাতিক পুষ্যবটী      | ৫৪       |
| হাইড্রোফোবিয়া—জলাতঙ্ক                           | ৫৫       |
| ম্যালিগ্‌ন্যান্ট কলাবা—ওলাউঠা                    | ৫৬       |
| ইয়েলো ফিবার—পীতজ্বর                             | ৬০       |
| সিম্পল্ কণ্টিনিউড্ ফিবার—সহজ একজর                | ৬১       |
| টাইফস্ ফিবার—মোহজ্বর                             | ৬২       |
| টাইফয়েড ফিবার—আজিক জ্বর                         | ৬৫       |
| সেবিরোম্পাইথ্যাল ফিবার—মাস্তিষকশোথক মজ্জীয় জ্বর | ৬৮       |
| বিল্যাম্পিৎ ফিবার—পোনঃপুনিক জ্বর                 | ৬৯       |
| মলপক্স—বসন্ত, মসূবিকা                            | ৭০       |



| বিষয়                                   | পৃষ্ঠা । |
|-----------------------------------------|----------|
| চিকেন্ পক্স পানবসন্ত                    | ৭৩       |
| মিজল্‌স—হাগ, রোমান্টী                   | ৭৩       |
| স্কার্লেট ফিবার—আবক্ত জ্বর              | ৭৫       |
| ডেঙ্গু—গ্রহিসঞ্চাবী জ্বর                | ৭৬       |
| পেগ্‌ মড়ক                              | ৭৭       |
| ইন্টরমিটেন্ট ফিবার—বিষম বা পর্যায় জ্বর | ৭৮       |
| রেগিটেন্ট ফিবার—স্বল্পবিবাম জ্বর        | ৮২       |

### ভিনিরিয়াল ডিজিজেন্স ।

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| ব্যালানাইটিস—শিশুগুণ প্রদাহ                | ৮৬ |
| গনোরিয়া একিউট,—তরুণ প্রমেহ                | ৮৭ |
| „ ক্রনিক—প্রাচীন প্রমেহ                    | ৮৯ |
| „ ইন্ ফিমেল—স্ত্রীলোকদের প্রমেহ            | ৯০ |
| প্রাইমারি সিফিলিস—প্রাথমিক উপদংশ বা গর্শ্ব | ৯১ |
| বিউবো—বাগি                                 | ৯৫ |
| কনট্রিউসনার্‌ল সিফিলিস—সার্বাস্থিক উপদংশ   | ৯৫ |
| ইনফ্যান্টাইল „—শৈশব উপদংশ                  | ৯৭ |
| সিফিলিফোবিয়া—উপদংশ তরু                    | ৯৮ |

### ডিজিজেন্স অব্‌ দি নার্ভস্‌ সিস্টেম ।

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| একিউট এনকেফেলাইটিস—তরুণ মস্তিষ্ক প্রদাহ     | ৯৯  |
| সিম্পল মিনিঞ্জাইটিস—সহজ মস্তিষ্কচ্ছদ প্রদাহ | ১০১ |
| টুবরকিউলার „ —গুটিক „ „                     | ১০২ |
| সেরিকাইটিস—আংশিক মস্তিষ্ক প্রদাহ            | ১০৪ |

বিষয় ।

পৃষ্ঠা ।

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| ক্রনিক এন্কেফেলুইটিস—প্রাচীন মস্তিষ্কপ্রদাহ        | ১০৫ |
| সফ্নিং অব্ ব্রেন—মস্তিষ্ক কোমলতা                   | ১০৬ |
| টিউমর্স অব্ ব্রেন মস্তিষ্কার্ধুদ                   | ১০৭ |
| ক্রনিক হাইড্রোকেফেলস—প্রাচীন মস্তিষ্কোদক           | ১০৮ |
| এপোপ্লেক্সী, সেরিব্রাল হেমরেজ -সংক্রাস, মস্তিষ্ক-  |     |
| বক্তব্য                                            | ১০৯ |
| কনকসন্ অব্ ব্রেন—মস্তিষ্ক বিনোড়ন                  | ১১২ |
| সন্ট্রোক—অর্কাঘাত, সর্দিগর্গী                      | ১১৪ |
| এফেসিয়া ও এগ্নিসিয়া—বাক্ ও স্মরণশক্তির অভাব      | ১১৫ |
| ভিলিরিয়ম ট্রিমেন্স—মদাত্যয়                       | ১১৭ |
| ডিপ্সোমেনিয়া—স্মরণান পিপাসা                       | ১১৮ |
| ইন্ট্রানিটী—উন্নততা, বাতুলতা                       | ১১৯ |
| হেড্যাক—শিরোবেদনা                                  | ১২৪ |
| ভাটিগো—শিরোধূর্ন                                   | ১২৮ |
| স্পাইন্ডাল মিনিজাইটিস—পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জাবৃষ্টপ্রদাহ | ১২৯ |
| স্পাইন্ডাইটিস—পৃষ্ঠবংশীয়মজ্জাপ্রদাহ               | ১৩০ |
| স্পাইন্ডাল হেমাবজ—পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জায় বক্তব্য      | ১৩২ |
| „ টিউমর্স—পৃষ্ঠবংশীয়মজ্জায় অর্ধুদ                | ১৩৩ |
| স্পাইন্ডাল বাইফিডা এণ্ড হাইড্রোকেফিস্              | ১৩৩ |
| স্পাইন্ডাল ইরিটেমেন্স কেশরকমজ্জার উদ্দীপনা         | ১৩৪ |
| হেমিপিজিয়া—অর্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত                      | ১৩৫ |
| প্যারাপিজিয়া—অধোঙ্গ পক্ষাঘাত                      | ১৩৬ |
| লকোমোটর এট্যাক্সিস—একরূপ পক্ষাঘাত                  | ১৩৮ |

| বিষয় ।                                       | পৃষ্ঠা । |
|-----------------------------------------------|----------|
| ইন্ফাণ্টাইল প্যারালিসিস—শৈশব পক্ষাঘাত ।       | ১৩৯      |
| বাইটার্স প্যারালিসিস—লিপিকবেব পক্ষাঘাত        | ১৪০      |
| হিষ্টিক্যাল ও রিউমেটীক প্যারালিসিস            | ১৪১      |
| প্রোগ্রেসিভ মস্কিউলার এট্রফি                  | ১৪২      |
| ম্যাকুরিয়েল পল্‌সী—পাবদজ পক্ষাঘাত            | ১৪৩      |
| লেড পল্‌সী—সীমজনিও পক্ষাঘাত                   | ১৪৪      |
| প্যারালিসিস এসিটাস—বেথু                       | ১৪৪      |
| কন্ডলসন্স—আফেপ, বিকম্প, খেঁচুনি               | ১৪৫      |
| এপিলেপ্সী—অপস্মার, যুগী                       | ১৪৮      |
| হিষ্টেরিয়া—ওল্‌বায়ু, সূক্ষ্মবায়ু           | ১৫০      |
| ক্যাটালেপ্সী—নিম্পন্দ্য পীড়া                 | ১৫২      |
| কোরিয়া—তাণ্ডব                                | ১৫৩      |
| টেটেনস—ধনুস্তম্ভ, ধনুষ্ঠকাব                   | ১৫৫      |
| সিপ্লেস্মেন্স অনিদ্রা, নিদ্রাভাব              | ১৫৭      |
| হাইপোকণ্ড্রিয়েসিস্ অবসাদ বায়ু               | ১৫৮      |
| নিউরাইটিস নায়ু প্রদাহ                        | ১৫৯      |
| নিউবালজিয়া-নায়ুশূল                          | ১৫৯      |
| ° ডিজিজেস্ অব্‌ দি অর্গান্স অব্‌ রেস্পিরেশন । |          |
| ক্যাটার—সর্দি, প্রাতিশ্যায়                   | ১৬৩      |
| ক্রনিক ইনফ্লাঃ অব্‌ নট্রীন্স, ওজিনা—পীনাস     | ১৬৫      |
| ইপিস্ট্যাকসিস্—নাসাবক্ত্রাব                   | ১৬৬      |
| এফোনিয়া—স্ববাভাব                             | ১৬৭      |
| ডিস্‌ফোনিয়া ক্লিরিকোরিস্—বাক্যকদের স্বরভঙ্গ  | ১৬৯      |

| বিষয় ।                                   | পৃষ্ঠা |
|-------------------------------------------|--------|
| কুপ—স্বরস, যুংড়ী                         | ১৭০    |
| ল্যারিন্জাইটীস—স্ববযন্ত্র ২ দাহ           | ১৭২    |
| ল্যারিন্জিস্মস্ দ্বীডুলস্ আক্কেপিক যুংড়ী | ১৭৪    |
| ত্রংকাইটীস বায়ুনদীভুজ প্রদাহ             | ১৭৫    |
| এজ্‌মা—শ্বাসকাস, হাঁপানী                  | ১৭৯    |
| এম্ফিসিমা অব্‌ গংস—ফুফুসের বায়ুক্ষীতি    | ১৮২    |
| হিমপ্টীসিস—বক্তোংকাস                      | ১৮৫    |
| প্লুরিসী ফুফুসচ্ছদ প্রদাহ                 | ১৮৭    |
| নিউমোনিয়া ফুফুস প্রদাহ                   | ১৯০    |
| থাইসিস্—ক্ষয়কাস, যক্ষ্মা                 | ১৯৩    |

### ডিজিজেস্ অব্‌ দি হার্ট ।

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| পেরিকার্ডাইটীস—হৃৎপিণ্ডবেষ্ট প্রদাহ  | ১৯৮ |
| এণ্ডোকার্ডাইটীস—হৃদান্তরবেষ্ট প্রদাহ | ২০০ |
| ভ্যাল্ভিউলার ডিজিজ্—হৃৎকপাটেব পীড়া  | ২০০ |
| হাইপার্ট্রফি অব্‌ হার্ট—হৃৎবিবৃদ্ধি  | ২০৪ |
| এট্‌ফি এণ্ড ফ্যাটী ডিজেনারেসেন্স     | ২০৬ |
| মায়ানোসিস্ নালবোগ                   | ২০৭ |
| এনজাইনা পেক্টোরিন্ হৃৎশূল            | ২০৮ |
| ফংসনাল ডিরেঞ্জমেন্ট ক্রিয়াটৈবময়া   | ২০৯ |

### ডিজিজেস্ অব্‌ এয়োৰ্টা ।

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| এয়োৰ্টাইটীস—২১২                | ২১২ |
| এয়োৰ্টিক এনিউবিজম—হৃৎকমন্যকুদু | ২১৩ |



| বিষয়                                                | পৃষ্ঠা |
|------------------------------------------------------|--------|
| ডিজিজেন্স্ অব্ দি থোরেসিক ওয়াল্‌স্ ।                |        |
| প্লুরোডিনিয়া—বক্ষ-পেশীবাও                           | ২১৪    |
| ইণ্টেরকষ্টাল নিউরাল্‌জিয়া—পশু কামধাম্‌স্ স্নায়ুশূল | ২১৫    |
| ডিজিজেন্স্ অব্ ডায়াফ্রাম্ ।                         |        |
| ডায়াফ্রাগ্‌মাইটিস্—উদববক্ষব্যবধায়ক পেশীব প্রদাহ    | ২১৬    |
| ডিজিজেন্স্ অব্ ব্লড ভেসেল্‌স্ ।                      |        |
| আর্টারাইটিস্—ধমনীপ্রদাহ                              | ২১৭    |
| ফ্রাইটিস্—শিরা প্রদাহ                                | ২১৮    |
| ফ্লেগ্‌মেসিয়া স্নাৰা ডোলেন্স                        | ২১৯    |
| ডিজিজেন্স্ অব্ লিম্ফাটিক্                            |        |
| ইনফ্লাঃ অব্ লিম্ফাটিক ভেসেল্‌স্—শোষকশিরা প্রদাহ      | ২২০    |
| „ „ „ „ স্নাওস্—শোষকগ্রন্থি প্রদাহ                   | ২২১    |
| টেবিস মেসেনট্রিকা—মধ্যাঙ্গিক লম্বীকাগ্রন্থিবিসৃদ্ধি  | ২২৩    |
| ডিজিজেন্স্ অব্ টং ।                                  |        |
| গ্লসাইটিস্—জিহ্বা প্রদাহ                             | ২২৪    |
| অলসাম্ অব্ টং—জিহ্বায় ক্ষত                          | ২২৫    |
| ক্যান্সার „ „ — „ ককট গীড়া                          | ২২৬    |
| ক্রাকট টং জিহ্বা ফাটা                                | ২২৬    |
| ডিজিজেন্স্ অব্ মাউথ্ ।                               |        |
| ফলিকিউলার ষ্টমাটাইটিস্—গ্রন্থিক মুখপ্রদাহ            | ২২৭    |
| অলসারেটীভ „ —সক্ষত মুখপ্রদাহ                         | ২২৭    |
| গ্যাংগ্রিনস্ „ —পচনশীল মুখপ্রদাহ                     | ২২৮    |

| বিষয়                                 | পৃষ্ঠা |
|---------------------------------------|--------|
| এফ্ থি অব্ মাউথ্ জাডি স্ত             | ২২৯    |
| টনসিলাইটীস্—তালুপার্শ্বগস্থি প্রদাহ   | ২৩০    |
| ডিজিজেস্ অব্ ফ্যারিংস এণ্ড ইসোফেগস্ । |        |
| ফ্যাবিনজাইটীস্—গলকোষ প্রদাহ           | ২৩২    |
| অল্ সার অব্ ইসোফেগস্—গলনলীব ক্ষত      | ২৩৩    |
| ক্যান্সার অব্ „ — „ কৰ্কট             | ২৩৪    |
| ট্রীকচব অব্ „ — „ অবরোধ               | ২৩৪    |

### ডিজিজেস্ অব্ ষ্টমাক ।

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| ডিম্পেপ্সিয়া অর্জীর্ণ, মন্দাশ্বি        | ২৩৬ |
| একিউট গ্যাস্ট্রাইটীস্—তরুণ পাকায় প্রদাহ | ২৩৯ |
| সব্ একিউট „ —অনুগ্র „ „                  | ২৩৯ |
| ক্রনিক „ —প্রাচীন „ „                    | ২৪০ |
| ইন্ডিউবেসন অব্ পাইলোরস—অধোমুখের কাঠিন্য  | ২৪১ |
| অল্ সার অব্ ষ্টমাক—পাকায়িক ক্ষত         | ২৪২ |
| ক্যান্সার „ পাকায়ের কৰ্কট               | ২৪৪ |
| কার্ডিয়ান্ জিয়া পাকায় শূল             | ২৪৫ |
| হিমোটিমিসিস্—বক্তবমন                     | ২৪৫ |
| ডাইজে টেসন—প্রসাবণ                       | ২৪৭ |

### ডিজিজেস্ অব্ ইণ্টেষ্টাইন ।

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| এণ্টিরাইটীস্—অঙ্গপ্রদাহ           | ২৪৭ |
| ইনফ্লাঃ অব্ সিকম অক্সাইডের প্রদাহ | ২৪৯ |
| ডিসেন্ট্রী—বক্তাশায়              | ২৫০ |

| বিষয় ।                               | পৃষ্ঠা |
|---------------------------------------|--------|
| উ'ফ'রিয়' উ'ফ'র'গ'ফ'                  | ২৫৪    |
| কলিক—অম্লশূল                          | ২৫৬    |
| কলিকা পিঠোনম—সীমশূল                   | ২৫৮    |
| কনষ্টিপেসন কোষ্ঠবদ্ধ                  | ২৫৮    |
| অবষ্ট্রক্সন অব্ বাউয়েল্‌স—অম্লাবরোধ  | ২৬০    |
| ইন্টেষ্টাইনাল ওয়াম'স—অম্লশ্রু ত্রিমী | ২৬২    |
| বেক্টাইটীস সবলান্ন প্রদাহ             | ২৬৩    |
| রেক্টাল অল্‌সার—সরলাস্ত্রের ক্ষত      | ২৬৩    |
| „ ষ্ট্রীকচর—সরলাস্ত্রের ব্যাসসংকোচ    | ২৬৫    |
| „ প্রোলাপ্স—গুদপ্রপণ                  | ২৬৫    |

### ডিজিজেস্ অব্ দি য়্যানাস ।

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| প্রবাইটস্ এনাই—মলদ্বার কণ্ঠমন | ২৬৭ |
| ভিটিউলা ইন্ এনো—ভগন্দর        | ২৬৮ |
| হেমরইড্‌স—অর্শ                | ২৬৮ |

### ডিজিজেস অব্ দি লিভর ।

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| হিপাটিক কন্‌জেষ্টন—যকৃতের রক্তাধিক্য                        | ২৭০ |
| হিপেটাইটীস যকৃৎ প্রদাহ                                      | ২৭২ |
| সিবোসিস—যকৃৎ কাঠিঘ                                          | ২৭৪ |
| সিফিলিটিক হিপেটাইটীস —উপদংশীয় যকৃৎ প্রদাহ                  | ২৭৬ |
| একিউট এট্রফি—তরুণ হ্রাস                                     | ২৭৬ |
| ক্রনিক „ —প্রাচীন হ্রাস                                     | ২৭৭ |
| ইন্‌স্ট্রাঃ অব্ বিলিয়ারি প্যানক্রেজস্—পিত্তপ্রণালীর প্রদাহ | ২৭৮ |

বিষয় ।

পৃষ্ঠা ।

গলাগ্ৰেহ—পিণ্ডমিষ্টা ।

২৭৯

জন্মভিস্ কামল, শ্রাবা

২৮১

ডিজিজেস অব্ প্যাংক্রিয়াস এণ্ড স্পলীন

২৮২,

২৮৩

ডিজিজেস অব্ পেরিটোনিয়াম ।

•

একিউট পেরিটোনাইটিস—তরুণ অঙ্গচ্ছেদ প্রদাহ

২৮৪

ক্রনিক „ —প্রাচীন „ „

২৮৫

এসাইটিস উদরী

২৮৬

ডিজিজেস অব্ দি ইউরিনারী অর্গান্স ।

নিফ্রাইটিস —সপুষ্ট মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ

২৮৮

একিউট ব্রাইটিস পীড়া

২৮৯

ক্রনিক „ „

২৯১

ডায়ুরেসিস মূত্রাধিক্য

২৯২

হিমাচ্যুরিয়া বক্তপ্রস্রাব

২৯৩

কাইলস্ ইউবিং —দুগ্ধবৎ মূত্র

২৯৪

মিনেল ক্যালকুলাই মূত্রগ্রন্থিক ক্ষুজাশ্মবী

২৯৪

ডিজিজেস অব্ ব্লাডর

ইরিটেবিলিটি অব্ ব্লাডর—মূত্রাশয়ের উদ্দীপনা

২৯৬•

স্প্যাজম „ „ — „ আক্ষেপ

২৯৭

প্যারাটিসিস অব্ ব্লাডর মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত

২৯৮

একিউট সিষ্টাইটিস মূত্রাশয়ের তরুণ প্রদাহ

২৯৯

ক্রনিক „ — „ প্রাচীন প্রদাহ

৩০০

স্টার্মেটোবিয়া—শুক্রমেহ

৩০২



| বিষয়।                                          | পৃষ্ঠা |
|-------------------------------------------------|--------|
| ডিজিজেস্ অব টেষ্টিকেলুস।                        |        |
| অর্কাইটিস—অণু প্রদাহ                            | ৩০৪    |
| ইম্পোটেন্স—ধ্বজভঙ্গ                             | ৩০৬    |
| ডিজিজেস্ অব দি আইজ।                             |        |
| ক্যাটারাল অপথালমিয়া সর্দিজ চক্ষুউঠা            | ৩০৮    |
| ক্রনিক অপথালমিয়া                               | ৩০৯    |
| পুরুলেণ্ট „ —সপুষ চক্ষুউঠা                      | ৩১০    |
| গনোবিয়েল „ —প্রমেহজনিত চক্ষুউঠা                | ৩১২    |
| অপথালমিয়া নিমোনেটোবম -শিশুদের চক্ষুউঠা         | ৩১৩    |
| স্ক্‌ফিউলস্ অপথালমিয়া—গাণ্ডগাণ্ডিক চক্ষুউঠা    | ৩১৪    |
| গ্রানুলার „ —দানায়ুত চক্ষুউঠা                  | ৩১৫    |
| অপথালমিয়া টার্সাই—অক্ষিপুটেব শ্লেষ্মি প্রদাহক  | ৩১৫    |
| আরাইটিস—উপতারা প্রদাহ                           | ৩১৬    |
| স্ক্লি়োরোআইটিস স্ক্লি়োরোটিকেব প্রদাহ          | ৩১৮    |
| ক্যাটারো বিউমেটিক অপথালমিয়া—সর্দিবাতজ চক্ষুউঠা | ৩১৯    |
| কর্ণিয়াইটিস—চক্ষের জলক্ষেত্রের প্রদাহ          | ৩১৯    |
| সিফিলিটিক কিবেটাইটিস—উপদংশ প্রদাহ               | ৩২১    |
| অল্‌সার অব্ কর্ণিয়া—কালক্ষেত্রে ক্ষত           | ৩২২    |
| ওপাসিটি „ „ —কালক্ষেত্রে ঘোলা                   | ঐ      |
| বেটাইনাইটিস—রেটাইনার প্রদাহ                     | ঐ      |
| এমোবোসিস—দৃষ্টিলোপ বা হীনতা                     | ৩২৩    |
| মাইওপিয়া নিকট দৃষ্টি                           | ৩২৫    |
| প্লেস্‌বাইয়োপিয়া—দূর দৃষ্টি                   | ৩২৬    |

বিষয় ।

পৃষ্ঠা ।

ফটোফোবিয়া—আশোকাভঙ্গ

৩২৬

ডিজিজেন্স অব্ দি ইয়ার ।

ওটাইটিস একষ্টের্নাল—বাহ্যকর্ণপ্রদাহ

৩২৭

„ ইন্টের্নাল—অভ্যন্তরকর্ণপ্রদাহ

৩২৯

ওটোরিয়া—কাণপাকা

৩৩০

ওটাল্জিয়া—কর্ণশূল

৩৩১

ডেফেন্স—বধিবতা

৩৩২

ডিজিজেন্স অব্ স্কিন ।

ইরিথ্রিমা

৩৩৪

রোজিয়োলা—পাটলিকা

৩৩৫

আর্টিকেরিয়া—আমবাত, শীতপিত্ত

৩৩৬

হার্পিস—ইক্সবিজ

৩৩৭

এক্জিমা—পামা

৩৩৮

পেম্ফাইগস—বিস্রিকা

৩৪০

রুপিমা—মলিনিকা

৩৪০

এক্টিমা—বৃহদাকাব পুণ্ড্রিকা

৩৪১

ইম্পিটাইগো—চর্মদল

৩৪২

ইফিউলস—অলঙ্ঘিকা

৩৪৩

লিচেন—অলসক, পদানীকণ্টক

৩৪৪

প্রুইগো—অক্ষয়িকা

৩৪৫

সোরায়েসিস—বিচর্চিকা

৩৪৬

পিটিরায়েসিস

৩৪৭



| বিষয়                                    | পৃষ্ঠা । |
|------------------------------------------|----------|
| এমিনোবিয়া—আর্ন্তব্রাভাব                 | ৩৬৫      |
| ডিস্‌মেনোবিয়া—কষ্টবজঃ                   | ৩৬৬      |
| মিনোরিজিয়া—রজোদিক্য                     | ৩৬২      |
| মিট্রোরিজিয়া—গর্ভাশয়িক রক্তস্রাব       | ৩৬২      |
| ইউটিবাইন ক্যাটার, লিউকোরিয়া শ্বেতপ্রদাহ | ৩৭০      |
| মিট্রাইটিস—জরায়ু প্রদাহ                 | ৩৭১      |
| অল্‌সারেমন অব্‌ সর্ভিক্স ইউটেরাই         | ৩৭২      |
| ক্যান্সার অব্‌ ইউট্রস                    | ৩৭৩      |
| ফাইব্রইড টিউমর অব্‌ ইউট্রস               | ৩৭৫      |
| একিউট ওভেরাইটিস—তক্‌ ডিম্বকোষপ্রদাহ      | ৩৭৬      |
| ক্রনিক „ —প্রাচীন „                      | ৩৭৭      |
| মেমারী এব্‌সেস—স্তনফোটক                  | ৩৭৮      |
| ইনফ্লামেশন অব্‌ নিপল—চুচুকাগ্রপ্রদাহ     | ৩৭৯      |
| ম্যামাইটিস স্তনপ্রদাহ                    | ৩৭৯      |
| ম্যাস্টোডিনিয়া—স্তনের স্নায়ুশূল        | ৩৮১      |

### গর্ভাবস্থায় বিবিধ পীড়া ।

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| ইডিমা অব্‌ লেবিয়া              | ৩৮৮ |
| টুথেক—দন্তশূল                   | ৩৮৯ |
| স্যালিভেসন—লালাস্রাব            | ৩৮৯ |
| নসিয়া এণ্ড ভমিটিং—বমন, বিবমিষা | ৩৮৯ |
| পাইরোসিস—মুখ দিয়া জলউঠা        | ৩৮৩ |
| হিমিটেমিসিস—রক্তবমন             | ৩৮৩ |



| বিষয় ।                      | পৃষ্ঠা । |
|------------------------------|----------|
| কনষ্টিপেসন—কোষ্ঠবদ্ধ         | ৩৮৩      |
| ডায়াবিমা—উদবায়             | ৩৮৪      |
| ক্কাতিস—কাসল                 | ৩৮৪      |
| প্যান্সিটেন অব্ হাট—হৃৎকম্পন | ৩৮৪      |
| ফেণ্টে—মূর্ছা                | ৩৮৪      |
| ডিম্পিনিয়া—শ্বাসকষ্ট        | ৩৮৫      |
| কফ—কাসি                      | ৩৮৫      |
| ইম্পিটসিস্—বক্তোৎকাস         | ৩৮৫      |
| সিপ্লেস্‌নেস্—অনিদ্রা        | ৩৮৫      |
| হেডাক্ শিরঃশীড়া             | ৩৮৬      |
| হেমরইড্‌স—অর্শ               | ৩৮৬      |

### প্রসবান্তের শীড়া ।

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| গ্যাগাল্যাটিয়া—দুগ্ধপ্রসাব        | ৩৮৬ |
| গ্যাগাল্টোবিয়া—দুগ্ধ প্রসাবাধিক্য | ৩৮৭ |
| আফ্টার পেশ—হেতাল বেদনা             | ৩৮৭ |

অন্তান্ত শীড়া—সাধারণ শীড়ার মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে ।

### বিবিধ ।

|                      |     |
|----------------------|-----|
| এবস'ন—গর্ভপ্রাব      | ৩৮৮ |
| ম্যাবসেস—স্ফোটক      | ৩৮৯ |
| বেডগোব—শয্যাশুভ      | ৩৯০ |
| অল্‌মাব—ক্ষত         | ৩৯১ |
| অটাইটিস—অস্থি প্রদাহ | ৩৯২ |

| বিষয় ।                                | পৃষ্ঠা । |
|----------------------------------------|----------|
| পেবি অষ্টাইটস্—অস্থিচ্ছদ প্রদাহ        | ৩২২      |
| কেরিজ অস্থিগত                          | ৩২৩      |
| কক্সিডিনিয়া—কোকিলচক্ষু অস্থি মায়াশূল | ৩২৪      |
| টুথেক দন্তশূল                          | ৩২৫      |
| হিকফ্—হিকা                             | ৩২৬      |
| ক্র্যজেস্ এণ্ড প্রেন্স                 | ৩২৭      |
| বিষাবলী                                | ৩২৮      |
| স্নেক বাইট—সর্প দংশন                   | ৪০৬      |
| বিষধব জন্তু দংশন                       | ৪০৭      |
| ব্যবস্থাবলী                            | ৪০৮      |
| নূতন ব্যবস্থাসংগ্রহ                    | ৪৬০      |
| ম্যাগ্নিটোইলেকট্রিসিটি ব্যবহার         | ৪৮১      |

