

হোমিওপ্যাথিক
ভৈষজ্য-সুধা ।

অথঃ

প্রধান প্রধান ঔষধের বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ লক্ষণ ।

৩ হরিপ্রসাদ চক্রবর্তী কর্তৃক অনূদিত ।

চতুর্থ সংস্করণ ।

ALLEN'S KEYNOTES
IN BENGALI

PUBLISHED AND REVISED BY
PIYUSH KIRAN CHAKRAVARTI, B. A.

Homoeopathy Prachar Karyalaya
Patuatuli, Dacca.

1924,

মূল্য ২৮ পাই টাকা ।

One of Print.

২/ ২০০০
২০০০



হেনা প্রেস, ঢাকা

প্রিন্টার—শ্রীগোপাল চন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত

ভূমিকা ।

ঔষধ-শুধা ঔষধ-তথ্যের প্রথম-শিক্ষা-ঔষধ-সাধন মণ্ডিত প্রথম প্রদান ঔষধের বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ লক্ষণ এই পুস্তকে গরিবিত। প্রত্যেক ঔষধের লক্ষণের মধ্যেই কতকগুলি এমন লক্ষণ দৃষ্ট হয় যে, সেই সকল লক্ষণ অল্প ঔষধে একেবারেই দেখা যায়না। এই লক্ষণ গুলিকেই সেই সেই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ বলে। এই বিশেষ লক্ষণ দ্বারা ঔষধের বিশেষত্ব স্থির হয়, এবং অল্প ঔষধ হইতে উহার স্বতন্ত্রতা নিরূপণ করিতে পারা যায়।

সকলনে বৃদ্ধি আইওনিয়ার, সকলনে স্থান রসটোয়ার, প্রচণ্ড প্রাণ পবেগেডোনার এবং ঔষধ ফসফরিক এসিডের এইরূপ এক একটা মূলপ্রদান বিশেষলক্ষণ।

এই পরিচালক লক্ষণগুলি ভিত্তি-ভূমি করিয়াই মনে মনে সেই সেই ঔষধের লক্ষণগুলির তুলনা করিতে হয়। তুলনা ব্যতিরেকে প্রভেদ নিরূপণ করিতে পারা যায়না, প্রভেদ নির্ণীত না হইলে যত্নের প্রকৃত জ্ঞান অসম্ভব। একই ঔষধে ঔষধে তুলনা করিয়া ঔষধের প্রভেদ নিরূপণ করিতে হয়, এবং উহার প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হয়। ঔষধের প্রকৃত জ্ঞান না থাকিলে ঠিক মদুশ ঔষধ নির্বাচন করিতে পারা যায় না। ফলতঃ তুলনাকরণ ও প্রভেদ নিরূপণ হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থীর জীবন-ত্রুটি। ঔষধেরলক্ষণে-ঔষধেরলক্ষণে এবং রোগীরলক্ষণে-ঔষধেরলক্ষণে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্তই কেবল তুলনা করিতে হয়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ-তথ্যের বিশাল লক্ষণ রাশি দেখিলে প্রথম শিক্ষার্থীকে ভীত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয়। বাস্তবিক উহা প্রথম উদ্ভবে অস্বস্তি করা বড়ই পুরুষ ব্যাপার। অতএব প্রথমে ঔষধের বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ লক্ষণ গুলি অধ্যাস করিয়া প্রত্যেক ঔষধের বিশেষ বা স্বতন্ত্র প্রতিকৃতি উপলব্ধি করা উচিত। উহা অপেক্ষাকৃত অস্বাস-সাধ্য এবং শিক্ষার প্রারম্ভে বড়ই উপযোগী। তাই এই পুস্তক অধ্যাস করিয়া বহু ঔষধ-তথ্য অধ্যাস করা সুবিধাজনক হইবে বলিয়া ঔষধ-তথ্যের এই প্রথম-শিক্ষা “ঔষধ-শুধা” নামে প্রকাশিত হইল। এতদ্বারা সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইলোই হইল। এই পুস্তকখানি ডাঃ

এলেনের “কি নোটস্” নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের বাঙ্গলা অনুবাদ গ্রন্থকা-
সিকাগো হেরিং মেডিক্যাল কলেজের ভৈষজ্য-তত্ত্বের অধ্যাপক । তিনি অধ্যয়ন
ও অধ্যাপনায় এই পুস্তকের বিশেষ উপকারিতা দেখিতে পাইয়াছেন ভরসা
করি ছাত্রগণও এই অনুবাদের তজ্জপ ফলবৎ উপলব্ধি করিবেন অনুবাদ
যথাযথ মূলানুরূপ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, জানি না কতদূর
কৃতকার্য্য হইয়াছি পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভ্রটি মার্জনা করিবেন ।

এই পুস্তকে প্যারেসিসিস্ চিহ্নের অভ্যস্তরে সমলক্ষণাপন্ন ঔষধের উল্লেখ
আছে অধ্যয়নকালে সেইগুলি একস্থলে সংগ্রহ করিয়া অনুশীলনী স্বরূপ
আলোচনা ও অভ্যাস করিলে একটি ঔষধ শিক্ষা করিলেই সঙ্গে সঙ্গে অল্পাধিক
কতকগুলি ঔষধেরও কতকটা জ্ঞানলাভ হইবে । এবং ঔষধে ঔষধে কোথায়
কোথায় সৌমাদৃশ্য ও কোথায় কোথায় অসাদৃশ্য তাহা ভাল করিয়া বুঝা যাইবে
লক্ষণগুলির প্রাধাত্যের তারতম্যানুসারে অক্ষরেরও তারতম্য করা গিয়াছে ।

চৈত্র ১৩১৯ ।

অনুবাদক ।

দ্বিতীয় সং

বিজ্ঞাপন ।

ভৈষজ্য-সুধার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল এ সংস্করণে পুস্তকের
বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই মুদ্রাক্ষনব্যয় পূর্বা সংস্করণ অপেক্ষা
বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও এ সংস্করণের পুস্তকের মূল্য বর্দ্ধিত না করিয়া পূর্ব্ববৎ দেড়
টাকাই রাখা হইল । মুদ্রাক্ষন-দোষ দূর করিবার জন্ত যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি,
তথাপি স্থানে স্থানে ভ্রম থাকিবার সম্ভাবনা । গ্রন্থকার জীবিত থাকিতে গুরুত্ব
গ্রন্থক মহোদয়গণ ইহাকে যেরূপ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, ভরসা করি ইহা
এখনও তাঁহাদের নিকট সেই ভাবে আদৃত হইবে

হোমিওপ্যাথিপ্রচার কার্যালয় ।

নবাবপুর, ঢাকা ।

আষাঢ়, ১৩২০ ।

বিনীত—

ডাঃ শ্রীমুদ্রোদ্রাচন্দ্র দাস ।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

ভৈষজ্য-সুধার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবারে পুস্তকখানি এংল কৌনোটস্‌এর শেষ সংস্করণের সহিত মিলিঠো দেওয়া হইয়াছে। এবং মোবিলাম্‌ নামক ভ্রমশ্রী নুতন সংযোজিত হইয়াছে। দুইটি পদ্যগুলির পাশেই উহাদের ইংরেজী পদ্য বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, আশা করা যায় ইহাতে অভিনব শিক্ষার্থীর যথেষ্ট সাহায্য হইবে।

কাগজের মূল্য আর তিন দল বাড়িয়া গিয়াছে সেইজন্য পুস্তকের মূল্য কিছু বাড়াইতে বাধ্য হইলাম। আশা করি সমস্ত পাঠকবর্গ আমার সকল এটি মার্জনা করিয়া স্বর্গীয় পিতৃদেবের এই পুস্তকখানি পূর্ণবৎ গ্রহণে চক্ষে দেখিবেন। নিবেদন ইতি—

হোমিওপ্যাথি প্রচার কার্যালয়।

পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

আবণ, ১৩২৮

শ্রীশ্রীমুখ্যকিরণ চক্রবর্তী।

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

ভৈষজ্য-সুধা নিঃশেষিত হওয়ার পুনঃ প্রিন্ট হইল। এবারে মূল্যও প্রায় কোনও পরিবর্তন বা পরিবর্জন না হইলেও ইহা সম্যক পরিমূহ হইয়াছে। যুগলব্যয়ের আদিক্য সত্ত্বেও ইহার মূল্য পূর্ণবৎই রহিল। নিবেদন ইতি—

হোমিওপ্যাথি প্রচার কার্যালয়

পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

বৈশাখ, ১৩৩১।

শ্রীশ্রীমুখ্যকিরণ চক্রবর্তী।

সূচীপত্র ।

অক্সিম মেটেলিকঃম (অক্স)	১	কামিজনম-নাইট্রো (কামজ)	৪১
অক্টোডঃম (অক্টোড)	৩	ক্যোনিয়ম কামিনিকম (ক্যোন কাম)	
অক্টোজন্টম নাইটিকম (অক্টো-না)	৭		৪২
অক্টোজন্টম মেটালিকঃম (অক্টো-মেট)	৭	ক্যোনিয়ম মিত্রিয়ারেটিকম (ক্যোন-মিট্র)	৪৩
অনিকা মটেনা (অন)	৮		
অসেনিকঃম একবম (অস)	১১	এক্সাতিমিয়া (এক্স)	৪৪
ইউপেটোরিয়ম পারফর্লিয়েটম (ইউপ-পারফ)	১৩	এক্স টি ফিলঃম (এক্স)	৪৫
ইউলেক্সিয়া (ইউলেক্স)	১৫	এলিয়ঃম মেগা (এলি-মে)	৪৭
ইকুইমিটম হাইমেল (ইকুই)	১৬	এলুমিনা (এলু)	৪৯
ইয়েমিয়া (ইয়ে)	১৬	এলো মকোইনা (এলো)	৫১
ইথুস মাইনেপিয়ম (ইথু)	১৯	এলিয়ারম (এলি)	৫৩
ইপিকাকুয়ানহা (ইপি)	২০	এমেটিক এগিড (এমে-এগ)	৫৪
ইক্সিউল্যাস (ইক্সি)	২২	এমেরঃম (এমের)	৫৫
একেনাইটম নেপেলম (একেন)	২৪	ওপিয়ম (ওপি)	৫৬
এক্টিয়া রেগিমোসা (এক্টিয়া)	২৬	ককিউল্যাস (কক)	৫৯
এগেরিকঃম (এগার)	২৮	কফিয়া কুডা (কফি)	৬০
এগসক্যাটম (এগস)	২৯	কলচিকম (কলচি)	৬২
এটিমোনিয়ম কুডম (এটি-কুড)	৩০	কলোফাইলম (কলোফ)	৬৩
এটিমোনিয়ম টাটারিকম (এটি-টারি)	৩২	কলোমিহ (কলোম)	৬৪
এনাকার্ডিয়ম (এনা)	৩৪	কলিকম (কলি)	৬৬
এক্সামাইনম (এক্স)	৩৬	কার্বালিক এগিড (কার্বাল-এগ)	৬৭
এপিস মেলিফিকা (এপিস)	৩৭	কার্বো এনিম্যালিস (কার্বো-এ)	৭০
এপোমাইনম (এপোমা)	৩৯	কার্বো ডেজিটেটিলিস (কার্বো-ডেজ)	৭২
এক্সোটেনম (এক্সোট)	৪০	কালো কার্বনিকম (কালো-কার্ব)	৭৩
		কালো বাইক্সিমিকম (কালো-বাই)	৭৫

কালী ব্রোমেটম (কালী-ব্রোম)	৭৭	চেলিডোনিয়ম (চেলি)	১১২
কুপ্রম মেটেলিকম (কুপ)	৭৯	জিকম (জিক)	১১৪
কোকা (কোকা)	৮১	জেলসিমিয়ম (জেল)	১১৬
কোনািয়ম (কোনা)	৮২	টিউবার কিউলাইনম (টিউব)	১১৮
কো+লিনসে+নিয়া (কো+লিন)	৮৪	টেরেবিহ (টের)	১২০
ক্যাক্টস (ক্যাক্ট)	৮৪	ট্যাবেকম (ট্যাবে)	১২২
ক্যানিবিস ইথিকা (ক্যান-ইথ)	৮৬	টারাক্সিকম (ট্যারাক্স)	১২৪
ক্যানিবিস স্টাটাইভা (ক্যান-স্টাট)	৮৬	টারাক্সিউলা (ট্যারাক্স)	১২৫
ক্যাথেরাইডিস (ক্যাথ)	৮৭	ট্রিলিয়ম (ট্রিল)	১২৬
ক্যাম্পিকম (ক্যাম্প)	৮৯	ডকেমেরা (ডক)	১২৭
ক্যামোমিলা (ক্যামো)	৯০	ডাইওসকোরিয়া (ডাইও)	১২৯
ক্যাম্ফোরা (ক্যাম্ফ)	৯২	ডিজিটেলিস (ডিজি)	১২৯
ক্যালমিয় (ক্যালমি)	৯৩	ডিপথিরিনম (ডিপথি)	১৩১
ক্যালেনডিয়ম (ক্যালেন্ড)	৯৪	ড্রোসেরা (ড্রোস)	১৩২
ক্যালেন্ডুলা (ক্যালেন্ড)	৯৫	থুজা (থুজ)	১৩৪
ক্যালকেরিয়া কার্বনিকা (ক্যালক-কা)	৯৬	থেরিডিয়ন (থেরি)	১৩৭
ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকা (ক্যালক-আর্সে)	৯৯	থ্যাক্সি বাসী (থ্যাক্স)	১৩৮
ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা (ক্যালক-ফস)	৯৯	নকাতমিকা (নকাতম)	১৩৯
ক্রিয়োজোটম (ক্রিয়োজ)	১০১	নকাতমিচটা (নকাতম)	১৪২
ক্রোকঃস (ক্রোক)	১০৩	নাইটি ক এসিড (নাই-এসি)	১৪৪
ক্রোটন (ক্রোট)	১০৪	জাজা (জাজা)	১৪৭
ক্রোটেলস (ক্রোটে)	১০৫	জাট্রম কার্বনিকম (জাট-কা)	১৪৮
ক্রোফাইটিস (ক্রোফ)	১০৭	জাট্রম মিউরিয়টিকম (জাট-মি)	১৪৯
গ্লনয়েন (গ্লন)	১০৯	জাট্রম সলফিউরিকম (জাট-সল)	১৫২
চায়না (চায়)	১১০	পডফিলম (পড)	১৫৪
		পলমেটিল (পলম)	১৫৬
		পাইরোজেন (পাইরো)	১৫৮
		পিক্রিক এসিড (পিক্রিক-এসি)	১৬০

পেট্রোলিয়ম (পেট্রো)	১৬২	মার্কিউরিয়াম বিন আইড (মার্ক)-	
পেট্রোসেলিনম (পেট্রোগ)	১৬৩	বিন)	২০৭
প্লাংকম (প্লম)	১৬৪	" " গলফিউরকম (মার্ক গলফ)	২০৮
প্লাটিনা (প্লাট)	১৬৬	" " মলিউবিলিস (মার্ক-মল)	২০৮
ফসফরম (ফস)	১৬৮	" " গায়েরনাইড (মার্ক গায়ের)	২০৮
ফসফরিক এসিড (ফস-এসি)	১৭০	মিউরিএটিক এসিড (মিউ-এসি)	২০৬
ফাইটো ল্যাক (ফাইটো)	১৭৩	মিউরেট (মিউর)	২০৭
ফাইসিগমা (ফাইসম)	১৭৪	মিলিফোলিয়ম (মিলি)	২০৮
ফিরম (ফির)	১৭৫	মেজেরিয়ম (মেজের)	২০৯
ফ্লোরিক এসিড (ফ্লোর-এসি)	১৭৭	মেজোরাইনম (মেজো)	২১১
কার্বেরিস (কার্ব)	১৭৮	মোনগ্রাইস (মোন)	২১৬
বিমসথ (বিম)	১৭৯	মেলিলাটস (মেলি)	২১৭
বেঞ্জোইক এসিড (বেঞ্জ)	১৮০	ম্যাগ্নিশিয়া ক্যালনিকা (ম্যাগ-কা)	
বেলেডোনা (বেলে)	১৮১		২১৮
বোভিষ্টা (বোভ)	১৮৪	" " ফসফরিক (ম্যাগ-ফস)	২১৯
বোরাক্স (বোর)	১৮৫	" " মিউরিএটিক (ম্যাগ-মিউ)	
ব্যাণ্ডিসিয়া (বেষ্ট)	১৮৬		২২১
ব্যারাইট-কার্ব (ব্যার-কা)	১৮৮	রসটার্কোডেজুন (রস, রুগ)	২২০
ব্রাইডনিয়া (ব্রাই)	১৮৯	রাটানহিম (রাটান)	২২৫
ব্রোমিয়ম (ব্রোম)	১৯২	রাননিকউলম (রানন)	২২৬
ভিরেটম এলবম (ভিরে-এ)	১৯৪	রিউম (রিউ)	২২৭
ভিরেটম ভিরিডি (ভিরে-ভি)	১৯৬	রুমেক্স (রুম)	২২৮
ভেরিওলাইনম (ভোরওল)	১৯৭	রুটা (রুটা)	২২৯
ভেলিরিয়ানা (ভেলি)	১৯৮	রোডোডেজুন (রোড)	২৩০
মার্কিউরিয়াম (মার্ক)	১৯৯	লরোমিরেসম (লরো)	২৩১
" " ক্রোসাইডম (মার্ক-ক্র)	২০২	লাইকোপোডিয়াম, লাই)	২৩২
" " ডলসিস (মার্ক-ডল)	২০২	লাইসীন (লাইস)	২৩৫
" " প্রোটোআইড (মার্ক-প্রোটো)	২০৩	লিডাম (লিড)	২৩৬

লিলিয়াম (লিলি)	২৩৮	সিম্ফাইটম (সিম্ফা)	২৭৫
লোবেলিয়া (লোব)	২৪০	সিলিশিয়া (সিলি)	২৭৬
ল্যাক ক্যানাইনম (ল্যাক-ক্যান)	২৪১	সেলেনিয়াম (সেলেন)	২৭৯
ল্যাক ডিফ্লোরিটম (ল্যাক-ডি)	২৪৪	সোরিনঃম্ (সোর)	২৮১
ল্যাকেসিস (ল্যাক)	২৪৬	স্পঞ্জিয় (স্পঞ্জ)	২৮৫
ষ্টানম (ষ্টান)	২৪৯	স্পাইক্সিলিয়া (স্পিক্সি)	২৮৭
ষ্টাফিসেগ্রিয়া (ষ্টাফ)	২৫১	স্ট্রুইনোরিয়া (স্ট্রা)	২৮৯
ষ্ট্রোমোনিয়াম (ষ্ট্রাম)	২৫৪	স্ট্রানিকউলা (স্ট্রানি)	২৯০
সংলফঃর (সলফ)	২৫৬	স্ট্রাবাডিলা (স্ট্রাবা)	২৯২
সংলফিউরিক এসিড (সল-এসি)	২৫৯	স্ট্রাবিন (স্ট্রাবি)	২৯৪
সাইকিউটা (সিকিউ)	২৬১	স্ট্রাক্সম (স্ট্রাক্স)	২৯৫
সাইক্লোমেন (সাইক্লো)	২৬৩	হাইড্রোমায়োমাস (হাইড্র)	২৯৬
সার্সাপেরিলা (সার্সা)	২৬৪	হাইড্রাটিস (হাইড্রাট)	২৯৮
সিকেলি (সিক)	২৬৬	হাইপারিকম (হাইপার)	২৯৯
সিড্রন (সিড)	২৬৮	হিপার সলফর (হিপ)	৩০০
সিনা (সিন)	২৬৯	হেমেমেলিস (হেমে)	৩০৩
সিপিয় (সিপি)	২৭০	হেলিবোরস (হেলি)	৩০৪
সিফিলাইনম (সিকি)	২৭৩	হেলোনিয়াম (হেলোন)	৩০৬

ছক্ৰ পাবিত্যিক শব্দৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ ।

অধঃক্ষেপ Sediment	কম Prolapsus Uteri.
অনাগাহি Innominate.	কৰোটী Cranium.
অনুকল্প Vicarious.	ক্ৰান্তি মৈথুন Onanism.
অনুপূৰক সম্বন্ধ Complementary relation.	কৈলিক Capillary
অনুভূতি Sensitiveness	কোৰিকল-চক্ৰ-অস্থি Coccyx.
অপচ্যমান Papular.	গতিমনন স্নায়ু Motor Nerve.
অবদৰণ Excoriation	গল-কোষ Pharynx.
অবমান-বায়ু Hypochondriasis.	গুটিকা দোষ Tuberculosis.
অবিদাহী Bland.	হৃদ-বায়ু Hysteria.
অমোঘ ঔষধ Genus Epidemicus.	গুৰুণ Bunion.
অকৰ্ষণাত Sun-stroke.	গুহি-বাত Gout.
অস্থিবেষ্ট Periostium.	ঘূৰ্ণ-ভ্ৰণ Bruise.
অততি Tension.	চিপটিকা Crusta.
আৰ্দ্ৰকাল Damp weather.	ছক্ৰ Fungus.
আধিভৌতিক Mechanical	ছিদ্রাঘ Inclined wound.
আবেশ Contents.	জিহ্বা - কণ্টক Papillae.
আবিল Turbid.	উৰণ Convulsions.
আবেশ Paroxysm.	উষ্মাশয় Ovary.
আভিঘাতিক Traumatic.	ভ্ৰম Fibrin.
আম Mucus.	ভাৰ্ষণ Fluxion of heat.
আমবাত Rheumatism.	ভাৰ্ষণ Tonsil
আমাশয় Stomach	ভ্ৰম, বিকাৰি Sacrum.
উদ্বেগ Eruption.	দ্বন্দ্ব-শব্দ Sordes.
উপকৃত Aphthae	দীৰ্ঘস্থি Tibia.
উপঘাত Injury.	দেশ Region.
উপচয় Aggravation	ধাতু-বিকাৰ Cachexia.
উপতক Epithellum.	নাড়ী-ভ্ৰণ Fistula.
উপদাহ Irritation.	নিগোৰণ Deglutition.
কঙ্কু-দোষ Psora.	নিমগ্নত Sinking.
কণ্ডু Tendon.	নিৰীক্ষন Expectoration
কৰ্ণনিকা Cornea.	নৌ-গহ্বৰ Navicular fossa.
	পচ্যমান Pustular.
	পৰ্শ্ব-কোষ Intercoastal.

পাণ্ডুব Pale.
 পামা Eczema.
 পীড়ক Eruptions.
 পৃষ্ঠবংশ Spine.
 প্রতিক্রিয়া Reaction.
 প্রতিষ্ঠার Catarrh.
 প্রধাবন Rush.
 প্রবণতা Tendency.
 ফুসফুস-পাকশায়িক-শ্নায়ু Pnenmo-
 gastric nerve.
 বজ্র-শ্নায়ু Sciatic-nerve.
 বস্তি-কোটর Pelvis.
 বহুপাদ Polypus
 বাতকণ্টক Sprain.
 বিদাহী Acid.
 বিদ্ধব্রণ Punctured wound.
 বিধান-তন্তু Tissue
 বিবমিষা Nausea.
 বিষয়-নিষ্ঠা Objective.
 বিসমাসিত Decomposed.
 বিসর্প Erysipelas
 বৃক্ক Kidney.
 ভ্রণশোথ Abscess.
 ভৌতিক Physical.
 মণিপুৰ Pubis.
 মণিবন্ধ Wrist
 মদাতার Delirium-tremens.
 মধ্যাজ্ঞ Mesentery.
 মস্ত Serum.
 মাষক-দোষ Sycoxis.
 মুখ-রাগ Flush.
 মুখশায়িগ্রন্থি Prostate.
 মূত্র-নাশ Suppress of urine.
 মূত্র-মার্গ Urethra.

মূত্রাশয় Bladder.
 মূলাধার Perineum.
 মৃৎপাণ্ডু Anaemia.
 যান্ত্রিক Organic.
 রক্তাতিসার Dysentery.
 লসিকা Lymph.
 মন্দির Temple.
 শল্য Foreign body.
 শঙ্ক Scales.
 শিখর Apex.
 শীতপিত্ত Urticaria.
 শীতাদ Scurvy.
 মৈথুনিক ঝিল্লী Macous-mem-
 brane
 সংক্রান্ত Apoplexy.
 সংবৃত্তি Stricture.
 সত্ত্বব্রণ Wound
 সমন্বয়োগতা Co-ordination.
 সরলাজ্ঞ Rectum.
 সন্ফোটজ্বর Eruptive fevers.
 সহানুভূতি Sympathy.
 মাণ্ডলাল Albuminous.
 মাণ্ডর Porous.
 সূক্ষ্মাঙ্গ Delicate.
 স্থলাজ্ঞ Colon.
 সূচী-বেধ Stitching pain.
 শ্নায়ু Nerve.
 স্নগ্ন-সঞ্চরণ Somnambulism.
 স্বরজ্ঞাত Idiothetic.
 স্বরনাশ Aphonia.
 হস্ত Jaw.
 হস্তজ্ঞাত Lock-jaw.
 হরিৎপাণ্ডু Chlorosis.
 ছল-বেধন Stinging pain.

হোমিওপ্যাথিক ভেষজ্য-সূচী ।

—:—

অরম মেটেলিকঃম ।

(Aurum metallionum)

কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু ও কৃষ্ণবর্ণ চুল বিশিষ্ট রক্ত প্রাধান ব্যক্তি ; ও গভীরতা,
অস্থিরতা, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা (anxiety) বিশিষ্ট ব্যক্তি

ক্ষীণ-দৃষ্টি, শূণ্যকায় ; জীবনে বিতৃষ্ণ, যুগ ।

পারদ ও উপদংশের মন্দফলে ভয়-দেহ ব্যক্তি ।

নিশ্লেষ, নির্জীব, অগ্নি-মেধ (of weak memory), বালক-শুলভ ক্রীড়া-
কৌতুকে বিরত, অবিকসিত-অণ্ড ; জন্মঃ শীর্ণতাপ্রাপ্ত, বালক ।

অবিরত আত্মহত্যার চিন্তা (ভ্রাতা—কিন্তু মরিতে ভয়, নশ) ।

গভীর বিষাদ —যুগ ও বিবাদ-প্রযুক্তির উজ্জেক ; আত্মহত্যা

করিবার ইচ্ছা ; জীবন সন্দেহা গলগ্রাহ অসুখ ; পারদ অপব্যবহারের পর : প্রাণ
সকল রোগেই বিষাদের বিদ্যমানতা ।

অস্বচ্ছন্দতা, ব্যস্তসমস্ততা, মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের সাতিশয় ইচ্ছা ;
কিন্তু তাড়াতাড়ি কাণ্ড করিতে অসমর্থতা (আর্জ-না) ।

শোক, ও প্রেম-ভঙ্গজনিত অসুখ তৎসহ মৃত্যু ও আত্মহত্যার কামনা

ভয়, ক্রোধ, প্রতিবাদ, হিংসা, বৈরক্তি, আতঙ্ক, অথবা সংগোপিত অসন্তোষ
বশতঃ (ষ্টাফ) অসুখ

অতিরিক্ত অসুখতি, যৎসামান্য প্রতিবাদে ক্রোধের উজ্জেক (কোনা) ;
যাতনায় ; গন্ধে, স্বাদে, স্পর্শে ও স্পর্শে (এনা) ভীতভাবসুখ ।

কপিশবর্ণ মলিন-বদন ; হ্রস্বিত, বিষয়, মৌনী ; কোষ্ঠ-রোধ-প্রবণ ;
ব্যক্তিদ্বিগ্নের যৎসামান্য মানসিক পরিশ্রমে উজ্জিক, শিরঃপীড়া ।

কেশ-পতন, বিশেষতঃ উপদংশ ও পারদজনিত রোগে
অর্ক-দৃষ্টি, কেবল নিম্নাৰ্ক দৃষ্ট হয় (কেবল বামার্ক দেখা যায়, দিগ্ধি-কা,
লাই) ।

উপদংশ ও পারদজনিত অস্থি-রোগ ।

অস্থি-ক্ষত ।--নাসিকা ও তালুর অস্থির এবং কপাল-প্রান্তের স্তনাণ্ডী মদুল
অস্থির কেরিচ (Caries) ; পুতিনা (Ozaena) ও কর্ণজাব, অতি চর্গাক্রান্তাব ;
রাত্রিতে বেদনার বৃদ্ধি ; বেদনা বশতঃ হতাশ হইয়া পড়া ; পারদ অথবা উপদংশ
হইতে উহার উৎপত্তি (এসা) ।

উচ্চ স্থান হইতে কিছু পাড়িতে অথবা স্বাভাবিক শক্তি অপেক্ষা অতিরিক্ত
চেষ্টা করাতে (পড়, রস) ; এবং বিবৃদ্ধি বশতঃ (কোনা) জরায়ু বাহির হইয়া
পড়া ও উহার কঠিনতা প্রাপ্তি

অতিশয় বিষমতা সংযুক্ত রজোরোগ ও গর্ভাশয়ের (uterus) রোগ ; ঋতু-
কালে উহার বৃদ্ধি ।

বয়স্হতার প্রারম্ভে বালিকাদিগের খাসে চর্গাক্রান্ত ।

হৃৎপিণ্ড যেন স্থির হইয়া পড়িয়াছে এরূপ অমুভব ; যেন উহার স্পন্দন
স্থগিত হইয়াছিল এপ্রকার অমুভব, তৎপরে সহসা একটা কঠিন আঘাত
প্রদান (সিপি) ।

প্রবল হৃৎকম্প ।--তৎসহ পরিশ্রমের পরে মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে রক্ত-সঞ্চয় ;
কুষ্ঠ, ক্ষীণ, ক্ষত ও অনিয়মিত নাড়ী ; গলার ও কপাল-প্রান্তের ধমনীর
(Carotid) দৃশ্যমান স্পন্দন (বেল, রস) ।

হৃৎপিণ্ডের মেদোপকর্ষ (ফ্যাটিডিজেনারেসেন) (ফস) ।

উপচয় ।--শীতল বায়ুতে ; শীতল হইবার সময় ; শয়ন-কালে ; ও মান-
সিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি । কেবল শীতকালে অনেক অস্থির উপস্থিতি ।

উপশম ।--উষ্ণ বায়ুতে ; উষ্ণ হইবার সময় ; প্রাতে ও গ্রীষ্মকালে হ্রাস ।

সম্বন্ধ ।--(১) অরমের পরে সিফিলাইনঃম ও সিফিলাইনঃমের পরে অরম
ভাল খাটে । (২) অস্থি-রোগে ও জরায়ু রোগে, এসা, কাল, ঘাট, সিপি,
টার, থেরে, অরমের সম্বন্ধ

আইডুডঃম ।

(Iodum.)

কৃষ্ণবর্ণ কেশ ও চক্ষুবিহীন ষ্ট গণ্ডমালা-ঘাড়-হৃষ্ট ব্যক্তি, প্রাণাঢ়ি দুর্বলতা ও অতিশয় শীর্ণতা (এরোট) সংযুক্ত ঘাড়-হৃষ্ট অবস্থা

উপরের তলার উঠিবার সময় (ক্যাফ); ও ঘাড়কাণে (এলম, কার্ভো-এন, কক) অতিশয় দুর্বলতা ও শ্বাস-রক্ততা ।

অতিশূণ্য; বেশ আহার করা হয়, অথচ পেশীর শীর্ণতা জন্মে (এব্র, গাট-মিউ, স্যানি, টিউন)

প্রাণকাল হইতে রাজি পণ্যস্ত শূচোদগার, যেন ভুক্ত জন্মের প্রত্যেক কণা পরিবর্তিত হইয়া বায়ুতে পরিণত হইয়াছে (কালী-কা) ।

ক্ষুধা হইলে কষ্ট হয় । অল্পকণ পরে পরে আহার করা আবশ্যক হয়, না থাইলে উৎকর্ষা ও বিরক্তি জন্মে (মিনা, মলফ); আহার-কালে বা আহারান্তে, আমাশয় পূর্ণ থাকিলে, ভাল বোধ হয় ।

কণ্ডুয়ন —বৃক্কাধির পশ্চাড্ভাগে, হুমকুগের নিম্নদেশে কণ্ডুয়ন অগ্নিমা কামের উদ্ভেক; বায়ুনীর অভ্যন্তর দিয়া নাগ-রক্ষ, পণ্যস্ত সেই কণ্ডুয়নের সংস্কারণ (কক কোনা, ফস)

গল-গ্রন্থি (thyroid), গুন, ডিম্বাশয় (ovary), অণ্ডাশয়, জরায়ু, মূত্রাশয়ের মুখশাণ্ডীগ্রন্থি (parastatic gland), ও অজ্ঞাশয় গ্রন্থির বৃদ্ধি ও দুর্বলতা প্রাপ্তি-জন্মের শীর্ণতা ও লোপিততাও অগ্নিতে পারে

মলিনবর্ণ কেশবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের শক্ত গলগণ্ড (পাতল চুল বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে ব্রোম); আহারান্তে ভাল বোধ হয় ।

হৃৎকম্প, বৎসমাশয় ৭ গ্রন্থিতে উহার আতিশয় (ডিঅ, তুলনা ককন—বৎসমাশয় মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি, ক্যাল-আস)

হৃৎপিণ্ড যেন সংশ্লিষ্ট হইতেছে অক্লপ অল্পভব; যেন গৌর নিম্নিত হস্তে ধৃত হইয়াছে এ প্রকার অল্পভব (ক্যাফ, মলফ) ।

কুপ ।—কৃত্রিম ঝিল্লীবিশিষ্ট কুপ, পরজন্মযুক্ত শুককাম, উদার আশ্রয়কালে কি, ভৎসহ হাঁগফাঁস ও কল্লাতটানার জায় শব্দ (মলফ) ।

বাগক হাতনিয়া স্বরযন্ত্র ধরে (সেপা); বাগকের, বিশেষতঃ মাংসল বাগকদিগের মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ও নীতল হয়।

শ্বেতপ্রদর —বিদাহীপদর আবে বস্ত্রে দাগপাগে ও বস্ত্র থাইয়া যায় ; ঋতুকালে প্রদরের সমধিক প্রাচুর্য্য আছে

জরায়ু গ্রীবার (cervix) ক্যানসারজনিত অপকৃষ্টতা (degeneration) ; উদরে কর্তনবৎ বেদনা ও পতোকবার মগত্যাগকালে রক্তস্রাব।

বিফল মল-প্রবৃত্তি সহ কোষ্ঠ রোধ, নীতল দুগ্ধপানে উহার উপশম

উপচয় —উষ্ণতায় ; ও মস্তকে কাপড় ছড়াইতে বৃদ্ধি (হিপার ও সোরিনমের বিপরীত)

সম্বন্ধ ।—(১) লাইকোপোডিয়ামের সহিত অল্পপুরুষ সম্বন্ধ। (২) কৃত্রিম ঝিল্লীবিশিষ্ট ক্রুপরোগে ও ক্রুপসংক্রান্ত পীড়ায়, বিশেষতঃ গণ্ডমালা-ধাতু দৃষ্টে অতিবর্দ্ধিত বাগকদিগের রোগে, এসে-এসি, ব্রোম, কালী বাই, কোনা, ও স্পঞ্জের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ। (৩) হিপার ও মার্কেস পরে আইওড ভাল খাটে, ক্রুপরোগে আইওডের পর কালী-বাই ভাল খাটে। (৪) লিপি বলেন যে পুষ্টিমান পরে, অথবা চন্দ্রের ক্ষয়প্রাপ্তির সময় প্রয়োগ করিলে আইওডিনের সর্বোত্তম ক্রিয়া দর্শে। (৫) হেরিং বলেন যে পোস্ত্যাবস্থায় উচ্চক্রমে ভিন্ন ঔষধ ব্যবহার করা বিহিত নহে

আর্জেন্টাম নাইট্রিকম্ ।

(Argentum Nitricum)

অসাধারণ অথবা দীর্ঘকালব্যাপী মানসিক পরিশ্রমজনিত তরুণ বা পুরাতন রোগ

শুষ্ক, দীর্ঘ, বৃদ্ধবৎদৃষ্ট রোগী

প্রতিবৎসর বিবর্দ্ধিত দীর্ঘতা ; নিম্নশাখাধমে উহার অত্যন্ত স্পষ্টতা (এম-মি) ; ক্ষয়-রোগ (Marasmus) ।

ভজনাগ্নয়ে অথবা নাট্যশালায় যাইবার সময় আশঙ্কায় উৎপত্তি ও অতিসারের উপস্থিতি (জেল) ।

সময় ধীরে ধীরে যায় (ক্যান-২৩), ভাড়াভাড়া কার্যা কাজ
করিবার ইচ্ছা ; শীঘ্র শীঘ্র হাটন ; মনোমাহ মনোমাহ , ব্যাকুলতা, কোপনতা,
ও ন্যায়বীর্যতা (অর, জিগি) ।

শিরঃপীড়া — মস্তকের পূর্ণতা ও স্বাভাৱিতা সহ রক্ত-সঞ্চয় জীনত,
প্রসারিত অনুভব সহ বাহ্যিক-বৌদ্ধির অভ্যন্তরীণ জীবনিক , নতুন
জীনত ; রূপান্তর সম্মুখাংগের উন্নতিতে অথবা শঙ্কিতানে (temerity)
আকৃষ্টন ও প্রচাপনবৎ এক পার্থক্য , পিত্ত বমনে পরিণাম , অবসাদজনক
মানসিক পরিশ্রমে বিবদ্ধিত ; এবং প্রচাপনে বা দূর্বলতানে
উপশমিত (এপিস, পলম) ; শিরঃপাড়া ।

চক্ষুর শুষ্কমণ্ডলের তরল দানাময় প্রদাহ , কাঁচা গো-মাংসের ন্যায়
লোহিত বর্ণ ; পুথাক্ত স্লেষ্মাময় ও ভূতজ্ঞান

নবজাত শিশুদিগের চক্ষু প্রদাহ । পুথময় ও ভূত জ্ঞান নিঃসরণ , কনীনকার
(cornea) অস্বচ্ছতা ও ক্ষত ; অগ্নি-পুটের ক্ষত, স্থলদ্র ও ক্ষৌভতা , প্রাণে
সংযোজন (এপিস, মার্ক-মল, রসট্যা) ।

সূচী কাষ্যজনিত চক্ষুর অস্বচ্ছতা, উৎসাহে উহার উপশম, ও অনাবৃত
বায়ুতে বৃদ্ধি (জাট-মি, কটো) ।

চিনি আহ্বারের আকাঙ্ক্ষা — বাক্য চিনি পাইতে জাগবামে, কিঞ্চ পাইলে
অতিসার জন্মে (লবণ বা ধূম-অম্ল মাংস (Smoked meat) আহ্বারে পূহা,
ক্যাঙ্ক-ফস)

আমাস্রয়ের অধিকাংশ রোগেই উদগারের বিদ্যমানতা ।

আগ্নান সংযুক্ত (flatulent) অগ্নিমান্দ্য । প্রত্যেকবার আহ্বারের পরে
উদগার ; বায়ুতে আম দ্বয় যেন ফাটিয়া যাইবে একপ কষ্টতা , উদগার
অন্যায়্যে উঠেন , অবশেষে অতিশয় ও তীব্রতায় বায়ু নিঃসৃত হয় ।

গিঠিবার সময় গলায় যেন চৌচ মুটিয়া বহিয়াছে একেবারে অস্বস্তি
(জিগি, হিপ, নাই এমি, মিলি) । হাটবার সময় অথবা কখনো কখনো এর যুক্ত
বা তলিকটেও চৌচ ফুটার স্থায় অস্বস্তি ।

অতিসার — কাটা শাকের ন্যায় ছিবড়া ছিবড়া সবুজ আম ,
শয্যাবস্ত্রে থাকিলে পরে সবুজবৎ পরিণতি ; জলপানান্তে অতি-

সার ; মিছরি অথবা চিনি খাওয়ার পর অতিসার ; স্বজাকার
থণ্ডেথণ্ডে অথবা গিঙে গিঙে রাশি রাশি শ্লেষ্মামিশ্রিত লসিকা (masses of
mucolymph) পড়ন (এসার) ; তৎসহ সশব্দে অধিক বায়ু নিঃসরণ (এলো)

জলপান করিবারাত্র অতিসার (আস', কোট-টিগ, থুম) ।

দিবারাত্রি অজ্ঞাতসারে মূত্র নিঃসরণ (কষ্ট)

ধ্বজভঙ্গ —রমণ চেষ্টায় উঃ হের অল্পখান ('গনস, ক্যালাভ, সেচেন)

রতি-ক্রিয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই রতিক্রিয়ায় যাতনা , রমনাস্তে যোনি
হইতে রক্তপাত (নাই-এসি)

জরায়ুতে রক্তশ্রাব —যুবতীবিশ্বাদিগের ; বক্ষ্যাদিগের ; স্নায়বীয়
ক্রিয়ার বিকৃত বিবৃদ্ধি সহকারে নিবৃত্ত-রক্তস্রাবাদিগের (ব্যাক),
জরায়ু হইতে রক্তশ্রাব ।

বিমল বায়ু সেবনের অতিশয় স্পৃহা (এমিল পলস, সলফ)

গায়কদিগের পুনাতন শ্রমবস্ত্র প্রদাহ ; উচ্চস্বরে কাস অনায়াস (এলম, আর্জ-
মে, এরম)

নিম্নাঙ্গে অতিশয় দুর্বলতা, ও কম্পন ; চক্ষুবুজিয়া হাঁটিতে পারা যায় না ।
দৃঢ়রূপে হাঁটিতে বা দাঁড়াইতে পারা যায় না, বিশেষতঃ যখন অল্প কেৎ
দেখেনা মনে করা যায় ।

টঙ্কারের (দড়কা) পূর্বে অতিশয় অস্থিরতা ।

গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিলে শীতানুভব, অথচ বস্ত্রাবৃত
হইলে শ্বাস-রোধানুভব ; বিমল বায়ু সেবনের স্পৃহা ।

এই ঔষধে ক্ষতে অধিক ক্ষতাস্থিরের উৎপত্তি নিবারণ করে ।

উপচয় ।—শীতল খাদ্যজব্য ; শীতল বায়ু ; চিনি আহার ; বগফের
কুন্নী ভোজন ; ও অসাধারণ মানসিক পরিশ্রমে ; বৃদ্ধি ।

উপশম । অনাবৃত বায়ুতে ; মুখমণ্ডলে বাতাস লাগিলে ; ও শীতলজলে
স্নানে , হ্রাস ।

সম্বন্ধ —(১) নাইট্রেটকৃত সিলভার দ্বারা পোড়াইয়া দেওয়ার মন্দফলে
ল্যাক্টিম মিউর ফলপ্রাপ্ত (২) কাফি সেবনে এই ঔষধের স্নায়বীয় বিরোধননা
বৃদ্ধি পায় (৩) তামাক খাওয়ার পর বালকদিগের অন্ত্রে এই ঔষধ

উপযোগী হয় (আম', জিহ) (৪) আম', মিত, নাই-এম' ব্যাধ, অসম, ও কুপের ম ২৩ হুহান সমস্ত ময় (৫) উত্তরোত্তর পরে আ' 'কম নাট্টে কম ভাল থা'ই. আ'জান ময়দা বাগিমা'এর বাজের'ম নাটটি কামর পরে ও হিহো'ও উত্তর উপযোগী হয়

ଆମର ନାହିଁଟି ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏର ଶକ୍ତି ୫ ଶାମ ୧୨ ମସିହା ୧୨ ମସିହା
 ୫୦ ନ ମସିହା ଦିନ ୭ ଅଥବା ମହଲ ଶକ୍ତିର ଶକ୍ତି ୧ ଶକ୍ତି ୧୨ ମସିହା ୧୨ ମସିହା
 ଉପକାର ମଧ୍ୟ

(Argentum Metallum)

ନୀର୍ଘ, ନୀର, କୋମଳ-ସ୍ଵଭାବ ବାହୁଗୁଣେନ ଗ୍ରୋମ ।

গার্ল অপর্যবহারজনিত রোগ ।

कृत्रिम दैवतान्तरा सर्वान्छिन यथा

উপাস্থ (cartilages), চক্ষি-স্পুটের উপাস্থ, কণ, কণ-বল, -সামকী ও
 গন্ধিস্থলের বিধানাদির পাড়া

অপ-দোষ — কুদ্রিম মৈত্র্যের পরে, প্রায় যে ও রাজিতে; উপস্থিত উপান
ব্যতীত; ও উপস্থিত দীর্ঘতামহ নিদ্রাবস্থা; শুক্রপাক

ଆତ୍ମକୋଷର ସ୍ପର୍ଶବଦ୍ଧ ବେଳନା

ବାୟ ଡିସ୍‌ଆନ୍‌ଡ୍ରେ (Ovary) ଓ ପ୍ରୁଥେ ବେଦନା, ଜବର ମସ୍ତୁର ଓ ମଳାଞ୍ଜାଗେ ଡିସ୍‌ଆନ୍‌ଡ୍ରେ ମହକାରେ ବନ୍ଦରୋଗ (ଉତ୍ତାପୁର ସ୍ଥାନ ବିଚ୍ଛାଡ଼ି, prolapsus) (ମାଳିକ ଡିସ୍‌ଆନ୍‌ଡ୍ରେ ବେଦନା, ପ୍ୟାଲ) ; ମିସ୍ତୁରରଜକାମିତେ ମ ଚକ୍ରସ୍ରାବ ।

ମୋକ୍ଷଣା ଧନକ, ୭ ହାଟିମଧୁସୂକ୍ତ ଉପକ୍ରମ ୩ ମି ।

ବାସନ୍ତୀୟା ଗାୟକ ଓ ବଜ୍ରାମ୍ବିତେଶ ଅଗ୍ରଭ୍ୟ (ଶ୍ରୀମତ, ଶ୍ରୀମତ)

वाचमाओ शीघ्रकसिदेशत मभूर्ण अत-नाम

কিছু গিমিটে, অথবা কাসিমিটে গলা ও শরমধ্যে ব্যবহার (Note) অনুভব

হাস্যে কাসের উদ্ভেদক জন্মে (ভ্রম, কশ, প্যান) ও পরবর্ত্তে গাঢ়
শোথার উৎপত্তি হয়।

উচ্চৈঃস্বরে পড়িবার সময় থক থক করিয়া কাগিতে হয় ; শিরীষের ছায় আঠা আঠা সিদ্ধ শ্বেতসারের (boiled starch) ছায় দৃষ্ট সহজে নির্গত নিষ্ঠীবন-বিশিষ্ট কাস

বক্ষঃস্থলের অতিশয় দুর্বলতা (ষ্টান) ; বাম পাশে উহার আধিক্য । গায়ক ও বক্তাবিগের স্বরের গুণের বৈলক্ষণ্য (এরম) ।

স্বরযন্ত্রের দ্বিখাখা স্থলের (bifurcation of the trachea) উপরে অবদীর্ণ ক্ষুদ্র স্থান (raw spot) ; স্বরের ব্যবহারে, আলাপে বা গানে উহার অতিশয় ।

উপচয় —গাড়ীতে চড়িলে (কক) ; স্পৃষ্ট বা প্রচাপিত হইলে ; আলাপে গানে ও উচ্চৈঃস্বরে পাঠে ; বৃদ্ধি ।

সম্বন্ধ ।—(১) এলমের পরে আর্জ-মেট ভাল খাটে । (২) হাশ্বে কাসের উল্লেখ ষ্ট্যানমের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ

আর্নিকা মণ্টেনা ।

(Arnica Montana)

স্নায়বীয়া নারী, রক্ত প্রধান ব্যক্তি, এবং মুখাকৃতির সম্ভাবিতা ও অতিশয় আরক্ততা ।

উপঘাতাদির মুখ্য বা গৌণফল বিশেষতঃ সামান্য উপঘাতের দীর্ঘকাল স্থায়ী সংস্কার (ইম্প্রেশন)

সর্বশরীরের অভ্যন্তর দিয়া আঘাতিতবৎ স্পর্শ-দ্বেষ, খণ্ডতা ও ঘৃণতা অনুভব ; পেদীর আভিঘাতিক পীড়া ।

আধিভৌতিক (মিক্যানিকাল) উপঘাত, বিশেষতঃ সংঘাত (ককশন) জনিত স্ফুট (ষ্ট্রুপার) সংযুক্ত, উপঘাত ; অনিচ্ছার মল মূত্র নিঃসরণ

স্থূল-মূখ অঙ্গজনিত উপঘাতের পর ব্যবহার্য্য (সিফা)

বিমিশ্র ভগ্ন (কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার) ও তজ্জনিত প্রচুর পুষ্ণোৎপত্তি (ক্যালো)

আঘাত বা উপঘাতের ফলে ; কোমলস্থানের বিদারণ পরিশূন্য সংঘর্ষণে ও

নিষ্পেষণে, এবং পুষ্টিপদ্ধতি ও পচন নিবারণার্থে ও আশোষণ-ক্রিয়া (absorption) প্রবর্তনার্থে ব্যবহৃত।

স্নায়বীয়তা, বেদনা সহ্য হয়না ; শরীরের আভ্যন্তরীণ অঙ্গাঙ্গিকতা (কায়, কক্ষি, ইত্যে)

যে কোন বস্তুর উপর শয়ন করা যায় তাহা আভ্যন্তরীণ

বোধ হয় ; রোগী অবশ্য এই নিয়মের আনয়ন করে এবং একটু

নরম স্থান পাইবার জন্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া সরিয়া যাঁতে থাকে (শরীরের যে অংশে ভর দিয়া থাকা যায় তাহা স্থিতি বা স্থায়িত্ব বোধ হয়, ব্যাপ্তি, পাইরে , বেদনার শাস্তির জন্য অবিরত উহা নাড়াচাড়া আবশ্যিক হয়, রসটকা) ।

শরীরের উষ্ণতার উত্তাপ ; শিরার শীতলতা ।

মৃৎমণ্ডল অথবা কেবল মস্তক ও মৃৎমণ্ডলের চক্ৰতা ; শিরার শীতলতা ।

সংজ্ঞাশূন্যতা ; কিছু জিজ্ঞাস করিলে পরিশুদ্ধরূপে উত্তর পাওয়া যায় না, কিছু অট্টোত্তর ও প্রাণাণ উৎকর্ষিত জেতায়ু হয় (কোন ব্যক্তির মনোস্থানে বসাইয়া পড়া, ব্যাপ্তি)

রোগী বলে যে তাহার কিছু হয় নাই

উপঘাত বা অভিঘাত জনিত, গতন বা মস্তিষ্কের সংঘর্ষজনিত (concussion) মস্তিষ্ক-বিলম্বিত প্রদাহে, রক্ত-ক্ষরণের সন্দেহ হইলে আশোষণের সাহায্যার্থ ব্যবস্থার । হাইড্রোক্যেফালাস , বালকদিগের বাহ্যিক সম্মুখাংশের মৃতবৎ শীতলতা (অতিমাত্র, ব্রোম)

সংজ্ঞাস , চৈতন্যশূন্যতা , অনিচ্ছায় মল-মূত্র নিঃসরণ ; তদ্রূপ আক্রমণে এই ঔষধে রক্ত-ক্ষরণ প্রদায়িত ও আশোষণ প্রবর্তিত হয় , পুনঃপ্রায়োজিত হওয়া উচিত এবং রোগীর লক্ষণ-মুঠে অল্প ঔষধ ব্যবহার করা প্রয়োজনীয় না হইলে কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ ইচ্ছার ক্রিয়া হইতে দেওয়া বিহিত ।

উপঘাত অথবা কাম বশতঃ চক্ষুর শুক্রমণ্ডলে কিম্বা তারকামণ্ডলে (Iris) রক্ত ক্ষরিত হইয়া রক্তপাত (লিড মক) ।

স্পৃষ্ট বা আহত হইবার অতিশয় আশঙ্কা সংযুক্ত, গাউট ও আমবাত

বস্তি-গহ্বর (Pelvis) প্রদেশে একপ্রকার ঘৃষ্টবৎ অসুভব বশতঃ মোজা হইয়া হাঁটিতে অসমর্থত ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, বেদনাবিশিষ্ট, একটীর পর আর একটী, অত্যন্ত স্পর্শ-বেদনসংযুক্ত ফোটকোৎপাত্তির প্রবণতা (একমুখে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোটকোৎপত্তি, সঙ্গফ) ।

বামদিকের পক্ষাঘাত, সবল ও পূর্ণ নাড়ী ; শ্বাসের ঘড় ঘড় শব্দ, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ; বিড় বিড় কবিয়া বকা ।

উল্কার ; ডেকুর, পচা ডিমের স্থায় ছর্গন্ধ

রক্তাতিসার ; তৎসহ মূত্র-রোধ, বিফল মূত্র-বেগ ; অনেকক্ষণ পরে পরে মলত্যাগ ।

কোষ্ঠ-রোধ ; সরলান্ত্রে মল সঞ্চিত থাকে, অণচ নির্গত হয় না, মূত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থির বৃদ্ধি অথবা গর্ভাশয়ের বিপর্যাস্ততা (retroversion) বশতঃ ফিতার স্থায় মল

প্রসবের পর জননাস্থের স্পর্শ-বেদন ; এই উদ্দেশ্যে প্রসবের পরবর্তী রক্তস্রাব ও উপসর্গাদির প্রতিবেদন ঘনো

প্রসবের পর মূত্র-রোধ কিংবা ও বাহিত মূত্রস্রাব (ওপি)

উপচয় ।—বিশ্রামে ; শয়ন কালে ; ও স্নানপানে ; বৃদ্ধি

উপশম ।—স্পর্শে ; ও সঞ্চালনে (রস, স্নাত) ক্রাস

সম্বন্ধ ।—(১) একন, হাইপার, ও রসটকোর সহিত আর্গিকার অল্পপুরুষ সম্বন্ধ (২) ঘৃষ্টবৎস্পর্শ-দ্বেষ্টে ব্যাপ্ট, চায়না, ফাইটো, পাইরো, রসটক, ও ট্যাফের সহিত আর্গিকার সমগুণ সম্বন্ধ । (৩) একন, এপিস, হেম, ইপি, ভিরের পরে আর্গিকা ভাল খাটে ; আর্গিকার ০য়ে মল-এসি ভাল খাটে (৪) মদিরা পান কিম্বা অজারের ধূমজনিত পাড়ায় অনেক সময় আর্গিকা ব্যবহৃত হয় (৫) পৃষ্ঠবংশীর সংঘর্ষে, হাইপারিকামের সহিত আর্গিকার তুলনা হয়

আর্সেনিকঃম এলবঃম ।

(Arsenionum Album)

অতিশয় অবসন্নতা, জীবনশক্তির শীঘ্র শীঘ্র অবমানন ;
মূর্ছা

প্রকৃতি :—[ক] অবসন্নতা, বমাদ নিরাসা, ঔদাস্য

[খ] ব্যাকুলতা, ভয়পূর্ণতা অস্থিরতা, অপ্রচ্ছন্নতা ।

[গ] কোপনতা, অল্পভাবাধিক্য, কণরোগিতা সহজে বিরক্তির উৎপত্তি ।

যাতনায় যতই আতিশয়া অপ্রচ্ছন্নতা, অস্থিরতা ও মৃত্যু ভয়ের ততই আধিক্য ।

মানসিক অস্থিরতা কিন্তু শরীরের এত দুর্বলতা যে
নড়িতে পারা যায় না ; একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারা যায় না ;
অবিরত স্থান-পরিবর্তন করা আবশ্যিক হয় ; রোগী এক শয্যা হহতে অল্প শয্যা
যাইতে চায়, এবং কখনও এখানে, কখনও সেখানে শয়ন করিয়া থাকে

ব্যাকুলতা সংযুক্ত মৃত্যু ভয় ; রোগী মনে করে যে ঐমত সেবনে কোন ফল
দর্শিবে না, তাহার রোগ আরোগ্য প্রাপ্ত হইবে না ; সে নিশ্চিতই
মরিতে যাইতেছে ; একাকা থাকিলে, অথবা শয্যায় শয়ন করিতে গেলে
মৃত্যু ভয় ।

স্নাত্তিতে উৎকর্ষার আক্রমণ, তৎক্ষণাৎ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হয়,
গম্যরাজির পরে উহা বর্জিত হয়

জ্বালাকর বেদনা, আক্রান্ত স্থান অগ্নি-দাহের ন্যায় জ্বালা

করে, বোধ হয় যেন কে একজন স্থলে তথ্য অঙ্গার লাগান হইয়াছে (দেখা),

উত্তাপ, উত্তপ্ত পানীয় জব্য, এবং উত্তপ্ত বায়ু প্রয়োগ দ্বারা উহার ক্রাস

অগ্নে

জ্বালাকর পিপাসা অথচ জল পান করিবার প্রবৃত্তিহীনতা ; আমাশয়ে জল
সহ্য হয় না, কেননা উহা শীতল জল জীর্ণ করিতে পারে না, আমাশয়ে শীতল
জল প্রস্তরের ন্যায় অবস্থিত থাকে । রোগী জল চায় বটে কিন্তু পান করিতে
পারে ন বা সাহস করে না ।

খাদ্য দ্রব্যের গন্ধ বা দর্শন সহ্য করিতে পারা যায় না
(কলচি, সিপি) ।

শীতল জল পানের আতশয় পিপাসা ; এক একবার অল্প অল্প
করিয়া বারবার জলপান ; কচিৎ কচিৎ আহার গ্রহণ, কিন্তু পারমাণে
অধিক ।

শীতল ফল ; বরফের কুলী ; বরফের জল অল্প বিয়ার, বিশিষ্টরূপে প্রস্তুত
মাংস (সসেজ) ; উগ্র মদিরা ; উগ্র পনির, সেবন বশতঃ আশাশয়িক
উপদ্রব

দাঁত উঠিবার সময় শিশুদিগের পাণ্ডুরতা, দুর্বলতা, বিরক্তচিত্ততা, ও কোলে
চড়িয়া দ্রুত গতিতে বেড়াইবার প্রবৃত্তি

আহার বা পানান্তে, অতিশয় ; অল্প, মলিন বর্ণ, দুর্গন্ধময় মল ; মল
ক্ষুদ্রই হউক বা বৃহৎই হউক, মলত্যাগের পর অতিশয় অবসন্নতা ।

অর্শঃ—হাঁটিলে বা বসিয়া থাকিলে, কিন্তু মলত্যাগকালে নয়, স্থচী-বেধবৎ
বেদনা, তদ্বারা উপবেশন ও নিদ্রার ব্যাঘাত ; উত্তাপ প্রদানে জ্বালাকর
বেদনার হ্রাস প্রাপ্তি ; অর্শ-বলির বিদারণ বশতঃ মূত্রত্যাগে কষ্ট

শ্বাস শ্বাস-কাসের (Asthma) শ্বাস ; উঠিয়া বসিতে অথবা সন্মুখভাগে
অবনত হইয়া থাকিতে হয় ; প্রাজিতে, বিশেষতঃ বারটার পরে শয্যা হইতে
নামিয়া পড়িতে হয়, শ্বাস-রোধের আশঙ্কায় শয়ন করিতে পারা
যায় না ; শীত-পিত্ত (Urticaria) রোগের পরিবর্তে ক্রুরোগের ন্যায়
আক্রমণ ।

সত্তর শীর্ণতা প্রাপ্তি ।—শীতল ষর্শ ও অতিশয় দুর্বলতা সহকারে শীঘ্র শীঘ্র
শীর্ণতা (টিউব, ভিরে) ; রোগাক্রান্ত স্থানের শীর্ণতা, ক্ষয় (Marasmus)

শোথ, ত্বকের পাণ্ডুবর্ণ, মোমের বর্ণ, মৃত্তিকার বর্ণ (এসে-এসি) ।

যৎসামান্য পরিশ্রমে অত্যন্ত অবসন্নতা ।

স্থির হইয়া শয়ন করিয়া থাকিলে রোগীর অবসন্নতা অস্বভূত হয়না ; কিন্তু
নড়িলা নড়িলা বড়ই অবসন্ন রোগ হয়

অপরাক্ষ ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত এবং রাত্রি ১২ট হইতে ২টা পর্য্যন্ত মাথার ওঃ
রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি

ত্বক, — শুষ্ক ও মশক ; শীতল, নীলবর্ণ ও কৃষ্ণকৃত ; শীতল, অসিা অসিা
ঘর্ষাক্ত ; পার্শ্বমেন্টে সূক্ষ্ম ; শুষ্ক ও লেহন ; রক্তবর্ণ ফোটা ও আলোক
বেদনাবিশিষ্ট ; ত্বক

আত্মাণ, আহার, অথবা অল্প কোন প্রকারে শরীরে পচা বাতজন্ম কিংবা
পচা অস্থি পদার্থের সংগ্রহের মন্দফল।

উপচয় ।— মধ্যরাত্রির পরে (১ ট হইতে ২টা রাত্রি পর্য্যন্ত),
শীতলতা হইতে ; শীতল আহার্য বা পানীয় দ্রব্য ;
আক্রান্ত পার্শ্ব অথবা মস্তক নীচ করিয়া রাখেন , রক্ত ।

উপশম ।—সাধারণতঃ উত্তাপে (মিকেলির বিপরীত), কিন্তু
শিরঃপিড়ার উত্তাপে নহে, শীতল জলে মুঠলে এই শিরঃপিড়ার অগ্ন্যায়ী হাম
(পিঞ্জি) ; আলোকর বেদনা, উত্তাপে উহার হাম আশ্বি ।

সম্বন্ধ ।—(১) এলিয়ম সেপ , কাকো, ফস, পাইরোর সহিত আমে-
নিকের অল্পপূরক (Complementary) সম্বন্ধ (২) তামাক চাপন ;
মাদিরাপান ; সমুদ্রজলে স্নান ; মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ অনিত কৃত ও কাগজের বিদ্য ;
বিষাক্ত জন্তর ছল-বেধাদি অনিত পাড়ায় আচে নিকের কথা প্ররণ করা অজ্ঞান

ইউপেটোরিয়ম পার্ফোলিয়েটম ।

(*Eupatorium Perfoliatum*)

বৃক্কদিগের রোগে ; ভগ্নদেহ, বিশেষতঃ অপারিত্ত প্ররপান মশকঃ
ভগ্নদেহ ব্যক্তিদিগের রোগে ; দীর্ঘকাল স্থায়ী অগ্না পুনঃ পুনঃ টৈপাক্ত অগ্ন বা
সবিরাম জরের আক্রমণ আনিত মাতৃ-বিকৃতিতে এই ঔষধ উপযোগী

সর্ব শরীরে ভগ্নবৎ ঘৃষ্টতা-অনুভব (আগ, বোলন,
পাইরো)

পৃষ্ঠ, মস্তক, বক্ষঃস্থল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষতঃ মণিবন্ধে (Wrist) সন্ধিচ্যুতবৎ
অস্থি-বেদনা ।

বেদনার গতই সর্বাঙ্গীনতা ও তীব্রতা থাকে ততই এই ঔষধ অধিক উৎপাদিত হয় (এই, মার্ক, তুলনা করুন) ।

অক্ষি-গোলকে বেদনাবিশিষ্ট স্পর্শবেদ ; প্রতিশ্রাব্য, প্রতি
অস্থিতে বেদনা ; ব্যাপক ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে অতিশয় অবসাদ (ল্যাক-ক্যান)

শীঘ্র শীঘ্র বেদনার আবির্ভাব ও শীঘ্র শীঘ্র বিরোভাব (বেল, ম্যাগ ফস,
ইউপ-পার্পু)

শিরোধূর্গন ; যেন বামদিকে পতিত হইতে হইবে এক্ষণে অনুভব (পতনের
আশঙ্কায় বামদিকে মাথা ফিরাইতে পারা যায় না, কলো)

কাস — পুরাতন কাস ; প্রলেপক জ্বর (হেট্টিক ফিভার) সহকারে
তরলকাস ; বক্ষঃস্থলে স্পর্শ-বেদ, হাত দিয়া বুক ধরিয়া রাখিতে হয় (এই,
গাট-কা), রাখিতে বৃদ্ধি, হৃৎকের পরে অথবা অবিরাম জরের অবরুদ্ধতার
পরে কাস

জ্বর ।—একদিন পূর্বাঙ্কে ৭টা হইতে ৯টা পর্যন্ত শীত, পরদিন মধ্যাহ্নে শীত ;
শীতের শেষে তীব্র বমন, ভাল পানে শীতের তীব্রতা জন্মে এবং বমনোৎপন্ন হয় ;
শীতের পূর্বে ও শীতের ভোগকালে, অস্থি-বেদনা ।

শীত ও তাপাবস্থার পূর্বে ও ভোগকালে অকৃত্রিম পিপাসা
রোগী যথেষ্ট জল পান করিতে পারেন বলিয়া, শীত থাকিতে
জানিতে পার

সম্বন্ধ । (১) এই ঔষধের পরে গাট-মিউ এরং সিপিফা ভাল খাটে
(২) পাণ্ডুগ্রস্ত অবস্থায় ইহার সহিত চেলি, পডে, ও লাইকোর তুলনা হয়
(৩) ব্রাইয়োনিয়া এই ঔষধের অনিষ্ট সমুদয় প্রভেদ এই যে ব্রাইয়োনিয়ায়
বিমুক্ত ভাবে স্বপ্ন নিঃসৃত হয় ও বেদনার রোগী সুস্থির হইয়া থাকে ; ইউপেটো-
রিয়মে স্বপ্ন ঘর্ম হয় এবং বেদনার রোগীর অস্থিরতা থাকে .

ইউফ্রাসিয়া ।

(Euphrasia)

পতন, সংঘর্ষণ অথবা বাহ্যাদের চর্মানয় আঘাতোত্তক (মেক্যানিক্যাল)
উৎসাহের সম্ভাব্য (আর্গ) ।

শৈথিল্যিক ঝিল্লি (mucous membrane) বিশেষতঃ চক্ষু ও নাসিকার
শৈথিল্যিক ঝিল্লির প্রতিক্রিয়াজনিত পীড়া (catarrhal affection) ।

প্রভূত বিদাহী অপ্রোক্ত্যাব, তৎসহকারে প্রভূত অবিদাহী
প্রতিক্রিয়ায় (অর্ধ-সেবার বিপরীত)

চক্ষু দিয়া সকল সময়েই জল পড়ে, এবং পাত্রে চক্ষু সংযো-
জিত হইয়া থাকে ; চক্ষুর পাতার প্রান্তভাগের আরক্ততা, ক্ষততা ও জালা ;

প্রাতঃকালে প্রবল কাস ও প্রচুর নিশ্বাস সহকারে প্রভূত তল গতিক্রিয়া,
দক্ষিণদিকের উষ্ণ বাতাসে উহার বৃদ্ধি

প্রাতঃকালে বিরক্তিকর স্নেহাখণ্ড তুলিতে চেষ্টা করিলে, যে সময় অথবা
বহিঃ পূর্বে ভুক্ত খাদ্যের বমন হইয়া না পড়ে সে পর্য্যন্ত খাদ্য ঠেক ঠেক
অগ্রহৃত হয় (গ্রাহ)

উচ্চাপ্রসঙ্গক থক থক করিয়া কাসিলে প্রভূত স্নেহা-নিশ্বাস, প্রাতে নিশ্বাস
হইতে উত্থানে উহার বৃদ্ধি

হৃৎ শব্দ কাস—কাসিবার সময় অতিশয় অপ্রোক্ত্যাব ; কেবল
দিবাভাগে কাস (ফির, গাট-মিউ) ।

চক্ষু এবং নাসিকার প্রতিক্রিয়া সহকারে স্নেহোন্মোহ, প্রভূত বিদাহী
অপ্রোক্ত্যাব

ধাতু ।—সঙ্গীতাদি নিয়মিত, কেবল এক ঘণ্টা স্থায়ী আব ;
অথবা বিলম্বে প্রকাশিত ; সঙ্গ, অঙ্গকালস্থায়ী, কেবল একদিন অবস্থিত, ধাতু
(ব্যাধি) ।

উপচয় ।—সন্ধ্যাকালে, শয্যা, গৃহের অভ্যন্তরে উষ্ণতা, আর্দ্রতা ;
দক্ষিণদিকের বাতাস লাগাইবার পর ; কেহ স্পর্শ করিলে
(হিপ) ; বৃদ্ধি ।

সম্বন্ধ ।—(১) চক্ষু-রোগে পলসেটিলার সমস্ত (২) অশ্রুপ্রাণ ও
নাসিকার প্রতিষ্ঠায় এলিয়ম সেনার বিপরীত

ইকুইসিটম হাইমেল ।

(*Equisetum Hyemale*)

মূত্রাশয়ে প্রসারণবৎ তীব্র বেদনা, মূত্রত্যাগে উহার অনুরণম ।

ঘন ঘন অসহ্য মূত্র বেগ, তৎসহ মূত্রত্যাগের শেষে তীব্র বেদনা (বার্ক,
মার্জ, থুজা) ।

অবিরত মূত্র প্রবৃতি অধিক পরিমাণে, পরিষ্কার, জলবৎ মূত্রত্যাগেও উহার
অনিবৃতি (স্বল্পমূত্র, এপিস, ক্যাস)

প্রস্রাব ত্যাগকালে মূত্রমার্গে তীব্র জ্বালাকর কর্তনবৎ বেদনা

বৃদ্ধিগেব মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত

দিবসে ও রাত্রিতে অনিচ্ছায় মূত্রপাত, জলবৎ প্রভূত মূত্র, অজ্যাসহ
কেবল উহার নির্ণয় কারণ

সম্বন্ধ ।—এপিস, ক্যাস, ফির-ফস, পলস ও স্কুইলার সহিত এই ঔষধের
তুলনা হয়

ইগ্নেশিয়া ।

(*Iguatia*).

স্বাস্থ্যবীর্য পুরুতি ; অতিবিক্রম অশ্রুভূতি ও সহজে উত্তেজনশীলতাবিশিষ্টা
স্ত্রীলোক ; এবং মলিন বর্ণ কেশ ও ত্বক, কিন্তু মৃদু প্রকৃতি, ক্ষুণ্ণ অনুরণম,
সস্তর কার্য সম্পাদন লক্ষণাপন্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইগ্নেশিয়া বিশেষ উপযোগী ।
পলসেটিলার সুন্দর মুখাকৃতি, নমনীয় প্রকৃতি, অশ্রুপ্রাণশীলতা, ধীরতা ও
চিত্তের অশ্রুত্যাগ সহিত ইগ্নেশিয়ার বিপরীত সম্বন্ধ রক্ত প্রধান ও
পিত্ত-প্রধান পুরুষদিগের সহিত নক্সালমিকার যে সম্বন্ধ, স্ত্রী-লোকদিগের রোগে
ইগ্নেশিয়ার সেই সম্বন্ধ ।

ইণ্ডেশিয়ান লক্ষণে অতিশয় অসঙ্গতি থাকে । বলা—

গীত-বাজে কর্ণের গর্জন-ধ্বনির উপশম, হাটিবার সময় অশেষ যাতনার শাস্তি ; গিলিবার সময় গলা-বেদনার শাস্তি ; আহারে আমাশয়ের শূণ্যতাও ভবের অল্পশম ৷ ততই কাগা যায় ততই কাগের বুদ্ধি, হাটিবার সময় শির হইয়া দাঁড়াঠে কাগের উদ্বেক, শোকজন্য আকোপক হাত ; ধ্বজভঙ্গ সহ রমণ প্রবৃত্তি জ্বরের শীতাবস্থায় তৃষ্ণা, তাপাবস্থায় তৃষাণীনতা ; বিশ্রামকালে বদনের বর্ণের পরিবর্তন ; আহারকালে দাঁত-বেদনার উপশম ।

অতি শীঘ্র শীঘ্র, অর্থাৎ অত্যন্ত সময়ের মধ্যে মানসিক অবস্থার পরিবর্তন, অর্থাৎ আত্মলাদ হইতে হুঃখে হাঃ হইতে ক্রোধনে পরিণতি (কফি, ক্রোড়, নক্স-ম) ; খামখেয়াল ।

দীর্ঘকাল স্থায়ী সংযত শোক বশতঃ মানসিক ও শারীরিক অবসন্নতা ।

অনিচ্ছায় দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ (শোক) তৎসহ আমাশয়-গহ্বরে দুর্গন্ধতা ও শূণ্যতা অল্পভব ; আহার গ্রহণে উহার অল্পশম ।

কোপ, শোক অথবা নিরাশ প্রেমের মন্দফল (হাইও, ক্যাঙ্ক-ফস) ; কাল্পিত উপজ্ঞান সম্বন্ধে বিরূপে হুসিচক্সা

একাকী থাকিতে ইচ্ছা

ভীষ অল্পভূতি ; শূণ্যতার বিবেক ।

চঞ্চলতা, অধীরতা, অস্থির-প্রতিজ্ঞতা, কলহকারিতা

শরীর স্বচ্ছন্দ থাকিলে প্রকৃতিও ভাল থাকে, কিন্তু অতি যৎসামান্য চিকিৎসাবিকারে সহজে ব্যকুণ্ঠতার উৎপত্তি হয় ; সহজে বিরক্তির জন্ম ।

যৎসামান্য দোষ-দর্শনে বা প্রতিবাদে প্রেমের উদ্বেক জন্মে, ও উহাতে নিম্নের প্রতি রাগ হয় ।

যাঙ্গকদিগকে তিরস্কার করিতে অথবা তাড়না করিয়া শুইতে পাঠাইয়া দিলে, তাহাদের পীড়া হয়, কিম্বা নিজাবস্থায় টক্কর (নড়কা) জন্মে ।

অশুভ সংবাদ ; সংযত অগস্ত্য-সংযুক্ত বিরক্তির ; অল্প মানসিক অল্পশম ; অল্প লজ্জা ও হুঃখের মন্দফল (ট্যাফ) ।

মস্তকের পার্শ্ব দিয়া যেন একটী প্রেক বিদ্ধ হইতেছে এবং শিরঃপাড়া, তথাগ
ভয় দিয়া শয়ন করিলে উহা উপশমিত হয় (কফি, নকা, থুঙ্গা)

তামাক সহ্য হযনা ; তামাক খাইলে অথবা তামাকের ধূম
সাগাইলে মাথা ধরে ব মাথা-ধরা বাড়ে

কথ বলিতে বা চর্চণ করিতে গালেব অভ্যন্তরভাগ দংশিত হয়
কেবল আহার করিবার সময় মুখমণ্ডলের কোন এক ক্ষুদ্রস্থানে ঘন উৎপন্ন
হয়

বেদনার অতিরিক্ত অনুভূতি (কফি, ক্যাম)
নিদ্রিত হইবার সময় কোন অঙ্গের অথবা সর্ব শরীরের স্পন্দন, উৎক্ষেপন,
বা আক্ষেপ

সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে বেদনা
প্রায়শঃ ঠিক একই ঘটিকায় রোগের প্রত্যাবৃতি ।
কোষ্ঠ-রোধ । গাড়ীতে আরোহণজনিত ; ও পক্ষাঘাতমূলক কোষ্ঠ-রোধ ;
অত্যন্ত মল-বেগ, উদরের উর্দ্ধভাগে উহার আধিক্য অনুভব
(ভিরে) ; মল-ত্যাগে অতিশয় যাতনা, পায়থানায় যাইতে ভয় হয় ; ককী
পারিনীদিগের কোষ্ঠ-কাঠি

মলত্যাগে অনধিক বেগ দিলে, অবশীর্ণ (Stooling) হইলে, অথবা কিছু
উঠাইতে চেষ্টা করিলে গুদভ্রংশ (হাড়িশ বাহির হইয়া পড়) (নাই-এসি,
পডো, কুটা) ; তরল মলত্যাগ-কালে উহার বৃদ্ধি

অর্শ । প্রতিবার মলত্যাগ-কালে বলি-নিঃসরণ, হাত দিয়া পুনরায় উহা
ভিতরে দিতে হয় ; সরলান্তের উপরের দিকে তীব্র সূচী-বেধের ন্যায়
যাতনার সঞ্চারণ হয় (Shoot up) (নাই-এসি) ; মলত্যাগের পরে কয়েক
ঘণ্টা পর্যন্ত উহার আধিক্য থাকে । (রাট, মল) ।

জ্বর ।—শীতাবস্থায় বদনের আরক্ততা (ফির) ; শীত, কেবল শীতা-
বস্থায় পিপাসা, বাহ্য উত্তাপে শীতের বৃদ্ধি ; উত্তাপাবস্থায় পিপাসা-
শূন্যতা ; বজ্রবৃত্ত করিয়া রাখিলে উত্তাপের উপশম (আবরণে উত্তাপের বৃদ্ধি,
নক)

উপচয়।—ভাষ্যক, কফি, গ্রাণ্ডি স্পন্দ গতি ভাবগত, মনোভাব, ও শোক হইতে বৃদ্ধি।

উপশম।—উষ্ণতা, শঙ্কপেচাপন (মিক), নিদ্রার ; ও বিচরণে উপশম।

সম্বন্ধ।—(১) কফি, নবা, ট্যাংগের সহিত ইয়েশিয়ার বিষম-বল সম্বন্ধ।

(২) ইয়েশিয়ার মনস্কণ পলমেটোলা দ্বারা নিবারণিত হয়।

ইথুসা সাইনেপিয়ম।

(*Æthusa Cynaplum*)

উত্তম গীষ্মকালে শিশুদিগের দন্তোদগমজনিত রোগে বিশেষ উপযোগী ;
যে সকল শিশুব ছুঁক্কা সহ্য হয় না, তাহাদের পক্ষে ফলপ্রসূ।

অতিশয় দুর্বলতা :—শিশু দাঁড়াইতে পারে না ; মাথা খাড়া করিতে পারেনা
(এলোটি) ; নিজানুভাগে অবসন্নতা।

শিশুদিগের ক্ষুধা।—চিন্তা করিতে অসামর্থ্য ; হতবুদ্ধিতা।

অতিশয় উৎকর্ষ ও যাতনাজাপক মূৰ্খা ক্রটি, তৎসহ নামিকার আকৃষ্ট অবস্থা
ও সম্পূর্ণ কুধান-রোমা।

যাতনা ও উৎকর্ষাব্যঞ্জক মূৰ্খতা।

নামিকার আকৃষ্টাগে দৃঢ়জনিত উদ্বেগ।

সম্পূর্ণ পিপাসাশূন্যতা (এপিদ পলগ, আগের বিপরীত)।

ছুঁক্কাসহ্যতা।—কোন আকারেই ছুঁক্কা সহ্য হয় না ;
থাইবামাত্র বড় বড় সংযত থণ্ডে বমন হইয়া পড়ে ; তৎপরে দুর্বলতাবশতঃ
ভজানুভা অগ্নে (ম্যাগ-কার সহিত তুলনা করুন)।

দন্তোদগমকালে শিশুদিগের অধিমাত্রা ; একপ্রকার ফেনিল, দুগ্ধবৎ স্তল
পদার্থ, প্রবলবেগে সহসা বমন ; অথবা পীতবর্ণ স্তল পদার্থ বমন
তৎপরে সংযত ছুঁক্কা ও পনিরবৎ পদার্থ উদগীরণ।

তাহাদের এক ঘটিকা পরে ক্রুদ্ধজন উদগীরণ ; হারতাক্রান্ত বমন।

আকৃষ্ট অঙ্গুষ্ঠ, আবদ্ধ মুখমণ্ডল, নিম্নদিকে আঘুণিত (Turned downward) চক্ষু ; স্থির ও প্রসারিত চক্ষু-তাঁরা ; মুখে ফেনা ; সংকুচ হস্ত (Jaws locked), ক্ষুদ্র, দৃঢ়, ক্রতনাড়ী ; সহকারে অপস্মারের আক্কেপ (Epileptic spasms)

বমন, মল-ত্যাগ, ও আক্কেপের পরে নিদ্রালুতা সহকারে দুর্বলতা ও অবসন্নতা ।

উপচয় ।—আহার বা পানাস্তে ; বমনাস্তে ; মলত্যাগাস্তে , ও আক্কেপাস্তে বৃদ্ধি

সম্বন্ধ ।—এণ্ট-কুড আস', ক্যাক, ও সেনিকিউলার সহিত সমগুণ সম্বন্ধ

ইপিকাকুয়ানহা

Ipecacuanha.

আমাস্মিক লক্ষণের প্রাধান্য (এণ্ট-কুড, পলস) ; জিহ্বার পরিচ্ছন্নতা, অথবা অল্প লেপাচ্ছন্নতা

অবিরত ও অনবরত বিবমিষা (Nausea) সংযুক্ত সকল রোগ ।

বিবমিষা — প্রচুর লাল্য নিঃসরণ ; শুষ্ক, চক (glairy), অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা বমন, অথচ উহাতে বিবমিষার অনুপাত, বমনের পর নিদ্রালুতা, মাথা নোলাইলে উহার আতিশয্য ; তামাকের মুখ্য ফল (Primary effects), গর্ভের মুখ্য ফল ।

আমাস্ম ।—আমাস্ম যেন বুলিয়া পড়িয়াছে (ইগে, ট্রাক), একপ শিথিলতা অনুভব ; যেন হাত দিয়া উহা মোচড়ান, আঁকড়ান ও নিষড়ান যাইতেছে, এবং অঙ্গের অভ্যন্তরে হাতের প্রত্যেকটি আঙ্গুল ভাবভাবে চাপ দিতেছে একপ্রকার অনুভব ; নড়িলে চড়িলে উহার বৃদ্ধি ।

নাভীর নিকটে আশ্মান (Flatulence) জনিত কঠিনবৎ উদর-বেদনা ।



মল।—খাসের জ্বাশ মনুষ্য, * দ্বাশামস্বক (কলচি) ; রক্ত-ক, উৎসেচিত (Fermentec), ফোঁপল, মে ওলা শেজল ফোঁপ মেৎ ওড়ুর খাসের মত, মল।

উজ্জ্বল দিবস, দীতল রাত্রি বিশেষ * রক্তকালের রক্তা ওয়ার (কলচি, মাক)।

এসিয়িক ওয়াউঠার প্রথম অংশ, বিবাময় ও বমনের আদ্য (কলচি)

রক্ত-স্রাব — পবন বা অপ্রবন, শরীরের সকল দ্বার হইতে উজ্জ্বল লোহিত (হরি মিলি) ; অরায়ু হইতে প্রভূত, সংবত, রক্তপাত।

রক্ত-স্রাব কালে খাসের কষ্ট, নাভী হইতে গর্ভাশয়ে সূচী-বেদন।

উদরের আড়াআড়ি বাম হইতে দানব দিকে কণ্ঠনবৎ বেদনা (ল্যাক)।

শুষ্ক, আক্ষেপিক, আকুঞ্চিত, শ্বাস-কাসজনিত, কাস।

অল্পমাত্র পরিশ্রমে শ্বাস-কষ্ট ; হাঁসফাঁস * দ্বা ও আশাশয়ের সমীপে উৎকর্ষা সহকারে প্রবণ শ্বাস-কষ্ট।

শ্বাস-লোপ, পাণ্ডুবর্ণধারণ, আড়ষ্টতা ও নীলবর্ণপ্রাপ্তি, যুগ-রোধ ও শ্লেষ্মা-বমন সংযুক্ত শ্বাস-রক্ততা ; নাসিকা অথবা যুগ হইতে রক্ত-পাত (হাঁওগো) ; এই সকল লক্ষণাপন্ন হুপমকক কাস।

নিশ্বাস-ওহণকালে বায়ু-নলী ভ্রুয়ে শ্লেষ্মার, ঘড় ঘড় শব্দ সহকারে কাস ; শ্লেষ্ম হইতে শ্বাস-রোধের আশঙ্কা।

অস্থিগুলি সকলই যেন ছিন্ন হইয়া থাও থাও হইতেছে এরূপ বেদনা (যেন ভগ্ন হইতেছে, হউপ)।

সবিরাম জ্বর।—অনিয়মিত বা বিশৃঙ্খল সবিরাম জ্বরের চাকৎসার প্রারম্ভে ; বিবমিষা সংযুক্ত, অথবা আশাশয়িক উপজবজনিত, কুইনাইন অংগেবিত, অথবা কুইনাইন দ্বারা অবরুদ্ধ, সবিরাম জ্বর।

একদিন পর একদিন, একই ঘণ্টায় উপস্থিত সবিরাম অগ্নিমান্দ্য ; ও দুর্নিবাস বমিষ সহকারে জ্বর

উত্তাপ ও শীতলতায় অতিরিক্ত অচুভুতি।

উপাচয়।—শীতকালে ও পরিশুদ্ধকালে ; উষ্ণ, আর্দ্র দক্ষিণ দিকের তাসে (ইউক্রে) ; ও যৎসামান্য মঞ্চলনে ; যুক্তি

সম্বন্ধ ।—(১) কুপ্রমেহ সহিত অনুরূপক সম্বন্ধ । (২) আশ্মাশয়িক উপদ্রবে পলস্ ও এন্ট-ক্লুডেব সহিত সমগুণ সম্বন্ধ ; (৩) ইনফ্লুয়েন্স, *দি, ক্রুপ, দুর্বলতা ও শিশু-বিসৃচিক্ রোগে ইপিকাকের পর আসেনিক ভাল খাটে ; স্বরযন্ত্রে বৈল্য (Foreign bodies) থাকিলে ইপিকাকের পর এন্ট-টার্টি উপযোগী হয় ।

ইস্কিউলাস হিপোক্যাঠেনম ।

(*Æsculus Hippocastanum.*)

যে সকল ব্যক্তির অর্শ-প্রবণতা থাকে, এবং যাহারা আশ্মাশয়িক, পৈত্তিক অথবা প্রাতিষ্ঠায়িক উপদ্রবে (Catarrhal troubles) উপদ্রুত হয় তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী ।

রক্তাধিক্য জনিত পূর্ণতার ছায় ছৎপিণ্ড, ফুসফুস, আশ্মাশয়, মস্তিষ্ক, বস্তি-গহ্বর (Pelvis) ও ত্বকাদি বিবিধ স্থানের পূর্ণতা ।

যকৃতের শিরা ও অর্শ-শিরার শৈরিক রক্ত-সঞ্চয় ।

নিরাশা, বিষমতা ; অতিশয় কোপনতা ; সহজে জ্বোলের উদ্ভেদ হয় এবং ধীরে ধীরে উহার শাস্তি প্রাপ্তি অতিশয় ক্ষণরাগিতা (ক্রাম)

মুখ-বিবর, গল-গহ্বর, ও সরলান্ত্রের শৈথিল্যিক ঝিল্লীর ক্ষীণতা, জ্বালা, শুষ্কতা ও অবদরন অনুভব ।

নাসিকার প্রাতিষ্ঠায় ; পাতলা জলবৎ জ্বালাফর প্রাব, নাসিকায় অবদরন এবং নিশ্বাসিত, শীতল বায়ুতে অতিরিক্ত অনুভূতি ।

ফলিকিউলার ফ্যারিঞ্জাইটিস ; প্রবল জ্বর, গহ্বর মধ্যে অবদরন অনুভব ; গল-মধ্যের নীরসতা ও ধরস্পর্শতা ।

ফসিসে (Fauces) জ্বালা, কণ্টক-বেধন, ছল-বেধন, নীরসতা ও আকুঞ্চন অনুভব সহ বারংবার গলাধঃকরণের প্রবৃত্তি ।

সরলান্ত্র (rectum) — সরলান্ত্রের শুষ্কতা ও উত্তাপ ; সরলান্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডে পূর্ণ রহিয়াছে এরূপ অনুভব ; সরলান্ত্রের

উর্দ্ধদিকে ছুরিকাঘাত। কদনের ত্রায়, বেদনার সময় (ইয়ে, মল) ; অল্যাবী, বাধিত, জালাকর ইয়ৎ বেগুণি বর্ণের অর্শ, কটিৎ পঙ্কজাব ।

পূর্ণত, জালা ও কণ্ডুয়ন (মলফ) সহ সরলাভের টাটানি ।

কোষ্ঠ-রোধ — শক্ত, শুষ্ক আয়ামে নিঃসারিত মল ; তৎসহকারে সরলাভের শুষ্কতা ও উত্তাপ ; কটি ও ত্রিকস্থানীয় (Lumbo-sacral) তীক্ষ্ণ পৃষ্ঠ-বেদনা ।

মল-ত্যাগের পরে কতিপয় ঘটিকাপর্যন্ত সরলাভের পূর্ণতা ও মল-দ্বারের স্থতীত্বে বেদনা (এলো, ইয়ে, মিউ-এসি, মলফ) ।

কন্দ ; ও বিদাহী মলিন প্রদর, তৎসহ কটি-বেদনা এবং হাঁটিতে অতিশয় প্রাপ্তি ।

কটি ও ত্রিকস্থানের সংযোগ-স্থলে তীক্ষ্ণ পৃষ্ঠ বেদনা ;
বেদনার অস্বাধিক নিরন্তর বিজ্ঞপ্তিতা ; ত্রিক (Sacrum) ও বক্ষের (Hips) অজ্ঞানতা

পিঠ ভাঙ্গিয়া আইসে ; গর্ভাবস্থায় হাঁটিতে বা মাথা নোয়াইলে কন্দ ও প্রদর অগ্নে ; বসিয়া বা শুইয়া থাকিতে হয় ।

পৃষ্ঠে শুষ্কতা ও পঙ্কজ অস্বস্তি ।

বাহু, জঙ্ঘা ও পৃষ্ঠদেশে পক্ষাঘাতবৎ অস্বস্তি ।

উপচয় ।—নড়িলে চাড়িলে ; শীতল বায়ু নিঃশ্বাসনে ; এবং পৃষ্ঠ-বেদনা ও স্পর্শদেষ বিচরণে ও অবশীর্ণ হইলে ; বুদ্ধি

সম্বন্ধ ।—(১) অর্শে ; এলো, কোলিন, ইয়ে, মিউ-এসি, নক্ষ, মলফের সমস্ত । (২) কোলিন ব্যবহারে অর্শের কতকটা উপশয় পড়িলে ইহঁউ দ্বারা প্রায়ই আরোগ্য অগ্নে । (৩) নক্ষ ও মলফ ব্যবহারে অর্শে উপকার দিলে, কিন্তু আরোগ্য না অগ্নিলে ইহঁউ ফলপ্রদ ।

একোনাইটঃম নেপেলঃম ।

(*Aconitum Napellus*)

যুবক-যুবতীদিগের, বিশেষতঃ রক্ত ও ধান্য অব্যায়ামশীলা, কুমারীদিগের তরুণ বা মূতন রোগে ; বাতাতপেব পরিবর্তনে সহজে অসুখের উৎপাদ্তে ; মলিনবর্ণ চুল ও চক্ষু এবং শক্ত পেশী-তন্তু (rigid muscular fibre) বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে ; সাধারণতঃ একোনাইট উপযোগী

শুষ্ক শীতল বায়ু, উত্তরদিকের কিম্বা পশ্চিমদিকের শুষ্ক বাতাস, ও ঘর্ষাবস্থায় শীতল বায়ু-পবাহ লাগিয়া রোগোৎপত্তি ; ঘর্ম-রোধের মন্দফল ।

অতিশয় প্রায়বীয় উত্তেজনা সহকারে অতিশয় ভয় ও চিত্তের উৎকর্ষা (anxiety) বাহিরে যাইতে, উত্তেজনা ও অধিক লোকবিশিষ্ট জনতায় যাইতে, রাস্তা পার হইতে ; ভয়

ভীততা স্বচক মুখাকৃতি ; ভয়বশতঃ জীবনের শোচনীয়তা ; রোগ সাংঘাতিক হইয়া উঠিবে বলিয়া নিশ্চিত ধারণা , মৃত্যুর দিন পূর্বেই বলা ; গর্ভকালে মৃত্যু-ভয়

অস্থিরতা উৎকর্ষা, প্রত্যেক কার্য সম্পাদনে অতিশয় ব্যস্তসমস্ততা ; ঘনঘন অবস্থান পরিবর্তনের আবশ্যিকতা ; সকল বস্তুতেই চকিততা ।

বেদনা ।—বেদনায় অসহিষ্ণুতা, বেদনা বশতঃ জিহুতা ; অতিশয় অস্থির হইয়া উঠা ; রাত্রিতে আধিক্য

হানিম্যান বলেন যে হোমিওপ্যাথি মতে একোনাইট নির্ধাচিত করিতে হইলে সর্বোপরি উহার মানসিক লক্ষণগুলির অর্থাৎ শরীর ও মনের যাতনা ; অস্থিরতা ও অদম্য অশান্তির সাদৃশ্য থাকা আবশ্যিক

অত্যন্ত সামান্য অসুখেও উৎকর্ষা, যাতনা ও ভয়ের বিজ্ঞমানতা

রোগিণীর গীত-বাণী সহ্য হয়না, উহাতে তাহাকে বিমর্ষ করে (শ্রাব ।—
ঋতুকালে, ঞ্চাট-কা)

হেলান দেওয়া অবস্থা হইতে উত্থান করিতে আরক্ত যুগ্মগুলি যুগ্ম৭ গাঢ়বর্ণ হয়, অথবা শান্তি ও শিরোমূর্ধন জগে এবং রোগী ৭ ৩০ হয়, পুনরায় উঠিতে ভয় পায়, উহার সহিত মচব চর চগে আঁধার দেওয়া ও তৈ, ২০ ৩০কে ।

রক্ত-প্রধানী যুগ্মী দা র মদোদোপ, ভয়প্রাপ্তিব পূর্ব, মদোদোদ
ও তিমেষার্থে

প্রদাহের রক্ত মগ মর অবস্থায়, পদাহের স্থান নিবন্ধস্থান (localization) পূর্বে ব্যাবহায়া ।

অর। - শুষ্ক ও উত্তপ্ত গাত্র-ত্বক ; বদন আরক্ত অথবা একবার আরক্ত একবার প ভূবণ ; অধিক পরিমাণে শীতল জল পান করিবার জন্য জ্ঞানীকর পিপাসা ; অত্যন্ত স্নায়বীয় অস্থিরতা, যাতনায় অবলুপ্তন (losing about) ; মক্ষার প্রাকালে ও নিদ্রা যাবার সময় রোগীর অধীরতার উৎপত্তি ।

টঙ্কার (কমভলন) ।—মস্তোজ্জেকাণ্ডে , ভিন্ন ভিন্ন ঘের উত্তাপ, উৎক্ষেপ (jerking) ও স্পন্দন (Switching) শির অঙ্গুলার ৭ ঘ (11) চক্ষণ, বিরক্তি প্রকাশ ও চিৎকার করণ , গানের উৎসাহ ও শুকতা মাত্র অর ।

কাস, কূপ ।—শুষ্ক, অরভঙ্গসংযুক্ত শ্বাস-রোধকর কাস ; উচ্চ, ককশ, স্তেজের উ কের জায় কাস ; কঠিন, বানবান শব্দবিশিষ্ট, শীঘ্রের শব্দ সংযুক্ত কাস ; প্রস্থাসে উজ্জ্বল শব্দ (কঠিকম, নিশ্বাসে স্পষ্ট) ; শুষ্ক শীতল বাতাস অথবা বায়ু-প্রবাহে রোগের উৎপত্তি ।

কেবল অর মমন করিবার জন্য একোনাইট ব্যবহায়া করা কখনও উচিত নহে, এই উদ্দেশ্যে অগ্ন্যাক্ত ঔষধের সহিত ইহা পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিতে বিবেচন নহে । যদি একোনাইট জাপক রোগী হয় তবে অল্প কোন ঔষধ ব্যবহার করিবার প্রয়োজন নাই ; একোনাইটেই রোগী আরোগ্য প্রাপ্ত হইবে ।

একোনাইটশুচক উজ্জ্বলক কারণ বিদ্যমান না থাকিলে টাইফয়েড অরের প্রথমাবস্থায় এতদ্বারা সর্বদাই অপকার দশে ।

উপাচয় ।—সায়াহে ও সাজিতে বেদনা অমর্য হইয়া উঠে ; উষ্ণ গৃহে ; শয্যা হইতে উঠিবার সময় ; রোগীজ্ঞান পাইলে শয়নে, (হিপ, মজ্জম) ; একোনাটের লগণ বজি পায় ।

—অনাবৃত বাগুতে উপশম (এলম, ম্যাগ-কা, পলস, জাব) ।

সম্বন্ধ ।—(১) জরে, নিদ্রাহীনতায়, বেদনার অসহ্যতায় কফির সহিত, অভিষাভের ফলে আর্নিকার সহিত ; সকল রোগীর পক্ষেই সলফারের সহিত, অল্পপূরক সম্বন্ধ (Complementary) যে সকল জরে উদ্ভেদ নির্গত হয় তাহাতে কদাচিত্ একোনাইট উপযোগী হয় (২) তখন অবস্থায় একোনাইট, অতরুণ অবস্থায় সলফার উপযোগী, এবং তরুণপ্রাদাহিক অবস্থায় একোনাইটের পূর্বে ও পরে ব্যবহার্য (৩) একোনাইটের অপব্যবহারে সলফার ব্যবস্থায় ।

এক্টিয়া রেমিযোসা ।

(*Actaea Racemosa.*)

স্মৃতিকোন্মান ; রোগিণী মনে করে যেন সে উন্মাদগ্রস্ত হইতেছে (সিফ)
আপনাকে আপনি উপহত করিতে চেষ্টা করে

স্নায়ু-শূল বিলোপের পর উন্মাদ

যেন একটা ভারী, কাল মেঘ রোগিণীর সর্ব শরীরের উপর
স্থাপিত রহিয়াছে, এবং একপভাবে তাহাব মস্তক আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে
যে সকল তাহার নিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বিশৃঙ্খল অল্পভূত হয়

আসনের তল হইতে যেন ইন্দুর দোড়িয়া যাইতেছে একপ ভ্রান্তি (ল্যাক্স-
এসি, ইথু)

অগ্নি-পুটের স্নায়ুশূল ।—অগ্নি-গোলকে (eye-ball) অবিরাম বেদনা অথবা
তীব্র, চিড়িকমারা , সঞ্চরমান বেদনা, শঙ্কর (temple), মস্তক-শিখর, মস্তক-
পৃষ্ঠ, ও অগ্নি-গহ্বর পর্যন্ত উহার প্রসারণ এবং মিড়ি বাহিয়া উঠিতে বৃদ্ধি ও
শয়নে উপশম ।

গর্ভাশয়ের অথবা ডিম্বাশয়ের প্রতিফল লক্ষণ (reflex symptoms)
অনিত দ্বংপিণ্ডের উপজব সহসা দ্বংপিণ্ডের ক্রিয়ার বিরতি , খাম-রোধের
সম্ভাবনা ; যৎসামান্ত সকলনে দ্বংকম্প (ডিঙ্ক) ।

ঋতু -- অনিয়মিত ; অবসাদজনক (এলম, কক) ; চিত্ত-বিকারে, শীত-

লতায়, অথবা জ্বরজ্বল বিলাসিত কিংবা বিলুপ্ত, অথবা কোরিসিয়া, হিষ্টেরিয়া অথবা উন্মাদ-সংযুক্ত; ঋতু । ঋতুকালে মান মত লক্ষণের বৃদ্ধি ।

• আক্ষেপ (— হিষ্টেরিয়া বা অপস্মার জনিত; অরায়ুরোগের প্রাতিফলিত হইতে উৎপন্ন; ও ঋতুকালে বিবাক্ত, আক্ষেপ । বায়পার্শ্বে কোরিসিয়ার আতিশয়া ।

বায়মিকের স্তনের নিম্নে তীব্র বেদনা (অষ্ট)

শরীরের নানাস্থানে ভিষাশয় অথবা গর্ভাশয়ের উপদাহের সহায়ত্বজনিত তীব্র, কর্তনবৎ, তড়িতের স্থায় বেদনা; অরায়ু-প্রদেমে একপার্শ্বে হইতে অল্প পার্শ্বে তীরমারীর স্থায় বেদনা

গর্ভ । বিবমিষা; নিদ্রাহীনতা; কৃত্রিম প্রসববেদনার স্থায় বেদনা; উদরের আড়াআড়ি তীব্র বেদনা; তৃতীয় মাসে গর্ভস্থান (স্থাব) ।

প্রসব কাল — প্রসবের প্রাথমাবস্থায় কম্পন; ন বয়স উত্তেজনা জনিত টক্সার; অরায়ুর-মূত্রের দৃঢ়তা; উগা, আক্ষেপিক, চায়াগিত প্রসব-বেদনা, যৎ-সামান্য গোলমাণে উহার বৃদ্ধি ।

কুচকীতে আতিশয়া বিশিষ্ট প্রসবাবস্থায় বেদনা

লক্ষণের সহিত গাদৃশ্য থাকিলে গর্ভের শেষ মাসে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে প্রসব-বেদনার হ্রাসতা আছে ।

• নর্টন (caeling), স্কীডন (Skating), অথবা অল্প প্রকারে পেশীর প্রবল সঞ্চালনে উহার আতিশয় স্পর্শ-দ্রোয় ।

ষাড়ের ও পিঠের পেশীতে বাতের বেদনা; পেশী শুক, খজ ও আক্লিষত অল্পভূত হয়; সেলাই করা; লেখা, অথবা পিয়ানো বাজানে বাতের চালনা অল্প মেরুদণ্ডের অল্পভাবাদিক্য (এগার, রাণ-বধ) ।

উদরের পেশীর বাত, স্ফীতি-বেদ, ও খালদার মত বেদনা ।

আমবাতিক রজ্জ শূল ।

উপচয় । ঋতুকালে; যতই অধিক পরিমাণে রজঃ নিঃসৃত হয়; ততই অধিক বাতনা বাড়ে

সম্বন্ধ । — অরায়ু ও বাতের ব্যারামে কলো ও পলসের সম্বন্ধ; এগার-লিপি, সিপি সহিতও সম্বন্ধ সম্বন্ধ

এগেরিকঃম মঃস্কেরিসঃম

(Agaricus Muscarius,)

লঘু বেশ ; এবং স্বকৃ ও পেশীর শিথিলতা বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে
উপযোগী

ক্ষীণ, মল্লী রক্ত-সঞ্চালন বিশিষ্ট বৃদ্ধদিগের পক্ষে উপযোগী

মত্তপানীদিগের শিরঃপীড়া , মদ্যপানের মন্দফল (জোব, নদ্রা প্রঃ)

প্রলাপ —সন্নিপাত-জরে জ্বরিত প্রলাপোক্ত ; ময়া ছাড়িয়া বাহির
হইয়া যাইবার চেষ্টা

শিরঃপীড়া জরে বা বেদনায় সহজে যাহাদের প্রলাপ জন্মে (বেল) ;
যাহাদের কোরিয়া, স্পন্দন বা মুখ-বিকৃতি আছে ; তাহাদের শিরঃপীড়া
পৃষ্ঠবংশের পীড়াজনিত শিরঃপীড়া

অতিশয় কণ্ডুয়ন ও অসহজালাবিশিষ্ট শীত-ক্ষোভ (চিলব্রেন) ;
নীহার-ক্ষোভ (Prostbite) ও শীত-ভোগের অত্যাশ্র ফল, বিশেষতঃ সুখমণ্ডলে ।

জাগ্রৎ অবস্থায়, অনিচ্ছায় অঙ্গ সঞ্চালন ; নিজাবস্থায় উহার বিরতি ;
এক একটা পেশীর সামান্য সঞ্চালন ও উৎক্ষেপণ হইতে সমগ্র শরীরে নর্ত্তন
লক্ষণাপন্ন কোরিয়া ; সমস্ত শরীরের কম্পন (সুখমণ্ডলের পেশীর কম্পন,
মাইগেল)

ত্বকে যেন বরফ স্পৃষ্ট অথবা বরফবৎ শীতল স্থচী বিদ্ধ হইতেছে এরূপ
অনুভব ; উত্তপ্ত স্থচী-বিদ্ধবৎ অনুভব

কর্ণ, নাসিকা, বদন, হস্ত-পদ প্রভৃতি নানাস্থানের জ্বালা ও কণ্ডুয়নবিশিষ্ট
আরক্ততা ; নানাস্থানের আরক্ততা, ক্ষোভতা ও উত্তপ্ততা

হাঁটিতে অনিশ্চিততা, পথে প্রতিবন্ধ্য হোঁচট লাগে ; দাঁড়াইলে পায়ের
গুড়মুড়ায় আঘাতিত হওয়ার জ্বর বেদনা করে ।

পৃষ্ঠ-বংশে স্পর্শে অনুভবাত্মক (থেরে) ; প্রাতে উহার আধিক্য

বেদনা —দ্বিবাভাগে পরিশ্রমকালে ; উপবেশনকালে, কটিদেশে ও
ত্রিকাস্থপ্রদেশে (Sacral region) বেদনা

অতিরিক্ত ইজিয়-সেবা বশতঃ পৃষ্ঠবংশের উপদাহ ।

অমিত ইঞ্জিয় মেগালি ও জারার অবস্থান

উদ্বেদ-বিলোপজনিত কণ্ঠস্বর (epilepsy) রোগ (মোরি, ২৭)

শরীরের প্রতি সঞ্চালনে, ও প্রতি আনন্দনে (lila) পৃষ্ঠবস্ত্রে বেদনার উৎপত্তি ; কএকটি কমে কমে (vertebra) স্পন্দ-ধ্বজ

নিবৃত্তরক্তস্রাবজনিত কণ্ঠ, অসহ্যপ্রায় কুহনবৎ যাতনা (ক্লিম্বিম, 'মউয়েয়া, সিপিয়)

শীতল বায়ুতে অত্যন্ত অল্পভাবিক্য (কাল, কালীকা, মোরি) ।

উপরের বামদিকে ও নাচের দক্ষিণদিকে, কোণাকোণি রোগের প্রকাশ, (এম্বা, ব্রোম, মেড, ফস, মল-এসি)

উপচয় ।—আহারান্তে, রমণান্তে, শীতল বায়ুতে, মানসিক আভ-নিবেশে ; ঝড়-বজ্রের পূর্বে (ফস, মোরি) ব্যক্তি

সম্বন্ধ ।—মদাত্ম্যের প্রকাশে, এঞ্জিয়া, কাল, কাল-ইত্ত, হাইত্ত, লাক, নক্স, ওপি, ট্রামোর সহিত ; কোরিয়ার—মাহ, টারেল, লিকের সহিত সম্বন্ধ সম্বন্ধ

এগ্নঃস ক্যাস্টঃস ।

(Agnus Castus)

লম্বিকা-প্রধান (লিম্বেটিক) ধাতুর পক্ষে উপযোগী ।

অন্যমনস্কতা, অন্তর্দৃষ্টি-শক্তির লোপ ; স্রবণ শাস্বিতে পারা যায় না, একটি বাক্য দুইবার না পাড়লে বুঝা যায় না (ক'ইকে', ফস-এসি, সিপি)

ধবং-ভঙ্গ ও লাল-মেহ বিশিষ্ট পুরাতন রোগী, অবিরাহিত ব্যক্তিদ্বিগের সায়বীয় ছন্দলতা ।

অকাল বার্দ্ধক্য —বিষমতা, উদাসীনতা, চিত্তের অস্থিরতা, আপনাকে হেয় জ্ঞান ; যুবক-যুবতীদ্বিগের ইঞ্জিয়-শক্তির অপব্যয় হইতে উহার উৎপত্তি ; শুক্রক্ষয় হইতে উদ্ভব

সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গ ।—জননেত্রিয়ার শিথিলতা, লোপিততা (flaccidity) ও শীতলতা ইন্ড্রিয়-শক্তি বা চক্রিয়-লিপ্সার বিরতি (ক্যাণাড, সেলে)

পুনঃ পুনঃ প্রমেহের আক্রমণের পর ধ্বজভঙ্গ

প্রমেহের অব-বলোপনের মনফল

সন্তোগ-লিপ্সা অথবা উপস্থের উথিতির অবিজ্ঞানতা সহকারে ভাল-মেহ শ্বেতপ্রদর স্বচ্ছ্রাব কিন্তু তদ্বারা বজ্রে পীতবর্ণ দাগ লাগে, অতিশয় শিথিলিত জননাঙ্গ হতে অজ্ঞাতসারে উহা নিঃসৃত হয়।

স্তম্ভদায়িনীদিগের দুগ্ধ-স্রাবের লাঘব বা বিলোপ (এসা, ল্যাক-ক্যান, ল্যাক-ডি), তৎসহকারে অনেক সময় অতিশয় বিষমতা ; রোগিনী বলে যে সে মরিয়া যাইবে

হেরিংমস্ত্র অথবা মৃগনাতির গন্ধের দ্বায় নাগিকার সম্মুখে কল্পিত হয়।

এই ঔষধে বিচরণ জনিত অবদরন (Excoriation) নিবারিত হয়

সম্বন্ধ ।—জননেত্রিয়ার দুর্বলতায় অথবা ধ্বজভঙ্গে এন্ড্রিয়ার পরে ক্যাণাড ও সেলেন ভাল পাটে।

এন্টিমোনিয়ম ক্রুডম্ ।

(Antimonium Crudum.)

বালক, বৃদ্ধ ও স্তূল্য-প্রবণ তরুণবয়স্ক ব্যক্তি (ক্যাঙ্ক)

প্রাণকালীন অতিসারগ্রস্ত বৃদ্ধ, সহসা কোষ্ঠ-রোধের উৎপাদ অথবা পর্যায়ক্রমে অতিসার ও কোষ্ঠ-রোধ, নাড়ীর দৃঢ়তা ও জ্বরত্ব।

শীতলতায় অল্পওবাধিক্য, সর্দি লাগিবার পরে উহার আধিক্য।

শিশুর খুঁতখুঁতে ও খিটখিটে প্রকৃতি, অন্যের স্পর্শ বা দৃষ্টি সহ্য হয় না ; কথা বলিতে বা শুনিতে বিরক্তি (এন্ট-টা, আইওড, গিলি) ; একটু

আদর করিলেই কোষ্ঠের উদ্রেক

ক্রন্দনসংযুক্ত অতিশয় বিষণ্ণভাব।

জীবনে বিরাগ

আকুলিত অশ্রুস্রাবশীল ভাব, সামান্য বিষয়ে রোগিনী প্রভাবক হই (পল),
নীচ নিরামা, অজমগ্ন হইয়া আত্ম-হত্যা ।

পশ্চো কথা বলিতে অথবা কবিতা অর্পিত করিতে ছনিবার ৭ বার

চন্দ্রালোকে গানন্দোর ও উন্নত প্রেমের ভাব, হতাশ প্রেমের মন্দ মল
(কাব্য ফল)

ন মাংস ও মূত্রে কোং নির্দিষ্ট ও চিপিটিয়াযুক্ত (১১১১)

শিরঃপীড় - নদীতে স্নান বশতঃ, সর্দি লাগিয়া মদিরা-পানকরা ; অম্লজব্য,
বসাজব্য, ও ফল আহর অত্র আমাশয়ের বিশৃঙ্খলা জন্মিয়া ; এবং উদ্ভ্রম-বিগোপ
বশতঃ শিরঃপীড়া

অতিরিক্ত আহার বশতঃ, আমাশয়ের রোগ, আমাশয়ের দুর্বলতা,
সহজে পরিপাক-ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি জিহ্বায় গাঢ় দুগ্ধবৎ
শুল্ক লোপ ; মুখে পচা ক্ষত-প্রবণতা (আর্জ্জ-না, মলক) ।

অন্ন ও আচার গ্রহণের অস্বাভাবিকতা

আমাশয়ের রোগ —কটি, লুচি প্রভৃতি আহারে ; অন্ন বিশেষতঃ মিক ;
ও অন্ন বা মন্দ মত্ত সেবন অত্র, শীতল অগ্নে মানান্তে ; অতিরিক্ত উত্তাপ গ্রহণে ;
এবং উত্তম্ন ঋতু বশতঃ, আমাশয়ের ও আশ্রয় পীড় ।

উর্দ্ধ দিকে ও অধোদিকে অনেক বৎসর পর্যন্ত নিয়ত বায়ু নিঃসরণ , তৃণ
জব্যের গন্ধবি শষ্ট উদ্গার ।

কাসিতে কাসিতে নাসিকার পশ্চাৎ রক্ত, হইতে অধিক পরিমাণে স্লেমা
নিঃসরণ ; মলবার হইতে রসানি ক্ষরণ, উহাতে কাপড়ে ছরিতা বর্ণের দাগ
লাগে ; আমত্সাবী অশ্র ।

চর্ম্মে অস্বাভাবিক বিবর্কনাদির উৎপত্তির প্রবণতা ; হাতের আঙ্গুলের নখ
শীঘ্র বর্জিত হয় না ; ঘুটনক আঁচলের স্থায় ফাটা ফাট আকারে ও শূলবৎ ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র স্থান সহক রে পুনরুৎপন্ন হয় ।

পদভলে খাঁটা বা শাল-ষড়া ; হাঁটিবার, বিশেষতঃ পাথরের উপর হাঁটিবার,
সময় উহাতে অতিশয় যাতন্য জন্মে ।

অতিরিক্ত উত্তম্ন হওয়াতে স্বর-লোপ ।

সূর্যের উত্তাপ সহ্য হয় না ; রোজে পরিশ্রম করিলে ক্ষুধা করে (ল্যাক টাট মিউ) ; অগ্নিতাপে অতিরিক্ত উত্তপ্ত হওয়াতে বৃদ্ধি প্রাপ্তি ; উষ্ণকালে অবসন্নতা ; সূর্য-মাহ বশতঃ পীড়

হৃৎকাস সূর্যের উত্তাপে অথবা উষ্ণগৃহে বিবর্তিত , ও শীতল জলে প্রণালন বশতঃ উৎপন্ন হৃৎকাস

শীতলজলে স্নানে অপ্রবৃত্তি ; শীতলজলে স্নানে অথবা স্নানে শিশুর ক্রন্দন , শীতলজলে স্নানে প্রবল শিরোবেদনাব উৎপত্তি , তুর বিপুলি ; মস্তুরণে বা জলে স্নানে সর্দি (রসটক)

উপচয় আহাৰাস্তে , শীতলজলে স্নানে ; অন্নজব্য বা অন্ন মদিরা সেবনে ; সূর্যের বা অগ্নির উত্তাপ ভোগান্তে ; এবং অতিশয় উত্তাপ বা শীতলত লাগিয়া ; বৃদ্ধি

উপশম — অনাবৃত্ত বায়ুতে ; বিশ্রামকালে ; উষ্ণজলে স্নানান্তে ; উপশম।

সম্বন্ধ — (১) স্কুইলার সহিত অল্পপুরুষ সম্বন্ধ । (২) আমাশয়িক রোগে বাট, ইপি, লাই, পলসের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ । (৩) পলস, মার্ক, সলফের পরে এন্ট-ক্লুড ভাল খাটে ।

এন্টিমোনিয়ম টার্টারিকম

(Antimonium Tartaricum)

নিশ্চেষ্ট, শ্লেষ্মা প্রধান ধাতুর ব্যক্তি, ও রক্ত-প্রধান ধাতুর ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী

সেঁতলেতে স্থানে থাকার দরুন উৎপন্ন রোগ (আম, আর্স, টেয়ে) ।

এই ঔষধে নিউমোগাট্রিক স্নায়ুর অভ্যন্তর দিয়া খাস-ক্রিয়া ও রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়ার অবসাদ অন্যে এবং তা হাতেই ইহার পয়োগের প্রধান পরিচালক লক্ষণের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ যখন রোগী কাসে, তখন বায়ু-নলীতে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা-সঞ্চয় বুঝা যায়, বোধ হয় যেন কাসিলে অধিক শ্লেষ্মা উঠিবে, কিন্তু কিছুই উঠে না

যাহারা নিকটে থাকে শিশু তাহাদিগকে বাড়াইয়া ধরে ; বোম্ব চাড়িয়া বেড়াইতে চায় ; যেহু ছুঁইলে কাঁদে, • ড়ী ঘোঁড়াতে দেহ না (এন্ট-কুড ভানি)

মুখমণ্ডলের শীতলতা, নীলবর্ণতা, পিণ্ডুরতা, ও শীতল ঘর্মাচ্ছন্নতা (টাইল)

গাঢ়, শুষ্ক, লেহনৎ (salty) পদার্থে মিলায় থাকিয়া, অস্বা-স্বাদ ও জিহ্বাপ্রান্তের আরক্ততা ; দাঁত লাল হওয়া জিহ্বা বড় লাল মধ্যভাগে শুষ্ক ; এপেল ফল খাওয়ার অস্বাভাবিক আকর্ষণ (এহো—অন্ন ও খাচার খাওয়ার স্পৃহা, এন্ট-কুড)

বমন —যেভাবে থাকা যায় সেট ভাবেই বমন হয়, কেবল দক্ষিণপাশে শয়নে বমন হয় না, বমন করিতে করিতে মুচীথোঁপ্তি, বমনের পরে তন্দ্রানুতা ও অবসন্নতা ; শীতল ঘর্মা ও আঁসার সহকারে ওলাউঠার বমন, প্রত্যেকবার বমনের পরে এক এক মাতা মেঘ (ভিন্ন)

শ্বাস—রোধ (এসফিকিয়া) —অসমজ্ঞান, বায়ু-নলীতে (bronchi) স্লেয়ার সম্ময়, ফুসফুসের পক্ষাঘাত সম্ভাবনা, বরষদ অথবা কর্কশালিতে শৈল্যাবস্থান (foreign bodies) —যান্ত্রিক (mechanical) কারণে তন্দ্রানুতা ও অচৈতন্য সহকারে, দুঃমান যুতা (এন্ট-কুড ভেগ্)

সকল রোগের চিকিৎসে অতিশয় নিদ্রানুতা অথবা নিদ্রা যাইবার ছুনিবার প্রবৃত্তি (নয়ন, ওগ)

অগ্নিবাহীক শিশুর পাণ্ডুরতা, শ্বাস-মূত্রতা বারি-খাওয়া, শিশুর শ্বাস-শুভ (এসফিকিয়া) । এই ওয়মে যুতা-সময়ের 'গলা-ঘড়ঘড়' উপশান্তি অস্মে (টারান)

ফুসফুস প্রদাহ, নিঃশ্বাসঃ লক্ষণ ফুসফুসের প্রদাহ সহকারে পাণ্ডু রোগ (jaundice) ।

উপচয় ।—অর্ধ, শীতল সময়ে, রাত্রিতে শয়নে ; গৃহের উষ্ণতায় ; ও বসন্তকালে ধতু-পরিবর্তনে ; বন্ধি ।

উপশয় ।—শীতল অনাবৃত বায়ুতে, মোজা বইয়া বসিলে, কাগ-নিষ্ঠীবনে ; দক্ষিণ পাশে শয়নে ; উপশয় ।

সহস্রক ।—(১) এন্ট-টার্ট, লাইকোপোডিয়ামের সহিত সমতুল্য ; কিন্তু লাইকোপোডিয়ামের নামা-পার্শ্বের আনুপিক প্রকায়নের পরিবর্তে এন্ট-টার্টে নামা রক্তের প্রসারণ লক্ষিত হয় , তিরোজ্জ্বলতা সমতুল্য, উভয় প্রযোজ্য অতিসার, উদর বেদনা, বমন, শ্বাসের শোভনতা ও অরুচ্যে স্পৃহা লক্ষ্য আছে ; ইপিকার্ডেরও সমতুল্য, কিন্তু এন্ট-টার্টে শ্বাস বিঘার জন্য বশতঃ অধিক ক্রিয়ালুতা ; এবং বমনান্তে বিমিশ্র উপদ্রব প্রযোজ্য (২) যখন ফুসফুসের ক্রিয়ালোপ হইয়া আসিতেছে বোধ হয়, রোগী নিজাগ্রস্ত হইয়া পড়ে, কাসের ক্রাস বা নিবৃত্তি প্রযোজ্য ; তখন ইপি-টার্টে সহজে এন্ট-টার্ট ব্যবহৃত হয় (৩) গো-বোজে টীকাদানের মনফসে খুন্সি বিফল হইলে এবং গিলি শিয়া ব্যবস্থায় না হইলে, এন্ট-টার্ট প্রয়োজিত হয় (৪) স্বদ্রব্যাগ বা কঠ নাগীতে মৈলার (foreign bodie) অবস্থিতি বশতঃ খাস-কুচ্ছে (cypripa) গিলিশিয়ার পূর্বে ; প্রমেহের আব-লোপে পতসোটিয়ার পূর্বে ; সৈভসৈতে ভিত্তির দোষে রোগ জন্মিলে টেরেবিহের পূর্বে , এন্ট-টার্ট ব্যবহৃত হয় । (৫) বালকদিগের কাসে এন্ট-টার্ট উপযোগী বোধ হইলেও তদ্বারা সহজে ফল না দিলে হিন্দু কাম্বুক হইবে (৬) বসন্ত ও মরৎকালে অঙ্গ-মস্তকের আরম্ভে শিশুদিগের কাস বৃদ্ধি পাইলে এন্ট-টার্ট প্রয়োজিত হয় ।

এনাকার্ডিয়াম ওরিয়েণ্টেল ।

(*Anacardium Orientale*)

সহস্রা শ্রুতি-বিলোপ ; সকলই স্বপ্নদ্রব্য বোধ হয় , রোগী স্বকীয় বিস্মৃতি বশতঃ স্মৃতিশয় বিস্মৃত হয় , সে অপ্রাণিত হইয়া পড়ে, কায় কাম্বুর উপযুক্ততা থাকে না ।

অহুয়াপরবশতা (malicious disposition), হৃদয়ে আনুজ্ঞানতা ।

অভিসম্পাত ও অপথ্য করিবার চুর্নিবার প্রবৃত্তি । (ম্যাক-ক্যান, লিলি, নাই-এসি) অবিরত প্রার্থনা করিবার প্রবৃত্তি (ষ্ট্রাম) ।

আপনার ও অন্তের প্রতি নির্ভরের অভাব ।

খোঁপের বোধ হয় যেন ভাঁহান হইছে। এ মারিছ, হুটাহুট করিতে
আদেশ করে অথ হুটাহুট করে গানতে নিচে (১০৮১)

হাঁটিবার সময় পাঁচে নাচে, কোঁকে পাইয়ে দেয় পাত্তা ; গাঁগ
নিচের ডাঙা ক'বড়া হইছে কোঁকে পাঁচে

সকল হাঁজিয়েগই ছাড়া তা

অর্ধ ও কোঁঠবদ্ধতা মতকার মত দ- কুঃ ভাব

অঙ্কুর বদান, আন্তর বিয়ে ও গুণাবলী করা ও হাঁহোদ্যোগ নিয়মে
গাঙীয়া ধারণ

মণিরের কোন অংশের তাই পকে যেন ৩ হাঁর মতা (happ) অদনা
যিতা বাধা গ্রহীত (বাঁঠা, বাঁঠা-গ্রাম, ১০৮) ; অদনা যেন তাই অঙ্ক
চাপিত হইতেছে ; কিংবা গাঙ স্তাং. (গোঁ. ১১) ২৪. ৫৬ গাঙার অঙ্কুর

আহার করিবার সময় সম্যকরূপে উপস্থিত (গোঁ. ১১),
গাঙিতে পদাঙ্গ মনেন, ও যম হাঁহা. সময় হুম প্রাপ্ত, গাং নাড়িলে চড়িলে ও
কার্যকালে। বর্জিত ; গিঃপীড়া

অব্যায়ামিদিগের সামান্যিক ও সামান্যক গিঃপীড়া (আজ্ঞ-মা, জাতি,
নক্ষ)

আহার ও পান করিবার সময় গাং. (ক্যান-মা, কান্ডা কান্ডা,
নাই-এগি)

আহারীয় ও নানায় জাতি ভাঙ তাই গাং. ; আহার-কালে রোগের
লক্ষণ অস্তিত্ব হয় (কান্ডা-ফ, গোঁ. ১১) ।

আমায় আমায় শূন্য থাকিলেই কেবল "গেটে যেন কিছু নাই" এতদপ
উপবাসবৎ অঙ্কুর ; আহারে উহার উপস্থ (চেলি, আইওড) ;
পরিপাক-ক্রিয়ার সময় উপস্থ (এই, ও নবোর বিপ্লব)

হাঁতের তালুতে আঁটল

মল-ত্যাগের অতিশয় ইচ্ছা, ১৫% মল-ত্যাগের চেষ্টা করিলে মল
পরিভুক্ত হইয়া ও যেন হুটাহুট গাং. মল ও পক্ষিশূত্র, পক্ষাঘাতিক,
ও হিলিবদ্ধবৎ অঙ্কুর হয় (মলত্যাগের ক্রিয়াক্রমা বা অনিয়মিত মলত্যাগ
, peristaltic action) (নক্ষ)

সম্বন্ধ ।—(১) রস-গেড, বহু টকা, ও রস-ভেনের সহিত সম্বন্ধে সম্বন্ধ
(২) দক্ষিণ হইতে বামদিকে বস্তুনের গতি প্রাধান্যতা (৩) চাহকো ও
পলসের পরে এনাকার্ডিয়াম ভাল খাটে (৪) এনাকার্ডিয়ামের পরে ও পুকে
প্লাটিনা ভাল খাটে

এন্থ্রাসাইনাম ।

(Anthracinum)

কার্বক্সল, দূষিত ক্ষত এবং ক্ষত, পচলা ও অসহ্য জ্বালাসংযুক্ত
রোগ ।

যখন আর্সেনিক বা অল্প কোন জ্বলিত পদার্থে কার্বক্সল কিংবা দূষিত
ক্ষতের জ্বালাকর বেদনার নিবারণ হয় না, তখন ব্যবহায্য

রক্ত-স্রাব ; মুখ-বিবরণ, নাসিকা, মল-দ্বার বা মূত্র-দ্বার হইতে রক্ত-স্রাব ,
ক'ল, গ'ল, অ'লক'ত'ন মত, শীঘ্র শীঘ্র বিস্মৃতি (decomp sing) (ক্রোচি)
রক্ত

সেপ্টিক ফিভার, শীঘ্র শান্ত-ক্ষয়, নাড়ীর নিম্নতা, পেলাপ ও মূর্ছা
(পাইরো) ।

গ্যাংগ্রীণ সংযুক্ত ক্ষত ; দূষিত ও কৃত্রিম আঙ্গুল-হাড়া (telor), কার্বক্সল,
এরিসিপেলাস

দূষিত আঙ্গুল-হাড়া ; পচলা ও উন্নয়নক জ্বালাকর বেদনা (আর্স, কার্ব-
এসি, ল্যাক)

সাংঘাতিক দূষিত ব্রণ ; কৃষ্ণ বা নীল বর্ণ ফোফা ; চক্ষু বা আট-
চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ।

কার্বক্সল ; ভয়ঙ্কর জ্বালাকর বেদনা ; রসানির ক্ষয় ছরিত (offen-
sive) পু্য নিঃসরণ ।

মৃতদেহ-ব্যবচ্ছেদ জনিত ক্ষত, বিশেষতঃ উহার গ্যাংগ্রীণ জন্মিবার
অভিমুখতা ; দূষিত পু্যজ জ্বর (সেপ্টিক ফিভার), অল্পষ্ট অবসন্নতা (আর্স,
পাইরো) ।

সর্নিগন্ধ ক টের ছল (বয়) কান্ডার বগের পাতা, ১১ জন, ১৫ অম্লিত হইতে লম্বিকাবাহী নাড়ীর (lymphatics) গাঁত ৩০০ লক্ষ লক্ষ রেখার উৎপত্তি (ল্যাক, পাইরো)

পুষ্ট ব অথ কোন দু যত পদার্থ রক্তে শোষিত হইয়া জীবাণুজনন ব অতিশয় অবসন্নতা লক্ষণাদি প্রদায় (আস, পাইরো)।

গে, মেঘ ও অথেন বহুবিধ রোগ

পচাঙ্গরের ব মৃত-মেহ-ব্যবচ্ছেদগৃহের দুর্গন্ধ আচাণের মন্দফল; দুর্গন্ধ নিঃসরণে বিষাক্ততা (পাইরো)

হেরিং বলেন কাব্বলকে শস্ত-চিকিৎসার রোগ বলা ঠিক নহে। উহা কাটিয়া দেওয়ায় প্রায়ই অপবান হয়। বাসিলেল কেবল অত্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগেই আরোগ্য প্রাপ্ত হয়, একত চিকিৎসায় একটী রোগীও নষ্ট হয় না।

সম্বন্ধ।—(১) পুষ্ট-দ্রব্যত অবস্থায় আস, কাব্ব-এসি, ল্যাক, সিকেল, পাইরোর সহিত সমস্ত সম্বন্ধ (২) ক্যান্সার, ক্যান্সার অথবা উন্নত পেলাসের ভয়ানক বেদনায় যখন আস বা এছাটার উপস্থিতি ন তখন ইউফরবিয়ামের সহিত এই ঔষধ তুলন করিয়া দেখা যায়।

এপিস মেলিফিকা।

(*Apis Mellifica*)

গণমালা-ধাতু; বিবর্জিত, দৃঢ়ভূত গ্রহি; বহুতর ক্যান্সার অথবা বিষাক্ত ক্যান্সারে এপিস উপযোগী।

নারী, বিশেষতঃ বিধবা নারী; এবং যে সকল বাচ্চ-বালিকা গাধারণতঃ সাবধান থাকিলেও হাত হইতে অব্যাহি ফেলিয়া দেয় (বোভ) তাহাদের ৭০০ এপিস উপযোগী

অসম্পূর্ণরূপে বিকশিত অথবা বিলুপ্ত তরু উদ্ভেদের মন্দফল (মিফ), রোমাষ্টিকা (হাম), অস্ট্রিকা (কালো টিনা), ও শীতাপক (আর্টিচেরিয়া)

বিষেয়, ভয় ক্রোধ, বিরক্তি ও অশুভ সংবাদের মন্দফল।

কোপনতা ; স্নায়বীয়তা (nervous) ; অস্থিরতা ; সহজে মগ্ধষ্ট না হওয়া
অশ্রুস্রাব প্রবণতা ; না কাঁদিয়া থাকিতে পারা যায় না ; সাহসহীনতা,
আশামূল্যতা (পলম)

জাগ্রৎ বা নিদ্রিত কালে শিশুদিগের আকাম্বক, তীব্র চাৎকার (হোল)

শোথ চক্ষুর নিম্নভাগে, তল্লব ন্যাস ক্রান্ততা, উচ্চভাগে, কাণী-কা) ;
হাত-পায়ের জলপূর্ণ ক্ষীততা, পিপাসামূল্য শোথ (পিপাস সংযুক্ত শোথ, এসে-
এসি, এপোসা)

স্পর্শে অত্যন্ত অনুরূতি (বেল ব্যাক)

বেদনা জ্বালাকর, হুল বেধবৎ, টাটানো বেদনা ; সহসা বেদনার
একস্থান হইতে স্থানান্তরে গতি (কাণী-বাই, ল্যাং-ক্যান পলম)

পিপাসাহীনতা শোথে, ও উদগীতে পিপাসামূল্যতা (বদনের অধিকতর
মোমাকৃতি ও অতিশয় পিপাসা, এসে-এসি) ।

জন্মান্তরে অতিশয় উপদাহ সহকারে অব্যাহিত মূত্র ; এক মুহূর্ত্তও মূত্র
ধারণ করিয়া রাখিতে পারা যায় না, এবং তাগ করিলে মূত্র-পথে দারুণ জালা
জন্মে ; পুনঃপুনঃ, যজ্ঞাযুক্ত, শব্দ, রক্তাৎ মূত্র নিঃসরণ

কোষ্ঠরোধ --কোষ্ঠ-রোধে মল-ভ্যাগের অধিক চেষ্টা করিলে যেন আঁটা
কিছু ছিঁড়িয়া যাইবে এরূপ অনুরূতি

অতিসার --মতপারীদিগের অতিসার, উদ্ভেদ-বিস্মিষ্ট রোগে, বিশেষতঃ
উদ্ভেদ বসিয়া গেলে, অতিসার, নড়িলে চড়িলে অনিচ্ছায় মল-নিঃসরণ, বোধহয়
যেন মল-দ্বার বিস্তৃতরূপে উন্মুক্ত রহিয়াছে (ফস)

দক্ষিণ পার্শ্ব সমধিক আক্রান্ত হয় ; দক্ষিণদিকের ভিত্তাস্থের বিবর্ধন বা
শোথ ; দক্ষিণ অণ্ডকোষের শোথ

সবিরাম জ্বর ; একবারে অপরাহ্ন তিনটার সময়, পিপাসাসহ, শীত (ইগে),
উষ্ণগৃহে ও বাহ্যোত্তাপে শীতের বৃদ্ধি (পূর্বাঙ্ক ৩টা ও অপরাহ্ন ৩টার সময়
শীত, থুজ)

উপচয় ।--নিদ্রান্তে (ব্যাক) ; উষ্ণ ও উত্তপ্ত গৃহে ; ভিত্তিলে (রসটকা),
বৃদ্ধি ; কিন্তু রক্তস্থান শীতল জলে ধুইলে বা শীতল জলে স্নানে ; কাসিলে,

এপোসাইনম ক্যান্সেবিনম ।

निःश्रव, विदेशयतः मूत्रं च घग्नेन क्षाम प्राप्ति

শোথ ।—নিপাসাম শোথ (এমে গ্রাম), অল মহা হয়না অথবা বমন হইয়া পড়ে (আর্গ), বিধান বিকার অনিত রোগের সহিত অসংখ্য অধিকাংশ শোথ ; টাইফস, টাইফয়েড, ও দ্বাদশটি । অগ্নের পন্নবর্তী, এবং মিগ্রেটিস গোগের পন্নবর্তী শোথ ; ফুইনাইন অপব্যবহারের পন্নবর্তী শোথ ।

সেবনৌ-সন্ধির (Sutures) নিম্নলিখিত মন্তব্য ৩য় হাইড্রোকোফেনাম
রোগ ; স্থিতি, এক চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি ; একবার ১০-১২ জন রক্তবাহী অথবা ১০ জন
সন্ধানন (বাম বাহু ও বাম কণ্ঠ, এই) , কংক্রিটের বহির্ভাগে ।

উন্নয়ন ও হস্ত-শিল্পের প্রাচীন ইতিহাস।

ଶ୍ରଦ୍ଧାସାଧକ୍ୟା :- କେମାଗତ ବା ପାକିୟା ପାକିୟା ଗୁଣ-ବ୍ୟାପ୍ତ ; ଭରଣ ବା ମାୟାତ
 ଶକ୍ତି , 'ସିଦ୍ଧିସିଦ୍ଧ', ସମନ, ହୃଦୟ ; ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚିତ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି ;
 ଜୀବନୀ-ଶକ୍ତିର ଅବସରାତା, ଶାଳିନ ହୃଦେ ଶାଳିନୀ ହୃଦେ ଶାଳିନୀ ।

গর্ভাবস্থায় হ্রস্ব ও শুষ্ক অথবা গভীর ও তরঙ্গাকার (কোলা)

ମଧ୍ୟସ୍ଥ । —ମୋତିଆ, ଲୁଗା-ଓରି, ଚାମଚ, ଖାମ୍ବ, ଗିନ୍ନା, ଡାକିଆର ଆଦିର ମଧ୍ୟସ୍ଥ
ମଧ୍ୟସ୍ଥ ।

এব্রোটেনাম ।

(Abrotanum)

পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও অতিসার ; অজীর্ণজ্বর প্রাণী অতিসার ।

অতিশয় শীর্ণতা, বিশেষতঃ অজ্বাঘরের শীর্ণতা (আইয়োড, স্ত্রানি, টিউব)
সহকারে বালকদিগের ক্ষয় বোগ (মরাসমাস) ; চর্ম্মের লোপিততা ; শিথিলভাবে
বলীতে বলীতে কুলিয়া থাকা

ক্ষয় বোগে মস্তকের দুর্বলতা, উহা সোজা করিয়া রাখিতে পারা যায়না

কেবল নিম্ন শাখাঘরের ক্ষয় প্রাপ্তি ।

অতিশয় ক্ষুধা , অথচ পর্যাপ্ত আহারেও শরীরের শীর্ণতা প্রাপ্তি, (আইও,
থ্রাট মিউ, স্ত্রানি, টিউব) ।

খন্টী (Cramps) বা তৎপরবর্তী উদর-বেদনা হইতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেদনা-
বিশিষ্ট আকুঞ্চন (Contractions)

বাত —ক্ষীততার আরম্ভের পূর্বে অত্যন্ত বেদনার জন্ত ব্যবস্থেয় ; অতিসার
অথবা অজ্বাঘ নিঃস্রবের সহসা অবরোধজনিত ; এবং অর্শের সহিত, ও রক্তাতি-
সারের সহিত পর্যায়ক্রমে উপস্থিত ; বাত ।

গাউট —সন্ধি-স্থলের ক্ষীততা, শুষ্কতা (Stiffness), তৎসহ কটক-বেদন
যাতনানুভব ; মনিবন্ধ (wrist) ও জল্ফসন্ধির (ankle-joints) বেদনা ও প্রদাহ

সর্বশরীরের অতিশয় পল্লতা (lumeness) ও স্পর্শ-দ্রব

কণ্ডুয়নশীল নীহার-ফোট (chilblains) (এগার) ।

শিঙিগের অতিশয় দুর্বলতা ও অবসন্নতা এবং একপ্রকার প্রাচৈপক জ্বর ;
দাঁড়াইতে অসমর্থতা ।

শিশুর মন্দ-প্রকৃতি, কোপনতা, বিরক্ত-চিত্ততা ও নিরাশতা ; প্রচণ্ডতা,
নিষ্ঠুরতা, ও নির্দয় কার্য্য করিতে ও বৃত্তি

পাণ্ডুর, কুঞ্চিত, বৃদ্ধবৎ মুখমণ্ডল (ওপি) ।

সম্বন্ধ । ফোটকে হিপারের পরে ; গ্লুমিসি রোগে একোনাইট ও
ব্রাইওনিয়ার পরে, আক্রান্ত পার্শ্বে শ্বাসের প্রতিবন্ধকতাজনক প্রচাপনবৎ
অনুভবের বিদ্যমানতায় ; উপযোগী ।

এমিলিনঃম নাইট্রোসঃম ।

(Amylenum Nitrosum.)

স্বাভাবিক রক্তোনিবৃত্তিকালে বা তৎপরে শ্বাসবায়ু, রক্তপ্রধান জীলোকদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী

এতদ্বারা ধমনিসকল প্রসারিত ও উহাদের গতি বিবর্তিত হয়, কিন্তু ২০০ নাড়ীর দ্রুতগতি ও মন্দগতি অগ্নে ।

মুখমণ্ডলে ও মস্তকে রক্তের তীব্র গতি (বেল, মন) ।

অত্যন্ত শীতল সময়েও অনাবৃত বায়ু সেবনের আকাঙ্ক্ষা ; গাত্রবদ্ধ-বিমোচন ও আনালা খুলিয়া দেওয়া (আঙ্গ-না, লাক, মল)

যে সকল রোগ আরোগ্য হয়না তাহাতে অনেক সময় এমিল দ্বারা উপশম ঘনো ; মৃত্যু-যজ্ঞণা নিবারণে ইহা অতিশয় ফলপ্রসূ ।

মুখ-রাগ (ফ্লুইড) । মুখমণ্ডল, আগাশ, ও শরীরের নানাস্থান হইতে উহার আরম্ভ তৎপরে ঘর্মের উৎপত্তি, অনেক সময় ঘর্মের উত্তপ্ততা ও প্রচুরতা ; সহসা উহার সীমাবদ্ধতা (abruptly limited), নিয়ন্ত্রণের তুয়াসবৎ শীতলতা ; তৎপরে অতিশয় অবসন্নতা

যৎসামান্য মনোভাষে মুখ-রাগের উৎপত্তি (কোকা, গির)

ব্লুশিং (লজ্জাদি কারণে গালের আরক্ততা) ।—পূরাণন বা তদং ; সামুদ্রিক বিবর্মিষা ।

অঙ্গ-শিরোবেদনা, বিশেষতঃ আক্রান্ত পার্শ্বের পাণ্ডুরণ থাকিলে ।

গল-বদ্ধ অতিরিক্ত কষা বোধ হয়, চিলা করিয়া দেওয়া আবশ্যক হয়

ষট্শূল ; স্বপ্নিগের ক্রিয়ার গতগোণ ; স্বপ্নিও ও জীবান বৃহৎ ধমনীধর (catoids) তীব্র দপদপ (মন) ।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত অঙ্গ-প্রসারণ ; এ ইচ্ছার পরিতৃষ্ণি অগ্নেনা ; খাট ধরিয়া ও অঙ্গের সহায়তা লইয়া অঙ্গ-প্রসারণ (আড়ামোড়াভাঙ্গা) ।

পুনঃপুনঃ গভীর জ্বরণ (হাইডোলা) (কালী-কা)

প্রসবের অব্যবহিত পরেই স্ত্রীকাক্ষণ (Puerperal convulsions) ।

উপচয় ।—মানসিক বা শারীরিক শ্রমে বৃদ্ধি ।

সম্বন্ধ ।—(১) বেগ, ক্যাষ্ট, কোকা, ফির, গ্লন, ল্যাকের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ (২) অস্থানে শীঘ্র ক্রিয়া দর্শে ; স্পর্শ-জ্ঞান-বিলোপকর পদার্থের ক্রিয়ায় মৃতকল্প ব্যক্তিদিগের পুনর্জীবনের সঞ্চার আছে । (৩) আদত ঔষধ প্রদানতঃ যাপ্যকর ; রোগী ঔষধে অভ্যস্ত হইয়া পড়িতে পুনঃ প্রায়ে'ক' অবশ্যক , উত্তর উচ্চতর ক্রমে ইহা আরোগ্যকর । (৪) ক্রমের শক্তির উপরেই অধিকাংশ সময় আরোগ্য নির্ভর করে

এমোনিয়াম কার্বনিকাম ।

(Ammonium Carbonicum.)

শারীরিক প্রকৃতির রক্তপ্রাব-প্রবণতা, রক্তের তরলতা ও লোহিত-কণার অপকৃষ্টতা (degeneration) ; ক্ষতের গ্যাংগ্রীনে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ।

শারীরিক পরিশ্রমের অভাব বশতঃ স্ত্রীলোকদিগের নানাপ্রকার অসুখে ; সর্বদা “স্নেলিং বোতল” (এমোনিয়াম শিশি) কাছে রাখিতে হয় একপ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে, এবং যাহাদের শীতকালে সহজে *দি লাগে, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী ।

শিশুরা গাঢ় ধৌত কর ভালবাসে না

নিজাক্রান্ত হইবার সময় শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আইসে, শ্বাস প্রাণ্ডির অল্প আগিতে হয় (গ্রিণ্ড, ল্যাক) ।

আর্দ্র-কালে, ঝড় বৃষ্টির সময় বদ-মেজাজ ।

শিরঃপীড়া ; পূর্ণতানুভব, বোধ হয় যেন কপাল ফাটয়া যাইবে (বেগ, গ্লন)

নাসিকার রক্তপাত ।—প্রাতে হাত ও মুখমণ্ডল প্রক্ষালনের সময় (আর্গ, ম্যাগ-কা), বাম নাসা-রক্ত হইতে রক্তপাত ; আহাৰ্নাস্তে রক্তপাত ।

ওজিনা, বারংবার নাসিকা হইতে রক্তাক্ত স্লেমা নিঃসরণ, অবশীর্ঘ (উপুড়, অবনত মস্তক) হইলে নাসাগে রক্তের প্রধাবন ।

প্রায়শঃ রাত্রিতে নামাবরোধ ; মুখাদিয়া নিশ্বাস গ্রহণ

করিতে হয় ; দীর্ঘকালস্থায়ী শক্তি ; শিশুদিগের নামা-রোধক শক্তি (হিণ, নক্স, স্থামু, টিক্টা)

পচা গল-ক্ষত ; তালু-মূলের পচা ক্ষত অগ্নিবীর উপকায়, গ্রন্থির রক্তপূর্ণতা ।

ডিপথিরিয়া ব. ফার্লে-টিনায় নামিকার অবরুদ্ধতা ; খাস রক্ত হইয়া আইসে বলিয়া শিশু ঘুমাইতে পারেনা।

ধাতুর আরম্ভে ওলাউঠার ছায় লক্ষণ (বোভ, ভিরে) ।

ধাতু — অতি শীঘ্র শীঘ্র, প্রভূত রক্তস্রাব, রক্ত-নঃসরণের পূর্বে উদরবেদনা, বিদাহী রক্ত-রক্ত, উহা লাগিয়া উঠতে ক্ষত অঙ্গে ; রাত্রিতে ও বসিয়া থাকিলে অধিক পরিমাণে রক্ত-স্রাব (মিক) ; ধাতু-কালে দাঁত-বেদনা, পেট-বেদনা ও বিষমতা ; প্রোক্তি, বিশেষতঃ উরুদয়ের প্রোক্তি ; অঙ্গুল (হাইতোল) ও মীত ।

প্রদর । — অসায় হইতে অলবৎ জালাকর স্রাব ; যোনি হইতে বিদাহী প্রভূত স্রাব ; ভগ্নের অবদরণ (excoriation) ।

স্বৎকম্প সহকারে খাস-কচ্ছু, শারীরিক পরিশ্রমে অথবা কতিপয় মিড়ি বাহিয়া উঠিলে উহার আতিশয্য ; উষ্ণগৃহে বৃদ্ধি ।

এফিসিমার (কোষময় বিধান বায়ু ও বেস, বায়ু কড়ক শক্ততা) অশ্রুতম সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ ।

এতাহ প্রোতে পুষ্কার ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত (কালি-কা) মূলিঅনিত কড়ুরনের ছায় গলা কড়ুরিত হইয়া শুককায়

নথ-মূলের প্রদাহ ; অস্থি-বেষ্টের গভীর-মূল বেদনা (ভাইওস, মিলি) ।

ফার্লে-টিনায় ছায় শরীরের আরম্ভতা (এইলাহের সহিত তুলনা করুন) ।

গভীর নিজা সংযুক্ত সাংঘাতিক ফার্লে-টিনা ; লক্ষণ খাস ; জীবনীশক্তির ক্ষীণতাবশতঃ উদ্ভেদগুলির অল্প অল্প প্রকাশ ; মস্তিষ্কের লক্ষণাত্ত সম্ভাবনা (টিউব, মিক) ।

উপচয় । — শীতল, আর্জকালে ; আয় গোটিশে ; প্রক্ষালনে (washing) ও ধাতুকালে ; বৃদ্ধি ।

উপশম । — উদরের উপর ভরদিয়া উপুড় হইয়া শয়নে (এসে-এসি) ; ব্যথিত পার্শ্বে ভর দিয়া শয়নে (পলস) ; ও শুককালে ; উপশম ।

সম্বন্ধ ।—(১) রসটক্কোর বিষক্রিয়া এবং কীটের ছল-বেধ-যাতনা এই ঔষধে নিবারিত হয়। (২) দক্ষিণ পার্শ্ব সমধিক আক্রমিত হয় (৩) ল্যাকেসিসের সহিত প্রতিকূল সম্বন্ধ

এমোনিয়াম মিউরিয়েটিকাম ।

(*Ammonium Muriaticum*)

স্থূলকার অলস ; অথবা শরীর স্থূল, জজ্বা কণি ব্যক্তিদিগের পক্ষে, বিশেষ উপযোগী ।

জলবৎ বিদাহী প্রতিশ্রায় (acid coryza), আবসম্প্যশে ওষ্ঠের ক্ষত (এলিসেপা)

ঋতুকালে বিরেচন ও বমন ; অত্র হইতে রক্তস্রাব (ফা), পদদ্বয়ে স্নায়ুশূল জনিত বেদনা ; রাত্রিতে রক্ত-প্রবাহের অধিকতর আধিক্য (বোভ—শয়নে আতিশয়া, ক্রিমো)

অতিশয় বায়ু-নিঃসরণ বিশিষ্ট হৃদয়া কোষ্ঠ-রোধ

কঠিন, বিখণ্ডিত মল, নিঃসারণে অতিশয় চেষ্টার আবশ্যকতা , মলধারের প্রাপ্ত হইতে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পতন (ম্যাগ-মি) মলের বর্ণের পরিবর্তন, ছইবারের মল একরূপ হয় না (পলস) ।

অর্শ বলি টাটায় ও বেদনা করে ; মলত্যাগের পর কয়েক ঘণ্টা পয্যন্ত সরলাঙ্গে জ্বালা ও ছল-বেধনের স্থায় যাতনা হয় (ইন্ডি, সলফ) ; বিশেষতঃ প্রদর-স্রাব বিলোপের পর

শ্বেতপ্রদর ; অঙের শুভ্রাংশের স্থায় স্রাব, স্রাব-নিঃসরণের পক্ষে নাভীর নিকটে জ্বালাকর মোচড়ান বেদনা, প্রত্যেকবার মুত্র-ত্যাগের পরে, কণি শবর্ণ, আঠাআঠা, বেদনাশূন্য প্রদর-স্রাব ।

পৃষ্ঠে, ঋক্ষাহিষ্মের ব্যবধান-স্থানে শীতলতা অনুভব (ল্যাকনান) ।

হাঁটিবার সময় জজ্বার শিরা রক্ত ও ব্যধিত বোধ হয় ; পেশীর রক্ততা হইতে

উৎপন্ন অশিথিলতার চ্যায় সন্ধিস্থলে অশিথিলতা (কষ্ট, মাঠমেয়া) ।

পদদ্বয়ে দুর্গম ঘম্ম (এলম, গ্রাম, মোরি, সেনিকউ, মিল)

সম্বন্ধ—এই উষ্মের পরে এণ্ট-কুড, ফস, পসম, সেনিকউ, ভাল খাটে ।

এম্ব্রাগ্রিসিয়া ।

(Ambragrisea.)

বালাক-বালাকানিগের, বিশেষতঃ উল্লেখ্যন-এবং, জায়বায় ও স্থলজা
যুবতীদিগের পক্ষে ; এবং বৃদ্ধদিগের জায়বায় রোগে, জায়ুর “জীর্ণশীর্ণতার” ;
এম্ব্রা উপযোগী

শীর্ণ, স্থগা, বাস্তিগণ, যাহাদের মধ্যে অধিক লাগে ।

অতিশয় বিষঃতা, কয়েক দিন পর্যন্ত বসিয়া ক্রন্দন

বৈষয়িক উৎপাতের পর নিদ্রা যাইতে অপারগতা, উঠিয়া বসিতে হয় (এ কষ্ট, সিঁপিয়া)

দুর্গম নিদ্রাসংযুক্ত রাগুলা রোগ (জিহবার নীচে অক্ষত টিউমার) (বৃদ্ধা)

উদরে শীতলতা অনুভব (কাষ)

মল-ত্যাগকালে ক হারও উপাশ্রুতি, এমন কি ধাত্রার

উপাশ্রুতি পর্যন্ত সহ্য হয়না ; বারবার বিফল মল-প্রস্রাব, ও
উদাতে উৎকর্ষার উৎপত্তি

অনেকক্ষণ হাঁটা, ও কঠিন মল-ত্যাগ প্রভৃতি সামান্য সামান্য কারণে
ঋতুযয়ের ব্যবহিত কালে রক্তস্রাব

বিশেষতঃ অথবা কেবল স্নানিতে গাড়, মালাভ শুভ্র ক্ষোষায়ন,
প্রদরস্রাব ।

থাকিয়া থাকিয়া প্রবল আকোপক ক স, তৎসহ উদগার ও প্রস্রাব ;
উঠেঃগরে কথা বলিলে বা পড়িলে উদগার আধিক্য (ভ্রম, ফস) ; সন্ধ্যাকালের
কাসে কাস উঠে না, প্রাতঃকালে উঠে (হাইও) ; “হপ”-সদৃশ বিবক্ষিত
হপসক কাস ।

উপচয় ।—উষ্ণ পানীয় দ্রব্য, উষ্ণগৃহে, গীত-বাঞ্চে ; * মনে, উচ্চৈঃস্বরে
কথা বলিলে বা পড়িলে ; বহুলোকের বিজ্ঞমানতায় ; ও আগরণান্তে ; বৃদ্ধি ।

উপশম ।—আহারান্তে ; শীতল বায়ুতে ; শীতল আহারীয় ও পানীয়
দ্রব্য, এবং শয্যা হইতে উত্থানে ; উপশম

সম্বন্ধ ।—এক্টে, এস্টফ, কাক, ইগে, মক্ষ, ফস, ভেলের সহিত এস্টার
সমগুণ সম্বন্ধ ।

এরুংম ট্রিফিল্লুম ।

(*Arum Triphyllum.*)

নাসিকার শর্দি ; বিদাহী, তরলজীব ; নাসারস্বেদ অবদরন
(raw)

জলবৎ জীব নিঃসরণ সত্ত্বেও নাসা অবরুদ্ধবৎ অমুভব (এম-কা, শুধু, মিনাপিসের সহিত তুলনা করুন), রাত্রিতে বিবর্তিত হাচি

বিদাহী, রসানীবৎ জীব নিঃসরণ, তদ্বারা নাসিকার অভ্যন্তর ভাগ, নাসাপাশ্ব
ও উপরের ওষ্ঠের অবদরন (আস, সেপা)

যে পর্য্যন্ত রক্ত না পড়ে সে পর্য্যন্ত সতত নাকখুঁটন ;
নাসিকার পার্শ্বে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করা

রক্ত না পড়া পর্য্যন্ত ওষ্ঠ খুঁটন ; মুখের কোণের গত, বিদারণ,
ও রক্তপাত ; রক্ত ন পড়া পর্য্যন্ত হাতের আঙ্গুল কামড়ান

অতিশয় বেদনা লাগিলেও কাঁচা রক্তজীবী স্থানে খুঁটন ও অঙ্গুলী
প্রবিষ্ট করণ ; রোগী বেদনায় চীৎকার করে অথচ অঙ্গুলী প্রবিষ্ট করিতে বিরত
হয় ন (ডিপার্থরিয়া, স্কার্লেটিনা, ও টাইফয়েড জরে)

মুখের ও গলার স্পর্শ-দ্রব্য বশতঃ শিশুদিগের পানাহারে অস্বীকৃতি (মার্ক) ;
ও নিদ্রাহীনতা ।

প্রভূত, বিদাহী লালা, তদ্বারা মুখের সৌম্যক বিচীর্ণ পাইয়া যায় ; জিহ্বা ও
মুখ-গহ্বরের অবদরন জগ্নো ও রক্তপাত হয়

অর-নাশ ।—উত্তর-পশ্চিমদিকের বাতাস ভোগ করিয়া সম্পূর্ণ অর-বিজোপ (একন, হিপ) ; গান করিয়া অর-বিজোপ (আজানা, কষ্ট, গম, মোল) ।

ধর্ম-যাযকদিগের গলা-বেদনা - অরের কর্ণশক্তি, আনিশিততা, অনায়িতা, ও ক্রমাগত পরিবর্তনশীলতা ; আশাও কারণে, কথা বলিলে, অথবা গান করার বুদ্ধি ; বক্তা, গায়ক, ও অভিনেতা-দিগের গলা-বাণী ।

কার্ণেটিনা রোগে দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার বড় বড় গোছায় গোছায় চাম উঠিয়া যাওয়া ।

উদাহ, স্বল্প বা বিশুষ্ঠ মূত্র সহকারে সান্নিপাতিক কার্ণেটিনা ; কউরিমিয়ার আশঙ্কা ।

সাংঘাতিক কার্ণেটিনা ও ডিপথিরিয়ায় নামিকা ও মূত্রের মত একই যেমতের পরিচালক লক্ষণ ।

লক্ষণ ।—(১) হিপার, ও নাইট-এগির পরে শুষ্ক, অরভঙ্গমশূন্য, কুপের ছায় কাঁসে ; এবং প্রাতঃকালের অরভঙ্গে ও বধিরতায় এবং কার্ণেটিনায় কঠিকম ও চিপারের পরে এরম উপযোগী (২) নিয়তমে বা পুনঃপুনঃ এরম প্রয়োগে অনেক সময় মনঃক্ষম দর্শে । (৩) উচ্চক্রমের যেমতে আত মতর মনঃল ক্রিয়া দর্শে ।

এলিয়ঃম মেপা ।

(Allium Copra)

বিবর্জিত নিঃস্রব নিঃস্রব সহকারে শৈথিল্য-বিচীর তরু ও তিষ্ঠায় অনিত প্রদাহ ।

শর্দিজনিত অতীব শিরোবেদনা, তৎসহ মাথার শর্দি ; মধ্যাকালে উহার বুদ্ধি, অনাবৃত বায়ুতে উহার উপশম ; উষ্মগ্রহে গিরিয়া আসিলে আবার বুদ্ধি (ইউফ্রে, পলস) ।

শতুকালে শিরঃপীড়ার নিরতি, ও শতুজাব অন্তর্হিত হইলে উহার প্রত্যাহা (লাক, জিহ) ।

চক্ষুতে ধূম লাগিয়া উৎপনের জ্বালা, কামড়ানি ও টাটানি, চক্ষু কচলাইতে হয় ; চক্ষুর জলপূর্ণতা ও জলস্রাব, উহার কৈশিক নাড়ীতে (capillaries) রক্তাধিক্য এবং অতিশয় অশ্রু স্রাব

মস্তকের প্রতিস্থায় ; প্রভূত, জলবৎ, ও বিদাহী (acid) নাসা-স্রাব, তৎসহ প্রচুর অবিদাহী অশ্রু স্রাব (বিদাহী অশ্রু ও অবিদাহী নাসা-স্রাব, ইউক্রে)।

নাসিকার অগ্রভাগ হইতে বিন্দু বিন্দু বিদাহী জলবৎ স্রাব পতন, (আম, আম-আইয়োড)

বসন্তকালের প্রতিস্থায় — উত্তর-পূর্বদিকের আর্দ্র বাতাস ভোগের পর শর্দি ; স্রাব লাগিয়া উপবের ওষ্ঠে জ্বালা ও ক্ষত জগে

হে-ফিভার (ওষধি-গন্ধজ্বর) — প্রতি বৎসর আগষ্ট মাসে উপস্থিত হয় হইতে উত্থান করিলে প্রবল হাঁচি, চিচফল নাড়াচাড়া করাতে উৎপত্তি

নাসিকার বহুপাদ (পলিপাস) (মেরম, শ্বাশ, শ্বাশ নাইট, মোরি)

শর্দিজনিত স্বরযন্ত্র-প্রদাহ ; কাসবৎ রোগীকে হাত দিয়া স্বরযন্ত্র ধরিতে হয় ; বোধ হয় যেন কাসিতে কাসিতে উহা ছিঁড়িয়া যাইবে।

উদর-বেদনা — পা ভিড়িয়া শর্দি লাগিয়, অতিরিক্ত আহার করিয়া, শসা ব শাকের কাঁচা চাটনি খাইয়া, ও অর্শ জন্ম উহার উৎপত্তি ; বালক-দিগের উদর-বেদনা, বসিয়া থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি, নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে হ্রাস

বদনে, মস্তকে ঘাড়ে ও বুকে একগাছি দীর্ঘ সূতোর জ্বালা স্নায়বিক বেদনা

আভিষাতিক পুরাতন শ্বাস-প্রদাহ ; অজচ্ছের পর অবশিষ্টাংশের শ্বাস-শূল ; জ্বালাকর ও জলবেধবৎ বেদনা

আঙ্গুল-হাড়া — বাহ্যর উর্দ্ধ পর্য্যন্ত লাল লাল দাগ, বেদনায় ক্ষিপ্তবৎ করিয়া তোলে, স্থতিকাবস্থায় উহার উৎপত্তি।

পায়, বিশেষতঃ শুড়গুড়ায় ঘর্ষণ বশতঃ ক্ষত ও কঁচা স্থান “ঘর্ষণে পায় ক্ষত হইলে এই ঔষধ উপকারী”।

সাঁড়াসী দ্বারা প্রসবের পর (after forceps delivery) স্থতিকাবস্থায় শির-প্রদাহ।

উপচয় ।—সামান্য ও উষ্ণগুণে প্রাণনতঃ বাক (পলম , অনাবৃত বায়ুতে বৃদ্ধি, ইউফে) ।

উপশম ।—শীতল গুণে ও অনাবৃত বায়ুতে উপশম (পলম)

সম্বন্ধ — (১) কদ, পদম, গুজার ২ হ ৩ অল্পপূরক সম্বন্ধ (২) নাম -
ক্লিপে (colypus) ক্য ৩ ক ৪ ৫ ও ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০
সিয়ান সহিত সমগুণ সম্বন্ধ, কিম্ব নাগ-জীব ও অশ্ব-জীবের বিপরীত সম্পর্ক,
(৪) পা ভিজাইবার মনফলে রসটোকার সহিত সম্বন্ধ

এলুমিনা ।

(Alumina)

যাহারা পুরাতন রোগে রক্ত থাকে তাহাদের পক্ষেই এলুমিনা বিশেষ উপযোগী ; “পুরাতন রোগে এলুমিনা একোনাহট স্বরূপ ”

শারীরিক উত্তাপের অসম্ভাব বিশিষ্টে ঘাট (ক্যাল সিলি) ।

ক্লীণ, শুষ্ক, ক্লান্ত রোগী ; মলিন বর্ণ মুখাবৃতি ; মূচ্ছ, প্রাকৃষ্ট প্রকৃতি ; অবগাদ বায়ুস্ত ব্যাক্তি (hypocondriac) ; শুষ্ক, শৈত্যবৎ, কণ্ডু, মনোমল উদ্বেগ, শীতকালে উষ্ণতা অধিক্য (পেটে) ; শরীর শরীর উষ্ণ হইতে থাকিলে সর্ব শরীরের অসহ্য কণ্ডু, মন (মলক) ; যে পর্য্যন্ত রক্ত না পড়ে সে পর্য্যন্ত কণ্ডু, মন, অমস্তর যাতনা

সময় অতিরিক্ত ধীরে ধীরে গত হয় ; একঘণ্টা অক্লান্তি মনে প্রায় বোধ হয় (ক্যাল-ইণ্ড) ।

চক্ষু না মেজিয়া এবং দিবান্তাগে ভিন্ন হাঁটিতে না যায় না ; চক্ষু বুজিয়া হাঁটিতে বুঁকিতে ও পড়িতে হয় (আর্জি-না, জেল) ।

অস্বাভাবিক ক্ষুধা ; শ্বেতসার, ফুলখড়ি, অম্বার, লবঙ্গ, চা বা কফির চূর্ণ, এবং অন্ন ও অপাচ্য জব্য আহারের আকাঙ্ক্ষা (সিকু, সোরি) ; গোষ্ঠ আঁলু সহ্য হয় না ।

বহুবৎসর ব্যাপী পুরাতন উল্গার, মধ্যাকালে উষ্ণতা আভিঃ য় ।

লবণ, সূরা, মিক্রা, গোলমরিচ প্রভৃতি সকল উত্তেজক দ্রব্যে তৎক্ষণাতঃ কাসের উৎপত্তি

কোষ্ঠ-রোধ।—অধিক মল সঞ্চিত না হইলে মল-প্রাবৃত্তি বা মল ত্যাগের সামর্থ্য জন্মে না (মেডিসিনো)। অতিশয় কুস্থন, শক্ত করিয়া কিছু ধরিয় কুঁথিতে হয়; শক্ত, গ্রাহিল, জরেল ফলের মত, শোথাবৃত, মল; অথবা নরম কাদার মত মল, উহা মলদ্বারে লাগিয়া থাকে (প্লাট)।

সরলাস্ত্রের নিশ্চেষ্টতা, কোমল মলও নিঃসারণ করিতে অতিশয় কুস্থনের আবশ্যিকতা (এনাক, প্লাট সিগি ভিরে)।

সুস্থপ যী শিশুদিগের কৃত্রিম আহার অনিচ্ছ, বোতলে ছুঁকপায়ী শিশুদিগের বৃদ্ধদিগের (লাই, ওপি); এবং গর্ভাবস্থায় সরলাস্ত্রের নিশ্চেষ্টতা বশতঃ (সিপি); কোষ্ঠবদ্ধতা

মূত্র-ত্যাগ কালে রোগিণীর অতিসার।

মল ত্যাগ-কালে প্রস্রাব করিতে কুস্থন করিতে হয়।

শ্বেতপ্রস্র। বিদাহী ও প্রভূত, গোড়গুড়া (heels) পর্য্যন্ত প্রবাহিত প্রাব (সিফ), দিবাতাগে উহার আধিক্য; শীতলকালে প্রাণে লাঘব ঋতুর পরে, শারীরিক ও মানসিক অবসন্নতা, প্রায় কণা বলিতে পারা যায় না (কার্কো-এন, ককু)।

কথা বলিলে শ্রান্তি জন্মে; শ্রান্তি ও ক্লান্তি, অবশ্য বসিয়া থাকিতে হয়

উপচয়।—শীতল বায়ুতে; শীতকালে; উপবেশন কালে; গোল আলু খাইলে; স্থপ (মাংসের কোল) আহারে; একদিনপর একদিন, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময়; বৃদ্ধি

উপশম।—গৃহ গ্রীষ্মকালে; উষ্ণপানীয় জব্যপনে; আহার করিবার সময় (সোর্সি), ও বর্ষাকালে (কষ্ট); হাস।

সম্বন্ধ।—(১) ব্রাইওনিয়ার সহিত অন্তপুরক সম্বন্ধ (২) ব্রাই জ্যাক মলফের পরে এলুমিনা ভাল খাটে। (৩) রোগের তরল অবস্থায় ব্রাই ও পুরাতন অবস্থায় এলু উপযোগী। (৪) বৃদ্ধদিগের রোগে ব্যার-কার্ক ও কোনার্ম এলুমিনার সম্বন্ধ।

গোষ্ঠায়া বিকৃত হইলে সাস-শূল, ও সাস-অনিত রোগে এলুমিনা একটা প্রধান ঔষধ

এলো সেকোট্রিনা ।।

(Aloe Sootrina)

যাহারা অলস ও ক্লান্ত মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে বিরক্ত ; মানসিক পরিশ্রমে যাহাদের শ্রান্তি অথবা তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী ।

বৃদ্ধ ব্যক্তি ; বিশেষতঃ শোথ-প্রধান-ধাতু, শিথিল-শরীর জীলোকদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী ঘর্ম্ম সহকারে অতিশয় অবসরত ইহার লক্ষণ ।

শীতকালের সমাগমে প্রতিবৎসরই পি চড়ায় উপস্থিত । (সোরি)

আপনার প্রতি অথবা আপনাদি অস্থির প্রতি অসন্তুষ্ট ও ক্রোধাধিত, বিশেষতঃ যখন কোষ্ঠ বন্ধ থাকে

গৈশিক ঝিল্লীর রোগ ; গলা অথবা সরলার (rectum) হইতে লেইয়েন মত দল দল শ্লেষ্মার উৎপত্তি ক্রমে ; সরলার গৈশিক ঝিল্লী আক্রান্ত হয় ।

কপালের আড়াআড়ি শিরঃপীড়া, প্রতি পদ-বিক্ষেপে উহার ঘুর্ণি (বেল, ব্রাই) তৎসহকারে চক্ষুর শুষ্কতা, ও নিবমিয়া (nausea) ।

শিরঃপীড়া ।—উদ্রাপে উহার বৃদ্ধি ও শীতল প্রয়োগে হ্রাস (সাস) ; কটিবেদনার সহিত পর্মাণরমে শিরাবেদনা ; অপ্রচুর মল-নিঃসরণের পর শিরঃপীড়া

অতিসার ।—আহার ও পানের অব্যবহিত পরে তাড়াতাড়ি করিয়া বহির্দেশে (পায়থানায়) যাঁইতে হয় (কাট-টি , মলদ্বারের আবরক-পেশীর উপর নির্ভর করিতে পারা যায় না (অর্থাৎ মল বেগ দারণ করা যায় না) ; প্রত্যয়ে তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া বহির্দেশে (পায়থানায়) যাঁইতে হয় (সোরি, ক্রম, মলক)

অপান (বায়ু flatus) নিঃসরণ করে যেন উঠার সহিত মত নির্গত হইবে এইরূপ অনুভব (ওলিন, মিউর-এসি, ক্রাট-মিউ)

উদর বেদনা — উদরের দক্ষিণ ভাগের নিম্নাংশে কর্তন ও মোচড়ানবৎ বেদন ; মলত্যাগের পূর্বেও মলত্যাগ-কালে বেদনার অত্যন্ত তীব্রতা, মলত্যাগের পর সমস্ত বেদনার বিরতি জগে, কিন্তু পেড়ুত ঘর্ম্ম ও অত্যন্ত দুর্বলতা অবশিষ্ট থাকে ; বেদনার আক্রমণের পূর্বে দুর্দ্দম্য কোষ্ঠ-রোধ থাকে ।

দুর্গন্ধ, জ্বালাকর, অধিক অপান (বায়ু-flatus) নিঃসরণ ; অল্প মণেব সহিত অধিক অপান নির্গমন (এগের), অপান নিঃসরণের পর মলদ্বারে জ্বালা ।

অনিচ্ছায় নিরেট মল ও অ ম রাশি নিঃসরণ , অতিসার কালে ক্ষুধা

মল-ত্যাগের পূর্বে পেট ডাকা, সহসা প্রবল মল-বেগ, সরলান্ত্রে গুরুত্ব ; মল ত্যাগ কালে কুহন ও অধিক অপান নিঃসরণ ; মল ত্যাগের পরে শ্রান্তি

অর্শ — নীলবর্ণ, অসূর ফলের তেঁপ্পার ছায়া বর্ণ (মিউর-এসি) ; সরলান্ত্রে অবিরত আবেগ ; রক্তস্রাবী, স্পর্শ-বেগ বিশিষ্ট, উত্তপ্ত ও শীতল মল প্রায়োগে উপশমিত-অর্শ , তীব্র কণ্ডুয়ন

মলদ্বারে কণ্ডুয়ন ও জ্বালা, উহাতে নিজার ব্যাঘাত (ইণ্ডি)

উপচয় । — প্রত্যয়ে ; শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে, উত্তপ্ত শুষ্ককালে ; আহার বা পানাস্থে ; দাঁড়াইলে বা হাঁটিলে বৃদ্ধি

উপশম । — শীতল জলে ; শীতল কালে ; অপান ও মল নিঃসরণে উপশম

সম্বন্ধ । — (১) উদরের রক্তাধিক্য এবং যকৃৎ-শিরার রক্তসঞ্চয় সংযুক্ত অনেক পুরাতন রোগে মলদ্বারের ছায়া এই ঔষধও ব্যবহৃত হয় , অপর এতদ্বারা লুপ্ত উদ্বেদ প্রকাশিত হয় (২) এস-মিউ, গ্যাঙ্ক, নয়া ও পডোফের সহিত এলোর সমগুণ সম্বন্ধ

এস্টেরিয়াম রুবেন্স

(Asterian Rubens)

মাষক-ধাতু দ্রব্য (সাইকোটিক ডায়াবাসিস), শিথিল, লম্বিকা পদান (ym chat'ic) শারীরিক পরাতি ; কোণন প্রভাব

কোনপ্রকার চিত্ত-বিকাশ, বস্তুতঃ প্রতিবাদে মধ্যে উত্তেজনার উৎপত্তি (এনাকা, কোনা) ।

উত্তপ্ত বায়ু দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকার ক্রায় মস্তকের উত্তাপ ।

মস্তকে রক্ত-সঞ্চয় ।

সংক্রামরোগে ; বদনের আরম্ভত, নাড়ীর দৃঢ়তা, পূর্ণতা, ও ক্ষমতা

স্তনের ক্যাথার, তরুণ ; ছুরিকা দিয়া কর্তনের ক্রায় বেদনা ; স্তনে আকর্ষণী বেদনা, যত্নের পূর্বে যেকোন হয় স্তনের সেইরূপ ক্ষীণতা ও প্রাণ-রিততা ; স্তনদ্বয় ভিতরেরদিকে আকৃষ্টে গচ্ছিত হয়

স্তনে একটী সৌমবর্ণ মিশ্রিত আরক্ত চিহ্নের প্রকাশ, উহা ভাবিয়া গিয়া লাব নিঃসরণ ; ক্রমে ক্রমে সমগ্র স্তন আক্রমণ, উহাতে অতিশয় দুর্গন্ধ, উহার প্রান্ত-ভাগ পাণ্ডুর, মধুরত, শক্ত ও বিপণ্যস্ত ; তৎকালে ঈষৎ সোহিত ক্ষতাকার (granulation) আবৃত

চলনের অদৃঢ়তা, পেশীর টানার অনিয়মিতা (এলম, জেল) ।

অপস্মার (epilepsy) ; রোগের আরম্ভে উপস্থিত হইবার চারি পাঁচ দিবস পূর্বে মর্ক শরীরে স্পন্দন ।

কোষ্ঠ-রোধ ।—দুর্গন্ধ কোষ্ঠ-রোধ, নিফল মল-প্রবৃত্তি ; জলপাইয়ের আকৃতি শক্ত শক্ত গোলায় ক্রায় মল

অতিশয় ক্ষয়নং কণিকা-বর্ণ, প্রাক্তন রক্ত-নির্গত মল (কোটি, গাট, গম, জ্যাট্রি, খুজা)

নারীদিগের সঙ্কোচ-লিখার বৃদ্ধি (লিলি)

সম্বন্ধ —(১) মিউরেস ও গিপায়ার মতত সমস্ত সম্বন্ধ । (২) স্তনের ক্যাথারে কার্বো-এন, কোনা মিলির সহিত, এবং অপস্মারে, বেল, ক্যাফ, ও মলফের সহিত ; জ্বলনা হয়

এসেটিক এসিড ।

(Acetic Acid)

পাণ্ডুর, ক্ষীণকায়া, শিথিল লোচি ত পেশী ; পাণ্ডুবর্ণ, মোমবৎ বদন (ফির)
বিশিষ্ট, ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযোগী

রক্তস্রাব — প্রত্যেক দৈনিক বিলম্বিত ঘর, নাসিকা, গলা, ফুসফুস, আমা-
শয়, অন্ত্র, গর্ভাশয় হইতে রক্তপাত (ফির, মিলি) ; অরায়ুর রক্তস্রাব ; অস্থকল্প
(vicarious) রক্তস্রাব ; নাসিকার আভিঘাতিক রক্তস্রাব (আর্ধ)

বালকদিগের ক্ষয়রোগ (marasmus) ও অজ্ঞাত *রীরক্ষয়কর রোগ
(এরে, আইও, সানি, টিউব)

অভিঘাতের (injury) পর (মল-এসি) ; শস্ত্রোপচারের
পর ; স্পর্শজ্ঞানবিলোপকর ঔষধ ব্যবহারের পর ; অতিশয়
অবসন্নতা ।

শোথ, বহুমূত্র, পুরাতন অতিসার প্রভৃতি রোগে তীব্র, জ্বালাকর, অধিক
জলপানেও অভূত, পিপাসা ; কিন্তু জ্ববে পিপাসাশূন্যতা ।

গর্ভ বস্থায় অল্প উল্কার ও বমন, দিবারাত্রি মুণ্ডিয় অল উঠা ও ওড়ত
লালা স্রাব (লাক এসি, — রাত্রিতে লালাস্রাবের বৃদ্ধি, মার্ক-৩৯)

অতিসার — অবসাদজনক, অতিশয় পিপাসাসংযুক্ত, আদিক মলস্রাব বিশিষ্ট
অতিসার, শোথ, টাইফস জ্বর, ও যক্ষ্মার অতিসার, নৈঃস্বপ্নসহকারে
অতিসার

প্রকৃত ক্রুপ, হিম্বেদিস্বপ্নবিশিষ্ট শ্বাস, নিশ্বাস সহকারে কাস (স্পঞ্জ) ;
মেঘাবস্থা

ক্রুপ রোগে ও সাংঘাতিক ডিপথিরিয়ায় সাইডার ভিনিগারের বাষ্প নিশ্বাসন
ফলপ্ৰসূত

চিৎ হইয়া শয়ন করিতে পারা যায় না (চিৎ হইয়া ভাল *য়ন করা যায়
আস') ; উদরে শূন্যতানুভব ও তজ্জন্ম শ্বাস-কৃচ্ছ ; উপুর হইয়া উদরের উপর
ভরদিয়া *য়নে ভালরূপে বিশ্রাম লাভ হয় (এম-কা)

প্লেপক জর (হেটিক গিভার) গ র প্লেপক পানিশ্চদতা ও উদ্বৃত্তা
বামগালে লাল চিহ্ন ও অতিশয় নৈশঘমা ।

সম্বন্ধ ।— (১) স্পন্দনানবরকম্প (ঝামঃ) ; অঙ্গার ও গায়েস ম
এবং ওপিয়ম ও টোমোনিয়মের তয়া গত্যদ্বারা বিনষ্ট হয় (২) সাইড র
ভিনিগাব (এপেল ফরে ব রসজাত চিকি) কাকালক এন্ড ডের
ক্রিয়া নষ্ট করে (৩) রক্তপ্রাণে মিলে নার পরে জাং মোথে
ডিক্লেটেলসের পরে ; এসেটিক এসিড ভাল খাটে (৭) এই ঔষধে আন,
বেল, ল্যাক, ও মার্কের লক্ষণ ; বিশেষতঃ বেলেডোনাঅনিত শিরঃপীড়া বৃদ্ধি
পায় ।

এসেরঃম ইউরোপিয়ঃম ।

(*Arsenum Europaeum*)

স্বয়ং ব্যাকুল , বিষঃ বা উত্তেজনা-প্রবণ , ব্যাধিগণ
শ্রোত দেহের জ্বর যেন রোগী শূন্যে নিচরণ করিতেছে একপ অশ্রুমান
(ল্যাক-ক্যান) ; সমস্ত অঙ্গের লক্ষণ

যে কোন প্রকার চিত্ত-বিকার বশতঃ পাতে কম্প

স্নায়ুর অতিরিক্ত অনুভবাধিক্য কার্পাস বা রেসমের
বস্ত্রে নখের আঁচড়, অথবা কাগজের খড় খড় শব্দ সহ্য হয় না ।
(ফির, টার) ।

কর্ণদ্বয় যেন কোন বাহ্যবস্তুর ছিপি দ্বারা রুদ্ধ হইয়াছে একপ অশ্রুভব

পড়িবার সময় চক্ষু যেন অচ্যাপিত হইয়া বিভিন্ন অথবা বহির্গত হইবে এ
প্রকার অশ্রুভব , শীতল জলে চক্ষু ধুইলে উহার শান্তি ।

চক্ষে শীতল বায়ু বা শীতল জল বড়ই ভাল লাগে ; রৌদ্র,
আলোক ও বাতাস সহ্য হয় না ।

বিবমিষা—(nausea) থাকিয়া থাকিয়া ব সতত ইপি বিবমিষা ,
 আহারান্তে উহার বৃদ্ধি, দ্বিহ্ব র পরিচ্ছন্নতা (মলফ) ; গর্ভাবস্থাব বিবমিষা
 মদিরাপানের দুর্জয় আকাজক্ষ ; কুমিয়ায় মদিরাপানোদিগের পক্ষে প্রচলিত
 ঔষধ

প্রাতে নিজ্জা হইতে জাগিবার সময় আমাশয়ে (stomach) “ভয়ঙ্কর”
 প্রচাপন ও খননবৎ অনুভব (অমিতাচারের পর) ।

অতিশয় শ্রান্তি ও সতত মৃগু (yawning)

উপচয় —শীতল ও শুষ্ক, অথবা পরিচ্ছন্ন ও স্নায় আবহাওয়ায়
 বৃদ্ধি (কষ্ট)

উপশম —মুখমণ্ডল অথবা রোগাক্রান্ত স্থান শীতলজলে প্রক্ষালনে, ও
 আর্দ্র, ভিজাকালে (কষ্ট) উপশম ।

সম্বন্ধ (১) ক্রাস-বৃদ্ধি সম্বন্ধে কষ্টিকমের সহিত ; এবং রক্তবৎ কুচিকুচি
 মল-লগ্নে এলো, আর্জ-না, মার্ক, পড, পল, সহ এসির সহিত সম্বন্ধ মন্ব
 (২) এসেরমের ৭ রে বিস, কষ্ট, পল, মল এসি ব্যবহৃত হয় ।

ওপিয়াম ।

(Opium)

বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে , অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় বালকত্বের (বার্কিক্যের)
 রোগে (ব্যারা-কা, মিলি) , এবং লঘুকেশ, শিথিল পেশা, ও শারীরিক উপ-
 দাহিতার অভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে ওপিয়াম বিশেষ উপযোগী

ঔষধে অনুভূতির অভাব, জীবনী শক্তির প্রতিক্রিয়ার অভাব
 স্নানিকীচিত ঔষধেও কোন ফলপ্রকাশ পায়না (কার্ভো লরো, ভেলে)

অচৈতন্য এবং আংশিক বা সম্যক পক্ষাঘাত সংযুক্ত ভয় হইতে উৎপন্ন,
 ভয়ের মন্দফল তখনও অবশিষ্ট (একন, হাইও) ; অঙ্গারের বাষ্পজনিত গ্যাস
 বা বাষ্প নিঃসমনবশতঃ উদ্ভূত এবং মস্তপায়ীদিগের রোগ

অতিশয় নিদ্রালুতা ; বেদনাশূন্যতা, অকাজগাহীনতা ও
অভিযোগ পরিশূন্যতা সংযুক্ত ; সকল রোগ ।

আক্ষেপ (apathy) — অপরিচিত ব্যক্তিগণের আগমনে ; মাতার ভয়-
প্রাপ্তির পর স্বপ্নদানে (হাইড্রস — মাতার কোমরে বসে জন্মদানে, কাম,
নয়), এবং জন্মন অল্প — স্ত্রীর কামে । আক্ষেপ-কালে চক্ষু অন্ধ বসন্ত ও
উর্দ্ধোখিত থাকে ।

আক্ষেপের পূর্বে ও আক্ষেপ-কালে চিৎকার (এপিস, হেলি)

নিশ্বাসে ও প্রশ্বাসে ছইয়েই শ্বাসের গভীর শব্দ ।

প্রলাপ, অবিরত কথাবলা ; চক্ষু বিস্তৃতরূপে বিমুক্ত, মুখমণ্ডল আরক্ত ও
ক্ষীত (ফুলাফুলা) ; অথবা অট্টেতত, কাচবৎ চক্চকে, অর্ধমুদিত চক্ষু, পাণ্ডুর
মুখমণ্ডল গভীর তন্দ্রা (কোম) ; তৎপূর্বে স্থাপ্ত (ষ্টুপার)

রোগিনী মনে করে যে সে বাড়ীতে নাই (বাই) ; ক্রমাগতই তাহার মনে
এই ভাব থাকে ।

নিদ্রাবস্থায় শয্যাবলম্বী চীন (অর্থাৎ অবস্থায়, বেগ, হাইড্রস) ।

মদাতায় (ডিলিরিয়ম টেম্প) — মুক্ত, শীর্ণ ব্যক্তিদিগের মদাতায় ; শীত
মুখমণ্ডল, স্থাপ্ত, জালাকর, উত্তপ্ত, শুষ্ক চক্ষু, উচ্চ নাগা-রব ।

নিদ্রা — প্রগাঢ় নিদ্রা, সমস্ত শ্বাস, আরক্ত মুখমণ্ডল, অর্ধ-মুদিত
চক্ষু, রক্তবর্ণ চক্ষু, উত্তপ্ত ঘনোআবৃত ত্বক্ ; চক্ষুর পরে

নিদ্রালুতা, কিন্তু নিদ্রা যাইতে পারা যায় না (বেগ, কাম), প্রাণ শক্তির
তীব্রতা মহাকারে নিদ্রালুতা, অধিক দূরের ঘড়ির শব্দ ও কুকুটের ডাক শুনিয়া
রোগিনী জাগরিত থাকে

নিদ্রা-বসন্ত চইবার সময় শব্দ বন্ধতা (টিউ, লাক) ।

শয্যা এত উত্তপ্ত বোধ হয় যে রোগিনী উহাতে শয়ন
করিতে পারে না (শয্যা-বোধ হয়, গার্গ, আই, পাইরো) ; একটি
শীতল স্থানের অন্বেষণে বারংবার নড়েচড়ে ; গাঙ্গ অনাবৃত করিতে চায় ।

পরিপাক-যন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা — ধমনী ক্রিয়া (পেরিষ্টালটিক শ্বাকশন) বিগ-
র্ভাশূন্যতা বা পক্ষাঘাত ; অঙ্গ অবশ্যক বোধ হয়

কোষ্ঠবদ্ধতা —শিশুদিগের ; শূলান্নী স্ত্রীপ্রকৃতি নারীদিগের (গ্রাফ) ; অঙ্গের নিষ্ক্রিয়তা বা আংশিক পক্ষাঘাত বশতঃ ; মল-প্রবৃত্তি পরিশূন্য ; ও সীমের বিষাক্ততা জনিত , কোষ্ঠ-রোধ *জ্বর, গোলকায়, কৃষ্ণবর্ণ বর্জ্যাবৎ মল (চেলি, প্লম, থুয়া) , মল বাহির হইয়া আবার ভিতরে প্রবেশ করে (সিলি, থুয়া)

মল।—অনিচ্ছায় নির্গত, বিশেষতঃ ভয় প্রাপ্তির পরে (জেল) ; কাল ও দুর্গন্ধ ; মলদ্বারের মুখাবরক পেশীর পক্ষাঘাত জনিত ; মল

মূত্র —মূত্রাশয়ের পূর্ণতাসহ মূত্র-রোধ , প্রসবের পরে অথবা অত্যন্ত তামাক খাওয়া বশতঃ , স্তন্যদায়িনী ধাত্রীর ক্রোধের পরে স্তন্যপায়ী শিশুর ; জ্বরে বা তরুণ রোগে ; ও মূত্রাশয় বা মূত্রাশয়ের মুখাবরক পেশীর পক্ষাঘাত বশতঃ ; মূত্র-রোধ।

(ট্রামোনিয়মে মূত্রেব অন্তঃপত্তি থাকে ; কিন্তু ওপিয়মে মূত্র-নিঃস্রব হ্রাস প্রাপ্ত হয় না, মূত্রাশয় মূত্রপূর্ণ থাকে কিন্তু রোগী সে পূর্ণত টের পায় না) ওপিয়মে অঙ্গের ক্রিয়ার এমনই জড়তা অথবা যে অতিশয় প্রবল বিরোধক উদ্বেগেরও স্ফীতি দর্শন , (হেরিং) ।

অধিক মাত্রায় ওপিয়ম দ্বারা চিকিৎসিত রোগীদের দুর্নিবার অতিসার (ডাঃ লিপি)

তরুণ উদ্ভেদের আকস্মিক বিলোপ বশতঃ মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত অথবা টকায় (দড়কা) (জিহ্বা)

ক্ষয়-রোগ (মারাসমাস) ; শিশুর যক আকুঞ্চিত হয়, তাহাকে শুষ্কীর্ণ ক্ষুদ্র বুদ্ধের স্থায় দেখায় (এলোট) ।

উপচয়।—নিজাকালে নিজাঙ্গ (এপিস, ল্যাক) ; স্বপ্ন-নিঃসরণ কালে ; উচ্চতা হইতে , ও উত্তেজক দ্রব্যাদি সেবন বশতঃ ; বৃদ্ধি ।

উপশম —শীতলতায় ; ও অবিরত বিচরণে উপশম ।

সম্বন্ধ।—(১) বিষ মাত্রায় ওপিয়ম সেবিত হইলে উগ্র কফি, নক্সভমিকা কালী-পার, এবং অবিরত হাঁটিয়া বেড়ান উহার প্রতিহারক । (২) শব্দের সহিত ঐক্য হইলে ওপিয়ম সেবনের মন্দফল ওপিয়মের হোমিওপ্যাথিক ক্রমদ্বারা নিবাবিত হইতে পারে (৩) ওপিয়মের সহিত এপিস, বেল, হাইওস, ট্রাম, ও জিঙ্কের তুলনা হয় ।

ককিউলাম ।

(Cocculus.)

পাতলা চুল ও পাতলা চক্ষু বিশিষ্ট যে সকল রম্যী শত্রুকালে ও বভাবস্থায় অতিশয় কষ্টে পায় তাহাদের পক্ষে ; এবং আববাহিতা ও মস্তানহানা নারী দলের পক্ষে , এই ঔষধ উপযোগী

যাহারা সর্বদা পড়ে ; যে সকল কুমারীদিগের শত্রু বৈয়ম্য সহকারে অতিশয়, অমুভবায়িকা ও কল্পনাময়তা (romantic) থাকে তাহাদের পক্ষে , এবং ক্রিয়ামৈথুন্যমত্ত ও অতিরিক্ত ইঞ্জিয়-সেবায় দুর্বলীভূত ব্যক্তিদের পক্ষে , এই ঔষধ উপযোগী

গাড়ী, নৌকা অথবা বাষ্পায় শকটে আরোহণ বশতঃ

(আর্গ, নক্স-ম), কিংবা সচল নৌকার প্রতি দৃষ্টিপাত জন্মিত, বিবস্মিয়া ও বমন ; সামুজিক বিবস্মিয়া (Sea-Sickness) ; বাষ্পায় শকট আরোহণ-জন্মিত বিবস্মিয়া

শিরঃপীড়া ।-- এইবার ও মস্তকের পশ্চাচ্ছাগে , মেরুদণ্ড পদ শ্ব সংপ্রসারিত ; রক্ষুদ্বারা কষিয়া বাঁধার স্থায় ; সমগ্রয় জার বিবস্মিয়ার অল্পকণ বিবস্মিয়া সহ ; প্রতি শত্রুকালে ; এবং মাথা চিৎ করিয়া শ্বনে বিবস্মিত , শিরঃপীড়া

গাড়ীতে, নৌকায় অথবা যেলের গাড়ীতে আরোহণ বশতঃ বমন
শিরঃপীড়া মস্তপায়াদিগের বিশেষ রোগ

মুখে ধাতব আশ্বাদ সহকারে সূক্ষ্মহীনত (ম ক)

সময় অতি শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যায় (অতি ধীরে ধীরে যায়
আর্জ-না, কান-ইও)

সমগ্র শরীর অতিশয় অশক্ত ; চেষ্টা করিয়া বৃদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হয় ;
উঠেঃপরে কথা বলিতে অতিশয় দুর্বলতা অনুভূত হয় ।

অনিদ্রার, এবং মানসিক উত্তেজনা ও রাগজাগরণের মন্দ
ফল ; এক ঘণ্টা কাল কম নিদ্রাগেলেও অতিশয় দুর্বলতা অনুভব ;
নিদ্রাহীনতার পরে টঙ্কার কোষ ও নৌকের মন্দফল ।

উত্তেজনা, শ্রম অথবা বেদনা বশতঃ বাহ ও অজ্ঞান কখন

শয্যা উঠিয়া বসিলে মত্ততাবৎ শিরোগূর্ণন ; অথবা গাড়ীর সঞ্চালনে শিরোগূর্ণন (ব্রাই)

প্রত্যেকবার নড়িলে চড়িলে উদরে ধারাল ও তরুর গ্রাস কর্তন বা ঘর্ষণবৎ অনুভব, মস্তকে ও শরীরের অন্যান্য অংশে শূণ্য-গর্ভতা অনুভব (ইয়ে)

রক্ত-নিঃসরণের চেষ্টায় এতই হৃৎকতা যে নিম্নাঙ্গের দৌলতা বশতঃ (এলম, কার্কো-এন) প্রায় দাঁড়াইতে পারা যায় না ; প্রত্যেকবার ঋতুর পরে অর্শ

ঋতুর অনুকূলে, অথবা ঋতুদ্বয়ের মধ্যবর্তী সময়ে (আইওড, অ্যাঙ্ক) প্রদর, মাংস-দোত জলের গ্রাস ; রক্তাধুর (Serum) গ্রাস, রসানি সদৃশ, রক্তাক্ত, আব গর্ভাবস্থায় প্রদর ।

প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারা যায় না ; সহজে বিরক্তি জন্মে ; সামান্য সামান্য বিষয়ে ক্রোধের উদ্রেক হয় ; রোগী তাড়াতাড়ি কথা বলে (এনা) ।

জরের ধীব, প্রচ্ছন্ন ও স্নায়বীয় ও কৃতি ধারণ, তৎসহকারে শিরোগূর্ণন, ও ক্রোধ-প্রবৃত্তি

উপচয় ।—আহারে, পানে, নিদ্রায়, ধূমপানে, আচরণে ; শকটারোহণে ; আহারের সঞ্চালনে বা সন্দোপনে, এবং গর্ভাবস্থায় উত্থানে ; বৃদ্ধি ।

সম্বন্ধ—(১) কোরিয়া ও পক্ষাঘাতের লক্ষণে ইয়ে ও নবোর সহিত, এবং রোগাক্রান্তস্থানের ঘর্ষে এন্ট-টার্টের সহিত ককিউলাসের তুলনা হয়

(২) হৃদয় কোষ্ঠবদ্ধ সংযুক্ত নাভীদেশীয় অঙ্গবৃদ্ধিতে (umbilical hernia) নব বিফলাস্তে এই ঔষধে আরোগ্য অন্নিয়াছে

কফিয়া ক্রুড ।

(Coffea Cruda.)

দীর্ঘ, ক্ষীণ, অবনতমেহ, মলিন সুখাকৃতি, রক্ত-প্রাধান পিত্ত-প্রাকৃতির রোগী।

অতিরিক্ত অনুভূতি ; দৃষ্টি, শ্রুতি, স্রাব, আশ্বাদন, স্পর্শ, সকল ইন্দ্রিয়েরই অতিশয় তীক্ষ্ণতা (বেল, ক্যাম, ওপি)

মন ও শরীরের অসাধারণ কার্য-পরতন্ত্রতা (unusual activity) ।

মনে নানাতরকার ভাবের উয় ; মনশীল কার্য-সম্পাদন, উচ্চ নিজার
বিস্তৃতি

আকস্মিক মনোভাবের অথবা আনন্দজনক বিষয়ের মনফল (কণ্ঠ
উত্তেজনাজনক বা অমঙ্গলজনক সংবাদের মনফল, অংশস) ; আনন্দাভিত্তিক ;
পর্যায়ক্রমে হৃদয় ও জ্ঞান

বেদনায় অতিশয় ভীষণতা অনুভব, উচ্চ অসহ্যায় বোধ হয়, রোগকে
শিথল করিয়া তোলে (এক, কাম) ; সে যাতনায় অবলুপ্ত হয় ।

নিজাহীনতা, সম্পূর্ণ জ্ঞান অবস্থা ; চক্ষু বুজিতে অসাধ্যতা ; মানসিক উল্লাসে
শারীরিক উত্তেজনা (রক্তোনিবৃত্তিকালে কন্দ (prolapsed uteri), অস্বাভাবিক
উপদাহ অনিত নিজাহীনতায় গিনিমিত্তর সঞ্চিত হওয়া হয়)

শিরঃপীড়া — অতিরিক্ত মানসিক পারিশ্রম, চিন্তা, ও আলাপন অনিত
শিরঃপীড়া, এক পার্শ্বের শিরঃপীড়া, বোধ হয় যেন মস্তিষ্কে জ্যেষ্ঠ নিক
হইতেছে (হাঁস, নাক), মস্তিষ্ক যেন ছিন্নভিন্ন অথবা অসাধারণ হইয়া পড়িয়াছে
হইতেছে ; অনাবৃত বায়ুতে উদ্ধার বাক্য ।

ব্যস্তমস্ত হইয়া আরার ও পান করা (বেগ, হিংসা) ।

সাবরাম, উৎকণ্ঠাবৎ (jerkiness), এবং যুগে বরফের অল রাশিগে উপ-
শমিত, কিন্তু সেই অল উষ্ণ হইয়াগাত জাতাবৃত্ত দস্ত বেদনা (বিস, জাঁক,
পল, কষ্ট, গিণ, জাট-মল) ।

উপাচয় ।— আকস্মিক মনোভাবে ; অত্যন্ত আনন্দে ; শান্তল,
অনাবৃত বায়ুতে ; মাদক ঔষধে ; বৃদ্ধি ।

সম্বন্ধ ।— (১) এক, কাম, হিংসা, মলমের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ । (২)
কাম, কষ্ট, কক, হিংসার সহিত বিষমস্ত সম্বন্ধ

কলচিকম অটমনেল ।

(*Colchicum Autumnale.*)

আমবাতিক ও গ্রহি-বাতিক (rheumatic) ধাতুতে ; হৃষ্ট পুষ্ট সবল ব্যক্তিমধ্যে ব পক্ষে ; এবং বৃদ্ধদিগের রোগে ; কলচিকম উপযোগী ।

আলোক, শব্দ, উগ্রগন্ধ, স্পর্শ, ও অপরের মন্দাচরণে রোগীকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিয়া তোলে (নক্স), তাহার যাতনা অসহ্য বোধ হয় ।

শোক বা অন্তের হৃদ্যর্ষ্য জনিত পীড়া (ষ্ট্যাফ) ।

আকর্ষণ, ছেদন, ও প্রচাপনবৎ (pressing) বেদনা , উষ্ণকালে উহার অপ্রগাঢ়তা , বায়ু শীতল হইলে অস্থি ও গভীর বিধান-তন্তুর (deeper tissue) আক্রান্তও , বায়ু হইতে দক্ষিণদিকে বেদনার গতি (ল্যাংক)

দ্রাণ-শক্তির অতিশয় তীব্রতা ; খাদ্যদ্রব্য পাকের গন্ধে বিশেষতঃ মৎস্য, অণ্ড অথবা বসন্তকৃমাংসপাকের গন্ধে (আস'সিপ) বিবমিষা ও দুর্বলতা ; প্রাণি জাগরণের মন্দফল (কফু)

খাদ্যদ্রব্যে অপ্রবৃত্তি ; উহা দেখিলে, অধিকস্থ উহার গন্ধে বিরক্তি ।
বায়ুজনিত (gas) উদরের অতিশয় স্ফীততা, বোধহয় যেন উদর ফাটিয়া যাইবে

অ মাশয় ও উদরে জ্বালা বা বরফের গ্রাথ শীতলতা ।

শরৎকালের রক্তাতিসার, অল্প হইতে অধিক পরিমাণে শাদা শাদা কুচিকুচি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ নিঃসরণ ; শাদা আম ; ও অঙ্গের চাঁচার গ্রাথ পদার্থ (ক্যাথ, কার্ব-এসি) নির্গমন

মূত্র --মলিন স্বল্প, বা বিলুপ্ত মূত্র ; শাদা অধঃপতিত পদার্থ সংযুক্ত বিন্দু বিন্দু মূত্রপাত ; রক্তাক্ত, কপিল, কালীর মত, মূত্র ; বিগলিত (putrid) ও বিসমাসিত (decomposed) রক্তের খণ্ড, এলবুমেন, ও চিনি ।

স্পর্শ করিলে ও নাড়িলে চাড়িলে রক্ত স্থানে অতিশয় অশুভুতি ।

সন্ধিস্থানে সন্ধি-বাতজনিত বেদনা ; সন্ধি-স্থান স্পর্শ করিলে বেদনায় রোগীর চিৎকার ।

উপচয় ।—মনোভাবে বা অবসন্নতা ; অতিশয় অসামান্য ; প্রখাতি
দ্রব্য পাকের গন্ধে বৃদ্ধি

উপশম ।—রোগী সম্পূর্ণ সুস্থিত হইয়া থাকিলে বমন-প্রবৃত্তির লোপ, নড়িলে চড়িলে উহার পুনরুৎপত্তি (আই) ।

সম্বন্ধ । (১) আমবা তিক গ্রন্থি-বতে (গ'উট) মস্ত-ক্ষরণ (*salivary effusions*) হইবে, ও উৎসর্গের আমবাতে ; এইজন্যকার সঠিক তুলনা হয় । (২) এপিস ও অসেপিনিক বিকল হইলে এই উভয়ে অনেক সময় সেরা আরোগ্য প্রাপ্ত হয়

কলোফাইলম

(*Caulophyllum*)

গর্ভাবস্থায়, প্রসবাবস্থায়, স্তন্যদানাবস্থায়, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে কলোফাইলম বিশেষ উপযোগী ।

স্ত্রীলোকদিগের বাত, বিশেষতঃ শুল্ক শুল্ক মন্দির বাত (এক্ট-ম্পি), কয়েক মিনিট পর পর বেদনার স্থান-পরিবর্তন (পলম) ; আনাত্ত মন্দির বেদনামূলক শুষ্কতা (*Stiffness*), আবেশিক (*Paroxysmal*), আকস্মিক, ও সন্নিবাস বেদনা

যৌবনাগমে, শ্রু-প্রকাশ-কালে কোরিয়া, হষ্টিরিয়া, অথবা, অগ্ন্যার (*epilepsy*) (এক্টিয়া) ।

ওদর —বিদাহো, অবসাদজনক প্রাব ; উপরের অগ্নিপুটের শুষ্কতা, আকুল দিয় উহা তুলিয়া রাখিতে হয় (স্বেদ) ; কপালে মাষ্টিয়া (মেছেতা) (মিসি) । ছোট ছোট বালিকাদিগের প্রদর (স্যাফ) । গর্ভ-দারবের প্রতিবন্ধকতা জনক প্রদর ।

অগ্ন্যার দৌর্ভাগ্য বশতঃ অত্যন্ত গর্ভপ্রাব (এলিটি ।—গর্ভীর নিয়াদ সংরক্ষণ নীরক্ততা অনিত গর্ভপ্রাব, হেলন) ।

আক্ষেপসংযুক্ত স্ফূট জরায়ু-মুখ, তজ্জগৎ প্রসবের বিষয় ; এবং
গ্রীবার (cervix) স্থচী বেধবৎ বেদনা ।

অল্পক্ষণস্থায়ী, অনিয়মিত আক্ষিপিক প্রসব-বেদনা, প্রসবের প্রারম্ভে কষ্টেদ,
নিষ্ফল বেদনা (এক্টিক) ; বেদনায় প্রসব ক্রিয়া প্রবলিত হয় না । লক্ষণেব সচিত্র
ক্রিয়া হইলে এই ক্রিয়ায় জীবনশক্তির অসম্ভাব পরিচয় দিত হয় ও ফলপ্রসূ প্রসব-
বেদনা জন্মে

ক্রান্ত প্রসবের পর রক্তস্রাব, পেশী-তন্তুর স্থিতিস্থাপকতার অসম্ভাব, গর্ভ
প্রাণের পর অপ্রবল রক্ত স্রাব (সিকেলি, ওয়াস্পি)

প্রসবান্তিক বেদনা — অধিক সময় স্থায়ী অবসাদকর প্রসবের পরবর্ত্তী আক্ষে-
পিক, উদরের নিম্নভাগের আড়াআড়ি ; ফুটকী পর্য্যন্ত প্রসারিত ; বেদনা (পায়ের
নলা পর্য্যন্ত প্রসারিত, কার্কো-ভেজি, কক) ।

প্রসবান্তিক প্রাণের দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি পেশীর অতিশয় দুর্বলতা,
শিথিলিত নাড়ী হইতে অনেক দিন পর্য্যন্ত বিন্দু বিন্দু করিয়া প্রবাহ (সিকেলি) ।

সম্বন্ধ ।—(১) এক্টিকিয়া, বেজ, লিজ, প্ৰসব, সিকেলি, ওয়াস্পি ভাইবারের
সহিত সমগুণ সম্বন্ধ (২) পলসেটিলার প্রসব-বেদনার সহিত সমগুণ, কিন্তু
মানসিক অবস্থা বিপরীত (৩) “মাস্তিয়া” ও জরায়ুর প্রসার-বৈমম্য অনিত
প্রতিফলিত (colic) লক্ষণে, মিলিত সমগুণ

কলোসিন্থিস

(Colocynthis.)

উদরে যজ্ঞপ্রাদ বেদনা, তজ্জগৎ বোগীর অবশীর্ষ হইয়া দ্বিভাঁজ হইয়া
থাকা, তৎসহকারে অস্থিরতা, এবং শান্তি লাভ হইবার নিমিত্ত আবর্ত্তন ; শক্ত
প্রচাপনে উপশম (উত্তাপপ্রয়োগে উপশম, ম্যাগ-ফস)

বেদনা — আহার বা পানাস্তে বেদনার বৃদ্ধি ; বেদন বশতঃ অবনত হইয়া
দ্বিভাঁজ হইতে হয় (ম্যাগ-ফস ।—অবনত হইয়া দ্বিভাঁজ হইলে বৃদ্ধি, ডাইওস) ;

বৈরক্তি (cha via, 'll h mou, অসজ্জায়) বশতঃ পথে চালাপ, উদর বেদনা
অত্যন্ত কোপনতা ও অধীরতা, কিন্তু শিথিল করিলে রাগ বা বৈরক্তির
উদ্ভেদক ।

কোপনতা, হাত হইতে জ্বালা দ ছুড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া ।

কোষজ্বিন্ত রোগ,—যথা, উদর বেদনা, ১১নং আভিমান ও রক্তোৎসাহ
(ক্যাম, ষ্ট্রাক)

শিরোগূর্ণন ।—জ্ঞাতবোগ মস্তকঘূর্ণাইবার সময় বিশেষতঃ বামদিকে,
পতনোপক্রম ; উদ্ভেদক জ্বা মেবনজ্বিন্ত শিরোগূর্ণন ।

সায়োটিকা । যেন পেটঘাটা আঁটা হইতোহে কুচকোত একপ খালধরা
বেদনা ; কণাপার্শ্বে শয়ন ।

সমগ্র অঙ্গের নিম্নভাগ পর্যন্ত, বাম কচকোত, বাম উরুতে, বাম জাঁহুতে, ও
জাঁহুর পশ্চাভাগের গহ্বরে ভাঙিত ঘ তবৎ প্রকাশমান বেদনা

উপচয় —ক্রোধে ও কোপে, অতুষ্টিজ্বিন্ত-বৈরক্তিতে (ষ্ট্রাক, লাই) ;
এবং (উদর বেদনার) পশ্চিম ভোজনে, বৃদ্ধি

উপশম —অবনত হইয়া পিঠাঙ্গ হইলে, ও মস্তক শাচাপান ; উপশম ।

সম্বন্ধ —(১) দক্ষিণ সায়োটিক আয়ুর অঙ্গরূপে (a o u r right sciatic-
nerve) দক্ষিণ বক্ষাণ-সন্ধি (hip joint) হইতে পা পর্যন্ত দক্ষিণ বেদনা-শয়ন,
সঞ্চালনে, ও পদ বিসেপে উহার আভিমান ; এবং উপবেশনে উপশম ; এষ্ট সকল
লক্ষণে, নেফের সহিত কলোমিছের তুলনা হয় (২) ক্রোধের, ও লুকায়িত
রোষের অথবা নীরব মোক্ষের মন্দফল জনিত ডিম্বাশয়ের (ovary) রোগে অথবা
অত্যাধি রোগে ষ্ট্রাকের সহিত কলোমিছের তুলনা হয়

কষ্টিকম ।

(Causticum)

কৃষ্ণ-কেশ, দৃঢ়-দেহ-তন্তু ; হৃৎকল, গোর-দোষগ্রস্ত, অতিশয় পীতবর্ণ ও মলিন মুখাকৃতি সংযুক্ত ; এবং শ্বাস-পথ ও মূত্র-পথের পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে কষ্টিকম উপযোগী

কৃষ্ণবর্ণ-চুল ও চক্ষু, এবং স্নুফুমার, ও অতিশয় অমুভূতি বিশিষ্ট বালকবালিকা, দন্তোদগমকালে একে ইণ্টারট্রাইগো (অহিপুটন) (লাইকো), অথবা টকারের (দড়কা) উৎপত্তি (ষ্টান)

অবসাদজনক রোগ অথবা দারুণ চিত্ত-বিকার বশতঃ মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় জায়গুচ্ছের ক্রিয়া বিকার ও তত্ত্বজনিত পক্ষাঘাত

মস্তক-তল, গল মধ্য, শ্বাস-পথ, সরলাজ, মলদ্বার, মূত্র-মার্গ, প্রসব দ্বার, ও জরায়ুর অবদরন অথবা স্পর্শ-দ্বেষ (soreness) (স্বষ্টবৎ অমুভব, জার্ণ ; মচকানবৎ অমুভব রমটক্স)

বিয়গ্ভাব —বিমর্ষতা, নিরাশতা ; হুম্বিচক্সা, শোক, ও হৃৎথ হইতে উহার উৎপত্তি, তৎসহ অশ্রুপাত, যৎসামান্য কারণে বালক কাঁদিয়া উঠে ।

অন্যের যন্ত্রণায় তীব্র সহ্যমুভূতি ।

দীর্ঘকালস্থায়ী শোক ও হৃৎথ (ফস-এসি), নিজস্বাহীনতা ও রাজিঅগরন (ককু, ইগে) ; ভয় ও আনন্দাদি আকস্মিক চিত্ত-বিকার (কাকি, জেল) ; ক্রোধ বা বিরক্তি ; এবং বিলুপ্ত উদ্ভূত ; হইতে উৎপন্ন পীড়া ।

শিশুদিগের হাঁটিতে শিথিতে বিলম্ব (ক্যাক-ফস)

শিশুদিগের অদৃঢ় বিচরণ ও সহজে পতন

অনৈচ্ছিক মূত্র —কামিতে, হাঁটিতে, ও নাকে ফোৎকরিতে অনিচ্ছায় মূত্র-পাত (পল, স্কুইলা, ভিরে)

কোষ্ঠ-রোধ —বারংবার নিফল মল-প্রবৃত্তি (নবা) ; দণ্ডায়মান অবস্থায় মল-ত্যাগে সুবিধা, অর্ধ-বলিষ্ঠারা মল-নিঃসরণের প্রতিবন্ধকতা শক্ত ও চিকণ (shining), চর্কির ছায় মল ; রাজিতে শয়্যায় মূত্রত্যাগ সহ শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধতা

কাম — বক্ষঃস্থলে অবদরন ও স্পর্শ-দেয় সংক, ও লম্ব
ফেলিতে অসমর্থতা স্তূতরাং নিশীথন-নিগোর (stiffness) গিষ্ট
(আর্গ, কালী ক) ; শীতলজ্ঞ গিষ্টল ডেমসত্রাথ, প্রস্থাসে উদ্ভিত
(একন) কুচকোতে বেদনা সংযুক্ত ; হৃৎস্পন্দক কামের পর অবাস্থে এবং
প্রধানতঃ রাত্রিতে হেম্যানিষ্টানিষ্ট কাম

অবদরন (rawness), ও স্বর-নাশ সহ পরভ্র, প্রান্ত উচারণ বৃদ্ধি
(স্বাংকাং বৃদ্ধি, কাং-ভেজি, ফস)

রাত্রিতে কোন প্রকার অবস্থানেই স্বচ্ছন্দতা বোধ হয়না অথবা এক মুহূর্তও
স্থির হইয়া থাকিতে পারা যায় না (ইউপ, রস)

সর্বদা নাড়িতে চড়িতে হয়, কিন্তু সঞ্চালনে শাস্তি অগে না ।

অতিরিক্ত উষ্ণতাবে আবৃত হইতে পারা যায় না, উষ্ণতায় শাস্তি অগে না ।

মূচ্ছাবেশের আয় স্ক্রিষ্ট বিলোপ ; দুর্বলতা ও কম্পন ।

অগ্নি দাহের ক্ষত-চিহ্নের পুনরায় নৃতনপ্রাপ্তি, পুনরায় টাটানি, পুরাতন
উপঘাতের আবার উন্মুক্তি ; রোগীর বলে যে এই অগ্নি-দাহ অবধি তাহার
কখনও স্বাস্থ্য-স্থল সন্ধান করে নাহ ।

ঋতু — নির্ধারিত সময়ের অনেক পূর্বে উপস্থিত ; অতিরিক্ত গাণ ;
কেবল দিব্যভাগে প্রবাহিত ; ও সময়ে স্থগিত ; ঋতু

পক্ষাঘাত — একাঙ্গের ; স্বরযজ্ঞ, জিহ্বা, অগ্নিপুট, বদন, শরীরলম্বা,
বা মূত্রাশয়ের ; সাধারণতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে ; শীতল বাতাস কিংবা বায়ু-প্রবাহ
জনিত ; টাইফয়েড বা টাইফস অথবা জিকাথারিয়া পরবর্তী ; ও ক্রমে ক্রমে
প্রকাশিত ; পক্ষাঘাত ।

উপরের অক্ষিপ্লবের পতন, উহা উন্মুক্ত রাত্রিতে বা বায়না (কলে কা,
জেল, গ্রাফ — উর্ধ্ব ও নিম্ন উভয় অক্ষিপ্লবের-পতন মিল) ।

অবনমনকর পেশীর (flexor muscles) আকৃশন ও সন্ধিহানের প্রকৃতি
সংযুক্ত আমবাটিক রোগ ; পেশীর অশিথিলতা ও প্রকৃতি (অম-মি, সাইমেবা,
গোয়াক, জাট) ।

ঔচিল । — বৃহৎ, অসমান, বৃন্তসংযুক্ত ; সহজে প্রকৃতি, রস-সংগমীল, ক্ষুদ্র

শুষ্ক, সর্ষপশরীরে ব্যাপ্ত ; চক্ষুর পাতা ও মুখমণ্ডলের উপর অবস্থিত , এবং নাসিকায় স্থিত ; আঁচিল

রোগীর কিছুকাল উপশম জন্মিয় তৎপরে উপকারের বিরতি (সোঁরি মল)

উপচয় ।—পরিচ্ছন্ন, উত্তম কালে (in clear fine weather), বায়ু হইতে উষ্ণগৃহে প্রবেশে (এই), নীতল বায়ুতে, বিশেষতঃ শীতল বায়ুর প্রবাহে ; শীতল হইলে ; এবং আর্দ্র হইলে ঠথবা স্থান করিলে বৃদ্ধি

উপশম ।—আর্দ্র, সিক্ত কালে (in damp weather) ; ও উষ্ণবায়ুতে ; হ্রাস

সম্বন্ধ ।—(১) কার্বো-ভেজিও পেটোসের সহিত অল্পপূরক (complementary) সম্বন্ধ (২) ফসফরাসের সহিত প্রতিকূল সম্বন্ধ যসের পূর্বে বা পরে কষ্টিকম ব্যবহৃত হয় না , এসিড্‌স ও কফির সহিতও প্রতিকূল সম্বন্ধ । (৩) স্লেগা গিলিয়া ফেলার আবশ্যকতায়, আণিকার সহিত , অক্ষিপুটের পক্ষাঘাতে জেল, গ্রাফ, সিপিয়ার সহিত ; স্রবডধে, সম্যাকালে বৃদ্ধিতে পরিবর্তিত হইলে, কমেজ ও কার্বো-ভেজিও সহিত ; পুষ্ণ তন স্রবনামো, সম্যাকালের সহিত ; সমগুণ সম্বন্ধ (৪) সৌমজনিত বিষাক্ততায় (কন্সোজিটারদিগের যুখে টাইপ অর্থাৎ সৌদের অক্ষরধারণের মন্দফল), এবং পীচড়ায়, মলফ বা মার্ক অপব্যবহারের মন্দফলে ; কষ্টিকম বিষ-দোষ ঠে করে । (৫) দক্ষিণ পার্শ্বেই কষ্টিকমের ক্রিয়ার প্রাধাত্য প্রকাশ পায় ।

কার্বলিক এসিড ।

(Carbolle Acid.)

ভয়ানক বেদনা ; সহসা আবির্ভাব, অল্পকাল অবস্থিতি, এবং সহসা তিরোভাব (বেগ, ম্যাগ-ফ্য)

* স্রবাসার দ্বারা ইহার ক্রম প্রস্তুত হইয়া থকে । অত্যাধু এসিডের প্রস্তুতির নিয়মের সহিত এই স্থানে ইহার অর্জনক্য দৃষ্ট হয় ।

গভীর অবমনতা, পতনাত্মকতা, গাঢ়ের সাধুগতা ও মৌলিক ধর্ম (কাম্ব কাকো ভেলি, ভিরে)।

শারীরিক পারিশ্রমে, মনোবিকারিত্ব ইত্যাদি ও মনোবিকারিত্বের কোন কোন, কিন্তু সাধারণতঃ দক্ষিণ কর্ণে মোটকের উৎপত্তি

মস্তকের মস্তক-গোলায় অল্প, এবং অল্পমাত্রা শিরঃস্রাব, বোকা (যেমন কাম্বান (lemon) হইতে অন্য কাম্বান পান কপাটে র উপর দিয়া একগাছি রবারের ফিতা দৃঢ়রূপে ও মারিত রাহিয়াছে (এল, মাট, মল)

অগ্নিদাহের ক্ষেত্রে পরিণতি ও রসানি নিঃসরণ

মূখ-বিবর, নাসিকা, গল মধ্য, নাসা-রক্ষ মরলাগ ও অপত্য ৭৭ (vagina) হইতে ছত্রিত (putrid-pitch) স্রাব নিঃসরণ (এছা, মোরি, পাটরো)।

দূষিত ফাল্গে-টিয়া ও বসন্ত (এম কা)

অধারাল (ভোঁতা) অল্পধারা বিদ্যমান তত্ত্ব; অস্থি অনাবৃত, ও সংশ্লিষ্ট (crushed), কোমলাংশে অধিক পচা পড়া (কাম্বো)

হৃদয় মদিরা ও তামাক মোহনের পূহা (এছা, কাকো-ভেলি)।

মস্তপায়া, গভীর, এবং সাধারণতঃ বিদ্যমান ও তামাক মোহনের বসন্ত, মলিন, গলপাইয়ের জায় সবুজ বর্ণ ও গল পাইয়ের মল (পাইরে)।

মৈথিল্য বিদ্যমান টাচন জায় তল জায় স্রাব কুশল নিঃসরণ অক্ষণাপন্ন রক্তাতিসার (dysentery) (কাম্ব); পাচনা, অনিচ্ছা-বর্জিত ক্রমবর্ণ, অমল্য দুর্গম অতিশয়।

ভয়ঙ্কর দুর্গম শ্বাস সহকারে কোষ্ঠবদ্ধ (ভেলি, মোরি)।
বিদ্যাহী, পাত্ত দুর্গম সবুজবর্ণ পদ

স্বল্পক।—কাম্ব-দাহে অল্প ও ক্রিম-জেন-টোর স্রাব, এবং দুর্গম ও অল্পমাত্রা স্রাববিদ্যমান পক্ষে, জেল, মর্ক মলকের স্রাব; কাব্যলিক জটিলের তুলনা হয়

ঘটনাক্রমে অথবা আত্মহত্যা পরিবার উদ্দেশ্যে কাম্বিতিক জটিল মোহন করিলে অথবা কোন প্রকারে মনোর বাহ্যিক প্রাণে অলম্বিত সাষ্টভার ভিনিগার প্রয়োগে উহার আত্মজ্ঞানিক ও বাহ্যিক বিষ-দোষ বিনষ্ট হয়।

কার্বো এনিম্যালিস ।

(Carbo Animalis)

শিরঃপীড়া —মাথা যেন বাতাবৃত্ত (ঘূর্ণাবায়ু) এ বিষ্টে হইয়াছে এরূপ অনুভব ; মাথা যেন থণ্ড থণ্ড করিয়া উড়াইয়া গইয়া গেল এরূপ অনুভব , রাত্রিতে উঠিয়া বসিয়া মাথা ধরিয়া রাখিতে হয়

শৈবিক রক্তাধিয়া, নীলগণ্ড, ও নীলভৰ্ণ, ও অতিশয় দৌৰল্যবিশিষ্ট পরিণত-বয়স্কদিগের রোগ

রক্ত-সঞ্চালনের ক্ষীণতা ও স্থিতিশীলতা (stagnated), এবং শারীরিক উত্তাপের অত্যন্ত অল্পতা , নীল-রোগ (Cyanosis) (এন্ট-টার্ট, কার্বো-ভেজি)

গ্রন্থি —ঘাড়, কক্ষ-ভৰ্ণ, কুচকী, শুন ও ভৃতি গ্রন্থির দৃঢ়তা, ক্ষীণতা, ও ব্যথিততা ; ধারাল শস্ত্র-বিদ্ধবৎ, কৰ্ণনবৎ ও জ্বালাবৎ বেদনা (কোনা) ।

সুস্থ পুষের দুষিত পুষে বা রসানীতে পরিণতি ।

উত্তোলনে, এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভার উঠাইতে সহজে শরীর চমকিয়া যাওয়া ; কিছু উঠাইতে সহজে অতিশয় দুৰ্বলতার উৎপত্তি, হাঁটবার সময় পায়ের গোড়ালি ঘুরিয়া যায়

সন্ধির দুৰ্বলতা ; সামান্য পরিশ্রমে উহা সহজে চমকিয়া যায় ।

বিমুক্ত শুক, শীতল বায়ুতে অপ্রস্তুতি ।

ঋতু-প্রকাশের পর ঋতুমতীর এত দুৰ্বলতা যে কথা বলিতে পারা যায় না (এলম, কক) ; কেবল প্রাতঃকালেই ঋতু-রক্ত প্রবাহিত হয় ।

প্রাতিশক্তির বৈলক্ষণ্য, কোন দিক হইতে শব্দ আইসে বলিতে পারা যায় না

ফুসফুস বেষ্ট ও দাহ (pleurisy) হইতে আরোগ্য লাভের পর বক্ষঃস্থলে একপ্রকার সূচী-বেধবৎ বেদনার অবশিষ্টতা (রাণ-বধ) ।

রক্তঃ, প্রদর, অতিশয় সকলই অবসাদকর (আসা — সকলই দুৰ্গন্ধময়, সোরি) ।

উপচয়।—ফোঁবি হইবার পরে বৃদ্ধি (মোরি হইবার পরে উপশম, বোম) ; যৎসামান্য স্পর্শ ; ও মদ্যপানির গলে ; বৃদ্ধি

সম্বন্ধ।—(১) কাঁক-ফসের সহঃ গুরুপুষক মধ্যঃ (২) গায়া, ব্রোম, কার্বো-ভেজি, ফস, সিপি সলফের সহিত সমস্তঃ মধ্যঃ (৩) -চায়া ও পচা উদ্ভিদ আহরনের মনফলে কার্বো আনিম্যালিস মলত্রাদ (কার্বো-ভেজি, সেপা) ।

কার্বো ভেজিটেবিলিস ।

(Carbo Vegetabilis)

যুবক বা বৃদ্ধদিগের অবসাদজনক রোগের মনফলে (সিঙ্ক, ফস, মোরি) ; এবং দুর্বলীভূত অথবা অবসন্ন জীবনীশক্তি বিশিষ্ট দাতু-বিকৃত ব্যক্তিদ্বিগের পক্ষে ; এই ঔষধ উপযোগী

পূর্ববর্তী রোগের দৌর্বল্যকর ফলের অবশেষের বিদ্যমানতার ; বাস্যকালের হাম বা কাসের অবশেষ প্রকণ শ্বাস-রোগে ; অপরিমিত মদিরা পানজনিত অগ্নি-মান্দ্য ; দীর্ঘকাল পূর্বের উপশান্তির ফলে ; এবং টাইফয়েড জ্বরের ফল হইতে অনারোগ্যে ; কার্বো-ভেজি উপযোগী ।

ফুইনাইনের কুফলে, বিশেষতঃ মবিরাম জ্বরের অবরোধে ; পারদ, লবণ, ও লবণাক্ত মাংসের অপব্যবহারে ; নষ্ট মৎস্য, মাংস বা বসা সেবনে ; এবং অতিরিক্ত উত্তপ্ত হওয়াতে ; অসুখ ।

রক্তাদি তরল বিধানের অপচয়ের মনফল (কষ্ট) , দৈনিক কিল্লীর ভগ্নাবস্থা হইতে রক্তপাত (সিঙ্ক, ফস)

শ্রুতিশক্তির দুর্বলতা ও চিন্তাশক্তির ধীরতা ।

সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিদিন নাসিকা হইতে রক্তপাত, পরিশ্রমে উহার বৃদ্ধি ; রক্তপাতের পূর্বে ও পরে দুগ্ধমণ্ডলের পাণ্ডুরতা ।

দৈনিক কিল্লীর যে কোন দ্বার হইতে রক্তপাত ; ভগ্নদেহ, দুর্বলীভূত

ব্যক্তিদিগের রক্তস্রাব, দুর্বলীভূত বিধান-ভেদ হইতে রক্ত-স্রাব হয়, শব্দ-শক্তির অবসন্নতা।

পাণ্ডুর, নিমগ্ন, আকুঞ্চিত মুখমণ্ডল ; তত্বে পিত্ত-স্রাব (ফেফাসে) ধূসর-বর্ণ শীতল-বর্ণ জিহ্বা নীল-বর্ণ শীতল ঘর্ষে শীতল, শব্দ-শক্তি, রক্ত-স্রাবের পর

দস্তের শিথিলতা, মাড়ী হইতে সহজে রক্তস্রাব

যাহাতে বোগীর অস্থির করে রোগী সেই সকল জায়গায় অ-সজ্ঞা করে পুষ্টি-মদ্যপানীরা ছইলি না ত্রাণি চায় রোগী এদের চারিদিকে কাপড় টিলা করিয়া দিতে চায়

পরিপাক শক্তির দুর্বলতা - অত্যন্ত সামান্য আহারও সহ্য হয় না ; আম-এয়ে ও অন্ত্রে অতিশয় বাষ্প-সঞ্চয়, ময়নে উহার আ-ভাষ্য ; আহার বা পানান্তে আমা-সয় মের ফাটিয়া পাইবে প্রকার অস্থির ; অতিরিক্ত মদিবা-পান, অধিক রক্তিতে আহার, ও অধিক মসজা যুক্ত আহারের মন্দফল

উদগারে অল্পকালস্থায়ী উপশয়

শিরামণ্ডলীর বোগের প্রাধান্য (সলফ), রক্তে অসম্যক অক্সিজেন সংযোগের লক্ষণ (জার্ড-নাই)

কৈশিকানাড়ীর (caul ray) বক্ত-সঞ্চয়ের অসম্যক বশতঃ স্বকের নীলাক্ততা ও হস্তপদের শীতলতা, শব্দ-শক্তির পায় অবসন্নতা, অবিরত পাথার বাতাস পাইবার ইচ্ছা ।

স্বরভঙ্গ সময় কালে ; আর্দ্র মক্যাবায়ুতে ; ও উষ্ণ মিত্তকালে স্বরভঙ্গের বৃদ্ধি, এবং স্বর-চেষ্টায় উহার বিফলতা (প্রাণ-কালে বৃদ্ধি, কষ্ট)

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শীতলতা বশতঃ নিদ্রা হইতে আগরণ এবং রাত্রিতে জাঁকুর শীতলতা বশতঃ কষ্ট (এপিস)

বারংবার, অনিচ্ছায় নিঃসৃত অতিদুর্গন্ধ মল, মলত্যাগের পর জালা ; কোমল মলও অনায়াসে পরিত্যক্ত হয় না (এলম)

রোগের চরম অবস্থায় (last stage) প্রভূত শীতল ঘর্ষ, শীতল শ্বাস, শীতল জিহ্বা, ও স্বর লোপ লক্ষণে, এই ঔষধে জীবন রক্ষা পাইতে পারে

উপচয় ।—মাগন শূকরের মাংস, ১০০ গ্রাম, মনন কুন্দনাঈন, সিঙ্কোনা ও পারদ অণুনাহারে, উত্তেজনার জন্যে বা পাচক এবং ঔষধ, আঙ্গিকালে ।

উপশয় উদার, ও পাণ্ডার পাতে, হাস

সম্বন্ধ ।—(১) কালি-কার্বনের সহিত অম্লপূরক স্বয়ং (২) জ্বলিত ঔষধেও অম্লভূতির অভাব (ওগি) (৩) উৎপত্তি নিউমোনিয়ায় সিঙ্ক ও প্লবের সহিত বিশেষতঃ পুরাতন মধ্যপ্রাচ্যের রোগ আলগা প্লেগা তুলিয়া ফেলিতে অসমর্থতা বশতঃ মুসমুসের পক্ষাঘাতাদি দ্বারা উৎ-টার্টের সহিত তুলনা হয় (৪) জ্বাবস্থায় ঔষধ ব্যবহারের প্রতিবন্ধন জাগ্রতে ও স্থায়ী উপকার না দর্শিলে ওপিয়ম ও ভেলের সহিত, (৫) সহজে প্রত্যক্ষান্বী ক্ষেত্র ক্ষেত্র সহিত ; (৬) বসাময় লাগু জ্বা ও পিষ্টকাধির বৃক্ষের পলয়ের সহিত ; এবং (৭) উগ্র-গন্ধ ধাতু-রক্ত ও শুনের বিষণ্ণ (dyspepsia) মলয়ের সহিত ; কার্বোঅক্সিজেন তুলনা হয়

কালী কার্বনিকম ।

(Kali Carbonium)

কৃষ্ণ-কেশ, শিথিল দেহ-তন্ত্র, মেদ-প্রবণ ব্যক্তিদিগের রোগ, বিশেষতঃ শোথ ও পক্ষাঘাত (এস-কার্ব, ওগি)

শরীরের তরল পদার্থ জ্বলনা জীবনীশক্তির অপচয়ের পরে, বিশেষতঃ নীরক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে (সিঙ্ক, কস-এসি, কস, সেরি) এই ঔষধ উপযোগী ।

সূচী বেধন, ও চিড়িকমারা বেদনারমত বিষাক্তকালে ও আক্রান্ত পার্শ্বশয্যে, উহার আতিশয় (বিষাক্তকালে ও ব্যথিত পার্শ্ব শয্যে হাস, আই)

অন্যে অপার্শ্ব সহ্য করিতে পাবা যায় না ; জৈমৎ স্পন্দে, বিশেষতঃ পদ-স্পর্শে, রোগী চমকিত হইয়া উঠে ।

একাকী থাকিতে অতিশয় অপ্রসূতি (আস, বিগ, লাই—একাকী থাকিতে ইচ্ছা, ইয়ে, নজ)

উপরের অক্ষি-পল্লব (eye lids) ও ভ্রুর মধ্যবর্তী স্থানে
খলীর চ্যায় ক্ষীণত্ব।

রমণান্তে, এবং স্বপ্নে বেতঃপাত, গর্ভপাত, ও হামের পর চক্ষুর দুর্বলতা
আমাশয়ের ক্ষীণত্ব ও অতিশয় অমুভূতি ; যেন ফাটিয়া পড়িবে এরূপ অমুভব,
অতিশয় আধান, রোগিনী যাহা কিছু পানাহার করে তাহাই যেন বাষ্পে পরিণত
হইবে বলিয়া বোধ হয় (আইওড)

প্রাতে মুখ ধুইবার সময়, নাসিকা হইতে রক্ত-পাত
কেবল আহার করিবার সময় দাঁত-বেদনা ; দন্দপকর বেদনা,
উষ্ণ বা শীতল কিছু দাঁতে লাগিলে বেদনার আধিক্য
গর্ভ-পাত প্রসব বা জরায়ু হইতে রক্তস্রাবের পর ; ও আহারকালে,
পৃষ্ঠ বেদনা, ঘর্ম ও দুর্বলতা ; হাঁটিবার সময় বোধ হয় যেন হাঁটা ছাড়িয়া
শয়ন করা আবশ্যিক

কাস।—শুষ্ক, আবৈশিক কাস, কাসিতে কাসিতে আঠা আঠাশেষ ব পূষ
আলগা হয়, উহা গিলিয়া ফেলিতে হয় গল-রোধ বা ভুক্তদ্রব্য বমন বিশিষ্ট
আক্ষিপিক কাস, কাসিবার সময় গলা হইতে শক্ত শুভ্র, অথবা ধূমল ঋণ্ড সমূহের
বিক্ষেপ (ব্যাড, চেগি)

ধাতু হইবার সপ্তাহ পূর্বে অমুখ অমুভব, ধাতুকালে ও ধাতুর
পূর্বে পৃষ্ঠ-বেদনা

অপ্রচুর প্রসব-বেদনা ; প্রবল পৃষ্ঠ-বেদনা ; পৃষ্ঠ প্রচাপিত হইবার ইচ্ছা
(কষ্ট)।

উষ্ণি বা বসিলে অথবা সমুদ্রদিকে অবনত হইলে কিংবা আন্দোলিত হইলে
উপশম-প্রাপ্ত শ্বাস-রোগ (asthma) ; রাত্রি ২টা হইতে ৪টা পর্যন্ত আধিক্য

ফুসফুসের ক্ষত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির এই সোর-দোষের ঔষধ ব্যতীত কদাচিৎ
আরোগ্য প্রাপ্ত হয়।—হানিম্যান।

শিলিতে আয়াস , গণকোমে (Pharynx) সংশ্লিষ্টকণিকার জায় বেদনবৎ (Sticking) বেদনা (হিপ নাই-এসি) ; বায়ুনলীল সহায় আহারের পবেশ , শিলিবার সময় পিঠে বেদনা ।

কোষ্ঠবদ্ধতা বৃহৎ, আয়াসে (difficult) নিঃসারিত, ও দুই এক ঘণ্টা পূর্বে উদার প্রচোবেদনবৎ বেদনা সংযুক্ত, মল

হ্রস্বপিণ্ড ।—মেদাপকৃষ্টতার (fatty degeneration) প্রবণতা (ফস) ; বোধ হয় যেন হ্রস্বপিণ্ড প্রত্যাহারী গুলায়মান রহিয়াছে (লাক) ।

ঘন ঘন * দি-লাগা ।

সম্বন্ধ । (১) কার্কো-ভেজির সহিত অম্লপূরক সম্বন্ধ (২) লাই, লাই, জাট-গি, নাই-এসি, ষ্টোনের সহিত সম্বন্ধ সম্বন্ধ । (৩) তরল, ঘড়ঘড় * দি বিশিষ্ট কাসে, কালী-মল, ফস, ষ্টোনের পরে ইহা ভাল খাটে (৪) জাট-মিউ ব্যবহারে কিছু ন হইলে এই ঔষধে কিছু প্রকাশিত হয় -হানিম্যান

কালী বাইক্রমিকম

(Kali Bichromicum.)

প্রতিশ্রাবজনিত, উপদংশ অনিত ও মোরা-দোষজনিত রোগ-ক্রোমী প্লুসকার, গম্বু-কেশ ব্যক্তি

ক্রুপ ও ক্রুপজনিত রোগ প্রবণ স্থল, স্তম্ভর, হ্রস্ব-ঔষ (short necked) বালক বালিকা ।

চক্ষু, নাসিকা, মুখ-বিবর, গল-বিবর, বায়ু-নলী-জুজ, আমাশয়াজপণ (gastro-intestinal tract) এবং অনন ও মূত্র-যন্ত্র পথের বৈদিক বিশেষ পীড়া—দুশ্শেষ

রজ্জুবৎ স্লেচ্ছাত্মক, উহার এক অংশের সহিত অন্য অংশ লাগিয়া

থাকে, টানিলে দীর্ঘ দড়ির মত লম্বা করিতে পারা যায়

(হাইড্রা, লাইসি) ।

গ্রীষ্মকালে সমুৎপন্ন রোগ

বিমুক্ত বায়ুতে * দি লাগা ।

পর্যায়ক্রমে আমবাত ও আমাশয়ের উপজব, * রৎকালে এক রোগের ও বসন্তকালে অপর রোগের আবির্ভাব, আমবাত ও আম-রক্তের পর্যায়ক্রমে উপস্থিতি (এবো)

বেদনা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে বেদনা, অসুখীর অগ্রভাগদ্বারা সেই সেই স্থান আবৃত করিতে পারা যায় (ইমে), একস্থান হইতে অন্য স্থানে দ্রুতবেগে বেদনার অবস্থিতির পরিবর্তন (কালী-সল, ল্যাক-ক্যান, পলস); সহসা আবির্ভাব ও তিরোভাব (বেথ, ইমে, ম্যাগ-ফস) ।

প্রতিদিন একই ঘটকায় দ্বাণু-শুলের উপস্থিতি (চিনি-সল) ।

আমাশয়ের রোগ —বিয়ার নামক মদিরা পানের মন্দফল; বুড়ুগার (ক্ষুধার) বিলুপ্তি; আমাশয়-গহ্বরে গুরুত্ব; আশ্বান; আহ্বারের অব্যবহিত পরে বৃষ্টি; রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা ও রক্ত বমন; আমাশয়ের গোলাকার দ্রুত (জিম) ।

নাসিকা —নাসা-মূলে প্রচাপনা বেদনা (কপালে ও নাসা-মূলে ঐ প্রকার বেদনা, টিষ্টে); গোঁজেরমত শ্লেষ্মা আব, হ্রস্বেত্ব, রজ্জুবৎ সবুজ বর্ণ তরল শ্লেষ্ম নিঃসরণ; পরিষ্কার রাশি রাশি শ্লেষ্মা-নিঃসরণ, শ্লেষ্মা আব রহিত হইলে মস্তকের পশ্চাত্তাগ হইতে কপাল পর্ষ্যন্ত প্রবল বেদনা

নাসারন্ধ্র-প্রভেদক অস্থি খণ্ডের (Septum) দ্রুত, ও রক্তাক্ত আব অথবা শক্ত শক্ত শ্লেষ্মার বড় বড় খণ্ড নিঃসরণ (এলম, গিপি, টিউক)

ডিপথিরিয়া—সুদৃঢ়, মুক্ত-সদৃশ, তন্তুময় (fibrinous), নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত ও কঠিনালীতে প্রসারণ-প্রবণ কৃত্রিম ঝিল্লী

অলিজিহ্বা জলপূর্ণ কোষের দ্বারা দূষিত হয়; উহার অধিক ক্ষীণতা, কিন্তু অল্প আরক্ততা (রসটকা)

কাস —প্রবল ঘড় ঘড় শব্দ সংযুক্ত, গলায় আঠা আঠা শ্লেষ্মার সঞ্চয় বলতঃ গল-রোধজনক, কাস; কাপড় ছাড়িবার সময় উহার আধিক্য (হিপ)

কুপ—ভগ্ন ধাতব স্বর (কর্কশ ঠন্ ঠনে গলা) প্রোক্ত আগরগাঙ্গে হ্রস্বেত্ব শ্লেষ্ম অথবা স্থিতিস্থাপক তন্তুময় পদার্থ নিষ্টিবন, খাস-কৃচ্ছ্র, শয়নে উহার উপশম (শয়নে আতিশয্য, এরেল, ল্যাক) ।

গল-কোষে উপসংশয় গভীর-পাণক (decortating) যত

শিরঃপীড়া —আক্রমণের পূর্বেই অপারিচ্ছন্ন দৃষ্টি অথবা দৃষ্টি-
হীনতা (ব্লেস, লাক-১৬)। তজ্জন্ম শমন করিয়া থাকবার আবশ্যকতা,
আলোক ও শব্দে বিরক্তি। শিরঃপীড়া বন্ধিত হইলে পুনরায় দৃষ্টির পরিচ্ছন্নতা
(অ'ইরিস, ছাট, লাক-১৬)

কম্ব, গ্রীষ্মকালে ইহার পরিদৃশ্যমানতা।

মাংসগ ব্যক্তিমিগের মস্তোঙ্গ-লিঙ্গার অসম্ভাব

উপচয় ।—গ্রীষ্ম ঋতুতে ; ও উত্তপ্তকালে ; বৃদ্ধি।

উপশম ।—শীতকালে চর্ম্ম লগনের উপশম (এসম ও পেটের বিক্রীত)।

সম্বন্ধ ।—(১) কুপরোগে ব্রোম, হিগার, ও আইওডিনের সহিত ইহার
তুলনা হয়। (২) ক্যাছ অথবা কার্বল-এসি ব্যবহারে অস্ত্রের ট চার ছায়া
পদার্থের নিঃসরণ দূরীকৃত হইলে আম-রক্ত রোগে ইহার ব্যবহার হয় (৩)
কুপ রোগে, আইওডিনের পরে, অন্তঃসংযুক্ত কার্ব. দ্রব্যে কৃত্রিম নিম্নী,
মর্জাধীন দুর্বলতা ও শীতলতা লগনে ; কালী-বাইকম প্রয়োজিত হয় (৪)
ন সিকার তরুণ বা পুরাতন প্রতিষ্ঠায় ক্যালবোরিয়ার পরে এই ঔষধ উপযোগী
হইয়া থাকে। (৫) প্রতিষ্ঠায় অন্তঃ রোগে ও চর্ম্ম-রোগে কালীবাইকমের
পরে এন্ট-টার্ট ভাল খাটে

কালী-ব্রোমেটম

(Kali Bromatum.)

স্থলকায় মেদ-রোগ-প্রবণ ব্যক্তিমিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী ; যুবক
অপেক্ষা বালকদিগের প্রতিই ইহার উৎকৃষ্টতর ক্রিয়া দর্শে

গল-গহ্বর, স্বরযন্ত্র, মূত্র-মার্গ, প্রভৃতি সমগ্র শরীরের অন্তঃপ্রবাহিতা, আন্দোলিত অনিশ্চিত গতি বোধ হয় যেন অজ্ঞাধীন পার্শ্বেরদিকেই চলিতেছে

স্নায়বীয়তা, অস্থিরতা, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারা যায় না, নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে অথবা কার্যে নিবিষ্ট থাকিতে হয়; হস্ত ও হস্তাঙ্গুলী সর্বদাই সঞ্চালিত হয়; হস্তদ্বয়েই 'অস্থিরতা' (ক্রন্দনের অস্থিরতা, জ্বঙ্ক) হস্তাঙ্গুলীর স্পন্দন

অদম্য ক্রন্দন ও গভীর বিষাদপূর্ণ জ্বঙ্ক অর্থাৎ অবাঞ্ছনিক বিষয়কে বাস্তবিক বোধ করিয়া বিষমতা

স্মৃতি-স্মৃতির ক্ষীণতা; কথা বলিতে ভুল হয়; বিমনস্কতা, কোন কথা বলাইবার পূর্বে সেই কথাটী বর্ণিয়া দিতে হয় (এনাক)

বিষমতা, হতোৎসাহিতা, উৎকণ্ঠা, বোধ হয় যেন চিন্তা-ভ্রম হইবে।

পেশীর অসামঞ্জস্য (জেরা) স্নায়বীয় দৌর্বল্য অথবা গতির স্তব্ধতাও অবশ্য

বিরক্তি ও শোক, সম্প্রতি বা সম্রমের অপচয় এবং বিষয়-কার্য্য-সংক্রান্ত উপদ্রব বশতঃ অস্থিরতা ও নিদ্রাহীনতা

বালকদিগের রাত্রিকালে ভয় (কালী-ফস), নিজায় দাঁত কড়মড়, চিৎকার, কৌকো, ও ক্রন্দন কর; ভয়ঙ্কর স্বপ্ন, আত্মীয় স্বজনের কথায় শাস্তি জন্মে না। স্বপ্ন সঞ্চরণ (মিলি)।

আক্ষেপ। ভয়, ক্রোধ বা মনোভাবজনিত কারণে স্নায়বীয়-রক্ত-প্রধান ব্যক্তিদিগের আক্ষেপ; এসব-কালে, দস্তোদগমকালে, ছপ শব্দ-কালে, ও আইট্‌স ডিজিঙ্গ নামক রোগে, আক্ষেপ।

অপস্মার।—আজ্ঞা, উপদংশজ বা টিউবারকেল জনিত অপস্মার; সাধারণতঃ ধাতুর হই এক দিবস পূর্বে; ও অমাবস্য়ার সময় রোগের আবেশ; আক্রমণের পরে শিরঃপীড়া।

মস্তিষ্কের প্রতিগিষ্ঠ উপদংশ সংযুক্ত শিশু বিস্মটিকা, মস্তিষ্কে রস প্রাণে পূর্বে; হাইড্রোক্যেফেলয়েডের প্রথমাবস্থায়; ও যুগ্ম।

পূর্বাঙ্ক ৫ টার সময় প্রত্যহ শিশুদিগের উদর-বেদনা (অপরাঙ্ক ৮ টার সময় কলো, লাই)।

ଗର୍ଭାବସ୍ଥାୟ ଶାଶିବାସ କାମ , ଡକ୍ଟ, କଞ୍ଚିନ, ଶିଶୁ ଆବଦ୍ଧ, ଗର୍ଭ ପାଟିହର ଆକାଶା
 ସ୍ଥଳକ, କାମ (କୋନା)

ଶ୍ରୀମତୀ-ଭାବ (୧୦୩୯ ଟଙ୍କା) ସାମାଜିକ-ଆଗମି-ଆମ (୧୦୩୯ ଟଙ୍କା)

মুখ-সূঁচিকা (বসন্ত ফোঁড়া) মুখের মাংসের বারিকোঠের ৩ খণ্ড,
 পাটলবর্ণ পীড়িকা ; মূত্র-মণ্ডলা, বসন্ত-স্থানে, ২৪ ঘণ্টা পরে ১০ জন লোকের, মাটামান
 (ঘাড়া পকে) পীড়িকা ; উহার কুণ্ডলি-বিহীন ৩ খণ্ডে থাকে (কাকো-এন)

সম্বন্ধ । --(১) সাংগঠনিক বিধাভ্যন্তরীণ স্বতন্ত্র নথি প্রণয়ন (২) মুখ-
দুষিকার ইউনিয়ন প্রাথমিকের পরে এই প্রণয়ন প্রায়ই আয়োজ্যকর

কুপ্রম মেটেলিকম ।

(Cuprum metallorum)

ଆମେକ୍ଷଣ ଓ ଶକ୍ତି ; ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟେ ଯୋଗ-ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା
ଆବିର୍ଭାବ ।

ଶକ୍ତିବିହୀନ ମାନସିକ ପରିସର ଏବଂ ନିନ୍ଦାହୀନତା (କଫ, ମଦା) ଏକତ୍ର
 ମାନସିକ ଓ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା, ଅସୁସ୍ଥ ଉତ୍ତରୀୟ ଆକ୍ରମଣ ।

ଜାମାଆନ ୨୫ କାମେ ମୁଖେ ଶ୍ରୀ.ଏ, ଶ୍ରୀ.ଏ. ସିଂହ ମାତ୍ର ଜାମାଟେ (ଶ୍ରୀ.ଏ.ଏ.)
ଆସାନ (ଶ୍ରୀ.ଏ.ଏ.)

ମର୍ଦ୍ଦିତ ଶ୍ରାମ ଅବିଚାର ଶିକ୍ଷା ବାହାର କରା ଓ ଡିଜିଟାଲ ମେଡ଼ିଆ (ଇଣ୍ଟରନେଟ୍),

गान कस्त्रिवाच समय उत्तरण : मार्श गंगल भट्ट नामा (प्राम, भुला)

উদরে ও অজ্যান্ত পশুচ্যুতগে (পয়েন ডাম) থানীমহ ললাউঠা

উদ্ভେদ-বিলୋপের অর্থাৎ বসিয়া যাক্ষার মনাকল (বাতির না হওয়ায় মন ফল, স্নিক), ও *ভেউকা* মলিটফর পোড়া, আটকপ টকার, বমন, পাটের ঘর্মের বিলোপের মনাকল (গিলি, স্নিক) ।

নীলবর্ণ মুখমণ্ডল ও আকৃষিত অশ্রু সহ উদ্ধার (নড়ক)

* রীর-মাথায় থলী (c amp's), করতলে, পদতলে. জজ্বা-পশ্চাতে থলী
তৎসহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অভিশয় শ্রান্তি

ঘনঘন পেশীব সঙ্কোচন ও প্রসারণ বিশিষ্ট আক্ষেপ, হস্তাঙ্গুলী ও পদাঙ্গুলীতে উহার আরম্ভ, গমগ্র শরীরোপরি সংপ্রসারণ ; গর্ভাবস্থায় আক্ষেপ ;
প্রসবান্তে আক্ষেপ (দড়কা), ভয় বা বিরক্তির পরবর্তী আক্ষেপ ; অল্প
যন্ত্রের রোগের মস্তিষ্কের স্থান-বিকল্প বশতঃ আক্ষেপ (জিহ্বা) ।

ছিন্নার পক্ষাঘাত ; অসম্পূর্ণ, তোতলা কথা

অপস্মার —জানু হইতে “অরা” অর্থাৎ এক পক্ষার “সর্সরের” আরম্ভ ও
উপরে উত্তীর্ণ ; রাজিতে নিজাকালে বৃদ্ধি (বিউফো) ; অমাবস্তার সময় ;
নির্দ্ধারিত ব্যবধান-সময়ের পরে অর্থাৎ ঋতুকালে ; পতন বা মস্তকে আঘাত
প্রাপ্তি হইতে ; ও জলে ভিজাতে ; রোগের আবেশের উপস্থিতি

বোতল হইতে জল ঢালিবার শব্দের স্থায় কাসের গলগলশব্দ ।

শীতল জল পানে কাসের উপশম (কষ্ট শীতল জল পানে বৃদ্ধি, স্পন্দ)

হৃপস্ক-কাস —অনেকক্ষণস্থায়ী, শ্বাস-রোধকর, আক্ষেপিক, কাস ;
কথা বলিতে অশক্তি ; শ্বাস-শূন্যতা (বেদন হইয়া পড়া), নীলবর্ণ মুখমণ্ডল,
শরীরের-দৃঢ়তা ও শুষ্কতা ; ক্রমাগত তিন আবেশ (ষ্টান) ; চৈতন্য
লাভের পর অতরল ভুক্তজব্য বমন (ক্যান) ; প্রত্যেক আবেশের সহিত
ক্যাটালেক্সি সদৃশ আক্ষেপ

জজ্বার পশ্চাঙ্গাগে ও পদতলে উগ্র, যাতনাগ্রহ প্রসবাস্তিক বেদনার গতি

উপচয় —শীতল বায়ু ; শীতল বাতাস (wind) ; রাজিকাল, পদের
ঘর্ষ বা উদ্বেগের বিলোপ ; বশতঃ বৃদ্ধি ।

উপশম ।—একটোক ঠাণ্ডা জলগিলিলে বিবমিষা, বমন, ও কাসের হ্রাস

সম্বন্ধ ।—(১) ক্যালকেরিয়ার সহিত অল্পপূরক সম্বন্ধ (২) ওলাউঠার,
আসেনিক ও ভিরেট্রের সহিত তুলনা হয় ; ইপিকাক কুপ্রমের উদ্ভিদ
সমগুণ । (৩) হৃপস্ক-কাসে ও ওলাউঠার কুপ্রমের পরে ভিরেট্রম ; এবং
উদ্বেদ-বিলোপজনিত আক্ষেপে এপিস ও জিহ্বা ; ভালখাটে ।

কোকা ।

(Coccol)

কার্যযোগে জীবনে অতিশয় শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম বশতঃ শরীরের ক্ষয়প্রাপ্তি ; এবং যুগ্ম বাস্তবিক অবস্থা নিবন্ধন পীড়া (ফ্লোর-এস)

স্নায়বীয় অবসন্নতা জীনত বয়ান , মজ্জতা, ভীকতা, লোক সংসর্গে অস্বচ্ছন্দতা ।

বিষন্নতা, কোপনতা, নির্জীনতায় ও গুপ্তায় আনন্দ

মদিরা ও তাম্রকূট সেবনের স্পৃহা , অভ্যস্ত উত্তেজক পদার্থ সেবনের আকাঙ্ক্ষা

ব্যায়াম-ক্রীড়ায় নিযুক্ত ব্যক্তিদলের ; বৃদ্ধিদলের , এবং অধিক পরিমাণে হইকি মদিরা ও তাম্রকূট সেবাদলের , শ্বাস-ক্লান্ততা ।

বক্ষঃস্থলের গৌরব (oppression , heaviness) ও শ্বাস-ক্লান্ত , সহকারে ফুসফুস হইতে রক্ত-প্রবাহ

নিজাতুরতা, অথচ কোথাও আরাম পাওয়া যায় না

বাতাধান জ্বর (আর্জু-মা, নবা) ; অতিরিক্ত পরিশ্রম বশতঃ ; এবং অঙ্গ-গিণ্ডের অতিজিহ্ম হইতে আর্গ, বোরা, কষ্ট) ; প্রবল ক্ষয়কাম্প ।

পক্ষত বা বোম্বাম আয়োচনের মন্দাগল (আস) ; উত্তেজক জবা, মদিরা, ও তাম্রকূট সেবনের কুশল ।

এই ঔষধে দাঁড়ের কেরিঙ্গ নিবারণিত হয় ।

সংক্ষেপ ।—(১) রোগীর আলোক ও লোক-সংসর্গের ঔচ্ছায়, ক্রীমো ; এবং অন্ধকার ও নির্জীনতার আকাঙ্ক্ষায়, কোকা ; ব্যবহৃত হয় (২) জামাকের বিষয় স্বরূপ প্রথমে কোকার ব্যবহার হইয়াছিল

কোনায়াস ম্যাকিউলেটম ।

(*Conium maculatum*)

রক্তোনিবৃত্তি-কালে ও রক্তোনিবৃত্তির পর বৃদ্ধা কুমারী ও গৌদিগের রোগে
এই ঔষধ পরমোপকারী

বৃদ্ধ পুরুষ, বৃদ্ধা কুমারী, বৃদ্ধ কুমার, দৃঢ় পেশী-ভেদ্যবিশিষ্ট, সহজে
উত্তেজনাশীল জঘু-কেশ ব্যক্তি, শারীরিক পরিশ্রম পরিশূন্য বয়স্ক ব্যক্তি,
এই সকল রোগীদিগের রোগে কোনায়াস বিশেষ উপযোগী

বৃদ্ধদিগের দুর্বলতা, আঘাত বা পতনজনিত রোগ, বিবর্তিত গ্রন্থিবিশিষ্ট,
ক্যাংসার ও ক্রফুলগ্রন্থ, দৃঢ় তন্তু, ব্যক্তিদিগের রোগ

কার্য বা অধ্যয়নে প্রবৃত্তিপরিশূন্য; অলস, উদাসীন সকল বিষয়েই অমনো-
যোগী ব্যক্তি

স্মৃতি-শক্তির দুর্বলতা, মানসিক (চেষ্টা সহ্য করিতে অসামর্থ্য)

উগ্রস্বভাব; সহজে বিরক্ত, প্রভুত্ব-প্রিয়, বিবাদী, তর্জুনকারী, প্রতিবাদে
অসহিষ্ণু (অর) ব্যক্তি; যে কোন প্রকার উত্তেজনায় মানসিক অবসাদে
উৎপত্তি।

একাকী থাকিতে ভয়, অথচ লোক সংসর্গ পরিত্যাগ (কাণী কা লাই)

গ্রন্থির প্রস্রাবের দৃঢ়তা; ঘৃষ্ট্রণ ও উপধাতের পর, ককট রোগ-প্রাণব্যক্তি
দিগের স্তনের বা অণ্ডের দৃঢ়তা

ঋতুকালে ও ঋতুকালের পূর্বে স্তনের স্পর্শ-বেধ, কঠিনতা ও বাধিততা,
(ল্যাক-ক্যান, কাণী-কা)

শিরোগূর্ণন।--বিশেষতঃ, শয়ন সময়ে ও শয্যায়া পাশ ফিরিবাব
সময়ে; যৎসামান্যরূপে মস্তক-সঞ্চালনে, অথবা চক্ষু সঞ্চালনে; মাথা ঘোরে
মস্তক সম্পূর্ণ স্থির রাখা আবশ্যক হয়; বামদিকে মাথা ফিরাইলে
(কলো); বৃদ্ধদিগের, এবং ডিম্বাশয়ের ও গর্ভাশয়ের পীড়ার সহিত সংশ্লিষ্ট,
শিরোগূর্ণন।

কাস; প্রথমতঃ শুষ্ক স্থান জন্ত উৎপন্ন, থাকিয়া থাকিয়া কাসের আবেগিক
আবেশ (spasmodic paroxysm); বক্ষঃস্থলে ও গলার অভ্যন্তরে কণ্ডর

(আইওড), রাস্তিতে, শয়ন-সময়ে ও গর্ভাবস্থায়, অথবা (কঠ
কালী-বাহি)

মূত্র-ভ্যাগে অতিশয় কষ্ট ; মূত্র-প্রবাহের সর্বত্র মত্তা ; যদ্যপি একবার
থামে আবার পড়ে ; মূত্রাশয়ের মুখদ্বারাদ্বারা অথবা গর্ভাশয়ের দীর্ঘ

ধাতু — ক্ষীণ, বিলুপ্ত, নিম্ন গ্রেত সময়ে অনেক পথে, অত্যন্ত পরিমাণে
নিঃসৃত, অস্বাভাবিক স্থায়ী, গায়ে মুত্র মুত্র লোড়ন বর্ণ উদ্ভেদ ও যত্নবাহিত
হইলে উহার বিলোপ (ভল) লক্ষণাপন্ন, যদিও গড়ে স্থগিত ; শীতল জলে
হাত রাখিলে অবরুদ্ধ (ল্যাক-ড), রহঃ ।

প্রদর ।— স্বাতুর দশদিন পরে প্রদর-প্রায় (বেগা, বোভি) ; বিদাহী
রক্তাক্ত ; দুগ্ধাকার, প্রভূত, গাঢ়, সবিরাম, স্থায়ী ।

মন্দফল — সংযত মঙ্গল-প্রবৃত্তির, অথবা বিলুপ্ত স্বাতুর মন্দফল ;
কাম প্রবৃত্তির অপরিহৃত্তি, অথবা অতি পরিহৃত্তির মন্দফল ।

চক্ষুর প্রদাহ ব্যতীতও আলোকে বিভ্রা ; ক্রান্তি কালোকে চক্ষুর ব্যবহারে
উহার আতিশয়া, রাস্তিতে পড়িলে অল্প ছায়াপথের ওয়া, তীর আলোকাতঙ্ক
(সোরি) ।

দিনারাজি ঘণ্টা, নিজে। আশিষামাত্র, অথবা চক্ষুরুদ্ধ করিবামাত্র
দর্শ (সিদ্ধ) ।

উপচয় ।— রাস্তিতে, স্নানে ; শয্যায় পাল ফিরিলে বা উঠিয়া বসিলে ; ও
কৌমার্য্যে ; বৃদ্ধি

উপশম — (১) যে সকল রোগীদিগের সঙ্গে কোনায়েম উৎসোগী স্রাব বা
উত্তেজক পদার্থ সেবনে রোগকালে তাহাদের উপকার নর্শে, কিন্তু স্রাবস্থায়
কোনায়েমের রোগীদিগের যদিরা সহ্য হয়না (২) ঘৃষ্ট্রাণে, আর্গিকা, ও
রসটেকের সহিত, ক্যান্সার রোগে, আম, ও এষ্টারের সহিত, গ্রাধির শীতলতা, ও
ক্যান্স, ও সোরির সহিত ; কোনায়েমের তুলনা হয় (৩) শুনের অর্কুদে
(tumour) দূষিততার আশঙ্কায় কোনায়েমের পরে সোরিং ম ভাল লাটে

কোলিনমোনিয়া ।

(*Collinsonia*)

বস্তি-গহ্বরে (pelvis) ও যকৃতের শিরায় রক্ত সঞ্চয় জনিত রক্তক্লচ্ছ ও অর্শ ।

অর্শসহ বস্তি-গহ্বরের যজ্ঞে রক্ত সঞ্চয়, বিশেষতঃ গর্ভের শেষ কয়েক মাসে ।
হৃদ্রোগজনিত শোথ ।

অর্শ ও অগ্নি মান্দ্যগ্রাস্ত ব্যক্তিদিগের হৃৎকল্প হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার প্রতি-
নিয়ত ক্রততা অথচ দুর্বলত

পুরাতন যাতনাসংযুক্ত, রক্তস্রাবী অর্শ ; সরসাজে যেন কাষ্ঠ-খণ্ড,
বালুকা অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর রাহিয়াছে একপ অমুভব (ইন্ডিউ)

অর্শজনিত সক্ষুন্ন রক্তাতিসার

পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠ-রোধ ও অতিসার ; রক্তসঞ্চয় জনিত নিম্নাজের নিষ্ক্রিয়তা ;
ধীরে ধীরে নির্গত কঠিন মল তৎসহ বেদনা ও অতিশয় আধ্বান (flatulence)

গর্ভাবস্থায় অর্শসহকারে জননেদ্রিয়ের কণ্ডুয়ন ; শয়ন করিতে অসামর্থ্য

উপচয় —যৎসামান্য মনোভাবে বা মানসিক উত্তেজনায় রোগ-
লক্ষণের বৃদ্ধি (আর্জ-ন)

সম্বন্ধ ।—(১) অর্শসংস্থষ্ট হৃদ্রোগে ক্যাট্ট, ডিজি, ও অন্যান্য ঔষধ বিফল
হইলে কোলিনমোনিয়া ব্যবস্থেয় হয় কিনা দেখা উচিত (২) কলো ও
নক্স বিফল হইলে কোলিন উদর-বেদনা (colic) আরোগ্য করিয়াছে ।
(৩) কোলিনের সহিত, ইন্ডিউ, এলো, ক্যাথ, নক্স, ও মলফের তুলনা হয়

ক্যাক্টাস গ্রাণ্ডিফ্লোরাস ।

(*Cactus Grandiflorus*)

রক্ত প্রধান ব্যক্তিদিগের রক্ত সঞ্চয় (একন) অনেক সময় সেই রক্ত-সঞ্চয়
হইতে রক্তস্রাব ; রক্ত-জনিত সম্যাস

মুত্ৰা-ভয়, বোম্ব হুগাংগাং ন এম বোম্বোর বিখ্যাত (৮১)

নাসিকা, ফুফুস আদিতে, মলমূত্র ও মুত্রাশয় হঠাৎ রক্তাশয় (বেগি, মিলি, ফস)।

মস্তকের মধ্যস্থানে অস্বাভাবিক পাচনোন্নতির স্থান শিরঃপীড়া (এ চাপনে উপস্থিত, যেমি); রক্তাশয়-কালের শিরোবেদনা (গা, ম্যাক)

রক্ত-সঞ্চয় অন্ত্র ও নিম্ন রক্ত সময়ে উপস্থিত। দাঁড়ান পাতের শিরঃপীড়া ও শ্বাস-শূল; তাই দাঁড়ান কর, ও স্পন্দন এর বেগে

সমগ্র দেহ পিঞ্জর-বন্ধবৎ বোধ হয়, পিঞ্জরের প্রত্যেকটি
তার যেন কাঁচের মোচড়ান হয়

গল-মধ্য, বক্ষঃস্থল, হৃৎপিণ্ড, মূত্রাশয়, মলমূত্র, ও যোনির
আকুঞ্চন; সাধারণতঃ ঘৎসামান্য সংস্পর্শে উহার উৎপত্তি বা উদ্বেগ।

শ্বাস-প্রশ্বাস অন্ত্র চাপের স্থায় বক্ষঃস্থলে চাপাশূল্য। বোধ হয় যেন লোহার
ফিতার বন্ধনে উহার আভ্যন্তরিক সঞ্চালনের ব্যাঘাত ঘটিতেছে।

বক্ষঃস্থলের নিম্নাংশের চারিদিকে যেন দুচাপে এক গাছি বন্ধ বন্ধ বন্ধিরাছে
একটি অশূল্য, ভায়াত্রামের স্থাপন অবস্থিত।

লৌহ নির্মিত হস্তে যেন হৃৎপিণ্ড শীঘ্র শীঘ্র একবার ধৃত
একবার বিমুক্ত হইতেছে এপ্রকার অশূল্য; স্পন্দনের স্থানান্তর
একটি অবস্থিত।

মকল স্থানেই বেদনা; তাড়িত শূল্যের স্থায় উৎসর্গণ ও উৎসর্গন এবং
স্বতন্ত্র আকুঞ্চনে; রিসমার্শি, তৎপরে পুনরায় উপস্থিত।

শয়ন-কালে রক্ত-প্রবাহের বিরতি (বেগি, ফস)

হৃৎকম্প — দিনরাত্রি, হাঁটবার সময় ও খামলাখে শয়নে (ম্যাক); এবং
শ্বাস-কালের নৈকট্যে, বৃদ্ধি

পূর্বাঙ্ক ১১টা ও অপরাহ্ন ১১টার সময় জরের আবেশের প্রত্যাবৃতি।

সম্বন্ধ — একন, ডাউ, জেল, ক্যালিমি, ম্যাক, ট্যাংগের সহিত সমস্ত
বন্ধ

ক্যান্নেবিস ইণ্ডিকা ।

(*Cannabis Indica*)

অতিশয় বিস্মৃতি ; মেঘ কথ ও ভাব স্মরণ থাকেনা ; কোন বাক্য
অবিস্মৃত করিয়া যাহা বলিতে হইবে তাহা মনে থাকেনা ; যন্তক্ষে
অজ্ঞান চিন্তা সমবেত হওয়াতে কোন চিন্তা বা ঘটনা পুনঃস্মরণ করিতে পারা
যায় না (এনাক, ল্যাক-কা) ।

অবিরত অনুমিতি (constantly theorizing)

প্রতি সামান্য কথায় অপরিমিত হাস্য

কৌতুক ও অপকার করা, অনন্তর বিলাপ ও ক্রন্দন করা

মৃত্যু সমীপবর্তী হইতেছে বলিয়া অতিশয় আশঙ্কা

মদাত্ম্য (delirium tremens) ; অত্যন্ত বাচাৎকতা ; সময় ও স্থান
অত্যন্ত বাড়াইয়া বলা

সময় অতিশয় দীর্ঘ বোধ হয় (আর্জ-না) , এক বিপদ একযুগের স্থায়
অনুভূত হয়

স্থান অতিশয় দীর্ঘ বোধ হয়, কতিপয় হস্ত কতিপয় কোশলের স্থায় বোধ হয়
করোটি যেন উন্মুক্ত ও অবরুদ্ধ হইতেছে একোকার অনুভব (এটিষ্টিয়া)

মূলাধারে (perineum) অথবা মলদ্বারের নিকট কোন গোলায় উপরে
উপবেশনের স্থায় ক্ষীণতা অনুভব (তৎসহকারে মূত্রে অধিক পরিমাণে রজ্জ্ববৎ
শোষার অবস্থিতি, দিল্ল)

সম্বন্ধ ।—বেশ, হাইও ট্রামোর সহিত তুলনা কর যায় ।

ক্যান্নেবিস স্যাটাইভা ।

(*Cannabis Sativa*)

শরীরের কোন কোন স্থানের উপর অথবা কোন কোন স্থান হইতে, যথা
মস্তকের উপর এবং মলদ্বার, আমাশয় ও স্থলপিণ্ড হইতে যেন বিন্দু বিন্দু জল
পড়িতেছে, এরূপ অনুভব ।

ফুর্সমা কোষ্ঠ-রোধ, তদ্বৎ মূত্র রোধ মূত্রাশয়ের আকৃশন
 মচকিয়া যাওয়ার পর হাতের আঙ্গুলের স্কোচন
 সিঁড়ির উপরে উঠিতে মলকার্ভার (patella) বিচ্যুতি
 খাম কচ্ছ, ন খাম-কাম রোমন রোমীর ফোণ দাঁড়াওয়া দাঁড়াইয়া,
 খাম-ক্রিয়ায় সাহায্য
 গিলিত গলায় বাধা, ও জু স্রবোত বিশদে গতি (ক্রমিক)
 প্রমেহ রোগের তরুণ, পদাহিত অবস্থা (দ্বিতীয় অবস্থা, মূত্রত্যাগান্তে জ্বালা,
 গাঢ়, পীতবর্ণ পুষ্ণবৎ জ্বাণ লক্ষণে, গিউটোন)।
 স্পর্শে বা প্রচাপনে মূত্র-মার্গের তীব্র অশুভবোধিকা, অজ্ঞাবহ না ছড়াইয়া
 হাঁটিতে পারা যায় না, উহাতে ব্রহ্ম-মার্গে আঘাত লাগে
 মূত্র ত্যাগ-কালে জ্বালাকর ও দংশনকর, এবং পশ্চাত্তাগে অধিকতর ভেদনবৎ
 বেদনার মূত্রমার্গের মুখ হইতে পশ্চাত্তিকে হোমার।
 মূত্রমার্গে বরাবর কুটিল গতিতে ভেদনবৎ বেদনা
 সম্বন্ধ। মূত্রমার্গের বিশেষ প্রদাহের অধাবক্তি ও অবস্থায় ক্যাথ, ক্যান্স,
 স্লেজ, পেট্রোসের সহিত সমন্বয় সম্বন্ধ

ক্যান্থেরাইডিস

(Cantharides)

সকল অঙ্গের অভ্যন্তরের ও বাহ্যিকের অতিরিক্ত অশুভুতি
 বেদনা, শরীরের সর্ববংশেই জ্বালা, অদমন ও টাটানি; তৎসহ
 অত্যন্ত দুর্ধ্বলতা
 নাসিকা, মুখ বিষর, অঙ্গ, অনন-যন্ত্র ও মূত্র যন্ত্র হইতে রক্ত-জ্বাণ।
 প্রত্যেক বস্তুতেই বিরক্তি পান, আহার, ও ভোগকে অশুভুতি।
 অল্পমাত্র অশপান করিলেও মূত্রাশয়ের বেদনার বৃদ্ধি।
 অবিরত মূত্র-বেগ, এক এক বার কয়েক বিন্দু মাত্র রক্তমিশ্রিত মূত্র
 নিঃসরণ (সহসা মূত্র-প্রবৃত্তি ও মূত্র মার্গে তীব্র কষ্ট যেন, পেট্রোস)।

মূত্র-ত্যাগের পূর্বে ও পরে এবং মূত্র ত্যাগ-কালে অসহ্য মূত্র-বেগ ;
মূত্রাশয়ের প্রবল বেদনা

মূত্র-ত্যাগ কালে মূত্র-মার্গে জ্বালা ও কর্তনবৎ বেদনা, এবং কুশল
ও মূত্র-কুচ্ছ

মল - শুভ্র বা পাণ্ডুবর্ণ, আরক্ত, দুশ্গন্ধি মল, রক্তের রেখাঙ্কিত, অস্ত্রের
টংচারে ন্যায় পদার্থ বিশিষ্ট মল

স্বপ্নে রক্তাক্ত শুকপাত (লেড, মার্ক, পেট্রে)

সন্তোষ লিপ্সা — স্ত্রী-পুরুষ উভয়েইই সমম-প্রবৃত্তির আতিশয়া উহাতে
নিজার ব্যাঘাত ; অত্যন্ত বেদনাসহকারে উপস্থের প্রচণ্ড উত্তীর্ণ (পিক-
এসি)

বায়ু-পথে (air passages) দুশ্গন্ধি শ্বেতা (বোডি, কালী-বাই)

ত্বক । - ফোফাসংযুক্ত বিসর্প (erysipelae), সকল * রীতে ফোফা এবং
উহাতে যাতনা ও পুষ্ণোৎপত্তি

রৌদ্র লাগাতে এরিথিম (অরুণিয়া)

সকল পকার প্রাদাহিক রোগে জ্বালাকর বেদনা ও অসহ্য মূত্র-বেগ,
ক্যাথেরিসের বিশেষ পয়োগ-০ ফল ।

সম্বন্ধ । — এটি স, তাম, ইকুই, মার্কের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ

অগ্নি-দাহে ফোফা উৎপন্ন হইবার পূর্বে ও যোফা উৎপন্ন হইতে ক্যাথেরিস
ব্যবহার্য্য । যদি চর্ম্ম ছিন্ন না হইয়া থাকে তবে যে কোন ক্রমেণ ঔষধ এক-
কোহলে মিশ্রিত করিয়া জ্বা প্রস্তুত করিয়া লাগাইয়া দিয়া তুলাদিয়া ঢাকিয়া
রাখিলে সমস্ত বেদনার শান্তি জন্মে এবং অনেক সময় ফোফা পড়েনা চর্ম্ম
ছিন্ন হইয়া থাকিলে সূক্ষ্ম বা চোয়ানজাল জ্বা প্রস্তুত করিয়া লাগান উচিত
উভয় স্থলেই সঙ্গে সঙ্গে শক্তীকৃত ঔষধ (ক্রম) আভ্যন্তরিক সেবন করা
বিহিত

ক্যাপ্সিকম ।

(Capsicum)

পাতল চুগ, নীলবর্ণ চুগ, শুইপুটে রক্ত-গদান অথচ ঘায়বান ব্যক্তি

শ্লেষ্মা-প্রধান পাতু ; পাকক্রিয়োৎপাদন শক্তির অভাব (Lack of reactive force) বিশেষতঃ শূলকায়, সহজে জ্বাতি ব্যক্তিদগের ; অলস প্রকৃতি, কোনপ্রকার পরিশ্রমেই প্রবৃত্তি জন্মে না ; পরিহাসাত্মকতা, অথচ সামান্য বিষয়েই কোপের উদ্ভেদ ।

শিশুরা, অনাবৃত বায়ুতে যাইতে চায়না ; সর্বদাই শীত শীত অনুভব করে ; অবিগৃহ্যকারিতা দেখায়, আনাড়ি, মোটা, ময়লা, শিশু, কাজ বা চিন্তা করিতে অপ্রবৃত্তি

একাকী থাকিতে ইচ্ছা . শুইয়া নিদ্রা যাইবার ইচ্ছা । আরক্ত গাও, ও নিজস্বাভিমান অলস ও বিষয়শূন্য ব্যক্তিদগের গৃহ-রোগ (home-sickness) ।

গল-কোষ (fauces) গল-মধ্য ; নাসা-রন্ধ ; বক্ষঃস্থল ; মূত্রাশয় ; মূত্রমার্গ ; ও সরলান্তের আকুঞ্চন ।

গলার মধ্যে ও শরীরের অগ্ৰাচ্ছ অংশে, উত্তাপে অর্জুণশমিত, লক্ষ্যমরীচের ঝালের জ্বালা ও যাতনা অনুভব ।

জ্বালা, যাতনা ; আত্মীয় স্পর্শশেষ ; জ্বালা সংযুক্ত গলার আকুঞ্চন ; প্রদাহিত, মলিন-আরক্ত ও ক্ষীণ তালুশূল বিশিষ্ট তালুশূল-প্রদাহ (tonsillitis) ।

গলাধঃকরণ-ক্রিয়ায় অন্তর্কর্ত্তী সময়ে (ইথে) জ্বালাকর আক্কেপিক আকুঞ্চন ও অগ্ৰাচ্ছ বেদনার আধিক্য ।

কণের পশ্চাত্তাগে বেদনাবিশিষ্ট ক্ষীণতা, উহাতে অত্যন্ত স্পর্শ-শেষ ।

প্রত্যেকবার মল-ত্যাগের পর পিপাসা ও প্রতিবার মল-পানের পর কম্পন ।

অরে, প্রত্যেকবার শীতে পিপাসা, এবং প্রত্যেকবার মলপানে কম্পন ।

যতই শরীরের শীতলতা বৃদ্ধি পায় ততই মেজাজ খারাপ হয় ।

স্বায়বীর আক্কেপিক কাস সহসা কাসের আবেশের উপস্থিতি ; কাসিবার সময় মাথা যেন থণ্ড থণ্ড হইয়া ছুটিয়া যাইবে এমন অনুভব ।

অন্য সময়ে নয়, কিন্তু সন্ধ্যাে কাস বাহির হইবার সময় মুখ হইতে কটু দুর্গন্ধ, একেবারে কতকটা বায়ু নিঃসরণ ।

কাসিলে (মুত্রাশয়, জ্বাৰ, জ্বর, কৰ্ণ প্রভৃতি) দূরবর্তী স্থানে বেদনা

সম্বন্ধ ।—(১) এপিস, বেণ, আই, ক্যালাড, পলসের সহিত ক্যাপ্সের তুলনা হয় (২) সবিরাম জ্বরে ক্যাপ্সের পরে সিনা ভাল খাটে (৩) আকুঞ্চনকর, জ্বল'কর, ও টাট'নে বেদন ধ'র' এপিস ও বেলেডে'ন' হইতে ক্যাপ্সিকমের প্রভেদ হয় ।

ক্যামোমিলা ।

(Chamomilla)

পাতলা-কপিশ কেশ স রবীয়, ও উত্তেজনশীল প্রকৃতির ব্যক্তি, বিশেষতঃ বালক-বালিকা ; এবং কাফি বা মাদক সেবন বা উহার অপব্যবহার বশতঃ অতিরিক্ত অগ্নুভূতিবিশিষ্ট ব্যক্তি ।

নবজাত, ও দন্তোদগমকালীয় শিশু

ক্ষণরাগী, কোপন, যাতনায় অসহিষ্ণু (কফি) ; অশিষ্ট, শিষ্ট উত্তর দানে অসমর্থ, ব্যক্তি

শিশুর অতিশয় কোপনতা, ও বিরক্তিপূর্ণতা ; কেবল কোলে করিয়া বেড়াইলে প্রশান্ততা ; অধীরতা, এজব্যা সেজব্যা চাওয়া, না দিলে রাগ করা, অথবা দিলে বিরক্তচিত্তে গ্রহণ না করা (আই, সিনা, জিয়ো), ক্ষণরাগিতা, পরজোহিতা (spiteful)

শিশু যাহা চায় তাহা না পাইলে সকলকণ বিলাপ ; গুণ্ গুণ্ করিয়া ক্রন্দন ও অস্থিরতা ।

রোগী কাহাকেও কাছে থাকা সহ্য করিতে পারে না, বিরক্ত-চিত্ততা বশতঃ কাহারও কথা তাহার সহ্য হয় না (সিলি) ; সে কথা বলিতে ভালবাসে না, অভদ্রভাবে উত্তর দেয় ।

ক্রোধজনিত অঙ্গুণ, বিশেষতঃ শীত ও জ্বর ।

বেদনা —বেদনা অসহ্য বোধ হয়, শিশু করিয়া তোলে ; উত্তাপে বৃদ্ধি পায় ; ছইঞাহর রাজির পূর্বে সারংকাচে যাড়ে ; বেদনার সহিত উত্তাপ, পপাসা, ও মুচ্ছা থাকে ; আক্রান্ত স্থানে অবশতা অনুভূত হয় ; উল্গারে উপচয় অগ্নে

এক গালের আরক্ততা ও উত্তপ্ততা, অন্য গালের পাতুরতা ও শীতলতা ।

বিমুক্ত বায়ুতে অতিরিক্ত অম্লজ্বতি, বাতাসে, বৈশেষতঃ ক'নে বাতাস লাগিলে, অতিশয় অপ্রবৃতি

উষ্ণ কিছু মুখে লইলে (বিস, বাই, কফ), উষ্ণগৃহে প্রবেশ করিলে, শয্যা শয়ন করিলে ; কফ সেবনে এবং ঋতু অথবা গর্ভকালে ; দন্ত-বেদনা ।

প্রবস-বেদনা —আগ্নোপক, ঘয়ণাওদ বেদনা, উহা হইতে মুক্তি লাভের ইচ্ছা, জজ্বাব নিয় পর্ষাস্ত ছেদনকর বেদনা ; বেদনার উপরের দিকে প্রচাপন ।

অতিসার ।—শীতলতা, ক্রোধ ব বিরক্তিজনিত ; দন্তোদেদ কালে ; তাম্রকূট সেবনের পর ; প্রসূতাবস্থায় ; নিম্নাভিমুখে গতি-মন্ত ; অতিসার

মধুস্বর্ণ, জলবৎ, বিদাহী, খণ্ডিত অণু বা শাকের জ্বার ; উত্তপ্ত, অতি দুর্গন্ধ, পাচা ডিমের স্থায় ; মল ।

স্তন-বৃন্তের প্রদাহ, স্পর্শে উহাতে বেদনা (হেলোন, ফাইটো) ; শিশুর স্তনে স্পর্শ-দেষ ।

স্তন্যদায়িনী স্ত্রীদিগের আপনা আপনি স্তন-দুগ্ধ নিঃসরণ (সস্তানকে দুগ্ধ ছাড়াইবার পরে নিঃসরণ, (কোনা) ।

মাতার ক্রোধাবেশের পর স্তনপান করিয়া শিশুর টকার (দড়কা) (নক্স ।—মাতার ভয়প্রাপ্তির পর, ও'পি) ।

প্রবল বাতের বেদনা বশতঃ রাজিতে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণের আবশ্যকতা (রসটবা) ।

নিজালুতা, কিন্তু নিজা যাইতে পারা যায় না (বেল, কষ্ট, জপি) ।

রাজিতে পদ-তল-দাহ, শয্যার বাহিরে পা বাহির করিয়া রাখিতে হয় (পল, মেড, মলফ) ।

উপচয় ।—উত্তাপে , ক্রোধে ; সায়াহ্নে, মধ্যাহ্নের পূর্বে ; অনাবৃত্ত বায়ুতে , বাতাসে ও উদগারে , বৃদ্ধি

উপশম ।—কোলে চড়িয়া বেড়াইলে ; উপবাসে ; ও উষ্ণ আর্দ্র কালে , হ্রাস

সম্বন্ধ ।—(১) বেলেডোনার সহিত অল্পপূরক সম্বন্ধ । শিশুদিগের রোগে, মস্তিষ্কের স্নায়ুর জটাক্রান্তিতে বেলেডোনা , ও উদরের স্নায়ুর আক্রমণে ক্যামোমিলা উপযোগী (২) শিশুদিগের রোগে ওপিয়ম অথবা মফাইন ব্যবহারে অপকৃত রোগীদিগের পক্ষে, ক্যামো ব্যবস্থেয় । (৩) বেজ, বোর, ব্রাই, কফ, পল, সল, ক্যামোমিলার সমগ্র (৪) মানসিক অস্থিরতা থাকিলে ক্যামোমিলা অব্যবস্থেয় ।

ক্যাম্ফোরা ।

(Camphora.)

বেদনার বিষয় ভাবিলে উহার উপশম (হেচি —বৃদ্ধি, ক্যাঙ্ক-ফস, হেলোন, অক্স-এসি)

শারীরিক ও মানসিক দুঃখলতা ও উপদাহিতা

শীতল বায়ুতে অতিশয় অমুভূতি (হিপ, ক্যাণী-মি, সোার)

উপঘাতপ্রাপ্তির মন্দফল ; শরীরের উপরিভাগের শীতলতা, বদনের পাণ্ডুরতা ও নীলাক্ততা, ওষ্ঠের সীস-বর্ণ ; গভীর অবসাদ (prostration) শরীরের উপরিভাগ, স্পর্শে শীতল, অথচ গাত্র বস্ত্রাবৃত রাখা সহ্য করিতে পারা যায় না । রোগী সমস্ত গাত্রাবরণ ফেলিয়া দেয় (মেডো, সিকেল) ।

যৎসামান্য স্পর্শে সমগ্র শরীরের বেদনাবিধিষ্ট অমুভূতি

জিহ্বার শীতলতা, লোলিততা ও কম্পন

সহসা বমন-বিরেচনের আক্রমণ ; নাসিকার শীতলতা ও সূক্ষ্মতা ; উৎকর্ষ ও অস্থিরতা ; ত্বকু ও শ্বাসের শীতলতা (ভিরে, অ্যাটো)

জলাউঠার প্রণয়নকারী কৌশলস্থায়ী তীব্র (চির)

জীবনীশক্তির আকস্মিক ও সম্যক অবসাদন হইয়া থাকে।
অতিশয় শীতলতা ; রক্তপ্রবাহিত হইতে ও দুঃখ বিষম ভাবে (চির)
অনেক সময় সুপ্রযুক্তা ওষধ, নাড়ীর হ্রাসতা, অত্যন্ত শূন্যতা, ও প্রায়
অপায়িতা

হামে ও কার্ণেটিনায় উদ্ভেদের অক্ষয় ; মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা বা
শীতলতা, অকৃদ্ধিততা, নীল ত্বা ও নিম্নতা (hypertonic)
বালক আবৃত থাকতে চায় না (চিকিৎসা)

হামের সকল প্রকার পরিণাম

উপশম ।—বর্তমান রোগের বিষয় চিন্তা-কালে ; উষ্ণ বায়ুতে
ও শীতল জলপানে ; উপশম ।

সম্বন্ধ ।—(১) ক্যান্ফর দ্বারা প্রায় সকল প্রকার উদ্ভিদ ঔষধের ক্রিয়া
বিনষ্ট হয়, তাহা ক, ও যে সকল ফলে প্রসিক্রমিত আছে তাহার এবং
বিষাক্ত ছত্রক (mushroom) ক্রিয়াও বিনষ্ট হয় (২) রোগীর গৃহে
আদিত ব্যঞ্জন রাখা উচিত নহে ক্যান্ফর-ভোজ, ওষিধ, ভিট্রোল, ও
মিকেলির সাহিত্য ক্যান্ফরের ভুলনা হয় ।

(ডাঃ হোরিং বলেন জাপান ও ক্যান্ফরের পরাম্পর প্রাপ্ত লক্ষণগুলির
যথার্থ জানের উপরে স্থলরূপে কোমিওপ্যাথির ক্রমোন্নতি নির্ভর করে ।
কণ্ঠাভিভাষিতা দেখিবার বিষয়) ।

ক্যালমিয়া ল্যাটিফোলিয়া ।

(*Kalmia Latifolia.*)

তরুণ শাখাগুল, বাত ও গাউট জনিত রোগ, বিশেষতঃ বাত ও গাউট-
পরিণাম স্বরূপ হৃৎপিণ্ডের আক্রান্ততা ।

বাত হইতে উপশম অথবা উহার সহিত সংযোজে উপস্থিত হইবে ।

ভেদন, চাপন, ও চিড়িক মারণের দ্বারা বেদনার নিম্নাভিমুখে সংকরণ (ক্যাট — উর্কটিকে, লিড) ; তৎসকারে বা তৎপরে আক্রান্ত-স্থানের অবশতা (একন, ক্যাম, প্লাট) ।

দক্ষিণ অক্ষিতে ও অক্ষি-গহ্বরে স্তূত্র স্তূচী-বেদনবৎ বেদনা (বাম চক্ষে, স্পিজি) ; পেশীতে শুষ্কতা, ও বেদনা, চক্ষু ঘুরাইলে উহার আধিক্য, স্পিজি) ; সূর্যোদয়ে বেদনার উপস্থিতি, মধ্যাহ্নে বৃদ্ধি ও সূর্যাস্তে বিরতি (ছাট মিউ)

বাত ।—তীব্র বেদনা, সহসা উহার স্থান-পরিবর্তন, সন্ধিতে সন্ধিতে গতি, সন্ধির উত্তপ্ততা, আরক্ততা, ও ক্ষীণতা, অল্পমাত্র সঞ্চালনে আতিশয়া ।

মস্তক অবনত করিলে অথবা নীচের দিকে দৃষ্টি করিলে শিরোঘূর্ণন ।

নাড়ীর ধীরগতি, প্রায় অপ্রাপ্যতা (প্রতি মিনিটে ৩৫ বা ৪০ বার স্পন্দন) ; পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল ও শীতল হস্ত-পদ

সম্বন্ধ—(১) বাত ও গাউট রোগে, লিড, স্পিজি, রোডের সমগুণ
(২) হৃদ্রোগে স্পিজিয়ার ৭ রে ভাল খাটে

ক্যালেনডিয়াম ।

(Caladium)

শব্দে অতিশয় অমুভূতি ; যৎসামান্য শব্দে নিজা হইতে চমকিত হইয়া উঠা (এসার, নক্স, টারেণ্ট) ।

অত্যন্ত বায়ু-নিঃসরণ সহকারে পুনঃপুনঃ উদগার, বোধহয় যেন আশাশয় শুষ্ক ভুক্তজব্যো পূর্ণ রহিয়াছে ।

ধ্বজভঙ্গ —মানসিক অবদান, সন্তোষ-লিপ্তা ও উত্তেজনা সহকারে শিথিলিত শিশ্ন (লাই, সেলে)

আলিঙ্গনেও উপস্থের অমুদ্রেক, সংসর্গকালে কমোদীপনা ও শুক্রপাতের অভাব (ক্যাল, সেলে)

যোনি-কণ্ঠয়ন । তজ্জন্তু কৃত্রিম রমণ-ক্রিয়ার প্রবৃত্তি
(অরিগে ; জিক) ; গর্ভাবস্থায় ; প্রেমাত্মক সহ কণ্ঠয়ন ।

সাযাহের জ্বরে নিদ্রা এবং জ্বর স্ত্রে জাগরণ ।

মিষ্ট ঘর্ষে মক্ষিকাকর্ষণ । (অর্থাৎ খাপ মিষ্টি লোকে বড়ি মাটি আসে)

মশক ও কীটের দংশনে অতিশয় আলা ও কণ্ডুয়ন ।

নড়িতে চড়িতে অপ্রবৃত্তি ; নড়িতে ভয় হয় (ভাই)

ক্যালেন্ডুলমে তামাক খাওয়ার স্পৃহা বিনষ্ট হয়

ক্যালেন্ডুলা ।

(Calendula)

আভিষাতিক (Traumatic) রোগে পুষ্টিওপত্তি ব্যতীত ক্ষত-সংযোজনার্থে ব্যবহৃত ।

কোমলাংশের বিনাশে এড্‌হিসিড গাষ্টার দ্বারা সংযোগ সাধনে অসমর্থতায় প্রযুক্ত ।

ছিন্ন-ভিন্ন অসমান বাহ্যিক সত্ত্বত্রণে (Wounds) এবং শল্যোপচারের পরে, স্বস্থ ক্ষতাকুর উৎপাদন ও অধিক পুষ্টিওপত্তি-নিষারণ এবং ক্ষত চিহ্নের প্রতিষেধার্থে ব্যবহার্য ।

আভিষাতিক ও স্বরত্নত স্নায়ুর অক্ষুদ (Neuroma) (সেপা) ; বিদারিত ক্ষত হইতে স্নায়ুর প্রদাহ (হাইপার) ; রক্ত-নাশ ও অতিশয় বেদনা বশতঃ অবসন্নতা ।

পেশী বা কণ্ডার (Tendons) ভগ্নাবস্থা ; প্রসবকালে বিদারণ ; অস্থির সংযোগস্থল পর্যন্ত সত্ত্বত্রণের সম্প্রবেশ ও মেহময় তরল পদার্থের (Synovial fluids) অপচয় ।

সত্ত্বত্রণ (Wounds) জ্বরের উত্থাপনস্থান আকস্মিক বেদনা সংযুক্ত সত্ত্বত্রণ ; বিসর্পোৎপত্তির শারীরিক প্রকৃতি (সোরি) ; পুরাতন, উপেক্ষিত, দুর্গন্ধ, ক্ষত, গ্যাংগ্রোন জন্মিবার আশঙ্কা (আল-এসি) ।

ক্ষত (Ulcers), উপদাহশীল, প্রদাহিত পাচনপাত (Sigmoid) বিশিষ্ট
নিরা-ক্ষীতি (Varicose) সংযুক্ত আধাতিতবৎ বেদনা বিশিষ্ট ;
ক্ষত (আর্গ) অতিশয় পুষ্-নিঃসরণ

শল্য ক্রিয়ার পৰিষ্কার কর্তনে, ও বিদারিত বাতঘাতে, অধিক পুষ্-নিঃসরণ
নিরাকরণে ক্যালোজুলা প্রায় অমোঘ

সম্বন্ধ ।—(১) হিপার, ও আ গড় স্থান সহিত অনুপূর্ণক সম্বন্ধ (২)
কোমল বিধান-ভঙ্গর বিদারণ ব্যতীত, প্রথম আধাতাদি অনিত শারীরিক
অবস্থা; আর্গিকার সহিত সমগুণ সম্বন্ধ (৩) শল্য প্রদান স্থানের উপঘাতে উপ-
ঘাতের পরিমাণাপেক্ষা বেদনার আধিক্য হাইপারের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ
(৪) অস্থির অসংযোজনে সিফা ও ক্যান্স-ফসের সহিত, (৫) স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র
পেশীর বাত-কণ্টকে (Strains) বা উপঘাতে রস ও রটার সহিত, সমগুণ
সম্বন্ধ। (৬) স্থান-গতি অত্যধিক পুষ্-নিঃসরণ, ও গ্যাংগ্রীণ নিবারণ করে, (৭)
সল-এসি, বেদনা বিশিষ্ট গ্যাংগ্রীণসংযুক্ত সম্ভবণে, রক্তের বিষ-দোষের বাস
(Septic-germs) নষ্ট করে বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। (৮) বাহ্য প্রয়োগে
ক্যালোজুলা 'ক্রম' ও মূল অরিষ্টের স্থায় ক্রিয়া করে, এবং বাহ্য প্রয়োগ-কালে
উহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগও করা যাইতে পারে।

ক্যালেকেরিয়া কার্বনিকা (ক্যালেকেরিয়া অক্সিরায়া) (Caloaoa Carbonia)

শ্বেত-প্রধান ধাতু, সুন্দর রূপ, চন্দ্র মুখাকৃতি, নীলনয়ন, সুন্দর বস; যৌবনকালে স্থলত্ব-প্রবণতা।

সোরা ধাতুর; পাণ্ডুরতা, দুর্বলতা, ভীকতা, বিচরণে সহজে প্রাপ্তি

স্থলত্ব-প্রবণতা, স্থল দেহ।

আরক্ত মুখমণ্ডল ও লোহিত পেশীবিশিষ্ট বায়ক-বলিকা, যাহাদের সহজে
ঘর্ষ নিঃসৃত হয় এবং ঘর্ষে সহজে সর্দি লাগে।

বৃহৎ মস্তক ও বৃহৎ উদর; বিগুক্ত ব্রহ্মারক্ষা ও সেবনীসন্ধি,
(Sutures) কোমল অস্থি, অস্থি অতি দীর্ঘে ধীরে বিকাশ প্রাপ্ত হয়

অস্থির বিশেষতঃ মেরুদণ্ড ও দাঁড়াইয়া বক্রতা প্রাপ্ত ভাগের ক্ষুণ্ণতা ও বিকলতা, অস্বাভাবিকরূপে অস্থির বিকলতা

নিদ্রাকালে মস্তকে প্রভূত ঘর্ষ, উহাতে মাথার চারি দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত বালিশ ভিজিয়া যায় (গিলি, স্থানি)।

প্রধানতঃ মস্তকের পশ্চাভাগে ও ঘাড়, অথবা বক্ষঃস্থলে ও শরীরের উর্দ্ধাংশে প্রভূত ঘর্ষ (গিলি)।

ক্যালকেরিয়া স্তাপন বিশেষ নিরোধক, ও বিমুক্ত ব্রহ্মরক্ষুসহ আশ্রমে ও বিলম্বে দস্তোদগম

রোগ বা আরোগ্যোন্মুখকালে, অণ্ডাহারের অতিশয় স্পৃহা, অপাচ্য জ্বাভোজনের আকাঙ্ক্ষা (এলম), মাংসে অপ্রবৃত্তি

পরিপাক-পথের অম্ল — অম্ল উদগার, অম্ল বমন, অম্ল মল ; সমস্ত শরীরের অম্ল গন্ধ (চিপ, রিউম)

মাংসলা, বক্ত-প্রধানা, এবং শীত্ৰ শীত্ৰ বর্দ্ধনশীলা, বাণিকা।

অতিশয় শীত্ৰ শীত্ৰ, অধিক পরিমাণ, ও অধিককাল স্থায়ী, ক্ষত ; তৎপরে ব্রহ্মরক্ষ বা রক্ষোনিরোপ সহকারে ক্রোরোগিস ও এমেনোরিয়া।

নাড়ী — অতি শীত্ৰ শীত্ৰ, অত্যন্ত অধিক পরিমাণ রক্ত-প্রাব ; শীতল আর্দ্র মৌজায়া, পা থাকার স্থায় পায়ের শীতলতা ও আর্দ্রতা ; এবং শব্দায় ক্রমাগত শীতলতা

অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনায়, প্রভূত রক্ত-প্রবাহের প্রত্যাবৃত্তি (মল টিউব)।

রোগিণী আশঙ্কা করে যে তাহার বুদ্ধিব্রহ্ম জন্মিবে অথবা লোকে তাহার মানসিক বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাইবে (এন্টিয়া)

দীর্ঘ, ক্ষীণ, প্রত্য বর্দ্ধনশীল যুবকদিগের ফুসফুসের রোগ ; দক্ষিণ ফুসফুসের উপরের তৃতীয়াংশের আক্রান্ততা (আস'।—বাম ফুসফুসের উপরের তৃতীয়াংশ, মাইরি, মলফ) ; দাতুগত রোগে অনেক সময় ফুসফুস অপেক্ষা ক্যালকেরিয়া অধিকতর উপযোগী (টিউবের সহিত তুলনা করুন)

অসম্যক পরিপোষণ ; ও অসম্পূর্ণ অস্থি নির্মাণ জনিত রোগ ;

হাঁটিতে বা দাঁড়াইতে শিথিলে কষ্ট, শিশুদিগের হাঁটিতে প্রযুক্তি হয় না এবং চেষ্টাও করিতে চায় না ; ঘর্ষ বিলোপ

ঘর্ষবশতঃ পদতলের অবদারণ (গ্রাফ, সেনি) ; ফোকা ও দুর্গন্ধি পাদ-ঘর্ষ (গৃহে থাকিলে) বিমুক্ত বায়ু সেবনের আকাজকা, উহাতে উৎসাহ, উৎকার ও বল অনায় (পল, মল) ।

শীতলতা ।—সর্বাঙ্গীন শীতলতা ; একাঙ্গীন শীতলতা (কালী বাই) ; মস্তক, আমাশয়, উদর, পদদ্বয় ও অঙ্গদ্বয়ের শীতলতা, বিমুক্ত বায়ুতে অপ্রযুক্তি, উহা যেন গায় বিদ্রোহ ; শীতল আর্দ্র বায়ুতে অল্পভাবিক্য , প্রায়ই শর্দি লাগে (মলকারের বিপরীত)

ঘর্ষ —একাঙ্গীন ঘর্ষ ; মস্তক, ও মস্তকের কেশাবৃত ভাগ আদি ও শীতল , গ্রীবা-পৃষ্ঠ ; বক্ষঃস্থল ; কক্ষতল (ampil) ; জননাধ , এবং হস্ত ও পদদ্বয়ের ঘর্ষ (সিপি)

আমাশয়-গহ্বর বিপর্যাস্ত রেকাবেবর ছায় ক্ষীত, চাপ দিলে উহাতে বেদনা ।

শীতল ভিক্ষা স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে, অথবা অগ্নে দাঁড়াইয়া কাজ করাতে ; ও শীতল কাদা লইয়া কার্যকারীদিগের ইউরিমিয়া অনিত কিংবা অত্যাচর রোগ কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে সকল প্রকারেই ভাল বোধ ।

কৃত্রিম উপায়ে মল নিঃসারণের আবশ্যকতা (আলো, মেলে, সিপি, সিলি)

বেদনাশূল স্বরভঙ্গ, প্রাতে উহার আদিক্য

আয়স্কাস্ত-শক্তি (magnet sm) গ্রহণের ইচ্ছা (ফস) ।

উপচয় ।—শীতল বায়ুতে ; আর্দ্রকালে ; শীতল স্থানে ; প্রেকালনে (এন্ট-জুড) ; প্রাতে ; ও পূর্ণিমার সময়ে ; বৃষ্টি

উপশম ।—উষ্ণকালে ; ও ব্যক্তি পান্থ্যে শয়নে ; হ্রাস প্রাপ্তি পক্ষম)

সম্বন্ধ ।—(১) বেলেডোনার সহিত অল্পপুরুষক সম্বন্ধ ; বেলেডোনা ক্যালকেরিয়া প্রযুক্ত্য তরুণ অবস্থায় উপযোগী । (২) লাইকো, নক্স ফস, সিলির পূর্বে ক্যালকেরিয়ার ভাল ক্রিয়া দর্শে । (৩) লাই-এসি, পলস, মলফের পরে (বিশেষতঃ কলীনিক প্রসারিত থাকিলে) ক্যালকেরিয়া ; এবং নাসিকার শর্দিতে ক্যালকেরিয়ার পরে কালী-বাই ; ভাল খাটে । (৪) হানিম্যানের মতে লাইট-

এসি ও সলমের পূর্বব ক্যালকোরিয়া ব্যবহৃত হওয়া বিধেয় নহে ;
উচ্চাতে অনাবশ্যক উৎসর্গের উৎপত্তি হয় (৫) কিন্তুদিগের পক্ষে ক্যালকোরিয়া
বারংব ন প্রয়োজিত চরিতে পারে বয়স ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহার পুনঃপুনঃ
প্রয়োগ নাযক বিশেষতঃ হহার প্রথম মাত্রায় উপকার দলিতে পুনঃ প্রয়োগে
অপকার হয়

ক্যালকোরিয়া আর্সেনিকা ।

(Calcareo Arsenica)

অতিশয় মানসিক অবসাদ ।

যৎসামান্য মনোভাবে হৃৎকম্পের উৎপত্তি (লিথিকা)

মস্তকে ও বাম বগে রক্তের প্রাধান (এসিল, গ্রন)

হৃৎকপাটের পীড়া বসন্তঃ অপস্মার রোগ

মস্তপায়াদিগের মস্তপান প্রতিযোগে অস্থখ ; মদিরাপানের আকাঙ্ক্ষা (এসার,
সল-এসি) ।

রক্তোনিবৃত্তিকাল সমীপবর্তী হইবার সময় জ্বলাদিগের অস্থখ ।

সম্বন্ধ ।—(১) কোনা, গ্রন, লিথিকা, পলস, নলের সহিত সমগুণ

সম্বন্ধ (২) লমিকা-প্রধান (lymphatic) দাতু, সোরা-দাতু, ও গুটিকা-
দাতুতে (tuberculous) কোনারসের পর ভাল খাটে

ক্যালকোরিয়া ফস্ফরিকা ।

(Calcareo Phosphorica)

নীরক্ত ও ময়লা গুণাকৃতি, কাল চুল ও চক্ষু ; স্থূল নহে কিন্তু স্নায় দেহ বিশিষ্ট
ব্যক্তিদিগের পক্ষে ; এই ঔষধ উপযোগী

গওমালা দাতু-দুই বালক-বালিকাদিগের প্রথম ও দ্বিতীয়বার দন্তোদ্ভবকালে ;
অতিসার ও অতিশয় আশ্বাস

শিশুর শীর্ণতা, দাঁড়াইতে অসমর্থতা ; ইটিতে শিথিতে বিলম্ব
(কাল, সিলি) ; নিমগ্ন, লোলিত উদর

শিশুর নাভী হইতে রক্তাক্ত তরল পদার্থ নির্গত (মূত্র অগ্ন, হাইড্র)

রেকাইটিস —করোটির অস্থি, সূক্ষ্মতা ও ভঙ্গপ্রবণতা ; ব্র্যাক্চি
ও সেবনী-সন্ধির অনেকদিন পর্য্যন্ত অসংযোজন, অথবা
রুদ্ধতা ও পুনরায় বিমুক্ততা ; বিলম্বিত কিংবা উপসর্গ-সম্বিত
দস্তোভেদ ।

পৃষ্ঠবংশের চূর্ণলতা, বিশেষতঃ বামদিকে বক্রতার প্রবণতা ; শরীর ধারণে
অসমর্থতা ; ঘাড়ের চূর্ণলতা, মস্তক ধারণে অক্ষমতা (এলো) ।

যৌবনাগমে কুমারীদিগের দীর্ঘতা, ও সত্তর পুষ্টি প্রাপ্তি ; অস্থি কোমলতা
বা মেরুদণ্ডের বক্রতা-প্রবণতা

যৌবনাগমে নীরক্ত কুমারীদিগের বয়ঃপ্রণ, তৎসহ মূৰ্দ্ধাদেশে শিরঃপীড়া ও
অগ্নান সংযুক্ত অগ্নিমান্দ্য, আহারে উহার উপশম

শোক বা হতাশ-প্রেমজনিত অম্লত্ব (অর, ইগে, ফস-এসি) ।

রোগের কথা ভাবিলে উহার আধিক্য অনুভব (হেলেন, অক্স-এসি) ।

অনৈচ্ছিক দীর্ঘনিশ্বাস ভাগ (ইগে)

অস্থির অসংযোজন ; এতদ্বারা নূতন অস্থিনির্মাণকর পদার্থের বিবর্তন
উৎপন্ন হয় ।

শীতকালের বাত ; বসন্তকালে উহা ভাল হয় এবং শরৎকালে পুনরায়
উপস্থিত হইয়া থাকে ।

বিচ্ছালনের বালিকাদিগের শিরঃপীড়া (ল্যাট-মি, সোরি), অভিসার

প্রত্যেকবার আহারের চেষ্টায়, উদরে বেদনা ।

ভগ্নদ্বার (fistula in ano) সহিত পর্যায়ক্রমে বক্রোন্মুল (বার্ক) ;
শারীরিক উত্তাপের অভাব ; শীতল ঘর্ম ও সর্কশরীরের শীতলতা ।

উপচয় ।—আর্জ, শীতল, পরিবর্তনশীল কালে ; পূর্বাধিকের বাতাসে,
দ্রবীভূত বরফে ; ও মানসিক পরিশ্রমে ; বৃদ্ধি ।

উপশম ।—গ্রীষ্মকালে ; ও উষ্ণ, শুষ্ক বায়ুতে ; হাস ।

সম্বন্ধ ।—(১) কাফো-এন, ক্যাশ ফ্লোর, কাফ, ফ্লোর-এস, ও কাণী ফসের সহিত এই ঔষধের সমগুণ সম্বন্ধ ; তদ্বৎ রোগের পরবর্তী ক্ষয়তায় সোরিগমের সহিত সমগুণ মিগিস্মিয়ারও সমগুণ বটে, কিন্তু ইহাতে যন্তকের ঘন-লক্ষণ নাই (২) ক্রটোর সহিত অল্পপূরক সম্বন্ধ (৩) আইওড, সোরি, সেনি, সলফের পূর্বে, এবং আস, আইওড, টিউবের পরে ; এই ঔষধের সকলোৎকৃষ্টে ক্রিয়া দর্শে ।

ক্রিয়োজোটিংম ।

(Kreosotum)

মলিনবর্ণ মুখাকৃতি, অসম্যক বিকসিত, ক্রীঃ কুণোষিত, অতিরিক্ত বর্দ্ধিত; বয়ঃক্রম অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘ রোগিনী (ফস)

বৃদ্ধবৎ দৃষ্ট, কুঞ্চিত মুখাকৃতি (এত্রো) ; গণ্ডমাণাগ্রস্ত বা ‘সোরা-দোষ’-দৃষ্ট ; ক্ষত শীর্ণতা প্রাপ্ত (আইওড) বালকবালিকা ; ও নিবৃত্তরজস্কা নারীদিগের রোগ (ল্যাক) ।

রক্তপ্রাব-প্রবণ শারীরিক প্রকৃত ; শূজ শূজ অভিঘাত হইতে বিমুক্তভাবে রক্তপাত (ক্রোট, ল্যাক, ফস) ; নাগিকার-রক্ত-পাতে, খুসখুসের রক্তপ্রাবে, ও রক্তমুখে অপ্রবণ প্রবাহ ; টাইফয়েড্ জ্বরে রক্তপ্রাবের পর অতিশয় অবসন্নতা ; দন্ত উন্নয়নের পর মলিন রক্তস্ফরণ (বেমে)

ঋতুর পূর্বে ও ঋতু-কালে কর্ণে গর্জ্জন ও গুণ্ গুণ্ ধ্বনি ।

শৈথিল্য বিস্তীর্ণ হইতে বিদাহী, দুর্গন্ধ, রসানী প্রাব ; জীবনীশক্তির অতিশয় অবসাদ ।

সন্ধ্যার প্রাকালে এককাল প্রবল কণ্ঠ্যন যে উহাতে রোগীকে ক্ষিপ্তবৎ করিয়া তোলে (উন্ডেন-পরিশৃষ্ঠ কণ্ঠ্যন, ডলিকোস)

দন্তোদগমে যাতনা ; দাঁত উঠিয়াই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে ; নীলাভ কারক, কোমল, সাস্তর (Spongy), রক্তপ্রাবী, প্রদাহিত, ক্ষতসংযুক্ত দন্ত-মূল

বমন—গর্ভাবস্থ য় লালসা এবং সহকারে জীষৎ মিষ্ট ভজ বমন , পলাউঠার বমন , দন্তোদগম-কালে বমন , অতিদুর্গন্ধ মৎস্যাব সহকারে প্রাতিনিয়ত বমন , আমাশয়ের দূষিত রোগে বমন

ঋতুর পূর্বে ও ঋতুকালে উগ্র শিরোবেদনা (সিপি)

ঋতু ।—নিয়মিত সময়ের অতিবিক্ত পূর্বে প্রভূত পরিমাণে দার্দ্র্যকামস্থায়ী ঋতু , ঋতুকালে বেদনা, ঋতুর পরে উহার আতিশয্য শয়ন করিলে ঋতু প্রবাহিত হয়, বসিগে বা হাঁটিলে উহার গিরতি জন্মে , পীড় পানীয় দ্রব্য পান করিলে ঋতুর বেদনার শান্তি জন্মে ; ঋতুর রক্তের সবিরাম-প্রবাহ, কখন কখন উহা প্রায় স্থগিত থাকে, অনন্তর আবার পতিত হয় (মলফ)

অনিচ্ছায় মূত্র-পাত, কেবল শয়ন করিয়া মুত্রোৎসর্গ করিতে পারা যায় ; পাণ্ডুবর্ণ (pale) প্রভূত মূত্র, মূত্র বেগ, মূত্রা পরিত্যাগ করিয়া না যাইতে না যাইতেই কাপড় নষ্ট হয় (এপিস, পেট্রোস) ; প্রথম নিদ্রাকালে মূত্র স্রাব (সিপি), শিশুকে উহা হইতে মহাজ্ঞ আগরিত করিতে পারা যায় না ।

মূত্র কালে ও তৎপরে জ্বালা ও টাটানি (মলফ) ।

শ্বেতপ্রদর —বিদাহী (acid, corrosive), দুর্গন্ধি স্রাব , ঋতুদ্বয়ের মধ্যবর্তী সময়ে, উহার আতিশয্য (বোভ, বোর), স্রাবে কাঁচা মস্তুর স্রাব গন্ধ ; উহাতে বস্ত্র শ্বেতমাত্রের স্রাব শঙ্ক হয়, ও বস্ত্রে হরিত্রাবণ দাগ লাগে ।

প্রস্রাবান্তিক স্রাব —মলিনবর্ণ, কপিশ মজ মজা, দুর্গন্ধ, বিদাহী স্রাব , এক এক বার প্রায় থামিয়া যায়, আবার নূতন হইয়া উঠে (কোন, মল)

ভগ (Vulva) ও যোনির প্রবল বিদাহী কণ্ডুয়ন ।

উপচয় ।—বিমুক্ত বায়ুতে ; শীত ঋতুতে ; শীতল হইবার সময় ; শীতল জলে গা ধুইলে বা স্নান করিলে ; বিশ্রামে বিশেষতঃ শয়নকালে ; বৃদ্ধি

উপশম ।—সাধারণতঃ উষ্ণতার উপশম

সম্ভব ।—(১) ক্যান্সার ও অন্যান্য দূষিত রোগে ক্রিয়োস্ট্যাটের পার, আর্স, ফস, মলফ, ভাজ খাটে ; (২) কার্বোভেন্সি ও ক্রিয়োস্ট্যাটে প্রতিকূল সম্ভব

ক্রোকঃস মেটাইভঃস ।

(Crocus Sativus).

পুনঃ পুনঃ অনুভূতিব পাববর্জন ; ১২ অত্যন্ত প্রাণহতা
হইতে গভীর নৈরাশ্রে পারগতি (১৫, ১৬)

অত্যন্ত আহলাদ ও প্রাতিপত্তা সকলকেই চুম্বন করিতে
প্রবৃত্তি ; পবক্ষণেই আবার ক্রোধের আবেশ ।

সরীরে যে কোন স্থান হইতে কাল, আঠা ও ঠা, সংযত, রক্তপাত-স্থান
হইতে লম্বা লম্বা কাল দড়ির ন্যায় ঝুলিয়ায়মান
(ইলাপ্পা) রক্ত-প্রাণ

রক্তোনিবৃত্তি-কালে, মণাপকর, স্পন্দনকর, নিয়মিত বাতু-কালের দুই
তিন দিন বিবক্ষিত ; শিরঃপীড়া ; শায়বীয় অথবা ধূম সংশ্লিষ্ট, ও রক্ত-প্রাণ
পূর্ণ, তৎকালে, বা তৎপরে উপস্থিত (লোক, লিপি, চিহ্ন) শিরঃপীড়া

চক্ষু — গৃহ যেন ধূমপূর্ণ ; যেন অস্ত্রপাত কর হইয়াছে, ও চক্ষুর
অক্ষুঃশ্রে (across the eyes) যেন শীতল বাতাস বহিতেছে, একপ
অক্ষুঃশ্রে, চক্ষুর পাতা দৃঢ়রূপে : ক করিলে উপশম প্রাপ্ত

নাসিকার রক্তপাত ; কাল, দুশ্চৈতন্য, রক্তবৎ রক্ত, প্রত্যেক
বিন্দু টানিয়া সূত্রে পরিণত করিতে পারা যায় ; তৎসহ কপালে
বড় বড় শীতল ঘর্ষাবলু (শীতল ঘর্ষ, কিছু পাথর বাতাস প্রাণের ইচ্ছা,
উজ্জল গোহিত রক্তপাত, কারো-ভোজ) , জ্ঞানবিকাশনীয় শিশুদিগের
নাসিকার রক্তপাত (কাল, কস)

কাল রক্তবৎ, সংযত রক্তবৎ রক্ত-রক্ত (অষ্ট)
অসংযত উদর, গর্ভাশয় বাহ্য অথবা সরীরের অস্থি স্থানে যেন ১২
কিছু নড়িতেছে একপ অক্ষুঃশ্রে প্রাণি, পুত্র, মলক) ; তৎসহ বিবক্ষিত ও
প্রাণি

অতিশয় কষ সংযুক্ত কোরিয়া ও হিষ্টেরিয়া একবার গান ও নৃত্যকরা (টারি)
আবার বিয়াদ ও রোষ ।

যতদূর সম্ভব পেশিশ্রমের আফেপিক আকৃষ্টন ও স্পন্দন (এগার, ইয়ে, জিক)

সম্বন্ধ ।—(১) কোকসের পর প্রায় সকল রোগেই নব, পল, বা মল ভাল খাটে (২) রক্ত-সংক্রান্ত রোগে অষ্টিচেগোর সহিত কোকসের তুলনা হয়

কোটন টিগ্লিয়ম ।

(Croton Tiglium)

এতদ্বারা অন্ত-পথের (intestinal tract) সৈমিক বিলম্বী আক্রান্ত হইয়া রক্তের অলীয়াংশ নিঃসৃত হয় ও প্রভূত, অসবৎ অতিমার অগ্নে (ভিরে), এবং সর্ষশরীরে একপ্রকার তরুণ পামার উৎপত্তি হয় (হঃস)

যেন আফেপিক উৎক্ষেপে (Spasmodic jerks) বন্দুকের গোলায় ছায় মবেগে (গ্যাথ), মল নিঃসৃত হয় ; রোগী পান বা আহার করিবামাত্র অথবা আহার করিবার সময়েও মলস্রাব ; হরিজাবর্ণ অসবৎ মল

সতত মল-প্রবৃত্তি অনন্তর সহসা মল নিঃসরণ, মল সরলান্ন হইতে তীরের ছায় ছোট (গ্যাথ, গ্রাট, পড, থুডা)

মল-ত্যাগের পূর্বে অস্ত্রে জলের আন্দোলনের ছায় গতি (মলত্যাগের পূর্বে কুঞ্জন, মলো)

বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তর দিয়া শুন হইতে ক্ষমাস্থি (Scapula) পর্যন্ত আকর্ষণবৎ বেদনা, যতবার শুতান শুন পান করে ততবার একই পার্শ্বে বেদনা উপস্থিত হয় ; শুন-বৃন্তে অতিমার স্পর্শ-বেদ অসুভূত হয় ।

সর্ষশরীরের দারুণ বণ্ডুয়ত, কিন্তু চুলকাইতে পারা যায় না, বেদনা লাগে, কিন্তু আন্তে আন্তে ঘর্ষণ করিলে উপশম অগ্নে ; সর্ষশরীরে পামা (eczema)

জী পুরুষ উভয়েরই জননাঙ্গের নিদাফন কণ্ডুয়ন (হঃস) ; পুরুষের জননাঙ্গে ফুসুড়ির ছায় উদ্ভেদ ; এতই অসুভূতি ও স্পর্শ-বেদ যে চুলকাইতে পারা যায় না

কাস, মাথা ব্যথা ও স্পর্শ করিয়া মোড় একপ্রকার আক্ষিপিক কাসের উপস্থিতি, উহাতে শ্বাসরুদ্ধ হয়, গৃহে হাঁটিয়া বেড়াইতে অথবা জেগারে বসিয়া ঘুমাইতে হয়।

উপচয় — প্রতি সকালনে; পানাস্তে; আহার বা শুন-দান কালে (আর্জ-না, আদ) ; আশ্রয়কালে; ফল ও মিষ্টান্ন আহারে (গাশ্ব) ; এবং অত্যন্ত আহার বা পান গ্রহণে; বৃদ্ধি

সম্বন্ধ।—(১) শিশুদিগের পুরাতন অতিসারে, ফালো-ব্রোম ও ফসের সহিত; শুন-দান কালে শুন-বৃদ্ধ হইতে পৃষ্ঠ পথ্যস্ত বেদনায় সিলিশিয়ার সহিত; ফোটিনের তুলনা হয়।

ক্রোটেলাঃস হরিডম।

(*Crotalus Horridus*)

গণমায়া ধাতু-দৃষ্ট, দুর্বলীভূত, রক্তস্রাব-প্রবণ ভগ্নদেহে; জাইমোটিক রোগকালে (বিষ বিশেষ দ্বারা অন্তর্যৎসেচিত (fermented) হইয়া যে ব্যাক্কক, অব্যাপক বা সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হয় তাহাকে জাইমোটিক রোগ বলে) ; মদিরাপারীদিগের পক্ষে; এবং ক্রান্তকাল অথবা রক্ত ফোটিকের অভিস্রুতায় এষ্ট।) এই ঔষধ উপযোগী হয়

শরীরের পূর্ববর্তী নিস্তেজ অবস্থানিত রোগ; সেপ্টিক, টাইফয়েড অথবা ম্যালেরিয়া অর; মদিরাপারীর পুরাতন ফল; প্রকৃত পতনাবস্থা (Collapse)

সম্যাস; অপারিমিত মদিরাপারী, এবং রক্তস্রাব ও ভগ্ন-দেহ ব্যক্তিদিগের সম্যাসজনিত টঙ্কার।

রক্ত-স্রাবপ্রবণ শারীরিক প্রকৃতি; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও শরীরের প্রত্যেক দ্বার হইতে রক্ত-পাত; রক্ত-বর্ষা।

চক্ষুর শুক্রমণ্ডলের, পীতধর্ণ; কনোনিকায় প্রদাহ (Keratitis), কিংবা কনোনিকা ও উপত্যার (iris) প্রদাহের পর এই ঔষধে দৃষ্টির পরিচ্ছন্নতা ঘণ্টে

হলিমক বা উৎকট পাত্ত; যক্ষৎ অপেক্ষা রক্ত অধিকতর আক্রান্ত।

রক্তস্রাবী পাগুরা, সহসা সকল দ্বার হইতে, এবং ঘর, নথ, ও মাড়ী হইতে রক্তস্রাব হয়।

অস্থির অগ্নিবৎ আরক্ততা, মন্থগতা ও সমতলতা (পাইরো); দারুণ ক্ষীণতা

সাংঘাতিক ডিপথিরিয়া বা ফ্যাল্টিটনা; গলকোষ বা তালুগুণের ক্ষীণতা বা গ্যাংগ্রীণ; শূণ্য চোকগিলিলে বেদনার আধিক্য; বমন বা অতিসারের আক্রমণ

জীবনী-শক্তির অবসন্নতা; নাড়ী প্রায় পাওয়া যায় না; রক্তের বিযাক্ততা (পাইরো)

বমন।—উৎকর্ষা ও দুর্বল নাড়ী সহকারে পৈত্তিক বমন, প্রাতিমােসে ঋতুর পরে বমন, দক্ষিণ পার্শ্বে ব চিৎ হইরা ময়ন করিলে তখনই মলিন, সবুজবর্ণ পদার্থ বমন; পীত-জরের কৃষ্ণবর্ণ বা কফি-চূর্ণের স্থায় বমন

অতিসার; কাল, পাতলা, কফি-চূর্ণের মত মল, দুর্গন্ধ মল; আহার্য ব' পেরজব্যো দুগ্ধ ও ব'ম্প বা ৭ চনজনক জব্যের সংশ্রবে উৎপন্ন অতিসার; পীত-জর, ওলাউঠা, টাইফয়েড, ও টাইফস জরের অতিসার।

সেপ্টিক, বা জাইমোটিক রোগানিতে উৎপন্ন জরের রক্তস্রাব; মলিন, তরল, অসংযত রক্ত

শব্দেরে জনিত অভিঘাত; কীটের হুল-বেধ; গো-বীজে ঢীকা-গ্রহণের ক্ষুফল।

দুর্বলী-ভূত দেহে অমুকর (vicarious) রক্তঃ (ডিম্বি, ফস)।

নিবৃত্ত-রক্তস্রাবের তীব্র তাপাবেশ (flushes of heat) ও সিক্ততাজনক ঘর্ম; শ্রান্তি ও আশাশয়ে শূণ্যতাভূত্ব; মলিন, তরল, দুর্গন্ধ রক্ত বিশিষ্ট, অনেকদিন স্থায়ী জরায়ুর রক্তস্রাব।

জরায়ুর দূষিত রোগ, রক্তস্রাবের সমধিক প্রবণতা, মলিন, তরল, দুর্গন্ধ রক্ত।

সম্বন্ধ।—(১) ইলাপ্স ল্যাক, নাজা, ও পাইরোর সহিত ক্রোটেলাসের জুলনা হয়। (২) ল্যাকেসিসে ব'ক শীতল ও আঠা আঠা ঘর্মাক্ত থাকে; ক্রোটেলাসের ব'ক শীতল ও শুষ্ক থাকে; ইলাপ্স দক্ষিণ কুমকুসের রোগে, কাল রক্ত নিম্নীবনে ব্যবহৃত হয়।

গ্রাফাইটিস।

(Graphites)

যে সকল নারীদিগের শূলভ-প্রবণতা, অভ্যন্ত কোষ্ঠরুদ্ধতা ; এবং বিলম্বিত ঋতু থাকে তাহাদেৱ পক্ষে গ্রাফাইটিস উপযোগী।

প্রাপ্ত-যৌবনাদিগের পক্ষে পলসেটিলার বেক্রপ অধিকার নিবৃত্ত-রক্তাদিগের পক্ষে গ্রাফাইটিসের সেইরূপ অধিকার।

অতিশয় গতর্কতা, ভীকতা, ইতস্ততঃতা ; কোন বিষয় স্থির-নিশ্চয় করিতে অসমর্থতা।

কার্য্য করিতে বসিয়া অস্থিরতা (জিহ্ব)

বিমর্ষতা, হতাশতা ; গীত-বাদ্যে অশ্রোত্ৰাব ; মৃত্যু-চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা না করা (গীত-বাদ্যে অসম্বতা, ছাট-কা, শ্রাব)

অগ্নি-পুটের গা মা ; আর্জ ও বিদারিত উদ্ভেদ, অগ্নি-পুটের আরক্ততা ও উহার পাক্ষদেশে শঙ্ক বা চিপটিকা (crusts)।

সঙ্গমেস্ত্রিয়ার অপব্যবহার বশতঃ উহার দৌর্ব্বল্য।

অতিরিক্ত শূল, পাণ্ডুবর্ণ, প্রবল উদর-বেদনা সংযুক্ত বিলম্বিত ; ও পদযম আক্রমণে বিলম্বিত (পলস) ; ঋতু

ঋতু-কালে প্রাতঃকালীন বিবসিমা , অতিশয় দ্বর্ধলতা ও অবসন্নতা (এলম, কার্কি-এন, কক)।

বিদাহী, অঙ্গের অবদারণকর ; দিবসে ও রাত্রিতে দমকে দমকে নির্গত ; এবং ঋতুর পূর্বে ও পরে উপস্থিত (পূর্বে মিপি, পরে ক্রিয়ো) ; খেতপ্রদর।

স্তন-ত্রণের পর অবশিষ্ট শক্ত ক্ষত-চিহ্ন, তজ্জন্ম স্তন-স্থূলের প্রবাহের প্রতি-বন্ধকতা ; পুরাতন ক্ষত-চিহ্ন ও পুনঃ পুনঃ ত্রণের উৎপত্তি হইতে স্তনের ককটিকা (cancer)।

থকের অসুস্থতা ; প্রতি উপঘাতেই পুয়োৎপন্ন হয় (হিপার) ; পুরাতন ক্ষত-চিহ্ন পুনরায় কাঁচা হইয়া উঠে। কাণের উপরে উদ্ভেদ ; হাতের আঙ্গুল ও পায়ের আঙ্গুলের ব্যবধান স্থানে এবং শরীরের নানাস্থানে উদ্ভেদ,

এবং এই সকল উদ্বেদ হইতে একপ্রকার জলবৎ, ফট্ট, আঠা আঠা বস
ধারণ ।

নখের ভঙ্গুরতা ও বিকৃতিপ্রাপ্তি (এণ্ট-জুড) ; যেন ক্ষত হইয়াছে একপ্র
বেদনা, স্থূলতা ও খঞ্জতা ।

মস্তকের শিখর-দেশের উপরিভাগে জালাকর গোষ্ঠাকার ক্ষুজস্থান (ক্যান্থ,
সলফ — শীতল স্থান, মিপি, ভিরে)

শিলাদ-বায়ু রোগের (catalepsy) লায় অবস্থা ; চৈতন্তের বিজ্ঞমানতা,
অথচ নড়িতে চড়িতে বা কথাবলিতে অক্ষমতা ।

সহজে শক্তি লাগে ; বায়ু-প্রবাহে অমুত্তবাহিক্য (বোর, ক্যান, হিপ, নক)
রোগের শীর্ণতাপ্রাপ্তি

গোলমাটুল ভাল শুনিতে পাওয়া যায় ; ঘোড়ার গাড়ীতে বা
রেলের গাড়ীতে, এবং গুড় গুড় শব্দ কালেও ভাল শুনা যায় (নাই-এসি) ।

অতিশয় — কপিশ, তরল, অক্ষীর্ণ পদার্থ বিমিশ্রিত, ও অসহ্য দুর্গন্ধ মল ;
প্রায়ঃ উদ্বেদ-বিলোপ-বসন্তঃ উহার উৎপত্তি (মোরি) ।

পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধতা ; আশ্রমে নিঃসারিত বৃহৎ শক্তি, গ্রন্থিল, প্লেয়ার ক্ষুজদ্বারা
সংযোজিত দলদল ; অতিরিক্ত বৃহৎ (সলফ) মল ; মলভ্যাগান্তে মলদ্বারের
টাটানি ও বেদনা ।

নিলাজ, বিরক্তি কর, তিরস্কারে হাতকর কালক ।

কপালে মাকড়সার জালের স্থতা থাকার লায় অমুত্তব, উহা দূর করিয়া
ফেলিবার অতিশয় চেষ্টা (বোরা, ব্যাঙ্গা, ব্রোম, রাণ-ক)

ফ্রেগমোনস এরিসিপেলাস । জালা ও হুল-বেধনবৎ বেদনা সংযুক্ত, মুখ-
মণ্ডলের বিসর্প ; দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বাম দিকে গতি ; আইওডিন
প্রয়োগের পর

জী-পুরুষ উভঃ জাতিরই রক্ত-ক্রিয়ায় নিশ্চিত অপ্রবৃতি ।

উপচয় । — বাজিতে, ঋতু-কালে ও ঋতুর পরে বৃদ্ধি

সম্বন্ধ । — (১) কষ্ট, হিপ, ও লাইকোর সহিত অল্পপুরুষ সম্বন্ধ । (২)
লাই, ও পলের পরে গ্রাফ ভাল খাটে ; যুবতীদিগের মেদ-রোজা (obesity)
ক্যালকেরিয়ার পরে ইহ উপযোগী হয় ; চর্ম-রোগে, সলফারের পরে ; এবং দমকে

দমকে প্রাণ প্রাণে মিলিয়ায় যে স্থানর কাঁধ করে (৩) ধাতু বোঝে
প্রাণ, ধাই ও পনের সমস্ত

গ্লোনয়েন ।

(Glonoine)

স্বাস্থ্যের দাতু ; রক্ত-প্রাণ ন, আভ্যন্তরীণ অম্লভূতিবিশিষ্ট জী-লোক ; ২৫৫
আক্রান্ত হয় এরূপ ব্যক্তি

মানসিক উত্তেজনা ভয়প্রাপ্ত ভীতি, উৎসাহ প্রাপ্তি ও উহার গৌণ ফল
জনিত অপকার ; চুল-ছাটার মত ফল (একন, ৬৭৮)

প্যাসের আলোতে কাজ করাতে, ও মস্তকে উত্তাপ পতিত হওয়াতে
মস্তকের উপদ্রব ; মস্তকে উত্তাপ-লাগা মহা হয় না, চুল্লীর উত্তাপে অথবা
রৌদ্রে ইঁটিলে অল্প করে (ল্যাক, স্টাট-কা)

মস্তকের রক্ত-সঞ্চয়, অথবা পর্যায়ক্রমে মস্তক ও কৃৎপিণ্ডের রক্ত-সঞ্চয়
মস্তক অত্যন্ত বড় বোধ হয় ; যেন মস্তক অপেক্ষা কেরাটী (skull) ছোট
একপ্রকার অল্পভূত হয় ; অক্ষাঘাত ও সূর্য্যাবর্ত শিরঃপাণ্ডা (Sun
stroke and Sun-headache) ; শরীরে ক্রাস-বৃদ্ধির সহিত উহার ক্রাস-বৃদ্ধি
(ক্যাল, স্টাট-কা) ।

নাড়ীর স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে মস্তকে ভয়ঙ্কর ধাবা লাগে । দপদপকর ও
স্পন্দনকর শিরঃপাণ্ডা ; দুই হাত দিয়া মাথা ধরিয়া রাখিতে হয় , শয়ন করিতে
পারা যায় না, মাথায় বাঁশের যেন আঘাত লাগে

মস্তক অতিরিক্ত বৃহৎ, পূর্ণ ও ফাটিয়া পড়ার ন্যায় অনুভূত হয় ;
রক্ত উপরের দিকে উত্তোলিত হয় , প্রতি পদ-বিক্ষেপে, নাড়ীর স্পন্দনে
ও সংঘর্ষনে মস্তক দপদপ করে ।

বিশিষ্ট বা বিশুদ্ধ ধাতু বস্তুঃ মস্তকের তীব্র রক্ত-সঞ্চয় ; ধাতুর
পরিবর্তে শিরঃ-পাণ্ডা ।

অস্বাভাবিক রক্ত-প্রাণের পর শিরঃপাণ্ডা ; গর্ভবতী জন্মের মস্তকে
বন্ধের প্রধাবন ।

ক্যারটিড ধমনীর দ্বা দ্বা সহকারে আবণ ধ্বংসনা ; ধ্বংসিতের জিয়া জিয়া
সিত ও গৌরবাবিত (laboured & oppressed) রক্ত ধ্বংসিত, এবং তথা
হইতে ক্রতবেগে মস্তকে প্রধাবিত হয় বলিয়া নোদ হয়

মস্তিষ্কের রক্ত-সঞ্চয় ২২ তঃ শিশুদিগের টিকা-রোগ (মড়কা), দস্তোয়েম-
 কালে মস্তিষ্ক-ঝিল্লির প্রদাহ (meningitis), কিন্তু রোগী দেখিয়া বেলেডোন
 উপযোগী বলিয়া বোধ হয়

ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ କରନ୍ତାର ଆଶ୍ୱିନେର ନିକଟ ବାଗିଚେ ଅଥବା ସେଥାନେ ସୁମାହିଆ ମଝିଲେ
ବାଳକ-ବାଳିକାନିଗେର ମୀଢ଼ା ଖନ୍ଦେ ।

নিবৃত্ত রক্তস্রাবের তাপাবেশ (flushes of heat) (এমিল, বেগ, লালক);
রক্তস্রাবের তাপাবেশ (ঘির, স্রাব)

উপচয়—সূর্য্যোত্তাপে, রৌদ্র-ভোগে ; গ্যাগের আঘাতে ;
অতিরিক্ত উত্তাপ গ্রহণে ; সংঘর্ষণে, অবশীর্ষ হইলে, উর্দ্ধে আরোহণে, টুপির
স্পর্শে, ও কেশাচ্ছেদনে ; বৃদ্ধি ।

সম্বন্ধ—(১) এমিল, বেল, ফির, জেল, মেসিঞ্জ, ষ্টামোর সহিত গনের
সম্বন্ধ সন্ধ্যা ।

চায়না বা সিল্কোনা ।

(China—Cinchona)

বলবান, শ্রামবর্ণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে ; ও পূর্বে সবল, পরে দৌর্বল্যকর
 আবাদি নিঃসরণ বশতঃ দুর্বলীভূত ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী ।

ওদাস্য, বৈরাগ্য, নীরবতা (ফগ-এমি), নিরাশতা, বিমর্ষতা, বাচিয়া থাকিতে অনিচ্ছা, কিন্তু আত্মহত্যা করিবার সাহসের অভাব।

শরীরের তরল বিধানের অপচয় (loss of vital fluids),
বিশেষতঃ রক্তস্রাব, এবং অতিরিক্ত স্তন্য-দান, অতিসার,
পুষ্টি স্রাব (চিনি-মল) হইতে উৎপন্ন ; অপর, খ্যাণেরিয়া-সম্প্রদ নির্দ্ধারিত
 সময়ে প্রত্যাগত, একদিন পর এক দিন উপনীত : রোগ ।

প্রভূত রক্তস্রাব-বিশিষ্টা নিম্ন-রক্তকাদিগের রোগ ; উরু-রোগের শে থে পরিণতি ।

বেদনা — চিড়িকমারা অথবা ট নিম্ন-ছিড়িম ফেলার মত বেদন , প্রতি সন্ধিস্থানে, সকল অস্থিতে ; এ অস্থি-বেষ্টে (periosteum) বেদন , তজ্জন্ত ঘন ঘন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিতে হয়, কেনন সঞ্চালনে উপশম জন্মে (ইউপ, রস), স্পর্শে বেদনা প্রত্যাবৃত্ত হয় এবং অনন্তর একে ক্রমে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় ; যৎসামান্য স্পর্শে বাড়ে, শক্ত চাপ দিলে কম পড়ে

অতিশয় দুর্বলতা, শারীরিক শ্রমে অপ্রবৃত্তি, স্নায়বায়তা ; স্পর্শে অনুভূতি, বেদনায়, ও বায়ু-প্রবাহে অতিরিক্ত অনুভূতি ; সমগ্র স্নায়ু-মণ্ডলের অত্যন্ত অনুভূতি অতৃপ্তির নিদ্রা, অথবা অবিরত নিদ্রা, স্নান তিনটার পরে উহার বৃদ্ধি ; প্রত্যয়ে জাগরণ

এক হাতের বরফের স্নায় শীতলতা, অথ হাতের উষ্ণতা (ডিজি, ইপি, পলস)

শিরঃস্ফীড়া—বোধ হয় যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে ; মস্তকের ও গ্রীবার বৃহৎ ধমনীধরের তীব্র দপ দপ ; বদনের প্রদীপ্ততা ; মস্তকের পৃষ্ঠভাগ হইতে সমগ্র মস্তকের উপর বেদনা ; বসিয়া অথবা শুইয়া থাকিলে বাড়ে, তখন দাঁড়াইতে বা হাঁটিতে হয় ; রক্তস্রাবের পরে বা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবার পরে উহার উৎপত্তি ।

মুখ-মণ্ডলের পাণ্ডুরতা, নিমগ্নতা ও আকুঞ্চিততা, চক্ষু নিমগ্ন ও নীলবর্ণ প্রাপ্ত হারা পরিবেষ্টিত ; অমিতাচারের পরবর্তী মুখাকৃতির স্নায় পাণ্ডুর ও রুগ্ন মুখাকৃতি ; সন্ধানকে শুদ্ধদান কালে দন্ত-বেদনা

আমাশয় ও অস্ত্রের অতিশয় আধান, উদগারে উপশম জন্মে না (লাই, পডো)—উদগারে উপশম, কার্ব-ভেজি) ; ফল আহ্বারের পরে বৃদ্ধি পায় (পলস)

প্রত্যহ কোম এক নির্দিষ্ট ঘণ্টায় উদর-বেদনা ; পিত্ত-শিলা (gallstones) বশতঃ নির্দিষ্ট রিত সময়ে প্রত্যাবৃত্ত উদর-বেদনা (কার্ড-মে) ; স্নানিতে ও আহ্বারান্তে বৃদ্ধি ; এবং অবশীর্ষ হইয়া দ্বিভাঁজ হইলে (bending double) উপশম (কলো) ।

রক্ত-প্রাব বসন্তঃ প্রসব-বেদনার বিরতি ; রোগীগণ কাহারও স্পর্শ মহা হয় না, তাহার হাত দুখানি পর্য্যন্ত ছুঁইতে পারা যায় না।

মুখ, নাসিকা, অরায়ু বা অঙ্গ হইতে রক্ত-প্রাব ; ক্রমাগত অনেকক্ষণ রক্তপাত, অল্প জ্বোব স্পৃহা ; মতিন রক্ত অথবা কর্ণনাদ সহকারে মলিন সংঘট রক্তপাত, মুছরা, দৃষ্টিশক্তি, মধ্যাজোন শীতলতা এবং কখন কখন চক্ষু (ফির-ফস)

সবিরাম জ্বর — প্রতি আক্রমণে জ্বরের আবেশ ছই তিন ঘণ্টা অগ্রবর্তী হইয় আইসে (চিনি-সল), সাও দিন বা চৌদ্দ দিন পর পর জ্বর প্রত্যাবৃত্ত হয়, কখনও রাত্রিতে জ্বর আইসে না ; আবৃত্ত হইলে বা নিশাকালে প্রভূত ঘর্ষ নিঃসৃত হয় (কোনা) ।

উপচয় ।—অত্যন্তমাত্র স্পর্শে ; একদিন পর একদিন ; বায়ু-প্রবাহে ; চিত্ত-বিকারে , ও রস রক্তাদির অক্ষয়ে ; বৃদ্ধি ।

উপশাম ।—প্রচাপনে ও অবনত হইয়া বিভ্রাজ হইলে হাস ।

সম্বন্ধ ।—(১) হিরমের সহিত অমুপূরক সম্বন্ধ । (২) অগ্রবর্তী প্রকারের সবিরাম জ্বরে চিনি-সলফের সহিত তুলনীয় (ডিম্বি, ও সেন্সনের পরে চায়না প্রতিকূল । (৪) অতিরিক্ত চা পানের মনফলে, রক্ত-প্রাব হইতে থাকিলে চায়না ফলপ্রসূ ।

চেলিডোনিয়াম মেজরাস ।

(*Chelidonium Majus*)

জ্বর, পাতলা মুখাকৃতি, ক্ষীণ-দেহ, উত্তেজনশীল ; যকৃৎ, আখিপায় ও উদরের রোগ-প্রবণ (পণ্ড) ; সকল বয়স, সকল ধাতু ও সকল লিঙ্গের রোগীদিগের পক্ষেই এই ঔষধ উপযোগী

দক্ষিণ ঋক্ষাহির (Scapula) নীচের ও অভ্যন্তরের কোণের নিম্নে অবস্থিত বেদনা (কালী-কা, মার্ক — বাম ঋক্ষাহির, চিনোপ, গাঙ্গ)

ঋতু-পরিবর্তনে উপস্থিত বা প্রত্যাবৃত্ত অসুস্থতা (মার্ক) ; আহারান্তে সমস্ত অসুখের প্রসঙ্গোত্তি

অিহ্বায় গাঢ় পীতবর্ণ তেপ, প্রান্তভাগের আরক্ততা, দস্তের চিহ্ন (৭৬ — বৃহৎ লোপিত অিহ্বায় দস্তাক, মার্ক)

যে পর্য্যন্ত না দক্ষপ্রায় আশ্রয় উহা উদগীরণ করে, সে পর্য্যন্ত অতিশয় উত্তপ্ত পানীর দ্রব্যের অ+ক+জ (অ+স, ক্য+ক)

নির্জারিত সময়ে সমাগত অগ্নি-কোটরের মায়ুশূল (দক্ষিণ পার্শ্বের), ও অতিশয় অপ্রাপ্যত ; অশ্রুজল প্রবল বেগে নির্গত হয় (রস) ।

কোষ্ঠ-রোধ ; মেঘের বিষ্ঠার স্থায় গোল গোল শক্ত শক্ত গোলার আকার মল (ওপি, প্লব) ; পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠ-কাঠিষ্ঠ ও অতিসার ।

অতিসার ।—রাত্রিতে ; মেওলা শেওলা, পাতলা-ধূসর, উজ্জল পীতভ ; কপিশ বা শুভ্র, জলবৎ, লেহাকার ; অনিচ্ছায় নিঃসৃত ; মল ।

বদন, কপাল, নাসিকা ও গণ্ডদেশের সবিশেষ পীতবর্ণ ।

হৃকের পীতমিশ্রিত ধূসর বর্ণ ; পরিপুষ্ট কুঞ্চিত হৃক ।
হস্তের তালুকার এই প্রকার বর্ণ ও আকৃতি (মিনি)

যক্জোগ ; পাণ্ডু (jaundice), দক্ষিণ হৃদয়ে বেদনা ।

দক্ষিণ ফুসফুসের প্রদাহ, যক্জের উপসর্গ (মার্ক)

আগ্নেয়িক কাম ; কাসিবার সময় মুখ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোক্ষাথও বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে (বাড়ে, কাণী-কা)

দক্ষিণ পার্শ্বের সমধিক আক্রান্তি ; দক্ষিণ চক্ষু, দক্ষিণ ফুসফুস, দক্ষিণ কৃকি ও উদর, দক্ষিণ বজ্রণ (hi) ও জন্মার আক্রান্ততা ; দক্ষিণ পদ বরফের স্থায় শীতল ; বাম পদ প্রাভাবিক (লাই)

আহারান্তে ছর্ষণতা ও আলস্য, শয়ন করিয়া থাকিতে ইচ্ছা যক্জোগের পূর্ব ইতিবৃত্ত সংযুক্ত অথবা যথা-প্রবণ-ধাতুবিধিষ্ট ব্যক্তিদিগের পুরাতন, পচা প্রসারণশীল ক্ষত ।

পিত্ত-শিলা, দক্ষিণ হৃদ্যস্থির নীচে বেদনা (পিত্ত-শিলাজনিত উদর-বেদনার উদ্যানক আক্রমণ, কাডু) ।

সম্বন্ধ ।—(১) যকৃতের পীড়ায় আইডোনিয়ামের পথ্যাবহারের মনসফল চেলিডোনিয়াম দ্বারা নিবারিত হয় (১) চেলিডোনিয়ামের সহিত একন, আই, লাই, মার্ক, নক্স, স্ট্রাফ, সিপি, ও সলফের তুলনা হয় (৩) চেলিডোনিয়ামের পরে আস, লাই ও সলফ ভাল খাটে, এবং আরোগা সম্পূর্ণার্থে প্রায়ই আবশ্যক হয়।

জিঙ্কম মেট্যালিকম ।

(Zinoun Metalloun)

মস্তিষ্কের ও শ্বাস্যুর অবসন্নতা ; জীবনীশক্তির প্রচুরতা, মস্তিষ্ক ও শ্বাস্যুর শক্তির অসম্ভাব ; এত দুর্বলতা যে হামাদি উদ্ভেদ অথবাধাতু প্রকাশিত হইতে পারে না, নিষ্ঠীবন, ও মৃত্যু ত্যাগ করিতে , এবং বুঝিতে বা মনে রাখিতে পারা যায় না।

পদদ্বয়ে ও নিম্নাঙ্গের অবিরত ও উৎকট অস্থিরতা
অনুভব ; সর্বদা উহা সঞ্চালন করিতে হয়।

যেই ধাতু-রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকে সেই সকল প্রকার অস্থিরতার নিবৃত্তি জন্মে, সকল প্রকারেই ভাল বোধ হয়, কিন্তু ধাতু বদ্ধ হইলেই তখন আবার সকল অস্থিরতা প্রত্যাবৃত্ত হয়।

মস্তিষ্কের রোগে, মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত-সম্ভাবনায় ; শ্বাস্যাবিক আরোগ্য-শক্তির অতিরিক্ত দুর্বলতা বলতঃ উদ্ভেদের অবিকাস (ফুপ, মল, টিউব) ; মস্তিষ্ক-গহবরে রস-ক্ষরণের লক্ষণ

শিশুকে যাহা বলা যায় সে তাহারই পুনরুজ্জীবন করে

শিশু নিজায় কাদিয়া উঠে ; নিজাকালে সর্কশরীরে উৎক্ষেপণ জন্মে ; ভীত হইয়া জাগরিত হয়, এক-দৃষ্টে চাহিয়া থাকে, মস্তক অবলুণ্ঠন করে ; তাহার মুখমণ্ডল একবার পাণ্ডুর একবার আরক্ত হয়।

দস্তোদগম কালে, পাণ্ডুবর্ণবদন ও অনুতাপ সহকারে,

টঙ্কার (দড়কা), কেবল মস্তকের পশ্চাৎভাগে উত্তাপ থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু গাঁজ-তাপের বৃদ্ধি দৃষ্ট হয় না (বেলেডোনার বিপরীত) ; চক্ষু ঘূর্ণন ; দন্তেদন্তে সংঘর্ষণ

হস্ত-দ্বয় ও মস্তকের, অথবা এক হস্ত ও মস্তকের অনৈচ্ছিক গতি (এপোঁসা, ব্রাই, হেলি) ।

উদ্বেদ-বিলোপ ; বা ভয়প্রাপ্তি বশতঃ কোরিয়া (তাণ্ডব রোগ) ।

পূর্বাঙ্ক ১১ টা বা ১২ টার সময় ভয়ানক ক্ষুধা (সল) ; আহারকালে অতিশয় পেটুকতা ; শীঘ্র শীঘ্র খাইতে পারা যায় না (শিশুদিগের প্রচ্ছন্ন মস্তিষ্ক-রোগ) ।

শয্যায় শয়ন করিবার পরে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত, এমন কি নিদ্রাকালেও পদদ্বয়ের অতিশয় স্নায়বীয় সঞ্চালন

পদদ্বয়ের ঘর্ষণাক্রান্ততা, ও অঙ্গুলির নিকটে ক্ষত ; দুর্গন্ধ পাদ-ঘর্ষের বিলুপ্তি ; অতিশয় স্নায়বীয়তা ।

বেদনাপূর্ণ নিহার-ফোঁট (Chilblains), ঘর্ষণে উহার বৃদ্ধি

পৃষ্ঠ-বংশের পীড়া ; সমগ্র পৃষ্ঠবংশের দীর্ঘাদীঘি জ্বালা ; পৃষ্ঠবেদনা, উপবেশনে উহার অতিশয় আধিক্য, বিচরণে দ্রাস (কোবার্ট, পলস, রসটক) ।

পৃষ্ঠ-বংশের উপদাহ ; শক্তির অতিশয় অবসন্নতা ।

পৃষ্ঠে স্পর্শ সহ্য হয়না (চিন-সল, টারাপ, থেরে) ।

কেবল পশ্চাদিকে বক্র হইয়া বসিয়া মুত্রত্যাগ করিতে পারা যায় ।

এক একটা পেশীর স্পন্দন ও উৎক্ষেপণ (এগার, ইয়ে) ।

শরীর-শাখার ত্বর্জিততা ও কম্পন ; লিখিবার সময় হস্ত কম্পন ; শতু-কালে হস্ত-পদের কম্প ।

ঘর্ষণ-কালে কোন প্রকার গাঢ়াবরণ সহ্য করিতে পারা যায় না

উপচয়—জ্বর-পানে, অল্পমাত্র পানেও অনেকগুলি লক্ষণের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি (এলম, কোন) ।

উপশম—নিষ্ঠীবন ত্যাগে বঙ্গোলক্ষণের ; মূত্র-ত্যাগে মুত্রাশয়ের লক্ষ-

গের ; শুক্রস্রাবে পৃষ্ঠ-লক্ষণের (বৃদ্ধি, -কোবাংট) এবং ঋতু স্বাবে সর্বাঙ্গীন লক্ষণের ; উপশম

সম্বন্ধ—(১) উত্তেজ বিশোপ জনিত প্রাচুর্য মস্তিষ্ক-রোগে, হেলি ও টিউব, জিঙ্কের সমস্ত (২) জিঙ্কের পরে ইয়ে ভাল খাটে, কিন্তু নবা ভাল খাটে না । (৩) জিঙ্কের সহিত ক্যাম ও মকোর প্রতিকূল সম্বন্ধ ; জিঙ্কের পরে বা পূর্বে এই দুই ঔষধ ব্যবহৃত হয় না ।

জেলসিমিয়াম ।

(*Gelsemium.*)

বালাক-বালিকা, ও যুবক-যুবতীদিগের পক্ষে, বিশেষতঃ স্নায়বীয় ও শুণ্যবায়ু-প্রকৃতির নারীদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী

গতিজনন-স্নায়ুর (Motor nerves) সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত সহকারে সমগ্র পেশী-মণ্ডলীর সম্যক্ শিথিলতা ও অবসন্নতা

উত্তেজনা, উপদ্রাব, ও অসুভূতি-শীলতা ; জী-পূর্য উভয় জাতিরই কৃত্রিম মৈথুন জনিত স্নায়বীয় রোগ

ভয়, উত্তেজক সংবাদ ও আকস্মিক মনোভাবের মনফল (ইয়ে । আকস্মিক, আনন্দ জন্ত, কফি) ।

মৃত্যু-ভয় (আস) ; সম্পূর্ণ সাহসহীনতা ।

ভজনাগরে, নাট্যাগরে, অথবা কাহারও সহিত সাংগাৎ করিতে য ইতে হইলে অতিসার উপস্থিত হয় ; সাধারনের নিকট উপস্থিত হইতে বা রঙ্গমঞ্চ দর্শনে ভয় জন্মে (আর্জ-না) ।

সূর্যের উত্তাপ বা গ্রীষ্মকালের উত্তাপজনিত সর্বাঙ্গীন অবসাদ জিহ্বা, হাত, জন্তা ; ও সমস্ত শরীরের দুর্বলতা ও কম্পন ।

নীরবে, ও একাকী থাকিতে ইচ্ছা ; কাহারও সহিত কথা বলিতে অথবা কাহাকে নিকটে আসিতে দিতে (সে চুপ করিয়া থাকিলেও) অনিচ্ছা (ইয়ে) ।

শিরোগূর্ণন, মস্তকের পশ্চাচ্ছাগ হইতে উহার প্রসারণ (সিলি) ;
শিরোগূর্ণন সহকারে দ্বিজ-দৃষ্টি (একটা বস্তু হইতেই দেখা), বাপমা দৃষ্টি ; দৃষ্টি-
বিলোপ ; ও নড়িতে চড়িতে চেঁচা করিলে মস্তক অস্থিত

শিশুদিগের পতনের ভয়, ভয় বা ভয়ঃ শিশু ধাতীকে বা অল্প কিছু ধরির থাকে
(বোরা, ভানি)

দৃষ্টি-হীনতা-পূর্বক শিরঃপীড়া (কালী-বাই) প্রভূত মূত্রজাবে উহার শাস্তি
পেশীর সামঞ্জস্যের বা সম-নিয়োগতার (co-ordination)

অসম্ভাব ; পেশীগুলি ইচ্ছানুরূপ কার্য করে না

শিরঃপীড়া — মেরুদণ্ডের গ্রীবাদেশীয় অংশে উহার আরম্ভ ; মস্তকের
উপর দিয়া বেদনার প্রসারণ, কপালে ও অক্ষি-গোলকে বিদারণবৎ অস্থিত (স্মৃতি,
সিলি, এইরূপে আরম্ভ, কিন্তু এক পার্শ্বে) ; মানসিক পরিশ্রমে ; ধূম-পানে,
স্বর্ঘ্যোত্তাপে , ও মস্তক নিম্ন করিয়া শয়নে ; বেদনার বৃদ্ধি ।

চক্ষুর উর্ধ্বে মস্তকের চারিদিকে বন্ধনের স্থায় অস্থিত (কার্কেল-এস, মলফ) ;
মস্তকের উপরিভাগে স্পর্শ-দ্রব্য

না নড়িলে চড়িলে স্থবর্ণিতের স্পন্দন স্থগিত হইবে একরূপ আশঙ্ক , (নড়িলে
চড়িলে রোগিণীর স্থবর্ণিতের স্পন্দন স্থগিত হইবে একরূপ আশঙ্কা, ডিজি)

বৃদ্ধ বয়সের ধীর (মন্দগতি) নাড়ী

চক্ষুর পাতার অতিশয় শুষ্ক ; উহা উন্মীলিত রাখিতে পারা যায় না (কষ্ট,
গ্রাফ, সিলি)

অরে পিপাসা-পারিশ্রুতা নীত, বিশেষতঃ মেরুদণ্ডের উপর দিয়া নীত, ত্রিকোণি
হইতে মস্তকের পশ্চাচ্ছাগ পর্য্যন্ত ক্ষত-গতি ভরঙ্গের স্থায় পরপর পৃষ্ঠের উপরে
ও নীচে শীতের প্রধাবন ।

উপচয় — আর্জকালে ঝড়-বজ্রের পূর্বে ; মনোভাব বা মানসিক
উত্তেজনায় , কুসংবাদে ; তামাকের ধূমপানে ; রোগের বিষয়
ভাবিলে ; এবং কাহারও মুখে নিদ্রের ক্ষতির কথা শুনিলে , বৃদ্ধি ।

সম্বন্ধ । — আশঙ্কিত টাইফয়েড্ অরে ব্যাপ্তিসিয়ার সহিত , এবং কুইনাইন
দ্বারা প্রতিরুদ্ধ সন্ধিরাম অরে ইপিকাকের সহিত জেলসের তুলন হয় ।

টিউবারকিউলাইনঃম—ব্যাসিলাইনঃম ।*

(Tuberculinum—Bacillinum)

যে সকল ব্যক্তির মুখাকৃতি পাতলা, নয়ন নোণবর্ণ গৌর ; যাহাদের বক্ষঃস্থল দীর্ঘ, ক্ষীণ, চেপ্টা ও অপ্রসারিত ; মানসিক শক্তি অকাল পক্ষ, শরীর দুর্বল, এবং যাহাদের গুটিকা-খাঁড় (tubercular diathesis) ; তাহাদের পক্ষেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী ।

যখন কোন রোগীর কুল-দোষে গুটিকা-রোগের (টিউবারকিউলার ডিসিজ) বিবরণ জানা যায়, এবং অত্যন্ত সুনির্বাচিত ঔষধেও উপশম বা স্থায়ী উপকার না দর্শে, তখন রোগের নাম যাহা কেন না হউক, এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে

রোগের লক্ষণের অবিরত পরিবর্তন ; ফুসফুস, মস্তিষ্ক, বৃক্ক (kidneys), যকৃৎ, আমাশয় স্নায়ুমণ্ডল প্রভৃতি যন্ত্রের একটীর পর আর একটীর আক্রান্ততা,—সহস উহার আরম্ভ এবং সহসা বিলুপ্তি

সহজে শর্দি লাগে, কি প্রকারে কোথায় শর্দি লাগে তাহা জানা যায় না ; “বিমল বায়ুর প্রতি নিখাম গ্রহণেই” যেন শর্দি লাগে এরূপ বোধ হয় (হিগ) ।

দ্রুত ও সুস্পষ্ট শীর্ণতা ; ভালরূপে আহার করিলেও মাংসের ক্ষয়প্রাপ্তি (এন্ডোট, ক্যাফ, কোনা, আইও, স্ফাট) ।

বিশগ্ৰতা, আশাশূন্যতা, বিষমতা, কোপনতা, বিরক্ত-চিন্ততা, ক্ষণরাগিতা, নীরবতা, নিরানন্দতা ; প্রভাবতঃ মধুর প্রকৃতি কিন্তু একগ প্রায় উদ্ভাসিত ।

গৃহের সমস্ত বস্তুই অপরিচিত বোধ হয়, যেন কোন অপরিচিত স্থানে অবস্থিতি করা যাইতেছে ।

শিরঃপীড়া ।—পুরাতন, ও গুটিকাজনিত শিরঃপীড়া ; দাক্ষিণ্য, কর্ণমবৎ দক্ষিণ চক্ষু হইতে মস্তকের পশ্চাচ্ছাগ পর্যন্ত প্রসারিত বেদনা ; বোধ হয়

* ডাঃ ফিক ও সোয়ান ফুসফুসের পৃথক নিষ্কাশন হইতে এবং ডাঃ হিথ অণু-বিশ্লেষণদ্বারা, ব্যাসিলঃ টিউবারকিউলোসিস বিশিষ্ট, টিউবারকিউলোস ফুসফুস হইতে

যেন মাথার চারিদিকে একটা লোহার পতর (i on hoop—ভৌহবহুয়, লোহার আংটা) রাখাচ্ছে (এনাক, মলফ) ; অতিশয় জ্বলিয়া উঠে ওষধেও বেদনা কেবল যাপ্য থাকে মাত্র

বিজ্ঞানগণের বালিকা পণ্ডের শিরোনবেদনা — অধ্যয়নে বা সামান্য মানসিক শ্রমে বেদনার আতিশয়া ; নিকটে চক্ষু রাখিয়া ফাংগ করাতে বৃক্ষি, চক্ষু চোখে থাকেও অল্পপলম ; গুটিকা দোষের পূর্ণবৃত্তান্ত ।

মস্তক ঝিল্লোর বা উহার ভূমিদোষের প্রদাহ, তৎসহ রস-নিঃস্রবণের আশঙ্কা ; রক্তিতে ভ্রান্ত-দৃষ্টি (মাধা দেখা) ; নিজা হইতে ভীত হইয়া চিৎকার পূর্বক জাগরণ ; যখন এপিস, হোল বা মলফ জ্বলিয়া উঠেও ফলপ্রদ হয় না ।

নাসিকায় ক্রমাগত দারুণ বেদনা বিশিষ্ট স্ফোটক সমূহের উৎপত্তি, হ্রিদ্ধর্ণ দুর্গন্ধ পুঘ (সিকে)

মাইকাপলোনিকা (কেশরোগ বিশেষ) ; বোরা ও সোরি বিফলাস্তে এতদ্বারা কয়েকজন রোগীর চির আরোগ্য লাভ হইয়াছিল

অতিশয় — অকস্মিক, অনিবার্য, প্রত্যয় কালীয় অতিশয় (মলফ) ভালরূপে আহার গ্রহণেও শরীরের শীর্ণতা প্রাপ্তি (আইও, ছাট) ; ময়লা, কটা, জলবৎ, দুর্গন্ধ, মল ; অতিবহু নিঃসরণ ; অতিশয় দুর্বলতা ও প্রভূত ; নৈশ স্বপ্ন ।

ধতু — নিষ্কারিত সময়ের অধিক পূর্বে ; অতি প্রভূত ; অতিরিক্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী ; প্রারম্ভে ধীর-গতি ; ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয় ; গুটিকা-দোষের ইতিবৃত্ত বিশিষ্ট ; ধতু

ফুসফুসের, বিশেষতঃ বাম ফুসফুসের শিথল-দোষে গুটিকা সঞ্চয় (ফস, মলফ, থেরে) ।

পামা (eczema) ।—সমস্ত শরীরের উপর গুটিকাঞ্জনিত পামা ; দারুণ কণ্ডুয়ন, রক্তিতে গাং-বস্তু উদ্গোচনে, ও জ্বলে উহা অধিক্য ; অধিক পরিমাণে শাদা শাদ ভূমির ছায়াক পাত, কর্ণের পশ্চাতে, চুলে, চর্মের বলিতে অবদারণ ও স্পর্শে সহ রস সঞ্চার ; চর্মের অগ্নিবৎ আরক্ততা । দক্ষ ।

এই ঔষধ প্রস্তুত কারয়াছিলাম ; একত্র ফিঙ্ক ও সোয়ানের ঔষধ টিউবারকিউ-নাইনঃম এবং হিথের ঔষধ ব্যাসিলাইনঃম নামে অভিহিত হইয়া থাকে কিন্তু উভয় প্রস্তুতিই নির্ভরযোগ্য ও ফলপ্রদ ।

সূত্র —(১) মলকার ও সোরিগমের সহিত অল্পপূরক সম্বন্ধ (২) যখন সোরি বা মলফ, অথবা অন্য কোন স্থানিকীর্ণিত ঔষধে উপশম বা স্থায়ী উপকার দর্শনা তখন টিউবার ব্যবহৃত হয় ; হে-ফিভার ও ম্যালেরিয়া রোগে ধাতু-দোষ সংশোধনার্থে সোরিগমের পরে টিউবার প্রয়োগিত হয় (৩) গুটিকা-জনিত রোগে, রক্ত সঞ্চয় বা প্রদাহের তৎকাল আক্রমণে বেলেডোনা ব্যবহৃত হয় (৪) টিউবার-প্রয়োগে আরোগ্য প্রাপ্ত রোগীর স্থলত্ব অনাহারের জন্য হাইড্রটিস প্রয়োগিত হয়

টেরেবিন্থ ।

(Terebinth)

মূত্রে ভায়োলেট ফুলের গন্ধ ।

জিহ্বার মসৃণতা, চিকণতা (glossy) ও আরক্ততা, যেন জিহ্বা-কণ্টক (papillae) বিনষ্ট হইয়াছে ; উন্নত জিহ্বা কণ্টক ; জিহ্বার লেপ খণ্ডে খণ্ডে উঠিয়া পড়ে ; উহার নীচে উজ্জল লোহিত বর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান দৃষ্ট হয়, অথবা সমগ্র লেপ সহসা পরিষ্কার হইয়া পড়ে (স্কেফাট অরে), জিহ্বার শুষ্কতা ও আরক্ততা, অগ্রভাগ জালা (মিউর-এমির সহিত তুলনা করান) ।

উদর ।—স্পর্শে অত্যন্ত অনুভূতি ; ক্ষীণতা, আগান, অতিশয় আধ্বান, কৃষ্ণন (কলচি) ।

অতিসার । জলবৎ, ঈষৎ হরিষর্গ, আমসংযুক্ত ; প্রভূত, দুর্গন্ধ, রক্তাক্ত পুনঃ পুনঃ নিঃসৃত মল ; মলধারে ও সরলাঙ্গে জ্বালা ; মল ত্যাগান্তে মূর্চ্ছা ও অবসন্নতা (আম) ।

কৃমি স্বামে দুর্গন্ধ গল-রোধ (সিনা, স্পিজি) ; শুষ্ক, থক্ থক্ কাস ; মলধারে তুড়তুড়ি , স্রব-কৃমি, মলীণতার চ্যায় কৃমি, পটু-কৃমির (tape worms) অংশ নিঃসরণ ।

রক্তমূত্র ।—মূত্রের সহিত সম্যকরূপে মিশ্রিত রক্ত, কফি-চূর্ণের

ক্রায় ঘনঃপতিত পদার্থঃসরাবৃত্ত (cloudy), ধূমল, সাণ্ডাল (aluminous) মূত্র ; প্রভূত, মলিন অথবা কাল, বেদনাসূচ্য, মূত্র ।

বৃকক, মূত্রাশয় (bladder), ফুসফুস, অন্ত্র (intestines), অরায়ু ও ভূতি আভ্যন্তরিক রক্তের রক্ত-সঞ্চয় ও প্রদাহ, তৎসহ রক্তাশ্রাব এবং সাংঘাতিকতার প্রবণতা ।

পাপুঁরা হিমোরজিকা, দিন দিন নূতন নূতন বহুসংখ্যক কালশিরা (ecchymoses) (মলফ-এমি) ।

বৃককের বিধান বিকারে সর্বাঙ্গীন শোথ সহ উদরী, ক্যালেক্টিনার পরে শোথ (এমিস, হেলি, ল্যাক)

ক্ষতসহ অল্প হইতে রক্তাশ্রাব ; শত অথবা উপত্যকের অপকৃষ্টতা সহকারে মলিন অঙ্গবল রক্তপাত ।

বৃকক, মূত্রাশয় ও মূত্রমার্গে প্রবল জ্বালাকর ও আকর্ষণবৎ বেদনা (বাধ, ক্যান, ক্যাছ)

মূত্রাশয়ে প্রবল জ্বালা ও কর্তনবৎ যাতনা, বৃহন ; উদরের নিম্নভাগে অল্পভাবিক্য ; মূত্রাশয়ের মূলদেশের দুর্বলতা বশতঃ মূত্রাশয়-প্রদাহ ও মূত্ররোধ

সাণ্ডাল মূত্র ; উহার তরল ও প্রথমাবস্থা, ছাঁচ ও উপত্যক (casts and epithelium) অপেক্ষা রক্ত ও অণুলালের আধিক্য ; ডিফথিরিয়া, ক্যালেক্টিনা ও টাইফয়েড জরের পরবর্তী এডুমিছুরিয়া (সাণ্ডাল-মূত্র) ।

মূত্রে অণুলাল ও রক্তের আধিক্য কিন্তু ছাঁচের অতিশয় অল্পতা ; আজ গৃহে বাসে বৃদ্ধি

মূত্রকৃচ্ছ ; আফ্রিক মূত্র-রোধ ।

সম্বন্ধ ।—এলুমেন, আর্স, আর্গ, ক্যাছ, ল্যাক, নাই-এমির সহিত সমগুণ মধ্য ।

ম্যালেরিয়া ও আফ্রিকার জরে প্রতিষেধক ঔষধ স্বরূপ ব্যবহারেরও বিধি আছে ।

ট্যাবেকঃম ।

(Tabacum)

মস্তিষ্কের উপদাহ (cerebral irritation) হইতে উৎপন্ন রোগ, ও তৎপরে
ফুসফুস পাকায়িক ভায়ুর (vari) জিয়ার স্পষ্ট উপদাহ

গালের ও পৃষ্ঠের শীর্ণতা ।

সমগ্র পেশীমণ্ডলের সম্পূর্ণ অবসন্নতা ।

গাত্রের বরফের ন্যায় শীতলতা ; শীতল ঘর্ম্ম আচ্ছন্নতা ।

শ্বাস-কাস, সবমন শিরঃপীড়া, নিরোগুর্জন, হাঁচি প্রভৃতি রক্ষণের আবেশে
আবেশে অর্থাৎ থাকিয়া থাকিয়া উপস্থিতি ।

অজীর্ণ, ক্ষুধাকম্প, ও সবিরাম নাড়ী সহকারে অতিশয় নিরাশতা ।

শিরোগুর্জন ।—মৃত্যুবৎ পাণ্ডুবর্ণ, উহা বর্ধিত হইয়া সংজ্ঞাহীনতা, বিমুক্ত
বায়ুতে ও বমনে ; উথানে অথবা উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাতে ; এবং চক্ষুর উন্মীলনে,
উপশম প্রাপ্তি ।

প্রত্যুষে সবমন শিরঃপীড়ার উপস্থিতি, মধ্যাহ্নে উহার অসহ্যতা, নিদ্রার
বিবমিষা, প্রবল বমন, শব্দ ও আলোকে বৃদ্ধি ; নির্জারিত সময়ে প্রত্যাবৃদ্ধি,
এক বা দুই দিন স্থায়িত্ব

মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বের উপর হাতুড়ি বা গদার আঘাতের দ্বারা আকস্মিক
বেদনা ।

আপসা দৃষ্টি, যেন অবগুষ্ঠনের ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে ; মস্তিষ্কের
উপদ্রব জনিত তির্য্যগদৃষ্টি (tiabismus)

রেটিনা অথবা দর্শন-ভায়ুর শীর্ণতা জনিত দৃষ্টিহীনতা ।

পাণ্ডুবর্ণ, নীলবর্ণ, কুঞ্চিত, নিমগ্ন, পতন্যবস্থাপন্ন, শীতল ঘর্ম্মাচ্ছন্ন ; মুখমণ্ডল
কপালে শীতল ঘর্ম্ম, ভিন্নে) ।

বিবমিষা ; সামুদ্রিক বিবমিষার দ্বারা অবিরত বিবমিষা ; অল্পমাত্রা নড়িলে
নড়িলেই বমন ; তৎসহ প্রাপ্তি ; বিমুক্ত বায়ুতে উপশম ।

বমন ।—শীতল ঘর্ম্মসহ, প্রবল বমন ; নড়িতে চড়িতে আরম্ভ

করিলেই বমন ; গর্ভাবস্থায় বমন ; ল্যাক্টিক এসিড বিফল হইলে ব্যবস্থেয়
(সোরি)

সামুদ্রিক বিবমিষা , নিদারুণ বিবমিষা ; পাণ্ডুবর্ণ ও শীতলতা ; যৎসামান্য
সকালনে বৃদ্ধি এবং জাহায়ের ডেকের উপরে বিমল শীতল বায়ু সেবনে
উপশম

আম্যশয়-গহ্বরে ভয়ঙ্কর শ্রান্তি ও নিমগ্নতা (sinking)
অনুভব ।

বিবমিষা সহকারে আম্যশয়ের শিথিলতা অনুভব (ইপি, ষ্টাফ)

শিশু উদর অনাবৃত রাখিতে চায় ; উহাতে বিবমিষা ও বমনের
শাস্তি ঘনো ; উদরে শীতলতা (কলচি, ইলাপ্স, ল্যাক) ।

কোষ্ঠকাঠিন্য —অঙ্গের নিজস্বতা অংবা সরলান্তের পক্ষাঘাত ; মলদ্বারের
মুখাবরক পেশীর আক্ষেপ ; অনেক বৎসর স্থায়ী গুদ-দ্রুপ (Prolapsus ani)
মলদ্বারের দ্রুপ (herpes) ।

অতিসার —সহসা, ঈষৎ পীতবর্ণ, ঈষৎ হরিদ্বর্ণ, আঠা আঠা, সবেগ জলবৎ
মলজাব ; তৎসহকারে বিবমিষা, বমন, অবমনতা ও শীতল ঘর্ম্ম
(ভিরে) অত্যন্ত শ্রান্তি ; অতিশয় ধূমপান বশতঃ রোগের উৎপত্তি ।

বৃকক-শূল —বামদিকের মূত্র-নাড়ীর দীর্ঘাদীঘি প্রবল আক্ষেপিক বেদনা
(বার্ল) ; নিদারুণ বিবমিষা ও শীতল ঘর্ম্ম

হৃৎকম্প —বাম পার্শ্বে ময়নে প্রাবল্য, ও দক্ষিণ পার্শ্বে ময়নে বিরতি ।

নাড়ী ।—জড়, পূর্ণ, বৃহৎ ; শূজ, সবিরাম, অতিশয় মন্দ ; ক্ষীণ, অনিয়মিত,
প্রায় অপ্রাপ্য ; নাড়ী ।

হৃৎকম্প বরফের স্থায়ী শীতল, শরীর উষ্ণ ।

জ্বর হইতে নিম্ন পর্যন্ত জ্বরবরফের স্থায়ী শীতল ; অঙ্গের কম্পন

উপশম ।—বিমুক্ত, বিমল, শীতল বায়ু সেবনে ; ও গাত্রাবরণ
উন্মোচনে উপশম

সম্বন্ধ —তামাকের অপব্যবহারের মন্দ ফলের প্রতিহারার্থে নিম্নোক্ত
ঔষধ সকল ব্যবহৃত হয় (১) ইপি,—অত্যন্ত বিবমিষা ও বমন ।

(২) আস, — তামাক চর্ষণের কুফল । (৩) নকা — ধূমপানান্তে পরদিন প্রাতে
আমাস্ময়িক লক্ষণ । (৪) ফগ, — স্বৎকম্প, তামাকুট স্বচক স্বৎপিণ্ড, মঙ্গমে-
জিয়ের দৌর্লভ্য । (৫) হেগে, — তামাকুট চর্ষণজনিত বিরজিতকর হিকা ।
(৬) ক্লিম, অর, প্যাণ্টে, — তামাকুট জনিত দস্ত বেদনা । (৭) গিপি, — বদনের
দক্ষিণ পার্শ্বে স্নায়ু-শূল জনিত পীড়া, অগ্নিমান্য পুরাতন গায়বীরতা বিশেষতঃ
অব্যাহতমীদিগের । (৮) হাইকো, — অতিশয় ধূমপানজনিত ধ্বজভঙ্গ,
আক্ষেপ, শীতল ঘর্ম্ম । (৯) জেলস, — অতিরিক্ত তামাকের ব্যবহার, বিশেষতঃ
ধূমপান অথ মস্তকের পঞ্চাঙ্গাগে শিরঃপীড়া ও শিরোধূর্নন । (১০)
তামাক খাওয়া ছাড়িয়া দিলে যে উহা সেবনের অথ হৃদয়া আকাজকা জন্মে
টাইফয়েডের ২০০ শত বা সহস্র ক্রম সেবনে উহার শাস্তি হয় ।

টারাক্সিকঃম ।

(Taraxacum)

আমাস্ময়িক ও পৈত্তিক আক্রমণ, বিশেষতঃ আমাস্ময়িক শিরঃপীড়া ।

মানচিত্রের দ্বায়া চিত্রিত জিহ্বা (ল্যাক, মাক, ছাট-মিউ) ;

জিহ্বার উপরে শাদা শাদা স্বল্প স্বল্প পর্দা, তৎসহ অবদরঃ অস্থত্ব এই পর্দা
থণ্ডে থণ্ডে উঠিয়া আইসে, তৎপরে মলিন লোহিত, অতিশয় স্পর্শদ্বেষ
বিশিষ্ট ক্ষুদ্রে ক্ষুদ্রে স্থান (Spots) (রাগ্ন) অবশিষ্ট থাকে ।

যকৃতের বিবৃদ্ধি ও কাঠিল মধ্যুক্ত পাণ্ড, (মানচিত্রের দ্বায়া চিত্রিত জিহ্বা) ।

হর্ষণতা, ক্ষুধাহীনতা, প্রভূত নৈশ ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ পৈত্তিক অর অথবা
টাইফয়েড অর হইতে আরোগ্যোগ্রাধ অবস্থার ।

টাইফয়েড অরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্থিরতা (রস, জিহ্ব) ।

উপচয় — উপবেশন ; শয়ন ; ও বিশ্রামকালে প্রায় সমস্ত লক্ষণের
প্রকাশ ।

সম্বন্ধ — আমাস্ময়িক ও পৈত্তিক রোগে আই, চেলি, হাইড্রাট, ও নক্সের
সহিত এই ঔষধের তুলনা হয় ।

টারান্টিউলা ।

(Tarantula)

অত্যন্ত স্নায়ুপ্রাধান ব্যক্তিদিগের পক্ষে, বিশেষতঃ কোরিয় রোগে সমগ্র শরীর, অথবা দক্ষিণ বাহ ও বাম অঙ্গা আক্রান্ত হইলে, এই ঔষধ উপযোগী (বামবাহ ও দক্ষিণ অঙ্গা আক্রান্ত হইলে, এগার) ।

অঙ্গা, বাহ এবং দেহ-কাণ্ডের অবিরত সঞ্চালন, ও কোন কার্য্য করিতে অসমর্থতা, পেশীর স্পন্দন ও উৎক্ষেপণ ।

অস্থিরতা, কোন প্রকার অবস্থানেই স্থির থাকিতে পারা যায় না ; অবশ্য নড়িতে চড়িতে হয় যদিও হাঁটা যায় তথাপি সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি হয় (রস ও রুটার বিপরীত)

স্পর্শাধিক্য ।— অল্পমাত্র উত্তেজনার উপদাহ আগে, তৎপরে বিষমত উপস্থিত হয় ; হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগে উহার অত্যন্ত আধিক্য থাকে

মেরুদণ্ডের দীর্ঘাদীঘি যৎসামান্য স্পর্শে বক্ষঃস্থলে ও হৃৎপিণ্ড প্রদেশে আগ্নেয়িক বেদনা উজ্জ্বল হয়

দারুণ শিরঃপীড়া; মস্তিষ্কে যেন সহস্র সহস্র খুচী বিদ্ধ হইতেছে এরূপকার অনুভব ।

ব্রণশোথ (abscess), ফোটক (boils) ও আঙ্গুলহাড়া (felons), আক্রান্ত স্থানের একপ্রকার ঈষৎ নীলবর্ণ (ল্যাক), এবং নিদারুণ জ্বালাকর বেদনা (এছা, অগ'), আঙ্গুল-হাড়ার যাতনায় রোগীকে রাতে উঠিয়া হাঁটিতে হয়

দূষিত আত ; কার্বিফল ; গ্যাংগিণ ।

নির্জীর্ণিত সময়ে লক্ষণের প্রকাশ

স্নায়বীয় শিরঃপীড়া; গোলমাল, স্পর্শ ও উগ্র আলোকে উহার বৃদ্ধি, বালিশে মাথা ষমিলে উপশম ।

প্রতি ঋতুকালে গল মধ্য, মুখ-মধ্য ও জিহবার অসহ্য পরিশুদ্ধতা, বিশেষতঃ নিদ্রাবস্থায় (নক্স-ম) ।

উন্মাদবৎ কামোত্তেজনা ; অরায়ুর আগ্রহ ; ভগকণ্ঠ্যনে অসহ্যতা প্রাপ্তি

উপচয় ।—নড়িলে চড়িলে, ধরিলে, আক্রান্ত স্থান স্পর্শ করিলে ; গোলমালে, ও ঘূর্ণ-পরিবর্তনে বৃদ্ধি ।

উপশম ।—অনার্থক বায়ুতে ; গাভবাতে ও আক্রান্ত স্থান ঘর্ষণে হ্রাস ।

সম্বন্ধ ।—এগিগ, ক্রোট, ল্যাক, পাট, মাইগেল, ল্যাম্বা, থেরের সহিত সম্বন্ধ সম্বন্ধ ।

স্বাস্থ্য শেষ প্রাপ্ত এতই উপদাহিত এবং অসুভূতিবিশিষ্ট হইয়া উঠে যে শান্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত কোন প্রকার ঘর্ষণের আবশ্যকতা জন্মে

ট্রিলিয়াম পেন্ডুলম ।

(*Trillium Pendulum.*)

রক্তপ্রাব ।—প্রভূত ধার্মিক ও দৈনিক রক্তপ্রাব ; সাধারণতঃ উজ্জ্বল, লোহিত রক্ত ; নাসিকা, মুসকুস, বৃকক, ও স্রাব হইতে রক্তপাত (ইপি, সিলি) ।

শরীরের তরল পদার্থের পচনোৎপাদন

নাসিকা হইতে রক্তপ্রাব ; প্রভূত, অপ্রবল, উজ্জ্বল লোহিত রক্ত

দন্তোৎপাদনের পর দস্ত-গহ্বর হইতে রক্তপ্রাব (হেমো, ক্রিমো) ।

ঋতু ।—প্রভূত, প্রতিপক্ষে একবার, এক সপ্তাহ অথবা ততোধিক কাল অবস্থিত, ঋতু (ক্যাক-ফস) ; অতিরিক্ত পরিশ্রম, অথবা অনেক দূর পর্য্যন্ত অশ্রাব্যবাহনের পর উৎপত্তি ।

মূর্ছাসহ প্রসবান্তিক রক্তপ্রাব ।

অতি-রক্তরোগ ।—প্রভূত, সবেগে নিঃসৃত উজ্জ্বল-লোহিত, রক্তপ্রবাহ ; একটু মাত্র নড়িলে চড়িলেই রক্ত নিঃসরণ (স্রাব) ; স্রাব স্থান-চ্যুতি হইতে ; বিরজ কালে (Climacteric) ; ও প্রতিপক্ষে, মলিন সংযত রক্ত (থ্র্যাস, অট) ; প্রাব ।

রক্তকাস — প্রাচীন যথা ও রক্তাক্ত নিষ্ঠীবন ; প্রবর্তিত অবস্থায় প্রভূত, পুষ্পময় নিষ্ঠীবন ও বিরজিকর কাস ।

কুচকি ও কটি যেন থণ্ড থণ্ড হইয়া পাড়িতেছে একপ অমুভব ; ত্রিকাহ্নি (Sacrum) ও অনামাহ্নি সংযোজক কণ্ডুগাণ্ডলি (Sacro-iliac Synchondroses) বিচ্ছিন্ন হইয়া পতনের ভায়ে অমুভব, উহা শক্ত করিয়া বাধিয়া রাখিবার ইচ্ছা ; বস্তি-কোটরের (pelvis) অস্থিগুলি যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে একপ অমুভব (ইফ্লিউ) ; তৎসহ রক্তস্রাব

বিরজাদিগের স্রাব হইতে প্রভূত রক্তস্রাব ; প্রতিপক্ষে রক্তপাত, পাণ্ডুবর্ণ, ক্ষীণ বাপসা দৃষ্টি ; হৃৎকম্প ; কর্ণে অবরোধ ও শব্দ (ফির) ; আমাশয়-গহ্বরে যজ্ঞগাজনক নিমগ্নতা (Sinking) ।

সম্বন্ধ । — (১) ঋতু ও রক্তস্রাব সংক্রান্ত পীড়ায় ক্যান্স-ফসের সহিত অমুপূরক সম্বন্ধ (২) মিক্স, বেগ, ক্যান্সি-কা, মিচি, ল্যাক, মিনি, সফ, থ্যাস ও অষ্টের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ ।

ডুল্লেমেরা ।

(Dulcanaria)

শ্লেষ্ম-প্রদান, গণ্ডমালা-মাতৃ, অস্থির, কোপন-স্রাব ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী

প্রতিষ্ঠার অনিত আমবাৎ অথবা চর্ম-রোগ, শীতলতা, আর্জতা, বর্ষাকাল, অথবা গ্রীষ্মকালে বাতাতপের আকস্মিক পরিবর্তন বশতঃ উহার উপস্থিতি বা বৃদ্ধি (ভ্রাই)

শীতলতা বশতঃ শর্মের বিলোপ হইয়া দৈন্যিকসিদ্ধো হইতে বিবর্তিত শ্লেষ্ম-নিঃসরণ ।

আর্জ, শীতল, নিমগ্নহে বাসকরা বা কাজকরা বশতঃ রোগ (এরাগ, আস, জাট-স) ।

মানসিক বিশৃঙ্খলা, কোন বস্তুর প্রকৃত নাম মনে করিতে পারা যায় না

চর্মের বেগমলতা, শীতলতায় অতিশয় অমুভূতি, উদ্বেদ, বিশেষতঃ শীতপিত্তের (urticaria) প্রাবণতা রোগীর মর্দি লাগিলে অথবা অনেকক্ষণ শীতলতা ভোগ করিলে শীতপিত্তাদি উৎপন্ন হয় ।

কণ্ঠজ্বর (angina), আমবাড়, ও আরক্তজ্বরের (scarlet fever) পর শোথ শোথ ।— ঘর্ম-গোপ, উদ্বেদ-বিলোপ ও শীত-ভোগের পর শোথ

অতিশয় —আর্দ্রস্থানে মর্দিলাগা বসতঃ অথবা আর্দ্র ক্ষুদ্রাটিকা-কালে, ও উষ্ণকালের শীতলকালে পরিবর্তনে (ব্রাই) ; অতিশয়

বয়স্ক বা শিশুদিগের মর্দিজনিত মূত্রাভাব ; তৎসহ হৃৎকম্প মূত্র ; খালি পায় ঠাণ্ডাজলে হাঁটায় উহার উৎপত্তি ; অনিচ্ছায় মূত্র নিঃসরণ ।

ঋতুপূর্বে গাত্রে উদ্বেদের উৎপত্তি (কোনা —অধিক ঋতুপ্রাব কালে যেহ, গ্রীষ্ম)

সকল শরীরে শীতপিত্ত ; জ্বরহীনতা ; কণ্ঠয়ন, চুলকাইলে পরে জ্বালা উষ্ণতায় বৃদ্ধি ; শীতলতার হ্রাস

মস্তকের কোমলস্থিত আশ্রম, মুখমণ্ডলে, কণ্ঠে, শঙ্খস্থলে (temple), চিবুকে (chin) স্থল, কপিশা মিশ্রিত পীতবর্ণ চিপটিকা (c usts), উহার দ্বিধা লোহিত বর্ণ প্রাস্তাগ, কণ্ঠয়ন করিলে রক্তপাত ।

মুখ-মণ্ডলে অথবা হাতের পিঠে ও আঙ্গুলে, মাংসল, বৃহৎ, মণ্ডল আঁচিল

উপচয় ।—সাধারণতঃ শীতলতার ; শীতল বায়ুতে ; শীতল আর্দ্রকালে, এবং ঋতু, উদ্বেদ, ও ঘর্ম-বিলোপে ; বৃদ্ধি ।

উপশম ।—নড়িয়া চাড়িয়া বেড়াইলে উপশম (ফির, রস) ।

সম্বন্ধ —(১) ব্যাধি-কারক, ও ক্যাণী-সলের সহিত অল্পপূরক সম্বন্ধ । (২) এমিটিক-এমি, বেল, ল্যাকের সহিত প্রতিকূল সম্বন্ধ । (৩) ক্যাঙ্ক, ব্রাই, লাই, রস, সিপির পরে ভাল খাটে । (৪) ল'লা-প্রাব, ও স্থির শীততা, বায়ুনশীতপ্রদাহ, অতিশয় ; ঋতু-পরিবর্তনে অমুভূতি, ও রাত্রিকালীন বেদনা লক্ষণে মার্কের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ ; ক্যাণী-সল রাসায়নিক সমগুণ । (৫) পারদের কুফলে, অথবা অপব্যবহারে ডলকেমেরা ব্যবহৃত হয় ।

ডাইওস্কোরিয়া ভিলোসা ।

(*Dioscorea Villosa*)

বৃক্ষ বা শুবকদিগের আংশান্তর ফলিতা ।

আহারান্তে আগান, বিশেষতঃ চ পায়াদিগের, মধ্যে মধ্যে এবং উদরবেদনার আক্রমণ ।

নাভীর নিকটে উদরে কামড়ানির দ্বারা বেদনা ।

এবল মোচড়ান উদর-বেদনা, নিয়মিত আবেশে উপস্থিতি, যেন অঙ্গগুলি সবল হস্তে ধৃত ও মোচড়ান হইতেছে

শূল-বেদনা ।—সম্মুখদিকে অবনত হইলে ও শয়ন করিলে বৃদ্ধি ; সোজা হইয়া দাঁড়াইলে অথবা পশ্চাদিকে বক্র হইলে উপশম (কলোসিসের বিপরীত) ।

নিজীবস্থায় শুক্রপ্রাব ; সমস্ত রাজি কামিনী বিষয়ক স্পষ্ট স্বপ্ন (ট্রাফে) ; জামুর দ্রব্রলতা , জগনাদের শীতলতা ; অতিশয় নিরাশা (ট্রাফে) ।

আঙ্গুল-হাড়া ; প্রথমাবস্থায় যখন ভীত ও দারুণ বেদনা থাকে, যখন কষ্টক-ভেদবৎ বেদনা প্রথম অনুভূত হয় ; নখের ভঙ্গুরত ।

প্রথম অঙ্গুলি সন্ধির প্রদাহ-প্রবণতা (হিপ) ।

উপচয় । - শয়নে ; উপবেশনে ; দ্বিতীয়া হইয়া অবনত হইলে ; বৃদ্ধি ।

উপশম । - নড়িলে চড়িলে ; হাঁটা কষ্টজনক হইলেও হাঁটিলে ; উপশম ।

সম্বন্ধ ।—কলোসিস, কস, পড, রস, ও মিলির সহিত তুলনা হয় ।

ডিজিটেলিস প্যাপিউরিয়া ।

(*Digitalis Purpurea.*)

নিবৃত্ত-রজস্বাদিগের আকস্মিক উত্তাপাবেশ, তৎপরে অতিশয় দ্রব্রলতা ও অনিয়মিত সবিরাম নাড়ী ; অল্পমাত্র সঞ্চালনে বৃদ্ধি ।

হৃদকপাটের উপসর্গপাতিশূল দ্রব্রল স্বপ্ন

নড়িলে চড়িলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্থগিত হইবে রোগিণীর
এপ্রকার অনুভব (কোকেন—সর্বদা না নড়িলে চড়িলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন
স্থগিত হইবে এপ্রকার অনুভব, ফ্রেন্স)।

আমাশয়ে শ্রান্তি অথবা নিমগ্নতা (Sinking) অনুভব ; দুর্বলতা ; অত্যন্ত
অবসন্নতা ; রোগীর বোধ হয় যেন সে মরিতেছে।

সংসর্গের পর সঙ্গমে হ্রদের অতিশয় দুর্বলতা সংযুক্ত, রাজিকালীন
জ্বরপ্রব।

বক্ষঃস্থলের অতিশয় দুর্বলতা, কথাবলিতে কষ্ট হয় (ষ্টান)।

মল —অতি লঘু ওদ্বার্ব ; বিলম্বে নিঃসৃত, খটিকাকার (চেলি, পড) ;
প্রায় শুষ্ক (ক্য ফ, সিক,) অনিচ্ছায় নিঃসৃত ; মল

পূর্ণ, অনিয়মিত নাড়ী, অতি ধীর ও দুর্বল নাড়ী ;
প্রতি তৃতীয়, পঞ্চম বা সপ্তম স্পন্দনের বিরাম।

মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, মৃতকল্প আকৃতি ও নীলাভ-লোহিত বর্ণ।

হৃকের নীলাভতা, অক্ষি-পল্লব, ওষ্ঠাধর ও জিহ্বার নীলবর্ণ ; নীলরোগ
(Cyanosis)

চক্ষুর পাতার, কানে, ওষ্ঠে ও জিহ্বার শিরার ক্ষীণতা।

বিষম, আয়াস-সাধা, গভীর দীর্ঘ নিশ্বাসের ছায়া শ্বাস।

হস্তাঙ্গুলিতে সহজে ও বারবার ঝাঁজি-লাগা

শোথ —স্ফালোটিনার পরবর্তী ; ও ট্রাইটুম্ ডিজিজ নামক রোগের শোথ ;
ভৎসল মূত্র-মাশ ; আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক শরীরাত্মকের শোথ ; হৃৎপিণ্ডের
বিধান-বিকার জনিত রোগ থাকিলে শোথ সহ মূর্ছা (অরায়ুর স্পর্শ-দেয়
সংযুক্ত শোথে, কনভেলে)

রোগীকে সোজাকরিয়া বসাইলে বা কাঁড় করাইলে মূর্ছার সম্ভাবনা।

উপচয় ।—বসিলে, বিশেষতঃ সোজা হইয়া বসিলে, এবং নড়িলে
চড়িলে ; বৃদ্ধি

সম্বন্ধ ।—সিকোনা ডিজিটেলিসের মুখ্য ক্রিয়া নষ্ট ও উৎকর্ষা বিবর্জিত
করে।

ডিপথিরিনঃম ।

(Diphtherinum)

গণ্ডমালা-ধাতু-ছুষ্ট এবং মোরা বা টিউবারকিউল অর্থাৎ কচ্ছ বা গুটিকা দেশগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে গল-মুখা ও শ্বাস যন্ত্রের বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞীর প্রতিশ্রুতি জনিত রোগের প্রবণতায় এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী ।

দুর্বল বা অবসন্ন জীবনীশক্তিসম্পন্ন স্তুরাং ডিপথিরিন বিধে অভ্যস্ত অসুভূতিবিশিষ্ট রোগী ; প্রারম্ভ হইতেই রোগের আক্রমণের সাংঘাতিকতা (ল্যাক-ক্যান, মার্ক-মায়ের) ।

যাতনাহীন ডিপথিরিনা ; প্রায় বা সম্যকরূপে কেবল বিষয়-নিষ্ঠ (Objective) লক্ষণের প্রকাশ ; রোগী এতই দুর্বল, উদাসীন ও অবসন্ন যে সে কোন বিষয়ের অভিযোগ করেনা ; নিজা বা স্বপ্তি, কিন্তু শুকিলে সহজেই জাগরিত হয় (ব্যাপ্ট, মলফ) তালু-মূল ও তালু-তোরণের (palatine arches) মলিন লোহিত ক্ষৌততা ; কর্ণ মূল ও গ্রীবার গ্রাহর আতশর ক্ষৌততা ; শ্বাসের এবং গলা, নাসিকা ও মুখ হইতে নিঃসৃত স্রাবের অতি দুর্গন্ধ ; জিহ্বার অতিশয় আরক্ততা ও স্বল্প লেপাচ্ছন্নতা ।

ডিপথিরিন বিজ্ঞী পুরু, মলিন-ধূসর বা স্বেদ কপিশমিশ্রিত কাল ; গাত্রতাপ নূন বা স্বাভাবিক অপেক্ষা নিম্ন, নাড়ী দুর্বল ও ক্ষুণ্ণ, হস্ত-পদ শীতল ; এবং রোগীর সুস্পষ্ট দুর্বলতা ; রোগীর অর্ধ-বুদ্ধিশূন্য (Semi Stupid) অবস্থায় পড়িয়া থাকা , চক্ষুর নিঃপ্রভতা ও বিমূঢ়তা (এপিস, ব্যাপ্ট)

আক্রমণের প্রারম্ভ হইতে নাসিকা হইতে রক্তপাত অথবা গভীর অবসন্নতা (এইল, এপিস, কার্ক-এসি) , রোগের প্রায় সূচনা হইতেই হিমাঙ্ক (ক্রোটে, মার্ক-মায়ের) ; নাড়ীর দুর্বলতা, ক্ষুণ্ণতা এবং জীবনী-শক্তির প্রতিক্রিয়ার অতিশয় মিমগ্নতা ।

বেদনা ব্যতীত গলাধঃকরণ করা যায় বটে, কিন্তু তরল পদার্থ বমন বা নাকদিয়া নিঃসরণ হইয়া পড়ে ; শ্বাসের উৎসব দুর্গন্ধ ।

স্বল্পযন্ত্রের ডিপথিরিনার ক্রোম,বাণী-বাই, বা ল্যাক-ক্যান বিফল হইলে ; এবং ডিপথিরিনার পরবর্তী পক্ষাঘাতে, কষ্ট, জ্বল, বিফল হইলে ; ডিপথিরিন ফলপ্রসূ ।

যখন প্রথম হইতেই রোগীর বিপত্তির সম্ভাবন দৃষ্ট হয়, এবং অত্যন্ত সুনির্বাচিত ঔষধেও উপশম বা স্থায়ী উপকার না দর্শে, তখন এই ঔষধের প্রয়োগ হয়।

ডাঃ এলেন পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত উপরোক্ত লক্ষণগুলি এই ঔষধের নির্ভর যোগ্য পরিচালক লক্ষণস্বরূপ অবলম্বন করিয়া উহাদের আরোগ্যসাধন করিয়াছেন

সকল রোগজ-ঔষধের জায় ইহাও ত্রিশ শক্তির নীচে চিকিৎসায় কার্যকর নহে শক্তির আধিক্য ইহার আরোগ্য-কারিতা বিবদ্ধিত হয়। দুই শত শক্তি হইতে সহস্র ও লক্ষ শক্তিতে ইহার ব্যবহার হয়। এই ঔষধের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন ও অবিধেয়। আদত এটিটাকানের জায় হোমিও-প্যাথিক ক্রমে ইহা হইতে কোন প্রকার বিপজ্জনক পরিণাম জন্মে না।

পঁচিশবৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে ডাঃ এলেন বলেন যে প্রতিষেধক ঔষধস্বরূপও ভিপথিরিণ স্কন্দন কাজ করে। এক পরিবারের একজনের ভিপথিরিয়া হইলে অন্তরা এই ঔষধ ব্যবহারে রোগ-মুক্ত থাকে

ড্রোসেরা রোটান্ডিফোলিয়া।

(*Drosera Rotandifolia*)

হৃদয়াকৃতি-কাস ; প্রবল আবেশ, একটির পর অপরাটর শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিতি, প্রায় খাস ছাড়িতে পারা যায় না (পূর্বাঙ্ক ৬—৭ টার সময় আগমন, যে পর্য্যন্ত না খানিকটা হৃদয়াকৃতি উথিত হয় সে পর্য্যন্ত কাসের অবিরতি,—কক-ক্যাউ ; প্রতি কাসেই আবেশকালে নাকদিয়া অধিক রক্তপাত, ইও ; দিবাভাগে ক্রম, স্নাত ও অন্তর্গত কাস, রাত্রিতে সুনিশ্চিত হৃদয়াকৃতি কাসের আবেশ, কোরে কব)।

গাভীর-শব্দ, স্ববভব সংযুক্ত ফুফুর-রববৎ কাস (বার্ধ), দুইপ্রহর রাত্রির পর হামের আক্রমণ-কালে বা তৎপরে বৃদ্ধি ; আগ্নেয়িক, গলরোধকর, এবং বমনোত্তম ও বমন বিশিষ্ট কাস (স্রাই, কাণী-কা)

বালাক-বালাকাগিরের অবিরত গল-কণ্ঠদূরনকর কাস ; রাত্রিতে বালাশে মাথা রাখিবারাজ উহার আরম্ভ (বেল, হাইওস, স্কন্দ)।

যক্ষ্মা রোগে যুবক-যুবতীদিগের সাজিকাজান কাম ; এবং রোগ অথবা পুষ্কর নিষ্ঠীবন ।

কাম ; উচ্চতায়, পানে, গানে, হাতে, ক্রন্দনে, শরনে, ও মধ্যসাজির পরে কামের বৃদ্ধি ।

কামিতে কামিতে অল ও ধোয়া এমন এবং অনেক সময় নাক-মুখদ্বারা রক্ত পতন (কুপ)

স্বরযন্ত্রে পালক থাকার স্থান অল্পভব, উহাতে কামের উদ্ভেদ ।

বহুবার ক হপ-শব্দ-কামের সময়ে অত্যন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব

ধর্ম্মাচার্যদিগের গলাবেদনা ; গল-গহ্বরের গভীর স্থানে থর-স্পর্শ (rough) অবদরন ও শুষ্কতা অল্পভব ; ভগ্ন, গভীর, শক্তিশূন্য স্বর, কথা বলিতে পরিশ্রমের আবশ্যিকতা (এরম) ।

স্বরযন্ত্রে আকুঞ্চন ও তুড়তুড়ি অল্পভব ; স্বরভঙ্গ, পীতবর্ণ, অথবা হরিষ্মণ নিষ্ঠীবন ।

হপশব্দ-কামের পরে সারসাজিক যক্ষ্মা (Laryngeal phthisis) (বায়ুনলী-ভ্রুজের প্রতিক্রিয়া, কক-ক্যাট্ট) ।

সম্বন্ধ ।—(১) নব্যভমিকার সহিত অল্পপূরক সম্বন্ধ (২) অ শ্ব, মল, ভিরের পরে ড্রোসেরা ভাল খাটে। (৩) ড্রোসেরার পরে ক্যাট্ট, পল, মল ব্যবহৃত হয় (৪) আক্কেপিক কামে সিনা, কোরাল, কুপ, ইপি, জাম্বুর সহিত ড্রোসেরার তুলনা হয় । যক্ষ্মা রোগের অবিস্ময়, যক্ষ্মাশ্রম, নৈশকাম অনেক সময়ে এই ঔষধে উপশমিত হয় ।

হানিম্যান তাঁহার মেটনিক মোডিক্স পিউব নাসিক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে ৩০ শক্তির একমাত্রা মাত্র ড্রোসেরা সেবনে বহুবারী হপ শব্দ-কাম সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য প্রাপ্ত হয় সাত ষাটদিনের মধ্যে নিশ্চিতরূপে আরোগ্য অন্বে । প্রথম মাত্রার অব্যবহিত পরে দ্বিতীয়মাত্রা কখনও দিতে নাই ; উহাতে যে কেবল প্রথম মাত্রার স্রবণ রহিত হয় এমন নহে, অধিকন্তু রোগীর অপকার হইয়া থাকে ।

থুজা অক্সিডেন্ট্যালিস ।

(*Thuja Occidentalis*)

রস-প্রধান-ধাতুতে অর্থাৎ যাহাদের *বীরে সাইকোসিস বিষ (মাষক দোষ) আছে তাহাদের পক্ষেই থুজা বিশেষ উপযোগী ।

সলফারের সহিত “সোরা-দোষের” অথবা মারকিউরির সহিত উপদংশবিষের যে সম্বন্ধ সাইকোসিস-দোষের সহিত থুজারও সেই সম্বন্ধ ।

ত্বকে বা শৈথিল্য বিলম্বিত অঁচিল, উপমাংস প্রভৃতি উৎপন্ন হইলেই শরীরে সাইকোসিস-দোষ আছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়

লসিকা-প্রধান (Lymphatic) ধাতুতে, অতিশয় গাংসল দেহে, ও মলিনবর্ণ মুখাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ কেশ, এবং অসুস্থ স্বক বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের *বীরে থুজার ভাল ক্রিয়া দর্শে ।

গে-বীজে টিকা গ্রহণের কুফল (এন্ট-টার্ট, সিলি) ; এবং বিলুপ্ত কিংবা কুচিকিৎসিত প্রমেহের মন্দ ফল (মেড) ।

যেমন কোন অপরিচিত ব্যক্তি পার্শ্বে রহিয়াছে ; আত্মা ও দেহ যেন পৃথক্ হইয়াছে ; উদরে যেন কোন জীবন্ত প্রাণী রহিয়াছে ; যেন কোন দৈবীশক্তির প্রভাব জন্মিয়াছে ; এই প্রকার স্থায়ী মনোভাব ।

উন্মাদিনী নারীরা স্পর্শ করিতে বা নিকটে যাইতে দেয়না

চক্ষু নিম্নীলন করিবার সময় শিরোঘূর্ণন ।

শিরঃপীড়া —মস্তক-প্রাচীরের অস্থিতে (parietal bone) যেন প্রেক বিদ্ধ হইতেছে (কফি, ইগ্নে) ; অথবা যেন ব্যথিত স্থানে একটা হুজ (convex) বৃত্তাঘ প্রচাপিত হইতেছে ; এরূপ শিরঃপীড়া ; অধিক ইন্দ্রিয়-স্বপ্ন-সন্তোষে ; অতিরিক্ত উত্তাপ লাগিতে ; ও চা-পানে (সেলে) ; উহার বৃদ্ধি ; মাষক-দোষ বা উপদংশ-দোষ হইতে উৎপন্ন পুরাতন শিরঃপীড়া ।

শাদা মশক থুস্কি (dandruff) ; কেশের শুষ্কতা ও পতন ।

চক্ষু।—নবজাত শিশুদিগের মাষক-দোষ বা উপদংশ-দোষ জনিত চক্ষু-প্রদাহ ; অঁচিল বা ফোকার ন্যায় বড় বড় উৎসাদন (granulations) উদ্ভব ও আচ্ছাদনে মন্দাবস্থা প্রাপ্তি ; অনাবৃত রাখিলে বোধ হয় যেন শীতল বায়ুর স্রোত উহার অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে ।

অক্ষি-পুট।—রাত্রিতে চক্ষুর পাতার সংযোজন, উহার পাতাদেশের শুষ্কতা ও সমত্বতা; অঞ্জনি ও পক্ষার্ধুদ (tarsal tumour); শূল, *জু, শুল্ক শুল্ক উপমাংসের তায় গ্রাহ্য, কঠিন অঁচিল, টাকিমেষ্ট্রি প্রয়োগে আংশিক উপশম, কিন্তু অনারোগ্য।

কর্ণ।—পুরাতন কর্ণ প্রদাহ, পচা মাংসের তায় পুষ্যাব; উৎসাদন, অম্লজল লব, কোষমঃ, সহজে রক্তস্রাবী বহুপাদ (polypus)

পুরাতন প্রতিষ্ঠায় (catarrh)—সক্ষোটে জন্মের পরবর্তী; গাঢ় সবুজবর্ণ শ্লেষ্মা, পুয় ও রক্তস্রাবী (পলস) ; প্রতিষ্ঠায়।

দন্তের মূলদেশের ক্ষয়প্রাপ্তি কিন্তু শিখর-দেশের স্বস্থতা (মেজ।—প্রাক্ত-ভাগের ক্ষয়প্রাপ্তি, ষ্টাক) ; দন্ত খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, পীতবর্ণ ধারণ করে (সিফি)

রাগুলা।—জিহ্বার নিম্নস্থ আর্কুদের দ্বিধা নীলবর্ণ অথবা জিহ্বার উপরের ও মুখ-বিবরের শিরার ক্ষীণতা (এম)।

চা-পান অনিত দন্ত-বেদনা

‘নাৎক ফোৎ করিলে ক্ষয়-প্রাপ্ত দন্তের গহ্বরে বা উহার পার্শ্বে (কিউলেক্স) প্রচাপনবৎ বেদনা’।—বিনিম্বোষণ

উদর।—উদরে যেন কোন অস্ত্র ডাকিতেছে, *জীব কিছু যেন নড়িতেছে ; বাম ভিষ্টায় প্রদেশে (left ovarian region), হাঁটবীর বা ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইবার সময় যজ্ঞনাশ্রম, জালাকর বেদনা, তজ্জন্ত অবস্থা বসিয়া থা শুইয়া পড়িতে হয় (জোকা, অষ্ট) ; প্রতি ঋতু-কালে আধিক্য

কোষ্ঠবদ্ধতা,—সরলাজে প্রবল বেদনা বশতঃ মল-তাগ-চেষ্টায় স্থগিত হইতে হয় ; মল খানিকটা বাহির হইয়া পুনরায় ভিতরে প্রবেশ করে (স্থানি, সিলি)।

অর্শ-বলির ক্ষীণতা, বসিবার সময় বেদনার অত্যন্ত তীব্রতা।

অতিসার প্রত্যয়ে উপস্থিত ; অধিক বায়ুসহকারে সবেগে নিঃসৃত (এলো) ; ও পিপা হইতে জলপতনের ন্যায় গলগল শব্দবিশিষ্ট অতিসার ; প্রাতরাশ, কফিপান, বসাক্ত জব্য আহার, গো-বীজে ঢাকা-গ্রহণ, ও পলাতু ভোজনে উহার বৃদ্ধিপ্রাপ্তি।

মল-দ্বারের বিদারণ (fissure), স্পর্শে ব্যথিততা, চারিদিকে চেপ্টা অঁচিল, বা আর্জ শৈথিল্য উপমাংস (condylomata) ।

অপত্য-পথের (vagina) অত্যন্ত অমুভূতি বশতঃ সংসর্গের প্রতিবন্ধকতা (প্লাট) :—পরিণততা বশতঃ প্রতিবন্ধকতা লাই, লাইসি, ট্রাউম) ।

চর্ম ।—চর্মের মলিন দৃশ্য ; স্থানে স্থানে কপিশ বা কপিশমিশ্রিত শুষ্ক চিহ্ন ; বৃহৎ, সবুজ, বীজাল (seedy) অঁচিল (ষ্ট্যাক) ; কেবল আবৃত স্থানে উদ্ভেদ, চুলকাইলে জালা

মাংস, অস্থি হইতে আঘাতিতবৎ অমুভূত হয় (ফাইটো টাচিয়া তোলাবৎ অমুভূত হয়-হুঃম,)

মূত্র-ত্যাগান্তে মূত্র মার্গে যেন মূত্র তুড় তুড় করিয়া ফরিতেছে একপ্রকার অমুভব ; মূত্রত্যাগের শেষ ভাগে তীব্র কর্তনবৎ ঘাতনা (মাসার) ।

উরুদয়ে জ্বরের শীতের আরম্ভ ।

ঘর্ম —কেবল অনাবৃতস্থানে, অথবা মস্তকব্যতীত সর্বশরীরে (মিলিশিয়ার বিপরীত) ঘর্ম ; নিদ্রাকালে ঘর্ম, জাগ্রৎ হইলে উহার বিরতি (শ্বাসুর বিপরীত) ; রাত্রিতে প্রভূত অল্প গন্ধ, ও দুর্গন্ধ ঘর্ম ।

জননাদে মধুর স্রাব গন্ধবিশিষ্ট ঘর্ম । হাঁটবার সময় অঙ্গগুলি কাঁঠ নির্গীতবৎ বোধ হয় । *রীর, বিশেষতঃ অঙ্গগুলি যেন কাঁচনির্মিত এবং সহজেই ভাঙ্গিয়া যাইবে, একপ্রকার অমুভব ।

বিলুপ্ত প্রমেহ ।—প্রমেহের স্রাব অবরুদ্ধ হইয়া সন্ধি-বাত, প্রোট্টের প্রদাহ ; মাষক দোষ, ধ্বজভঙ্গ ; উপমাংস, ও অসংখ্য বহুল সর্সাদীন উপজবের উৎপত্তি । নথের বিকৃতি ও ভঙ্গুরতা (এণ্ট-ক্রুড) ।

উপচয় ।—রাত্রিতে, শয্যার উত্তাপে ; পূর্বাঙ্ক ৩ টা ও অপরাহ্ন ৩ টার সময় ; শীতলতায়, অর্জবায়ুতে ও মাদকদ্রব্যে ; বৃদ্ধি ।

সম্বন্ধ ।—(১) মেড, স্রাব, ও মিলির সহিত অমুপূরক সম্বন্ধ (২) ক্যান-স্রাট, ক্যান, কোপে, টেফের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ । (৩) উপস্থের মুণ্ডাবরক জকের (prepuce) কাঁচিলে সিনাব, থুঙ্গা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (৪) মেড, মার্ক, ও নাই-এসির পরে থুঙ্গা ভাল খাটে ।

থেরিডিয়ন ।

(Theridion Curassavicum)

সময় অতিশয় শীঘ্র শীঘ্র অতীত হয় এক্ষণ অনুভব (অতি ধীরে ধীরে, আর্জ-নাই, ক্যান-ইও নয় য)

শিরোধূর্নন — চক্ষু বুজিলে (ল্যাক, থুজ, চক্ষু মেজিলে, ট্যাক ; উপরের দিকে চাহিলে, পল, সিলি ;) যে কোন যৎসামান্য শব্দ হইতে ;
শিরোধূর্নন কর্ণ-রোগ সংক্রান্ত শিরোধূর্নন ।

বিবমিষা ।—অত্যন্ত মাত্র সঞ্চলনে বিশেষতঃ চক্ষু বুজিলে ; ও ক্ষতবেগে গাড়ীতে চড়িলে ; বিবমিষা ।

শিরঃপীড়া — নড়িতে আরম্ভ করিলে চক্ষুর পশ্চাতে ক্ষুদ্রাকার সূক্ষ্ম ; মস্তিষ্কের গভীর স্থানে পবন, শয়নে বর্জিত (ল্যাক) ; এবং অথোরা গৃহে হাঁটিলে অথবা অল্পমাত্র মস্তক নাড়িলে অতিশয় বর্জিত ; শিরঃপীড়া

প্রত্যেক শব্দ যেন সমগ্র শরীরের অভ্যন্তর দিয়া প্রবিষ্ট
হয় একপ্রকার অনুভব এবং উহাতে বিবমিষা ও শিরোধূর্ননের
উৎপত্তি

নাটিকার পুরাতন প্রতিষ্ঠান, গাঢ়, পীতবর্ণ, হরিভাঙ, দুর্গন্ধ প্রাণ (পঙ্গু, থুজ)

দন্ত-বেদনা ; প্রত্যেক তীব্র শব্দ দন্তে প্রবিষ্ট হয়

আয়বীয়া রমণীদিগের সামুদ্রিক বিবমিষা ; জাহাজের গতি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার নিমিত্ত উহারা চক্ষু রুদ্ধ করিয়া রাখে, এবং নিদারুণ বিবমিষায় আক্রান্ত হয় ।

জ্বকাস্থির নীচে, ষাড় পর্যন্ত প্রসারিত বাম বক্ষের উর্দ্ধভাগে প্রবল স্ফীবেদন (এনিম, মাইরি, পিক্স, সলফ) ।

সমুদয় অস্থির উপর ভয়বৎ বেদনা ।

বশেষকার (verte brae) ব্যবধান স্থানে অতিশয় অনুভূতি, মেরুদণ্ডে চাপ না লাগে অক্ষত হেলান না দিয়া এক পার্শ্বে বসি (চিন-সল) ; অল্পমাত্র শব্দ ও ঘরের মেজেতে পায়ের সংঘর্ষে উহার বুকি ।

বয়স্হাবস্থায়, গর্ভাবস্থায় এবং বিরজাবস্থায় (climacteric years) অত্যন্ত
স্বাভাবিক অনুভূতি ।

রেকাইটিস, কেরিজ, ও নিক্রোসিস রোগে থেরিডিয়ন রোগের মূলদেশে
প্রবিষ্ট হইয়া উহার কারণ বিনষ্ট করে ।

থাইসিস ফ্লোরিডা রোগে প্রারম্ভাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে
অনেক সময় ঐতদ্বারা আরোগ্য লাভ হয় ।

গর্ভমালা রোগে, অনির্বাচিত ঔষধেও উপকার না দর্শিলে এই ঔষধ
ব্যবহৃত হয় ।

সম্বন্ধ । - ক্যাক এবং লাইকোর পরে এই ঔষধ ভাল খাটে ।

থ্যাস্পি বাস্‌ পেস্টোরিস ।

(*Thlaspi Bursa Pastoris*)

শরীরের প্রত্যেক দ্বার হইতে ও ভূত মৈরিক রক্তস্রাব ; রক্ত মলিন ও
সংযত ।

অরায়ুর রক্তস্রাব ।—প্রবল গলী ও অরায়ু উদর-বেদনা সহ , হরিৎপাত্ত
(chlorosis) রোগে ; গর্ভপাত্ত, গর্ভস্রাব বা এসবের পরে ; বিরজকালে
অরায়ুর ক্যানসার সহকারে ; রক্তস্রাব (ফস, অষ্ট) ।

ঋতু - নিয়মিত কালের অনেক পূর্বে ; আভ্যন্তর অধিক পরিমাণে,
অধিক দিন পর্য্যন্ত (আট, দশ, পনের দিন) ; আন্তে আন্তে আরম্ভ, প্রথম
দিন কেবল চিহ্ন মাত্র ; দ্বিতীয় দিন উদর-বেদনা, বমন ও বড় বড় ঝণ্ডা সংযুক্ত,
রক্তস্রাব ; এক পর্য্যায়ের পর অপর পর্য্যায়ের অধিকতর রক্তপাত্ত

অরায়ুর নিষ্ক্লিয়তা বশতঃ রক্তস্রাব অথবা ঋতুর বিলম্ব ; উহাতে অবসন্নতা
অস্বাভাবিক, ঋতুর এক পর্য্যায় না যাইতে যাইতেই অপর পর্য্যায় উপস্থিত হয় ।

প্রদর —রক্তাক্ত, মলিন বর্ণ, দুর্গন্ধ স্রাব ; ঋতুর কয়েক দিন পূর্বে ও পরে
উহার উপস্থিতি

সম্বন্ধ ।—সিনাপিস, ট্রিলিয়ম, ভাইবারনম ও অটিলেগোর সহিত এই ঔষধের তুলনা হয় ।

নক্সভমিকা ।

(*Nux Vomica*)

কৃশদেহ, কোপনস্বভাব, কৃষ্ণকেশ, পিত্ত-প্রধান, বা রক্ত-প্রধান ধাতু, বিবাদ-প্রিয়, হিংসা-দ্বেষ-প্রবণ, বিষম ব্যক্তিদিগের পক্ষে নক্সভমিকা বিশেষ উপযোগী ।

সূক্ষ্মকায়, কোপন-স্বভাব, স্নায়বীয় প্রকৃতির মত্তপারীদিগের অগ্নিমান্দ্য ও বর্শ-প্রবণতা থাকিলে (লঘু-কেশ, নীল-নয়ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে, লোবে)

হানিম ন বপেন যে অধীরতা, কোপনতা, হিংসা-দ্বেষ, অথবা প্রতারণতা-প্রবণতা ও ব্যগ্রতা বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে নক্সভমিকা ভাল খাটে

কোপনতা সংযুক্ত উৎকর্ষ ও আত্মহত্যা করিবার প্রবৃত্তি, কিন্তু মস্তিষ্কে ভয় বিষাদবায়ু :—অধ্যয়নশীল, সাহিত্যিক, যাহারা অধিক সময় বাড়ীতে থাকেন, অব্যায়াম বশতঃ পীড়িত হন, যাহাদের আত্ম-মিক ও উদরের উপসর্গ এবং কোষ্ঠ-বদ্ধ থাকে ; বিশেষতঃ মত্তপারীদিগের পীড়ায় এই ঔষধ কার্যকরী

বাহ্য সংস্কারে ; গোলমালে ; গন্ধে ; আলোকে বা গীতবাণে (নক্স-ম) ; অতিরিক্ত অনুভূতি ; সামান্য অস্থিরতা ও অসহ্যতা (ক্যাম) ; প্রত্যেকটি নির্দোষ কথায় বিরক্তি (ইথে)

বিশিষ্ট ও সাবধান ব্যক্তি, যাহারা অতি সহজেই উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে ; খিটখিটে ও নাছোড়বন্দা লোকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ।

কফি, তামাক, উত্তেজক পানীয় জ্বা, অধিক মসজাযুক্ত খাদ্য গ্রহণ, অপরিমিত আহার (এট-জু) ; অধিক দিন ব্যাপী অতিরিক্ত মাসিক-

শ্রম ; বসিয়া বসিয়া থাকিবার অভ্যাস , নিদ্রাহীনতা (কক, কণ্ঠ, নাই-এসি),
সুগন্ধি জ্বা বা পেটেন্ট ঔষধ ব্যবহার ; বিশেষতঃ উষ্ণকালে শীতল প্রস্তরের
উপরে উপবেশনের মন্দফল

এলোপ্যাথি বা কবিরাজী চিকিৎসায় উষ্ণবোধ্য ঔষধাদি সেবনের পরে কোন
রোগীর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে অনেক সময় প্রথমেই
নক্স-ভমিকা ব্যবস্থায় হইয়া থাকে কিন্তু লক্ষণের সাদৃশ্য না থাকিলে
ব্যবহার করা বিধেয় নহে

চৈতন্য সংযুক্ত টকার (টীক), ক্রোধ, চিন্তা-বিকার, স্পর্শ ও
সংলগ্নে উহার বৃদ্ধি

ঝাঁঝ লাগার মত, ও পাড় মারার মত অবিরাম বেদনা, নড়িলে
চড়িলে ও স্পর্শ করিলে উহার আধিক্য ।

গন্ধে, প্রাতঃকালে, আহাৰান্তে ; প্রত্যেক প্রসব-বেদনার পরে ;
মূচ্ছার প্রবণতা (নক্স-ম, সলফ)

সারাহে, শয়নের কয়েক ঘণ্টা পূর্বে, যখন বসিয়া থাকা যায় তখন না
ঘুমাঁইয়া পারা যায় না, এবং রাত্রি ৩টা বা ৫টার সময় জাগিতে হয় ; রাত্রি
প্রভাত হইবার কালে আবার এক প্রকার স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা জন্মে, উহা হইতে
রোগীকে সহজে জাগরিত করিতে পারা যায় না, তৎপরে তাহার শ্রান্তি ও
দুর্জলতা জন্মে (পলসেটিলার বিপরীত)

প্রতিষ্ঠার :—শিশুদিগের নাসারব (এম-কা, জায়ু) ; রাত্রিতে শুক,
দিবাভাগে তরল প্রতিষ্ঠার (coryza) ; উষ্ণ কক্ষে বিবর্জিত, শীতল বায়ুতে
উপশমিত ; শীতল স্থানে ও প্রস্তর নির্মিত সিঁড়িতে বসিয়া উৎপন্ন ; প্রতিষ্ঠার

উদগার ।—অম্ল, তিক্ত উদগার ; অত্রফুলভাসহ ২তিদিন প্রাতে
বিবমিষা ও বমন ; আহাৰান্তে উদগার ।

বিবমিষা ।—আহাৰান্তে ; প্রাতে ; ও ধূম-পানান্তে ; অবিরাম
বিবমিষা । রোগী বলে যে বমন করিতে পারিলেই সে ভাল থাকিতে পারে ।

আমাশয় —আহারের এক বা দুই ঘণ্টা পরে আমাশয়ে প্রস্তর-চাপার
জ্বা চাপাভব (আহাৰের অব্যবহিত পরে, কালী-বাই নক্স-ম) ; মুখে
জল-উঠা, আমাশয়ের অনিখিলতা, কাপড় ঢিল করিয়া দিতে হয় ; আহাৰের

পরে দুই তিন ঘণ্টা পর্যন্ত মানসিক পরিশ্রম করিতে পারা যায় না ; আহারান্তে নিদ্রা লুপ্ত, উৎকর্ষা বিরক্তি, ভ্রাণ্ডি সেবন, কফি পান, উগ্র ঔষধ সেবন, স্নান জাগরণ, ভোজন-বিলাস প্রভৃতি কারণে এই সকল লক্ষণের উৎপত্তি

কোষ্ঠবদ্ধতা ; বারবার নিষ্ফল মল-প্রবৃত্তি, অল্প অল্প মল-নিঃসরণ, (উদরোর্দে—ইথে, ভিরে) ; যেন মলত্যাগ শেষ হইল না এরূপ অনুভব ।

বারবার মল-প্রবৃত্তি ; উৎকর্ষা ও নিষ্ফলতা, মল-ক্রিয়ায় কিছুকাল পর পর্যন্ত উহার আতিশয্য ; প্রাতে উথানান্তে, ও মানসিক পরিশ্রমের পর উহার উপস্থিতি (নিশ্চেষ্টতা, ও অপ্রবৃত্তি, ভ্রাণ্ডি, ওপি, সলফ) ।

আহারে চির জীবন বিরেচক ঔষধ সেবন করিয়া থাকেন তাঁহাদের পর্মাণ-ক্রমে কোষ্ঠ-কাঠিগ ও অতিসার (সল, ভিরে)

ঋতু —নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্বে, অতিরিক্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রভূত ঋতু ; অপবা প্রারম্ভে ও পরে অল্প সহ কতিপয় অধিক দিন স্থায়ী ঋতু ; প্রতি পক্ষে পক্ষে ঋতু ; ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে কখনও ঋতু উপস্থিত হয় না ; ঋতু একবার ধামে আবার উপস্থিত হয় (সল) ; ঋতুকালে ও তৎপরে পুরাতন লক্ষণের বৃদ্ধি ।

প্রসব-বেদনা ।—প্রবল, আকস্মিক প্রসব-বেদন ; উহাতে মল-বেগ বা মুত্র-বেগের উৎপত্তি ; পৃষ্ঠে বেদনার আধিক্য ; উষ্ণ গৃহে থাকার ইচ্ছা ।

আবদ্ধ অঙ্গবৃদ্ধি (hernia), বিশেষতঃ নাভী দেশীয় অঙ্গ-বৃদ্ধি ।

পৃষ্ঠ বেদনা ।—ইন্দ্রিয়-দৌরল্য বা ক্রান্তিম-মৈথুন হইতে উৎপন্ন কটিবেদনা ; ও পৃষ্ঠ-বেদনা, শয্যা পাল ফিরিতে হইলে উঠিয়া বসিয়া পাল ফিরিতে হয়

শীতলতায় বা শীতল বায়ুতে অপ্রবৃত্তি ; অত্যন্তমাত্র নড়িলে চড়িলেই শীতানুভব, অনাবৃত হইলেই শীত ; জ্বরের শীতোত্তাপ ও ঘর্ষ প্রত্যেক অবস্থায়ই আবৃত থাকিবার আবশ্যিকতা ।

জ্বর ।—অতিশয় উত্তাপ সর্ব শরীরের আলাকর উত্তপ্ততা (একন), মুখমণ্ডলের আরক্ততা ও উত্তপ্ততা (বেগ), কিন্তু তথাপি রোগী নড়িলে চড়িলে বা অনাবৃত হইলে শীত অনুভব করে ।

উপচয়—প্রাতে ; রাত্রি ৪টার সময় নিদ্রা হইতে জাগিয় ,
মানসিক পরিশ্রমে ; আহাৰাশ্বে বা অতিরিক্ত আহাৰে ; মসজা ভক্ষণ ;
মাদক দ্রব্য সেবনে ; স্পর্শে, শব্দে ও ক্রোধে এবং শুষ্ককালে বৃদ্ধি

উপশম ।—সায়াহ্নে ; বিশ্রামে , শয়নে ; এবং আর্দ্রকালে ; হ্রাস (কষ্ট)

সম্বন্ধ - (১) প্রায় সকল রোগেই সলফারের সহিত নব্যভমিকার
অনুপূরক সম্বন্ধ । (২) জ্বরের সহিত নলের প্রতিকূল সম্বন্ধ ; জ্বরের
পূর্বে বা পরে নকা ব্যবহৃত হয় না । (৩) আস , ইপি, ফস, সিপি, সলফের
পরে নক্স ভাল খাটে । (৪) নলের পরে ব্রাই, পলস, সলফ ভাল খাটে
(৫) শরীর ও মনের বিশ্রাম-সময়েই নব্যভমিকার ভাল ক্রিয়া দর্শে, এজন্য শয়ন
করিবাব কয়েক ঘণ্টা পূর্বে ইহা সেবন করা উচিত

নক্স-মশ্চটা ।

(*Nux moschata*)

স্নায়বীয়, গুলাবায়ু প্রকৃতির (hysterical) নারী, ও বালক-বাণিকাদিগের
পক্ষে ; যাহাদের শুষ্ক ত্বক্ অর্থাৎ যাহাদের কদাচিৎ ঘর্ম্মস্রাব হয়,
তাহাদের পক্ষে এবং গর্ভাবস্থার অন্তর্গত ; নক্সমশ্চটা বিশেষ উপযোগী ।

বৃদ্ধ বয়সের দুর্বলতা ; বৃদ্ধদিগের অগ্নিমান্য

আলোক ; শ্রবণ ; গন্ধ ; ও স্পর্শে অতিশয় অসুভূতি

সকল রোগের সহিতই তন্দ্রালুতাওনিদ্রালুতা (এন্ট-টার্ট, ওপি)
অথবা সামান্য বেদনায় ও মুর্ছার প্রবণতা (হিপ) ; রোগে
নিদ্রালুতার উৎপত্তি করা ।

স্বাপ্ত ও অট্টেভন্ত ; অদম্য নিদ্রা

বিমনস্কতা, চিন্তা করিতে পারা যায় না ; সকল বিষয়েই অতিশয় উদাস

স্মৃতি-শক্তির দুর্বলতা বা বিলোপ (এনাক, ল্যাক-ক্যান, লাই) ।

পঠন, শিখন, ও আলাপনে চিন্তার বিলোপ প্রাপ্তি, ভুল কথার ব্যবহার ;
সুপরিচিত পথ চিনিতে না পারা (ক্যান-ইও, ল্যাক) ।

পরিবর্তনশীল প্রকৃতি ; একবার হাঁশ, পরমাণেই কন্দন (কোক, ইয়ে)
গাঙীর্ঘ্য হইতে প্রফুল্লতা, প্রফুল্লতা হইতে গাঙীর্ঘ্য অকস্মাৎ পরিবর্তন (মাট)

চক্ষুর শুষ্কতা ; এত শুষ্কতা যে অক্ষিপুট রুদ্ধ করা যায় না

মুখ-বিবরের অতিশয় পরিশুদ্ধতা (এপিস গ্যাকে) ; জিহ্বার

এত শুষ্কতা যে উহা তালুকায় সংলগ্ন হইয়া থাকে ; ঠাণ্ডা ভুজার
শ্রায় বোধ হয় ; গলার শুষ্কতা ; ও দৃঢ়তা, পিপাসাভাব (পলস) ।

প্রকৃত পিপাসা ও জিহ্বার পরিশুদ্ধতা ব্যতীতও জিহ্বার অতিশয় শুষ্কতা
অনুভব ।

যে সকল অঙ্গে ভর দিয়া শয়ন করা যায় তাহার অতিশয় স্পর্শ-দেষ (ব্যাপ্ট,
পাইরে) ; শয্যাশ্রিত জগ্মিবার সম্ভাবনা

অল্প কিছু অতিরিক্ত আহার করিলেই শিরঃশীড়া অগ্নে, আহার-কালে
অথবা আহারের অব্যবহিত পরে আমাশয়ে বেদনা, পূর্ণতা ও যাতনা
(কালী-বাই)

প্রত্যেকবার আহারের পরে উদরের অতিশয় ক্ষীণতা

অতিসার ।—গ্রীষ্মকালে শীতল পানীয় দ্রব্য সেবন করাতে, শরৎকালের
এপিডেমিকে শাদা মলবিশিষ্ট (কলচি) ; আগমনেওয়া দুগ্ধপান বশতঃ ; দস্তোদগম-
কালে ; গর্ভ-কালে অতিসার ; তৎসহ নিদ্রালুতা ও গূর্ছা শরৎকালে শুভ্রবর্ণ,
দুর্গন্ধ ব্যাপক অতিসার (কলচি) ।

প্রতি ঋতু-কালে, বিশেষতঃ নিদ্রার সময় মুখমধ্য, গল-মধ্য, ও জিহ্বার
অসহ্য শুষ্কতা ।

ঋতুর পরিবর্তে প্রদর জ্বাব (কক), শুষ্ক জিহ্বা সহকারে নিদ্রা হইতে
জাগরণ (ল্যাক) ; বায়ু বা বাষ্প সদায় বশতঃ জ্বরায়ুর ক্ষীণতা (ল্যাক-ক্যান,
লাই) ।

বায়ুর প্রতিকূল দিকে হাঁটাতে সহসা শ্বস-ভঙ্গ (ইউফ, হিপ) ।

কাস —শয্যায় উষ্ণ হইলে ; অতিরিক্ত উত্তপ্ততা জগ্মিলে ; গর্ভ-কালে
(ক্যান), জ্বানে ; জলে দাঁড়াইলে ; ও শীতল অন্ধকার স্থানে বাসে (ছাট-সল)
কাসের উৎপত্তি ; আহারান্তে উহার তরলতা, পানান্তে শুষ্কতা ।

নিজ্জা । — দুনিবার তজ্জালুতা ; মত্ততার স্থায় জড়তা, কোমা (তজ্জা-দোষ) ;
নীরব ও অচল ভাবে পড়িয়া থাকা ; মত্তত বিমুদিত চক্ষু (মশক খাস সহ, ওপি, ।

পা ভিক্ষাতে ; ও উত্তপ্ত অবস্থায় বায়ু-প্রবাহ লাগাতে (একন, ভাই)
বাতের পীড়া , শীতল আর্দ্র ঋতুতে, অথবা শীতল আর্দ্র বজ্রে (হ্রস) উহার বৃদ্ধি ;
বাম স্বক্কের বাত (ফির - দক্ষিণ স্বক্কের, স্থান, ষ্ট্রন) ।

গাড়ীতে বিচরণ-কালে পৃষ্ঠ-বেদনা

শ্রান্তি, অতি অল্পমাত্র পরিশ্রম করিলেও শয়নের আবশ্যকতা ।

উপচয় । শীতল, আর্দ্র, ঋজাবাত্ত বিশিষ্ট সময়ে (রোড) , ঋতুর
পরিবর্তনে শীতল আহার, জল, ও শীতল স্নানে, শকটারোহণে (ককু),
সঞ্চাঙ্গনে ; এবং ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে ; বৃদ্ধি (অব্যথিত পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি,
পলস)

উপশম । — শুষ্ক, উষ্ণকালে ; উষ্ণগৃহে ; ও উষ্ণবজ্রে আবৃত হইলে ;
হ্রাস

সম্বন্ধ । — পারদের ধূম নিশ্বাসন মীস-শূল, তার্পিন তৈল, এবং মদিরা,
বিশেষতঃ মদ্য বিষারমদিবর মদ্য ফল নকুমশেচট' বর' বিনষ্ট হয়

নাইট্রিক এসিড ।

(Nitric Acid)

দূঢ় পেশীতন্ত্র, মলিনবর্ণ মুখাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ চুল ও চক্ষু, স্নায়বীর প্রকৃতি
এবং গৌরান্ন অপেক্ষা খ্যামাঙ্গ কৃষ্ণ ব্যক্তিদ্বিগের পক্ষেই নাইট্রিক এসিড বিশেষ
উপযোগী ।

পুরাতন রোগগ্রস্ত যে সকল ব্যক্তিদ্বিগের সহজে শর্দি লাগে ; ও সহজে
অতিসার জন্মে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী ; যাহারা কোষ্ঠবদ্ধতায়
কষ্ট পায় তাহাদের পক্ষে ইহা কদাচিৎ উপযোগী হয়

অতিশয় দুর্বলতা ও অতিসার সংযুক্ত বৃদ্ধিদ্বিগের পক্ষেও নাইট্রিক এসিড
উপযোগী

অত্যধিক শারীরিক উপদাহিতা

বেদনা।—চৌচফুটার ন্যায় ভেদন ও বেধনবৎ বেদনা ; সহসা

আবির্ভূত ও সহসা তিরোভূত ; বাতাতপ বা ঋতুর পরিবর্তনে উপস্থিত ;
নিদ্রাকালে প্রকাশিত ; এবং স্থানে স্থানে সন্তোষ দমনসদৃশ দংশনবৎ
যাতনানিশিষ্ট ; বেদনা ।

অনুভূতি -- মাথার চারিদিকে, ও হাড়ের চারিদিকে দিতার বন্ধনের স্থায়
(কার্ক-এসি, সল) ; কণ্ঠস্থানে, ক্ষতস্থানে, অর্শে, গল-মধ্যে ও পাদ-নখের কুণীতে
চৌচফুটার ন্যায় অনুভব, যৎসামান্য স্পর্শে উহার বৃদ্ধি ।

পুরাতন রোগ -- কোন তীব্র বিষজনিত ; পারদ, উপদংশ ও গণ্ডমালা
হইতে উৎপন্ন ; এবং জীর্ণ শীর্ণ শরীরে প্রকাশিত ; পুরাতন রোগ

ক্রমাগত নিদ্রাশূন্যতা, দীর্ঘকালস্থায়ী উৎকর্ষ ; রোগীর শুষ্কায় যন ও
শরীরের অতিরিক্ত শ্রম (কক) ; প্রায়তন বন্ধুর বিয়োগে মানসিক যাতনা ;
ঔদাস্য ; জীবনে বিতৃষ্ণা, ঋতুর পূর্বে বিষম্বতা ।

স্বীয় রোগের বিষয়ে অতিশয় উৎকর্ষা ; বিগত উপজব সম্বন্ধে অবিবর্ত
ভাবনা ; ওলাউঠার অতিরিক্ত ভয় (আস) , সায়াহ্নে অপ্রফুল্লতা ও আকুলতা ।

কোপনতা ; অবিমুখ্যকারিতা ; বৈরসাধনতৎপরতা ; ঘৃণাপূর্ণতা ; হৃদম্যতা,
বিষেযিতা ; সমাপ্রার্থনা ও অবিচলিততা ।

ঐতিশক্তির ক্ষীণতা, ঘোড়ার গাড়ীতে বা রেলের গাড়ীতে চড়িলে উহার
আধিক্য (গ্রাফ) ।

পাকা রাস্তায়, গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দে অতিশয় অনুভূতি ; টুপীর চাপে
মাথা-ধরা (ক্যাক, ফস, কার্কো, ছাট) ।

ওজিনা।—প্রত্যহ প্রাতঃকালে সবুজবর্ণ ছাঁচ (green casts) নিঃসরণ

অতিশয় -- অতিশয় প্রবল (কুখন) কিন্তু অল্প নিঃসরণ, বোধ হয় যেন
মল সঞ্চিত রহিয়াছে, নিঃসারণ করিতে পারা যায় না (এলম) ; সরলান্ত
অথবা মলবার যেন ছিন্ন বা বিদীর্ণ হইয়াছে এরূপ বেদনা (ছাট-মি) ;
মল ত্যাগান্তে প্রবল কর্তনবৎ বেদনা কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত উহার
অবস্থিতি (রাট, সলফ) -- মলত্যাগ-কালে ও ত্যাগান্তে বেদনা, মার্ক) ।

সরলাঙ্গের বিদারণ, মলত্যাগ-কালে ছেদনবৎ আকস্মিক বেদনা ; কোমল মলত্যাগের পরেও ছুরি দিয়া কাটার স্থায় যাতনা (এলুমেন, জাট, রাট) ।

মূত্র — স্বল্প, মলিন-কপিশ, উগ্রগন্ধ “অশ্বমূত্র সদৃশ”, ত্যাগকালে শীতল ; ঘোলা মূত্র ।

ক্ষত — সহজে রক্তস্রাবী ক্ষত ; মুখের কোণে ক্ষত (জাট) ; চৌচফুটার স্থায় যাতনা, বিশেষতঃ স্পর্শ করিলে (হিপ) ; প্রাচুর্যে কুটিল ও অসম, ভূমিদেহ দেখিতে কাঁচামাংসের অনুরূপ ; ক্ষতাকুর বহুল ; পারদ বা উপদংশ অথবা উত্তরের পরে গণ্ডমালাগ্রস্ত ভূমিতে উৎপন্ন ; ক্ষত

স্রাব — পাতলা ; দুর্গন্ধ, বিদাহী, কাপশ বা মলিন পীতাত্ত হরিদ্বর্ণ স্রাব ; কদাচিৎ ভাল পুষ ।

রক্তস্রাব — টাইফয়েড বা টাইফস অবস্থায় অল্প হইতে (ক্রোট, মিউর-এসি) ; গর্ভস্রাব বা প্রসবাস্তে ; অতিরিক্ত শরীর-চেষ্টায়, উজ্জল, প্রভূত অথবা মলিনবর্ণ রক্তস্রাব ।

চর্ষণ-কালে কর্ণে চড় চড় শব্দ, নড়িলে চড়িলে সন্ধিস্থলে চড় চড় শব্দ (কক, গ্রাফ)

আঁচিল । — মাষক-দোষ বা উপদংশজ ; বৃহৎ, অসম, সবৃন্ত, প্রক্ষালনে সহজে রক্তস্রাবী ; আর্জ, রসক্ষরণশীল ; ভেদনবৎ যাতনা বিশিষ্ট ; আঁচিল ও উপমাংস (ষ্ট্রাক, থুয়া) ।

যে যে স্থলে ত্বক ও শৈথিল্য বিঘ্নী সংযুক্ত সেই সেই স্থলে অর্থাৎ মুখ-বিবর, নাসিক, সরলাঙ্গ, মলদ্বার, মূত্রমার্গ, অপত্য-পথ প্রভৃতি শরীরের প্লেগ-স্রাবী স্থান এই ঔষধে সবিশেষরূপে আক্রান্ত হয় (মিউর-এসি)

উপচয় । — সামান্যে ও রাজিতে, হুইপ্রের রাজির পরে ; স্পর্শে ; বাতাতপ বা ঋতুর পরিবর্তনে, ঘর্মকালে, নিদ্রা হইতে জাগরণাস্তে ও বিচরণকালে, বৃদ্ধি

উপশম । — গাড়ীতে চড়িয়া বেড়াইবার সময় দ্রাস (ককুগাসের বিপরীত)

সম্বন্ধ । — (১) আস' ও ক্যালাভের সহিত অনুরূপক সম্বন্ধ (২) ল্যাকেসিসের সহিত প্রতিকূল সম্বন্ধ (৩) ওলাউঠার অতিরিক্ত ভয়ে

আমেনিকের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ (৪) নাইট্রিক এসিড ও মার্কিউরিয়ামে অনেক সময় প্রভেদকরা কঠিন ; নাইট্রিক এসিড কৃত্রিমকৃত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ও মার্কিউরি লবুকেশ ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযোগী। (৫) পারদ অপব্যবহারের পরবর্তী রোগে, বিশেষতঃ জীবনী-ক্রিয়ার বিবৃদ্ধি থাকিলে ; এবং পুনঃ পুনঃ ডিফিটেমিস প্রয়োগের মন্দফলে নাইট্রিক এসিড উপমুগ্ধ। (৬) ক্যান্স, হিপ, মার্ক, স্ফাট-কা, পলস অথবা থুসার পরে নাইট্রিক এসিড ভাল খাটে, কিন্তু কালী-কার্বের পরেই ইহা অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

ন্যাজ ট্রিপুডিয়ান্স।

(Naja Tripudians)

আত্মহত্যার প্রবৃত্তি বিশিষ্ট উন্মাদ, কল্পিত উপদ্রব সম্বন্ধে অবিরত ভাবনা (অরম)

হৃৎপিণ্ডের উপসর্গশূন্য বিবৃদ্ধি।

তরুণ প্রদাহ দ্বারা অপকৃত হৃৎপিণ্ডের স্বস্থতা পুনরায় স্থাপনার্থে, অথবা হৃৎপিণ্ডের পুরাতন বিবৃদ্ধি ও হৃৎকণাটের বিকৃতি জনিত যাতনার উপশমার্থে এই ঔষধ উপযোগী

আমবাতিক হৃৎপিণ্ড-প্রদাহের তরুণাবস্থা অথবা হৃৎপিণ্ডের পুরাতন বিধান-বিকৃতি-বশতঃ উৎপন্ন উপদ্রবকর, শুষ্ক মহামুতুতিক কাম (স্পল)।

ডিপথিরিয়ার পরবর্তী হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাতের আশঙ্কা

বলে অনিয়মিত কিন্তু কালে (ভালে) নিয়মিত নাড়ী।

শ্বাস-রোধকর, স্নায়বীয়, পুরাতন হৃৎকম্প সংযুক্ত, বিশেষতঃ বক্তৃতার পরে, কথা বলিতে অসমর্থতা ; গাড়ীতে আরোহণে অথবা পার্শ্বে লয়নে যাতনার বৃদ্ধি।

হৃৎপিণ্ড প্রদেশে তীব্র সূচি-বেধনবৎ বেদনা।

সম্বন্ধ।—আস, ক্যাষ্ঠ, ল্যাক, মাইগেল ও স্পিজির সহিত ঔষধের তুলন হয়।

বাস্তব-সমস্ততা, আয়বীয় ছললতা বশতঃ হাত হইতে জ্বালাদির পতন (এগিস, বোড)

বিলাপ-প্রবৃত্তি ; অকারণে অশ্রুজার (পলস), কিন্তু সাজনা-প্রদানে রোগিণীর কষ্টের আধিক্য

শিরঃপীড়া — বিভাগয়ের বাণিকদিগের শিরোবেদনা (ক্যাক-ফস) ; সূর্য্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উহার অবস্থিতি, দৃষ্টিহীনতা সহ উহার আরম্ভ (আইরিস, কালী-বাই) চক্ষুর অতিরিক্ত চেষ্টায় উহার উৎপত্তি, হিষ্টিরিয়া জনিত বামপার্শ্বের শিরঃপীড়া ; বোধ হয় যেন মাথা কাটিয়া যাইতেছে ; তৎসহ ঋতু-কালে এবং ঋতুর পূর্বে ও পরে আরম্ভ বদন ; বিবমিষ ও বমন ; যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতুড়ি দ্বারা মস্তিষ্ক আঘাতিত হইতেছে এপ্রকার অমুভব, জ্বরের উত্তাপাবস্থায় শিরোবেদনা, ঘর্ম্মারন্তে উহার উপশম

অশ্রুপাত ; যখনই রোগী কাসে তখনই তাহার গাল বাহিয়া অশ্রুধারা পতিত হয় (ইউরো)

উত্তপ্ত সূর্য্যের তাপ অথবা দারুণ গ্রীষ্মকালের উত্তাপ বশতঃ ওষধি-গন্ধজ জ্বর (হে-ফিভার), নাসা-রন্ধে ক্ষুদ্র কৃমির জ্বালা অমুভব ।

জিহ্বায় চুগ থাকার জ্বালা অমুভব (সিলি) ।

জিহ্বা ।—জিহ্বায় রক্তবর্ণ দ্বীপাকার খণ্ড খণ্ড চিত্র ; পার্শ্ব দক্ষর জ্বালা আকৃতি (আস, ল্যাক, মার্ক, নাই-এসি, ট্যাগায়া) ; ভারী কষ্টসাধ্য কথা, শিশুদিগের ইঁ টিতে শিথিতে বিলম্ব ।

কোষ্ঠবদ্ধতা ।—মলবারের আকুঞ্চন অমুভব, পরে উহার বিদারণ, রক্তপাত ও টাটানি ; কষ্টে নিঃসারিত, শক্ত, খণ্ড খণ্ড মল (এম-ক্স, মাইগ-মি), সরসাজে সূচী-বেদন (নাই-এসি জটব্য) ; অনিচ্ছায় নিঃসৃত মল, বায়ু কি মল বাহির হইবে জানা যায় না (এলো, মিউর-এসি, আইও, ওলিন, পড) ।

গূত্র — ইঁটিবার, কাসিবার, ও হাসিবার সময় অনিচ্ছায় গূত্র-নিঃসরণ, (কষ্ট, পলস, সিলি), অন্তের উপস্থিত থাকিলে অনেকক্ষণ গূত্র-পাত হয় না (হিপার, মিউ-এসি), গূত্র ত্যাগান্তে কষ্টবৎ যাতনা (মাসার) ।

শুক্রস্রাব —সংসর্গের অন্তিম পরে, বিবর্জিত স্ত্রীয়া সহকারে শুক্রপাত ; সংসর্গ-কালে অতি বিশেষে শুক্রস্রাব লক্ষণাপন্ন জননাধের দুর্বলতা ; অত্যধিক ইন্দ্রিয় সেবার পরবর্তী ধ্বংসজনক, পৃষ্ঠবংশের উপদাহ, ও পথ্যঘাত

প্রত্যাহ প্রাতে বাহ্য জননোন্মেষের অভিমুখে চাপ ও পাকি লাগে, কন্দ (pro-lapsus uteri) নিবারণার্থে বসিয়া থাকা আবশ্যক হয় (লিপি, মিউর, সিপি)।

মূত্র মুচ্ছাস্থভব সহকারে স্ফুপিণ্ডের ক্ষতস্পন্দন, শুইয়া থাকিলে মূচ্ছাস্থভবে উপচয় (ল্যাক)

স্ফুপিণ্ডের স্পন্দনে দেহ কম্পিত হয় (স্পাইজি)।

স্তন্যদ্বারাদিগের (সিপি —জরাস্ত্র, লাই) কেশ স্পর্শ করিলে কেশ পতন ; মুখমণ্ডলের তৈলাস্কতা ও চিকণতা (থুয়া)

ক্রোধ, অন্ন খাদ্যদ্রব্য ; রুটি ; কুইনাইন ; অতিরিক্ত লবণ ভক্ষণ ; এবং নাইট্রেট-অব-সিলভার দ্বারা ক্ষার-কর্মের (কটোরজেন), শোক, ভয়, অসন্তোষ, মর্মান্বিত ভাব, ও সংযত অসুস্থটির মন্দফল (ট্রাফ)।

নথের চারিদিকের চর্মের শুষ্কতা ও বিদারণ (পেটে) ; মলম্বারের নিকটে, ও ষাডের নিকটের চুলের প্রান্তভাগে দক্ষ (জাহুর বাঁকে, হিপার, গ্রাফ)।

হাতের তালুতে আঁচিল (স্পর্শ বেদনা, ছাট-কাঁক)।

গৃহে দস্ত্র তক্ষরাদির প্রবেশের স্বপ্ন, আগিয়াও গৃহ অধেষিত না হওয়া পর্যন্ত উঠাতে বিশ্বাস (সোরি), আলাকর পিপাসার স্বপ্ন

ওষ্ঠের নিকটে মুক্তার ন্যায় অর-ফোট ; ওষ্ঠের শুষ্কতা, বিদারণ ও ক্ষত (নাই-এসি)

অস্থির শিরার বেদনায়ুক্ত আকুঞ্চন (এম-মি, কষ্ট, গুয়াক)।

লবণে স্পৃহা (ক্যাফ, কষ্ট) ; রুটিতে অতিশয় অকটি

অতিরিক্ত লবণ ভক্ষণ, সমুদ্রকূলে অবস্থিতি অথবা সমুদ্রযাত্রা বশতঃ উৎপন্ন, কঁচা আরক্ত প্রদাহিত, বিশেষতঃ কেশের প্রান্তে উদ্ভূত, পান্না (একজিমা)।

ভয় বা পুরাতন নীতপিত্ত ; সর্বস্রীরে, বিশেষতঃ প্রবল শারীরিক পরিশ্রমের পর উহার প্রকাশ (এপিস, ক্যাফ, হিপ গ্রানি, আর্ট)।

সবিরাম অর ; পূর্ববাহু ১০ বা ১১ টার সময় জ্বরের আবেশের উপস্থিতি, পুরাতন কুটিকিৎসিত অর, বিশেষতঃ কুইনাইন দ্বারা অবরুদ্ধ অর,

শীত ও তাপাবস্থায় সংজ্ঞাশূন্যতা সহ শিরঃপীড়া ; ও ঘর্শে বেদনার উপশম

উপচয় ।—পূর্ববাহু ১০ টা বা ১১ টার সময়, সূর্য্যের বা চন্দ্রের উত্তাপে ; সমুদ্র-কূলে বা সমুদ্র-বায়ুতে ; মানসিক পরিশ্রমে, আলাপনে, লিখনে ও পঠনে এবং শয়নে বৃদ্ধি

উপশম .—অনার্যুত বায়ুতে (এপিস, পলস) ; শীতল জলে ও খালনে ; উষ্ণি বাসনে, ; ও উপবাসে ; দক্ষিণপার্শ্বে ভরদিয়া শয়নে (ব্যথিত পার্শ্বে ব্রাই, ইগ্নে, পলস) ; হ্রাস

সম্বন্ধ ।—(১) এপিসের সহিত অল্পপূরক সম্বন্ধ ; এপিসের পূর্বে ও পরে ছাট্রিম মিউরের ভাল ক্রিয়া দর্শে (২) ইগ্নেশিয়া ছাট্রিম-মিউরের উদ্ভিদ সমুদগ তরুণ রোগে-ইগ্নেশিয়া ও পুরাতন রোগে ছাট্রিম-মিউর উপযোগী । (৩) ছাট্রিম মিউরের পর সিপিয়া ও থুজা ব্যবহৃত হয় (৪) পুরাতন রোগে লক্ষণের সাদৃশ্য অনুসারে অথ অস্ত্রবর্তী ঔষধ ব্যবহার না করিয়া অনেক সময় ছাট্রিম-মিউরের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হয় না (৫) জরের আবেশ কালে কখনও ছাট্রিম-মিউর দেওয়া উচিত নহে (৬) ছাট্রিম-মিউর ব্যবহারের পরে যদি শিরোঘূর্ণন ও শিরঃপীড়া অতিশয় প্রবর্তিত হয় ; অথবা অবসন্নতা দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে নক ব্যবহারে উহার শাস্তি জন্মে

ন্যাট্রুম সালফিউরিকম ।

(*Natrum Sulphuricum*)

আর্দ্র-কালে, আর্দ্রগৃহ-বাসে সমুৎপন্ন বা বিবর্তিত রোগে ; এবং শুষ্ক ঋতুর আর্দ্র ঋতুতে পরিবর্তনে যে সকল রোগীর অসুখ করে ; যাহারা সমুদ্র-বায়ু সহ্য করিতে পারেনা, জলের নিকটে যে সকল উদ্ভিদ জন্মে তাহা আহাৰ করিতে পারেনা ; যাহাদের * গ্রীয়ে প্রমেহ-বিষে বিশেষ অনিষ্ট হয় ; ও যাহারা প্রত্যেক রোগ হইতেই ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করে ; তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী ।

প্রতি বসন্তকালে চর্ম্ম-রোগের পুনঃ প্রকাশ (সোরি) ।

চিন্তা করিতে অসামর্থ্য (চাট-কা)

বিমর্ষতা, অপ্রকৃষ্টতা, কোপনতা ; প্রাতে উহার আধিক্য, কথা বলিতে বা শুনিতে অপ্রবৃত্তি (আইও, সিটি)

অপ্রসন্নতা, গীত-বাঞ্চে রোগিণীর বিষণ্ণতা ; জীবনে পরিতৃপ্ততা (Satiety), আত্মহত্যা নিবারণার্থে অতিশয় আত্মসংযমের আবশ্যিকতা ।

অভিঘাতের মানসিক মন্দফল ; মস্তকের উপঘাত জনিত মানসিক লক্ষণ ; আঘাত বা পতন প্রভৃতি মস্তিষ্কের পুরাতন উপদ্রব ।

অগ্নিপুটের দানাময়তা—ক্ষুদ্রে ক্ষুদ্রে ফোফার ন্যায় দানাদান (থুতু), হরিষ্ণ পুষ্প ও ভয়ঙ্কর আলোকাতঙ্ক ; প্রমেহ বা মাষক-দোষ হইতে উহার উৎপত্তি ।

ঋতু-কালে নাসিকা হইতে রক্তপাত (ঋতুর পরিবর্তে রক্তপাত, আই, পলস) ।

শীতল জলে ও শীতল বায়ুতে উপশমিত দন্ত-বেদনা (কফি, পলস) ।

জিহ্বায় ময়লা, হরিতাভ ধূসর অথবা কপিশবর্ণ লেপ

অতিগার —সহসা বেগ, হুড় হুড় করিয়া মলপ্রাব, অধিক বায়ু-নিঃসরণ ; নিদ্রা হইতে উঠিয়া প্রথম দাঁড়াইবামাত্র মলবেগ ; বৃষ্টি-কালের আবেশাশ্রু ; ও নিম্নতল গৃহে বাস বা কাজ করাতে উহার উৎপত্তি

প্রমেহ হরিতাভপীতবর্ণ, বেদনামূল্য, গাঢ়প্রাব (পলস) ; পুরাতন বা সংরুদ্ধ প্রমেহ (গাঢ়, হরিষ্ণপ্রাব, কাণী-আইওড)

শ্বাস-কুচ্ছু, সৈতসেতে, সেধাচ্ছরকালে দীর্ঘ শ্বাসগ্রহণের ইচ্ছা ।

শিশুদিগের শ্লেষ্মাশ্রাবী শ্বাস-কাস, প্রতি বর্ষাকালে ; ও প্রত্যেকবার নূতনশর্দি লাগিলে উহার উপস্থিতি, আজ, ও বৃষ্টি-কালে সর্ষদা বৃদ্ধিপ্রাপ্তি, হরিষ্ণ, হরিতাভ, প্রচুর নিষ্টিবন (হরিতাভ ধূসর নিষ্টিবন, কোপে) ।

মাষক-দোষজনিত ফুসফুস-প্রদাহ (সাইকোটিক নিউমোনিয়া) ; বায়ু ফুসফুসের নিম্নতর খণ্ডেব আক্রান্ততা ; বয়ঃস্থলের অতিশয় স্পর্শ-বেগ, কাসিবার সময় শ্বাস উঠিয়া বসিয়া ও ছুই হাতে নাক ধরিয়া কাসিতে হয় (নিক ।—দক্ষিণ ফুসফুস, আই) ।

সাইন্সাল মিনিমাইটিস।—মস্তিষ্কের ভূমিদেশে প্রবল চৰ্ব্বণবৎ বেদনা ; মস্তকের পশ্চাৎদিকে আকৃষ্টতা ; মানসিক উপদাহিতা ও প্রলাপ সহকারে আগ্রহ ; মস্তকে প্রবল রক্ত-সঞ্চয় ; প্রলাপ, পশ্চাৎক টঙ্কার উপচয়।—আর্দ্রগৃহে বাসে ; আর্দ্রকালে (আর্দ্রাণ, আস-আইও, ডলকা) ; বিশ্রামে ; ও শয়নে ; বৃষ্টি ।

উপশম।—শুককালে ; প্রচাপনে ; উঠিয়া বসিলে (কাস) ; অবস্থান-পরিবর্তনে (আর্দ্রকালে কষ্ট) ; ও অনাবৃত বায়ুতে ; হ্রাস ।

রোগীর ঘন ঘন অবস্থানের পরিবর্তন করিতে হয় বটে কিন্তু উহাতে কষ্ট হয় এবং শাস্তি জন্মে না (কষ্ট)

সম্বন্ধ।—চাট-মিউ ও সলফের সহিত অধিক সমগুণ সম্বন্ধ ; রস-প্রধান-ধাতুতে সিকিলিস ও সাইকোনিম জন্মিলে থুজা ও মার্কেলের সহিত তুলনা হয়

পডফিলঃম ।

(Podophyllum)

পিত্ত-প্রধান-ধাতুর যে সকল ব্যক্তি, বিশেষতঃ পারদ সেবনের পর, আমাশয়ের বিশৃঙ্খলায় আক্রান্ত হয় ; এবং যাহারা পিত্ত-প্রকোপের আক্রমণ সহকারে ; তাহাদের পক্ষে পডফিলঃম বিশেষ উপযোগী

উৎক্ষেপণবৎ (jerking) বেদনার আকস্মিক আক্রমণ । অধিক পরিমাণে শীতলজল পানের পিপাসা (লাই) ।

বিমর্ষতা, রোগীর অনুমান হয় যেন সে মরিতে যাইতেছে অথবা অতিশয় পীড়িত হইয়াছে (আস) ; জীবনে বিরক্তি ।

অতিসারের সহিত সপর্ষায়ে শিরঃপীড়া (এলো) ; শীতকালে শিরঃপীড়া, গ্রীষ্মকালে অতিসার ।

বেদনাশূন্য মূত্র-বিসূচিকা ; পদ, জঙ্ঘা-পৃষ্ঠ (Calves) ; ও উরুতে প্রবলধল্লী ; বেদনাশূন্য জলবৎ মল, শিউ-বিসূচিকা (ফাইটো) ।

সহজে দস্তোদগম না হওয়া ; কঁে কঁে করা, ও রাবিত্তে দাঁত কড়মড় করা ;
মস্তকের উত্তপ্ততা ও অবলুণ্ঠন (বেল, হেল) ; মাড়িতে মাড়িতে
চাপ দেওয়ার অতিশয় ইচ্ছা (ফাইটো) ।

হস্তদ্বারা যকৃৎ-প্রদেশে অবিরত মর্দন ।

অতিসার —শিশুদিগের অতিসার, দস্তোদগম কাগোন অতিসার ; আহায়াশ্বে,
প্রক্ষালনকালে ও শিশুর শয্যার বস্ত্র ভিজিয়া পতিত মলিন
জলবৎ অতিসার (বেজ এমি) ; প্রতুষ-কালে অতিসার, পূর্বাহ্ন
পর্যন্ত উহার অবস্থিতি, সন্ধ্যাকালে প্রাভাবিক মল নিঃসরণ (এলো), তৎসহ
উদরে ও সরলাঙ্গে দুর্বলতা বা নিমগ্নতা অনুভব ; দীর্ঘকাল স্থায়ী অতিসার

মল —সবুজবর্ণ, জলবৎ, দুর্গন্ধ, প্রভূত (ক্যাক) ; প্রবলবেগে বহির্গত
(স্ট্রেট, ফস), খটকাবৎ, লেহবৎ (এলো) ; অকীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত (সিক, ফির),
শীতবর্ণ ময়দার প্রায় তলানিবিশিষ্ট ; এবং মলত্যাগের পূর্বে ব তৎকালে
সরলাঙ্গের (lectum) বহির্গমন লক্ষণাপন্ন ; মল ।

কুন্দন বা ভারোত্তোলন বশতঃ ; কোষ্ঠাধতা জনিত ; ও প্রসবের
পরবর্তী ; কন্দ

গর্ভের প্রথম ভাগে কেবল আমাশয়ের উপর ভর দিয়া পন্ননে স্বচ্ছন্দতা
(এসেট-এসি) ।

দক্ষিণ গল-মধ্য, দক্ষিণ ডিম্বাশয় ও দক্ষিণ কুক্ষির আক্রান্ততা, পূর্বাহ্ন ৭ টার
সময় আরের আবেশ, তৎসহকারে শীত ও উত্তাপের সময় অতিরিক্ত বাঢ়াশতা ;
যক্ষ্মজ্বরের সময় নিজা (লাই)

দক্ষিণ ডিম্বাশয়ে বেদনা ও অবশতা, সেই দিকের উরু পর্যন্ত, উহার প্রাধাবন
(লিলি)

যুবতী কুমারীদিগের রজোবিলুপ্তি (পলস, টিউব)

উপচয় ।—প্রতুষে (এলো, নকা, মল) ; উত্তপ্তকালে, ও দস্তোদগম-
সময় ; বৃদ্ধি ।

উপশমন ।—সন্ধ্যাকালে ; বাহ্যিক উষ্ণতা প্রমাণে ; ও চাপদানে দ্রাস

সম্বন্ধ —(১) এলো, চেলি, কোলিন, লিলি, মার্ক, মক্কা ও সলফের সহিত পডর তুলনা হয়। (২) এতদ্বারা পারদের কুফল নিবারিত হয়। (৩) আশাশয়ের রোগে ইপি ও নক্সের পরে ; এবং যক্ষ্মারোগে ক্যাক ও সলফের পরে ; পড উপযোগী হয়।

পলসেটিল্লা ।

(Pulsatilla)

পিপ্পলকেশ, নীলচক্ষু, পাণ্ডুর মুখমণ্ডল, নীরব শোক-প্রবণ, বিনীত স্বভাব ব্যক্তিদিগের পক্ষে, বিশেষতঃ নারী ও বালকবালিকাদিগের রোগেই এই ঔষধ বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়। পলসেটিলার রোগীর মন্দ গতি, স্লেমা-প্রধান ধাতু, ও বিরক্তি-প্রবণতা থাকে, কিন্তু কোপনতা থাকেনা।

সহজে অশ্রুতপাত ; অশ্রুপাত না করিয়া প্রায়ই রোগের কথা বলা অসম্ভব (ধনুৰ্বন্দ দিলে অশ্রুপাত, ল্যই) ।

জীলোকদিগের মাংসলা হইবার প্রবণতা, তৎসহ স্বপ্ন ও অনেক দিন স্থায়ী ধাতু (গ্রাফ)

প্রথম রজ-প্রকাশের সময় হইতেই শাশ্বতজ, নীরক্ততা, হরিৎপাণ্ডু বায়ু নলীভুজ-প্রদাহ, যক্ষ্মা । সেই সময় হইতে কখনও শরীর সুস্থ নহে।

সমস্ত শৈল্পিক বিল্লীর আবহে গাঢ়, অবিদাহী ও পীতভ-হরিদ্বর্ণ (কালী-সল, ছাট-সল)

বেদনা । - আকর্ষণবৎ, ছেদনবৎ, একস্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চার স্থান-বিকল্পশীল সঞ্চারমান বেদনা (কালী-বাই, ক্যাক-ক্যান, মাংস-এ), তৎসহ অবিরত শীত শীত অনুভব, যতই বেদনার উগ্রতা ততই শীতের তীব্রতা ; সহস বেদনার প্রকাশ, ক্রমে ক্রমে বিরাম, অথবা অশিথিলতা (টেনশন্), যে পর্য্যন্ত না উহার তীব্রতা অগ্রে সে পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্তি, অনন্তর চট করিয়া উহার নিবৃত্তি (দস্ত-শূল, সায়ু-শূল) ; প্রথম সঞ্চলনে বেদনা (হ্রাসটকা)

লক্ষণের সতত পরিবর্তন, দুই বারের শীত, দুই বারের গরম, দুই বারের আক্রমণ একরূপ হয় না, এক দণ্ডেই গুলির স্ফূর্তি, অল্প ঘণ্টায় অস্তিত্ব

প্রায় সকল রোগের সহিতই পিপাসাহীনতা ।

জ্বরপাক জ্বর, পিষ্টক দ্ব্যতপক জ্বর, তৈলাক্ত জ্বর, ও শূকরের মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ অল্প আশ্বাসিক উপদ্রব ; প্রাতে মুখের বিরসতা

প্রাতে পিপাসা বাতীত অতিশয় মুখ-শোষ (নকা-ম । - মুখ জার্স, অথচ দারুণ পিপাস, মার্ক) ।

আমাশয়ে, বিশেষতঃ চা পায়ীদিগের আমাশয়ে শূন্যতা অনুভব

স্তনে বা যুগ্মে (testicle) মঃপ্পস্ (ওন্দাবিবি) রোগের স্থান-বিকল্প

অতিসার - নিরবচ্ছিন্ন অথবা সাধারণতঃ রাত্রিতে অতিসার, জলবৎ, পীতান্ত হরিৎ, অতিশয় পরিবর্তনশীল, আহারের অব্যবহিত পরে নিঃসৃত ; ফল, দীতল পানীয় জ্বর, ও বরফ সেবন হইতে উৎপন্ন ; অতিসার (আস, ব্রাই - পেয়ারা ফল (গ্রাসপাতি) অহার বশতঃ, ভিরে, চায়না ; পলাতু ভক্ষণ জনিত, থুত্বা ; গুলি ভক্ষণ জনিত, ব্রোম, লাই ; দুগ্ধপান বশতঃ, ক্যাক, চাট-কা, নিক, মল ; অপরিষ্কৃত জলপান বশতঃ, ক্যাক, মিজ) ।

প্রাণ-যৌবনাদিগের অক্ষয় ; গ ভিষ্মাতে রজোবিলোপ ; সন্ধ্যাকালে শীতসহ নিয়মিত সময়ের অনেক পরে, স্বপ্ন আঠা আঠা, থাকিয়া থাকিয়া প্রবাহিত, ধতু, তৎসহকারে দারুণ বেদনা, অতিশয় অস্থিরতা ও অবলুষ্ঠন (ম্যাগ ফস) । দিবাভাগে অধিকতর ধতু-নিঃসরণ (শিলি - শয়ন করিবার অব্যবহিত পরে, ক্রিয়োৎসাহ ; কেবল রাত্রিতে অথবা শয়ন কালে, ম্যাগ-কা) , প্রথম ধতুপ্রকাশে বিলম্ব

নিদ্রা । - সন্ধ্যাকালে সম্পূর্ণ নিদ্রাশূন্যতা, তখন শয়ন করিতে অনিচ্ছা , প্রাণ অস্থির নিদ্রা, যখন নিদ্রা হইতে উঠিবার সময় তখন গাঢ় নিদ্রা ; দুর্বলতা ও শ্রান্তি সহকারে জাগরণ (নকাভমিকার বিপরীত) ।

অজ্ঞানী - দ্ব্যতাদি বসায়, তৈলাক্ত, অধিক মসল্লাযুক্ত খাদ্য জ্বর অথবা শূকরের মাংস আহার বশতঃ অজ্ঞানী, বিশেষতঃ উপরের অক্ষিপুটে (লাই ও ট্যাফ্ ডুলনা করন) ।

গর্ভ-আবের আশঙ্কা ; রক্ত-আবের বিরতি ও অনন্তর বিবর্জিত বেগে প্রত্যাবৃতি ; আক্কেপিক বেদনা, তজ্জন্ত খাস-রোধ ও মুচ্ছার উৎপত্তি ; বিমল বায়ু সেবনের প্রবৃতি

দন্ত-বেদনা — মুখে শীতল জল রাখিলে দন্ত-বেদনার শান্তি (ভাই, কফি) ; উষ্ণ দ্রব্য ও গৃহের উত্তাপে উহার আতিশয্য

শ্বাসক্রিয়া ভালরূপে নিষ্পন্ন করিতে অপারগতা, অথবা উষ্ণগৃহে শীতানুভব প্রায়বীরতা, গুল্ফদ্বয়ে উহার আধিক্য অনুভূত হয় ।

উপচয় ।—উষ্ণ, আবদ্ধগৃহে ; সন্ধ্যাকালে গোধূলি সময়ে ; বামপার্শ্বে বা বেদনাহীন পার্শ্বে শয়নে ; ছুপ্পাচ্য আহার, বসা দ্রব্য, শূকরের মাংস, ও বরফাদি সেবনে ; নড়িতে চড়িতে আরম্ভ করিলে ; উত্তাপে, ও উষ্ণ বাহ্য প্রয়োগে ; বৃদ্ধি (কালী-মি)

উপশম ।—অনারূত বায়ুতে ; বাধিত পার্শ্বে শয়নে (ভাই) ; শীতল বায়ুতে বা শীতল গৃহে, শীতল দ্রব্য পানে বা আহারে ; ও শীতল বাহ্য প্রয়োগে ; হ্রাস (কালী-মি)

সম্বন্ধ ।—(১) কালী-মি, লাই, সিলি, সল-এসির সহিত পলসেটিলায় অনুপূর্বক সম্বন্ধ (২) যে সকল তরুণ রোগে পলসেটিলা উপযোগী প্রায়ই সেই সকল রোগের পুরাতন অবস্থায় সিলিমিয়া সুপ্রযুক্ত্য । (৩) কালী-বাই, লাই, সিলি, সলের পরে পলসেটিলা ভাল খাটে (৪) ক্যাম, কুইনাইন, মাক ও সল সেবন, এবং চা পান জনিত রোগ । (৫) পুরাতন রোগের চিকিৎসা আরম্ভ করিতে যে সকল ঔষধ সর্বোত্তম পলসেটিলা উহার অন্ততম । (৬) মৃৎপাণ্ডু, হরিৎপাণ্ডু বিশিষ্ট যে সকল রোগী অধিক বৎসর পূর্বেও অধিক পরিমাণে কুইনাইন, আয়রন (লৌহ), ও বলকর ঔষধ (টনিক) সেবন করিয়াছে তাহাদের পক্ষে পলসেটিলা উপযোগী (৭) পলসের পূর্বে ও পরে কালী-মিউ ভাল খাটে ।

পাইরোজেন ।

(Pyrogen)

প্রসবাস্তিক বা ক্ষ-ক্রিয়ার প্রবর্তী ; জল-প্রণালী প্রভৃতির দূষিত বাষ্পজনিত, উপধিরিয়া, টাইফয়েড বা টাইফস জ্বরের ভোগ-কালে উৎপন্ন, সেপ্টিসিমি-

যায় অত্যুৎকৃষ্টে স্থানিকবাচিত ঔষধেও একেবারেই উপকার না জন্মিলে অথবা স্থায়ীফল না দর্শিলে এই ঔষধ উপযোগী।

শয্যা শক্ত অনুভূত হয় (আর্গ) ; যে সকল অঙ্গে ভরদিয়া শয়ন করা যায় উহা ব্যথিত ও ঘৃষ্টবৎ অনুভূত হয় (ব্যাপ্ট) ;
ক্রতোৎপন্ন শয্যা-গত (কার্গ এমি)

অতিশয় অস্থিরতা ; অঙ্গের স্পর্শ-ধ্বয়ের উপশমার্থে অবিরত সঞ্চালনের
আবশ্যকতা (আর্গ, ইউপ) ।

জিহ্বা ।—বৃহৎ, লোলিত ; পরিচ্ছন্ন, ভার্গিসকরারমত মসৃণ ;
অগ্নির ন্যায় রক্তবর্ণ ; শুষ্ক বিদারিত জিহ্বা ; শব্দোচ্চারণে কষ্ট (জোটি,
টেরে)

শ্বাস —ঈষৎ মিষ্ট ; ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ ; গত হইতে উৎপন্ন পুষবৎ
মুখের শ্বাস ।

বমন —প্রতিনিয়ত ; কফি চূর্ণের স্তম্ভ ঈষৎ কপিশবর্ণ ; পক্ষাদির বিষ্ট গন্ধ
বিশিষ্ট ; আবদ্ধ বা প্রতিরুদ্ধ অঙ্গ সংযুক্ত (ওপি, পাম) ; বমন ।

অতিসার —ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ (গোরি) ; কপিশ বা কৃষ্ণবর্ণ (লেপ্ট) বেদনামূল্য,
অনিচ্ছায় নির্গত, অনিশ্চিত, বায়ু-নিঃসরণকালে বহির্গত (এলো, ওলিন),
অতিসার ।

কোষ্ঠ-রোধ ।—সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টতা সংযুক্ত (with complete inertia)
(ওপি, শানি) ; জ্বরে অন্ত্রাবরোধ বশতঃ দুর্দমা ; বৃহৎ, কাল,
পচা মাংসের গন্ধ ; জলপাইয়ের মত ছোট ছোট, কাল গোলাবর্ণ
ন্যায় গুল বিশিষ্ট (ওপি, পাম) কোষ্ঠ-রোধ ।

ঋতু —ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ ; পচা মাংসের গন্ধ ; পচা গন্ধ ; কেবল একদিন
স্থায়ী, তৎপরে সেই প্রকার ভয়ঙ্কর গন্ধ রক্তাক্ত প্রদর বিশিষ্ট ; ঋতু ।

ক্রণ —(lotus) ক্রণ ও ফুলাদির অবশেষের অরায়ুতে অবস্থিতি, বিগলিত
হওয়া, গর্ভে ক্রণের কতিপয় দিবস যরিয়া থাকা ; কাল, ভয়ানক দুর্গন্ধ বা
নিঃসরণ ; গর্ভপ্রাব বা প্রসবের পর সেপ্টিক জ্বরের পরে প্রাহ্মা-শূণ্ডিত
পাই-
রোজেন অরায়ুর স্বাভাবিক ক্রিয়ার উত্তেজনা অস্বাভাবিক ।

পাতলা, বিদাহী, কটা, অতি দুর্গন্ধ প্রসবাস্থিক স্রাব (lochia) (নাই-এসি) ; প্রসবাস্থিক স্রাবের বিলুপ্তি, তৎপরে শীত, উত্তাপ ও প্রভূত দুর্গন্ধ ঘর্ষ বিদ্রিষ্ট জ্বর

হৃৎপিণ্ডের বিদ্যমানতার সুস্পষ্ট জ্ঞান, উহা শ্রান্ত অনুভূত হয় ; যেন বড় হইয়াছে একপ বোধ হয় ; কানে অবিরত হৃৎপিণ্ডের দপ দপ ও স্পন্দন কর শব্দ শুনা যায়, তাহাতে নিদ্রার বাধাত জন্মে ; রক্তে পচনজনক পদার্থের অবস্থিতি বশতঃ হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা

নাড়ীর অস্বাভাবিক দ্রুততা, গাত্র-তাপের সহিত উহার অনুপাতের সম্পূর্ণ অসম্বন্ধ (লিপি)

দ্রবের পাণ্ডুরতা, শীতলতা, ও ভ্রমের প্রায় বর্ণ (সিকেলি) ; বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের দুর্বলতা শিরা-ক্ষীতিসংযুক্ত, দুর্গন্ধ স্রাব (মোরি)

জ্বর — ক্ষমাস্থিরয়ের মধ্যভাগে, পৃষ্ঠে শীতের আরম্ভ ; তীব্র শীত ; সর্ববাহ্যের, অস্থির ও হস্ত-পদের শীত ; সেপ্টিক জ্বরের আক্রমণের লক্ষণ ১০৩ হইতে ১০৬ ডিগ্রি গাত্রতাপ ; আকস্মিক উত্তাপ, দ্রবের শুষ্কতা ও জ্বালা ; দ্রুত, ক্ষুদ্র, তারবৎ নাড়ী, ১০৪ হইতে ১১০ বার স্পন্দন ; অনন্তর শীতল আঁঠা আঁঠা ঘর্ষ ।

সেপ্টিক জ্বরে, বিশেষতঃ প্রসবাস্থিক সেপ্টিক জ্বরে পাইরোজেন অতিশয় উপকারী পচন-নিবারক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

সম্বন্ধ :—(১) আস, ব্যাপ্ট, কার্ব-ভেজি, কার্ব-এসি, ওপি, হ্রঃস, মোরি, সিকেলি, জ্বরের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ ; (২) প্রচ্ছন্নপুণ-জনন-প্রক্রিয়া (latent pyogenic process) বশতঃ দৃঢ়মান সদৃশ ঔষধ ব্যবহারেও রোগের পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবৃতি

পিক্রিক এসিড ।

(Picric Acid)

জীর্ণশীর্ণ শরীর-যজ্ঞ ; প্রায়শ্চিন্ত অবসরতার সুন্দর প্রতিকৃতি এই ঔষধে পরিশোধিত হয় (ক্যালী-ফ) ।

ঔদাশ্র ; কথা বলিতে অনিচ্ছা ; ধীরে ধীরে উত্তর দান ; আশ্রয় আশ্রয়
সঞ্চালন । জীবনে শ্রান্তি ; বিষয়তাপূর্ণ ভাবী ভাবনা

খুমকি বা বুমিকা ; বহুসংখ্যক একত্র পতন (লাই) ; ধোঁপা ধোঁপা ফেশ-
পতন, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানের টাক ।

স্নায়বীয় দুর্বলতা ; কম্পন ; ম্যাগেটাইজ হইবার ইচ্ছা ।

সমগ্র শরীরের দুর্বলতা ও অবসন্নতা ; জীবনের তরল বিধানের অপচয়
বশতঃ দৌর্বল্য ও শ্রান্তি (সিক, ফস-এসি) ।

শীতল খাত্ত ও পেয় দ্রব্যের আকাজকা ; শিথল দ্রব্যের স্পৃহা ; বরফ ভক্ষণে
আমাশয়ের যাতনার ক্রাস ।

উষ্ণ জলে হাত রাখিলে বিবমিষা জন্মে ; শীতলজলে হাত রাখিলে হাঁচি ও
শর্দি হয় (ল্যাক-ডি) ।

জল আমাশয়ে উষ্ণ হইবামাত্র উঠিয়া পড়া ।

এসে এসে ভুক্তদ্রব্য উদগীরণ (এলম) ।

কোষ্ঠ-কাঠিন্য ; স্রু, লম্বা, শুষ্ক, দুশ্ছেদ্য, ও শক্ত ; কষ্টে নিঃসারিত মল
(কষ্ট, প্রণ, ষ্ট্যাফ্) ।

অতিসার —সরলান্ত্রে কিছু প্রবেশ করিবামাত্র ; পিচকারীর
জলের স্থায় স্রোতোবেগে নিঃসৃত, সাগর স্থায় দানা দানা মিশ্রিত, অলবৎ ;
মলদ্বার যেন বিমুক্ত রহিয়াছে এরূপ অনুভব বিশিষ্ট
(এপিস, সিকে) ; অনিচ্ছায় বিনির্গত ; ওলাউঠার সময় প্রাচুর্ভূত (ওলাউঠার
পূর্ববর্তী, ফস-এসি) ; এবং বৃদ্ধদিগের প্রোতঃকালীয় ; অতিসার ।

গর্ভাবস্থা ।—গর্ভকালে জলপানে অসামর্থ্য ; জল দর্শনে বমনের উৎপত্তি ;
জান করিবার সময় চক্ষু বুজিয়া থাকার আবশ্যকতা (লাইসি)

রক্তস্রাব ।—পুনঃ পুনঃ প্রভূত পরিমাণে, বিমুক্ত ভাবে রক্তপাত, অনন্তর
কিরংকালের জন্য উহার বিরতি ; ফুসফুস হইতে রক্তপাত ; অরায়ু হইতে
রক্তপাত ; ক্যানসার হইতে রক্তস্রাব ; রক্তোবিলোপে নাসিকা, আমাশয়,
মল-দ্বার ও মুত্র-দ্বার হইতে অল্পকাল রক্ত-স্রাব ।

বক্ষঃস্থলের উপর যেন কোন গুরুভার স্থাপিত রহিয়াছে এরূপ গুরুত্ব
অনুভব ।

ঘর্ষে গহকের গন্ধ

বামনিকের নিম্ন হৃদয় অস্থি-পুতি (Necrosis)।

রক্তপ্রাব-প্রবণ শারীরিক প্রকৃতি ; সামান্য অভিঘাত হইতে প্রভূত রক্তপাত (ক্রিমো, ল্যাক), প্রতি শৈল্পিকবিপ্লবীয় দ্বার হইতে রক্তপ্রাব

স্বরম্বে এতই বেদনা যে কথা বলিতে পার যায় না ; উষ্ণ হইতে শীতল বায়ুতে গেলে (আইওনিয়ার বিপরীত), হাসিলে, কথা বলিলে, পড়িলে, খাইলে ও বাম পাশে শুইলে, কাসের উদ্বেক হয় (ড্রস, ষ্ট্যান)

হানিম্যান বলেন যে পুরাতন অতিসার-গ্রস্ত রোগীদিগের প্রতি ছই ঔষধের সমধিক উপকারজনক ক্রিয়া নশে

উপচয় ।—ছই প্রহর রাত্রির পূর্বে, সারাহে (পলস, হ্রঃস), একাকী থাকি কালে, বাম বা ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে ; আলোকে, মেঘগর্জজন কালে ; উত্তপ্ত বা শীতল পাতুর পরিবর্তনে ; ও উষ্ণ বস্ত্র আহারে ; বৃদ্ধি।

উপশম ।—অন্ধকারে, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে ; নিজাশ্বে ; শীতল দ্রব্য আহারে, ঘর্ষণে বা মিসমেরাইজ করিলে, হ্রাস শীতল বায়ুতে মত্তক ও মুখমণ্ডলের লক্ষণের উপশম, কিন্তু বক্ষঃস্থল, গলা ও ঘাড়ের লক্ষণের বৃদ্ধি

সম্বন্ধ ।—(১) আসেনিকের সহিত অল্পপূরক সম্বন্ধ। (২) কষ্টিকমের সহিত প্রতিকূল সম্বন্ধ। কষ্টিকমের পূর্বে বা পরে ফসফরাস ব্যবহৃত হয় না। (৩) সিকোনা বা ক্যালকেরিয়ার পরে ফসফরাস ভাল খাটে (৪) আইওডিন সেবনের ও অতিরিক্ত লবণ আহারের মন্দফল ফসফরাস দ্বারা নিবারিত হয়।

ফসফরিক এসিড।

(Phosphoric Acid)

পূর্বে বাহ্যিকের শরীর সবল ছিল, কিন্তু পরে শুক্রাদি জীবনের তরল বিধানের অপচয় ; অপরিমিত ইন্ডিয়সেবা (সিন) ; প্রবণ তরল

রোগ এবং শোক-দুঃখ, দুঃখিত, তথা প্রেমাদি অনিত দীর্ঘকালস্থায়ী চিওবিকার বা বৈরক্তি বশতঃ যাহারা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে ; তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ সমধিক উপযোগী

পাণ্ডুবর্ণ, রক্ত মুণাকৃতি, নীলবর্ণপ্রাস্ত-পরিবেষ্টিত স্ফিয়ন নয়ন উদ্বিগ্ন, উৎকর্ষা, শোক, দুঃখ ও স্বপ্নে যাইবার অল্প কাতরতা অনিত রোগ (ইমে), নিজাপ্রাণতা, বিলাস-প্রবণতা ; ও তৎকালের প্রাকালে নৈশ শর্ম

মুহ ও বিনীত স্বভাব (পল) ।

অনাবিষ্টতা ও উদাসীনতা ; জীবনের কার্যে বিরাগ ; যে সকল বিষয়ে অত্যন্ত অহুরাগ ছিল তাহাতে অনাসক্তি ; শৌকে বিহ্বলতা ।

অতি বর্জনশীল বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতী (ক্যাক, ক্যাক-ফস) পৃষ্ঠে ও অঙ্গে আঘাতিতবৎ বেদনা

প্রলাপ —অবোধ্য মুহ (বিড়বিড়ে) প্রলাপ ; স্তম্ভি অথবা মোহবৎ নিজায় পড়িয়া থাকা, চারিদিকে যাহা ঘটিতেছে তদ্বিষয়ে জ্ঞানশূন্যতা ; আগ্রহিত করিলে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাপ্রাপ্তি, বিজ্ঞাসিত বিষয়ের ধীরে ধীরে ও পরিপাকরূপে উত্তর প্রদান, পুনরায় আবার স্তম্ভি (stupor)

রোগীর কম্পন, অজ্ঞার দুর্বলতা, সহজে হৌচট লাগা, বা পদ-স্থলন ।

গণ্ডমালা, উপদংশ অথবা পারদ-দোষ বশতঃ অস্থির অন্তর্কর্ষী বিধানের প্রদাহ, অস্থি-বেষ্টের প্রদাহ, জালাকর বেদন, ছুরি দিয়া টাচার জ্বর ছেদনবৎ বেদনা (ক্রুসটব্য) ; কেরিজ, রেকাইটিস, কিন্তু নিক্রোমিস নহে ; বিবর্জনশীল বেদনা ।

শিরোধূর্ন ।- সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগে মস্তকের নিমগ্নতা ; চক্ষু বৃদ্ধিলে শিরোধূর্ন ; টাইফঃস জ্বরে উদ্ভিগ্না বসিলে পতন ; শয্যায় শয়ন করিয়া থাকার সময় মাথা স্থির রহিয়া পা যেন উপরে যাইতেছে এরূপ অনুভব ।

শিরঃপীড়া—মস্তকের মধ্যস্থানে প্রচাপক ভার, অধিকদিন স্থায়ী শোক অথবা শায়র অবসন্নতা বশতঃ উহার উৎপত্তি ; মস্তকের ও গ্রীবার পশ্চাৎভাগে ; সাধারণতঃ পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ দিকে বেদনা ; নড়িলে চড়িলে, গোলমালা, বিশেষতঃ গীত-বাণে উহার বৃদ্ধি । শয়নে উপশম (আই, জেল,

সিলি), চক্ষুর অতি ব্যবহার বশতঃ বিজ্ঞানায়ের বালিকাদিগের শিরঃপীড়া (ক্যাঙ্ক-ফ, টাট-মি); অতিরিক্ত বর্ধনশীল ছাত্রদিগের শিরঃপীড়া

শরীর-শাখার অস্বাভাগেব জায়তে হ্রিজকরণ টানন ও খননবৎ বেদনা ; অজ্ঞেদের পর অবশিষ্টাংশে জায়বায় রোগ (মেপা)

অতিসার —বেদনাশূন্য, অদৌর্বল্যজনক ; গীত বা শ্বেতবর্ণ ; বায়ু সহকারে, অনিচ্ছায় নির্গত (এলো, টাট); অল্পজ্বা, ওলাউঠা ও ভয়জনিত ; অতিসার

মূত্র ।—লেহবৎ, রক্তাক্ত খণ্ডমিশ্রিত দুগ্ধবৎ-দৃষ্ট মূত্র ; মূত্র সত্তর বিসমাসিত হয় ; রাত্রিতে পরিশ্রুত জলবৎ প্রভূত মূত্রে, ত্যাগের পর তৎক্ষণাৎ উহার উপর শুভ্র সরের উৎপত্তি (ফসফেটের আধিক্য, জায়ু ক্ষয়) ।

কৃত্রিম মৈথুন ; দূষিত ক্রিয়ার অপরাধিতায় রোগীর অতিশয় যাতনা (ডাই ওস, ট্যাফ) ।

অনৈচ্ছিক শুক্রস্রাব—বারংবার, দৌর্বল্যকর, প্রভূত শুক্রপাত ; সংসর্গের পরেও শুক্রস্রাব ; শুক্রস্রাবের পর অতিশয় সন্তোষলিপ্তা ; এক রাত্রিতে দুই বা ততোধিকবার শুক্রপাত, সলজ্জতা, দুঃখিততা, ও আরোগ্যাশাবিহীনতা (কৃত্রিম মৈথুনের দুর্নিবার প্রবৃত্তি সহকারে—অষ্টি)

বক্ষঃস্থল —কথা বলিলে ও কাসিলে বুকের দুর্বলতা (ট্যান) ; যক্ষ্মা ; তরল-বিধানের অপচয়, অতি শীঘ্র শীঘ্র বর্ধন ও অবসাদজনক মনোভাব বশতঃ জায়বায়তা

মাস্তিক (cerebral) টাইফয়েড বা টাইফস জ্বর ; সম্পূর্ণ উদাস্ত্য ও অস্থি ; কাঠের গুড়ির জায় পড়িয়া থাকা ; কোন বিষয়ে কোন খবর না লওয়া ; চারিদিকে যাহা ঘটিতেছে তৎপ্রতি সম্পূর্ণ অমনোযোগ ; অল্প হইতে ময়লা রঙের রক্তস্রাব

উপচয় —মানসিক পীড়া জন্ম ; শুক্রাদি তরল-বিধানের অপচয় বশতঃ ; কৃত্রিম মৈথুন ; অতিরিক্ত ইঞ্জিয়-গেবা বশতঃ বুদ্ধি কথা বলিলে বক্ষঃস্থলে দুর্বলতার উৎপত্তি (ট্যান)

উপশম ।—সঞ্চলন ; উষ্ণতা ও আর্দ্রকালে ; দ্রাস (কষ্ট, নর) ।

সহস্র ।—(১) টাইফয়েড জ্বরে, ফস, পলস, পিক-এসি, সিলি ও মিউ-

এসির সহিত ; এবং ঔদাস্ত, স্থিতি ও প্রাণাণে, নাইট-স্পিরি-ডলসিসের সহিত এসিড ফসের তুলনা হয়। (২) শরীর-অস্বস্তি ঘর্ষ, অতিশয় ও দুর্বলতার সিকোনার পূর্বে ও পরে ; এবং আহাতির পরে সূর্য্যের নবোদয় পরে ; ফস-এসিড তাল ক্রিয়া করে

ফাইটোল্যাকা ।

(Phytolacca.)

আস্বাসিক ধাতুর রোগী ; পেশী-তন্তু ও অস্থি-বেষ্টের ব্যাধি ; পারদ বা উপদংশ হইতে উহার উপপত্তি ।

দীর্ঘতা, হরিৎপাণ্ডু, শরীরের বসার ক্ষয়প্রাপ্তি

অতিশয় ক্লান্তি ও প্রাণাণ অবসন্নত ।

ব্রাইওনিয়া ও ক্রাসটক্স দেখিতে সুন্দর উপযোগী দেখাইলেও যখন এই ঔষধ দ্বয়ে সফলতা লাভ হয় না তখন ফাইটো ব্যবহারে আরোগ্য জন্মে

ডিপথিরিয়া, প্রমেহ, পারদ বা উপদংশের পরবর্তী আস্বাস ও জায়ু-শূল ।

তাড়িতাঘাতের স্থায় বেদনার সঞ্চার ; চিড়ক-মায়া ও ছুরিদিয়া কাটার মত দীর্ঘ দীর্ঘ স্থান-পরিবর্তনশীল বেদনা (ল্যাক-ক্যান, পলস) ; নড়িলে চড়িলে ও রাজিতে উহার বুদ্ধি ।

জীবনে সম্পূর্ণ ঔদাস্ত ; রোগিনী মনে করে যে সে নিশ্চয়ই মরিবে ।

শিরোবুর্ন ; শয্যা হইতে উঠিবার সময় শক্তিহীনতা অনুভব (ব্রাই) ।

তীব্র শিরোবেদনা ও পৃষ্ঠ-বেদন ; সর্বশরীরে খজতা, ব্যথিততা ও ঘুটতা অনুভব, অবিরত নড়িতে চড়িতে ইচ্ছা, কিন্তু নড়িলে চড়িলে বেদনা বৃদ্ধি পায় ; (ল্যাক-ক্যান, মার্ক নড়িলে চড়িলে ক্রাস পড়ে, ক্রাস) ।

দস্তোদ্ভেদ-কালে দস্ত অথবা দস্ত-শূল একত্র দংশন করিবার দুর্গিবার প্রবৃত্তি (পডো)

গল-ক্ষত (Sore throat) ; উহার মলিন লোহিতবর্ণ, আল-জিহ্বার বৃদ্ধি, শোথ, প্রায় আংশিক স্বচ্ছতা (কালী-বাই, ক্রাস)

ডিপথিরিয়া ।—গলাধঃকরণে গলা হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত বেদনার সঞ্চার ; গিলি-

বার সময় জিহ্বা-মূলে অতিশয় বেদনা ; জ্বলন্ত অঙ্গার অথবা আরক্ত তপ্ত লৌহ সংলগ্নের ন্যায় জ্বালা ; পরিশুদ্ধতা ; হস্ত-কম্প সহ গিলিতে কষ্ট ; ক্রমাগত গলাধঃকরণের ইচ্ছাসহ গলায় যেন একটা পিণ্ড রহিয়াছে একপ্রকার অনুভব, তালু-মূল, অগ্নি-জিহ্বা, ও গল-মধ্যের পশ্চাৎ ভাগের উন্নয়ন বিল্লীদ্বারা (membrane) আচ্ছন্নতা ; তপ্ত তরল দ্রব্য পান করিতে অসমর্থতা (ল্যাক)

ডিফথিরিয়া ও আরক্ত জরের পরে ক্যারোটাইড, ধমনীর গ্রন্থির ও হৃৎ-নিম্ন-গ্রন্থির দৃঢ়তা ।

স্তনে অনেকগুলি শক্ত ও ব্যথিত অর্কুদ

স্তনের স্তব্ধ থুমকা জগিবার সম্ভাবনা ; পূর্ণতা, প্রস্তুতবৎ দৃঢ়তা ও ব্যাথিততা বিশেষতঃ যখন পুয়োৎপত্তি অপরিহার্য, সন্তান স্তনপান কালে স্তন-বৃন্ত হইতে সর্ব শরীরে বেদনার সঞ্চরণ (পৃষ্ঠে-গতি, ক্রোটে-টিগ জরায়ুতে গতি, পলস, সিলি)

স্তন-ব্রণ ; নালী, ই' করা প্রদাহিত ক্ষত ; দূষিত, রসানীর মত, অম্লস্থ পুষ্ণ

স্তনের ক্ষীণতা সারেওনা পাকেওনা, উহার বেগুণী রং এবং “পুরাতন পনিরের ন্যায় কাঠিল” (ব্রাই, ল্যাক-ক্যান, ফেল) ।

স্তন-বৃন্তের অতিরিক্ত অনুভূতি, স্পর্শ-দ্বেষ ও বিদারণ (গ্রাফ) ; সন্তানকে স্তনদানে উহার দারুণ বৃদ্ধি, সর্ব শরীরে বেদনার বিকীরণ ।

ফাইটো পুয়োৎপত্তির স্তব্ধতা জন্মায় (হিপ, ল্যাক, মার্ক, সিলি) ।

উপচয় ।—বৃষ্টির সময় ও আর্দ্র শীতল বায়ুভোগে বৃদ্ধি ।

সম্বন্ধ ।—কালী-আইওডের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ ।

ফাইসটিগমা ।

(Physostigma)

অসাধারণ মানসিক ক্রিয়াশীলতা ; চিন্তাকরা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারা যায় না ।

দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা ; কলঙ্ক (blum) বা পাতলা পরদা হইতে উহার উৎপত্তি ;
দৃষ্টবস্তুর বিমিশ্রিত দেখায়

ব্যবহারের পর চক্ষু-বেদনা, চক্ষুর সম্মুখে ভাসমান বস্তুবর্ণ চিহ্ন ও আলোকের
শিখা দর্শন, চক্ষুর পাতা ও পেশীর স্পন্দন (এসার) ; নিষ্ট্যাগ্মস্ (অন্ধি-গোলকের
অনৈচ্ছিক পরিমোচন) ।

পেশী-মণ্ডলের অতিশয় অবসন্নতা ; গতিশক্তির ক্ষীণতা (জেলস) ।

মানসিক বা শারীরিক উপজীব বশতঃ যুবকযুবতীদিগের কম্প ।

স্বয়ভূত বা আভিঘাতিক ধনুর্ষ্টকার ; কোন গতিশাল লোকের যৎ-
সামান্য নিশ্বাস-বায়ুতে উহার উপস্থিতি বা উপচয় (হাইপার, লাইসি,
নকা, ট্রিক)

সম্বন্ধ ।—বেল, কোন, কিউর, জেলস, হাইপার, ও ট্রিকনিয়ার সহিত
এই ঔষধের তুলনা হয়

ফিরঃম ।

(Ferrum met)

রক্ত-প্রধান-ধাতু ; বিবাহ ও বিতর্ক প্রিয়, সহজে উত্তেজিত ; যৎসামান্য
প্রতিবাদে রাগাঘাত ব্যক্তি (এনাক, কক, ইগে) ; এবং দুর্বলতা, ক্ষুধারী,
হরিৎপাণ্ডুপ্রস্রাব অথচ অতিশয় আরক্ত-বদনা নারীদিগের পক্ষে এই ঔষধ
বিশেষ উপযোগী ।

রক্তপ্রাব-প্রবণ শারীরিক প্রকৃতি ; উজ্জল লোহিত রক্তপাত, সহজে উহা
সংযত হয় (coagulates easily) (ফির-ফদ, ইপি, ফস) ।

মুখমণ্ডলের অত্যন্ত পাণ্ডুরতা এবং অত্যল্পমাত্র বেদনায় ;
সঞ্চলনে বা শ্রমে উহার আরক্ততা ও উদ্দীপ্ততা, মুখ-রাগ
(blushing) (এমিল, কোকা) ।

উপদাহিতা ; যৎসামান্য গোলমালে, এমন কি কাগজের কড় কড় শব্দে
পর্যন্ত রোগীর নৈরাশ্র জন্মে (এসার, টার) ।

দুর্বলতা বশতঃ যদিও রোগীকে শয়ন করিয়া থাকিতে হয়, তথাপি আন্তে আন্তে হাঁটিয়া বেড়াইলে রোগী সর্বদাই ভাল বোধ করে

কোন স্নায়বিক-ক্রিয়ার বিকৃত বিবৃতি বশতঃ হরিৎ-পাণ্ডু (Icteric chlorosis), শীত ঋতুতে উহার বৃদ্ধি

ওষ্ঠ, মুখমণ্ডল, জিহ্বা ও যুথের শৈথিল্যক বিঘ্ন ও ভ্রুতি আরক্ত স্থানের শুভ্রবর্ণ প্রাপ্তি ।

ঋতু —নিয়মিত সময় অপেক্ষা শীঘ্র উপস্থিত, অধিক দিন অবস্থিত, প্রভূত ঋতু, তৎসহ অগ্নিবৎ আরক্ত মুখমণ্ডল ; কর্ণে বন্ বন্ শব্দ ; ঋতুশ্রাবের একবারে দুই তিন দিন বিরতি, তৎপরে পুনরায় প্রত্যাবৃতি ; পাণ্ডুবর্ণ জলবৎ, দৌর্বল্যকর রক্ত-শ্রাব ।

শিরোগূর্ণন —জলের উপর থাকার স্থায় তৌল করার (balancing) মত অনুভব সহকারে ; প্রবাহিত জল দর্শনে ; জলের উপর হাঁটিবার সময়, যথা সেতু পার হইবার কালে, নীচে নামিবার সময় (বোর, স্থান) ; শিরোগূর্ণন

শিরঃগীড়া —দুই তিন সপ্তাহ পর পর, দুই তিন বা চারি দিনব্যাপী ; মুদগরাঘাত বা করাঘাতবৎ স্পন্দনজনক বেদনা ও শয়নের আবশ্যকতা বিশিষ্ট শিরঃগীড়া, তৎসহ আহার বা পানে অপ্রবৃতি

বিবমিষা ব্যতীত গ্রাসে গ্রাসে ভুক্ত-দ্রব্য উল্লীর্ণ (এলম) ।

সর্বপ্রকার ঋতুজব্যে অত্যন্ত অপ্রবৃতিসহ ক্ষুধাহীনতা, অথবা ক্ষুদ্রবৎ ঘন ঘন ক্ষুধা ।

বমন ।—দুই প্রহর রাত্রির অব্যবহিত পরে বমন ; আহার করিবার মাত্র ভুক্তদ্রব্য বমন ; থাইতে থাইতে সহসা উঠিয়া বসিয়া যাহা কিছু আহার করা গিয়াছে সমস্ত এক উত্তমে বমন করিয়া ফেলা, পুনরায় বসিয়া থাইতে পারা ; অল্প বমন (লাই, মল-এসি) ।

অতিসার ।—রাত্রিতে অপরিপাচিত মল, অথবা আহার বা পান করিবার সময় মলশ্রাব (কোট-টি) ; উত্তম ক্ষুধা সহকারে বেদনাশূন্য অতিসার ; ক্ষয়রোগগ্রস্তদিগের অতিসার ।

বিবৰ্জনশীল, অনিষ্টজনক নীতিতা, শ্বাস্যুর দুর্বলতা ।

মস্তিষ্ক-দৌৰ্বল্য (এং-ফ্যাগ) — সাহিত্যিক বা কর্মশীল লোকদিগের রোগ, যৎসামান্য উত্তেজনায়, মানসিক পরিশ্রমে বা অতিরিক্ত কার্য করিলে শিরঃপীড়ার উৎপত্তি ও পৃষ্ঠবংশের লম্বালম্বি জ্বালার উৎপত্তি (কালী-ফস) ।

শিরঃপীড়া — ছাত্রদিগের, শিক্ষকদিগের, ও অতি-কার্যশীল লোকদিগের শিরঃপীড়া, শোক বা অবসাদজনক মনোভাব বশতঃ উহার উৎপত্তি ; মস্তকের পশ্চাত্তানে ও গ্রীবাদেশে বেদনা (হ্যাট-মি, মিটি) ; একটু মাত্র নড়িলে চড়িলে অথবা মানসিক পরিশ্রমে উহার বৃদ্ধি বা উদ্বেগ

পৃষ্ঠবংশের রোগসহকারে কাম-প্রবৃত্তি পরিশূন্য লিঙ্গোদ্বেগ ; অনেকক্ষণস্থায়ী প্রবল উদ্যম ; প্রভূত শুক্রপাত ; পুরুষের কামোন্মাদ (ক্যাম্ব, ফস) ।

* রীরের যে কোন অংশে, কিন্তু বিশেষতঃ বাহ্যিক শ্রুতি-প্রণালীতে (external auditory canal) ক্ষুজ ক্ষুজ শ্ফোটক

পৃষ্ঠবংশের (Spine) লম্বালম্বি জ্বালা এবং পৃষ্ঠবংশ ও পৃষ্ঠের অতিশয় দুর্বলতা ; পৃষ্ঠবংশের মজ্জার কোমলতা (ফস, মিক)

শ্রান্তি, নড়িলে চড়িলে অল্প ক্লান্তি অনুভব হইতে সম্যক পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত উহার পরিণিত সর্বশরীরে বিশেষতঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শ্রান্তি ও গৌরব অনুভব (heavy feeling) পরিশ্রমে উহার আধিক্য ।

উপচয় । — অত্যন্ত মানসিক শ্রমে ; সঞ্চালনে ; অধ্যয়নে ; ও বৃষ্টির দিনে ; বৃদ্ধি ।

উপশাম । — শীতল বায়ুতে ও শীতল জলে ; উপশম ।

সম্বন্ধ । — আর্জিনা, জেল, কালী-ফস, ফস-এসি, ফস, পেট্রো, মিচির সহিত পিত্তিক এসিডের তুলনা হয় ।

পেট্রোলিয়াম ।

(Petroleum)

যে সকল ব্যক্তিদ্বিগের চুল ও স্বক পাতলা, প্রকৃতি উগ্র ও বিবাদশীল (নক্স) ; যাহারা সামান্য বিষয়ে কষ্ট (ইগো, মেড) ও সকল বিষয়েই বিরক্ত হয় ; তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী

ঘোড়ার গাড়ী, রেলের গাড়ী অথবা জাহাজে আরোহণ জনিত পীড়া (কক, স্তানি) ; ঝড়-বজ্রের পূর্বে ও তৎকালে বিবর্জিত হয় একরূপ পীড়া (ছাট-কা, ফস, সোরি)

রোগের লক্ষণের নীচ্র নীচ্র আবির্ভাব ও তিরোভাব (বেল, ম্যাগ-ফস — প্লাট ও ষ্টাণের বিপরীত) ।

নিদ্রা বা প্রলাপ কালে একটী জজ্বা যেন ছুইটী হইয়াছে একরূপ অসুস্থান ; যেন একই শয্যায় রোগীর পার্শ্বে আর এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া রহিয়াছে ; এবং শয্যায় যেন দুইটী শিশু রহিয়াছে ; এ প্রকার অসুস্থত্ব (ভেলে) ।

উঠিলেই শিরোঘূর্ণন (ব্রাই) ; মস্তকের পশ্চাঙ্গাগে ; মস্তকবৎ ; সামুদ্রিক বিবমিষার অনুরূপ (কক) ; শিরোঘূর্ণন ।

শিরঃপীড়া মস্তকের পশ্চাঙ্গাগে সীম সদৃশ গুরুত্ব ; প্রচাপন ও দপদপকর বেদনা ; মস্তকের প্রত্যেক বস্তুই যেন সজীব ; মস্তক যেন কাষ্ঠ নির্মিত , অবশ ও ঘৃষ্ট ; একরূপ অসুস্থত্ব ।

আমাশয়-বেদনা — গর্ভাবস্থায় ; প্রচাপন ও আকর্ষণবৎ বেদনা সহকারে আমাশয় শূন্য থাকিলে ; আমাশয়ের গ্যাষ্ট্রোলজিয়া, সতত আহার করিলে উহার উপশম (এনাক, চেলি, সিলি)

অতিসার । — বাকাকপি, ও অল্প ক্রাউট (কপি দ্বারা প্রস্তুত জব্য বিশেষ আহারে ; গর্ভাবস্থায় ; ঝড়বৃষ্টি-কালে ; সর্বদা দিবাভাগে প্রবল বেগে নিঃসৃত ; পীতবর্ণ জলবৎ ; অতিসার ।

সমস্ত শরীরের চর্ম্মের কষ্টপ্রদ অসুস্থতি ; সকল পচিছেছেই কষ্ট জন্মে ; বৎসামান্য উপধাতে পুষ উৎপন্ন হয় (হিপ)

হস্তের ত্বকের থরস্পর্শতা ও বিদারণ, হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগ প্রতি শীতকালে ককঁশ, ফাঁটা, ও বিদৌর্ণ, পদ-ত্বকে স্পর্শ-দেয়, ছর্গক শর্যে উহার সিক্ততা (গ্রাফ স্থানি, সিলি)।

হার্পিজ (দক্ষ নিদেয়) — মূলাধার ও উরুধর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট অনন্যদের দক্ষ; কণ্ডুয়ন, অরক্তত, ত্বকের বিদারণ, ককঁশতা রক্তদ্রাব, শুষ্কতা বা আর্দ্রতা।

পদতল ও করতলের উত্তাপ ও আলা (স্থান, মল)

দ্বী পুরুষ উভয়েরই বাহ্য অনন্যদের শর্য ও আর্দ্রতা

বেদনা সংযুক্ত, কণ্ডুয়নজনক শীত-ফোঁট, ও হাত ফাটা, শীত স্বভূতে উহার বৃদ্ধি; শয্যা-কত।

জংপিণ্ডের সমীপে শীতলতা অস্বভাব (কার্কী-এন, ছাট-মিউ, ক্যালি-মিউ)।

উপচয়।—শকটারোহণে, বজ্র-বৃষ্টি কালে, ও শীতকালে (চর্ম-লক্ষণের) বৃদ্ধি

উপশম।—উষ্ণতার ও উষ্ণ বায়ুতে ক্রাস।

সম্বন্ধ।—(১) মীসজনিত বিষাক্ততায় পেট্রোলিয়ম অস্ত্রতম উৎকৃষ্ট ঔষধ এই ঔষধের চর্ম-লক্ষণ শীতকালে বর্জিত হয় গ্রীষ্মকালে উপশমিত থাকে (এলম); এবং বিলুপ্ত হইলে অতিসার জন্মে

পেট্রোসেলিনঃম।

(*Petroselinum*)

সবিরাম জর।—আতিষাতিক বা পুরাতন মূত্র-মার্গের প্রদাহ কিংবা সংকুচ (stricture) সংশ্লিষ্ট জর; তৎসহ উদরের রোগ এবং বিকৃত বা অসম্পূর্ণ সমীকরণ-ক্রিয়ার (assimilation) বিচলিততা

তৃষ্ণার্ততা ও ক্ষুধার্ততা, কিন্তু আহার বা পান করিতে আরম্ভ করিবারাত্র হেঁচকার সম্যক বিরতি (ক্যাঙ্কের বিপরীত)।

সহসা মূত্র-বেগ (ক্যান্স)

শিশুর সহসা মূত্র-বেগ , তৎক্ষণাৎ মূত্র-ত্যাগ করিতে না পারিলে যাতনায় উল্লসফন ।

মূলাধার (perineum) হইতে সমগ্র মূত্রমার্গের অভ্যন্তর দিয়া জালা ও সড়সড় কর ।

মূত্র-মার্গের নোকাকার গহ্বরে বারবার স্ক্রস্ক্রি

প্রমেহ —সহসা দুর্নিবার মূত্র-প্রবৃত্তি ; মূত্র মার্গের গভীর স্থানে তীব্র দংশন, ও কণ্ঠয়ন, উহাণ উপশমার্থে কর্কশভাবে মূত্র-মার্গ মর্দনের আবশ্য-কতা , লিঙ্গ মূলে বা মূত্রাশয়ের গ্রীবায়া বেদনা লাল-মেহ (gleet)

সম্বন্ধ । —সহসা মূত্র-বেগে ; ক্যান, ক্যান্স, মার্কের সহিত এই ঔষধের তুলনা হয় ।

প্লম্বাম ।

(Plumbum)

প্লম্বাম মেরুদণ্ড মূলক রোগে উপযোগী (ফস, পিক-এসি, জিক) ।

শীঘ্র শীঘ্র সমধিক শীর্ণতা প্রাপ্তি ; সর্বাঙ্গীন বা আংশিক বিরক্ততা এবং অতিশয় দুর্বলতা সহকারে পক্ষাঘাতের চরম সীমা

পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ু-মণ্ডলের দৃঢ়তা বশতঃ পেশীর শীর্ণতা ।

অবসাদ , জনপূর্ণ গৃহে প্রবেশে মুচ্ছাপ্রাপ্তি ।

ধীরে ধীরে উপলব্ধির উৎপত্তি ; বুদ্ধি-বৃত্তির জড়তা, ক্রমশঃ বিবর্তিত ঔদাস্য (জরে, ফস-এসি)

স্বুতি-শক্তির দুর্বলতা বা বিলুপ্তি ; উপযুক্ত শব্দ প্রাপ্ত হইতে অসমর্থতা (এনাক, ল্যাক-কা)

উদর-বেদনার সহিত পর্যায়ক্রমে প্রলাপ

শয্যা অঙ্কুরিত অঙ্গভঙ্গি ও অবস্থিতির অদলদল

পাণ্ডুর, ভাস্কর, পীতবর্ণ, মূতদেহ সদৃশ, ও নিমগ্ন গণ্ড বিশিষ্ট ; অতিশয় উৎকর্ষা এবং যাতন জ্ঞাপক , মুখাকৃতি

মুখমণ্ডলের স্বকের তৈলাক্ততা ও চিকণতা (হাট মিউ, শ্রানি)

মাড়ীর প্রান্তভাগ দিয় সুস্পষ্ট নীলবর্ণ রেখা ; মাড়ীর ক্ষীততা, পাণ্ডুরতা ও সীসবর্ণ রেখা প্রদর্শন

উদরে অত্যধিক বেদনা, শরীরের সকল অংশে উহার বিকীর্ণতা ।

রাজিতে উদরে এক প্রকার অস্বভূতি বশতঃ কতিপয় ঘটিকা পর্যন্ত রোগীর প্রচণ্ড ভাবে অঙ্গ-প্রসারণ ; সকল দিকেই প্রসারণের আবশ্যকতা (এমিগ)

প্রবল শূল-বেদনা, উদর-প্রাচীর যেন রজ্জুবদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠ-বংশের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে এ প্রকার অনুভব ।

উদর-বেদনা ও পুরীয় বমন সহ অঙ্গ-প্রবেশ রোগ (intussusception), উরু, বক্ষগণ অথবা নাভী দেশীয় আবদ্ধ অঙ্গ-বৃদ্ধি

কোষ্ঠ-রোধ — শক্ত, দলা দলা, মেঘের বিষ্ঠার ন্যায় কাল মল (চেলি, ওপি) ; তৎসহ মল-দ্বারের আক্ষেপ বশতঃ আবেগ ও ভয়ঙ্কর বেদন ; মলের দৃঢ়তা, প্রস্রাবের শুষ্কতা, পক্ষাঘাত বা পেশীর শীর্ণতা ; গর্ভাবস্থা ; অধিক মল-সঞ্চয় বশতঃ মল নিঃসরণের প্রতিবন্ধকতা (প্লাটিনা বিফল হইলে প্রঃমঃম ফলপ্রদ) ।

আইট-রোগ — উদর-বেদনা, উদরের আকৃষ্টতা ; শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণতা প্রাপ্তি ; অতিশয় দুর্বলতা ; বৃক্কের সঙ্কুচিততা ।

গর্ভাশয়ে জগ্ন-দেহের স্থানান্তার অনুভব ; অরায়ুর প্রসারণে অসামর্থ্য ; আশঙ্কিত গর্ভপাত ।

আক্ষেপ — ঘন ঘন পেশীর আকৃষ্টন ও প্রসারণ , অথবা অধিককণ স্থায়ী আক্ষেপ ; মস্তিষ্কের দৃঢ়তা অথবা অর্ধদ্র হইতে উহার উৎপত্তি ; অপস্রাব বা অপস্রাবের অল্পরূপ আক্ষেপ ।

পীতবর্ণ স্বক ; নিবৃত্ত-রক্তকামিগের এক প্রকার মলিন-কপিশ ছলী ; পাণ্ডু ; চক্ষু, স্বক ও মূত্রের পীতবর্ণ ।

উপচয় — রাজিতে (অঙ্গ-বেদনার) বৃদ্ধি

উপশম । — ঘর্ষণে ; ও শক্ত প্রচাপনে ; ক্রাগ

সম্বন্ধ (১) শূল-বেদনায় এলম, প্লাট ও ওপির সহিত ; নাভীর আকৃধানে পড়োর সহিত এবং আবদ্ধ অঙ্গ-বৃদ্ধিতে নকোর সহিত পঃস্বঃমের তুলনা হয় (২) পডো এই ঔষধের উদ্ভিজ্জ সমগুণ (২) পঃস্বঃমের কুফল, এলম, পেট্রে, প্লাট, মল-এসি ও জিঙ্ক দ্বারা বিনষ্ট হয়

প্লাটিনা ।

(Platina)

যে সকল নারীর কেশ মলিনবর্ণ, দেহ-তরু দৃঢ় ; যাহাদের শরীর বৃশ, ধাতু রক্ত-প্রাধান ; এবং ঋতু নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে ও অতিরিক্ত অধিক পরিমাণে হয় ; তাহাদের পক্ষে প্লাটিনা বিশেষ উপযোগী ।

অনন্যদের অত্যন্ত অনুভূতি ; বস্ত্রের স্পর্শ সহ্য করিতে পারা যায়না ; অনন্যের পরীক্ষা করিলে আক্ষেপ উৎপন্ন হয় ; রমণ-কালে ভগ্নে কষ্ট অনুভূত হয় ; সংসর্গকালে মুচ্ছা জন্মে অথবা উহা সহ্য করিতে পারা যায়না (মিউর, ও অরিগেনম তুলনা করুন) ।

বেদনা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং সেইরূপ ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হয় (ষ্টান) ; তৎসহ বেদনাক্রান্ত স্থানের অবগতা থাকে (ক্যাম) ।

শূল-বায়ুগ্রস্ত (hysterical) রোগিনী, পর্যায়ক্রমে প্রফুল্লতা ও বিমর্ষত, সহজে ক্রন্দন (ক্রোক, ইয়ে, পলস) ; পাণ্ডুরতা, সহজে শ্রান্তির উৎপত্তি ।

উদ্ধত, গর্জিত, প্রগল্ভ প্রকৃতি, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি উপেক্ষা, অনিচ্ছার একপ্রকার তাচ্ছিল্য করা

মানসিক শ্রান্তি, রোগিনীর সমীপবর্তী প্রত্যেক বস্তুই যেন ক্ষুদ্র, সকল ব্যক্তিই যেন শারীরিক ও মানসিক সম্বন্ধে নিকৃষ্ট, কিন্তু তাহার নিজের শরীর বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ ; এপ্রকার অনুভব ।

সকল দিকেই যেন রোগিনী বৃহত্তর হইতেছে এরূপ অনুভব ।

সামান্য বিরম্বে গভীর বিরক্তির উৎপত্তি (ইয়ে, ট্যাফ) ; অনেকক্ষণ মনে মনে রাগ করিয়া থাকা

অল্পভাষিতা ও মৃত্যু ভয় সহকারে জীবনে পরিতৃপ্তি (একন, আস)

ভয়, শোক, বিরক্তি ; এবং কৃত্রিম মৈথুন, ও অহঙ্কারের পরে মানসিক উপদ্রব ।

মানসিক লক্ষণের উপস্থিতিতে শারীরিক লক্ষণের বিরতি এবং শারীরিক লক্ষণের উপস্থিতিতে মানসিক লক্ষণের নিবৃত্তি

শিরঃপীড়া — মস্তিষ্কে বা মস্তকের শিথলদেশে অবশতা ও গুরুত্বজনক বেদনা ; কোথ বা বিরক্তি হইতে ; ও অরায়ুর রোগজনিত হিষ্টিরিয় হইতে উহার উৎপত্তি ; বেদনার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রাপ্তি

কামোন্মাদ — স্মৃতিকাবস্থায় উহার বৃদ্ধি ; ইন্দ্রিয়-লিপ্সার অত্যধিক বিকাশ, বিশেষতঃ কুমারীদিগের (কালী-কস) ; যোনি-মুখের অনৈজ্ঞিক আক্কেপিক অবরোধ, আক্কেপ ও আকুঞ্চন

নির্জীৱিত সময়ের অনেক পূর্বে, অতিশয় অধিক পরিমাণে, অতিরিক্ত অধিক দিন স্থায়ী ঋতু ; মলিনবর্ণ, সংযত, হর্গন্ধ, কুস্মনবৎ আক্কেপ সংযুক্ত স্রাব ; হেঁচক টান সংযুক্ত অরায়ুর বেদন , জননাদেশ অতিরিক্ত অসুভূতি

অরায়ুতে অতিশয় কণ্ডুয়ন ; ভগ-কণ্ডুয়ন ।

কোষ্ঠবদ্ধতা — পর্যটন কালে (সপ্তাহ, ত্রাই) ; মীসদ্বারা বিষাক্ত হইবার পরে ; অঙ্গের নিষ্ক্রিয়তা হইতে, কোষ্ঠ-কাঠিন্য ; পুনঃ পুনঃ নিষ্কল মল-বেগ ; সরলান্ত্রে ও মলদ্বারে স্রম কাদার স্থায় মল লাগিয়া থাকে (এলম) ; উপনিবেশিকদিগের ; গর্ভাবস্থার ; ও নকা বিকল হইবার পরে হৃদয়া অবস্থার ; কোষ্ঠ-রোধ ।

অরায়ুর রক্তস্রাব । — কাল কাল সংযত রক্তথণ্ড ও তরল রক্ত একত্র স্রাব ; গাঢ়, কাল, আলকাতরার মত অথবা জমাট-বীধা রক্ত-পিণ্ড স্রাব (ক্রোক) ।

সম্বন্ধ । — অরম, ক্রোক, ইমে, কালী-কস, পলস, সিপি, ও ষ্ট্যানের সহিত প্লাটিনার সমগুণ সম্বন্ধ ।

জ্যালে প্লাটিনার উদ্ভিজ্জ সমগুণ

(১৩৫)

ফসফরাস ।

(Phosphorus)

যে সকল রক্ত-প্রাধান-বাহুর ব্যক্তির দীর্ঘ ও ক্ষীণ দেহ, সুন্দর ও ক্ষু-
স্কুমার চক্ষু-পক্ষ্ম, সুন্দর সূক্ষ্ম অথবা আরক্ত চুল ; এবং
যাহাদের ক্ষেত্র তীক্ষ্ণ প্রতিবোধ (perceptions) ও তীব্র অনুভূতি, তাহাদের
পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী । যে সকল যুবক-যুবতী নীচ নীচ বর্জিত হয়, যাহাদের
অবশীর্ণতার প্রবণত থাকে (অবশীর্ণ হইয়া হাঁট মল), এবং ক্লোরোসিস ; ও
এনিমিয়া রোগ থাকে তাহাদের পক্ষে ; এবং প্রাতঃকালীন অতিসার বিশিষ্ট
বৃদ্ধদিগের পক্ষে , ফসফরাস সুপ্রযুক্ত ।

আলোক, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি বাহ্য সংস্কারে পক্ষেজিয়ের অতিরিক্ত
অনুভূতি (ইগে, নয়া, টারাগ)

অস্থিরতা , অবিরত সঞ্চালন, এক মুহূর্তও স্থির হইয়া বসিতে বা দাঁড়াইতে
পারা যায় না (পদস্থিরতা, জিহ্বা)

জ্বালা । — মেরুদণ্ডের স্থানে স্থানে ; ক্ষতস্থানের মধ্য ভাগে
(বরফ ঙ্গের অনুরূপ, ল্যাক-না) ; অথবা পৃষ্ঠের উপর দিকে প্রথর উত্তাপের
প্রদান ; করতলের জ্বালা (ল্যাক) ; বক্ষঃস্থলে ও ফুসফুসের জ্বালা , শরীরের
প্রত্যেক যন্ত্রের ও বিধান-তন্ত্রের জ্বালা (অসি, মলক), সাধারণতঃ শ্বাস-মণ্ডলের
রোগে

মস্তক, বক্ষঃস্থল, আমাশয় ও সমগ্র উদরে এক প্রকার দুর্বলতা
ও শূন্যতা অনুভব ।

বেদনা — বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলে বেদনা, সামান্য প্রচাপনেও উহার বৃদ্ধি,
পশ্চীক-মধ্যবর্তী স্থানে (intercostal space), ও বামপার্শ্বে
শায়নে বেদনা, অত্যন্ত মাত্রা শীতে বেদনার উদ্বেক , অনাবৃত বায়ু সহ্য হয় না

চক্ষু — নিম্ন নীলবর্ণ মণ্ডল-পরিবেষ্টিত চক্ষু ; চক্ষুর পাতার ক্ষীণতা,
জলপূর্ণ ক্ষীণতা (উপরের পাতার ক্ষীণতা, কালী-কা ; নীচের পাতার
এপিস)

কেবল দিবাভাগে কাস (ইউফ্রে), শয়ন করিলে উহার উপশম ; ও
আহারান্তে উপশম (স্পঞ্জ) ।

শরীরের তরল বিধানের অপচয়ের পরে ; কুইনাইন অপব্যবহারে ; ও
সবিরাম জ্বরের অবরোধে ; উৎপন্ন শোথ (কার্বো, সিঙ্ক) ।

কোষ্ঠকাঠিণ্ড অঙ্গের দৌর্বল্য অনিত, নিফল মল-প্রবৃত্তি বিশিষ্ট, শক্ত,
আয়সে বিনির্গত ও মলত্যাগের পর পৃষ্ঠে বেদনা অথবা সরলান্ত্রে খস্মীবৎ বেদনা
সংযুক্ত, শিশুদিগের গুদপ্রদেশ সমন্বিত, এবং রাত্রিতে মলদ্বারের কণ্ডুয়ন লক্ষণাপন্ন
মল ক্রুচ্ছ ।

আন্তে আন্তে ইঁটিলে সর্বদাই ভাল বোধ হয়, কিন্তু হ্রস্বলতা
বশতঃ রোগীকে বাধ্য হইয়া শয়ন করিতে হয় ।

উপচয় ।—বিশ্রাম কালে ; স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি ।

উপশম ।—ধীরে ধীরে ইঁটিলে ; ও গ্রীষ্মকালে হ্রাস ।

সম্বন্ধ ।—(১) এলম ও সিক্কোনার সহিত অম্লপূরক সম্বন্ধ । (২)
কি তরুণ কি পুরাতন গ্রাম সকল রোগেই ফিরমের পরে সিক্কোনা ভাল খাটে ।

ফ্লোরিক এসিড ।

(Fluoric Acid)

বার্জকোর বা অকালবার্জকোর রোগ ; উপদংশ ও পারদঅনিত ধাতু-হ্রষ্টতা
এবং যুবক-যুবতীদিগের বৃদ্ধিবৎ দর্শন ।

প্রাপ্তি ব্যতীত শারীরিক পরিশ্রমের বিবর্জিত সাধারণ্য (কোকা) ; গ্রীষ্মকালের,
অতি গ্রীষ্মের ও শীতকালের শীতের অল্পতর প্রভাব অনুভব ।

পুরাতন দন্ত-চিহ্নের প্রান্তভাগের চারিদিক লাল হইয়া উঠা ও কাঁচা দন্ত
অগ্নিবীর সম্ভাবনা (কষ্ট, গ্রাফ)

বহু সম্বানের প্রযুক্তীদিগের শিরার ক্ষীণতা ও দ্রুত, উহার দীর্ঘকালস্থায়িতা
ও হ্রস্বম্যতা ।

অস্থির, বিশেষতঃ দার্যাস্থির কেরিজ ও নিক্রোসিস, সোরা-দোষ, উপদংশ-দোষ এবং গারদ বা সিলিশিয়ার অপব্যবহার হইতে উহাৰ উৎপত্তি (এফস্)।

বালক-বালিকাদিগের দক্ষিণ শঙ্গা-স্থানের (Temple) চেষ্টা জটুল (জনা-চিহ্ন) ; কৈশিকানাড়ীর অর্কদ (ক্যাক-ফ্লোর টিউব)।

ক্ষত।—লোহিতবর্ণ প্রাপ্ত ও ফোঁকাংযুক্ত ক্ষত ; শয্যা-ক্ষত ; উষ্ণতায় বৃদ্ধি ও শীতলতায় হ্রাস প্রাপ্তি, কে'ন এক ক্ষুদ্র স্থানে নিবদ্ধ, বিদ্যায় রেখার ছা'য় প্রচণ্ড বেদনা।

শীঘ্র শীঘ্র দস্তুর ক্ষয় প্রাপ্তি ; দস্ত-নাগী বা নেত্র নাগী (নাগী ষা) ; মুখমণ্ডলের অস্থির অস্বাভাবিক বিবর্জন (হেক্স)।

সম্বন্ধ।—(১) কোঁকা সিলির সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ (২) মণ্ড-পায়ীদিগের উদররোগে আসেনিকের পরে ; বজ্রকণ রোগে (হিপ-ডিজিজ) কালী-কার্বে'র পরে ; দস্তুর অতিরিক্ত অনুভূতিতে, কক্ষি ও ষ্ট্রাকের পরে ; বহুমূত্রে ফস-এসির পরে ; অস্থিরোগে সিলি ও সিম্ফার পরে ; এবং গলগণ্ডে, স্পঞ্জিয়ার পরে ; ফ্লোরিক এসিড ভাল খাটে।

বার্বে'রিস ভঃলগেরিস।

(Berberis Vulgaris)

বৃক্ক (kidney) অথবা মূত্রাশয়ের লক্ষণের প্রাধাত্য

কটিতে বেদনা ; বৃক্ক-প্রদেশে অতিশয় স্পর্শ-বেদ ; উপবেশনে ও শয়নে, এবং সজ্জ্বর্ণ ও প্রাপ্তি বশতঃ উহার আতিশয়া

বৃক্ক-প্রদেশে জ্বালা ও টাটানি।

বৃক্ক-প্রদেশে ও কটিদেশে প্রচাপনসংযুক্ত অবশতা, আড়ষ্টতা ও পঙ্গুতা (Lameness)

মুখমণ্ডলের মৃত্তিকার ছায় পাণ্ডুবর্ণ, গণ্ডকের নিমগতা, এবং নীলমণ্ডল-পরিবেষ্টিত কোটর-গত চক্ষু

মূত্র-বস্ত্রের রোগ সহকারে আমবাত ও গ্রহিবাত জনিত পীড়া।

পিত্ত-শিলা (gallstone) জনিত উদর বেদনা ।

পিত্তজনিত উদর বেদনা, তৎপরে পাণ্ডু-রোগ ; কদম-বর্ণ-মল পিত্তলক্ষণ ও কৃষ্ণস্থানের কণ্ডুয়ন সহকারে ভগন্দর (fistula ano) হ্রস্বকাম ও বক্ষঃস্থলের পীড়া, বিশেষতঃ ভগন্দরে মজ্জাক্রিয়ার পরে (ক্যাথ-কম, মিলি)

বাম বৃকক হইতে মূত্রবাহীনের (ureter) পথে মূত্রাশয় ও মূত্রমার্গ (urethra) পর্যন্ত সূচী-বেধন ও কর্তনবৎ বেদনা (ট্যাব—দক্ষিণ বৃকক হইতে, লাইক)

বৃকক শূল, বামপার্শ্বে আতিশয় (ট্যাব—মূত্রবেগ ও মূত্র-কচ্ছ, সহ যে কোন পার্শ্বে, ক্যাথ)

বৃককে জল-বুদবুদ উথিতির স্থায় অশুভব (মেড)

মূত্র —ঈষৎ হরিষর্ণ (greenish), রক্তের স্থায় লোহিত, গাঢ় আঠা আঠা স্লেয়া সংযুক্ত ; স্বেচ্ছ, ঈষৎ আরক্ত অথবা সেহবৎ (jelly like) অধঃপতিত পদার্থ বিশিষ্ট ; মূত্র ।

সঞ্চালনে মূত্র-বেগের উপস্থিতি অথবা বৃদ্ধি ।

উপচয় —সঞ্চালন, বিচরণ বা শকটারোহণ ; এবং আকস্মিক সংঘর্ষণে বৃদ্ধি ।

সম্বন্ধ —(১) বৃকক-শূলে, ক্যাথ, লাই, মাসী, ট্যাবের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ । (২) আমবাতিক রোগে, আর্গ, ব্রাই, কালী-বাই, হ্রাস ও মলকের পরে এই ঔষধের ভাল ক্রিয়া দর্শে ।

বিসমঃথ ।

(Bismuth)

নির্জানতা সহ্য হয় না । লোক-সংসর্গের ইচ্ছা, শিশু সংসর্গার্থে মাতার হাত ধরিয়া থাকে (কালী-কা, মিলি, লাই)

উৎকর্ষা ; রোগী কখন বসে, কখন হাঁটে, কখন শোয়,

কখনও একস্থানে অনেকক্ষণ থাকে না ।

প্রতি শীতকালে শিরঃপীড়ার প্রত্যাবৃতি ; আমাশয়-শূণ্যের সঙ্গে সঙ্গে, বা পর্যায়ক্রমে উপস্থিতি ।

মুখমণ্ডলের মৃতবৎ পাণ্ডুরতা, চক্ষুর চতুর্দিকে নীলবর্ণ মণ্ডল
শীতল জল মুখে রাখিলে দন্ত-বেদনার উপশম (ভ্রাই, কফি, পলস)

বমন । জল আমাশয়ে উপস্থিত হইলেই বমন হইয়া

পতন, ভুক্তজব্যের অধিকতর সময় অবস্থিতি (ভুক্তজব্য ও জল বমন, আস) ।

কয়েকদিন পরে পরে, আমাশয় ভুক্তজব্যে পূর্ণ হইলে, অধিক পরিমাণে বমন ; পান করিবারাত্র সকল প্রকার তরল পদার্থ বমন ; এবং দুর্গন্ধ মল বিরেচন (জলবৎ মল, ভিরে) ; তৎসহ আক্ষেপিক মুখ-রোধ ও অকথ্য বেদনা, উদর-ছেদের (laparotomy) পরে উহার উৎপত্তি (নক্স, ষ্ট্রাক)

আমাশয় ।—কোন এক ক্ষুদ্র স্থানে, ভারী বস্তুর চাপের স্থায় চাপ, তৎসহ পর্যায়ক্রমে জালা । খাল-ধরার স্থায় আক্ষেপিক বেদনা ; তৎসহ উপদাহ, হৃদাহ (বুক-জালা) ও মুখ-প্রসেক (মুখে জল-উঠা)

বমন-প্রধান, মুহু ওলাউঠা ও গ্রীষ্মকালীয় উদরাময় ; মলিন, লেহবৎ জলবৎ, দুর্গন্ধ, অতিশয় অবসন্নতাজনক মল (আস, ভিরে)

বেঞ্জোইক এসিড ।

(Benzoic Acid)

প্রমেহ কিংবা উপদংশগ্রস্ত রোগীর গাউট বা আমবাতিক প্রকৃতি প্রাপ্তি ।

গাউট জনিত পিণ্ড-সঞ্চয় ; সন্ধি-বাত, সকল সন্ধির আক্রান্ততা, বিশেষতঃ সঞ্চালনে আশুসন্ধির কড় কড় শব্দ ; সন্ধিস্থলে চূর্ণময় পদার্থের সঞ্চয় (বার্ক, লিথি-কার্ক, লাই)

মলিন-কপিশ মুত্র, মুত্রের মুত্র-গন্ধের অত্যন্ত তীব্রতা ।

সুকুমার শিশুদিগের রাত্রিতে শয্যা-মূত্র ; মূত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থির বিবর্জনসহ বৃদ্ধ পুরুষদিগের বিন্দু বিন্দু মুত্র-পাত ; মুত্রের স্বাভাবিক গন্ধের অধিকতর তীব্রতা ; মুত্রে ইউরিক এসিডের আতিশয্য

গ্রামেহের বিলুপ্তির পর মূত্রাশয়ের প্রাতিষ্ঠায় (catarah) ।

বালক-বালিকাদিগের অতিসার , শুভ্র, অতি দুর্গন্ধ, অবসন্নতাজনক তরল মল, শয্যা-বস্ত্রের অভ্যন্তর দিয়া উহার গতি (পড়) ; দুর্গন্ধ, গাঢ় লোহিত বর্ণ মূত্র

কাস ; হরিদ্বর্ণ শ্লেষ্মা নিষ্কাশন (স্কাট-মল) ; অত্যন্ত শ্রান্তি ও আমশ্র ।

পায়ের বৃক্কাক্ষীর বড় বড় সন্ধিতে ছেদন ও সূচী-বেধনব্যৎ বেদনা ; সন্ধিস্থানের আরক্ততা ও ক্ষীণতা ; রাত্রিতে গাউটের বৃদ্ধি ।

সম্বন্ধ ।—(১) অব্যবহৃত মূত্র রোগে ; বিশেষতঃ নাইটার বিফল হইলে কোপে, নাইটার, ফির, থুজার সহিত বেঞ্জ-এসিডের সমগুণ সম্বন্ধ সন্ধিবাত অনিত রোগে বার্ক ও লিথি-কার্ক ইহার সমগুণ (২) গাউট রোগে কলচিকম বিফল হইলে তৎপরে ; এবং বিলুপ্ত গ্রামেহে কোপেবা অপব্যবহৃত হইবার পরে এই ঔষধ উপযোগী । (৩) সুরার সহিত ইহার বিষম-গুণ সম্বন্ধ ; তদ্বারা মূত্র-রোগ, এবং গাউট ও আমবাত অনিত রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ।

বেলেডোনা ।

(Belladonna)

পিত্ত-প্রধান, রস-প্রধান ও রক্ত-প্রধান প্রকৃতির রোগী ; অসুস্থাবস্থায় সজীবতা ও প্রফুল্লতা, অসুস্থাবস্থায় প্রচণ্ডতা ও অনেক সময় প্রলাপিতা

লঘু-কেশ, নীল-নয়ন, স্তম্ভর মুখশ্রী, স্নকুমার বকবিশিষ্ট নারী ও বালক-বালিকা ; অম্লভাবাদিক, স্নায়বিক, আকোপ-শৃঙ্খল রোগী ; গুটিকা প্রকৃতি-বিশিষ্ট (টিউবারকিউলস) রোগী

সহজে সর্দি লাগে ; বায়ু-প্রবাহে, বিশেষতঃ শস্তক অমাবৃত থাকিলে, অতিশয় অম্লভাবাদিক্য ; চুল কাটিলে সর্দি লাগে ; শীতল বাতাসে ঘোড়ার চড়িয়া বেড়াইলে তালু-মূলের (lonsils) প্রদাহোৎপন্ন হয় (একন, হিপ, রস—পায় ঠাণ্ডা লাগিলে সর্দি লাগে, কোনা, কুপ, সিলি) ।

দ্রুত অনুভব ও দ্রুতগতি; শূন্য শীঘ্র সঞ্চালিত হয়; বেদনা অবশ্রান্ত উপস্থিত হয়; অনিশ্চিত সময় পর্যন্ত থাকে এবং অকস্মাৎ বিরত হয় (ম্যাগ-ফর্ম)

বেদনার সাধারণতঃ অল্প অল্প সময় স্থায়ী আক্রমণ; বেদনার বদন ও নয়নের আরক্ততার উৎপত্তি; মস্তকের পূর্ণতা ও ক্যারটিড ধমনীর দপদপ।

রোগী মনে করে যেন সে ভূত-প্রেত, ভাঙর মুখ, ও বিবিধ কীট (ট্রাম) কৃষ্ণবর্ণ জন্তু, কুকুর এবং নেকড়ে বাঘ প্রভৃতি দেখিতে পায়।

অবাস্তব বস্তুর ভয়, উহাদের নিকট হইতে পলায়নের ইচ্ছা; ভ্রান্তদৃষ্টি (halucination)।

প্রচণ্ড প্রলাপ; কামড় দেওয়া, থুথু ফেলা, মারা ও জ্বালাদি ছিঁড়িয়া ফেলিবার প্রবৃত্তি; উচ্চ হাস্যের আবেশ ও দাঁত কড়মড় করা; পরিচারকদিগকে দংশন ও আঘাত করিবার প্রবৃত্তি (ট্রাম); পলায়নের চেষ্টা (হেলি)

মস্তকের উত্তপ্ততা ও যাতনাপূর্ণতা; বদনের প্রদীপ্ততা; নয়নের প্রমত্ততা (wildness) ও একদৃষ্টি (staring), চক্ষু-তারার প্রসারিততা, নাড়ীর পূর্ণতা, উল্লক্ষনশীলতা (bounding), গোলাকারতা, ও গোলায় স্থায়ী অঙ্গুলিতে আঘাতকারিতা, মুখ গহ্বরের শৈথিল্যিক স্থিতির পরিস্ফুটতা; মস্তকের ধীরতা ও মস্তকের বিলুপ্ততা; নিজা লুপ্ততা, অথচ নিজা যাইতে অপারগতা (ক্যাম, ওপি)

দস্তোকাগম-কালে, জরসহকারে টক্কর (জর ব্যতীত টক্কর, ম্যাগ-ফর্ম); সহসা উহার উপস্থিতি, মস্তকের উত্তপ্ততা ও পদদ্বয়ের শীতলতা

মস্তকে ও মুখমণ্ডলে রক্তের প্রাধান্য (এমি, গ্রন, মেল)।

আরক্ত মুখমণ্ডল, মস্তিক ও গ্রীবার বৃহৎ ধমনীদ্বয়ের দপদপ সহকারে, রক্তসঞ্চয় জনিত, শিরোবেদনা (মেল); সামান্য শক, সংঘর্ষণ, সঞ্চালন, আলোক, শব্দ, ও অন্যান্য শ্রেণী উহার উপচয়, প্রচাপন, দৃঢ় বন্ধন, বস্ত্র আড়িত করণ ও ঘাতকালে উপশম।

বালিসে মস্তক প্রবিষ্ট করণ (এপিস, হেলি, পড)

মস্তক অবনত করিলে, অথবা মস্তক অবনত করিয়া থাকিয়া উঠিবার সময় (ব্রাই) শিরোগূর্ণন; প্রত্যেকবার অবস্থান পরিবর্তনে শিরোগূর্ণন।

উদরের স্পর্শ বেষ ও স্ফীততা, অতি অল্প মাত্র সংঘর্ষে এমন কি শয্যার

সংস্পর্শে পর্য্যস্ত উহার বৃদ্ধি; কোন প্রকার সংঘর্ষ না লাগে একজন্ম অতি সাবধানে বিচর।

দক্ষিণ জড়িতাজ ও অক্ষাজ প্রদেশে (ইগিওসিকেল রিখিয়ন) বেদনা, যৎসামান্য স্পর্শে এমন কি মধ্য-বয়স্কের সংস্পর্শে পর্য্যস্ত উহার বৃদ্ধি

অনুগ্রহ স্থলাজের (ট্রান্সভাস কোলন্) পিণ্ডের দ্বারা উন্নয়ন।

ত্বক্।—ত্বকের সমাকার, মৃদু, চিকণ, গাঢ় আৱরক্ততা পরিপূর্ণতা, উত্তপ্ততা, ও আলা, পরীক্ষার্থে গায়ে হাত দিলে হাতে আলা অনুভব; সম্পূর্ণ মৃদু ও প্রকৃত আৱরক্ত উদ্ভেদ বিশিষ্ট একত সিডেন্‌হাম্ স্কার্লেট জ্বর।

উন্নতির আধেয় পদার্থ যেন ভগপথে বাহির হইয়া পড়িবে নিম্নাভিমুখে একপ প্রচাপন; দাঁড়াইলে ও সোজা হইয়া বসিলে উহার উপশম; প্রাতঃকালে উপচর (লিলি, মিউর, গিপি)।

উপচর।—স্পর্শে, নড়িলে চড়িলে, শব্দে, বায়ুপ্রবাহে, সমুজ্জল চাকচিক্য-ময় বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করিলে (লাইসি, ট্রাম) অপরাহ্ন ৩টার পরে, রাত্রিতে, ছই প্রহর রাত্রির পরে, পানকালে, মস্তক অনাবৃত করিলে, গ্রীষ্মকালের সূর্য্যের উত্তাপে ও শয়ন করিলে বৃদ্ধি

উপশম।—বিশ্রামে, দাঁড়াইলে অথবা সোজা হইয়া বসিলে ও উষ্ণ গৃহে উপশম

সম্বন্ধ।—(১) ক্যালকেরিয়ার সহিত অল্পপুরুষ সম্বন্ধ বেলেডোনার আৱরক্ত আরোগ্য ক্যালকেরিয়ার সম্পূর্ণ হয়। (৪) একন, ব্রাই, সিকু, জেল, মন, হাইওস, মেল, ওপি ও ট্রামোর সহিত বেলেডোনার সমগুণ সম্বন্ধ।

বোভিষ্টা ।

(Bovista)

শুষ্ক বা আর্দ্র দক্ষিণাঙ্গ রোগী ।

হৃৎকম্প সংযুক্তা বৃদ্ধা কুমারী

তোতলা বালক-বালিকা (ষ্ট্রাম)

নাসিকা ও অন্যান্য শ্লিষিকঝিল্লী হইতে অতি শক্ত, রজ্জুবৎ, চুম্বেচ্ছত্বে
আব নিঃসরণ (কালী-ব)

ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি -মুখ *জাদি ব্যবহারে অঙ্গুলীতে অতিশয় গভীর
দাগের উৎপত্তি ।

কটিদেশে কাপড় সহ্য না (ক্যাঙ্ক, ল্যাক, সলফ) ।

কক্ষতলের ঘর্ষে পীলা গুর জায় গন্ধ

দন্তোত্তোলনের পর (হেমে) ; আঘাত হইতে ; এবং নাসিকা হইতে
রক্তস্রাব ।

সন্ধি সকলের অতিশয় দুর্বলতা এবং হস্ত-পদের শ্রাস্তি ।

হাত হইতে জব্যাদির পতন-প্রবণতা (এপিস) ; শক্তিশূন্য হস্ত হইতে
বস্তুর পতন ।

ঋতু ।—কেবল রাত্রিতে ঋতুর রক্ত প্রবাহিত হয়, দিনে পড়েনা
(ম্যাগ-কা—কেবল দিনে পড়ে, এবং শুইলেই থামিয়া যায়, ক্যাঙ্ক, কষ্ট,
লিলি) ; ঋতুর পূর্বে ও ঋতু-কালে অতিসার (এম-কা) ; ঋতুঘয়ের
ব্যবধান-কালে মধ্যে মধ্যে কয়েকদিন রক্তদর্শন (বোরা) , প্রক্তি ছই
সপ্তাহে মলিন ও সংযত রক্ত নিঃসরণ ; তৎসহকারে যজ্ঞগাপূর্ণ আবেগ (bearing
down sensation) (সিপি) ।

কোকিল-চঞ্চু-অস্থির (coccyx) অগ্রভাগে ছর্নিবার কণ্ডুয়ন ; যে পর্য্যন্ত
না অবদরন ও ক্ষত জগ্নো ততক্ষণ চুলকাইতে হয়

সম্বন্ধ ।—(১) ঋতু-বৈলক্ষণ্যে, এম-কা, বেল, ক্যাঙ্ক, ম্যাগ-সল, সিপির
সহিত তুলনা হয় । (২) আলকাতরার বাহ্য প্রয়োগের মন্দ ফল ; এবং বাষ্প
(গ্যাস) অনিত শ্বাস-রোধ বোভিষ্টা দ্বারা নিবারিত হয় (৩) পুরাতন শীত-
পিতে ব্রুসটিকা উপযোগী হইয়াও বিফল হইলে বোভিষ্টা ব্যবহৃত হয় ।

বোরাক্স ।

(Borax)

প্রায় সকল রোগেই নিম্নাভিমুখ গতিতে আশঙ্ক্য ।

নিম্নাভিমুখ গতিতে অতিশয় উৎকর্ষা ; শিশুকে খাটে শোয়াইতে গেলে কান্দে ও খাতীকে ছড়াইয়া ধরিয়া থাকে ; দোলাইলে, বুলাইলে, নাচাইলে, এবং নীচের তলায় নামাইতে ও ঘোড়ার পিঠে চড়াইতে ভয় পায় ।

কোন দৃশ্যমান কারণ ব্যতীত শিশু সহসা জাগিয়া চিৎকার করে ও ঘোড়ার পার্শ্ব হাতদির চাপিয়া ধরে (এপিস, সিনা, ট্রাম) ।

অত্যন্ত স্মারবীয়তা, যৎসামান্য শব্দে অথবা অসাধারণ (unusual) তীব্র শব্দে এবং কানি, হাঁচি, ক্রন্দন বা দীপ-শলাকা জালিবার শব্দে ভয়প্রাপ্তি (এসার, ক্যানাড)

চুল জড়াইয়া যায়, চিরিয়া যায়, অগ্রভাগে সংলগ্ন হইয়া থাকে ; এই সকল খোঁপা কাটিয়া ফেলিলে পুনরায় জন্মে, আঁচড়াইয়া সমান করা যায়না (ফ্লোর-এসি, লাই, সোরি, টিউব) ।

চক্ষুর পক্ষা শুষ্ক, আঁঠা আঁঠা জ্বাব ; প্রোতে সংযোজনা ; পক্ষের রোম অভ্যন্তর দিকে ফিরিয়া চক্ষুর, বিশেষতঃ উহার বহির্দিকের কোণের প্রদাহের উৎপত্তি ; উচ্ছৃঙ্খল রোমোৎপত্তির প্রবণতা

নাসা-রন্ধুর চিপিটিকা, প্রদাহিতা ; নাসাগ্রের চিকণ আকৃতি ; যুবতী কামিনীদিগের লাল-নাক ।

দক্ষিণ নাসা-রন্ধুর অবরুদ্ধতা, অথবা প্রথমে দক্ষিণ, তৎপরে বাম নাসা-রন্ধুর অবরুদ্ধতা, তৎসহ অবিরত ফোঁৎ ফোঁৎ করণ (এম-কা, ল্যাক-কা, ম্যাগ-মি) ।

উপক্ষত ।—মুখ-বিবরে, মিহবার উপরে, গালের অভ্যন্তর ভাগে উপক্ষত ; আহারকালে বা স্পর্শ করিলে উহা হইতে সহজে রক্তপাত হয় ; শিশুর স্তনপানে প্রতিবন্ধকতা জন্মে ; তৎসহকারে মুখ-বিবরের উত্তপ্ততা, পরিপুষ্কতা ও

পিপাসা (আস'), জ্বরের বিদারণ ও রক্তপাত (এরম) এবং লাল্য প্রাব (বিশেষতঃ দস্তোজ্জেন-কালে) থাকে ।

উপকৃতজনিত মুখ-ক্ষত ; স্পর্শ, এবং অন্ন বা লবণাক্ত জব্য আহারে উহার বৃদ্ধি ; বৃদ্ধিগের মুখের উপকৃত (এলুমেন) ।

শিশুর বারবার মূত্র-পাত, ও মূত্রত্যাগের পূর্বে চিৎকার (লাই, শ্যানি, সাম')

শ্বেতপ্রদর — প্রভূত অণ্ডলালময়, শ্বেতসারময়, উষ্ণতার প্রবাহের দ্বারা অল্পভূত ; ঋতুকালের ব্যবধান সময়ে ছই সপ্তাহ পর্যন্ত ; প্রদর-প্রাব (বোভ, কোনা) ।

দ্রব ; অল্প, সামান্য উপঘাতে পুষ্টিপত্র (ক্যালেক, হিপ, মার্ক, সিলি) ।

উপচয় । — নিম্নাতিমুখীন গতি ; আকস্মিক যৎসামান্য ক্ষয় ; ধূমপান (উহাতে অতিসারও জন্মিতে পারে) ; ও সর্জ, শীতল ঋতুতে এবং মূত্রত্যাগের পূর্বে, বৃদ্ধি ।

উপশম । — প্রচাপনে ; ব্যথিত পার্শ্ব হাত দিয়া ধরিয়া রাখিলে ; উপশম ।

সম্বন্ধ । — (১) ক্যালেক, সোরি, শ্যানি, ও সলফের পরে বোরাক্স ব্যবহার (২) বোরাক্সের পরে, আস', লাই, লাই, ফস, সিলি, স্প্রুয়স । (৩) এসেটিক-এসিড, ভিনিগার ও আসবের (সুরা) পূর্বে বা পরে বোরাক্স ব্যবহৃত হয় না । উহাদের সহিত প্রতিকূল সম্বন্ধ ।

ব্যাপ্টিসিয়া টিকটোরিয়া ।

(*Baptisia Tinctoria*)

ব্যাপ্টিসিয়া রস-প্রধান ধাতুতে উপযোগী ।

শরীরের তরল বিধানের বিসমাস-প্রবণতা সহকারে অতিশয় অবসন্নতা (পাইরো) ; লৈঙ্গিক বিলম্বিত ক্ষত ।

শরীরের সর্ববিধ নিঃসরণ ও প্রাবের দুর্গন্ধ, বিশেষতঃ টাইফয়েডজের অথবা অন্যান্য তরলরোগে শ্বাস, মল, মূত্র, ঘর্ম ও ক্ষতের দুর্গন্ধ (সোরি, পাইরো) ।

মানসিক পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তি ; চিন্তা করিতে অনিচ্ছা, অথবা অসামর্থ্য।
সম্পূর্ণ উদাসীনতা, কিছু করিতে চেষ্টা জ্ঞাননা, কার্যে মন স্থির রাখিতে পারা
যায় না।

সুপ্তি ; কথা শুনিতে শুনিতে অথবা জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর দিতে দিতে
নিদ্রিত হইয়া পড় , কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক উত্তর পাওয়া যায়, আবার
তখনই প্রলাপ উপস্থিত হয় (আর্ন)

প্রথমে লোহিতবর্ণ জিহ্বা-কণ্টকসহকারে জিহ্বায় শুভ্রবর্ণ লেপ ; কেন্দ্র
স্থলের শুষ্কতা এবং পীত-কপিশ বর্ণ, পরিশেষে জিহ্বার শুষ্কতা, বিদারণ ও ক্ষত
মুণমণ্ডলের উদ্ভীষ্টতা, ধূসরবর্ণ, মলিন আরক্ততা, বুদ্ধিশূন্য, বিমত্ত মুখাকৃতি
(জেলস)।

কেবল তরল পদার্থ গিলিতে পারা যায় (ব্যারা-কা), যৎ-
সামান্য কঠিন খাদ্য ও গলায় ঠেকে (কেবল তরল জব্য গিলিতে পারা যায়, কিন্তু
উহাতে অরুচি, সিলি)

বেদনাশূল্য গল-ক্ষত (Sore throat); তালু-মূল, কোমল তালু (Soft
palate) ও কণ্ঠমূলের মলিন আরক্ততা ও ক্ষীণতা, পচা, দুর্গন্ধ জ্বাব ; ডিপথিরিয়া।

বুদ্ধিগের রক্তাতিসার ; বালকদিগের অতিসার, বিশেষতঃ উহাতে অতিশয়
দুর্গন্ধ (কার্কো, পডো, সোরি)।

রোগিণী আপনাকে একত্র করিতে পারেনা বলিয়া নিজা যাইতে পারেনা ;
মস্তক বা শরীর শয্যার চারি দিকে খণ্ড খণ্ড ছড়ান বোধ হয় ; সেই সকল
খণ্ড একত্র করিতে রোগিণী এপাশ ওপাশ করে ; তাহার বোধ হয় যেন সে
তিনজন, সকলকে সে চাকিয়া রাখিতে পারে না (পেট্রো)।

যে কোন অবস্থানে রোগী শয়ন করে, শরীরের যে
অংশে ভর দিয়া শয়ন করে সেই অংশই ব্যথিত ও ঘৃণ্ট অনু-
ভূত হয় (পাইরো—আস' ও পাইরো তুলনীয়)

টাইফয়েড জ্বরে শয্য-ক্ষত (আর্ন, মিউ-এসি, পাইরো)।

সংস্কৃত ।—(১) শানি, স্নায়বীয়তা, প্রদীপ্ত মুণমণ্ডল, তজ্জালতা ও পেশীর
বেদনাবিশিষ্ট জ্বরের প্রথমাবস্থায় আর্ন, আস', আই, ও জেলসের সমস্তণ।

(২) টাইফয়েড্ বা টাইফস জ্বরে অল্পপদার্থভাবে অথবা অতিরিক্তরূপে পুনঃ পুনঃ আর্সেনিক প্রয়োজিত হইয়া থাকিলে ব্যাপ্ট উপযোগী (৩) টাইফয়েড ও টাইফস জ্বরের রক্ষণাবে ব্যাপ্টিগিয়ার পরে ক্রোট, হেমে, নাই-এসি ও টেরেবিন্থ ভাল ক্রিয়া করে ।

ব্যারাইটা কার্বনিকা ।

(Baryta Carbonica)

প্রথম বাল্যকাল ও দ্বিতীয় বাল্যকাল অর্থাৎ বার্ককোর রোগে এবং কচ্ছ-দোষ অথবা গুটিক-ধাতু-দোষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী ।

স্মৃতিশক্তির অসম্ভাব । বিস্মরণশীলতা, অনাবিষ্টতা (inattention), মনে রাখিতে পারেনা বলিয়া বালক লিখিতে পারেনা জড়ত্ব জন্মবার সম্ভাবনা ।

গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত, খর্ষকায় শিশু, শীঘ্র বাড়েনা (শীঘ্র শীঘ্র বাড়িলে, ক্যাঙ্ক); গণ্ডমালাজনিত চক্ষু-প্রদাহ, কনোনিকার অনচ্ছতা, উদরের ক্ষীণতা; ঘন ঘন উদর-বেদনার আক্রমণ; মুখমণ্ডলের ক্ষীণতা (ফুলা-ফুলা ভাব); সর্ষাজীন শীর্ণতা।

শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা বিশিষ্ট বালক বালিকা ।

খর্ষকায়, হিষ্টরিয় গ্রস্তা স্ত্রী এবং স্বল্পরজোবিশিষ্টা কুমারীদিগের রোগ; শারীরিক তাপের অসম্ভাব, সর্ষদা শীত শীত অনুভব ।

বৃদ্ধ, ধাতু-দ্রষ্ট ব্যক্তি; গণ্ডমালাগ্রস্ত, বিশেষতঃ স্কুলকায় ব্যক্তি, অথবা গাউট রোগগ্রস্ত ব্যক্তি (ফ্লোর-এসি)

বৃদ্ধ পুরুষদিগের রোগ; মূত্রাশয়ের মূখশায়ী গ্রন্থি ও অণ্ডের বিবৃদ্ধি অথবা দৃঢ়তা; মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতা ।

বৃদ্ধদিগের সংল্যাস-প্রবণতা; প্রাচীন মদ্যপায়ীদিগের রোগ; বাল-চিত্ত বৃদ্ধদিগের শিরঃপীড়া ।

তালু-মূল বা গল-প্রদাহের প্রবণতা, সহজে শর্দির উৎপত্তি; অথবা প্রতিবার শর্দির আক্রমণে, এমন কি যৎসামান্য শর্দি লাগিলেই তালু-মূল-প্রদাহের উপস্থিতি, উহাতে পুষোৎপত্তির প্রবণতা (হিপার, সোরি) ।

এরূপ দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছু গিলিতে অক্ষমত (ব্যাপ্ট, গিলি) ।

প্রত্যেকবার মূত্র-ত্যাগকালে অর্শবলির বহির্গমন (মিউ-এসি)

সোরা দোষগ্রস্ত বালক-বালিকাদিগের পুসাতন কাম ; বিবর্জিত তালু-মুণ্ড অথবা দীর্ঘাভূত অলি-জিহ্বা ; যৎসামান্য শক্তিতে উপচয় (এলম) ।

গ্রন্থির, বিশেষতঃ গ্রীবার ও কুচকীয় গ্রন্থির ক্ষীণতা ও দৃঢ়তা, অথবা প্রচ্ছন্ন (incipient) পুষ্টিপদ্ধি ।

হৃগ্ন পাদ ঘর্ষ, তজ্জীর্ণ পদাঙ্গুলী ও পদতলের ক্ষত (পাদ-মূলের ঘর্ষ) ,
পায়ের ঘর্ষের অবরোধ বশতঃ গল-রোগ (গ্রাফা, সোরি, স্তানি, গিলি) ।
শর্দিতে অতিশয় অল্পভাবিক্য (ক্যাফ, কালী-কা, সোরি) .

উপচয় ।—রোগের বিষয় চিন্তা করিলে (অক্স-এসি), ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে ; আহারান্তে ও স্বপ্নস্থান প্রক্ষালনে ; বৃদ্ধি

সম্বন্ধ ।—(১) সাধারণতঃ সোরি, সলফ ও টিউবের পরে উপকারী ।
(২) ব্যারাইটা-কার্বের পরে সোরিগম ব্যবহারে তালুগুণ প্রদাহের প্রবণতার শারীরিক প্রকৃতি নির্মূল হয় । (৩) এলম, ক্যাফ-আইওড, ডলকা, ক্লোর-এসি, আইওড, গিলি, ব্যারাইটার সমষ্টি (৪) গণ্ডমালাজরোগে, ক্যালকেরিয়ার পরে ব্যারাইটা বিষমণ্ডণ ও অল্পপযোগী

ব্রাইওনিয়া ।

(Bryonia)

আমবাত বা গ্রন্থিবাত প্রকৃতির ব্যক্তিদিগের পক্ষে এবং পিত্ত-প্রকোপের পক্ষে ; এই ঔষধ বিশিষ্টরূপে উপযোগী

ব্রাইওনিয়া জাপক রোগীদের কোপনতা, অচঞ্চলতা ও ক্রোধ-প্রবণতা ; মলিনবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ চুল, মলিনবর্ণ মুখাকৃতি, দৃঢ় পেশী তন্তু ; শুষ্ক, কৃষ্ণ স্নায়বিক দেহ থাকে

বেদনা ।—ব্রাইওনিয়ার বেদনা স্থলী-বেদন বা ছেদনবৎ হয়, রাত্রিতে উহা বৃদ্ধি পায়, নড়িলে চড়িলে, নিশ্বাসগ্রহণে, ও কাসিলে উহার

উপচয়; এবং সম্পূর্ণ স্থিতিরতায় ও ব্যথিত পার্শ্ব শয়নে
উহার উপশম অগো (টিটিয়া, ৭ল;—সুচী-বেদনবৎ বেদনার উপচয় ও
উপশম তাইওনিয়ার বিপরীত প্রকৃতির হইলে, কালী-কা)

সমগ্র শরীরের শৈল্পিক বিল্লীর অতিশয় পরিশুদ্ধতা, গঠ
ও ত্রিহবার পরিশুদ্ধতা ও বিদারণ; মলের দৃষ্টবৎ ওকত; শুষ্ক কঠিন;
যন্ত্রণাজনক স্বল্প নিষ্টিবন বিচ্ছিন্ন কাস; মণিবর্ণ অল্প মূত, অতিশয়
পিপাসা।

অনুকল্প রজঃ : খাতুকালে ধতু প্রকাশিত না হইয়া নাসিকা
হইতে রক্তপাত (ফস) : রক্ত নিষ্টিবন অথবা রক্ত কাস; টাইফয়েড
জরের ভোগ কালে শেষোক্ত প্রকার রক্ত প্রাব

ক্রোধ অথবা বিরক্তিজনিত অস্থ (কলো, ষ্টাফ) ; শীতানুভব ও
শীতলতা সহ পচওতা; ক্রোধের পর শীতানুভব কিন্তু মস্তকে উত্তপ্ততা
ও মুখমণ্ডলের আরক্ততা

শীতল সময়ের পর উষ্ণ সময়ের সমাগমে; গ্রীষ্মকালে শীতল পানীয় জ্বা
বা বরফ সেবনে; শর্দি লাগিয়া ও গ্রীষ্মকালে গরম হইয়া;
অতিরিক্ত উত্তপ্ততার সময় শীতল হওয়াতে; শীতল বাতাসের প্রবাহ লাগিয়া
(একন, হিপার) ; ধতু, শুন-দৃষ্ট, অথবা তরু উদ্ভেদের বিলোপ হইয়া যে
সকল রোগ অগো, তাহাতে তাইওনিয়া ফলপ্রদ।

কোন প্রকারে নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি, এবং শারীরিক বা
মানসিক সম্যক স্থিতিরতায় হ্রাস, তাইওনিয়ার একটা প্রধান
বিশেষ লক্ষণ

যে সকল বস্তু পাওয়া যায়না তাহা তৎক্ষণাৎ পাইতে ইচ্ছা অথবা উহা দিলে
না লওয়া।

শিশুরা কোলে চড়িয়া বেড়াইতে অথবা শয্যা হইতে উঠিতে ভালবাসে না
প্রলাপ; সর্বদা নিজের কার্যের কথা বলা; শয্যা হইতে উঠিয়া স্বগৃহে
বাইবার ইচ্ছা (এন্টি, হাইওস)

বামবাহু ও বাম জুড়বার অবিরত সঞ্চালন (এপোমা, হেলি)

বিবমিষা ও অবসন্নতা বশতঃ রোগীর উষ্ণ বসিতে অক্ষমতা

অনেকক্ষণ পরে পরে একবারে অধিক পরিমাণ জলপানের
অতিশয় পিপাসা।

শিরঃপীড়া।—মাথা নোয়াইলে মস্তিষ্ক যেন কপালের ভিতর দিয়া ফাটিয়া
বাহির হইবে একোকার অল্পভব; ইঙ্গি করা বশতঃ (গিপি) ; কাসিলে,
প্রাতে উথানান্তে, অথবা প্ৰথম চক্ষু মেলিবার সময় শিরঃপীড়া ; প্রাতে
উহার আরম্ভ, মধ্যাহ্নে ক্রমশঃ বৃদ্ধি ; কোষ্ঠ রোধ জনিত শিরোবেদনা
(এলো, কলিন, ওপি)

আমাশয়-গহবরে প্রস্তুত-জনিত চাপের স্থায় চাপ অল্পভব, উদগার উহার
উপশম (নক্স, পল))

কোষ্ঠ-রোধ —নিষ্ক্রিয়তা, মল-প্রবৃত্তি-শিশুতা ; বৃহৎ কঠিন,
মলিনবর্ণ, পরিপুষ্ট, দৃষ্টবৎ মল সমুদ্র-যাত্রায় কোষ্ঠ-রোধ (প্লাট)

অতিসার —গ্রীষ্মকালের আবেশ সময়ে উপস্থিত পৈত্তিক,
বিদাহী, মলবারের স্পর্শ-দেষ জনক ; মলিন জলবৎ, অজীর্ণ ভুক্তজব্য বিশিষ্ট ;
অতিরিক্ত উত্তপ্ত অবস্থায় শীতল পেষজব্য পান বশতঃ ও ফল আহার অল্প
অতিসার ; প্রাতে ও নড়িলে চড়িলে, এমন কি হাত-প নাড়িলেও উহার
বৃদ্ধি স্তনের গুরুত্ব, প্রস্তুতের স্থায় কঠিনতা ; পাণ্ডুরতা কিন্তু কাঠিল ;
উত্তপ্ততা ও ব্যাধিততা ; স্তনদ্বয় অবলম্বন দ্বারা তুলিয়া রাখিতে হয়
(ফাইটো)।

কাস —শুষ্ক, আক্ষেপিক, গল-রোধ ও বমন সংযুক্ত (কালী-কা) ;
বক্ষঃস্থলের পার্শ্বে স্থচী-বেধনবৎ যাতনাবিশিষ্ট ; যতক যেন থও থও হইয়া
উড়িয়া যাইবে এরূপ শিরঃপীড়াসহ ; আহারান্তে, পানান্তে, উষাগৃহে
প্রবেশে, ও গভীর নিশ্বাস গ্রহণে, বিবর্জিত ; কাস

উপচয়।—সঞ্চালনে, শারীরিক ক্রমে ও স্পর্শে বৃদ্ধি ; উষ্ণতা
বসিতে পারা যায়না, প্রান্তি বা বিবমিষা অথবা উভয়ই অগো উষ্ণতা, উষ্ণ
খাদ্য ও কোনও প্রকার স্রাবের বিলোপে ; উপচয়।

উপশম।—শয়নে, বিশেষতঃ ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে (টেলিয়া, পলস) ;
চাপ প্রদানে ; বিশ্রামে ; শীতলতায় ও শীতলজব্য আহারে ; উপশম

সম্বন্ধ ।—(১) এসুবিলা ও রসটকোর সহিত অল্পপূরক সম্বন্ধ । (২) ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কথা বলা ও অলপান করা লক্ষণে, বেলেডোনার সহিত সমগুণ সম্বন্ধ । (৩) বক্ষঃস্থলের আঘাতিক বা স্প্রিটিক বেদনার রাগনকিউলাসের সহিত এবং যকৃদ্দেশে বোনা ও গৌরব ; দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে ক্রাস ও বামপার্শ্বে শয়নে অতিশয় বৃদ্ধি ; বামদিকে ফিরিলে একপ্রকার ভারাকর্ষণ অনুভব, এই সকল লক্ষণে টিলিয়ার সহিত সমগুণ সম্বন্ধ । (৪) ব্রাইওনিয়ার পরে, এলম, কাণো-কা, নক্স, ফস, রসটক, সলফ, ডাল খাটে

ব্রোমিয়াম ।

(Bromium)

পাতলা-নীলবর্ণ চক্ষু, ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ চুল, পাতলা ত্ব, সুন্দর সুকুমার ত্বকবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে এবং সুন্দর আঁরক্ত-গুণ্ড, গুণ্ডমালাগ্রস্ত বালিকাদিগের পক্ষে ; এই ঔষধের অত্যাৎকষ্টে ক্রিয়া দর্শে । অজ্ঞাত প্রকার আকৃতির রোগীদিগের পক্ষেও ইহার ক্রিয়া যে না দর্শে এমন নহে

মুখমণ্ডলে লুতা-তন্ত (cobweb) প্রকার ছায় অনুভব (ব্যাংরা, বোরা, গ্রাফ) ।

নাঁসা-পক্ষের তাল-বৃন্তবৎ সঞ্চালন (এণ্ট-টা, লাই) ।

সমুদ্র-কূলে জাহাজের নাবিকদিগের শ্বাস-কাশ

গ্রন্থির, বিশেষতঃ নিম্ন-হস্ত ও গল-গ্রন্থির অর্থাৎ ফলক গ্রন্থি (thyroid), হস্ত নিম্ন গ্রন্থি (sub maxillary), কর্ণ-মূল (parotids) ও অণ্ডের (testes) গুণ্ডমালা বা গুটিকা-ধাতু-মোষ জনিত প্রস্রাবৎ দৃঢ় শ্ফীততা ।

ডিফথিরিয়া —ফ্যাব্রিস বা গল-কোষে কৃত্রিম বিজ্ঞার উৎপত্তি ; বায়ু-নলী, কর্ণ-নলী অথবা স্বরযন্ত্রে উহার আরম্ভ ও উপরের দিকে প্রসারণ ; বক্ষঃস্থলের বেদনার উর্দ্ধদিকে গতি ।

কৃত্রিম-ক্লান্তিবিশিষ্ট ও ডিফথিরিয়া জনিত কুপ । কাসিবান সময়
শ্লেষ্মার অতিশয় ঘড় ঘড় শব্দ, কিন্তু হিপারমলকারের লক্ষণের স্থায়
গল-রোধ নহে ; কাসের শব্দ তরল শুনায় বটে, কিন্তু নিষ্ঠীবন উঠে না।

ছপ-শব্দ কাসের সময় স্বরভঙ্গসহ কুপের লক্ষণ ; শ্বাস ত্যাগের অল্প
“এবি থাওয়া” (gasping for breath) ।

শ্বাস-কুচ্ছ, —গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারা যায়না ; যেন স্পঞ্জের
ভিতর দিয়া শ্বাস-ক্রিয়া চলিতেছে অথবা বায়ু-পথ যেন ধূমায় বা গন্ধকের
বাষ্পে পূর্ণ রহিয়াছে একপ্রকার অসুস্তব ; ঘড় ঘড় শব্দ, করাত-টানার স্থায়
শব্দ (স্বর শুনা যায়না) ; স্বর-যন্ত্রে শ্লেষ্মাবিস্তান বশতঃ শ্বাস-রোধের আশঙ্কা ;
(বায়ুনলী ভুঞ্জে শ্লেষ্মা অল্প, এন্ট-টাট)

ব্যায়াম ক্রীড়াবশতঃ বালকদিগের কুৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি । (অঙ্গচালনা বশতঃ
বালিকাদিগের কুৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি, কষ্ট)

অরায়ুর বাতায়ান ; অপত্য-পথ হইতে উঠেঃসরে বায়ু-নিঃসরণ (লাই) ;
ক্লান্তিবিশিষ্ট রক্তকুচ্ছ (ল্যাক-ক্যান) ।

নিশ্বাস গ্রহণে পরস্বল্পে শীতলতা অসুস্তব (রসটক, সলফ) ক্ষৌর ক্রিয়ার পর
উহার উপশম (ক্ষৌর-ক্রিয়ার পর বৃদ্ধি, কার্কো-এন) ।

সম্বন্ধ ।—(১) কুপ ও কুপজনিত রোগে, ক্রোর, হিপার, আইওড ও
স্পঞ্জিয়ার সহিত ব্রোমিয়মের তুলনা হয় । (২) আইওড বিফলাস্ত্রে এতদ্বারা
কঠিন গলগণ্ড আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে । (৩) কুপরোগে, আইওড, ফস,
হিপার, স্পঞ্জ বিফল হইবার পর ; বিশেষতঃ আইওডের পরে পুনরাক্রমণে, ব্রোম
দ্বারা আরোগ্য লাভ হইয়াছে । (৪) “ব্রোম ও আইওডে প্রধান প্রভেদ এই
যে ব্রোমে নীল-নয়ন এবং আইওডে কৃষ্ণ নয়নবিশিষ্ট রোগীদিগের আরোগ্য
হয় ।” হেরিং ।

ভিরেট্রুম এলবুম ।

(Veratrum Album)

বালাক-বালিকা ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে ; জীবনের অন্ত্যসীমায় ; যাহারা স্বভাবতঃ শীতল ও জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়ার অসম্ভাব বিশিষ্ট ; তাহাদের পক্ষে এবং স্নায়বীয় ও রক্ত-প্রধান ধাতুর যুবক-যুবতীদিগের পক্ষে ; এই ঔষধ সমধিক উপযোগী

জীবনী-শক্তির শীঘ্র শীঘ্র পতন ; সম্পূর্ণ অবসন্নতা ও হিমাক্ষ বিশিষ্ট রোগ ।

প্রায় সকল রোগের সহিতই কপালে শীতল ঘর্ম (মর্ক শরীরে শীতল ঘর্ম, ট্যাবে) ।

একাকী থাকিতে পারা যায় না ; অথচ কাহারও সহিত কথা বলিতে একেবারেই প্রবৃত্তি হয় না

রোগিনী অ'পন'কে গর্ভবতী অথবা অ'ঙ্গ প্রসব' মনে করে ।

প্রত্যেক বস্তু, বিশেষতঃ কাপড় কাটিবার ও ছিঁড়িবার ইচ্ছা সহকারে উন্মাদ (টারান) ; লাম্পাট্যুচক অগ্নীল কথা সহ প্রেমোন্মাদ অথবা ধর্মোন্মাদ (হাইয়স, ট্রায়)

অত্যন্ত মাত্র শ্রমে মুর্ছার আক্রমণ (কার্কো-ভে, সলফ) ; অত্যধিক দুর্বলতা ।

রক্তপ্রাব কালে নিমগ্নতা (sinking) অনুভব (মুর্ছা, ট্রিল) ।

শীতানুভব সহ মস্তকের মধ্যস্থলে একথাণ্ড বরফ স্থাপিতবৎ অনুভব (সিপি, ভেলে) ; করোটিতে যুগপৎ শীতোত্তাপ অনুভব ; মস্তক যেন ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে এরূপ অনুভব ।

মুখমণ্ডল । পাণ্ডুর নীলবর্ণ শীতল মুখমণ্ডল ; নিমগ্ন (hypocratic) মুখাকৃতি ; শয়িত অবস্থায় মুখমণ্ডলের আরক্ততা, উঠিলে পাণ্ডুরতা (একন)

পিপাসা -- অধিক পরিমাণে শীতল জল ও অল্প পানীয় দ্রব্য পান করিবার দারুণ ও দুর্নিবার পিপাসা ; সকল বস্তুই শীতল অবস্থায় থাইবার ইচ্ছা

অল্প দ্রব্য অথবা সরস স্নিগ্ধ দ্রব্য আহারের স্পৃহা (কস-এসি) ।

মুখমণ্ডল, নাসাও, পদ, শুণ্ণ, বাহু ও অন্যান্য অনেকগুলি শরীরাত্মক
বরফবৎ শীতলতা

উদরে গীতলতা অমুভব (কলচি, ট্যাব) ।

প্রভূত অতিসার সহকারে প্রবল বমন ।

বমন —বিবমিষ ও আত্মীয় অবসন্নতা সহ আত্মদিক বমন ; জলপানে উহার
বৃদ্ধি (আস') ; অত্যধিক মাত্র নাড়িলে চাড়িলে বৃদ্ধি (ট্যাবে) ; বমনান্তে
অতিশয় দুর্বলতা

উদরে ছুরিকা দ্বারা কর্তনের প্রায় যাতনা ।

ওলাউঠা । —বমন-বিরেচন, প্রভূত, জলবৎ বেগে বিনির্গত অবসন্নতাজনক
ভেদ বিশিষ্ট ওলাউঠা ; ভয় প্রাপ্তির পর ওলাউঠা (একন) ।

অতিসার —হারতের আভাবিশিষ্ট (gice ish), জলবৎ প্রবলবেগে-
বিনির্গত,বারবার নিঃসৃত ; ছিবড়ে ছিবড়ে পদার্থ বিমিশ্রিত অতিসার ; হাত পা
থল্লীর আরম্ভ হইয়া সর্বশরীরে উহার প্রসারণ সহকারে কর্তনবৎ উদর-বেদনা ;
ভয়প্রাপ্তির পর অবসন্নতাজনক অতিসার ; অত্যধিক মাত্র নাড়িলে চাড়িলে উহার
বৃদ্ধি ; বমনসহ অতিসার, ভেদ-কালে কপালে শীতল ঘর্ম ও তৎপরে অবসন্নতা
(আস', ট্যাবে)

কোষ্ঠবদ্ধতা —মল প্রবৃদ্ধি পরিশুদ্ধতা ; বৃহৎ, * ক্ষুদ্র মল (লাই, মলফ) ;
গোলাকার কালকাল গোলায় মত মল (চেলি, ওপি, মল) ; সরলান্তের নিজীয়তা
অনিত কোষ্ঠ-রোধ ; উদরোর্দ্ধে দেশে বার বার মল-প্রবৃদ্ধি অমুভব (ইমে,
সরলান্তে প্রবৃদ্ধি অমুভব, নকা) ; শিশু ও বালকদিগের মলকৃচ্ছ, লাই ও নকোর
পরে ।

রজকৃচ্ছ । —বমন ও বিরেচন, অথবা শীতল ঘর্ম সংযুক্ত অবসাদ-জনক
অতিসার (এম-কা, বোভ) সহকারে রজ-কৃচ্ছ, এত দুর্বলতা যে প্রতি ঋতু-কালে
দুই দিন পর্যন্ত প্রায় দাঁড়াইতে পারা যায় না (এলম, কার্কো-এন, কক) ।

অহিফেন-সেবন বা ত্যাকুট-চর্কণের মন্দ ফল

বর্ষাকালে অধ-প্রত্যয়ে বেদনা, শয্যায় উষাতায় উহার আতিশয়া, জমাগত
হাটিলে হাস ।

রক্তসঞ্চয় বিম্বিষ্ট বা দূষিত সবিরামজ্বর, শরীরের অতিশয় শীতলতা, পিপাসা, মুখমণ্ডলের শীতলতা ও পতনাবস্থা ; ত্বক্ শীতল ও আঠা আঠা, অতিশয় অবসন্নতা ; কপালে শীতল ঘর্ম ও মুখমণ্ডলের মৃত্যুৎপন্ন পাপুরতা ।

উপচয় ।- যৎসামান্য সঞ্চালনে , পানাস্তে ; ঋতুর পূর্বে ও ঋতুকালে , মল-ত্যাগকালে ; ঘর্ম নিঃসরণ সময়ে , ও ভয় প্রাপ্তির পর ; বৃদ্ধি

সম্বন্ধ ।—(১) আস, আর্গ, সিক, কুপ, ইপির পরে ; (২) ওলাউঠায় ক্যান্সরের পরে ; (৩) বমন ও বিরেচন সহবর্তী রক্তচক্ষু, এম-কা, কার্বো-ভোজ ও বোভের পরে , ভিরেট্রঃম ভাল খাটে (৪) অপরিমিত মদिरা-পান ও তাহ-কুট সেবনের মন্দফল অনেক সময় এই ঔষধে দূরীকৃত হয় ।

ভিরেট্রম ভিরিডি ।

(*Veratrum Viride*)

পূর্ণ-রক্ত, রক্তপ্রধান ব্যক্তিমিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী ।

রক্ত-সঞ্চয়, বিশেষতঃ মস্তকের ভূমিদেশে (base of brain), বক্ষঃস্থলে, পৃষ্ঠবংশে ও আমাশয়ে রক্ত-সঞ্চয় ।

প্রদাহ সংশ্লিষ্ট প্রবল বেদনা ।

তরুণ আমবাও, উগ্রজ্বর, পূর্ণ-দৃঢ়-জ্ঞাত নাড়ী, সন্ধিতে ও পেশীতে তীব্র বেদনা (ব্রাই, আলি-এসি) ; শ্বস ও লোহিত মূত্র

শিশুর কম্পন ও উৎক্ষেপণ, টঙ্কারের সম্ভাবনা ; অবিরত মস্তকের উৎক্ষেপণ বা সঞ্চালন স্মারবীয় বা সবমন শিরঃপীড়া ; ধতু-বিলুপ্তি বহুতঃ রক্ত-সঞ্চয় ; প্রবল বিবমিষা ও বমন সহকারে প্রায় সম্যাস সদৃশ দারুণ শিরঃপীড়া ।

রক্ত-সঞ্চয় জনিত সম্যাস, উত্তপ্ত মস্তক, রক্তবর্ণ চক্ষু, জ্বলবাক্য, ধীর, পূর্ণ, লোহার ন্যায় শক্ত নাড়ী ।

টঙ্কার ।—অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি ; মস্তকের ভূমিদেশের বিক্লীর প্রদাহ ; পশ্চাদিকে আকৃষ্ট মস্তক, শিশুর আক্ষেপের উপক্রম ।

আক্ষেপ, প্রসারিত কনৌনিকা, ধূমপেয়কারের আবেগ, পশ্চাদ্ টকায়, শীতল
আঁঠা আঁঠা ঘর্ষ্য মহাকাশে মস্তক-পৃষ্ঠ-বংশীর (occipito-scapular) রোগ
একটিঘাত (Sun stroke), মস্তকের পূর্ণত, ধমনী-বন্দন, মস্তক অতি-
রিক্ত অশুভ্রুতি ; যুগল বা আংশিক দৃষ্টি (জেল, মন)

১০ হ্র । মধ্যস্থলের নিম্নে লোহিত রেখাসহ শেত ব পাউর্ণ
জিহ্ব ; শুষ্ক, অজ, শেত বা দীপ্তবর্ণ জেপ, ধমনী উজ্জ্বল পাউর্ণি ০০ পাউর্ণ ;
জিহ্ব বালগিয়া যাওয়ার স্থায় অশুভ্রুত হয় (শাঙ্গ) ।

নাড়ী — সহসা বেগের বৃদ্ধি এবং ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক অপেক্ষা হ্রাস প্রাপ্ত
নাড়ী ; মন্দ, কোমল, দুর্বল ; অনিয়মিত সবিরাম (ডিজি) ; নাড়ী ।

কেবল নাড়ীর বেগের হ্রাস অথবা “হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার লাঘব” জ্ঞানাইবার
জন্ম ভিরেট্রিম ভিরিডি ব্যবস্থের নহে অত্যাধ ঔষধের স্থায় “লক্ষণ সমষ্টির”
সাদৃশ্য অনুসারেই এই ঔষধও ব্যবহৃত হওয়া বিধেয় ।

ভেরিওলাইনাম ।

(Variolinum)

বসন্তের পুণ্য হইতে এই ঔষধ প্রাপ্ত হইয়া ইহা আংশিক পরীক্ষিত
হইয়াছে

ডিপথিরিয়ার সহিত এটিটকিনেন্স যে সম্বন্ধ বসন্তের সহিত ভেরিওলাইন-
মেরও সেই সম্বন্ধ ।

সংশ্লিষ্ট, বিশ্লিষ্ট ও দূষিত বসন্ত, উপবসন্ত ও জল-বসন্ত সকল প্রকার বসন্তেই
এই ঔষধের আরোগ্যকারিণী শক্তি বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ কর্তৃক প্রতিপন্ন হইয়াছে ।

ষষ্ঠশততম ক্রম হইতে লক্ষ (c.m) ক্রম পর্যন্ত সকল ক্রমেই এই ঔষধে
উপকার দর্শে ।

বসন্তের প্রতিষেধক স্বরূপ ভেরিওলাইনাম ভ্যাক্সিনেশন অপেক্ষা অনেক
শ্রেষ্ঠ দূষিত বীজের দোষে টীকার পরে যে সকল উপসর্গ উপস্থিত হয় ইহাতে
সে সকল পরিণামফল উৎপন্ন হয় না । হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শক্তির কাব্যকা-

রিতা জড়বানী বুঝিতে নাহি যেন না, কিন্তু বসন্ত ঔষধে রোগের সংক্রামক প্রকৃতি বুঝিলে, শক্তিকৃত ঔষধের ক্রিয়া বুঝা কি উহা হইতে আরও কঠিন? যাহারা এই ঔষধ ব্যবহার করেন নাই তাঁহাদের কথা যাহারা হোমিওপ্যাথির “সম্মতের” সত্যতা পরীক্ষা না করিয়াছেন তাঁহাদের মতই অবিশ্বাস্য, ইচ্ছা হয় এই ঔষধের ফলাফল পরীক্ষা কর এবং অগত্যাগার সম্মুখে পার যদি ইহার বিফলতা ঘোষণা কর

ভেলেরিয়ানা ।

(Valeriana)

স্নায়বীয়, কোপন-স্বভাব, হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত (ইমে, গলস), বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধাত্য-বিশিষ্ট, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হিষ্টিরিয়াজনিত স্নায়ু-শূলসংযুক্ত ; এবং পরিবর্তনশীল প্রকৃতি সমন্বিত ব্যক্তিদ্বিগের ক্ষেত্রে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী ।

* রীরের লোহিতাংশের শুভ্রতা প্রাপ্তি (ফির) ।

বায়ুতে যেন ভাসিতেছে রোগীর একপ মন্থতা অনুভব (এসার, ল্যাক-ক্যান) ।—যেন জড়তা ভাসিতেছে, ষ্টিক) ।

সমুদয় ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত অনুভূতি (ক্যান, কফি, নক্স) ।

মস্তকে শীতলতা অনুভব (মূর্ছাদেশে, সিপি, ভিরে) ; গল-গহ্বরের নীচে যেন একগাছি স্নতা ঝুলিতেছে একপ অনুভব (জিহ্বায়, গাট, সিলি) ।

শিশুর বড় বড় খণ্ড খণ্ড সংযত দুগ্ধ বমন ; মলও সেইরূপ সংযত দুগ্ধ (ইথু), মাতার ক্রোধান্বিতের পর স্তন পান করিবামাত্র তখনই বমন ।

সায়েটিকাঃ—দাঁড়াইলে ; ঘরের মেজের উপর পা স্থির রাখিলে (বেল) ; অঙ্গ-প্রসারণ করিলে ও পূর্ববর্তী পরিশ্রম হইতে বিশ্রাম করিলে, বেদনার বৃদ্ধি, হাঁটিলে হাস ।

সম্বন্ধ ।—(১) এসাফ, এসার, ক্রোক, ইমে, ল্যাক-ক্যান, স্পিজি, সলফের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ । (২) পাদ-মূলের বেদনায় এগার, কষ্ট, সাইক্রে, লিড, ম্যাঙ্গ ও ফাইটোর সহিত এই ঔষধের তুলনা হয় ।

মারকিউরিয়াম ।

(Mercurius),

পাতলা চুল বিমিষ্ট এবং শিথিলপেশী ও চর্মবিমিষ্ট ব্যক্তিদেগের ৭ নং সর্গাপেক্ষা অধিক কার্যকারিতা ।

রাত্রিতে ও শয্যার উত্তাপে রোগের বৃদ্ধি মারকিউরিয়ামের প্রদান প্রয়োজনজনক ।

অস্থি রোগ, রাত্রিতে বেদনার আতিশয্য ; পুণ সংযুক্ত বা পুনঃপরিশুভ, বিশেষতঃ পুষের আতপ্রাচুর্য্য বিশিষ্ট (হিপ, মিল) গ্রন্থির ক্ষতি ।

শীতল ক্ষতি ; ব্রণে ধীরে ধীরে পুষোৎপত্তি

প্রায় সকল রোগের সহিতই প্রভূত ঘর্মের বিচ্যুতমানতা, কিন্তু ঘর্মপ্রাপ্তি উপশম জন্মে না, এমন কি যাতনার বৃদ্ধিও হইতে পারে (অধিকঘর্ম উপশম প্রাপ্তি, ছাট, সোরি, ভিরে)

সামান্য পরিপ্রমেই অত্যন্ত দুর্বলতা ও কম্পন

খাস ও শরীরের দুর্গন্ধ (সোরি) ।

ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে শীঘ্র শীঘ্র কথা বলা (হিপ)

অত্যন্ত হাঁচি ও প্রভূত বিদাহী জ্বাব সহকারে নাগারক্ষে, অবদরন ও দন্ত ; শীতাত হরিৎ বর্ণের দুর্গন্ধ পুষের মত জ্বাব ; নাগার্ষির ক্ষতি ; আর্জধাতু ও রাত্রিকালে বৃদ্ধি ; সহকারে নাগার্ষির প্রতিশ্রাব

দপদপকর, ছেদনকর, বিদীর্ণকর, মুখমণ্ডল ও কর্ণে সম্ভ্রামারিত তীব্র বেদনা ; আর্জধাতু অথবা সাম্য বায়ুতে, শয্যার উত্তাপে, শীতল উষ্ণ জ্বাবো বিবর্তিত ; গণ্ডঘর্ম উপশমিত দস্ত-বেদনা ।

দস্তের শিথরের ক্ষয়প্রাপ্তি, কিন্তু দস্ত-মূলের বর্তমানতা, দস্ত-মূলের ক্ষয়প্রাপ্তি, শিথরের বিচ্যুতমানতা, মেজ

রক্তমাশয় — শেওলা শেওলা রক্তাক্ত মল, তৎসহ উদর-বেদনা ও মুচ্ছা, মলত্যাগ কালে ও মলত্যাগের পরে, অতিশয় কুন্দন, তৎপরে শীত, এবং “মলত্যাগ-ক্রিয়া শেষ হইল না” এই প্রকার অনুভব ; যতই অধিক রক্ত ও অধিক বেদনা থাকে ততই এই ঔষধ ভাল খাটে ।

লালাস্রাব প্রভূত, হ্রগ্ধ তাঁবাটে ধাতব আশ্রাদ লাল, মাঝান সদৃশ, ও
রক্তজ্বল লাল।

বৃহৎ লোলিত, দন্তীক্ষ সম্মিলিত (চেলি, পড, হ্রঃস) ; ক্ষতসংযুক্ত ;
ব্যথিত ; লোহিত বা শুভ্র জিহ্বা।

ন রূপ পিপাসা, কিন্তু জিহ্বা আর্দ্র দৃষ্ট হয় ও প্রভূত লালস্রাব হয় (মুখ-শোথ
কিন্তু পিপাসা পরিশূন্যতা, পল)।

প্রভূত হ্রগ্ধ লাল সহকারে ওন্দাবিবি (mumps) ; ঝিল্লিক প্রদাহ (di sh-
theria), ও তালুমূল প্রদাহ (tonsillitis) ; বৃহৎ, লোলিত দন্তীক্ষ সম্মিলিত
জিহ্বা ; গানচিক্রের ত্রায় অক্ষিত জিহ্বা (লাক, ছাট, টারাবা)

ডিফথিরিয়া।—প্রদাহিত তালুমূল, বিবর্জিত ও ক্ষীত উপজিহ্বা, অবিরত
গলাধঃকরণের প্রবৃত্তি ; স্বল, ধূসরবর্ণের দড়ির মত সংলগ্ন ব বিযুক্ত প্রান্ত্রবিশিষ্ট
কৃত্রিম ঝিল্লী, সহকারে ডিফথিরিয়া

যে পরিমাণ জলপান করা যায় তদপেক্ষা অধিক মূত্রস্রাব ; বাগবার মূত্র-
প্রবৃত্তি।

স্বপ্নে রক্তাক্তিত শুক্রস্রাব (লেড ; সাসা)।

শ্বেতপ্রদর।—বিদাহী, জালাকর, কণ্ডুয়ন ও অবদরনবিশিষ্ট প্রদর ;
সর্বদা রাত্রিতে উহার আধিক্য ; ভগ-কণ্ডুয়ন, মূত্র সংস্পর্শে উহার বৃদ্ধি,
ধুইয়া ফেলার আবশ্যকতা (সল)।

গর্ভাবস্থায় প্রাতঃকালীন বিবগিধা (মর্পিংসিকনেস), নিদ্রাকালে অতিশয়
লালাস্রাব হইয়া বাগিশা ভিজিয়া যায় (ল্যাক্ট-এসি)।

প্রতি ঋতু-কালে শুনে বেদনা, বোধ হয় যেম উহাতে ক্ষত হইবে
(কোনা, ল্যাক-ক্যান), রক্তের পরিবর্তে শুনে ছক্কোৎপত্তি।

কাস।—শুক, শান্তিকর, যন্ত্রণাক্ষনক ; হই আবেশে উপস্থিত ; রাত্রিতে
ও শয্যার উত্তাপে বিবর্জিত, দক্ষিণপার্শ্বে শয়নে সম্পূর্ণ অসমর্থতা বিশিষ্ট কাস

দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্নখণ্ডের আক্রান্ততা ; পৃষ্ঠের অভ্যন্তর দিয়া হৃদীবন্ধবৎ
যাতনা (চেলি, কালী-কা)।

ফুসফুস-প্রদাহের রক্তস্রাবের পর ফুসফুসে পুয়োৎপত্তি (কালী-কা)।

“নাড়ীতে, জিহ্বায়, গল র মধ্যে, গালের অভ্যন্তর ভাগে, লালস্রাব সহকারে

স্বভাব প্রকাশ . দ্রুতগতির অসম আকৃতি ; অনির্দিষ্ট প্রান্ত ; মণিন, অস্বস্থ দৃশ্য ; মণিনবর্ণ মণ্ডল-পরিবেষ্টিত, শূকরের বগামদূশ ভূ মেদেশ , দ্রুতগতির একত্র মিলিত হইবার ত্রিমুখতা, উপদংশের দ্রুত গোলাকার হয়, যুগ্মমধ্য ও গল-মধ্যের পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করে ; উহার নির্জারিত প্রান্ত থাকে ; চারিদিক তালবর্ণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়, এবং আদি স্থান হইতে প্রসারিত হয় না” - জনহাম ।

শরীর-সাধার বিষয়তঃ হস্তদ্বয়ের কম্পন ; বেপথু (প্যারাগলিসিস-এক্টিভাস)

উপচয় ।- রাত্রিতে ; ভিজা মৌসুমে, শীতল বায়ুতে, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে ; * রৎস্কাহে, উষ্ণ দিন ও শীতল মৌসুমে রাত্রিতে অনাবৃত হইলে, থোলা গায় শীত* বায়ু লাগিলে (ব্যাঙ্গ, হিপ) , দক্ষিণপার্শ্বে শয়নে ; ঘর্ম্ম-নিঃসরণে ; ও শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি

উপশম ।- অনাবৃত বায়ুতে ; কার্যের সময় সবল সঞ্চালনে ; শয্যার বিশ্রামে ; উপশম

আসেনিক ও মার্কিউরির উভয় ঔষধেই * শ্যায় * শয়ন-কালে উপচয় ও উপশম জন্মে । শয্যার উত্তাপে মার্কিউরির লক্ষণ বিবর্ধিত কিন্তু শ্যায় বিশ্রামে উহা উপশমিত হয় । আসেনিকের লক্ষণ * শ্যায় বিশ্রামে বিবর্ধিত কিন্তু শয্যার উত্তাপে উপশমিত হয় ।

সম্বন্ধ ।- (১) বেল, হিপ, ল্যাক ও সলফের পরে মার্ক ভাল খাটে, কিন্তু গিলিসিয়ার পূর্বে বা পরে এই ঔষধ ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে । (২) নিম্নক্রমে মার্ক ব্যবস্থা করিলে প্ৰয়োজনীয় নিবারণিত না হইয়া সত্তর উৎপন্ন হয় । (৩) মার্কের সমান ফল অব্, হিপ, ল্যাক, নাই-এসি, সলফ এবং লক্ষণের সহিত সোসাদৃশ্য থাকিলে উচ্চ শক্তির মার্ক ব্যবহারে বিদূরিত হয় । (৪) মেজেরিয়ম মার্কের উদ্ভিজ্জ সমতুল্য ; অধিক মাত্রায় ও অতিরিক্ত পুনঃ পুনঃ মার্ক সেবনের মন্দফলে ইহার ব্যবহার হইতে পারে । (৫) চিনি ভক্ষণ, কীটাদির হরণবেধ, আসেনিক বা তাত্ত্বের দুগ্ধগ্রহণের মন্দফলে যে সকল রোগ এবং শীতকালের রোগে মার্ক উপযোগী ।

মারকিউরিয়ঃস করোসাইভঃস ।

(Mercurius Corrosivus)

পুরুষের উপদংশঃ রোগ ; থাইরা যার একপ বিদাহী পুয়-বিশিষ্ট ক্ষত ;
বাইটস ডিস্কিড ।

অল্প-প্রাণীকৃত রক্তাতিসার ও ঔষুকালীয় অতিসার, যে হইতে নবোদয় মাস
পর্যন্ত উহার উপস্থিতি ।

কুহন ।—সরলাঙ্গের কুহন, মল-ত্যাগে উহার অনিবৃত্তি (মলত্যাগে
নিবৃত্তি, নক্স), অবিরত ও ক্রমাগত কুহন, স্বপ্ন, রক্তাক্ত, শেওলা
শেওলা, দুর্গন্ধ, তপ্ত মল ; শৈথিল্যক বিলম্বিত খণ্ডপাত এবং ভয়ঙ্কর কর্তনবৎ
উদর-বেদন ।

মুত্রাশয়ের কুহন, তৎসহ মুত্রমার্গে তীব্র জ্বালা ; তপ্ত, জ্বালাকর স্বপ্ন বা
বিলুপ্ত মুত্র ; অতিশয় যাতনা সহকারে বিম্বু বিম্বু মুত্র-পাত ; রক্তাক্ত কপিশ,
ইষ্টক চূর্ণের দ্বায় অধঃপতিত পদার্থ ; মাণ্ডলাল মুত্র

প্রমেহ, দ্বিতীয় অবস্থা, ঈষৎ হরিদ্বর্ণ (greenish) স্রাব, রাত্রিতে বৃদ্ধি,
অতিশয় জ্বালা ও কুহন

মারকিউরিয়ঃস ডলসিস ।

(Mercurius Dulois)

শৈথিল্যক বিলম্বিত বিশেষতঃ চক্ষু ও কর্ণের শৈথিল্যক বিলম্বিত প্রতিষ্ঠায় জনিত
পীড়া

মধ্য-কর্ণের প্রতিষ্ঠায় জনিত প্রদাহ (ক্যালী-মিউ) ।

ইউফেকিয়ান টিউবের অবরুদ্ধতা ; সোরাধোমগন্ত বালক-
বালিকাদিগের প্রতিষ্ঠায় জনিত বধিরতা ও কর্ণস্রাব (ক্যালী-মিউ) ।

কুচিকিৎসিত ক্লীকচারের পর এন্টো-গ্রাফির তরুণ পীড়া ।

নাঙ্গা-রক্ত, গল-মধ্য ও গলকোষের পারদ মিশ্রিত ধাতব পদার্থ জনিত
প্রতিষ্ঠায়িক পীড়া ও বধিরতা

বালক-বালিকাদিগের অতিসার ; ঘাসের দ্বায় সবুজবর্ণ ও খণ্ডিত অণ্ডের
দ্বায় মল ; প্রভূত মল ; মল লাগিয়া মল-দ্বারে দ্বারের উৎপত্তি

মারকিউরিয়ঃ প্রটো-আইওডাইড ।

(Mercurius Proto-Iodide)

ডিপথিরিয়া অনিত রোগে এবং গল-রোগে গ্রীবা-গ্রন্থি ও কর্ণমূল-গ্রন্থির অত্যন্ত ক্ষীণতা ; দক্ষিণ পার্শ্বে কৃত্রিম ঝিল্লীর আরম্ভ বা অতিশয় ; উষ্ণ পানীয় জ্বা পানে ও পানি ঢোক গিলিলে বৃদ্ধি (ল্যাক) ।

বিদ্য ।—জিহ্বার ভূমিদেগে গাঢ় পীতবর্ণ লেপ (কাণী-বাই — স্বর্ণের স্থায় পীতবর্ণ লেপ, ছোট ফস ; মলিন বর্ণ অথবা হরিতাভ ধূসরবর্ণ লেপ, ছোট-মল) ; অগ্রভাগ ও প্রান্তভাগের আরক্ততা ; গলার ও ঘাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বের অধিকতম আক্রান্ততা ।

কঠিন উপদংশে (হার্টেরিয়ান স্ফাকার), উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার করিলে গৌল লক্ষণ কদাচিৎ প্রকাশ পায় ; বক্ষ-গ্রন্থির (বাঘী) অতিশয় ক্ষীণতা, পুষোৎপত্তি হইবার অপ্রবণতা ।

মারকিউরিয়ঃ বিন আইওডাইড ।

(Mercurius Bin Iodide)

বাম পার্শ্বের ডিপথিরিয়া অনিত ও গ্রন্থির পীড়া ; গল-গহ্বরের মলিন আরক্ততা ; অন্তরল বা তরল পদার্থ গিলিতে যাতন ; যৎসামান্য কৃত্রিম ঝিল্লী, উহা সহজে বিচ্ছিন্ন হয় ; বহুব্যাধক আরক্ত জ্বরের (epidemic scarlet fever) আনুষঙ্গিক রোগ, গলগহ্বরে বা তালু-মূলে ক্ষত ; গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, গল-কোষ (pharynx) অথবা নাসিকার পশ্চাৎ বন্ধ হইতে ঈষৎ হরিদবর্ণ দ্রুত ঋণ নিঃসরণ ।

টিউবারকিউলার ফেরিগাইটিস অর্থাৎ ওটিকা অনিত গলকোষ-প্রদাহ ।

মারকিউরিয়ঃ সলফিউরিকঃ ।

(Mercurius Sulphureus)

স্রোত অথবা বহুস্রোত হইতে উৎপন্ন বক্ষস্থলের শোথ ; শ্বাস-কষ্ট, উঠিয়া বসিয়া থাকিতে হয়, শয়ন করিতে পারা যায় না । হাত-পায়ের ক্ষীণতা

অজবৎ তরল মল, উহাতে জীর আচা ও স্পর্শদেয়ের উৎপত্তি ; বক্ষঃস্থলে জ্বালা ।

ডাঃ লিপি বলেন এই ঔষধের উত্তম ক্রিয়া দর্শিলে এতদ্বারা প্রাপ্ত অজবৎ অতিগারের উৎপত্তি হইয়া রোগীর আত্মায় শান্তি জন্মে ; বক্ষঃস্থলের শোথে ইহা আর্সেনিকের স্থায় উপযোগী ।

সম্বন্ধ --আগ, সিনাব, ভিজ ও সলফের সহিত এই ঔষধের তুলনা হয়

মারকিউরিয়ঃস সলিউবিলিস ।

(Mercurius Solubilis)

জীব বিলুপ্তির পর, বিশেষতঃ সোরা-দোষ-গ্রস্ত রোগীদিগের নামবীয় রোগ (এসাক্)

বালক-বালিকাদিগের গ্রন্থিসংক্রান্ত এবং গণ্ডমালা জনিত রোগ

কর্ণজ্বাব (কান-পাকা) ।—রক্তাক্ত, দুর্গন্ধজ্বাব তৎসহ খোঁচা মারিয়া সেলাই করার মত বেদনা ; দক্ষিণ পার্শ্বে, রাত্রিতে এবং আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে বুদ্ধি ।

বাহ্যকর্ণ-দ্বারে ফোঁটক (পিক-এসি)

বাহ্যকর্ণ-দ্বারে বহুপাদ (polypus) এবং ছত্রকাঁকার উপমাংস (মেরম, পুঙ্গা) ।

বিদাহী নাসা-জ্বাব, উহার পুরাতন পনিরের স্থায় গণ্ড ; নাসারন্ধ্রের আরক্ততা, অবদারণ ও ক্ষত ।

নাসিকা হইতে রক্তজ্বাব —কাসিবার সময় ; রাত্রিতে নিদ্রাকালে ; নাসিকা হইতে লঘমান বরফবিন্দুর স্থায় মণিন সংযত-রক্ত-রঞ্জু ঝুলিয়া থাকে ।

গ্রমেহ (gonorrhoea) ।—মূদা (phymosis) বা চীমৎ উপদংশ (chancroid), সবুজবর্ণ জ্বাব,রাত্রিতে উহার বুদ্ধি ; মূত্র-বেগ, মেঘ কয়েক বিন্দু মূত্রের পতন-কালে মূত্র-মার্গের সমুখভাগে অসহ্য জ্বালা, লিঙ্গ-মূত্রের আচ্ছাদন-ত্বকের উত্তপ্ততা, কীততা এবং স্পর্শ-দেয়, নিস্তেজ প্রকৃতির রোগ, বাঘীর সম্ভাবনা অথবা পাকা বাঘী

উপদংশ -মুখ্য (primary) উপদংশ ; নি মিত কঠিন (হর্নেটরিয়ান), শূকরের বসার ছায় নিম্ন ভাগবিশিষ্ট, ৭ গির মদুশ ভল এবং বিপর্যস্ত আরক্ত প্রান্ত; ও মুদা বা উটামুদা (paraphymosis) সংযুক্ত উপদংশ, গভীর গোলাকার ক্ষত, লিঙ্গ-মুণ্ডের বল্গা (liacum) ও আচ্ছাদন-ত্বক (prepuce) ধাইয়া যাইয়া ক্ষত অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় ; উহা হইতে যাতনা সহকারে রক্ত ও ঐষৎ পীতবর্ণ দুর্গন্ধ প্রাব নিঃসৃত হয় ।

উপদংশ এবং জনন ও যুতপথের রোগে মারকিউরিয়াম সলিউবিগিস হানি-মানের ঔষধ ছিল শুধু থাকিবে কদাচিৎ ইহার প্রয়োগ হয় ।

চর্মের রোগ ; শরীরে কাট-দংশনের ছায় অগ্ৰ দংশন ও কণ্ডুয়ন ; স্ফাটিকা-কালে ও শয্যার উত্তাপে উহার বৃদ্ধি ; চুলকাইলে ভাল লাগে
অঙ্গের দুর্বলতা ও প্রাণ্ডি ; স্পর্শ-বেদ ও ঘৃষ্টবৎ অনুভব ।

মারকিউরিয়াম সাইনাইড ।

(Mercurius Cyanide)

গল-গহবরের তীব্র আরক্ততা ও গলাধঃকরণে অতিশয় আশ্রাস-সহকারে দু্যিত ডিফথিরিয়া ; সমগ্র গল-গহবরের উপর এবং গলমধ্যের নিম্ন পর্য্যন্ত ক্রিমিবিহীন প্রসারণ ; পচা, গ্যাংগ্রীণ বিশিষ্ট ডিফথিরিয়া, তৎসহ বিগলিত ক্ষত ; ক্রিমি বিহীণবিশিষ্ট জুগ ।

অতিশয় দুর্বলতা ; যৎপরোনাস্তি অবসন্নতা ; দুর্বলতা-বশতঃ দাঁড়াইতে পারা যায় না ।

যখন এই ঔষধ ব্যাপক আকারে প্রকাশিত ডিফথিরিয়ার লক্ষণের সাদৃশ্যে অমোঘ ঔষধস্বরূপ স্থিতিকৃত হয় তখন অত্যান্ত অমোঘ ঔষধের ছায় প্রতियেধক স্বরূপও ইহা ফলপ্রসূ হইয়া থাকে ।

মিউরিএটিক এসিড ।

(Muriatic Acid)

কৃষ্ণকেশ, কৃষ্ণচক্ষু, মলিনবর্ণ মুখাকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে মিউর-এসি
বিশেষ উপযোগী

কোপনতা, ক্ষণরাগিতা, ক্রোধ ও বিরক্তির প্রবণতা (নর) ; অস্থিরতা ও
নিরোধূর্ণন ।

দৌর্বল্যকর প্রকৃতির রোগ, তৎসহ কৌকৌ করা ; সংজ্ঞাশূন্যতা, ও
বিরক্তচিত্ততা

ছত্রকের স্থায় (fungus-like) উপমাংস ও কৃত্রিম ঝিল্লীসংযুক্ত অঙ্গ-
প্রণালীর (intestinal tract) ক্ষত ।

অতিশয় দুর্বলতা । বসিবামাত্র চক্ষু মুদিত হইয়া আইসে ; নিম্ন
হনু ঝুলিয়া পড়ে ; রোগী শয্যার নিম্নভাগে সরিয়া
পড়ে ।

মুখ-বিবর ও মল-দ্বার প্রধানতঃ আক্রান্ত হয় ; জিহ্বা ও মলদ্বারের আবরণ-
পেশীর পক্ষাঘাত জন্মে

মুখ-বিবরের উৎকট রোগ ; গভীর ও রক্তাক্ত ক্ষতগুহা ক্ষত, উহার কাণ
অথবা মলিন ভূমি ; হৃগন্ধ শ্বাস ; দারুণ অবসন্নতা ; ডিম্বাণুরিয়া, ফাণে টিনা,
ক্যান্সার ।

মাংসের চিন্তা বা দৃশ্য সহ্য করিতে পারা যায় না (নাই-এসি) ।

অর্শসম্বলিত বা অর্শ-বিবর্জিত মলদ্বারের অতিশয় অনুভূতি ; ঋতু-কালে
মলদ্বারের স্পর্শ-বোধ

অর্শ ।—স্ফীত নীলবর্ণ বলি, স্পর্শে উহাতে অনুভূতি ও
বেদনা ; সহসা বালকদিগের অর্শোৎপত্তি ; উহাতে অত্যন্তমাত্র
স্পর্শও সহ্য হয় না, শয্যার চাদর লাগিলেও অস্বচ্ছন্দতা জন্মে । মুত্রোত্যাগ-
কালে হাড়িশ বাহির হয় (ব্যারা-কা) ।

অতিশয় ।—মূত্র-কালে ; ও অপান নিঃসারণ-কালে (এলো) অনিচ্ছায় মল নিঃসরণ মূত্রকালে যুগপৎ মলের নিঃসরণ না হইয়া মূত্রত্যাগ করিতে পারা যায় না ।

ধীরে ধীরে মূত্রনিঃসরণ হয় ; মূত্রাশয়ের দুর্বলতা, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় , এত বেগ দিতে হয় যে মল-দ্বার বাহির হইয়া পড়ে

জননাঙ্গে অত্যন্ত মাত্র স্পর্শ, এমন কি বিছানার চাদরের স্পর্শ পর্যন্ত সহ্য হয়না (মিউর)

দুঃপিণ্ডের স্পন্দন মুখমণ্ডলে অস্বভূত হয় ।

মাস্তিষা , একজিম সোলারিস

টাইফয়েড ও টাইফস অর ।—মোহবৎ গভীর নিদ্রা ; আগ্রদবস্থায় জ্ঞান-শূন্যতা , উচ্চ কৈ কৈ শব্দ বা মৃদুপ্রলাপ (বিড়বিড় করিয়া বলা) ; প্রান্তভাগে লেপাচ্ছন্ন, কুঞ্চিত, শুষ্ক, চর্শ্মবৎ, পক্ষাঘাতিত জিহ্বা ; মূত্রত্যাগকালে অনিচ্ছায় দুর্গন্ধ মল নিঃসরণ ; শয্যার নিম্নভাগে সরিয় পড়ন ; নড়ীর তৃতীয় স্পন্দনের বিরাম ; মলিনবর্ণ তরল রক্তস্রাব ; দীর্ঘ নীলবর্ণ ক্ষতে মুখ-বিবরের পূর্ণতা ; অতিশয় অবসাদ

সম্বন্ধ ।—(১) ব্রাই, মার্ক, ফ্রাসের পরে ভাল থাকে । (২) অতিরিক্ত আফিম ও তামাক সেবন জনিত পেশীর দুর্বলত এই ঔষধে আরোগ্য প্রাপ্ত হয় ।

মিউরেক্স পার্পিউরিয়া ।

(*Murex Purpurea*)

বিমর্ষ প্রকৃতির লোকদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী

নিবৃত্ত-রক্তদ্বিগের অস্থখে ইহা ব্যবহার্য (ল্যাক, সিপি, মলফ) -চিত্তের অতিশয় অবসাদ আমাশয়ে যেন কিছু নাই এপ্রকার শূন্যতা অস্বভব (সিপি) ।

জননাঙ্গের অত্যন্ত সংস্পর্শে, এবল কামোদ্দীপনার উৎকৃতি (জননাঙ্গের অতিশয় উপদ্রাব বশতঃ ক্রটিম মৈথুনে প্রবৃত্তি, অরিগেন, জিক) ।

জননেত্রিয়ার এবল উত্তেজনা, এবং স্রবণ-ক্রিয়ায় অত্যন্ত ইচ্ছা (সিপিয়ার বিপরীত) ।

জরায়ুতে ক্ষতবৎ বেদনা ; জরায়ুর বিজ্ঞানতঃ স্পষ্ট অনুভূতি (হেলোন, লাইগ) আন্তর্গতীয় যজ্ঞার্থে যেন বহু পুষ্কর বাহির হইয়া আসিবে একাগ্র আবেগ অনুভব তজ্জন উৎসর্গ উপর উৎসর্গ গাঢ়তা বসিয়া থাকিতে হয় ও চাপ দিলে উপশম পড়ে (কিন্তু সন্ধ্যা-প্রবৃত্তি পরিশুদ্ধতা, মিলি)

ধতু — অনিয়মিত, নির্ধারিত সময় অপেক্ষা মজার প্রকাশিত, প্রভূত, অধিক-দিন স্থায়ী, বড়বড় রক্ত ঋণ বিশিষ্ট, ধতু

ওদর — মানসিক অসমাদ, স্রাবের আতিশয্যে প্রফুল্লতা ।

সম্বন্ধ ।— (১) কামোত্তাপে জিহ্বা ও ঘ্রাণের সহিত ; এবং কাম-প্রবৃত্তি পরিশুদ্ধ “আবেগ” অনুভবে মিলিয়ার সহিত মিউরেয়ের তুলনা হয়

মিলিফোলিয়াম ।

(*Millefolium*)

অতিবিকৃত মাত্রারিক চেষ্টা অথবা পতনজনিত রোগ ।

প্রবল ব্যায়াম-কালে নহে, কিন্তু ধীরে ধীরে সঞ্চালন-সময়ে শিরোঘূর্ণন

রক্ত-স্রাব — জর বর্ত্ত ও বেদনা বিবর্জিত ; উজ্জল লোহিত, তরল রক্তপাত (একন, ইপি, স্ত্রাবি) ; ফুসফুস, বায়ু-নলী-ভ্রম, শরীর, মুখ-বিসরণ, নাসিকা, আমাশয়, মূত্রাশয়, মরলাজ ও জরায়ু হইতে রক্তপাত ; আধিভৌতিক (mechanical) রক্ত-স্রাব, স্তম্ভগণের (wound) রক্তস্রাব (হেম)

প্রভূত রক্তস্রাব স্তম্ভগণ, বিশেষতঃ পতনের পর (আর্গ, হেম) ।

ফুসফুস হইতে রক্তপাত — উপঘাতের পর • প্রচুর যক্ষা রোগে ; অর্শওস্ত রোগীর ও রক্তবহানাড়া বিদৌর্গ হইয়া ; ফুসফুস হইতে রক্তপাত ।

নাসিকা, ফুসফুস ও জরায়ু হইতে ; প্রসব বা গর্ভপাতাঙ্গে ; অতি পরিশ্রম বসন্তঃ ও গর্ভ-স্রাবের পর ; ক্রমে ক্রমে বেদনাশূন্য রক্তস্রাব । এই ঔষধ প্রসবাস্তিক রক্তস্রাবের প্রতিষেধক ।

ধতু — নির্ধারিত সময়ের পূর্বে প্রকাশিত, প্রভূত ও দীর্ঘকালস্থায়ী ধতু ; উদরে বেদনা সংযুক্ত বিলুপ্ত ধতু

পেশীর দৌর্বল্য বশতঃ বাতি কাদিগের শ্বেতপ্রদর (কাদ)

কাম। উজ্জল রক্তের উত্তীর্ণ বিশিষ্ট ; ঋতু বা অশ্রুতাব বিলোপপ্রকৃতি ; বক্ষঃস্থলে শুষ্ক ও ক্ষুৎক্ষণ সম্বলিত ; উচ্চস্থান হইতে পতন বশতঃ (আর্শ) ; প্রবল পরিশ্রমের পর ; প্রতিদিন অপরাহ্ন ৪টার সময় (লাইকো) রক্ত সংযুক্ত কাম

সম্বন্ধ।—(১) নাসিকা ও ফুসফুস হইতে উজ্জল লোহিত রক্ত-পাতে ইরেটোর সহিত মিলিফোলিয়ামের তুলনা হয় (২) রক্ত-স্রাবে একন ও আর্শ-কার পরে মিলিফোলিয়াম ভাল খাটে

মেজেরিয়াম ।

(Mezerium)

পাতলা চুল, শ্বেতা-প্রধান ধাতুবিশিষ্ট অস্থিরপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে মেজেরিয়াম বিশেষ উপযোগী

অবসাদবায়ুপ্রকৃতি ও নিরাশ চিত্ত ; প্রত্যেক বিষয় ও ব্যক্তির প্রতি উদাসীন ; সামান্য ও সম্পূর্ণ নির্দোষ বিষয়ে রাগাঘাত ও তৎপরে শীঘ্র তন্নিমিত্ত অল্পতপ্ত রোগী ।

পর্মা (eczema), অসহ্য কণ্ডুয়ন, শয্যায় থাকাকালে ও স্পর্শে উহার বৃদ্ধি ; রক্তাধুবৎ প্রচুর স্রাব স্রবণ ; গে বীজে ঢাকা দেওয়ার পর কণ্ডুয়নজনক উদ্ভেদ ।

শিশু সত্তত বদন কণ্ডুয়ন করে, উহাতে মুণমণ্ডল রক্তাবৃত হইয়া পড়ে ; আর্শ উদ্ভেদ ; রক্তিতে কণ্ডুয়নেব বৃদ্ধি ; মুণমণ্ডলের প্রাদাহিক আক্রমণ ।

অতি অল্পমাত্র বিরক্তির পরে প্রবল শিরঃপীড়া ; যৎসামান্য স্পর্শে উহাতে যাতনা ; সাধারণতঃ মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা

মস্তকে একপ্রকার পুরু, চর্ম্মবৎ চিপটিকা (crusts), উহার নীচে স্থানে স্থানে গাঢ় ও শাদা পু্য সঞ্চয়, কেশের সংযোজনা, কিছুকাল পরে পু্যের রসানিবৎ দূষিততা প্রাপ্তি, এবং উহাতে দুর্গন্ধ ও পোকাকার উৎপত্তি

ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে দন্ত-শূল (ক্রিমোজ) ; দন্ত দীর্ঘাভূত বোধ হয়, দাঁতে কামড় বা জিহ্বা লাগাইলে মৃদু বেদনা, রাত্রিতে বেদনার বৃদ্ধি ; মুখ খুলিয়া বায়ু আকর্ষণে উপশম দন্ত মূলের ক্ষয়প্রাপ্তি (মার্কের বিপরীত) ।

শূল, যেভাবে পীতবর্ণ চিপটিকাযুক্ত ক্ষত, উহার তলে গাঢ়, পীতবর্ণ পুষ মধ্যম। ক্ষতে বস্তু লাগিয়া থাকে, উহা টানিয়া ছাড়াইলে রক্তপাত হয় ।

ক্ষতের চারিদিকে জলপূর্ণ স্ফোট উৎপন্ন হয়, উহাতে প্রবল কণ্ডুয়ন জন্মে, আঙুলের ছায়া জালা করে (হিপ) ; উহার চারিদিকে অগ্নির ছায়া লোহিত বর্ণ, চকচকে মণ্ডল দৃষ্ট হয় ।

অস্থি, বিশেষতঃ দীর্ঘাস্থি প্রদাহিত ও ক্ষীণ ; উপর হইতে নীচের দিকে রাত্রিকালীন বেদনার গতি ; পারদ-সেবন, ও উপদংশ-রোগের পর উহার উৎপত্তি ; অস্থি-ক্ষত ; অস্থি-বিবর্জন, ভিতর হইতে বাহিরের দিকে অর্কুনের কোমলতাপ্রাপ্তি ।

দীর্ঘাস্থির অস্থি-বেষ্টি (periosteum) বেদন, রাত্রিতে শয্যায়া, অত্যন্ত মাত্র স্পর্শে, ও আক্রমণে উহার বৃদ্ধি (মার্ক, ফাইটো) ।

কটিবন্ধবৎ দস্তার (zona) পরে স্নায়ু-শূলজনিত আলাকর বেদনা ।

অরের স্বল্প-বিরাম বা টাইফয়েড প্রকৃতির প্রবণতা । আক্সারী ও ফেব্রুয়ারি মাসে ব্যাপক আকারে যে সকল জর উপস্থিত হয় : তাহাতে সাধারণতঃ মেডে-রিয়মের প্রয়োজন পড়ে ।

উপচয় ।—শীতল বায়ুতে ; শীতল জলে প্রক্ষালনে ; রাত্রিতে এবং স্পর্শে ও সঞ্চালনে সাধারণতঃ দক্ষিণ পার্শ্বের আক্রান্ততা ও মার্কিউরি অথবা এল-কোহলের মন্দফলের ; বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ।

সম্বন্ধ ।—ফাইটো, কষ্টে, হুঃস ও গোয়েকের সহিত মেডে-রিয়মের তুলনা হয় ।

মেডোরাইনঃম ।

(Medorrhinum)

প্রমেহের বিষ হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয় । কুটিকিৎসিত ও নিমুগ্ন প্রমেহের মর্সাদীন মন্দফলে অত্যন্ত সুনির্ধারিত ঔষধেও উপশম বা স্থায়ী উপকার না দর্শিলে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

সাইকোসিস (মামক-দোষ) হইতে উৎপন্ন গাউট, আমবাত, স্নায়ু-শূল এবং পৃষ্ঠ-বংশের মঞ্জার বা উহার ঝিঁড়ি রোগ—এমন কি উহার বিধান-বিকার (organic lesions) ও উহা হইতে পক্ষাঘাতে পরিণতিতেও মেডোরাইনঃম উপযোগী ।

নারীদিগের পুরাতন ডিম্বাশয়-প্রদাহ (ovaritis), ফ্যালোপিয়ান টিউবের প্রদাহ, পেলবিক সেলুলাইটিস, তন্তুময় অর্কুদ (fibroids), কোষময় অর্কুদ (cysts) ও জরায়ুতে অত্যাধিক অস্বাভাবিক বস্তুর উৎপত্তিতে, বিশেষতঃ সেই সকল বিকৃত পদার্থের উৎকট প্রকৃতি ধারণের সম্ভাবনার, সাইকোসিস-দোষ-মূলক হউক বা না হউক, এই ঔষধের ব্যবহার হয় ।

স্ক্রিমঃস, কার্গিনোমা অথবা ক্যান্সার রোগের তরুণ বা পুরাতন বিকাশ লক্ষণের সৌমাদৃশ্য ও সাইকোসিস-দোষের পূর্ববৃত্তান্ত থাকিলে এই ঔষধ উপযোগী ।

স্বক ও মৈথুনিক ঝিঁড়ি গভীর-মূল রোগে মোরিগমের যে সম্বন্ধ সাইকোসিস-দোষ অনিত পৃষ্ঠবংশীয় ও সহায়ত্বোত্তিক স্নায়ু-শুলের (sympathetic nervous system) গভীর-মূল পুরাতন রোগে মেডোরাইনঃমের সেই সম্বন্ধ ।

পাণ্ডুবর্ণ, রেকাইটিস-গ্রস্ত বালক-বালিকা ; অপরিবর্দ্ধিত ক্ষুদ্রকারী (ব্যা'রা-কা) ; মানসিক দুর্বলিত ও দুর্বলত ।

লসিকা-গ্রন্থির বিবর্দ্ধন সহকারে সর্বশরীরের অতিশয় উত্তাপ ও স্পর্শ-দেয় ।

ক্ষয়রোগজনিত অবসাদ, শ্রান্তি ; মর্সাদীন জীবনী-শক্তির অতিশয় অবসন্নতা ।

বেদনা ।—বিমুগ্ন প্রমেহের পরিণাম স্বরূপ সন্ধিবাত ও আমবাত অনিত

বেদনা (ডাফ, গ্রিম) আকৃষ্টনং বাতনা, বোধ হয় যেন সমগ্র শরীর কষিয়া ধরা হইয়াছে (কার্ট) ; সর্জনবীরে ঘৃণবৎ স্পর্শ-দ্রব্য (আর্ন, ইউও)

রোগীর নিকট সর্বত্র শরীরের কম্পানুভব, তাঁৎ শায়বীয়তা ও গভীর অবসন্নতা ।

হিমাক্ত অবস্থা, মস্তক সমগ্রই বাতাস করিতে বলা (কার্ভো-ভে) ; বিমল বায়ু পার্শ্বঃ আকাঙক্ষা ; গাণ শীতল সংজ্ঞে গাণাবরণ ফেলিয়া দেওয়া (ক্যাফ, সিক) গাণের শীতলতা ও শীতল ঘর্ষে মিত্ততা (ভিরে)

মন । স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা ; নাম, শব্দ বা শব্দের প্রথম অক্ষর স্মরণ রাখিতে পারা যায় না, অত্যন্ত আত্মীয় বন্ধুরও নাম ভিজ্ঞাসা করিতে হয় ; এমন কি নিজের নাম পর্য্যন্ত মনে থাকেনা

পরিপূর্ণরূপে বর্ণ বিজ্ঞাস করিতে পারা যায় না ; অপরিচিত নাম কেমন করিয়া বানান করিতে হয় তাহাও ভিজ্ঞাস করিতে হয় ।

আলাপ করিতে করিতে কথার সম্বন্ধ হারাইয়া যায়

রোগিণী তাহার লক্ষণ অনায়াসে বর্ণনা করিতে পারে না, ভেবাচেকা খায়, তখন পুনঃ পুনঃ তাহাকে প্রশ্ন করিতে হয় ।

না কাঁদিয়া কথা বলিতে পারা যায় না ।

মৃত্যুর কথা পূর্বে বলা, সর্জন পূর্ক-দৃষ্টি, ঘটনা ঘটাবাব পূর্বেই তৎসম্বন্ধে অতিশয় অনুভূতি ।

সামান্য সামান্য বিষয়ে বিরক্তি ; দিবাভাগে কোপনতা, রাতিতে দৃষ্টতা অতিশয় অসহিষ্ণুতা, কণরোগিতা ।

উৎকর্ষা, শায়বীয়তা, অত্যন্ত অনুভূতি, অত্যন্ত শব্দ চমকিত হইয়া উঠা । সমস্ত অত্যন্ত ধীরে ধীরে অবসান হয় (এলম, আর্জ-না, ক্যান-ইও)

অতিশয় ব্যস্ত-সমস্ততা ; কোন কিছু করিবার সময় রোগিণীর এতই ব্যস্ত-সমস্ততা যে শ্রান্ত হইয়া পড়ে

অনেকগুলি লক্ষণ, যখন উহাদের বিষয় চিন্তা করা যায়, তখন বুদ্ধি পায় । (বেদনার বিষয় ভাবিবার্থে উহার প্রত্যাবৃতি, অকৃষ্ণ-এমি) ।

মস্তক ।—মস্তিষ্ক দারণ আলাকর বেদনা, উপমস্তিষ্কে (cerebellum) উহার আতিশয় ; মেরুদণ্ডের নিম্ন পর্য্যন্ত প্রসারণ ।

মস্তক ভারী বোধ হয় এবং পশ্চাৎ কৈ আনুভব হয়

গাড়ীর কচল সম্বন্ধে পিঠের পিঠা ও অভিমার। মস্তকে অস্বাভাবিক ও সঙ্কোচন অনুভব, সমগ্র পৃষ্ঠবংশের লম্বা লম্বা উহার পক্ষাঘাত।

গল-মধ্য। — যেন তীব্র স্নিগ্ধ হইয়াছে বোগিলীর একপ অনুভব, তৎসহ অস্থিতে যাতনা প্রায় বেদনা, গলার বেদনা ও শীততা, ভবক বা অভরণ পদার্থ গিলিতে পারা যায় না (মাক)

নাসিকার পশ্চাৎ প্রান্ত, হইতে গাঢ়, ঘূর্ণ, বা রক্তাক্ত স্লেথ নিঃসৃত হইয় গলার সতত পূর্ণতা (হাইড্রা)।

ক্ষুধা। — আহারান্তে তৎক্ষণাৎ আবার অতিশয় ক্ষুধা (মিনা, লাইকো, সোরি)

অবিরত পিপাসা, রোগিলী অগ্নেও অলপান করে।

মদিরায় (পূর্বে ঘৃণা স্বভেদ) (এসার), লবণে (ক্যাঙ্ক, জাট) ; মিষ্ট জবো (মলফ) ; বরফ, অন্ন, কমলালেবু ও কাঁচামলে, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা।

অস্ত্র। — হৃদয়ে, কর্ণমণ্ডলে, ধীরে ধীরে নির্গত, মল ; সরলান্ত বাহির হইয়া পড়িলে এপ্রকার অনুভব বশতঃ কুহন করিতে অসামর্থ্য (এলম)।

গোলায় জ্বায় মল সহকারে অস্ত্রের আকৃষ্ট ও নিষ্ক্রিয়তা (লাক)

কেশল অনেকদূর পশ্চাৎদিকে ঝুঁকিয়া মলত্যাগ করিতে পারা যায় ; মল-ত্যাগে বড়ই যাতনা হয়, এত যাতনা হয় যে চক্ষু দিয়া অলপ পড়ে ; বোধ হয় যেন মলধারের মুখাবরক-পেশীর পশ্চাৎদিকের উপরিভাগে একটা পিণ্ড রহিয়াছে

সরলান্তে তীব্র স্থচী-বেধের জ্বায় বেদনা

মলধার হইতে রস-ক্ষরণ, উহার লোণা মৎস্তের জলের জ্বায় দুর্গন্ধ (কষ্ট, হিপ)

মূত্র-যন্ত্র। — বৃক্ক-প্রদেশে উগ্র বেদনা (পৃষ্ঠ-বেদনা), অধিক মূত্রজাবে উহার উপশম (লাইকো)।

বৃক্ক-শূল, অশ্মরী (calculus) নিঃসরণ অনুভব সহকারে মূত্রবাহী নালীতে দারুণ বেদনা (বার্ক, লাইকো, ও সিম) বরফ খাইবার স্পৃহা।

রাত্রিতে শয্যা-মূত্র। — প্রতিদিন রাত্রিকালে শয্যায় এমোনিয়ার

গন্ধবিশিষ্ট লোহিত বর্ণ প্রভূত মূত্র-ত্যাগ ; অধিক কার্য্য করিলে বা অধিক খেলা করিলে, ও উত্তাপ বা শীতলতার আভিলাষে উহার বৃদ্ধি ; মধ্যাপেক্ষা অনিচ্ছাচিত্ত ঔষধ নিষ্ফল হইলে : এবং সাইকোসিস-দোষের পূর্বা-বৃত্তান্ত থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়

মূত্র ত্যাগ কালে মূত্রাশয় ও অঙ্গের যত্ন-পূর্ণ কুস্থন ।

জনন-যন্ত্র ।—ধূ অতি মলিন, সংযত, প্রভূত, রজঃ ; রক্তের দাগ সহজে ধুইয়া উঠান যায় না (ম্যাগ-কা)

অগ্নায়ুর রক্তস্রাব ।—বিরজ কালে সপ্তাহ পর্য্যন্ত মলিন সংযত দুর্গন্ধ রক্তের প্রবাহ, নড়িলে চাড়িলে ছড় ছড় করিয়া রক্তপাত ; তৎসহ অগ্নায়ুর উৎকট রোগ

দারুণ রজঃশূল, আত্মদয় উপরের দিকে আকর্ষণ এবং প্রসব বেদনার অম্লরূপ ভয়ঙ্কর বৃদ্ধি ; প্রসব-বেদনার স্থায় পদদ্বয় কোন অবলম্বে চাপ দিতে হয়

ভগের ওষ্ঠের ও যোনির দারণ কণ্ঠ্যন, চিস্ত করিলে উহার বৃদ্ধি প্রাপ্তি । স্তন ও স্তন-বৃন্তে স্পর্শ-দেষ

(ঋতুকালে) স্তনদ্বয়ের বিশেষতঃ স্তন-বৃন্তের স্পর্শে তুমার সদৃশ শীতলতা, শরীরের অবশিষ্টাংশের উষ্ণতা

শ্বাসযন্ত্র ।—শ্বাস-কাস —এপিগ্লামের দুর্বলতা বা আকোপ বশতঃ শ্বাস-রোধ ; শ্বস-যন্ত্রের একপ অবরুদ্ধতা যে উহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, কেবল মুখের উপর ভর দিয়া শ্বসন করিলে এবং জিহ্বা বাহির করিয়া রাখিলে উহার উপশম

শ্বস-যন্ত্রে ক্ষতবৎ স্পর্শ-দেষ

শ্বাস-কৃচ্ছ্র ও আকুঞ্চন অসম্ভব ; অনারামে নিশ্বাস গ্রহণ করা যায়, কিন্তু প্রাশ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না (শ্বাসু) ।

কাস —শুষ্ক, অনিরত, উগ্র কাস, যাতনা, বোধ হয় যেন শ্বসযন্ত্র হইতে শৈল্পিক ঝিল্লী ছিড়িয়া গিয়াছে ; পিপার মধ্যে কাস দেওয়ার স্থায় গভীর শূন্যগর্ভ কাস ; স্নাত্তিতে, মিষ্টদ্রব্য আহারে ও শ্বসন করিলে, উহার বৃদ্ধি ; আমাশয়ের (stomach) উপর ভর দিয়া শ্বসন করিলে উপশম ।

নিশ্বাস —সাণ্ডলাল, ফেণিল ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সবুজ বর্ণ তিক্ত, গোলাবী স্থায় নিশ্বাস, আঠা আঠা কফ, অনারামে তুলিয়া ফেলিতে পারা যায় না ।

প্রচুর ক্ষয়-রোগ যুগ্মকূমের মধ্যভাগে তীব্র বেদনা ।

পৃষ্ঠ ও দেহ-শীতলা ।—ক্ষয়-রোগের বাবধান-স্থলে পৃষ্ঠ-বেদনা, সমগ্র মেরুদণ্ডে লম্বাশির্ষ স্পর্শ-দেয় (চিনি-মল) ।

দারুণ জ্বালাকর উত্তাপ, ঘাড়ে গিঠে উহার আরম্ভ এবং মেরুদণ্ডের নিম্ন পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ, তৎসহ আকুঞ্চন বা শুকতা, অথ প্রসারণ করিলে উহার বৃদ্ধি ।

জ্বরের বাহ্যিক শির-দেশের আমবাতি ; হাতের আঙ্গুল পর্য্যন্ত বেদনার প্রসারণ, মধ্যভাগে বৃদ্ধি (দক্ষিণ, শ্রাব্য বাম, ফির)

কটিদেশীয় কশেরুকা (lumber vertebrae) বেদনা ও স্পর্শ-দেয় ।

এক স্থি (sacrum), কোকিল-চকু-অস্থি (coccyx) এবং বজ্রাঙ্গ-পৃষ্ঠ (back of hips) বেদনা, চারিদিকে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিম্নপর্য্যন্ত উহার সঞ্চরণ ।

কুচকী হইতে জ্বর পর্য্যন্ত ও জজ্বাদয়ে বেদন ; কেবল হাঁটিবার সময় বেদনা অল্পভূত হয় ।

জজ্বাদয়ের শুরুত্ব, সীসের জ্বর তার বোধ হয় ; হাঁটিতে অতিশয় অস্বাস বোধ হয়, জজ্বা ভাঙ্গিয়া আইসে ।

নিম্নাঙ্গ সারারাত্রি বেদনা করে, উহাতে নিজার প্রতিবন্ধকতা ঘটে ।

জজ্বাদয় ও পদদ্বয়ের অত্যন্ত অস্থিরতা (ত্রিষ্ক) ।

তড়িৎ সম্বলিত ঝড়কালে জজ্বাদয়ে ও বাহ্যদয়ে ভরস্কর যজ্ঞা ।

জজ্বাদয়ে বেদনা, শয্যায় উহা স্থির রাখিতে পারা যায় না, আত্ম-সংযম পরিত্যাগ করিলে ও নিজা যাইতে শরীর শিথিল করিলে বেদনার বৃদ্ধি ।

জজ্বা ও পদের এবং হাত ও বাহ্যক সঙ্গুৎভাগের শীতলতা ।

জজ্বার শিরায় ও পদের গ্রন্থিতে আকর্ষণ ও আকুঞ্চনবৎ অল্পভব ; জজ্বাপৃষ্ঠে ও পদতলে খল্লী (কুপ) ।

হাঁটিবার সময় শূলফ সহজে ঘুরিয়া যায় (কার্কে-এন, লিভ) ।

হাত-পায়ের জ্বালা, উহা অনাহন রাখিতে ও পাখার বাতাস প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা (ল্যাক, মল) ।

জজ্বায় এবং বাহ্যতে শায়-শক্তির প্রায় সম্পূর্ণ বিলোপ ; অত্যন্ত শীত প্রয়াসে উহার অবসন্নতা ।

শরীরের প্রত্যেক সন্ধির বেদনা-পূর্ণ শুকতা ।

হাতের আঙ্গুলের সন্ধির বিকৃতি ; পর্বেবর অঙ্গুলীর বৃহত্ত্ব ও ক্ষীণতা ; শুষ্কমুড়ার ক্ষীণতা ও বেদনাবিশিষ্ট শুকতা ; পায়ের গোড়ালীর এবং গোলাবৎ স্থানের অভিশয় স্পর্শ-দ্বৈ ; বায়ু কোবের শায় সন্ধির ক্ষীণতা ।

উপচয় ।—রোগের বিষয় চিন্তা করিলে (হেলন, অক্স-এসি) ; উত্তাপে, আবরণে ; প্রসারণে ; ঝড় বতকাৎ , অত্যন্ত মৃদু সঞ্চালনে ; মিষ্টজন্য সেবনে ; দিবাগোক হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত (সিকিট বিপরীত) ; বৃষ্টি ।

উপশম ।—সমুদ্রকূলে (গাটের বিপরীত) ; আমাশয়ের উপর ভর দিয়া শয়নে ও আর্দ্রকালে (কষ্ট নয়) ; ভ্রাস

সম্বন্ধ ।—(১) শুষ্ক কাগজে, ইপির সহিত ; হিমানে, সিকি, ক্যান্স, ট্যাব ডিরের সহিত ; বিচরণে অসমর্থতায়, পিক-এসি, জেলসের সহিত ; এবং প্রাতঃকালীন অভিমারে, এলো ও সলফের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ । (২) সলফারের পদব্রের জালা এবং জ্বিলের পদ ও জজবার অস্থিরতা উভয়ই যুগপৎ মেডোরাইনমে পাওয়া যায়

মেনিয়াস্থিস ।

(Monyanthes)

সিকোনা ও কুইনাইনের অপব্যবহারে-জনিত রোগে মেনিয়াস্থিস উপযোগী ।

শীতাবস্থার প্রাধান্য বিশিষ্ট জ্বর ; উদরে ও হাত-পায় দারুণ শীতানুভব (ভিরে) ।

অনেক আক্রমণের পূর্বে বা সহযোগে, যেন কোন দ্ব্যর্ঘটনা ঘটবে সৎ-পিণ্ডের নিকটে একপ উৎকর্ষা অনুভব ।

শিরঃপীড়া — উর্দ্ধ হইতে নিম্নদিকে মস্তক-শিথরে প্রচাপন, হাত দিয়া শক্ত চাপ দিলে উহার লাঘব (ভিরে) ; প্রতি পদ-বিক্ষেপে যেন মস্তকের উপর কোন গুরুভার চাপিত হইতেছে এরূপ অনুভব (ক্যান্স, গ্লন, ল্যাক), উপরে উঠিবার সময় বৃদ্ধি (ক্যান্স) ; সচরাচর শিরো-বেদনার সহিত হাত পায়ের বরফবৎ শীতলতা (ক্যান্স, সিমি) ।

নাগ-মূত্রে ; বাহ্যদমে ও হস্তাঙ্গুষ্ঠে ; অস্থিখিলতা (tension)
অকেন্দ্র আততি (tension) অনুভব ।

উপচয় । - ১ ক্যাফালে ; নিশামকালে ; ময়ন করিলে ; বুদ্ধি ।

উপশম । - পাড়িলে-চড়িলে ও আক্রান্তস্থানে চাপ দিলে ; ভ্রাম

সম্বন্ধ । (১) কাষ্ঠ, ক্যাক, জেজ, গিপি, ম্যাগ মি, ও পারিসের সহিত
ভুলনা হয় । (২) মেনিসাইট্রিসের পরে ক্যাথ, চাক, লাই, ৩৪স, ৩৫স, ভির,
ভাল থাটে

মেলিলোটঃম এলবা ।

(*Molilotus Alba*)

রক্ত-সঞ্চয়, রক্তস্রাবে উহার উপশম ।

পর্যায়ের কোন অংশের বা যন্ত্রের রক্ত-বহানাড়ীর রক্তপূর্ণতা

রক্ত-সঞ্চয় ঘনিষ্ঠ বা স্নায়বীয় পেশ শিরঃপীড়া নাকদিয়া রক্ত পড়িলে
উহার শান্তি (বিউক, ফেরি ফস, ম্যাগ্রে মস) ।

টফার (convulsions) - স্নায়বীয় শিশুদিগের দস্তোভেন-কালে টফার
(বেল) ; শিশুর আঙ্গণ, তরিতাঙ্গণ (eclampsia), অপমায় (epilepsy)

প্রগাঢ় আরক্ত মুখমণ্ডলসহকারে দর্শ-বিষয়ক বিষাদ ; উন্মাদ, প্রণমাবস্থায়,
মস্তিষ্কের প্রচাপন ও উপদাহ প্রমমনার্থ

নাসিকা হইতে রক্ত-পাতের পূর্বে মুখমণ্ডলের প্রগাঢ় আর-
ক্ততা ও উদ্দীপ্ততা এবং ক্যারিটিড্ ধমনীর দপদপ (বেল) ;
রক্ত পড়িলে সর্বাঙ্গীন শান্তি ।

প্রত্যেক যন্ত্র হইতে রক্ত-পাতের পূর্বে মুখমণ্ডলের অতিশয়
আরক্ততা ।

কোষ্ঠবদ্ধতা - আয়সে ও যাতনায় মল নিঃসরণ, মলদ্বারের আবদ্ধন ;
দপদপ ও পূর্ণতা ; অধিক মল সঞ্চিত না হইলে মল-ত্যাগের ইচ্ছা পরি-
শুদ্ধতা (এলম) ।

উপচয়।—ঝড়-বৃষ্টির সমাগমে ; রুটি-কাণে ও পারিবারিকনাশ খতুতে
বৃদ্ধি

সম্বন্ধ।—(১) শিরঃপীড়ার পর নানামকী হইতে রক্তপাত্তে মেডিগোটিংসে,
উপকার না দিলে, ওয়িল ও এন্ট-জুডের সহিত এবং রক্ত-সঞ্চয় জনিত
শিরঃপীড়ার, আরক্ত মুখমণ্ডল, উত্তপ্ত মস্তকাদি লক্ষণে বেশ, ঘন ও জ্বালের
সহিত উহার তুলনা করা যায়

ম্যাগ্নিশিয়া কার্বনিক।।

(Magnesia Carbonica)

যে সকল ব্যক্তির, বিশেষতঃ বায়ক-খালিকারিগের কোণ প্রকৃতি, শায়বীয়
ধাতু (ক্যাল) ও সমস্ত শরীরের অল্প গদ (রিডম) তাহাদের পক্ষে এই
ঔষধ উপযোগী।

সমগ্র শরীর, বিশেষতঃ জজ্বা ও পদদ্বয় প্রান্ত ও ব্যথিত অমুভব।

বিদ্যাবৎ শায়-শুলের বেদনা, বামপার্শ্বে আধিক্য (কণো —দক্ষিণ পার্শ্বে
আধিক্য, ম্যাগ-ফ) ; বিশ্রামকালে বেদনার অসহ্যতা, উঠিয়া ইতস্ততঃ হাঁটিতে
হয় ; গর্ভাবস্থায় দন্তবেদনা, রাত্রিতে বৃদ্ধি

মস্তকের শিথল স্থানে চুল টানার স্থায় বেদনা (কালী-না, গস)।
প্রতি তৃতীয় সপ্তাহে সমস্ত লক্ষণের উপচয় (খাতুর এক সপ্তাহ পূর্বে ভাল বোধ
হইলো, কালী-কা)

খাতুর পূর্বে গলা-ব্যথা (ল্যাক-ক্যান), অসবৎ বেদন, কর্তনবৎ উদর
বেদনা, পৃষ্ঠ-বেদনা, হর্ষণতা, শীত, কেবল রাত্রিতে বা শয়িত
অবস্থায় ঋতু-রক্ত নিঃসরণ, এবং জরায়ুর বেদনা না থাকিলে হাঁটিবার
দময় উহার বিরতি (এম-কা, জিঙ্গো।—বিপরীত, লিলি) ; বিদাহী, মণিন,
খালিকারিয়ার মত, সহজে ধুইয়া ফেলিতে পারা যায়না একরূপ জ্বাব।

ওটিকা-ধাতু-বিশিষ্ট পিতামাতার সন্তানসন্ততিদিগের মাংস আহারের
অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা।

অতিশয় মলম্বাণের পক্ষে কঠিনবৎ উদর-বেদনা । প্রতি তৃতীয় সপ্তাহে নিয়মিতরূপে উহার উপস্থিতি ; ভাঙ্গপড়া পুকুরের জলের মত, সবুজ, ফেনিল মল ; মলে শাদা শাদা চর্কির ছায় বড় ভাসমান দৃষ্ট হয় ; শুষ্কপায়ী পিণ্ডাদিগের মতের সহিত অজীর্ণ অবস্থায় দুগ্ধ নিঃসরণ ।

অতৃপ্তির নিদ্রা, ঘুমাইতে ঘাইবার সময় অপেক্ষা ঘুম হইতে উঠিবার সময় অধিকতর শান্তি অনুভব (ভ্রাই, কোনা, হিপ, ওপি, মলফ, টিউব) ।

উপচয় — নীতলতায় ; বায়ু প্রবাহে ; বাতাতপের পরিবর্তনে ; স্পর্শে ; প্রতি তৃতীয় সপ্তাহে ; বিশ্রামে ; এবং ঋতুকালে দুগ্ধপানে ; বৃদ্ধি ।

উপশম । — উষ্ণ বায়ুতে ভ্রাস, কিন্তু শয্যার উষ্ণতায় বৃদ্ধি (লিড, মিউর — শয্যার উষ্ণতায় ভ্রাস, আস) ।

সম্বন্ধ । — ক্যাগোমিলার সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ

ম্যাগ্নিশিয়া ফসফরিকা ।

(Magnesia Phosphorica)

ক্ষীণকায়, ক্ষীণ-দেহ, অতিশয় শ্বাস-প্রশ্বাস ; মলিনবর্ণ মুখাকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ উত্তম উপযোগী

শরীরের দক্ষিণভাগের রোগ ; মস্তক, কর্ণ, মুখমণ্ডল, বক্ষঃস্থল, ডিম্বাশয় বজ্রকণ-শ্বাস (sciatic nerve) ইত্যাদির পীড়া (বেল, ভ্রাই, চেলি, কালি-কা, লাই পড)

বেদনা । — তীব্র, কঠিনবৎ, ঘোঁচানিয়ার মত, বিদ্ধবৎ, সূচী-বেধনের স্থায়, যাতায়াতে বিদ্যুৎ সদৃশ (বেল) ; সবিরাম আবেশ-কালে বেদনার প্রায় অসহ্যতা বশতঃ রোগীর অনস্থায়ী ক্ষিপ্তভাজনক ; গতর অবস্থান পরিবর্তনশীল (ল্যাক-ক্যান, পলস), আকুঞ্চনবৎ অহুভবসংযুক্ত (ক্যাট্ট, আইওড, মলফ) ; আমাশয়, উদর ও বস্তি-গহ্বরের (Pelvis) পীড়ায় ধল্লীবৎ (কলো. কোলিন), বেদনা ।

শীতল বায়ুতে, অনাবরণে; আকাশ স্থানে স্নান; শীতল স্থানে
স্নানে বা প্রক্ষালনে, ও সঞ্চালনে, আত্মসংযম
শ্রান্তি, ক্লান্তি ও অবসরত; উষ্ণ বায়ুতে অমানব্যা
শীতল জলে দাঁড় হইয়া থাকা অথবা শীতল পানীয় পান করিয়া
অস্থির (ক্যাঙ্ক)।

দন্তোদগম-কালে সিঁড়িদিগের দাঁড়, দন্তোদ্ভেদের সময় জ্বরশূন্য
আক্ষেপ (জ্বর, উত্তাপ মস্তক ও ত্বকু সহ আক্ষেপ, বেচ)

শিরঃপীড়া মস্তকের পশ্চাত্তানে আরম্ভ ও মস্তকোপরি পসারণ (স্ফাঙ্গ,
সিলি); বিভ্রাণয়ের বাহিকাদিগের শিরঃপীড়া সু-মস্তকের আরম্ভতা ও
প্রদীপ্ততা; চিত্তিকার, পারিশ্রম বা কঠিন অধ্যয়ন বশতঃ উহার উৎপত্তি;
পূর্বার ১০টা হইতে ১১টা অথবা অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি; এবং
চাপ ও বাহ্যিক উত্তাপ প্রদানে হ্রাস

শায়ু-শূল;—মুখমণ্ডল, অক্ষি-কোটরের উর্দ্ধ বা নিম্নভাগ ও দক্ষিণ পার্শ্বের
শায়ু-শূল, চিড়িকমার ও কাটার স্থায় বেদনা, স্পর্শে, শীতল বায়ুতে ও চাপে
উহার বৃদ্ধি, বাহ্য উত্তাপ প্রদানে উপশম

দন্ত-শূল —রাজিতে; শীঘ্র শীঘ্র অবস্থান পরিবর্তনশীল দন্ত-বেদনা;
আহার ও পানে বিশেষতঃ শীতল জল পানে উহার বৃদ্ধি; উত্তাপে ক্লান্তপ্রাপ্তি
(শীতলতার হ্রাসপ্রাপ্তি, ব্রাই, কফ, ফির-ফগ)

পরিষ্কৃত জিহ্বা সহকারে আমাশয়ের আক্ষেপ বা খন্ডা, বোধহয় যেম
শরীরের চারিদিকে একটা ফিতা কষিয়া ঢানা হইতেছে।

উদর-বেদনা —আগ্নান-শূল, যোগ্যে বিলম্ব হওয়া অবনত হইয়া থাকিতে
হয়; উত্তাপ, ঘর্ষণ ও শক্ত চাপ প্রদানে উপশম হয় (কলোস, ধম);
ঘোড়া ও গাড়ীর বেদনায় কলোসিহ বিফল হইলে এই ঔষধে উপকার দর্শে।

ধতু।—নির্জীৱিত সময়ের অনেক পূর্বে; মচিন বর্ণ, রক্তাৎ রক্তজীব,
পূর্বে বেদনার আধিক্য, রক্ত পতিত হইতে আরম্ভ হইলে উহার হ্রাস
(ল্যাক, জিঙ্ক); বিছাডের স্থায় সঞ্চরণশীল তীক্ষ্ণ বেদনা, দক্ষিণপার্শ্বে আতি-
শয়া, উত্তাপে ও অবনত হইয়া বিভ্রাঙ্গ হইলে লাঘব, যোনিমুখের আশেপিক
অবরোধ।

ম্যাগ্নেশিয়াম ।—ম্যাগ্নেশিয়াম ডিপ্লোম্যাট বর্ণিতঃ ম্যাগ্নেশিয়াম মূত্র ; ১ ভূবর্ণ পোড়িত মূত্র ; মূত্র-মার্গে শলাকা প্রবেশের পর ।

খল্লী ।—১ ভীষ্মায়া, লেখ্যাদিগের, জন্ম পিপাসনে বা বেহালাবাদক-দিগের ; হস্ত পদের যক্ষা (খালধরা)

উপচয় ।—১ ১০০ ব'য়ুতে ; ১ ১০০ ব'য়ু বা ১ ১০০ ব'তাসের ১ বাহে ; শীতলমণে স্নানে বা থাফ গলে ; সঞ্চালনে ও সংপর্শে ; বুদ্ধি

উপশম ।—অবনত হইয়া দ্বিভাঁজ হইলে ; উত্তপে, উষ্ণতায় ; প্রচাপনে (জাগাকর বেদনার উত্তাপে উ শম, জাগ) ক্রাস

সম্বন্ধ ।—(১) বেগ, কণোফা, কণো২, পাইকে, জ্যাক-ক্যান ও পলসের সহিত তুলনা হয় ক্যাম এই ঔষদের উদ্ভিজে সম্বন্ধ । (২) তণ্ডু জন্মে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ ব বিধে কখন কখন ইহার মকোৎকষ্ট ক্রিয়া দর্শে

ম্যাগ্নেশিয়া মিউরিয়েটিকা ।

(Magnesia Muriatica)

নারীদিগের রোগে , অবায়ু রোগের সহিত সংশ্লিষ্ট, আক্কেপিক ও হিষ্ট্রিয়া-জনিত পীড়ায়, এবং যে সকল রোগীর অনেক বৎসর পর্যন্ত অগ্নিমান্দ্য কিংবা পিত্ত-প্রকোপের আক্রমণ সহ করিয়াছে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী

শিশুগণের আশ্বাসিত দস্তোদগম-কালে দুগ্ধজীর্ণ করিতে অসমর্থতা ; দুগ্ধ আশ্বাসয়ে বেদনা জন্মায় এবং অপরিপাচিত আকারে নির্গত হয় , দুগ্ধকাষ, রিকেট রোগগ্রস্ত শিশু, মিষ্টদ্রব্য আহারের আকাঙ্ক্ষা

স্পার্ম-দ্রব্য অম্লত্ব, শল্যে অভিণয় ক্ষুভুতি (ইণ্ড, নর, থেরে) ।

শিরঃপীড়া ; প্রতি ছয় সপ্তাহে এক এক বাব উপস্থিত , কপালে ও চক্ষুর চারিদিকে বেদনা ; বোধ হয় যেন উহা ফাটিয়া পড়িবে ; নড়িলে চড়িলে ও অনাবৃত বায়ুতে বেদনার বৃদ্ধি ; শয়ন করিলে, সবলে চাপ দিলে, ও কাপড় জড়াইয়া উষ্ণ করিলে, ক্রাস (মিলি, ঈণ) ।

মস্তকের ঘর্ষ নিঃসরণের প্রবণতা (ফা , স্যানিন , মিডি)

মুখ বেরে এমাগড ও মস্টোয়ার উল্লিখিত

দস্ত বেদনা ; খাণ্ড জায়া দস্তে লাগিতে উহার অস্তিত্ব

পলাতুব ভায় গম্ব বিচি উহার (যমে পলাতুব ওক, সিনা) হাটিতে
ও স্পর্শ করিলে স্ক্রতে পচাপনবৎ বেদনা স্ক্রতেয় দৃঢ়তা ও বিবর্জন, দক্ষিণ
পাশে শয়নে বৃদ্ধি (মার্ক, পালোক)

কোষ্ঠবদ্ধতা, বৃহৎ স্ক্র ; গ্রাহন, মেয়ের নিষ্ঠা সন্ম , আয়ামে নিঃসারিত ;

মলদ্বারের প্রান্ত-ভাগে বিখণ্ডিত ; মল (এম মি, গাট-মিউ)

দন্তোদগম-কালে শিশুদিগের কোষ্ঠ-কাঠিন্য ।

অনুজ্ঞা পীতবর্ণ ; কেবল উদরের পেশাদার কুহন করিতে নিঃসারিত,
মূত্রাশয়ের দুর্বলতা

স্বাস্থ্য , প্রতি স্বাস্থ্য-কালে অতিশয় উত্তেজনা , কৃষ্ণবর্ণ, সংযত রক্ত-প্রবাহ ; উক
পর্যন্ত প্রসারিত আক্ষেপ ও বেদনা ; অরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তপ্রাব, রাজিতে
স্বাস্থ্য উহার বৃদ্ধি এবং উহাতে হিষ্টিরিয়ার উৎপত্তি (এক্টে, কলো, অ্যাস)

প্রদর ; ব্যায়ামান্তে ; প্রতিবার মলত্যাগ-কালে অরায়ুর আক্ষেপ সহ-
কারে ; প্রাব নিঃসরণ তৎপরে অরায়ু হইতে রক্তপ্রাব স্বাস্থ্য দুই
সপ্তাহ পরে প্রদরের উপস্থিতি (ব্যা রা, বোভ) ।

পাদ-ঘর্ষের অতিশয় প্রবণতা (সিলি, স্যানিন)

উপবেশন-কালে স্বৎকম্প ও স্বৎপিণ্ডের বেদনা, নড়িয়া-চড়িয়া বেড়াইলে
উহার উপশম (গেল ভুগনা করন) ।

উপচয় ।—রাজিতে ; অস্বাভাবিক ; সমুদ্র-স্থানে (অতিশয় দুর্বলতা)
ও শীতলতার ; বৃদ্ধি ।

উপশম ।—উষ্ণতায় , স্নায় ; ও ব্যায়ামে ; ক্রম

সম্বন্ধ ।—বালক-বার্ভিকাদিগের রোগে ক্রামোন্ন সহিত ভুলনা হয় ।

রঃ নটক্সিকোডোন্ড্রন ।

(Rhustoxicodendron)

আমবাতিব গ্রাকাতর (কয়েটি ১ ড়ে ২ মস) ব্যা ক'রগের পাতা বসটখোর
বিশেষ উপযোগিতা ।

ভিজিবার, বিশেষতঃ অভ্যন্তরিত্ত ভক্ত হইবার পরে ভিজিবার মন্দফল ।

কোন অঙ্গ, পেশী বা কণ্ডুরা (tendon) মতক ইয় গেলে (চোক, নদা ; বাছ
উর্দ্ধে তুলিয়া কোন বস্ত্র লাগান পাইতে গেলে, অর্থাৎ মৃত্তিকায় শয়ন করিলে,
এবং প্রাণকালে মদোতে বা হু দে শয়ন করিলে যে সকল অঙ্গুথ উৎপন্ন হয় সেহ
সকল অঙ্গুথ ।

শরীরের শুষ্কময় বিধানের (fibrous tissue) বিশেষ আক্রান্ততা (রোডো, —
মস্তৃসাবো বিধান, এই) ; বাম ভাগ অপেক্ষা দক্ষিণভাগে আধিক্য ।

মচকানবৎ বেদনা, কোন পেশী বা কণ্ডুরা যেন উহার সংলগ্ন স্থান হইতে
ছিঁড়িয়া গিয়াছে এবং বেদনা ; হাড়গুলি যেন ছুরি দিয়া চাঁচ যাইতেছে একপ্রকার
বেদনা ; হুপ্রহর রাত্রির পরে ও বৃষ্টির সময়ে বেদন বৃদ্ধি পায়, আক্রান্ত স্থান
স্পর্শে ব্যথিত বোধ হয় । বিশ্রামের পবে প্রথম নড়িতে-চাড়িতে অথবা প্রাতঃকালে
শয়্যা হইতে উঠিবার অস্বাভাব্যত পরে থলত, শুষ্কত ও বেদনা, হাটিলে বা ক্রমা-
গত নড়িলে চড়িলে উহার ৮ ম

অতিশয় অস্থিরতা ; উৎকর্ষা, আশঙ্কা (একন, আস) ; শয়্যায় থাকিতে
পারা যায় না ; বেদনার শান্তির জন্য বারবার অবস্থান পরিবর্তন করা আবশ্যক
হয় (মানসিক উৎকর্ষা বশতঃ অস্থিরতা, আস) । অস্থিরতা, অনেকক্ষণ এক-
ভাবে থাকিতে পারা যায় না

পেশীর বাত, বাম পার্শ্বের গৃহসী (সায়োটিকা) (কণো), হুজোগ সহযোগে
বাম বাহতে বেদনা

অনার্দ্ভ বায়ুতে অতিশয় অনুভূতি ; শয্যা-বস্ত্রের নীচে হইতে
হাত বাহির করিলে ক ম ভীত হয় (ব্যাসা, হিপ) ।

প্রাণিতে অতিশয় আশঙ্কা ; যেন কেহ বিষ খাওয়াইয়া য়ারিবে এরূপ ভয়,
শয়্যায় থাকিতে পারা যায় না ।

শিরঃশীত , পদ বিক্ষিপ্ত করিবার বা মাথা ঝিকিয়ার সময় মস্তিষ্ক চালনা বোধ হয় মস্তিষ্কে আন্দোলন অনুভব , বমুচলা অনুভব , চিঃবৎ অনুভব , বিসার পানজন্য উহার উৎপত্তি ; পানীয় বাক্যের ব্যাঘাতি , উপবেশনে, শয়নে, শুশ্রূষা তৎক্ষণাৎ ; এবং উদ্ভাসিত হইয়া মস্তিষ্কে হ্রাসপাতি

দাঁড় ইবার বা হাঁটিবার সময় পানীয়ের , পানীয় উহার বাক্য (শয়ন কালে হ্রাস, এপিগ , শয়ন হইতে উত্থানে তাদিক্য , বাহ)

অতি প্রশম দাঁড় বাহিয়া, হাঁটার দেওয়া ও জাত্যতিক কার্যে কঠিন শয়ন করায় স্থগ (বাই)

মুখের কোণে ক্ষত, মুখের চারিদিক জ্বর-শোথ (জ্বর-ঠা) ; চিবুকে উদ্ভেদ (ঠাট)

শিরঃশীত সময় ক্ষয়ক্ষয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বেদনা . কটিতে বেদনা ও শুষ্কতা, উপবেশনে বা শয়নে উহার আধিক্য , সঞ্চালন অথবা কোন কঠিন বস্তুর উপর শয়নে উহার হ্রাস

শুষ্ক, আরক্ত, বিদারিত জিহ্বা ; ত্রিভুজাকার আরক্ত অগ্রভাগ ; জিহ্বায় দস্তুর দাগ পড়ে (চেলি, পত) ।

জিহ্বা, মুখ-বিবর ও গল-মধ্যের শুষ্কতা সহকারে অতিশয় পিপাসা

প্রদাহিত বিসর্পিত জল-শোত বাহ্য জননায়

টাইফয়েড জ্বরের আরম্ভ সহকারে অতিশয় ; অতিশয় অবসন্নতাসহ অনিচ্ছায় বিবেচন , মলত্যাগ কালে জ্বরের পশ্চাত্তাপের নিম্নে ছেদনবৎ বেদনা ।

আক্রান্ত অংশের অবসন্নতাসহ পক্ষাঘাত , অগ্নে ভিজিয়া বা ভিজা মাটিতে শয়ন করিয়া ; এবং প্রশম, প্রেম, অপরিমিত ইন্দ্রিয় সেবা, কম্প জ্বর বা টাইফয়েড জ্বর হইতে উহার উৎপত্তি ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আংশিক পক্ষাঘাত , অগ্নিপুটের পক্ষাঘাত ।

বিসর্প, বাহ্য হইতে দক্ষিণে বিসর্পণ ; ফোফাসংযুক্ততা ; পীতবর্ণ ফোফা, অতিশয় ক্ষীণতা, প্রদাহ , জ্বালা, কণ্ডুয়ন, হ্রাস-বেদন ।

সবিরাম জ্বরে শীতাবস্থার পূর্বে ও তৎকালে শুষ্ক, বিরক্তিকর কাস ; রক্তের আশ্বাসবিশিষ্ট কাস ।

ভ্রমণরোগের ঐশিগা ভাবস্থা প্রাপ্তি ।

উপচয় । বাতের পূর্বে ; শীতল, আর্দ্র কালে ; রাত্রিতে, বিশেষতঃ
ছাই প্রহর রাত্রির সময় ; শীতল জ্বরে ; এবং বিশ্রামে ; রক্ত

উপশম ।—উষ্ণ গায় ; উষ্ণ, শুষ্ক কালে, বসন্ত রক্ত হইলে, উষ্ণ বা উত্তপ্ত
জ্বরে , ঐক্ষণে ; অবস্থান পরিবর্তনে ; রক্তাঙ্গ সঞ্চালনে ; হ্রাস

রসটরোগ আত্মবিশেষ বক্ষণ এই যে কতিপয় স্থান ব্যতীত বেদনা বিশ্রামকালে
উপস্থিত ও বিবর্তিত হয় এবং সঞ্চালনে হ্রাস পড়ে । রসটরোগ অনিত
কণ্ডুয়ন ও জালা অনেক সময় সিপিরা দ্বারা সহন আরোগ্যপ্রাপ্ত হয়, কয়েক-
দিনের মধ্যে ফোঁকাগুলি শুকাইয়া উঠে

সম্বন্ধ ।—(১) আইউনিয়ার সহিত অল্পপুরুষ সম্বন্ধ । (২) এপিমেস
সহিত প্রাক্কুল সম্বন্ধ রসটরোগ পূর্বে বা পরে এপিমেস ব্যবহার করা অকর্তব্য ।
(৩) আর্গ, আই, রোড, নাট মল ও মলফের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ

রাটানহিয়া ।

(Ratanhila)

গর্ভের প্রথম কয়েক মাসে ভ্রমণের দস্ত-বেদনা ; দস্ত দীর্ঘাভূত বোধ হয় ;
শয়ন করিলে বেদনা বাড়ে, তখন উঠিয়া হাঁটিতে হয়

কোষ্ঠবদ্ধত ; অতিশয় কুস্থন সংযুক্ত কঠিন মল ; অর্ধ-বলি নিঃসরণ,
তৎপরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত অবিরাম বেদনা ও মলদ্বারে জ্বালা (মলফ) ;
অঙ্গের নিগ্রন্যতা ; মলত্যাগের পর মলদ্বারে ও সরলাঙ্গে যেন কাচের চৌচ
ফুটিয়া রহিয়াছে একরূপ বেদনা (থুজা)

মল-নিঃসার পর নিদারুণ যাতনা ; নরম মল-ত্যাগের পরও জালা (নাই-
এমি)

মলদ্বারের বিদারণ (fissures), সরলাঙ্গের অতিশয় অল্পভূতি
স্তম্ভদায়িনী প্রীদিগের স্তন-বৃন্তের বিদারণ (গ্রাফ, সিপি)

সম্বন্ধ ।—ক্যাছ, কার্ক-এমি, আইরিস, মলফ ও থুজার সহিত সমস্ত
সম্বন্ধ ।

বাণঃনকিউলঃম বঃল্লোমঃম ।

(Ranunculus Bulbosus)

মদিরাপানের কুফলে যে সকল ঔষধ অত্যন্ত ফলপ্রসূ বাণঃনকিউলঃম তাহার অন্ততম, আক্ষেপিক হিত ; মদ্যভ্যাস (alcoholism)

দিবাক্ততা ; চক্ষুর সম্মুখে ফুটাকা ; অগ্নি-গোলাকে প্রচাপন ও যাতন (ফস) ।

যে সকল জীলোক বসিয়া বসিয়া কাঁদ করেন তাহাদের স্বক্কাস্থির প্রাণভাগে পৈশিক বেদনা, অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে জালা (এগার, ফস), সূচী-কাঁধা, টাইপ-লেখা ও পিয়ানো বাজান হইতে উহার উৎপত্তি (এক্ট) ।

বক্ষ-প্রাচীরে স্নায়ু-শূল, পেশী-শূল ; অথবা আমবাত জনিত, সূচীবোধন বা সঞ্চরণবৎ, তীব্র বেদনা, আবেশে আবেশে উহার উপস্থিতি ; বাতাতপের পরিবর্তনে উহার উদ্বেক বা প্রকাশ ; প্রাদাহিক প্রকৃতি, পৃষ্ঠবংশের উপদাহ হইতে উৎপত্তি (এগার) ।

অতিরিক্ত উত্তপ্ত অবস্থায় সহসা শর্দি লাগিয়া অথবা তদ্বিপরীত কারণে উৎপন্ন প্লুরিসি বা নিউমোনিয়া (একন, আর্গ)

কড়ায় স্পর্শ-দ্রব্য, যাতনা ও জালা (স্ফাতিসি-এগি)

পশ্চক-মধ্য পেশীর বাত ; বক্ষঃস্থলের স্পর্শ-দ্রব্য ও ঘৃষ্ণতা, স্পর্শে, সঞ্চালনে অথবা শরীর ফিরাইলে ঘুরাইলে উহার আধিক্য (ব্রাই) ; আর্জ-কালে ও বাড়-বৃষ্টির সময় উৎপাদ (ব্রঃম)

কটি-দক্ষ ; পশ্চক-মধ্য-পেশীর স্নায়ু-শূলের পূর্বে বা পরে উহার উৎপত্তি (মেজ) ; ফোঁটগুলির নীলাভ আকৃতিও থাকিতে পারে

উপচয় । স্পর্শে, সঞ্চালনে ; বাতাতপের পরিবর্তনে, বিশেষতঃ ঝড়-বৃষ্টি-কালে (ব্রঃম) বৃদ্ধি ।

সম্বন্ধ ।—(১) একন, আর্গ, ব্রাই, ক্রিম, ইউফর, ও মেজের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ । (২) সলফ ও ষ্ট্রাকের সহিত বিষম-গুণ সম্বন্ধ ।

রিউম ।

(Rheum)

শিশুদিগের মধ্যে, বিশেষতঃ দন্তোদ্ভেদ-কালে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী ।
সর্ব শরীরের অঙ্গগত ; শিশুর গাত্র হইতে অঙ্গগত
নিঃসরণ, প্রক্ষালন বা স্নানান্তেও উহা দূর হয় না (হিপ,
ম্যাগ-কা)

মল-বেগ ও অম-মল সহকারে শিশুদিগের টিংকাব সারা রাত্রি শিশু-
 দিগের ক্রন্দন ও অবশুর্চন (মোরি) ।

শিশুর অধীরতা, বহু বস্তুর আকাঙ্ক্ষা, এবং ক্রন্দন ; প্রিয় খেলার দ্রব্যেও
 অপ্রবৃত্তি (গিনা, ষ্টাফে) ।

মস্তকের কেশাবৃত্ত অংশের অবিরত প্রভূত ঘর্ষ ; শিশু নিদ্রিত বা ঘাটাত
 থাকুক, স্থির বা সঞ্চালিত থাকুক, তাহার চুল সর্বদা ভিষা থাকে ; এই ঘর্ষ
 অল্প বা অনল্প থাকিতে পারে (ক্যাস্ক, স্থানিক) ।

দন্তোদ্ভেদে কষ্ট ; মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরণ ও গালের অঙ্গগত সহকারে শিশুর
 অস্থিরতা, কোপনতা ও বিরক্ত-চিত্ততা ।

নানাপ্রকার থাউজবোর আকাঙ্ক্ষা কিন্তু উহা থাইতে পারা যায় না,
 বিরাগ অগ্নে

উদর-বেদনা ; এক বাহু বা উভয়া অনাবৃত করিলে তৎক্ষণাৎ উহার
 আধিক্য ; তৎসহ অতিশয় অম্ল মল ; দাঁড়াইলে বৃদ্ধি প্রাপ্তি ; মল-
 ত্যাগে অল্পপলম ।

সংস্ক — (১) ছক্ক অসহ্য হইলে এবং শিশুর গাত্র অঙ্গগত থাকিলে
 ম্যাগ-কার পরে অল্পপূরক সম্ভব । (২) ক্যাম, কালোস, হিপ, ইপি, ম্যাগ-
 কা, পড, ষ্টাফ, সলফের সহিত সমস্ত সম্ভব । (৩) মলে অঙ্গগত থাকিলে
 কবাক্ক সংযুক্ত বা পরিমূত্র ম্যাগনিশিয়ার অপব্যবহারের পরে রিউম দেওয়া
 যাইতে পারে ।

কুমেক্স ক্রিস্পাস ।

(Rumex Crispus)

শুটিকা-ধাতুর রোগী, শুষ্ক ও শৈথিল্যক বিষমীর অত্যন্ত অনুভূতি ।

বিমুক্ত বায়ুতে অত্যন্ত অনুভূতি ; শ্বশ্বাস ; সক্ষাৎকাল উহার
অতিশয়, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আধিক্য ; শ্বশ্বাস অনিশ্চিততা

গল-গহ্বরে তুড়তুড়ি, উহাতে শুষ্ক বিষমীকরণ কাসের উদ্ভব

শুষ্ক, অবিরত, শ্বশ্বাসজনক কাস । বায়ুর বা গৃহের পরিবর্তনে

(ফস, স্পঞ্জ) ; সায়াহ্নে শয়নান্তে ; গল-গহ্বরে স্পর্শে বা প্রচাপনে ; বামপার্শ্বে

শয়নে (ফস) ; অত্যন্ত মাত্র শীতল বায়ু নিশ্বসনে ; বৃদ্ধ প্রাপ্তি ;

বায়ু উত্তর করিবার জন্য শয্যাবস্ত্র দ্বারা মস্তকাবরণ ;

অত্যন্ত নিশ্বাস বা একেবারেই নিশ্বাসের অভাব ।

শীতল বায়ুতে অথবা ঘাহাতে নিশ্বাসিত বায়ুর আয়তন বা সঙ্কটতা বর্দ্ধিত হয়
তাহাতে কাসের বৃদ্ধি ।

গলার মধ্যে পিণ্ডবৎ অনুভব, চোক গিলিলে উহার অবতরণ, কিন্তু তৎক্ষণাৎ
আবার প্রত্যাবৃতি ।

কাসিবার সময় শ্বশ্বাসে ও কণ্ঠনাগীতে অবদারণ অনুভব (কষ্ট) ।

কাসিতে কাসিতে অনিচ্ছায় মুত্র-নিঃসরণ (কষ্ট, পলস, গিলি)

প্রত্যুৎপন্নীয় অতিশয় ; পূর্বাহ্ন ৫টা হইতে ১০টা পর্যন্ত (এলো, ষাট-সল,
পড, সল) ; বেদনাশূল, প্রভূত, দুর্গন্ধ মল ; সহসা মল-বেগ, প্রাতঃকালে
তাড়াতাড়ি শয্যা পরিত্যাগ করিয়া মল-ত্যাগ করতে যাইতে হয় ।

অকের নানাস্থানে কণ্ডুয়ন ; শীতলতায় উহার বৃদ্ধি, উষ্ণতায় হ্রাস ;
কাপড় ছাড়িবার সময়, অনাবৃত হইলে অথবা শীতল বায়ু
লাগাইলে গাত্র-কণ্ডুয়ন (হিপ, ষাট-সল, ওলিন) ।

উপচয় ।—শীতল বা ঠাণ্ডা বায়ুতে শয়নে (হাইও) বৃদ্ধি ।

উপশম ।—উষ্ণতায় শীতল বায়ু বহুলাংশে মুখ-বিবর আবরিত
করিয়া রাখিলে, ঝাঁস

সম্বন্ধ ।—বেগ, কষ্ট, ভ্রম, হাইও, ফস, জ্বাঙ্গা সহ্যের সহিত ভুলনা
করা যায়

রুটা গ্রেভিওলেন্স ।

(Ruta Graveolens)

গাণ্ডমালাজনিত অস্থির অস্বাভাবিক বিবর্তন ; অস্থি ও অস্থি-বেষ্টের ঘৃষ্টভগ্ন
ও অজ্ঞাত উপঘাত ; বাত-কটক (sprain) ; অস্থি-বেষ্টের প্রদাহ ; অস্থি-
ভগ্ন (fracture) বিশেষতঃ অস্থির সন্ধি-বিচ্যুতি (গিম্ফাই) ।

পতন বা আঘাতের পরে যেকোন হয় সর্ক শরীরে সেইরূপ ঘৃষ্টতা ও খণ্ডতা
অনুভব ; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ও সন্ধি-স্থলে উহার আধিক্য (আর্গ) ।

শরীরের যে সকল অংশে ভর করিয়া শয়ন করা যায় তাহাতে ঘৃষ্টতার জ্বর
বেদনা (ব্যাপ্টে, পাইরো) ।

অস্থিরতা, শয়ন-কালে পুনঃ পুনঃ অবস্থান-পরিবর্তন (ক্রঃস) ।

মচকিয়া যাওয়ার পরে, বিশেষতঃ মণিবন্ধ-সন্ধির (wrists) ও জঙ্গ-সন্ধির
(ankles) খণ্ডতা (পুরাতন বাতকটক, বোভ, ট্রেন)

বক্ষঃস্থলে উপঘাত প্রাপ্তির পরবর্তী যক্ষা (গিলি) ।

চক্ষুর মধ্যে ও উপরে অবিরাম বেদনা তৎসহ দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা, বোধ হয়
যেন চক্ষু অতিরিক্ত ব্যবহৃত হইয়াছে

স্বল্প কারুকার্যে, খটকা-নির্ম্মাণে, ভাস্কর কার্যে (জাট-মি) ; একাগ্রভাবে
দৃষ্টিপাতে (সেন) চক্ষু ব্যবহারের পরবর্তী পীড়া ।

চক্ষুর অতি ব্যবহার, মন্দ আলোকে অতিরিক্ত ব্যবহার ; স্বল্প স্বচীকার্য,
রাত্রিতে অতিরিক্ত অধ্যয়ন প্রভৃতি হইতে দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা বা দুর্বলতা,
কুস্মাটিকাৎ বাপসা দৃষ্টি, দূরে সম্পূর্ণ অস্পষ্টতা ।

চক্ষুর জ্বালা, বেদনা ও অত্যাক্ষত (strained) অনুভব ;
অগ্নির গোলার আয় উত্তপ্ততা ; নীচের অক্ষিপুটের আক্ষেপ ।

উপঘাত প্রাণির পরবর্তী নিশ্চেষ্টতা, বা সংঘাত বশতঃ কোষ্ঠ-রোধ (আর্গ)
মলত্যাগের চেষ্টা করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ হাড়িশ বাহির
হইয়া পড়া ; যৎসামান্যরূপে মস্তক অবনত করিলে ; প্রেসবাস্তে ও পুনঃ
পুনঃ বিফল মল-বেগের পর উহার উপস্থিতি

মূত্রাশয় যেন সর্বদা পূর্ণ রহিয়াছে উহাতে এক্রপ চাপ অনুভব ; মূত্র-
ত্যাগের পরেও উহার বিদ্যমানতা ; মূত্র-বেগ উপস্থিত হইলে আর উহা
ধারণ করিতে পারা যায় না, ধারণ করিলে পরে মূত্র-ত্যাগ করিতে কষ্ট হয় ;
স্বপ্ন, হরিদ্রণ মূত্র ; অনিচ্ছায় মূত্র-নিঃসরণ ।

অঁচিল ; উহাতে স্পর্শসহ বেদনা ; করতলে চেপ্ট, মৃদু অঁচিল (ছাট-কা,
ছাট-মিউ ।—কর-পৃষ্ঠে, ডল)

পৃষ্ঠে ভরদিয়া শয়ন করিলে উপশমিত হয় : এক্রপ পৃষ্ঠ-বেদনা

সম্বন্ধ ।—(১) অঁর্ল, অঁর্জ না, কোল, ইউফ্রে, ফাইটো, ফ্রাস ও সিম্ফাইর
সহিত সমগুণ সম্বন্ধ । (২) আর্গিকার পরে সন্ধি-স্থলে ; এবং সিম্ফাইটমের পরে
অস্থির উপঘাতে রূটা আরোগ্য-প্রক্রিয়ার সহায়তা জন্মায় ।

রোডোডেন্ড্রন ।

(Rhododendron)

যে সকল জায়বীর ব্যক্তির বাড়ের ভয় হয় এবং যাহারা বজ্রাঘাতে বিশিষ্ট-
রূপে ভীত হইয়া থাকে ; ঝড়ের পূর্বে বিশেষতঃ তড়িৎপূর্ণ ঝড়ের পূর্বে যাহাদের
অস্থির বুদ্ধি পায় (ছাট-কা, ফস, সোরি, সিলি) তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ
উপযোগী ।

প্রতি বসন্ত ও শরৎকালে তীব্র পূর্বদিকের বাতাসে দম্ব-বেদনা ; বাতা-
তপের পরিবর্তনে, বাড়-বজ্র-কালে, এবং প্রবল বাতাস-কালে
উহার আধিক্য ।

সন্ধি-স্থানের তরল প্রাদাচিক ক্ষীততা ; এক সন্ধি হইতে অন্য সন্ধিতে উহার সঞ্চর ; রাত্রিতে উগ্রতা , বিশ্রামকালে এবং ঝড়ের সময় আধিক্য (ক্যালমিয়া)

সকল অঙ্গে আঘাতজনিত আকর্ষণ ও ছেদনবৎ বেদনা, বিশ্রামে এবং আর্দ্র, শীতল, বায়ু-বাত কালে উহার বৃদ্ধি (হঃস) ।

অভ্যাস্য অল্পপ্রস্থভাবে না রাখিলে নিজা ঘাইতে বা নিদ্রিত থাকিতে পারা যায় না ।

পদের অশুষ্ঠ-সন্ধিতে আমবাতজনিত তন্দ্রময় পদার্থের সঞ্চর সংযুক্ত গাউট, সাধারণতঃ গুজন (banion) বলিয়া ভ্রম করে (কলচি, লিড) ।

এমেহ অথবা আমবাত জন্ত অণুকোষের ক্ষীততা ও দৃঢ়তা (ক্রিম) ; অণু-প্রদাহ, অণু যেন সংপিষ্ট হইতেছে এরূপ অনুভব (অন্ন, ক্যাথ) ।

উপচয় ।—বায়ু-বাত-কালে ; আকাশে তড়িৎসংক্রান্ত পরিবর্তনে ; ঝড়-বজ্রের আগমনে ; বৃদ্ধি । বাতাসের প্রাবল্যে লক্ষণের পুনরুৎপত্তি ।

উপশম ।—মস্তকে বস্ত্র জড়াইয়া উষ্ণ করিলে ; এবং শুষ্ক উত্তাপ প্রয়োগে ও ব্যায়ামে, উপশম ।

সম্বন্ধ ।—ব্রাই, কোন, ক্যাথ, লিড, লাইক, সিপি, ক্রাসের সহিত সমস্তগ সম্বন্ধ ।

লরোসিরেসঃস ।

(Laurocoranus)

কপালে বায়ু-প্রবাহ জনিত শীতলতার জ্বর শীতলতা ।

গল-নলী ও অস্ত্রের অভ্যন্তরে ঘাইবার সময় পানীর প্রবেশ শব্দ শুনা যায় অধিকাংশ রোগের সহিত বেদনা-পরিশুদ্ধতা (ট্রাম) ।

জীবনী-শক্তির ক্ষত অবসাদন সংযুক্ত রোগ (ক্যান্স, ভিরে) ।

প্রতিক্রিয়ার অসম্ভাব, জীবনী-শক্তির বলের অভাব, বিশেষতঃ দক্ষঃস্থলের রোগে ; অনির্দিষ্ট উদ্বেগে ক্রিয়া দর্শনা ।

অনেককণহায়ী মুচ্ছার আবেশ । আহারান্তে ও সন্ধ্যাকালে চক্ষু নিদ্রাসুতা ।

লাইকোপোডিয়াম ।

(Lycopodium)

যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রাথমিক, কিন্তু শরীর দুর্বল, শরীরের উর্দ্ধাংশ শীর্ণ, নিম্নাংশ অর্ধ-শোথগ্রস্ত ; যাহারা গণগণায় এবং ফুসফুস ও যকৃতের রোগপ্রবণ (ক্যাঙ্ক, ফস, সল) ; তাহাদের পক্ষে এবং বালাক ও বুড়ের পক্ষে এই ঔষধ সমধিক উপযোগী ।

গাঢ়-মূল, ক্রমশঃ বিবর্ধনশীল, পুরাতন রোগ ।

প্রধানতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে প্রচাপন ও আকর্ষণবৎ অবিরাম বেদনা, অপর হ্র ৪টা হইতে ৮টা পর্যন্ত উহার আতিশয্য ।

রোগের দক্ষিণ পার্শ্বের আক্রান্তি, অথবা দক্ষিণ হইতে বাম পার্শ্বে গতি, গল-মধ্য, বক্ষঃস্থল, উদর ও ভিত্তাশয় সকল স্থানের রোগেরই এইরূপ প্রকৃতি

দুর্বল শীর্ণ শিশু ; অবিবর্তিত কিন্তু ক্ষুদ্র, রোগ - রীতি ।

শিশু সারাদিন কাঁদে, সারারাত্রি ঘুমায় (জ্যাণ ও সোরির বিপরীত)

ভয়, ক্রোধ, হঃখ কিংবা সংশ্লিষ্ট অসন্তুষ্টি সংযুক্ত বৈরক্তি জনিত অশ্রু (টাক) ।

লোভী, ঔদরিক, ক্রপণ ঘেষী, ভীক-স্বভাব রোগী

কোপনতা, নিজা হইতে আগরণান্তে গণগণাগিতা ও বিরক্তচিত্ততা ; কুৎসিততা, পদাঘাত করা ও চিৎকার করা ; সহজে ক্রোধের উদ্বেক হয় ; প্রতি-বন্ধকতা বা প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারা যায় না ; বিবাদ-প্রবৃত্তি ; উন্মত্ততা

সমস্ত দিন অশ্রুপাত, রোগিনী আপনাকে সুস্থির করিতে পারেনা ; অতিশয় অশুভ্রুতি, ধন্যবাদ দিলেও ক্রন্দন ।

মরুতা-ভীতি ; নির্জনতার ভয় ; একাকী থাকিতে ভয় (লিলি, বিস, কালী-কা) ।

পাণ্ডুর, মলিন, অস্বস্থ মুখাকৃতি ; নাসা-পার্শ্বের পাথার ছায়া সঞ্চ-লন (এন্ট-টার্ট ড্রষ্টব্য) রোগীকে বয়ঃক্রম অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধ দেখায় ।

প্রতিশ্রাব্য ; শুষ্ক প্রতিশ্রাব্য, রাত্রিতে নাসিকার অবরুদ্ধতা, মুখনিম্ন শ্বাস-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয় (এম-কা, নগ্ন, শুষ্ক) ; অবরুদ্ধ নাসিকাগার কাষ্ঠে সশব্দে শ্বাসক্রিয়া, নাসিকা, নাসাগুল ও তৎসম্মুখবর্তী গহ্বর ঘর্ষণ করিতে করিতে শিশুর নিজা হইতে চমকিত হইয়া উঠা, নাসা-রন্ধ্রে চিপটিকা (ফালী-বাহ, টিউক)

ডিপথিরিয়া ; গল-গহ্বরের ঈষৎ কণিষমিশ্রিত লোহিত বর্ণ, কৃত্রিম বিজীর্ণ বামদিক হইতে দক্ষিণ তালু-মূলে প্রসারণ, অথবা নাসিকা হইতে দক্ষিণ তালু-মূলে অবতরণ ; নিজাশ্ব ও শীতল পানীয় দ্রব্য পানে আধিক্য (উষ্ণদ্রব্য পানে আধিক্য, ঢাক)

সকল বস্তুই অস্বাদ ; উদগার, বৃকজালা, মুখে জ্ব-উঠা, অন্ন বমন (জরের শীত ও উত্তাপাবস্থার মধ্যে) ।

কুক্কুরবৎ ঘন ঘন ক্ষুধা ; রোগী যতই খায় ততই খাইতে চায় ; না খাইলে মাথা বেদনা করে ।

আমাসিক রোগ ;—অতিশয় বায়ু-সঞ্চয় ; সর্বদা পরিতৃপ্তি অনুভব ; উত্তম ক্ষুধা, কিন্তু করেক গ্রাস আহার করিবামাত্র কণ্ঠ পর্যন্ত পূর্ণতানুভব (উদগারে পূর্ণতার হ্রাস না হইলে, সিদ্ধ), রোগীর উদর স্ফীত বোধ হয় ও পেট ভাকে নিম্ন উদরই বিশিষ্টরূপে আক্রান্ত হয় (উর্ধ্ব উদর কার্কো-ভে সমগ্র উদর, সিদ্ধ) ।

বয়ঃপ্রাপ্তি হইতে ; শেষ-গ্রাসব কাল হইতে ও গৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গেলে কোষ্ঠবদ্ধতা ; শিশুদিগের কোষ্ঠ-কাঠিষ্ঠা ; বিফল মল-প্রবৃত্তি, মলত্যাগ-কালে সরলাঙ্গের আকুঞ্চন ও বহির্গমন ও অর্শের বিকাশ ।

মূত্রে লোহিত রেণু ; শিশুর শয্যাবঙ্গে লোহিত রেণু (ফস) ; প্রস্রাব করিবার পূর্বে শিশুর ক্রন্দন (বোরা) ; মূত্রত্যাগে পৃষ্ঠ-বেদনার শাস্তি ।

কৃত্রিম-মৈথুন ও অতি-মৈথুন বসন্তঃ যুবকদিগের ধ্বংসজনক ; উপশ্লেষ ক্ষুদ্রতা, শীতলতা ও শিথিলতা ; বৃদ্ধদিগের প্রবল লিপ্সা কিন্তু উপশ্লেষ অসম্যক উত্তিষ্টি ; মৈথুন-কালে নিদ্রিত হইয়া পড়া ; অকালে শুক্রনিঃসরণ

যোনির শুষ্কতা ; ঠেপুন-কাণ্ডে ও ৩২ পাতা উহাতে আঁচা (লাইসি),
 জরাধুর বাতামান ভজ্জিত মৈথুনের পোতিব-কতা
 পোতিবার মলত্যাগ কাণ্ডে জননপ্রায় হইতে রক্তপাত
 ক্রমের পা উপরে উচিত হইয়া উদ্ভাসনবৎ গাও জায়েতে, গাউবার একপ
 অনুভব ।

দক্ষিণাদগের অঙ্গ বৃদ্ধি (hea l), অনেকগুলি রোগে, বিশেষতঃ বাতক-
 বালিকা এই ঔষধে আরোগ্য লাভ করিয়াছে

উপেক্ষিত বা ফুটিকিৎসিত ফু ফুস পদার্থ (P eumon'), দক্ষিণ ফুসফুসের
 ভূমিদেহের সবিশেষ আক্রান্ততা , (আশোষণ (absorption) বা নিষ্টিবন
 প্রবর্তনার্থে) ।

গভীর, শূন্য-গর্ভ (ফাঁপা) কাগ, অধিক পরিমাণে শোষা উঠিলেও শাস্তি
 জগেনা

এক পা উত্তর, অত্র পা শীতল (শিষ্ণ, ডিম্বি, ইপি) ।

রাজিতে ক্ষুধা অনুভব করিয়া শিষ্ণা হইতে আগরণ (সিনা, সোরি) ।

উপচয় ।—অপরাক্ত ৪টা হইতে ৮টা ; আহারের পরে ; শীতল
 আহায়া বা পানীয় জবা সেবনে ; বিতৃক ও লবণাক্ত খাদ্যদ্রব্য ভঞ্জে , বৃদ্ধি

উপশম ।—শীতল হইলে ; মস্তক অনাবৃত করিলে ; উষ্ণ আহায়া বা পানীয়
 জবা সেবনে ; ও পরিষেয় বস্ত্র শিথিল করিয়া দিলে ; হাস ।

সম্বন্ধ ।—(১) আইওডিনের সহিত অল্পপূরক সম্বন্ধ (২) কাফ,
 কার্বো-লেভ, ল্যাক, মলফের পব লাইকো জাল খাটে । (৩) লাইকোর
 ক্রিয়া গভীর মূল ও দীর্ঘস্থায়ী এই ঔষধে উপকার দর্শিতে আরম্ভ করিলে
 ইহার পুনঃ প্রয়োগ বিহিত নহে (৪) স্পষ্টে সাদৃশ্য না থাকিলে পুরাতন
 রোগের চিকিৎসার প্রারম্ভে লাইকো ব্যবহার করা পরামর্শসিদ্ধ নহে ;
 প্রথমে অত্র কোন সোরা-দোষের ঔষধ প্রয়োগ করাই ভাল (৫) পলাতু ,
 রুটী ; মদিরা ; তালকুটের ধূমপান বা দোস্তা খাওয়ার মন্দ ফল (আস) ;
 লাইকো দ্বারা নিবারিত হয়

লাইসিন ।

(Lysin)

জল ঢালা বা প্রবাহিত জল দেখিলে বা উহার শব্দ
শুনিলে সমুদয় গীড়ার উপচয় ।

জলাতঙ্ক রোগ বা উগাত্ত কুণ্ডরের দংশনের আতঙ্ক ; উগাদ অগ্নিবার
আশঙ্কা

সত্ত্ব-প্রণের (wound) দ্বৈত নীল বিবর্ণ (ল্যাক)

অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি জ্ঞাত পাড়া (নিবৃত্তি জনিত—কোনা) ।

মনোভাব বা বিরক্তিক্রমক সংবাদে রোগীর সর্বদা মন্দাবস্থা প্রাপ্তি

সূর্যের উত্তাপ সহ্য করিতে পারা যায়না (জেল, ঘন,
ল্যাক, নাট)

টঙ্কার অত্যাঙ্গুল বা প্রতিফলিত (reflected) আলোক ও জল বা দর্পণ
দর্শনে (ট্রাম) ; কোন প্রকার তরল পদার্থের বিয়র চিন্তা করিলে ; এবং অত্যন্ত
স্পর্শ বা বায়ু-প্রবাহে আগ্নেয়ের উৎপত্তি ।

শিরঃপীড়া .—উগাত্ত ও অন্যান্য কুণ্ডরের দংশন বশতঃ শিরঃপীড়া ; মনো-
বিকার বা মানসিক পারিশ্রম জনিত পুরাতন শিরঃপীড়া প্রবাহিত জলের
শব্দে অথবা উজ্জ্বল আলোকে উহার বৃদ্ধি ।

মুখে ও গণ্ডার দৃশ্যেতা, রক্তবৎ আঠা আঠা, ফেনিল লালা ; অবিরত থুথু-
ফেলা (হাইডা)

গণা-বেদনা ; সত্ত্ব গণাধঃকরণের ইচ্ছা (ল্যাক-ক্যান, মার্ক)

গিলিতে কষ্ট, এমন কি তরল পদার্থ গিলিতে গল-নলীর আক্ষেপ ; জল
গিলিতে মুখ-রোম ।

প্রবাহিত জল দর্শনে অনিরাত মূত্র-প্রযুক্তি (ক্যান্থ, মার্ক) ;
চিনিসংযুক্ত, স্বাধা আবিষ্ট মূত্র

কন্দ (অরায়ুর স্থান বিচ্যুতি), বহু বৎসরের অনেক রোগিণীর আক্রান্তগোষ্ঠ

অপত্য-পথের অতিশয় অল্পভূতি, তজ্জন্ত রক্ত-ক্রিয়ায় যাতনা

উপচয়। - অঙ্গের দর্শন বা শব্দ, উদ্বেগ পথের আলোক (দ্বীপ), ও শকটরোহণে বৃদ্ধি (কক — শকটরোহণে হৃদি, নাই-গমি)

সম্মুখ হাইড্রোমেদিয়া এবং ওরোভ্রোমোগে, বেগ, ক্যাথ, হাইও, প্রায়ের সহিত লাইসোনের তুলনা হয়।

লিডুম।

(*Ledum*)

আমবাত ও গ্রন্থি-বাত ও ক্রান্তিতে, এবং উৎ মাদরা অপব্যবহৃত শরীরে এই ঔষধ উপযোগী (কলচি)

আইরিসের (উপত্যকা) শল্যোপচারের পর চক্ষুর সম্মুখের কক্ষ (anterior chamber) রক্তস্রাব।

চক্ষু ও চক্ষুর পাতার ঘৃষ্ট্রণ বিশেষতঃ অধিক অগ্নিত-রক্ত স্রব, অন্ধি-পল্লব ও শুক্রমণ্ডলের (conjunctiva) কালিয়া

আমবাত ও আমবাত জনিত গ্রন্থিবাত নিম্নাঙ্গে উহার আরম্ভ ও উপরের দিকে উত্তীর্ণ (নীচের দিকে নামন, ক্যালমিয়) ; বিশেষতঃ কলচিকমের অপব্যবহার বশতঃ নিম্নে অবস্থায় পরিণতি, সন্ধিস্থানে বেদনা-যুক্ত অর্ধদ বা চূর্ণময় পদার্থের স্রব ; তরু ও পুরাতন সন্ধি-বাত

বায়ু স্রব ও সন্ধি বজ্রণ-সন্ধির আক্রান্তি (এগার, এন্ট-টাই, দ্বীপ)

আক্রান্ত স্থানের শীর্ণতা প্রাপ্তি (গ্রাফ)

ভেদন, ছেদন, ও দপদপবৎ বেদনা, নড়িলে চড়িলে সন্ধির বেদনার আতিশয্য ; রাস্তিতে শয্যা ও শয্যাবস্ত্রের উত্তমতায় আধিক্য (মার্ক) ; কেবল বরফের জলে পা রাখিলে উহার উপশম (সিগে)

বাহারী সকল সময়েই শীতল থাকে তাহাদের অঙ্গণ ; সর্বদা শীতল ও শীত অনুভব ; স্বাভাবিক শারীরিক উত্তাপের অভাব (সিগি), আহতস্থান স্পর্শে সবিশেষ শীতল।

শরীরে তাপের স্পর্শ দাঁত, কিন্তু রোগী উহা দাঁত অনুভব করেন।

কোন কোন রোগে অধিক উত্তাপ ও জ্বালা অধিক বহিরা শয্যার উষ্ণতা
অসহ্য হয়

আত্ম প্ৰাণ পদবস্ত্রের শীততা মচকিয়া যাওয়ায় মত অসহ্য বেদনা
সহকারে ওষুধের শীততা ; পায়ের বৃদ্ধাধুনির শীততা ও ব্যাধিততা ; পায়ের
জুড়মুড়ার ঘৃষ্টব্য শীততা ।

পদ ও শুষ্কতার দ্বারা কণ্ঠ, কণ্ঠ, কণ্ঠ করিলে ও শয্যার উষ্ণতার উহার
বৃদ্ধি (পদ, রস) ।

মহা ওষুধ ও পা মচকিয়া যাওয়া (কার্খো-এ)

সুশ্রাব্য অঙ্গ, শ্বসিক-দংশন (হাইপার) ; প্রেক, কোটের ছল-বেধ, বিশেষতঃ
মদক-দংশন অনিত বিকল্প

প্রাণিপায়াদিগের লায় কপালে ও গালে লাল লাল পীড়কা বা জটিকা,
স্পর্শ করিলে উহাতে চিট্ মিট্ করা

উপশান্তির পর দীর্ঘকালস্থায়ী বিবর্ণ ; কৃষ্ণ ও নীলবর্ণ হান
হরিদ্বর্ণ হয় ।

উপচয় ।—উত্তাপে বৃদ্ধি ; শয্যার উত্তাপ সহ্য করিতে পারা যায়না,
মধ্য-রাত্রিকালে উহা অসহ্য হইয়া উঠে, তজ্জন্ম শয্যার গাত্র-বস্ত্র ফেলিয়া
দিতে হয় (মিলির নিপত্ত) । সন্ধিস্থল নাড়িলে চাড়িলে, পা ফস্কিয়া গেলে
ও যদিগাপানে ; বৃদ্ধি

উপশম ।—গাত্র-বস্ত্রোন্মোচনে রাত্রিকালে সন্ধিস্থানের গ্রহি-বাতজ
চূর্ণময় অধুনের ভয়ানক জ্বালায় শান্তি ।

সম্বন্ধ ।—উপশান্তির দীর্ঘকালস্থায়ী ফলে কোনায়েমের সহিত, এবং
অভিঘাতে, আর্গ, ক্রোই, হেম, বেজিস ও ক্লটোর সহিত লিডমের তুলনা হয়

লিলিয়ঃম টাইগ্রিনঃম ।

(*Lilium tigrinum*)

প্রধানতঃ বনপার্শ্বেব আকৃতি (চাক, খুঁড়া)

ডিম্বাশয় বা গর্ভাশয়ের পীড় সহবাবে গোষ্ঠিক রক্তসংকট যাতনা (লাই, মন, ভিরে) , সাজু-পান্নে ডহাও অত্যাচার

মাথার চাঁদিতে উন্মত্তবৎ অনুভব ; মনোভাবের গোলযোগ ।

চিৎসের গভীর অবসাদ ; অক্ষপাত নিবারণ করিতে পারা যায় না , অতিশয় ভীর্ণতা, ভয়পূর্ণতা, ও অধিক অশ্রুস্রাবিতা রোগিণীর অশ্রু যাহা করা যায় তাহাতে উদাস্ত ।

রোগসময়ে উৎকর্ষা ; লক্ষণগুলি যাজ্ঞিক রোগজ্ঞাপক বলিয়া আশঙ্কা করা ; স্ত্রী-পুরুষ উভয় প্রকার রোগীতেই এই লক্ষণের সুস্পষ্টতা

অরায়ুর উপদাহের সহিত পর্যায়ক্রমে অভিমুখপাত, আঘাত ও কুৎসিত চিন্তা করিবার (এনাং, লাক-জান) প্রবৃত্তি

উদাসীনতা অথচ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারা যায়না ; অস্থিরতা, অথচ হাঁটিতে ইচ্ছা হয়না , কাম-প্রবৃত্তি দমন করিয়া রাখিবার জন্য কার্যে নিবিষ্ট থাকিতে হয় ।

কিছু করিতে ইচ্ছা ব্যস্ত-সমস্ত ভাব অথচ উচ্চাভিলাষহীনতা ; লক্ষ্য-শূন্য ত্রস্তগতি (সাজু-না)

ভয় —একাকী থাকিতে ভয়, উদ্গাদ ও ক্ষোভের অগিবার ভয় ; রোগ আরোগ্য পাইবে না বলিয়া আশঙ্কা ; আসন্ন বিপদ বা রোগের আশঙ্কা

অরায়ুর উপদাহ অথবা স্থান-চ্যুতি অনিত্য বিরোবেদনা বা মানসিক রোগ ।
রক্তোদৈবলক্ষণ্য ও হৃৎপিণ্ডের উপদাহও

অসমান ভূমিতে হাঁটিতে অপারগতা ।

ক্ষুজ ক্ষুজ স্থানে বেদনা ; সতত উহার স্থানপরিবর্তন (কালী-বাই) ।

বার বার মূত্র-বেগ ; মূত্র-ধারণা করিলে বদনস্থলে রক্ত-সঞ্চয় অনুভব ।
উদরে ও বস্তি-কোঠরে কুস্থনবৎ আবেগ অনুভব, বোধ হয় যেন

সমস্ত যজ্ঞ বাহিব হইয়া পাড়ান (জ্যাক-ক্যান, মিউরেল সিপি) ; জগ-দেশ হাত দিয়া উচ্চ কাবয় রাখিতে উপশম , তৎসহ স্বকম্প

১৩ — যথাক্রমে পূর্বে স্নান, মলিন, দুগ্ধ রসঃ , কেবল নড়িয়া-চড়িয়া বেড়াইবার সময় উহা নিঃসৃত হয় ; বিচরণে বিরত হইতে রক্ত নিঃসরণেরও বিরতি জন্মে (কষ্ট —শয়ান বিরতি, ক্ষিপ্রতা, মাগ-কা) ।

স্বপ্নিও যেন পাক সাঁড়াসি দ্বারা চাপিয়া ধরা হইয়াছে একপ্রকার অল্পভব (ক্যাট) ; বোধ হয় যেন সমস্ত রক্ত স্বপ্নিও গিয়াছে , উহা বিদীর্ণ হইবার প্রায় পূর্ণ বোধ হয় ; সোজা হইয়া হাটিতে পারা যায়না ।

সমগ্র শরীরে নাড়ীর স্পন্দন অল্পভব, রক্ত-বহা নাড়ীগুলি ফাটিয়া যেন রক্ত পড়িবে উহাদের একপ প্রসারিততা অল্পভব (ইফিউ)

স্বকম্প, বিক্ষোভ ।—স্বপ্নের (apex) নিকটে শান্তি, অস্ততা, ও উৎকর্ষা অল্পভব ; বাম বক্ষে তীব্র বেদনা ; রানিতে নিদ্রা হইতে আগ্রহিত হইতে হয় ; নাড়ীর অনিয়মিত গাত ; হাত প শীতল ও শীতল ঘর্ষাবৃত ; আহায়েব পরে,ও যে কোন পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি (বামপার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি, জ্যাক) ।

স্বপ্নিওর ক্ষত স্পন্দন, প্রতি মিনিটে ১৫০ হইতে ১৭০ বার স্পন্দন ।

সরলায়ে চাপবশতঃ (কন্দসহযোগে) অবিরত মল ও মুত্র ত্যাগের ইচ্ছা ।

ভিষ্মাশয়, গর্ভাশয় ও পেণ্ড্রবসের বিধান-তন্ত্রর দুর্দ্বল অবস্থা, উহা হইতে অন্নায়ুর সঙ্কুচাবর্তন, বিপরীতাবর্তন, ও অসম্যক সঙ্কোচন (হেলন, সিপি) ; প্রসবের পর ধীরে ধীরে আরোগ্য প্রাপ্তি ; তৎসহ প্রায় সর্বদাই সরলায়ের নিশ্চেষ্টতা বশতঃ মল-কৃচ্ছ

সম্বন্ধ ।—এক্ট, এগার, ক্যাট, হেলন, মিউরেল, গাট-ফস, প্লাট, সিপি, স্পিজি, ও টারার সহিত সমগুণ সম্বন্ধ

লোবেলিয়া ইন্ফেটা ।

(Lobelia Inflata.)

পাতলা চুল, নীলবর্ণ চক্ষু, স্বন্দর মুখকৃতি, ও সুদৃঢ় প্রাবল্যবিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বিগের পক্ষে এই ঔষধের সম্ভোজ্য উপযোগিতা

আমাসয়িক বিশৃঙ্খলা, অত্যন্ত বিবমিষা ও বমন ; গর্ভ-কালে প্রাতঃকালীন বিবমিষা ; আক্কেপিক শ্বাস (য্যাঁজমা), শ্বাস-রোধের আশঙ্কা-জনক শ্বাস-কৃচ্ছ্র সংযুক্ত হৃৎস্পন্দ কাস ।

শিরঃপীড়া — বিবমিষা, বমন ও অতিশয় শ্বাসরতা সহ আমাসয়িক শিরঃপীড়া ; মওতার পরবর্তী শিরঃপীড়া ; অপরাহ্ন হইতে দুই পের রাত্রি পর্যন্ত উহার বৃদ্ধি ; প্রভূত ঘর্ম্ম সহকারে সহসা পাণ্ডুবর্ণ প্রাপ্তি (ট্যাব) ; তামাক বা তামাকের ধূমে বৃদ্ধি পাশ্চ

বমন — শীতল ঘর্ম্ম-স্নাত বদন সহকারে বমন ; প্রভূত লালাত্মক সহকারে গর্ভাবস্থান বমন (জ্যাঁজমা যদি রক্তিতে, মৎক), উত্তম ক্ষুধা, বিবমিষা, প্রভূত ঘর্ম্ম ও স্তম্পর্ক অবসন্নতা সংযুক্ত

পুণাতন বমন ।

চা বা তামাকের অতি-ব্যবহার বশতঃ প্রাপ্তি, দুর্বলতা ও উদরোর্ধ্বদেশে এক প্রকার অবজ্ঞা ভাব ।

মূত্র ।—গাঢ় কমলা-বর্ণের মূত্র ; আধক পরিমাণ তরল অধঃপতিত পদার্থ

শ্বাস-কৃচ্ছ্র ।—বক্ষঃস্থলের মধ্যভাগের আকুঞ্জন অনিত শ্বাস-কৃচ্ছ্র, প্রতিবার প্রসব-বেদনার উপস্থিতিতে উহার আধিক্য, বোধ হয় যেন এতদ্বারা প্রসব বেদন বিনষ্ট হয় শীতলতা লক্ষ্য হইলে অথবা অত্যন্তমান শ্বাসে, সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলে বা নীচে নামিলে উহার বৃদ্ধি প্রাপ্তি (ইপি) ।

যেন দেহ-শাখা হইতে বক্ষঃস্থলে রক্ত আসিয়া উহা পূর্ণ হইতেছে বক্ষঃস্থলে একরূপ রক্ত-সঞ্চয়, চাপ অথবা ভার অনুভব, দ্রুতবেগে হাঁটিলে উহার বৃদ্ধি ।

কৃৎপিণ্ড যেন গতিশূন্য হইবে একরূপ অনুভব, উহার ভূমিদেশে গভীর-মূল বেদনা (শিথরদেশে, লিলি) ।

ত্রিকাঙ্কি --- মেঘনগুপ্তের নিম্নভাগস্থ ত্রিকোণস্থিতে অত্যন্ত অনুভূতি; অত্যন্ত স্পর্শ, এমন কি নরম বালিশের স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারা যায় না ; কাপড়ের স্পর্শ পর্য্যন্ত না লাগিতে পারে এমন সম্মুখদিকে অবনত হইয়া উপবেশন

পাতলা চুল, নীল বা ধূসর বর্ণ চক্ষু, আরক্ত বদন, স্থলকায় ব্যক্তিদিগের মদিরাপায়িতার মন্দফলে লোবেলিয়ার যেকোন সঞ্চর্ষ এতদ্বিপন্নীত আকৃতির ব্যক্তিদিগের পক্ষে নকাজমিকার মেহরূপ সঞ্চর্ষ ।

উপচয় । --- শীতল অলে গা ধুইলে বা স্নান করিলে শ্বাস-কৃচ্ছ, এবং বেদনার বৃদ্ধি বা প্রত্যাবৃদ্ধি অগ্নে (এণ্ট-ক্লড) ; একটুখানি নড়িলে চড়িলে ; ও স্পর্শে বৃদ্ধি প্রাপ্তি ।

উপশম । --- পানাত্তে , ও সায়াহ্নে শ্বাস ; ক্ষতবেগে হাঁটিলে বৃক্কের বেদনার উপশম ।

সম্বন্ধ । --- এণ্ট-টাইট, আস, ইপি, ট্যাবে, ভিরের সহিত সম্বন্ধেণ সঞ্চর্ষ ।

ল্যাক ক্যানাইনঃম ।

(Lao Caninum)

স্নায়বীয়, অস্থির ও অত্যন্ত অনুভূতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী ।

লক্ষণের স্থান-পরিবর্তনশীলতা, বেদনার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে, সন্তত সঞ্চরণ (কালী-বাই, পলস), কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিবস পরে পরে এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে গতি ।

অতিশয় বিস্মৃতি, অন্তঃমনস্কতা ; জব্যাদি কিনিয়া তাহা ফেলিয়া চলিয়া যাওয়া (এগনঃস, এসাক, কষ্ট, হাট) ।

লিখিতে অতিরিক্ত অধিক কথা ব্যবহার করা অথবা প্রকৃত কথাগুলি

ব্যবহার না করা ; শব্দের শেষ অক্ষর বা অক্ষরগুলি ফেলিয়া যাওয়া , পাঠ বা অধ্যয়ন করিতে মনোনিবেশ করিতে না পারা অতিশয় শব্দ মিতা (বোভ, গ্রীষ্ম, জ্যাক, চাট-কা, মিপি)

নৈরাশ্য ; রোগিণী যেন করে যে তাহার রোগ আত্যাগ্য প্রাপ্ত হইবে না তাহার কোন আশ্রয়-স্বপ্ন জীবিত নাই , উহার বঁ চায়া থা কখন কোন প্রয়োজন নাই ; যে কোন গুরুত্রে সে অতঃপ্ত করিতে পারে (এজি, এর কাক্স লাক)

কোপনতা, খিটখিটে স্বভাব ; শিশু সকল সময়েই, বিশেষতঃ রাত্রিতে ক্রন্দন ও চিৎকার করে (জালা, নয়া, গোরি) ।

একাকী থাকিতে ভয় (কালী-কা) ; মৃত্যু-ভয় (জাস) ; উন্মাদ হইবার আশঙ্কা (লিলি) , নীচের তলায় পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা (বোরা) ।

পুরাতন “নীলবর্ণ” অবস্থা (“ব্লু” কন্ডিশন) ; প্রত্যেক বস্তু এত কৃষ্ণবর্ণ দেখায় যে উহা হইতে আর অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ হইতে পারে না (লাই, পলস) ।

যৎসামান্য উত্তেজনায় ক্রোধের, অভিশাপের ও শপথের আবেশ (লিলি, নাই-এসি) ; দারুণ কুৎসিততা , ঘৃণাপূর্ণতা

গাঢ় ওজ্র শ্লেষ্মা নিঃসরণ সহকারে মস্তাক্ষর প্রতিশ্রায

এক নাস-রোধের অবরুদ্ধতা অথবা নাস-রোধের বিমুক্ততা ও শ্রাব-নিঃসরণ ; এই অবস্থার পর্যায়শীলতা ; শ্রাবের বিদাহিতা, নাসিকা ও ওষ্ঠের অবদারণ (এরম, সেপা) ।

ডি° থিরিয়া ও টম্বলাইটিস ; এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে লক্ষণের পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন ।

ধাতু সহকারে গলাব্যথা ও কাসের আরম্ভ ও শেষ ; গলায় শ্বেত বা পীতবর্ণ তালীর (patches) মত স্থান ; বেদনার কর্ণপর্যন্ত ঝঞ্চরণ ।

গল-মধ্যা।—বহির্দিকে স্পর্শ-দ্রব্য (জ্যাক) ; খালি ঢোল গিলিলে উহার বৃদ্ধি (ইগে) , অবিরত গলাধঃকরণের প্রবৃত্তি, উহাতে ব্যথিততা, শ্রায় অসাধ্যতা (মার্ক) ; বেদনার কর্ণ পর্যন্ত প্রসারণ (হিপ, কালী-বাই) ; বাম পার্শ্বে আরম্ভ (জ্যাক) ।

ডিপোজিটর মধ্যত পদার্থের (deposit), উপদংশের ও ক্ষতের উদ্ভূত, চিকণ আকৃতি ।

আত ক্ষুধা, কিছুতেই ক্ষুধার পরিভূক্তি জন্ম ন ; আহারের পূর্বেও যেমন ক্ষুধা পরেও তদ্রূপ ক্ষুধা (ক্র্যাক, ক্র্যাক, সিনা লাই, ট্রেন) ।

উদরোর্বদেশে নিমগ্নত ; আশাশয়ে দুর্বলতা ।

২ তু — নিয়মিত সময়েই অনেক পূর্বে ; অতি প্রভূত পরিমাণে ; প্রবল প্রবাহে, উদ্ভূত লোঁ হত, আঠা আঠা, রজ্জুবৎ রজ-নিঃসরণ (মলিন, কাল, রজ্জুবৎ রজঃ, ক্রোঁক) স্তনদ্বয়ের ক্ষীণতা, ব্যথিতত, এবং ধতুর পূর্বে ও তৎকালে অতিশয় অনুভূতি (কোঁনা)

অপত্য-পথ (vagaria) হইতে বায়ু নিঃসরণ (ব্রোম, লাই, নক্স-ম, স্ত্রাক) ।

স্তন — স্তনের প্রদাহ ও বেদনা, অত্যন্ত সংঘর্ষে ও সন্ধ্যার প্রাকালে উহার বৃদ্ধি ; সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে বা ন মিতে স্তনদ্বয় দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিতে হয় (ব্রাই) ।

স্তন-দুগ্ধ শুকাইয়া ফেটিবার অন্ত প্রায় সকল রোগিনীই পক্ষেই এই ঔষধ উপকারী (এসাফ — স্তন দুগ্ধের পুনরুৎপত্তি বা বিবন্ধনার্থে, ল্যাক ভি) ।

শয়নে শ্বাস রোধ হইবে রোগিনীর এক্রপ অনুভব ; সেজন্য তাহাকে উঠিয়া হাঁটিতে হয় (এম-কা, গ্রিগু, ল্যাক)

কোন অপরিষ্কার কারণে শুভদান-কালে দুগ্ধের বিলোপ (এসাফ)

বাম পার্শ্বে শয়নে ক্ষতকম্পের প্রাবল্য, দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিলে লাঘব (ট্যাব) ।

স্পর্শে, উপবেশন কালে প্রচাপনে. অথবা হাঁটিবার সময় ঘর্ষণ লাগিয়া সহজে অননৈজিয়ের উত্তেজনা (সিনে, কফ, মিউর, প্লাট) ।

হাঁটিবার সময় বোধ হয় যেন শূন্যে হাঁটা যাইতেছে ; শয়ন সময়ে বোধ হয় যেন শয্যা স্পর্শ করা যাইতেছে না (এসার)

পৃষ্ঠ-বেদনা — নিদারুণ, অসহ্য ত্রিকাস্থি-প্রদেশের উর্দ্ধভাগে অবস্থিত, দক্ষিণ নিতম্ব হইতে দক্ষিণ বক্ষগ-প্রায় পর্য্যন্ত প্রসারিত ; বিশ্রামে ও বিশ্রামান্তে প্রথম সঞ্চালনে বিবর্জিত ; পৃষ্ঠ বেদনা (ব্রঃস) , মস্তিষ্কের ভূমিদেশ হইতে কোকিলচকু-অস্থি পর্য্যন্ত পৃষ্ঠবংশের অবিরাম বেদনা, স্পর্শে বা প্রচাপনে উহাতে অতিশয় অনুভূতি (চিন-সল, কস, জিঙ্ক) ।

সম্বন্ধ ।—(১) গঠন, কোনা, মিউরেয়া ল্যাক, কালী বাহ, পলস, গিলি, মলফের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ (২) সাধারণতঃ এক অঙ্গের ১২ ভাগের সর্বোৎকৃষ্ট ক্রিয়া দর্শে (৩) ল্যাক ক্যানের গা ওদণ্ডগুলির সূক্ষ্ম ওষধ সম্ভবতঃ তৈয়জ্য-ভয়ে আর নাই (৪) বহুদিন সময়ের রেইটিং, বেয়ার্ড, সোয়ান প্রভৃতি আমেরিক চিকিৎসকগণ ভিগাথারিয়ায় ইহার উপকারিতা সপ্রমাণ করিয়াছেন

ল্যাক ডি ফোরটেম ।

(*Lao de floratum*)

ডনকিন মণিত দ্বন্দ্ব দ্বারা ডায়াবিটিস (বহুমূত্র) ও ডাইটিস্ ডিম্বিষ্ রোগের চিকিৎসা করিয়া কৃতকাব্য হইয়াছিলেন । এই অঙ্গের প্রাপ্ত হইয়া ডাঃ সোয়ান উহা হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রে পরিণত করিয়াছিলেন এবং হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে উহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন । এখানে যে সকল লক্ষণের উল্লেখ করা গেল ইহার সকলগুলিই রে গার আরোগ্যে সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে

স্নায়ু-কেন্দ্রের প্রতিশ্রুতি পীড় (reflex affections) সহকারে প রপোষণের দোষ ও ক্রটি বিশিষ্ট রোগ

নৈরাশ্র ; বাঁচিয়া থাকিতে যত্নশূন্যতা, মৃত্যুর ভয় নাই কিন্তু মরিতে যাইতেছে বলিয়া নিশ্চিত ধারণা

আমেরিকার সবমন শিরঃপীড়া ।—প্রাতে উঠিবার পর কপালে শিরঃপীড়ার আরম্ভ, মস্তকের পশ্চাঙ্গাগ পর্যন্ত প্রসারণ (ব্রাই) ; দাঁতের দপদপ, বিবমিষা, বমন, অস্বস্তি ও দুর্দমা কোষ্ঠ-রোধ (ইপিডিমিয়া, আইরিগ, স্ট্রাঙ্গ) ; গোলমাল, আলোক ও সঞ্চালনে (ম্যাগ-মি সিলি) ; এবং স্বাভূ-কালে (ক্রিয়োজ, গিলি) বৃদ্ধি, অতিশয় অবসন্নতা ; প্রচাপনে, ও কষিয়া মাথা বাঁধিলে (আর্জ-না, পলস) হাস ; বর্ণশূন্য প্রভূত মূত্র

শ্লেষ্মা-বিকটম (১২ ম বায়ু-গে-গ) : আশাশয় হইতে গলায় যেন একটা বড় গোলা উঠিতেছে এবং অশ্লুভব, এবং উহাতে শাস-বোধের উৎপত্তি (কফ, ক-ময়)

বমন : নিরন্তর বমন, আহা-বোধের স্ফূর্তি উঠান কোন সম্ভব নাই, প্রথমে অপরিপাচিত, অতঃপর ভক্ত দ্রব্য, অনন্তর তিষ্ঠ জল বমন, গর্ভাবস্থার বমন (ল, ক-এসি সোফি)

কোষ্ঠবদ্ধতা : নিম্নলিখিত মল-বেগ (এনাক, নক), শুষ্ক ও শুষ্ক বিষ্ঠা (ব্রাই, মল), বৃহৎ, শক্ত মল, অতিশয় কুস্মন, উহাতে মলদ্বারেব বিদারণ ; এন্দনজনক যাতনা । (একজন জীলোকেব কোষ্ঠবদ্ধ রোগ ছিৎ, ও ত্যহ দলবার ১৮-কাণী লহতে হইত, চারি পাচ মাস্তাহ পর্যন্ত একেবারেই মল-ত্যাগ হইত না, পনের বৎসর যাবৎ এই রোগ ছিৎ, অবশেষে ওহে ঔষধে আরোগ্য আনিয়াছিল) ।

ঋতু—বিলাষিত ঋতু, শীতল জলে হাত রাখাতে ঋতু-বিচোপ (কোনা), ঋতু-কালে এক গ্রাস দুগ্ধ পান করিলে তৎক্ষণাৎ পরবর্তী ঋতু-কাল পর্যন্ত রজঃস্রাবের বিপ্লুপ্তি (যস তুৎনা করন)

অতিশয় আশ্রয়ত, নিদ্রাহীনত বশতঃ দাঘকাল-বাণী অত্যন্ত যাতনা (কফ, নাই-এস) ।

কিছু করা হউক বা না হউক সম্পূর্ণ অবসন্নতা অশ্লুভব, হাটিবার সময় অতিশয় ক্লান্ত

অশ্লুভূতি : আবৃত থাকিলেও যেন শীতল বায়ু-গায় লাগিতেছে ; চাদর যেন আজ, রোগিলীর এককাল অশ্লুভব ।

শোথ । - যাক্ষিক হ্রস্বোগ ; পুরাতন যক্ষ্মোগ ; ও অনেক দূর বিবাক্তিৎ এল্‌বু'মস্ক'র হইতে উৎপন্ন ; এবং স'বস'ম অরের পরবর্তী, স্বেদ-হ্রোণ্য বা মেদ-রোগ ; মেদের অপকৃষ্টতা প্রাপ্ত ।

ল্যাকেমিস ।

(Laechosis)

চিত্ত-প্রাধান বিমর্ষ প্রকৃতি, মচিনবর্ণ চক্ষু এবং অশুভ্রতা ও অলমতার
এ বর্ণভাবিষিষ্ট ব্যক্তি

ভিলক্স জন্ম-কাল ও আকৃত্য চুলা বিশিষ্টা চিত্ত-প্রাধান-ধাতুর নানী (ফস)
সুদৃশ্য অপেক্ষা ক্ষীণ ও শীর্ণকায় ব্যক্তি ; এবং রোগবশতঃ মানসিক ও
শারীরিক পরিবর্তন-প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের ক্ষে, এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী

নিবৃত্তরজস্কাদিগের পীড়া (climacteric ailments) ; অর্শ,
রক্তপ্রাব, উত্তাপাবেশ (hot flushes), উত্তপ্ত ঘর্ম ; মুর্চ্চাদেশে
আলাকব শিরোবেদনা ; বিশেষতঃ রক্ত-নিবৃত্তিকালে অথবা তৎপরে (জ্ঞান,
মলফ) উহার বিজ্ঞমানতা

শীর্ণকাল স্থায়ী শোক ; ক্রোধ, ভয় বিরক্তি, প্রেম-বিচ্ছেদ বা নিবান প্রেম
জনিত পীড়া (অঃম, ইঃম, মঃম-এমি)

রক্তোনিবৃত্তির উপক্রম হইতে যে সকল নারীর বিমুক্তি লাভ হয় নাই, যাহারা
সেই অবধি কখনও স্বাস্থ্য-সুখ ভোগ করে নাই তাহাদের পক্ষে ল্যাক উপযোগী ।

শিরঃপীড়া — অস্থানে (temple) প্রচাপন বা বিদারণবৎ বেদনা,
নড়িলে চড়িলে চাপ দিলে, মাণ নোয়াইলে, মঃম ও নিজার পরে উহার বৃদ্ধি ;
রোগিণীর নিজা যাইতে ভয় হয় কেননা তাহার এই প্রকার মাথাধরা সহকারে
অগরিত হইতে হয়

মদিরাপানের পরে ; বিজ-বিকারে, বিমুগ্ধ বা অনিয়মিত খাদ্য বশতঃ ;
রক্তোনিবৃত্তি কালে ; মস্তকে রক্তের প্রাধান

বামপার্শ্বিক গন্যাস মুর্চ্চাদেশে ভার ও চাপ (সিলি) ; মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে
মীমের তায় চাপ ও ভার (পেট্রো)

মস্তপাগ্নদিগের শিরঃপীড়া বা অর্শ ; বিসর্প বা সন্ন্যাসদোগের প্রবণতা ।
প্রধানতঃ বামপার্শ্বের আক্রান্তি ; ডিম্বাশয়, অণ্ডকোষ, বক্ষঃস্থল,
মুখমণ্ডল ও গল-মধ্যাদির বামপার্শ্বের রোগের আরম্ভ ও দক্ষিণপার্শ্বের
গতি ।

গলা, আমাশয়, ও উদরে স্পর্শে অতিশয় অনুভূতি ; গা বা কটির চারিদিকে দৃঢ় বস্ত্রাদি দৃঢ় হয় না ; গলা বা উদরে প্রাকৃতিক স্নেহ বা গাজ-বস্ত্রের স্পর্শ দৃঢ় করিতে পারে না, উভাতে এক-প্রকার অস্বচ্ছন্দত জন্মে, কিন্তু এপিমা বা বেঠেডোনার স্নায়ু স্পর্শ-বেধ জন্মে না অর্থাৎ ছন্দন করে না।

উত্তাপ ও শীতের অতিশয়ো অতিশয় দুঃখজনক।

সমস্ত লক্ষণ, বিশেষতঃ মানসিক লক্ষণ নিদ্রার পরে বৃদ্ধি পায়, অথবা বৃদ্ধি পাইয়া রোগীকে নিদ্রা হইতে জাগায় ; বৃদ্ধি না পাওয়া পর্যন্ত রোগী নিদ্রা যায় ; অস্থখ্য, ব্যাকুলিত, ও বিমর্ষ ভাব, প্রাতে জাগরণান্তে উহার বৃদ্ধি।

মানসিক উদ্দীপনা, চিত্তের অস্বাভাবিক অবস্থা, প্রায় ভবিষ্যৎবাণীর দ্বারা অনুভব, উদ্দীপ্ত কল্পনা ; অতিশয় বহুভাষিতা (এগার, ট্রান্স) ; সকল সময় কেবল কথা বলিতেই ইচ্ছা ; একভাব ছাড়িয়া দিয় নীল নীল অল্প ভাবের কথা বলা ; এক একটী কথায় এক একটী গল্পের সূচনা করা।

কোষ্ঠ-বদ্ধতা ;—নিশ্চেষ্টতা, মরণান্তে মনের অবস্থিতি, অথচ বেগশূন্যতা ; মলদ্বারের আবরণ-পেশীর আকুঞ্চন অনুভব (কষ্ট, নাই-এসি)।

নিয়মিত সময়ে খুঁ, অতিরিক্ত, অল্পকাল স্থায়ী, স্বপ্ন, কণ্ঠ রক্তঃ, রক্ত-স্রাবে সকল বেদনার শান্তি ; ঋতু-কালে সর্বদাই ভাল থাকা (জিগ)।

অর্শ ;—স্বপ্ন রক্তঃ সহকারে ; রক্তোনিবৃত্তি কালে, আকুঞ্চন বশতঃ রক্ত-সঞ্চলন অবরুদ্ধ ; ও উর্দ্ধদিকে স্থচী-বেধবৎ ব্যতনা সংযুক্ত অর্শ (নাই-এসি)।

মূথ বা নাকের নিকটে কোন ক্ষুদ্রতম বস্তু উপস্থিত হইলেও শ্বাসের ও ভিষক-কতা ; ও একটু দূরে পাত্রে রাখিয়া আস্তে আস্তে বাতাস দিতে বলা (তাড়াতাড়ি বাতাস দিতে বলা, কারো-ভেজি)।

নিদ্রিত হইয়া ২ ডিগ্রিমাাত্র শ্বাসের শূন্যতা (এম-কা, ল্যাক ক্যা, জিডি, ওপি)।

অতিশয় সারিরিক ও মানসিক শাসনাতা মধ্যবর্তী বসন, এবং তা বসনঃ
অবিরত অবসন্নতা, প্রাণঃ মলে উহার অস্থিমা (মনফ, টউব)

অপস্মার (epilepsy), নিদ্রা বহুয় নোগের শঙ্ক (ডিউফে),
শারীরিক তরল পদার্থের অক্ষয়, ক্রমশঃ মৈথুন, ও প্রেম মনিকতাক্রান্তি
অপস্মার; স্বত্বকালে অস্থিত অপস্মার (ডিউ)

বক্তৃতা প্রদান মনোবৃত্তি প্রদান, দ্বন্দ্ব মূল্য অধিকতর হইতে সহজে ও
অধিক পরিমাণে রক্তপাত (ক্রোট, প্রিয়োম, ফস), মণ্ডিন অসংযত রক্ত
(ক্রোট, সিকে), টাইফয়েড ও হুগারসো এবং বক্তৃতা, অতিশয় অবসন্নতা
(প্রিয়োম)

ফোটক, কাঁকড়া, অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট ক্ষত (টার), দূষিত ব্রণ,
শয্যা ক্ষত; উহার মলিন, জীবাণু নীল, বেগুনি আকৃতি; উৎকটতা
জগিবার সম্ভাবনা

বিষাক্ত অভিধাতের, ও শব্দেদের মন্দ ফল (পাইরো)

মুদ্রাশয়ে যেন একটা গোলক (ball) গড়াইতেছে এরূপ অনুভব
পূর্ববর্তী শরৎকালে কুইনাইন সেবনে অবরুদ্ধ জরের প্রতিবৎসর বসন্তকালে
প্রত্যাবৃতি (কাঁকো-ভেজি, মলফ)

অগ্নি, মূহপ্রলাপ, নিমগ্ন মুখাকৃতি, নিম্ন-হৃদয় পতন, জিহবার শুষ্কতা, কক্ষবর্ণ,
ও কম্পান; কষ্টে জিহ্বা বাহির করা যায় অথবা বাহির করিবার সময়
আটকয়া যায়, চক্ষুর গুরুমণ্ডলের পীত বা কমলালেবুর বর্ণ; ঘন শীতল,
বঙ্গে পীতবর্ণ চিহ্নকর ও রক্তাক্ত (চার), এই সকল লক্ষণঃ টাইফয়েড ও
টাইফয়েড জ্বর।

বামপার্শ্বে আবদ্ধ ও দক্ষিণপার্শ্বে প্রসারিত ডিপিরিয়া ও টিগি-
লাইটিস (ল্যাক-ক্যান, সাবাড); মাগন বেগুন আকৃতি (নাঙ্গা), উত্তপ্ত
পানীয় দ্রব্য পানে, ও নিদ্রান্তে বৃদ্ধি; গালবার সময় অতরল
অচেহা তরল দ্রব্য গিলিতে অধিকতর যাতনা (বেল, আই, ইয়ে);
গলার আকৃতি দোষিয়া যেকোন বোম হয় তদপেক্ষা অধিকতর
অবসাদ।

উপচয়।—নিদ্রান্তে; অন্ন, মাদর, গিধোনা ও পারদ সেবন জন্ত;

স্পর্শ, গ্রীতে ও শ্বাসকালে, শীতোত্তাপের অত্যধিকতা; সূর্যের তাপ;
বসন্তকাল; ও গ্রীষ্মকালে; বৃষ্টি

উপশম্য।—উষ্ণতায় হ্রাস

১ স্বপ্ন। (১) হিণ, ৮ ই, ৮ ই গ্রামের সহিত অল্পপূরক সঞ্চয় (২)
গ্রামটো মিসি ও কাঁক-গ্রামের সহিত বিষম-গুণ ময়ঃ (৩) সবিরাম অরে
জ্যাকেসিস ব্যবহারে রোগের প্রকার পরিবর্তিত হইলে জ্যাকেসিস পনে ল্যাট মিউ
ভাগ খাটে

ফ্যানঃম।

(Stannum)

মন ও শরীরের অত্যন্ত অবসন্নতা। আমাশয়ে নিমগ্নতা ও শূন্যতা অনুভব
(চেচ্চি, ফস, মিসি)।

সর্বদা ক্রন্দনের দ্বারা বিষমতা ও নিরাশতা অনুভব,
কিন্তু ক্রন্দন করিলে উহার আভিগম্য (গ্রাট, পলস, মিসি) ; শ্রান্তি ও দুর্বলতা,
বিশেষতঃ নীচের তলার নামিতে, কিন্তু উপরের তলার বেশ উত্তীর্ণে পারা
যায় (বোরা। - ক্যাকের বিপরীত)।

শিরঃপীড়া কিংবা স্নায়ু-শূল (neuralgia) ; যুদ্ধভাবে বেদনার আরম্ভ এবং
ক্রমে ক্রমে চরম সীমা (highest point) পর্যন্ত বৃদ্ধি ; অনন্তর ক্রমে
ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্তি (প্লাট)

উদর-বেদনা ; শক্ত চাপ দিলে, অথবা উদর আনুষঙ্গ্যের আড়াআড়ি রাখিলে
উহার উপশম (কলো) ; দীর্ঘকালি ; ক্রম-নিঃসরণ।

নির্ধারিত সময়ের অনেক পূর্বে, অতিরিক্ত প্রভূত রক্তঃস্রাব ; ঋতুর পূর্বে
বিষমতা ঋতু-কালে হ্রাস অস্থিতে বেদনা।

প্রদর , অতিশয় দুর্বলতা ; বক্ষঃস্থল হইতে যেন দুর্বলতা উপর হইতেছে
একপ অনুভব [উদর ও বস্তি-গহ্বর (pelvis) হইতে ফস, মিসি]।

শ্বাস-প্রশ্বাস, মল-ত্যাগ-কালে উহার আধিক্য (অতিশয় সহকারে আতিশয়া, পড়) ; এত দুর্বলতা, যে বসিবার পরিবর্তে রোগিণী আসনে (chair) পতিত হয় ।

প্রাতঃকালে কাপড় পরিবার সময় কয়েকবার বায় বিস্তার করিয়া লইতে হয় ।

প্রাতঃকালে ; ও খাদ্যদ্রব্য পাকের গন্ধ হইতে বিরামিয়া ও বমনের উৎপত্তি (আস, কলচি) ।

গান করিবার বা স্বর চালনা করিবার সময় ক্ষতের একোণাকার পেশীতে (deltoid) ও বাহুদ্বয়ের বেদনা ও দুর্বলতা

বক্ষঃস্থলে অতিশয় দুর্বলতা ; কথা বলিলে, হাসিলে, উচ্চ-স্বরে পড়িলে, ও গান করিলে উহার ব্যক্তি ; এত দুর্বলতা যে কথা বলিতে পারা যায় না ।

গভীর, ফাঁপ, বিখণ্ডিত, শ্বাস-রোধকর, কাস ; কন্পকর ; এক এক আবেশে তিনবার উপস্থিত, কাস (দুইবার উপস্থিত, মার্ক) ; সন্ধ্যাকালে শ্বাস-থাকা কালীন শুষ্ককাস ; বক্ষঃস্থলে শূন্যতানুভব ।

অণ্ডের খেতাংশসদৃশ, প্রভূত নিষ্ঠীবন ; উহার ঈষৎ মিষ্ট ও লবণা-স্বাদ (কালী-আই, সিপি) ; অন্ন পচা, ভাপসা • পীত-মিশ্রিত হরিৎবর্ণ পু। (ভারী, সবুজ, লোণা পুয়, কালী-আই) , দিবাভাগে নিঃসরণ ।

স্বরভঙ্গ ; গভীর, ককর্ষণ, শূন্য-গর্ভ স্বর ; কাসিলে অথবা স্লেমা তুলিয়া ফেলিলে উহার সাময়িক উপশম ।

ভাপসা-গন্ধ ; প্রত্যহ রাত্রি চারিটার পরে ঘাড়ে ও কপালে ; অতিশয় দৌর্বল্যকর স্বপ্ন

উপচয় ।—হাস্তে, গানে, আলাপনে, স্বর-চালনে ; দক্ষিণপার্শ্বে শরনে ; ও উষ্ণ দ্রব্য পানে (শীতল দ্রব্য পানে, স্পঞ্জ) বৃদ্ধি ।

উপশম ।—কাসিলে অথবা নিষ্ঠীবন তুলিলে স্বরভঙ্গের উপশম ; শক্ত চাপ প্রদানে হাস (কলো)

সম্বন্ধ ।—(১) গলগোটটার সহিত অল্পপূরক সম্বন্ধ

(২) কলিকমের পরে, এবং ক্যাচ, ফস, মিলি, মল, টিউবের পূর্বে ঠানম ভাণ খাটে ।

স্ট্যাফিসেগ্রিয়া ।

(Staphisagria)

কৃত্রিম মৈথুন ও অতি মৈথুন জনিত মানসিক লক্ষণ ।

অত্যন্ত মানসিক সংস্কারে (mental impression) অতিশয় অশুভুতি ;
যৎসামান্য কার্য্যে কিংবা দোষশূন্য কথায় বিরক্তি ।

অচোর বা নিজের কৃতকার্য্যে রুষ্টতা ; উহার ফলাফল ভাবিয়া শোক
প্রকাশ

ইঞ্জিয়-সেবার অপব্যবহার বশতঃ চিত্তের উদ্বিগ্নতা, বৈরাগ্য, নিরুৎসাহ ও
শ্রুতি দৌর্ব্বল্য (এনাকা, অর, স্টাট, ফস-এসি) ।

অহংকার, হিংসা বা বিরক্তি জনিত অশুভ

মন্দ প্রকৃতির বালক-বালিকাদিগের কোন প্রকারে অশুভ জন্মন, এবং উহা
প্রাপ্ত হইলে অসম্ভব চিত্তে প্রত্যাখ্যান বা মূরে নিষ্ফেপ করা (ক্রিয়োজ) ।

অপমানিত হইয়া ক্রোধ সম্বরণ করিয়া রাখা এবং অশুভ হইয়া কম্পিত ও
অবসন্ন শরীরে গৃহে ফিরিয়া যাওয়া (নবোর বিপরীত)

কপালে একটা গোলাকার বস্তুনের স্থায় অশুভব, মাথা বাঁকিলেও সেই
স্থানে দৃঢ়রূপে উহার অবস্থিতি তীব্রধার অজ্ঞানত উপঘাত, শস্ত্রোপ-
চারের পরবর্ত্তী উপঘাত ; ছুরিকা দ্বারা কর্ণের স্থায় বেধনবৎ বেদনা ।

কৃত্রিম মৈথুন ; অতি-মৈথুন, শুক্রক্ষয় ; বিরক্তি ; হঃথ, অশুচিত অপমান ;
বিরক্তি বা সংযত অসম্ভব সংযুক্ত রুষ্টতা জনিত মন্দফল (অরম) ।

স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা অধিক কঠিন পরিশ্রমের পরবর্ত্তী অবসন্নতার স্থায়
অবসন্নতা ।

অগ্নিপুটে বা উপরের অগ্নিপুটে একটির পর আর একটি অঞ্জনী, এবং তৎপরে শক্ত শক্ত স্থানের অবশেষ (কোনা, থুঙ্গা)

দস্ত-বেদনা - হাতুকালে দস্ত-গোনা, হুহ ও গগ হাত উভয় একর দস্তেই বেদনা; খাঁচা দেব্য ও পেয় দেব্যের স্পর্শে ব্যাধিততা, বিস্ত দস্তন বা চর্ষণে বেদনাশূন্যতা; মুখ-এবার শীতল বায়ু আকর্ষণ করিলে (এন্ট-জুড, মার্ক); এবং শীতল পানীয় জবা গানে ও আচরণান্তে উহার যুক্তি

দাঁত কাল, উহাদেব ভিতর দিয়া কাল কাল রেখা দৃষ্ট হয়; পরিষ্কৃত কাথিতে পারা যায় না; খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, প্রান্তদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (মূলদেশের ক্ষয়প্রাপ্তি, মেজ, থুঙ্গা), শীতাদ (scurvy) জনিত শরীরবিকার।

আমায় ভুক্তদ্রব্যে পূর্ণ থাকিলেও অত্যন্ত ক্ষুধা।

আমায় ও উদর যেন শিথিলিত হইয়া নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে একপ্রকার অসুস্থব (এগার, ইপি, টায়ে)

তামাক সেবনে স্পৃহা।

শক্তক্রিয়া দ্বারা মূত্রাশয় হইতে প্রস্রাব বাহির করা ব ডিম্বাশয়চ্ছেদের পরে; ও উদরচ্ছেদের পরে (বিস, হিপ) উদর-বেদনা।

বিবাহিতা যুবতীদিগের; সঙ্গমাস্ত্রে; ও কষ্টসাধ্য প্রসবের পর (ওপি) মূত্র বেগ, অনেকক্ষণ পর্যন্ত মূত্র-ত্যাগের স্থানে বসিয়া থাকিতে হয়; যখন প্রস্রাব করা যায় না, তখন মূত্র গার্গে জালা; রক্তদিগের মূত্রাশয়ের মুখশীর্ষস্থির উৎসর্গে মূত্র-ত্যাগের পর বেগ ও বেদনা; মূত্রাশয়-অংশ (prolapse of bladder)।

সঙ্গমেন্দ্রিয়ের বেদনা বিশিষ্ট অসুভূতি, বাহ্য স্ত্রী-অঙ্গের একটই অসুভূতি যে উহার উপর বস্ত্রের স্পর্শ সহ্য হয়না (পাট)।

কৃত্রিম মৈথুন; অবিরত রমণ-বিষয়ক বর্ণনা, সঙ্গম রতিস্থলের ভাবনা

শুক-মেহ; নিমগ্ন মুখাকৃতি; অপরাধিত, লজ্জিত দৃষ্টি; শুক্র-পাতাস্ত্রে পৃষ্ঠ-বেদনা ও দুর্বলতা; সঙ্গমেন্দ্রিয়ের অবসন্নতা ও শিথিলতা অথবা শীর্ণতা।

কাম, কেবল দিবাভাগে, অথবা কেবল আহারান্তে কাম, মাংস আহারের পর; এবং নিরস্ত্র ও কষ্টের পর উহার আধিক্য; দাঁত মাঝিলে কামের উদ্দেক

শীতকালে তুপাদৃশ কাম সহকারে পর্যায়ক্রমে গ্রীষ্মকালে মায়েরটিকা; তাগাকের ধূমে কামের উদ্দেক (স্পঞ্জ) ।

পৃষ্ঠ-বেদনা, রাজিতে ম্যায় এবং প্রোতে শয্য হইতে উঠিবার পূর্বে উহার আধিক্য

মদ্রি-স্থানে; বিশেষতঃ হস্তের অঙ্গুলী-মদ্রিতে গাতজনিত চূর্ণময় পদার্থের মদ্রয় (কলোফা, কলসি, লাই) ; শ্বেদ ও পুষ সহকারে অঙ্গুলীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মদ্রির প্রদাহ

সারা দিন নিজাবুতা, সারারাত্রি নিদ্রাহীনতা; সর্ব শরীরে ব্যাথা ।

শুক, মধুস্ব, ফুলকণির মত; ও পারদ অপবাবহারের পর উৎপন্ন; দুগ্ধবৎ আঁচিল বা উপমাংস (নাই-এসি, জাব, থুলা) ।

অরে, অক্রমণের কয়েক দিন পূর্বে অতি মূধা ।

পামা (Eczema) ।—চিপটিকার নিয় হইতে পীতবর্ণ, বিদাহী রস-ক্ষরণ, ঐ রস লাগিয়া মূতন ফোটার উৎপত্তি; কোন একস্থান চুলকাইলে উহার কণ্ডুরনের নিবৃত্তি, কিন্তু অল্প স্থানে উপস্থিতি

উপায় ।—রাজিতে; প্রোতে, শুকাদি তরল বিধানের অপক্ষয় বশতঃ; অস্তি মৈথুন নিবন্ধন; কৃত্রিম মৈথুন অল্প, তাম্রকুট সেবনে; আক্রান্ত স্থানের অল্পমাত্র স্পর্শে; মানসিক পাড়ার, রাগ, বিরাগ, ও শোক-দ্বন্দ্ব; বৃদ্ধি ।

সম্বন্ধ ।—(১) রাগবৎসবের সহিত প্রতিকূল সম্বন্ধ । উহা এই ঔষধের পূর্বে বা পরে ব্যবহৃত হয় না । (২) কষ্ট, কলো, ইগো, লাই ও পলসের সহিত তুলনা হয় । (৩) কলো ও ষ্ট্যাফ একটীর পর আর একটী ভাল কাজ করে (৪) কষ্টের পরে কলো, কলোর পরে ষ্ট্যাফ ভাল ফল দর্শায়

ষ্ট্রামোনিয়াম ।

(Stramonium)

রক্ত-প্রধান যুবক যাতীদিগের রোগে (একন, বেণ,), বিশেষতঃ কোরিয়া রোগে ও বালক-বালিকাদিগের পক্ষে ; এবং উদ্ভাদ, জ্বর, ও প্রলাপে ; ষ্ট্রামোনিয়াম বিশেষ উপযোগী ।

প্রলাপ বাচালতা, সঞ্চদা কথা বলা, গানকরা, পঞ্চ রচনা করা, উদ্ভাসবৎ বক্ বক্ করিয়া বলা । বেলেডোনা ও হাইড্রোসাইয়েমাসের সহিত ষ্ট্রামোনিয়ামের প্রলাপের সাদৃশ্য দেখা যায় বটে, কিন্তু প্রভেদ আছে । ষ্ট্রামোনিয়ামের প্রলাপ অধিকতর প্রচণ্ড, উদ্ভাদ অধিকতর তরুণ, কিন্তু রক্ত-সঞ্চ হাইড্রোসাইয়েমাস অপেক্ষা অধিকতর ও বেলেডোনা অপেক্ষা অনেক অল্পতর, কখনও প্রকৃত প্রাদাহিক অবস্থার সমীপবর্তী নহে ।

বহুভাষিতা ; অবিশ্রান্ত কথা বলিতে প্রবৃত্তি (সিকু, ল্যাক) ; অবিরত ও অসম্পূর্ণ প্রলাপন ও হাস্য করণ ; ঐত্বনিশ্চিন্তি সহ প্রার্থনা করা, বিনয় ও অনুনয় করা ।

সংজ্ঞাসংযুক্ত টঙ্কার (নয় —সংজ্ঞাশূন্য, বেণ, সিকু, হাইড্র, ওপি) ; জ্যোতিঃ, জল, ও দর্পণ দর্শনে উহার পুনরুৎপত্তি (বেণ, লাইস) ।

আলোক প্রাপ্তির ইচ্ছা ও আসঙ্গলিপ্সা (Desire for light and company) ; একাকী থাকা সহ্য করিতে পারা যায় না (বিম) ; অন্ধকারে ও নির্জনে বুদ্ধি প্রাপ্তি ; অন্ধকার গৃহে হাঁটিতে পারা যায় না ।

আকুঞ্চিত মুখাকৃতি সহ নিদ্রা হইতে আগরণ, যেন প্রথম যে বস্তুর প্রতি দৃষ্টি পতিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া ভয় করিয়াছে ।

অবাস্তব বস্তু দর্শন করিয়া রোগীর ভয়প্রাপ্তি ।

প্রলাপাবস্থায় পলায়নের প্রবৃত্তি (বেণ, লাই, ওপি, ক্রঃস)

রোগিণী যেন ছইমন বা দ্বিগুণিত, অথবা অকুপ্রোস্থভাবে (crownwise) শরিত, তাহার ঈদৃশ নানাবিধ কল্পনা (পেট্রো) ।

মস্তক গেন ইত্যন্তঃ গও গও হইয়া বিকীর্ণ হইয়াছে এরূপ অস্বভব (ব্যাপ্তি) ।

প্রসারিত, সমুন্নত, সমুজ্জ্বল চক্ষু ; সুবিস্তৃত প্রসারিত কনীনিকা, উহার চৈতন্যশূন্যতা, অক্ষি ও অক্ষিপুটের আকুঞ্চন শিশুকে ভিরঙ্কর করিতে তাহার কনীনিকার প্রসারণ ।

শীতল হস্ত-পদ সহকারে মুখমণ্ডলের উত্তপ্ততা ও আরক্ততা, গণ্ডঘয়ের সীমাবদ্ধ আরক্ততা, মুখমণ্ডলে রক্তের উথিত ; হাশ্ববৎ আক্ষেপিক মুখবিকৃতি । অধিকাংশ রোগের সহিত বেদনা-পরিশূন্যতা (ওপি) ।

জ্ঞাতিত্ব, জ্ঞানের ভয়, ভরল পদার্থে অত্যন্ত অপ্রবৃত্তি (বেল, লাইসি) ; গলার আক্ষেপিক আকুঞ্চন.

গদগদভাষণ (ভোতলামি) ; একটা কথা উচ্চারণ করিবার পূর্বে অনেকগণ পরিশ্রম করিতে হয় ; কথা বলিতে অতিশয় চেষ্টা আবশ্যক হয় ; মুখমণ্ডলের বিকৃতি জন্মে (বোভ, ইয়ে, স্পিজি)

বালিশ হইতে মার্খা তুলিলেই বমন জন্মে ; উজ্জ্বল আলোক দেখিলেও বমন হয় ।

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পেশীর অথবা পেশীপুঞ্জের, বিশেষতঃ শরীরের উর্দ্ধাংশের পেশীর ক্রম্পন্দন । কোরিয়া ।

অধিকাংশ রোগের সহিত বেদনার অবিচ্ছিন্নতা ; বেদনাহীনতা, বিশেষ লক্ষণ (ওপি) ।

নিজাদুতা, অথচ নিজা হয় না (বেল, ক্যাম, ওপি)

উপাচয় ।—অন্ধকারে ; একাকী থাকিলে ; উজ্জ্বল বা চিকন (shining) দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে ; স্পর্শে ; নিজাভে (এপিস, ল্যাক, ওপি, স্পঞ্জ) ; ও নিগীরণে ; বৃদ্ধি

উপশম ।—লোক সংসর্গে ; উজ্জ্বল আলোকে ; ও উষ্ণতায় ; হাস ।

সম্বন্ধ —(১) বেল, কুণ, হাইও ও লাইসিনের পরে প্রায়ই ট্রামোনিয়ম উপযোগী হয় (২) ফুলের অবরোধ বলতঃ অরায়ুর রক্তপ্রাবে ট্রামোনিয়ম-

স্থচক প্রাপ-লক্ষণের বিজ্ঞমানতায় হইলো বিষয় হইবে সিকেলি শীতল ক্রিয়া করে (জর ও পচন-প্রাবণতায়, পাইরো) (৩) উপ-লক্ষ-কালে পুনঃ পুনঃ বেলে-ডোনা প্রয়োগ করাতে অতি ক্রিয়া জন্মিলে হইলে ব্যবহৃত হয়

সলফার ।

(Sulphur)

গণ্ডমালা ধাতু-দোষ-প্রাপ্ত, শৈবিক রক্ত-সঞ্চয়, বিশেষতঃ যকৃতের শিরামণ্ডলীর রক্ত-সঞ্চয় প্রবণ ব্যক্তি

যাহারা তাড়াতাড়ি নড়ে-চড়ে, গরুর উদ্বেজিত হইয়া উঠে বা অবসন্ন হইয়া পড়ে, যাহাদের শরীরে রক্তের প্রাধাত্য, অক্রে বাত-তপের অন্তর্ভুক্তির অত্যন্ত অনুভূতি, এপ্রকার স্নায়বীয় প্রকৃতির ব্যক্তি (হিপ, কালী-কা, সোরি) ।

যাহারা অবশীর্ণ (glooping) হইয়া উপবেশন বা বিচরণ করে ; যুদ্ধদিগের চায় অবনত মস্তকে হাঁটে ; এপ্রকার গণ-কায় অবনত-স্বভাব ব্যক্তি

সলফার জ্বাপক রোগী দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেনা ; উহাতে অস্বচ্ছন্দতা অনুভূত হয় ।

চর্ম-রোগ-প্রবণ (সোরি) অপরিচ্ছন্ন মলিন ব্যক্তি ।

প্রকালনে অপ্রবৃত্তি ; স্নানের পরে সর্বদাই মন্দাবস্থা প্রাপ্তি ।

এত অঙ্গ যে জ্বাতিতে চাহেনা ; এত অঙ্গ যে বাঁচিতে চাহেন ।

শিশুদিগের গাত্র-প্রাকালন বা স্নান সহ্য হয় না (শীতল জলে, এন্ট-ফ্রুড) ; শীর্ণ-শরীর বৃহৎ-উদর শিশু ; রাত্রিতে অস্থিরতা ও উত্তপ্ততা, পদাঘাত করিয়া বজ্রাদি ফেলিয়া দেওয়া (হিপ, গানি) ; কৃমির বিজ্ঞমানতা, কিন্তু সর্পিণ্ডকষ্টে নির্বাচিত ঔষধেও কোন ফল দর্শনা ।

যখন কোন রোগে, বিশেষতঃ তরল রোগে সতর্কতা সহকারে নির্বাচিত ঔষধেও সফল দর্শনা, তখন সচরাচর সঙ্গফার ব্যবহারে রোগের প্রতিক্রিয়া-শক্তি সমুদ্ভূত হয় ; রোগীর লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠে (পুরাতন রোগে সোরি) ।

উদ্ভূত বসিয়া গিয়া সমুৎপন্ন গণ্ডমাগাজনিত পুরাতন রোগ (কষ্ট, সোরি)

পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত রোগ ; (রক্তোরোগ, প্রদরাদি) ; রোগ যখন

বারবার প্রত্যাবৃত্ত হয় তখন রোগী যেন প্রায় স্থস্থ হইতেছে এরূপ বোধ হয় ।

চক্ষু, বক্ষঃ, নাক, উদর, ডিম্বাশয়, বাহু, জজ্বা প্রভৃতি এক এক অঙ্গে ; কিম্বা রক্তোনিবৃত্তি কালে শরীরের কোন যঙ্গে উৎপন্ন অর্কদানিতে রক্ত সঞ্চয় ।

মস্তক-শিথবে ; চক্ষে আরক্ততা-পরিশূন্ত মুখমণ্ডলে, মুখ-বিবরের ফোঁকায় ; প্রথমে দক্ষিণ দিকে পরে বামদিকের গলকোষে ; আমাশয়ে, সরলাঙ্গে ; কণ্ঠন-শীতল অর্ধবলি, ও বিদাহী মূত্র সহকারে মলবারে, অগ্নির ক্ষুদ্রক্ষুদ্র তরঙ্গের অল্পরূপ (আম) ; বক্ষঃস্থলে বদন পর্য্যন্ত উখিত ; তাপাবেশ সহকারে সর্ব শরীরের ত্বকে , ও স্বক্কাস্থিরের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে (ফস) , জ্বালানুভব ।

অবসাদজনক ও দৌর্বল্যকর (স্থাধ) ; এবং উক্ত মস্তক-শিথর ও শীতল পদ সম্বলিত ; প্রতি সপ্তাহে বা প্রতিপক্ষে প্রত্যাগত ; সবমন শিরঃপীড়া

মস্তকের মধ্যস্থলে সতত উত্তাপ ; দিবাভাগে পদবয়ের শীতলতা, বাত্মিতে পদতলের জ্বালা, পদ-তল শীতল স্থলে রাখিবার চেষ্টা (মাল, স্থানি), শীতল করিবার অল্প পদবয় শয্যার বাহিরে রাখিতে হয় (মেড) , বাত্মিতে জজ্ব - পৃষ্ঠে ও পদ-তলে থলী

দিবাকালে উত্তাপাবেশ, তৎসহ দুর্বলতা ও শ্রান্তির আবেশ, গাজের অল্প অল্প অর্জিত সহকারে উহার অবসান ।

রক্ত যেন কাটিয়া বাহির হইবে ওষ্ঠাধরের একপ্রকার উজ্জল আরক্ততা (টিউব)

পূর্বাহ্ন ১১টার সময় আমাশয়ে দুর্বলতা ও শূন্যতা অনুভব (১০ টা বা ১১টার সময় শূন্যতানুভব ও আহারে উহার শাস্তি, ছাট-কা) ; জলখাবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারা যায়না ; দিবাভাগে বারবার দুর্বলতা ও শ্রান্তির আবেশ (বিক্ষ ভুলনা করুন)

ছই গ্রহর রাজির পরে বেদনাশ্রুত খাতিয়ার, অতি প্রত্যুখে শয্যাভ্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি বহির্দেশে যাইতে হয় (নলে, সোরি) ; বোধহয় যেন অল্প এত অতিরিক্ত ছুঁয়া হইয়া পড়িয়াছে যে, উহা উহার আধেয় (contents) ধারণ করিয়া বাধিতে পারেনা।

কোষ্ঠ-কাঠিখ ; শক্ত, গ্রাষ্টল, দৃঢ়বৎ শুষ্ক মল (লাই) ; যত্ন-জনক বৃহৎ মল, বেদনা ডান্নো বলিয়া শিশু মলভ্যাগ কবিতো ভয় পায়, অথবা বেদনা বশতঃ শিশু প্রাণমে মল-ভ্যাগের চেষ্টা করেনা ; পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠ-রোধ ও অতিসার ।

যে যে স্থান দিয়া মল-মূত্র প্রবাহিত হয় সেই সেই স্থানে যাতনা ; অধিক পরিমাণে বর্ণশূন্য মূত্র-প্রাব ; মলদ্বারের চারিদিকের আরক্ততা ও অবদারণ ; শরীরের সকল দ্বারগুলিরই অতিশয় আরক্ততা ; সকল প্রাণেরই বিদাহিতা, উহা যেখানে স্পর্শ করে সেখানেই অবদারণ অস্বাভাবিক ।

শত্ৰু ;—নির্জীৱিত সময়ের অনেক পূর্বে, অধিক দিন স্থায়ী, প্রভূত রক্ত । অতি রক্তোরোগ, বিগত গর্ভপ্রাব হইতে অসুস্থতা । “অস্বাভাবিক সময় কেবল একমাত্র ঔষধ ব্যবস্থার”—লিপি ।

শ্বেটিক ,—শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দলে দলে শ্বেটিকের উৎপত্তি, অগ্না প্রথমটি আরোগ্য হইবামাত্র আর একটির উৎপত্তি (টিউব) ।

যক্ষ ;—স্বপকর-কণ্ডুয়ন, চুলকাইলে উল্লস ; চুলকাইতে ভাল লাগে ; চুলকাইলে জাল হয় ; শয্যার উপরে বাড়ে (মার্ক) ; চর্মের বর্ণিতে ক্ষত (লাই)

ঔষধাক্ত সাবান ও ধোতাদি দ্বারা চিকিৎসিত চর্ম-রোগ ; মলম দ্বারা চিকিৎসিত অর্শ ।

মস্তিষ্ক, ফুসফুস-বেষ্ট, ফুসফুস, ও সন্ধিতে মস্ত-সঞ্চয় অথবা প্রদাহজনিত অজীর্ণ করিত পদার্থের আশোষণে লাইউনিয়া, কালী-মিউর, অথবা অপর অনির্জীৱিত ঔষধে উপকার না দিলে সলফার ব্যবহৃত হয় ।

অপরিমিত স্নানপান জনিত পুরাতন বিষ-লক্ষণ ; মস্তপায়ীদিগের শোণ

ও অচ্ছাদিত পীড়া ; এক এক বার মস্ত ০ রিত্যাগ কিন্তু পুনঃ পুনঃ প্রতিক্রিয়া
(সোরি, টিউব)

রাতি কাণীয়া স্বাস রোধের আক্রমণ, দ্বার ও জানালা খুলিয়া দিতে বলা ;
রাতিতে সহসা সম্পূর্ণরূপে আগরিত হইয়া উঠ ; মায়াহ্নে স্বর্যাস্তের পর
তক্ষণাত, সমস্ত রাত্রি নিদ্রাশূন্য গা ।

সুখকর স্বপ্ন, গান করিতে করিতে আগরণ

রোগী যাহা ভালবাসে তাহাই তাহার নিকট সুন্দর দেখায় ; এমন কি
নেকড়াও সুন্দর দেখায়

উদরে জ্বরের সঞ্চালনের স্থায় সঞ্চালন (ক্রোম, থুলা)

উপচয় ।—বিশ্রামে ; দাঁড়াইলে ; শয্যার উষ্ণতায় ;
প্রক্ষালনে, স্নানে ; ও পরিবর্তনশীল বাতান্তপে (ব্রঃস) ; বৃদ্ধি

উপশম ।—শুষ্ক, উষ্ণকালে ; ও দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে (ষ্ট্রানের বিপরীত) ;
ব্রঃস

সম্বন্ধ ।—(১) একো ও সোরির সহিত অল্পপূরক সম্বন্ধ (২) সঞ্চারণতঃ
ধাতব ঔষধ অপব্যবহারের মন্দ ফল । (৩) ক্যাল, লাই, পলস, সার্সা, সিপি
সহিত অল্পপূরক সম্বন্ধ (৪) সলফ, ক্যাল, লাই ; অথবা সলফ, সার্সা ও সিপি
অনেক সময় উল্লিখিত পর্যায় অল্পপূরক পরপর ব্যবহৃত হয় (৫) সলফারের
পূর্বে ক্যালফেরিয়া ব্যবহার করা উচিত নহে (৬) নিউমোনিয়া ও অচ্ছাদিত
তরুণ রোগে একোলাইটের পরে সলফার ভাল খাটে ।

সালফিউরিক এসিড ।

(Sulphuric Acid)

লঘু কেশ ; বৃদ্ধ ও বিশেষতঃ বৃদ্ধাদিগের পক্ষে ; এবং নিবৃত্তরক্তাদিগের
উত্তাপাবেশে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী

অবাধ্যতাবশতঃ নয়, কিন্তু অল্পপয়োগিতা বশতঃ প্রলের উত্তর দিতে
অনিচ্ছা ।

অতিশয় ব্যস্ত-সমস্ততা অনুভব, তাত্ক্ষণিক বিষময়ে সহন সম্পন্ন করিবার প্রয়োজন (অর্জ্জ-না)

ক্রমে ক্রমে ও ধীরে ধীরে বিবর্তিত বেদনা, চরম গোমায় উপস্থিত হইয়া সহসা উহার নিবৃত্তি, কিন্তু পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবৃতি (প্যাস)।

স্থূল-মুখ অঙ্গের চাপের জায় বেদনা উপধাতু প্রাপ্তির পর, বিশেষতঃ বৃক্ষদিগের পক্ষে, গ্যাংগ্রাণ্ড অনিবার্য সম্ভাবনা।

সতর্কভাবে প্রকাশন করিলেও শিশুর গাত্রে অঙ্গগন্ধ (হিপ, ম্যাগ-কা, গ্লিউম)

অপালে যেন মস্তিষ্ক আচ্ছাদিত হইয়াছে এবং অপাশ হইতে ওপাশে পড়িতেছে একরূপ অনুভব (বেল, ব্রাই, ব্রুস, স্পিঞ্জি)

মুখ-বিবর, দস্ত-মূত্র অথবা মম ও গড়-গহ্বরের উপস্থিত (aphthae), দস্ত-মূল হইতে সহজে রক্তপাত ; কতজালর ব্যথিততা, খামে দুর্গন্ধ (নোর)

পুরাতন ছাদাহ (বুক-জাণ) , অন্ন উদগার, দাঁত টক হয় (রোব)।

মদিরার সহিত মিশ্রিত না করিয়া ছল পান করিলে আমাশয়ের দীপ্ততা জন্মে।

প্রকৃত কল্পন ব্যতীত সর্ব শরীরে কম্পাচ্ছাদিত ; মদিরাপানাদিগের আভ্যন্তরিক কল্পন। *

উপধাতু প্রাপ্তির মন্দফল, ঘৃষ্টভ্রণ উন্মোচিত ও ন জাত্য প্রক ; অবসন্নতা (এসেট-এসি)

কালিয়া (Ecchymosis) ; ক্ষত-চিহ্নের রক্তবৎ লোহিতবর্ণে বা নীলবর্ণ পরিণতি ও বেদনাপূর্ণতা (হরিৎবর্ণে পরিণতি, লিড)।

পেটিকিয়া ; পার্শ্বী হেমরহেমিকা ; নীলবর্ণ দাগ ; মৌসবর্ণ, আরক্ত, কণ্ডুয়ননীল কুস্কুড়ি।

শরীরের সকল স্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব (ক্রোট, মিউ-এসি, নাই-এসি, টেরে)।

* হেরিং বলেন যে সলফিউরিক এসিড একভাগ এককোহল তিনভাগ, ১০ হইতে ১৫ বিন্দু, প্রতিদিন তিনবার তিন চাঙ্গি সম্ভ্রাহ পয়ঃপ্রবাহ ব্যবহার করিলে মদিরা-পানের প্রবৃত্তি প্রশমিত হয়

পতন বা আঘাত বশতঃ মস্তিষ্কের সংঘর্ষ বা সংঘাত এবং উহাতে হৃৎকের শোভনভেদ ও শরীরের শোভন ঘর্ষ মিস্কৃত।

কোন গভীর মূল ধাতু-দৃষ্টে অনিত হৃৎকৃত্য ও অবসন্নতা, অতীকোন বক্ষণ নহে (মোরি, মধ্য)

সম্বন্ধ।—(১) পলসের সহিত অনুরূপক সম্বন্ধ (২) ঘৃষ্টবৎ বেদনা, পাণ্ডুর চর্ম, এবং প্রভূত ঘর্ষে আধিকার পর ৩ কালশিরায় লিডমের পরে ভাল খাটে (৩) আস, বোরা, ক্যাঙ্গেল, লিড, রুট রিউম ও সিন্ফাইটমের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ (৪) কোমলাংশের ঘর্ষণে ও বিদারণে সলফিউরিক এসিড ক্যাঙ্গেলুলার সমকক্ষ (৫) ব্রাণ্ডি পানজনিত অস্থি ব্যবহৃত হয়

সাইকিউটা ভিরোনা।

(Clouta Virosa)

অতিশয় প্রায়বীয় ও কৃত্তির ব্যক্তিদিগের পক্ষে, অপস্মার ও তাণ্ডব (কোরিয়া) জনিত আক্ষেপগ্রস্ত জীলোকের পক্ষে; এবং দস্তোলাস-কাঠে, অথবা কুমিজন্তু শিশুদিগের আক্ষেপে; এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী

টঙ্কার —সর্বশরীরের ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভয়ঙ্কর বিকৃতিবিশিষ্ট প্রবল আক্ষেপ; স্পর্শ, ও গোলমাল বা কর্কশ শব্দে আক্ষেপের প্রত্যাবৃতি।

অপস্মার।—ভায়াক্রামের প্রবল আক্ষেপ জনিত ক্ষীণতার জায় আশাশয়ের ক্ষীণতা; চিৎকার-করণ; আরক্ত বদন; হ্রস্বশ্বাস; হিক; চৈতন্যশূন্যতা ও অঙ্গ-বিকৃতি; রাত্রিকালে বারংবার উপস্থিতি; প্রথম প্রথম অল্পকাল, অনন্তর দীর্ঘকাল ব্যবধানের পর আক্ষেপের প্রত্যাবৃতি

স্থতিকক্ষেপ —কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত বারংবার শ্বাস-রুদ্ধ হইয়া থাকা; শরীরের উর্দ্ধাংশের সর্বাঙ্গের অধিক আক্রান্ততা; প্রসবের পরেও উহার অবস্থিতি।

দস্তোদাম-কাচে, দাঁত বা মাড়ি কড়মড় করা, দাঁত কপাটী লাগিলে যেকোন
হয় চোয়ালের সেইপ্রকার আকৃষ্টন ফুলখড়ি (চক) ও অপাচ্য দ্রব্য
আহারের অন্তর্ভাবিক প্রকৃতি, শিশু কাল বা অঙ্গার অতি শ্রাদসহকারে
আহার করে (এলম, সোরি)

মস্তক, আশাশয়, বাহ, ও অঙ্গার অত্যন্ত দিয়া এবং বিকল্প (shock)
এবং তদ্বারা সেই সেই অঙ্গে উৎসেপের উৎপত্তি, মস্তকের উত্তপ্ততা

মস্তক ও পৃষ্ঠবংশের সংঘর্ষ (concussion), বিশেষতঃ পুরাতন অপকারক
ফল, মাংসের ভিতর চৌচ ফুটিয়া থাকিতে হস্তপ্ত (trismus) ও ধস্তপ্ত
(tetanus) (হাইপার)

পড়িবার সময় অক্ষরগুলি ঘূর্ণিত হয়, উপরে-নীচে যায় অথবা অদৃষ্ট হয়
(ককু) ।

মস্তকে ও মুখমণ্ডলে প্রচ্যমান পীড়কা, উহা মিসিয়া গিয়া পীতবর্ণ, স্থল
চিপটিকার উৎপত্তি ।

কণ্ডূয়ন-পরিশুদ্ধ পান্না ; আবে লেবুরবর্ণ মস্তক চিপটিকার উৎপত্তি ।

উদ্বেদ বসিয়া গিয়া মস্তক-রোগের উদ্ভব ।

উপচয় । — তামাকের ধূম কইতে (ইগে) ; স্পর্শে ; ও সংঘর্ষে (জরে) ;

বৃদ্ধি

উপশম । — অনাবৃত বায়ুতে দ্রাস

সম্বন্ধ । — হাইড্রো-এমি, হাইপার, নব্বা, ও প্রীকনিয়ার সহিত সমগুণ সম্বন্ধ ।

সাইক্লেমেন ।

(*Cyclamon Europæum*)

শ্লেণা ও রস-প্রাণান ধাতুর যে সকল ব্যক্তির মূতপাণ্ডু (*anæmia*), হরিৎ-পাণ্ডু (*chlorosis*) থাকে ; যাহাদের সহজে শ্রান্তি অগ্নে স্ততরাং কোন প্রকার পরিশ্রমে প্রবৃত্তি অগ্নে না এবং যাহাদের শরীরস্থ যন্ত্রগুলির অথবা বিশেষ বিশেষ ইঞ্জিনের ক্রিয়ার ক্ষণতা বা স্থগিততা থাকে তাহাদের পক্ষেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী

পাণ্ডুবর্ণ, বিকৃত ধাতু-রক্ত (ফির, পলস), তৎসহকারে শিরোগূর্ণন, শিরঃপীড়া, ঝাপসা দৃষ্টি

সংযত শোক ও বিবেকের যাতনা ; কর্তব্য কর্ম না কর বা অকর্তব্য কর্ম করা নিবন্ধন ; অসুখ ।

বেদনা । যে যে স্থলে অস্থিগুলি চর্মের সমীপবর্তী সেই সেই স্থানে প্রচাপন, আকর্ষণ বা ছেদনব্য যাতনা

অতিশয় বিমর্ষতা ও বিরক্ত-চিত্ততা ; গণরাগিতা, অপ্রফুল্লতা, মনপ্রকৃতি (বদ্মেজাজ) ; অপ্রস্রাবপ্রবণতা ; নির্জনপ্রিয়তা , বিমুক্ত বায়ুতে অপ্রবৃত্তি (পলসের বিপরীত) ।

প্রাতে উথানাস্তে চক্ষুর সম্মুখে দীপ্তি-রেখা দর্শন অথবা দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা সহকারে রক্তহীন রোগীদিগের শিরঃপীড়া

চক্ষুর সম্মুখে নানাবর্ণের আলোক শিখা, অগ্নিশূলিজ, উজ্জল সূচী দর্শন , কুস্মাটিকা বা ধূমের স্থায় অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি

অল্প কয়েক গ্রাম আহার করিলেই পরিতৃপ্তি (লাই), তৎপরে অহরীয় জন্য ভাল লাগেনা, গলায় ও তালুকার বিবমিষা অনায়াস

লালা ও সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যের একপ্রকার লবণাক্ত অস্বাদ ।

নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্বে, অতি প্রভূত, ক্রমবর্ণ ও সংযত (অনেক বিশেষ, অতি অল্প, প ডুবর্ণ, পলস) ; ঝিল্লীমৎস্ক ; প্রবাহিত হইবার সময় উপশমপ্রদ (উপচরকর, ঐষ্ট, পলস) ; ঋতু ।

অনাবৃত বায়ুতে বসিতে, দাঁড়াইলে অথবা হাঁটিলে পাদ মূলে জ্বালাকর বেদনা
(এগার, কষ্ট, ফাইটো, ভেলে)

উপায় ।—অনাবৃত বায়ুতে , শীতল অঙ্গে ; শীতল অঙ্গে স্নানে ; ঝড়,
স্নানিতে উপবেশনে ও স্নানে ; এবং বসন্ত জ্বর ভোজনে , বৃদ্ধি

উপশম ।—উষ্ণ গৃহে ; গৃহের অভ্যন্তরে ; ঝড়, বিচরণে (খেতাদার,
উপবেশনে বৃদ্ধি বিচরণে হ্রাস, ক্যাষ্ট, কফ) , হ্রাস ।

সম্বন্ধ ।—ক্লোরোসিস ও এনিমিয়া জনিত রোগে পলম, মিক, ও ফিরমের
সহিত ; এবং উদরে যেন কোন সম্বীৰণ প্রাণী রহিয়াছে নই লক্ষণে ক্রোম ও
খুজার সহিত সাইক্লোমেনের তুলনা হয়

সার্সা পেরিলা ।

(Sarsaparilla)

মলিনবর্ণ কেশ, লিথিক বা সাইকোটিক ধাতুবিষিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে সার্সা
বিশেষ উপযোগী ।

অতিশয় শীর্ণতা ; ঘকের ক্ষুধিততা কিংবা বর্ণবিষিষ্টতা (এক্সোট, আইওড,
জাট, জ্যানিক)

সাধারণতঃ পারদ উপদংশ অথবা বিজুগ্ম প্রমেহ হইতে উৎপন্ন শিরোবেদনা
ও অস্থি-বেষ্টের বেদনা

বৃক্ক-বৃক্কিদিগের বৃদ্ধির শ্রম মুখমণ্ডল ; বৃহৎ উদর , শুষ্ক, লোপিত
ত্বক (ব্যায়া-কা, ওপি) ।

শরীরের সকল অংশে দক্ষ অউদ্ভেদ ; উপদংশে পারদ অপব্যবহারের
পর ক্ষত

অনাবৃত বায়ু লাগিয়া গায়ে উদ্ভেদের উৎপত্তি ; শুষ্ক পাঁচড়ার স্থান উদ্ভেদ,
বসন্তকালে উহার উপস্থিত হইবার প্রবণতা ; উহাতে চিনিটিকা অগো ।

মূত্র-ত্যাগ শেষ হইলে দারুণ, অসহ-পায় যাতনা (বাক্সে, ইঞ্চি মেডো, থুলা)

প্রান্তর রেণু অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রান্তর নিঃসরণ, বৃকক-শূল ;
মূত্রাশয়ে অশ্মরি ; রক্তাক্তমূত্র ।

মূত্র উজ্জ্বল ও ঋক্ষিত কিন্তু উপদাহক (irritating) মূত্র, অল্প, আঠা
আঠা, রেণুসংযুক্ত, প্রচুর, অনুভব ব্যতীত পরিত্যক্ত (কষ্ট) মূত্র ;
শূলবর্ণ রেণু অধঃপাত ।

মূত্রাশয়ের বেদনাপূর্ণ প্রসারিততা ও স্পর্শদেয়, উপবিষ্ট অবস্থায় বিন্দু
বিন্দু মূত্র-পাত ; দাঁড়াইলে বিমুক্তভাবে মূত্র প্রাব ; মূত্রমার্গ হইতে বায়ু
নিঃসরণ ।

মূত্রে কিংবা শিশুর শয্যাবক্ষে রেণু, মূত্র-ত্যাগের পূর্বে ও মূত্রত্যাগ-কালে
শিশুর চিৎকার (বোঁরা, লাইকো) ।

* ভলতা, আর্দ্র-কাল, অথবা পারদ সেবন বশতঃ অবরুদ্ধ প্রমেহ, তৎপরে
আমবাত ।

অ যু-শূল কিংবা বৃকক-শূল ; দক্ষিণ বৃকক (kidney) হইতে নিম্নাতিমূলে
নিদারুণ বেদনা (লাই) ।

অনন্যদেয় অসহ দুর্গন্ধ ; পাতল রক্তঃপাত রক্তাক্ত শুষ্ক-প্রাব (গিড,
মার্ক) ।

স্তন-বৃন্তের সংহরণ (retraction), বৃন্তের ক্ষুদ্র, শুষ্ক ও উত্তেজনা
শূন্য (সিগি) ।

বাত, পারদ বা অবরুদ্ধ প্রমেহের পর অস্থি-বেদনা ; রাত্রিতে, আর্দ্রকালে,
অথবা অলপ থাকিয়া শক্তি জাগাইলে বেদনার আধিক্য ।

শ্রু-কালে কপালে কণ্ঠমূলীল উদ্বেদ (ইউজি, শ্রু, সোরি)

হাত-পায়ের চর্মের বিদারণ ; বেদনা ও জ্বালা, বিশেষতঃ হাতের ও পায়ের
আঙ্গুলের পার্শ্বের চর্মের কঠিনতা ও দৃঢ়তা ।

সম্বন্ধ ।—(১) মার্ক ও সিগির সহিত অল্পপূরক সম্বন্ধ, ইহার যে কোনটা

ମାର୍ମାର ପରେ ଭାଜ ଖାଟେ (୨) ବାଦ, ଘାଣ୍ଟିକୋ, ଛାଟିମିଡ଼, ଗମ୍ଭୀର ମଞ୍ଜିତ
ମାର୍ମାର ତୁଳନା ହୁଏ (୩) ପାମାମ ଅପବାବହାରେର ପର ପ୍ରାୟମ୍ : ଇହାର ବାବହାବ
ହୁଏ ଖାକେ

ମିଟେକଲି ।

(*Secale Cornutum*)

କ୍ଷୀଣା, ଦୁର୍ବଳା, କ୍ଷୀଣା, ଶରୀର ବିକାର ବିଶିଷ୍ଟା ନାରୀ ; ଉଦ୍ବେଗନ-
ଶୀଳ ମାର୍ମାବୀୟ ପ୍ରକୃତି ; ଭୟବତ୍ ପାତୁର, ନିୟମ ଯୁକ୍ତ କୃତିର ପକ୍ଷେ ଏହି ଔଷଧ
ଉପଯୋଗୀ

ଅତି ବୃଦ୍ଧ, କ୍ଷୀଣ, ଓ ଦୀନ ବ୍ୟକ୍ତି

ପେଶୀ-ତନ୍ତ୍ରର ଅତିଶୟ କ୍ଷୀଣତା ବିଶିଷ୍ଟ ନାରୀ ; ଶରୀରେର ପ୍ରାତ୍ୟେକ
ବସ୍ତୁରହି ଅଳସ୍ ଓ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବୋଧ ; କ୍ରିୟାଶୂନ୍ୟତା ; ରକ୍ତବହା
ନାଡ଼ୀର ଲୋପିତତା (vessels flabby) ; ଅପ୍ରାବଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ; ପାତଳା,
କାଳ ଶରୀର ଓ ରକ୍ତର ପ୍ରାଚୁର ପ୍ରବାହ ; ରକ୍ତାଂଶୁର ବିନିଷ୍ଟତା ।

ରକ୍ତସ୍ରାବ-ପ୍ରାବଣ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକୃତି ; ସଂସାରୀ ଉପସ୍ଥାପନେ ମୁଖ୍ୟତଃ
ରକ୍ତ-ପାତ (ଗ୍ୟାକ, ଫମ), ଦୂଷିତ ତରଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ, ଉହାର ପ୍ରାବଣ ପଚନ-ପ୍ରାବଣତା,
ଅଳ୍ପେ ଶାନ୍ତି ଲାଗାର ମତ ଅମୁତବ ଓ ଅତିଶୟ ଦୁର୍ବଳତା, ବିଶେଷତଃ ପୁରୁଷର
ରକ୍ତସ୍ରାବାଦି ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦୁର୍ବଳତାର ଅମୁତପତି

ହରିତ, କପିଳ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପଦର-ସ୍ରାବ ।

କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର, ବେଦନାବିଶିଷ୍ଟ, ସବୁଜବର୍ଣ୍ଣ, ପଦାର୍ଥଧାରୀ ଷ୍ଟେଟିକ ;
ଅତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉହାର ପକ୍ତତା ଓ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ଉହା ବଢ଼ି ନୌରୋଗ୍ୟ ଜନକ ।

ସାମାନ୍ୟତଃ ଅସ୍ବାଭାବିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ; ଅବମାନକର ଅତିଶୟ ସହକାରେ ଶୁଦ୍ଧା ;
ଲେମନେଡ଼ ଓ ଅଗ୍ରଜବ୍ୟ ସେବନେର ଆକାଂକ୍ଷ

ଅନିଚ୍ଛାୟ ନିଃସୃତ ପ୍ରସୂତ, ଜଳବତ୍, ପଚା, କପିଳ ; ଅତି ସବଳେ ବିନିର୍ଗତ
(ଗ୍ୟାସ, କ୍ରୋଟ) ; ଅତିଶୟ ଅବସମତା ଜନକ, ଶୁଦ୍ଧ-ବିଶୁଦ୍ଧି ସଂଯୁକ୍ତ ; ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ
ବିସ୍ତୃତ ବିସ୍ତୃତତା ବିଶିଷ୍ଟ (ଶ୍ପିସ, ଫମ), ଅତିଶୟ ।

বুর্জাদিগের অব্যাহত মুখ, বর্ণশূন্য অঙ্গবৎ রক্তাণ্ড মুখ ।

শরীরের সকল অংশে জ্বালা, বোধ হয় যেন বোঁগীর গাজে অগ্নির ক্ষুণ্ণিত পতিত হইতেছে (জ্বা)

মুখমণ্ডল, বিশেষতঃ মুখ-বিবরের চারিদিকের পাণ্ডুবর্ণ, নিমগতা, বিকৃতি ; গাজের শীতলতা অথচ আবৃত থাকিতে অপ্রতি লক্ষণাপন্ন ওলাউঠার পতনাবস্থা ।

বুদ্ধাবস্থার অস্বাভাবিক গ্যাংগ্রাণ, বাহ্যোস্তাপে উদার বুদ্ধি ।

বৃহৎ কাগশিরা ; রক্তপূর্ণ ফোঁকা, প্রায়শঃ গ্যাংগ্রীণের সূচনা ।

স্পার্শে গাত্র-ত্বকের শীতলতা, অথচ রোগী গাত্রের আবরণ

সহ্য করিতে পারেনা ; হস্তপদের বরফবৎ শীতলতা ।

অনিয়মিত, প্রভূত, মারাত্মক, তরল পদার্থ-স্রাব, উদরে প্রসব-বেদনাবৎ প্রচাপনকর বেদনা বিশিষ্ট, পরবর্তী ধূমকান পর্ষ্যন্ত ক্রমাগত অঙ্গবৎ রক্তস্রাব সংযুক্ত ; ঋতু ।

গর্ভস্রাবের আশঙ্ক, বিশেষতঃ তৃতীয় মাসে (জ্বা) ; অনেকক্ষণ স্থায়ী, কুস্থন-অনক, বলপূর্ণক নিঃসরণবৎ বেদনা ।

অনিয়মিত, অতিদীর্ঘ, ক্ষীণ বা নিরন্তর ; এসব বেদনা ; সকলই অমৃতা ও বিমুক্ত বোধ হয়, কিন্তু নিঃসারণী ক্রিয়া (expulsive action) দৃষ্ট হয়না ; মূর্চ্ছা ।

অতিরিক্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী ; অতীব যন্ত্রণাপ্রদ এসবাস্থিক বেদনা ; অরায়ুর বাণী-ঘড়ির ছায় অথবা ডমরুবৎ সঙ্কোচন (hour-glass contraction) ।

শীলা, শীর্ণা, অবসন্ন জীবনের স্তন-দুগ্ধের বিলুপ্তি ; স্তন উপযুক্তরূপে দুগ্ধ-পূর্ণ হয় না ।

শূল, জ্বত, আক্রান্ত ও সচরাচর দোষ-যুক্ত নাড়ী ।

উপচয় ।—উত্তাপে ; ও আবরণের উষ্ণতায় ; আক্রান্ত সকল স্থানের সকল রোগেই উত্তাপে ; বৃদ্ধি ।

উপশম ।—শীতল বায়ুতে ; শীতল হইলে, আক্রান্ত স্থান অনাবৃত করিলে ; ও মর্দনে ; ক্রাস ।

সম্বন্ধ ।—(১) ক্রাসে মিকের সহিত সমস্ত মধ্য, শীতোত্তাপে বা নিম্নীত প্রকৃতি । (২) ওলাউঠার কলটিকমেন সহিত মাদুশ (৩) ১ মবাস্তিক রক্ত-স্রাবে সিনেমেনের সহিত সমস্ত মধ্য (৪) মিকেলি প্রসব-বেদনা বর্ধিত করে ; রক্তস্রাবের প্রভূততা ও সাধোতকাল নিবারণ করে, ইহ নিরাপদে ব্যবহার করা যাইতে পারে ; কিন্তু আর্গটের (এলোপ্যাথিক) ব্যবহার সর্বদাই বিপজ্জনক

সিড্রন ।

(Cedron)

নারী ; স্নায়বীয়, উত্তেজনশীল ধাতু ও ভোগস্বখাসক্ত প্রকৃতির ব্যক্তিদিগের পক্ষে সিড্রন বিশেষ উপযোগী ।

রমণান্তে স্নায়বীয় অবমানন, ও কোরিয়ার আক্রমণ, জীলোক উহার সমধিক স্পষ্টতা (রমণান্তে দুর্বলতা, পুরুষদিগের পক্ষে উহার স্পষ্টতা, এমি-ফস) ।

একদিন পর একদিন পূর্বাঙ্ক ১১টার সময় সবময় শিরঃপীড় (প্রতিদিন, ছাট) ।

অঙ্গে ছেদন ও স্পন্দনকর বেদনা

ধাতুকালে মুখ-বিবর ও প্রস্থার অতিশয় শুষ্কতা, অতিশয় পিপাসা, অপস্রাব, যে দিন প্রথম ধাতু নিঃসরণ হইতে আরম্ভ হয় ঠিক সেই দিনে অপস্রাবের পূর্বলক্ষণ প্রকাশ পায় । প্রতি ধাতু-কালেই নিয়মিতরূপে টঙ্কার উপস্থিত হয় ।

ধাতুর পাঁচ ছয় দিন পূর্বে প্রতিমাসে নিয়মিতরূপে শ্বেতপ্রদরের উপস্থিতি (কাগা-কা) ; ধাতুর পরিবর্তে শ্বেত-প্রদর (কক) ।

ধাতুর পরে প্রভূত লাল-স্রাব

কুইনাইন অনিত কর্ণ-নাশ সিড্রন সেবনে নিবাসিত হয় ।

ঘটিকা-যন্ত্রের দ্বারা ঠিক একই সময়ে জরের উপস্থিতি ।

উপচয় ।—সঞ্চলনে শীতের প্রত্যাবৃষ্টি ; ঋতুর পূর্বে বৃষ্টি

উপশম ।—উষ্ণ পেষ জব্য ; ও উষ্ণ গৃহে ক্রাস ।

(২৬৯)

সিনা

(Cina)

কুম্ভ-কো, খিটখিটে স্বভাব ; কোলে চড়িয়া বেড়াইবার ইচ্ছা, অথচ উহাতে
অস্থিরতা ; স্পর্শ করিতে দিতে ও ক'হাকেও ক'হে অসিতে দিতে অনিচ্ছা ;
আমর কারিয়া গায় হাত বুলাইলে বিরক্তি ; অনেক বস্তু চাওয়া, কিন্তু সেগুলি
দিলে না ওয়া (এন্ট-টাট, ব্রাই, ক্যাম, ষ্ট্রাক), অশ্রদ্ধতা, যাতনায়ুক্ততা ;
সকল সময় নাক খুঁটা ও বালিশে বা ঘাতীর স্বক্ষে নাকঘষা (ম্যারম) ; নিদ্রা
হইতে জাগিয়া করণ ক্রন্দন ; নিদ্রাবস্থায় চমকিয়া উঠ ও চিৎকার করা, দাঁত
কড়মড় করা (সিকু, স্পিঞ্জি) ; কুমি (ম্যারম)

পাখুর বদন ; মুখের ও চোখের চারিদিকের রক্ত আকৃতি ; এক গাল লাল
আর এক গাল ফেকাসে (ক্যাম)

কুকুরবৎ শ্রুতি, পূর্ণ আহারের একটু পরেই আবার শ্রুতি ;
মিষ্ট জাব্যের পূর্ণ ও অল্পাংশ বহুবিধ জাব্যের আকাঙ্ক্ষা, মাতার অনপানে অনিচ্ছা
কাম ;—হাঁচি সংযুক্ত শুষ্ক কাস ; প্রাতে আফেপিক, গর্জরোধকর কাস ;
প্রতি বসন্ত বা শরৎকালে ও ত্যাগকৃত কাস । কাসের আবেশ উপস্থিত হয় বলিয়া
শিশুর কণা বাঁজতে বা নড়িতে চড়িতে আশঙ্ক (ব্রাই) ।

ত্যাগকালে মুত্র খোলা থাকে, পানিক-ক্ষণ থাকিলে দুধের মত, ও অর্জনিরেট
হয় । শুভ্র ও ঘোলা ; অনিচ্ছায় নির্গত, মুত্র ।

স্নায়বায়, দুর্বল গুণমালাধাতু-দৃষ্ট বালক বালিকাদিগেব সন্নিবাস্য ।

উপচয় ।—রাত্রিকালে ।

সম্বন্ধ । —(১) শিশুদিগের উপদাহিতায় এন্ট-কুড, এন্ট-টাট, ব্রাই,
ক্যাম, ক্রিয়ো, সিলি, ষ্ট্রাকের সহিত সিনার সমস্ত সম্বন্ধ (২) জপ-ক-কাসে
জ্বরের সোণনে উগ্রতর লক্ষণগুলির শাস্তি জন্মিলে সিনা ব্যবহৃত হয় (৩) শর্দি
জাগিয়া শ্বস বিদ্যুৎ হইলে একন, ফস, ও স্পঞ্জিয় ব্যর্থ হইলে সিনা দ্বারা উপকার
দর্শে (৪) যুবকদিগেরপক্ষে যখন অল্পাংশ ঔষধ প্রয়োজিত হয় তখন বালক-
দিগের রোগে বহুব্যাপক ঔষধ স্বরূপ সিনার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা উচিত ।

(৫) সিনা ব্যবস্থায় বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে তদ্বারা ক্রমি রোগে উপকার না দিলে কখন কখন স্ফাটোনাইন প্রয়োগে আরোগ্য অথবা (মেরম, স্ফিজ) ।

সিপিয়া ।

(Sepia)

মলিনবর্ণ চুল, দৃঢ় তেজ-ত্ব, কিছু মূহ ও শাস্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট (পলম)
ব্যক্তিমিগের পক্ষে সিপিয়া উপযোগী

দ্রীলোকের রোগে ; বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায়, প্রসূতাবস্থা ও শুদ্ধদান কালে
যে সকল রোগ উপস্থিত হয় সেই সকল রোগে, অথবা আকস্মিক অবসাদ ও
প্রাণিসংযুক্ত রোগে (সিউরেক, নগ-ম) সিপিয়া ব্যবহৃত হয়

সিপিয়া “রক্তকের ঔষধ,” অর্থাৎ কাণ্ড ঘোত করিবার পরে যে সকল অস্থি
অথবা বা বৃদ্ধি পায় তাহাতে এই ঔষধ প্রয়োজিত হয় ।

অত্যন্ত স্থান হইতে পৃষ্ঠে বেদনার প্রসারণ (জীবিনার বিপরীত)
উহার সহিত কম্প (শীত, পলম)

শীতল বায়ুতে স বিশেষ অমুভূতি, সহজে শীতোৎপত্তি, শারীরিক উত্তাপের
অসম্ভাব, বিশেষতঃ পুরাতন রোগে (তরল রোগে, লিডম) ।

ভিষিকার পরে ; উত্তাপ বা শীতের : আতিশয়া হইতে ; গাড়াতে চড়িলে ;
ভয়নাথয়ে জ্বর পাতিয়া যিগিয়া প্রার্থনা করিবার সময় ; সহজে মুচ্চীর
উৎপত্তি ।

দ্রুত-কালে, গর্ভাবস্থায় শুদ্ধদান-সময়ে ; এবং কোষ্ঠ কাঠি, অতিসার, অর্শ,
প্রদর ও অরায়ুর রোগসহযোগে ; অত্যন্তরূপে একটা গোলায় স্থায় অমুভব ।

শিরঃপিড়া সহকারে মস্তক-শিথরে শীতলতা (ভিরে ।—উত্তাপ, ক্র্যাক, গ্রাক,
সলফ) । অতিশয় পেটুকতা (লাই) ।

ভয়, বদনে ও মস্তকের উপর উত্তাপাবেশ সহকারে ; : কৃত বা কল্পিত বিপদ
সহজে ; মক্ষার প্রকালে ; উৎকর্ষ ।

অতিশয় বিমর্ষতা ও বিলাপ । জরায়ু রোগ সহকাৰে একাকী

থাকিতে আশ্রয়, চোকেৰ ভয় বয়াদিগের সহিত যোগ্য করিতে হয়

আপনার পরিজন, কার্য-কর্ম (ফ্লোর-এগি, ফস-এগি) ও প্রিয়তম ব্যক্তিদিগের প্রতি ; উদাস্য ।

কোষ্ঠ ও কৃপা (নাই), অশ্রু, কার্য বা ক্রিয়া করিতে, এমন কি কোন বিষয় চিন্তা করিতে বা করিতেও অপ্রবৃত্তি

ধাতু-কালে স্বল্প রক্ত-আবসহ ; হিষ্টিরিয়া গ্রস্তা, অনুভূতি-প্রবণা, অক্ষুমাণা নারাদিগের ; প্রচাপন বা বিদারণবৎ, ভয়ঙ্কর শিরঃপীড়া । নড়িলে চড়িলে, মস্তক অবনত কারলে, ও মানসিক পরিশ্রমে উহার বৃদ্ধি, এবং বাহ্যিক চাপ-প্রদানে ও অস্বাভাবিক সময়ে সঞ্চালনে উহার হ্রাস ।

পুরা ওন শিরঃপীড়ার পরে অথবা রোগানিবৃত্তিকালে অতিশয় কেশপাতন ।

মুখমণ্ডলের, ও চক্ষুর ষ্ঠেতমণ্ডলের পীতবর্ণ, বক্ষঃস্থলে পীতবর্ণ চিহ্ন ; গাণ্ডদ্বয় ও নাসিকার উর্দ্ধভাগের অনুপ্রাশ্বে ঘোড়ার জিনের অনু-রূপ পীতবর্ণ দাগ ; জরায়ু-রোগ জ্ঞাপক বদন

গলবজ্জ অত্যন্ত দৃঢ় বোধ হয়, সর্বদাই উহা টিপা করিয়া দিতে হয় (চ্যাক)

* রোগের উর্দ্ধাংশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে চার্পিল্ মার্গিনেটঃ (দক্ষবিদেশ)

(সম্ভবমতে বিবর্তিত অঙ্গুরীর আকার দক্ষ, টেল)

উদরোর্ধ্বে স্থানে কষ্টপ্রদ শূলতা, “যেন কিছুই নাই” এরূপ অনুভব, আহার করিলেও উহার অল্পপক্ষ (চেলি, মিউরেয়া, ফস) ।

অনন্যদিগের সুলোদরতা (বালক-বালিকাদিগের, মল) ।

জিহ্বার মলিনতা কিন্তু প্রত্যেক ধাতু-কালে উহার পরিচ্ছন্নতা, ধাতু-প্রাধিকার বিমূর্ত্তির পর পুনরায় উহার প্রত্যাবৃত্তি ; নিম্ন ষ্ঠের ক্ষীণতা ও বিদারণ ।

কোষ্ঠ-কাঠিল্য :—গর্ভাবস্থায় (এলম) ; শক্ত গ্রন্থি, বর্জ্যলাকাব, অপ্রচুর আশ্রমে নিঃসারিত, মল ; মলত্যাগকালে ও তৎপরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সরলাঞ্জে বেদনা (নাই-এগি, মল) ; মলদ্বারে তার বা বর্জ্যবৎ, ‘অনুভব, মলত্যাগেও উহার অনিবৃত্তি ।

মূত্র —মূত্রের জোহিতাভ কর্দ্দিমবর্ণ অসংখ্য ক্ষিত পদার্থ, উহা আদার পাঁজে লাগিয়া থাকে, দেখিলে বোধ হয় যেন দধি চর্কনাছে, মূত্রের এত দ্রবীভব উহা গৃহে রাখিতে পারা যায় ন (পানিকণ্ডে লাক্ষিতে কর্দ্দিম, ইণ্ডিয়াম)

*যা-মূত্র, শিশু নিজেই হইলমাত্র *যা ভিত্তাইয়া গেলে (নিম্নোক্ত);

প্রথম-নিদ্রাকালে *যায় মূত্র ত্যাগ

*জ'-মেহ (গ্লেট); বেদনা-শূল, শীতল, বস্ত্র-বন্ধকর স্রাব; প্রাতে মূত্র-চারের মূত্র সংযোজন, দুর্দ্দিয়া, দীর্ঘকাল স্থায়ী রোগ (কালী-আইওড); অনেনেজির দুর্বলতা ও অবসন্নতা

যোনিতে উর্দ্ধমিকে প্রবল স্রটবেধবৎ যাতনা; অরায়ু হইতে নাভী পর্যন্ত ছবি দিয়া কর্তনের গ্রায় বেদনা।

অরায়ু ও যোনির বহির্গমন, প্রচাপন ও আবেগ, যেন বস্তি-

গহ্বর হইতে সকলই বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ অনুভব;

উহা নিবারণ করিবার জন্য উরুর উপর উরু রাখিয়া বসিতে হয়; উহার সহিত স্বাস-কষ্ট থাকে (এগ'র, বেল, মিউরো', অ'নি)

পূর্বোক্ত রোগের সহিত সংশ্লিষ্ট, নিরমিত সময়ের পূর্বে বা পরে প্রকাশিত, স্রব বা অত্যধিক স্রব, স্রবসাতাব বা অতিরিক্ত;—প্রায় সর্বপ্রকারের স্রবোৎপাদন

গর্ভাবস্থায় প্রাতঃকালীন বিবমিষা; আহাৰ্য্য জবা দেখিলে বা উহার বিষয় চিন্তা করিলে বিবমিষার উদ্বেক (নকা), ঋতুজব্য রক্তনের গন্ধে বিবমিষা অশো (আগ', কলচি)।

শ্বাস-কষ্ট; উপবেশনে, নিদ্রান্তে, ও গৃহের অভ্যন্তরে উহার বৃদ্ধি, নর্তনে বা দ্রুত ভ্রমণে হ্রাস

জীবনী-ক্রিয়ার বিকৃত বিবৃতি, অত্যন্তমাত্র নড়িলে চড়িলে উত্তাপাবেশ, তৎসহ উৎকর্ষ ও শ্রান্তি; তৎপরে সর্ব শরীরে ঘর্ষ; নিবৃত্ত-রজস্কতা (ল্যাক, স্রাব, সলফ, টিউব), বস্তি গহ্বর-স্থিত বস্তু হইতে উত্তাপের উৎপত্তি

চর্ম্মের কণ্ডুয়ন; নানী অঙ্গের কণ্ডুয়ন; বাহ্য জননাস্রের কণ্ডুয়ন, কণ্ডুয়নে উপশম জন্মেনা, বয়ঃ আলায় পরিবর্তিত হয় (সলফ)।

উপচয় —অপরাক্ষে বা সায়াক্ষে, শীতল বায়ুতে অথবা শুষ্ক পূর্বমিকের

বাতাসে, স্নানমাতিশায্যে, বিশ্রামে, আর্দ্র নিবাস্ত গ্রীষ্ম সময়ে; বাড়বজের পূর্বে; বৃদ্ধি

উপশাম।—স্বাভাৱ উত্তাপ, উষ্ণ বাহ্য প্রয়োগে; ও প্রবল শারীরিক পরিশ্রমে, হ্রাস অনেক লক্ষণ বিশেষতঃ মস্তক, হৃৎপিণ্ড ও বহিঃগহবরের লক্ষণ বিশ্রাম ও ব্যায়াম উভয়েই বৃদ্ধি ও উপশমিত হয়।

সম্বন্ধ।—(১) ল্যাক্সিমিউরের সহিত অল্পপুরুষ সম্বন্ধ (২) ল্যাক্সিমিসের সহিত প্রতিকূল সম্বন্ধ, ল্যাক্সিমিসের পূর্বে বা পরে সিপিয়া ব্যবহৃত হয় ন পলসেটিলার সহিতও প্রতিকূল সম্বন্ধ, পলসেটিলার সহিত কখনও সিপিয়া পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয় না (৩) সিলিশিয়া ও সলফারের পরে প্রায়ই সিপিয়া উপযোগী হয় (৪) সিপিয়ার এক মাত্রার আরোগ্য-ক্রিয়া অনেক সময় বহু সপ্তাহ পর্যন্ত থাকে। (৫) অতিরিক্ত তাত্রকূট সেবনের মানসিক ফল এই ঔষধে নিয়ন্ত্রিত হয়। (৬) বসিয়া বসিয়া থাকার ও অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ক্ষুণ্ণে এই ঔষধ উপকারী।

সিফিলাইনঃম।

(Syphilinum)

অস্বকার হইতে দিবালোক পর্যন্ত বেদনা; গোষ্ঠুগি সময়ে হইতে আরম্ভ ও দিবালোকে পরিসমাপ্ত (মার্ক, ফাইটো)।

ক্রমে ক্রমে বেদনার বৃদ্ধি ও হ্রাস (ষ্ট্যাণ), স্থান-পরিবর্তনশীল বেদনা, তজ্জন্ত রোগীর বারংবার অবস্থান-পরিবর্তন করিতে হয়।

রাত্রিতে সমস্ত লক্ষণের আতিশয্য (মার্ক); সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত বৃদ্ধি

উদ্বেদ।—নিশ্বেদ, আরক্ত, তাত্রবর্ণাচ্ছ, দীপ্ত হইবার সময় নীলবর্ণধারণ সর্কশরীরের অত্যন্ত দীর্ণতা (এন্ট্রোট, আইওড)।

হৃৎপিণ্ড —রাত্রিতে হৃৎপিণ্ডের ভূমিদেহ হইতে শিথর দেশ পর্য্যন্ত কর্তনবৎ বেদনা (শিথর হইতে ভূমি পর্য্যন্ত, মেডো , ভূমি হইতে কণ্ঠাশ্রি বা শঙ্ক পর্য্যন্ত, স্পিঞ্জি) ।

স্মৃতিহীনতা পুস্তক, ব্যক্তি ও স্থানের নাম স্মরণে রাত্রিতে পারা যায় না ; গণিতের গণনা কবায় অয়াস (difficulty) জনে

অমুভূতি যেন উন্মাদ হইবে ; যেন পক্ষাঘাত জন্মিবে, একপা অমুভব ; উদাস অমুভব

নিদ্রা হইতে জাগরণান্তে মানসিক ও শারীরিক অবসন্নতা জনে এলিয়া রাত্রির ভয়ঙ্কর ভয় ; উহা সহ্য হয় না, বরং মৃত্যু শ্রেয়ঃ বোধ হয়

জাগরণান্তে অবসন্নতাজনিত ভয়ঙ্কর যাতনার আশঙ্কা (ল্যাক , প্রদর ; প্রভূত আব, নেকড়া ভিজিয়া, শুড়মুড়া পর্য্যন্ত বাহির পড়ে (এসম)

স্বাসবীর প্রকৃতির শিরঃপীড়া, উহাতে রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা ও প্রলাপ ; অপরাহ্ন চারিটার সময় আরম্ভ, ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত আতিশয্য এবং দিবালোকে নিবৃত্ত (রাত্রি ১১ বা ১২ টার সময় বিরতি, লাই) ; কেশ-পতন ।

নবজাত শিশুদিগের তরুণ চক্ষু-প্রদাহ ; চক্ষুর পাতার ক্ষীণতা, নিদ্রাকালে উহার সংযোজনা ; রাত্রিতে বেদনার তীব্রত, রাত্রি ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত উহার আতিশয্য ; প্রভূত পুষ্টি নিঃসরণ ; শীতল জলে প্রক্ষালনে উপশম ।

অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত —উপরের তীক্ষ্ণ পেশীর (Superior oblique) পক্ষাঘাত ; চক্ষুর পাতা অবনত হইয়া থাকিতে নিদ্রিতেই ত্রায় দৃষ্ট হয় (কষ্ট, গ্রাফ) ।

যুগল-দৃষ্টি, এক প্রতিরূপের নিম্নে অত্র প্রতিক্রম দৃষ্ট হয় ।

দন্ত ।—দন্ত-মূলের প্রান্তভাগে দন্তের ক্ষয় প্রাপ্তি ও ভাঙ্গিয়া পড়া ; দন্তে গর্ভ হইয়া যাওয়া, উহার প্রান্ত ভাগ করাতের দাঁতের ত্রায় কাটা-কাটা ; দন্তের আকৃতির খর্বতা প্রাপ্তি, অগ্রভাগগুলির একই বিন্দুর অভিমুখে গতি (ষ্ট্যাফ)

যে কোন আকারে এলকোহল পানের আকাঙ্ক্ষা ।

পিতৃদোষ জনিত যদিরা দোষের প্রাবল্যতা (এসার, গোরি, টিউবার, মল, মল-এসি)।

অনেক বৎসর ব্যাপী হৃদয়া মল-বৃদ্ধি, সরসাজ সংক্ৰান্তি (sludges) দ্বারা আক্রান্ত হইয়া হয়; পিকচারী দিলে মল নিঃসরণের যাতনা প্রায়শ-বেদনার জায় অধুভূত হয় (লাক-ক্যা, টিউব)।

মলধারে ও সরসাজে বিদারণ (Fissures) (থুজা); সরসাজ বাহির হইয়া পড়া; উপদংশের পূর্ণ বৃত্তান্ত, রোগের হৃদয়তা।

স্কন্ধ-সন্ধি, বা স্কন্ধের ত্রিকোণ পেশীর (deltoid) সংযোগ-স্থলে আমবাত, বাহু পার্শ্বের দিকে উঠাইলে উহার আধিক্য (রসটক্স — দক্ষিণ স্কন্ধ, স্ফাঙ্গ, বাম, ফির)।

উপদংশের রোগে অত্যন্ত সুনির্বাচিত ঔষধেও স্থায়ী উপশম বা উপকারের অভাব।

উপদংশগ্রস্ত যে সকল রোগীর কঠিন উপদংশ (chancre) স্থানিক ঔষধ প্রয়োগে চিকিৎসিত হইয়াছে, এবং উহার ফলস্বরূপ যাহারা অনেক বৎসর পর্যন্ত গলার ও চর্মের রোগ ভোগ করিয়া আসিতেছে, অথচ কোন ঔষধের সহিত স্পষ্ট মাদুগ না থাকিলে, চিকিৎসার প্রারম্ভে এই ঔষধ ব্যবহারে প্রায়ই তাহাদের উপকার দর্শে।

উপচয়।—রাত্রিতে, গোখুল সময় হইতে দিবালোক পর্যন্ত বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ।—অস্থি-রোগে ও উপদংশীয় পীড়ার অরম, এসাক, ক্যাণী-আই, মাক, ও ফাইটোর সহিত সমগুণ স্বন্ধ।

সিম্ফাইটম।

(Symphytum)

ভগ্নাস্থির সংযোজনায় এই ঔষধে সুসাধাতা আছে (কাব-ফল); কণ্টক-বেধনবৎ বিশেষ বেদনা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়; ভগ্নাস্থি সংযোগের মূল কোমল উপাদানের উৎপত্তির অধিকুলতা আছে।

ভগ্নাঙ্গির বিচ্ছেদ-স্থানের উপবাহিতা, অভিব্যক্ত আরোগ্য প্রাপ্তির পরে অস্থি-বেষ্টের বেদনা

ভৌতিক উপঘাত (mechanical injuries), অগ্নি-গোলাকে আঘাত, ঘৃষ্টতা, খোঁচা

সুগ-মুখ জ্বরের আঘাতের পর চক্ষু বেদনা ; বরফের গোলায় চক্ষু আঘাত লাগা ; মাতার চক্ষু শিশুর হাতের মুষ্টির খোঁচা (চক্ষুর চতুর্দিকস্থ কোমল বিধানতন্ত্রে খোঁচা, আর্গ)

সম্বন্ধ ।—(১) আর্গ, ক্যালেক্স, ক্যান্থ-ফস, ফ্লোরি-এসি, হিপ, ও সিলির সহিত সমগুণ সম্বন্ধ (২) কণ্টক-বেধনবৎ বেদনায় এবং উপঘাতের পরে অস্থি-বেষ্টের স্পর্শ-দেয়ের অবশিষ্টতায় আর্গিকার পরে সিলফাইটঃম ভাগ খাটে ।

সিলিশিয়া ।

(Silicea)

স্নায়বীয়, কোপন-স্বভাব, রক্ত-প্রধান ; গণ্ডমালা-ধাতুর ব্যক্তিদ্বিগের পক্ষে সিলিশিয়া উপযোগী

খাদ্য জ্বরের গুণ বা পরিমাণের জটিলতঃ নহে কিন্তু সমীকরণের (assimilation) অসম্যকতা নিবন্ধন শরীরের পরিপোষণের অসমভাবে অপরিপুষ্টি (ব্যারাকা, ক্যান্থ) ; এবং অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক অমুভূতি

বৃহৎ মস্তক বিশিষ্ট, গণ্ডমালা-দোষ ছষ্টে, রিকেট-রোগ-গ্রস্ত বালক বালিকা ; ব্রহ্মবন্ধু ও সেবনী-সন্ধির বিমুক্ততা ; মস্তকে, সমধিক ঘর্ম (ক্যালকেরিয়া অপেক্ষা নিম্নতর অংশে), বাহ্যিক আবরণে মস্তক উষ্ণ রাখিবার আবশ্যকতা (স্থানিক) ; বৃহৎ উদর ; দুর্বল গুলফ, হাঁটিতে শিথিলে বিলম্ব

সমুজ্জল মুখাকৃতি ; স্ফূর্ণ, শুক ত্বক্ ; পাঞ্জুর মুখমণ্ডল, শিথিল পেশীবিশিষ্ট দুর্বল শরীর

পায়ের ঘর্ষণের বিষুপ্তি (কুপ, গ্রাফ, মোরি) ; মস্তক বা পৃষ্ঠে সামান্য বায়ু-প্রবাহ লাগান, ও গো-বীক্ষে ঢাকা গ্রহণ (থুয়া) বশতঃ রোগ ; প্রান্তর কষ্টক-দিগের বক্ষোরোগ, তৎসহ শক্তির সম্পূর্ণ অভাব ।

স্বাভাবিক শারীরিক উত্তাপের অভাব, সর্বদাই শীত, এমনকি ব্যায়াম-কালেও শীত (লিড, মিলি)

স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ; কোন জীবনী-ক্রিয়ার বিকৃত বিহঙ্গি সহকারে অবসন্নতা ; কঠিন পরিশ্রম ও আবদ্ধ থাকা বশতঃ উহার উৎপত্তি, শ্রান্তি, শয়ন করিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি ; ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা উহার পরাভব

কোমল বিধান-তত্ত্ব, অস্থি-বেষ্ট অথবা অস্থি প্রভৃতির পুষ্টোৎপত্তির প্রতি মিলিশিয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা, এতদ্বারা ফোটোকার্বনে পুষ্টোৎপত্তি জগিয়া উহা পক হয় অথবা ত্রণাদির অতিরিক্ত পুষ-প্রাব দ্বারা প্রাপ্ত হয় (প্রধানতঃ কোমল বিধান-তত্ত্বের আক্রমণ, ক্যালোজ, হিপ) ।

শিশুদিগের অবাধ্যতা ; অবিমূষ্যকারিতা, সদয়ভাবে কিছু বলিলেও ক্রন্দন (এন্ট-টা, স্থানিক, আইওড)

অস্থিরতা অতঃপূর্বে শব্দে চর্মকিত হইয়া উঠা ।

আকুলতা, নমনীয়তা, সাহসহীনতা ।

মানসিক পারিশ্রমে আত্মীয় আগ্রাস ; লেখা পড়ায় আশ্রয় উৎপত্তি, চিন্তা করিতে পারা যায় না ।

শারীরিক উত্তাপের অভাব, সর্বদাই শীতানুভব, এমনকি শারীরিক শ্রমেও শরীর উত্তপ্ত হয় না ।

পৃষ্ঠবংশজ শিরোগূর্ণন, গ্রোবা-পৃষ্ঠ হইতে মস্তক পর্যন্ত উহার উৎপত্তি ; যেন সম্মুখ দিকে পাড়িতে হইবে একজন অসুস্থ ; উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে শিরোগূর্ণন (পলস ;—নিম্নদিকে দৃষ্টিপাতে, ক্যালমি, স্পিজি) ।

যৌবনকালের কোন উৎকট পীড়ার পর হইতে পুরাতন সবময় শিরঃপীড়া (মোরি) , ঘাড় হইতে মস্তকের শিখর পর্যন্ত উহার উৎপত্তি, বোধ হয় যেন পৃষ্ঠবংশ হইতে সমাগত হইয়া এক চক্ষে, বিশেষতঃ দক্ষিণ চক্ষে উহার স্থিতি (বাম চক্ষে, স্পিজি) ; বায়ু-প্রবাহে কিংবা মস্তক অনাবৃত

বসিয়া রাখিলে উহার বৃদ্ধি ; ৮৭ দিনে ও উষ্ণবস্ত্রে জড়াইয়া রাখিলে ক্রাস
(মাগ-মি, ষ্ট্রন) , প্রভূত ১৭-জাবে উপস্থিত ।

সর্বদা ধাতুর পূর্বের ও ধাতু-কালে কোষ্ঠবদ্ধতা (ধাতুর পূর্বে
ও ধাতু-কালে অতিসার, ক্রম-কা, বোভ) ; সরলান্তের নিষ্ক্রিয়তার ন্যায়
মল ৩৭গে সরলান্তের ৭ কাষাতবৎ অতিশয় কুশন, মলের খানিকটা বাহির
হইয়া পুনরায় ভিতরে প্রবেশ (থুলা) , সরলান্তে অনেকক্ষণ মলের
অবস্থিতি

বক্ষোলক্ষণের সহিত পর্যায়ক্রমে গুল্মজং (বার্ক, ক্যাক-ফ)

প্রত্যেকবার ১ স্তান স্তন-পান কালে অপত্য-পথ হইতে রক্ত-জাব
(ক্রোট-টিগ তুলনা করুন)

স্তন-বৃন্ত যিটির আকারে আকৃষ্ট হয় (সাস') ।

স্বপ্ন সঞ্চরণ (নিশিপাণন) , নিম্নিত অবস্থায় উঠিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ,
অনন্তর পুনরায় শয়ন (ক লী-ব্রোম)

অসুস্থ ভক ; প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপঘাতে প্ৰয়োৎপত্তি (গ্রাফ, হিপ,
মার্ক, পেট্টে) ।

হস্ত ও পদের অঙ্গুলীর নথের খণ্ডতা (এণ্ট-ক্র)

পা অনারত রাখিলে * দ্বি লাগে (কোনা, কুপ)

হাত পা, পায়ের অঙ্গুল এবং কক্ষ-তলের ঘর্ষ ; দুর্গন্ধ ঘর্ষ ।

প্রতিদিন সামান্যে ঘর্ষবাতীত পদবয়ের অয়, পচামাংসের ন্যায় অমহ্য দুর্গন্ধ ।

ম্যাগ্নিটাইজড্ হইবার (অয়স্ফাস্ট-ম স্কি-সঞ্চারণের) ইচ্ছা, উহাতে উপশম
(ফস)

বিধান-তত্ত্ব হইতে মাছের কাঁটা, সূচী, হাড়ের চোঁচ ও ভুতি শৈল্য নিষ্কাশনে
এতদ্বারা সহায়তা হয় ।

অশ্রুজাবী গ্রন্থির নালী-স্রব ; কুলী (ম্যাগ-ফস, ম্যারম) ; অঙ্গুল-হাড় ;
রক্ত-স্ফোটক , কার্ককল ; সকল প্রকার ক্ষত । নালী-স্রব, উহাতে বেদনা,
দুর্গন্ধ, উচ্চ সাস্তর প্রান্ত (high spongy edges) , ও মাংসাস্তর ; মল-স্রাব-
বিদারণ (গুল্ম-বিদারী) ; মলত্যাগান্তে অতিশয় যতন ।

গীবা, কক্ষ, কর্ণ, তুল, বক্ষঃ প্রভৃতির দৃষ্টির পদার্থ ও পুষ্টিপদার্থ ।

উপচয় ।—শীতলতায় ; ঋতু-কালে , অমাবস্যা-ব সময়ে ; অনাবৃত হইলে , বিশেষতঃ মস্তক অনাবৃত করিলে ; এবং শয়ন করিলে বৃদ্ধি

উপশম ।—উষ্ণতায় বিশেষতঃ মস্তকে বজ্র ঝড়াইলে , আশ্মাশ্মিক লক্ষণ ব্যতীত অস্ত্রাণ্ডা সমস্ত লক্ষণের উপশম , আশ্মাশ্মিক লক্ষণ শীতল আহারে বর্ধিত হয় (লাই)

সম্বন্ধ । (১) থুলা ও স্থানিকিউলার সহিত ঘনুপূরক সম্বন্ধ (২) সিলিসিয়ার পরে লাইকো , সিলি , ফ্লোরিক এসিড ও হিপার ভাল খাট । (৩) সিলিসিয়ার সহিত হিপ , পিক-এসি , ক্যালো-ফস , হাইপার , রটা , স্থানিকিউ , ও গেটিনবার্গের তুলনা হয় (৪) কাল্ফ গ্রাফ , হিপ , লাই-এসি ও ফসের পরে সিলি ভাল খাটে (৫) তরুণ অবস্থায় পলস ও পুরাতন অবস্থায় সিলির মাদৃশ-সম্বন্ধ

সেলেনিয়াম ।

(Selenium)

সুন্দর মুখাঙ্গীত ; এবং বদন , হস্তদ্বয় , অন্তর্ভাগ , পদদ্বয় ও এক এক অঙ্গের শীর্ণতা

কাথো অতিশয় বিস্মৃতি , কিন্তু নিজ কালে স্বপ্নে উচ্চারণ

শিরোবেদনা —মদিরাপায়ীদিগের শিরোবেদনা ; ব্যাভিচারের পর ; লেমনেড , চা ও সুরাপানের পর ; প্রতিদিন অপরাহ্নে , শিরঃপীড়া

মস্তক , প্রাণ , গোপ , ও অনন্যঙ্গের কেশ-পতন

প্রতিশ্রুতের অতিশয়ে ৭ রিগমাণ্ড

রাজিতে ক্ষুধা (গিনা , মোরি) ; উগ্র মদিরা পানে স্পৃহা , প্রায় অদম্য আকাঙ্ক্ষা

কোষ্ঠবদ্ধতা । শক্ত অবরুদ্ধ মল , হাতদিয়া বাহির করিতে হয়

(এলো, ক্যাক শ্যানি-কিউ, সিলি, সিলি) , গুরুতর রোগে, বিশেষতঃ আন্ত্রিক (enteric) জ্বরের পর উহার উৎপত্তি ।

মূত্র—লোহিত, মলিন, স্বচ্ছ ; ও স্থূল, লোহিত, রেণুময় অধঃপতিত পদার্থ বিশিষ্ট মূত্র ; বিচরণ-কালে অনিচ্ছায় বিন্দু বিন্দু মূত্র-পাত ।

লিঙ্গ সংযুক্ত ধ্বজভঙ্গ ; অশ্লীল চিন্তা, কিন্তু শারীরিক অসামর্থ্য (আকস্মিক ধ্বজভঙ্গ, ক্রোর) ।

ধীর, অপ্রচুর উদগম অনেকক্ষণ স্থায়ী পুলক সহকারে অতিক্রান্ত শুক্রপাত , সংসর্গের পর দুর্বলতা, বদমেদাজ, প্রায়শঃ অনিচ্ছায় বিন্দু বিন্দু শুক্র ও প্রায়েটিক রসের নিঃসরণ এবং উপবিষ্ট অবস্থায়, মলত্যাগ কালে ও নিজাকালে, উহার ক্ষরণ ; লালা মেহ (gleet) (ক্যালাড) ।

কাম-প্রবৃত্তি পরিশূন্য প্রবল লিঙ্গোদগম, লিঙ্গমুণ্ডের উপরের দিকে আকৃষ্টতা (বার্ষ নীচের দিকে আকৃষ্টতা, ক্যাছ) ।

স্বর-নাশ (aphonia) —অধিকক্ষণ স্বরের ব্যবহারের পর স্বর-নাশ ; গান করিতে আরম্ভ করিবার সময় স্বরের ভগ্নতা ; পুনঃ পুনঃ গলা পরিষ্কার করিয়া স্বচ্ছ শ্বেতসারময় স্লেমা তুলিয়া ফেলিতে হয় (আঙ্জ-মে, ষ্ট্যাণ) ; টিউবারকিউলার ল্যারিঞ্জাইটিস ।

দৌর্বল্য, সহজে অবসন্নতার উৎপত্তি ; মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম জন্ত ; টাইফয়েড, টাইফস, বা অমিতাচারের পরে, উহার উদ্ভব ।

শুইয়া থাকিবার ও নিজা যাইবার দুর্নিবার ইচ্ছা ; সহসা শক্তির বিলোপ ; বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে ।

উষ্ণ, শীতল অথবা আর্দ্র সকল প্রকার বায়ুর প্রবাহেই অতিশয় অপ্রবৃত্তি ।

টাইফয়েড জ্বরের পরে মেরুদণ্ডের অতিশয় দুর্বলতা, পক্ষাঘাত জন্মিবার আশঙ্কা ।

রোগাক্রান্ত স্থানের শীর্ণতা প্রাপ্তি ।

উপচয়—বায়ু-প্রবাহে ; সূর্যের তাপে এবং লেমনেড, চা বা জুরাপানে ; বৃদ্ধি

উপশম ।—মুখে শীতল জল বা শীতল বায়ু গ্রহণে , দ্রাস ।

সম্মুখ্য । --(১) অনন ও মূত্র-যজ্ঞের লক্ষণে, এবং খাস-যজ্ঞের লক্ষণে ফসের সহিত, গায়ক ও বক্তাদিগের স্বর-যজ্ঞ-প্রদাহে আজ্জ-মে ও ঠানের সহিত; এবং কঠিন মল, নিশ্চেষ্ট সরলাঙ্গ লক্ষণে এলামের সহিত সেলেনের তুলনা হয়। (২) ইন্ডিয় দৌর্ধ্বল্যে, ক্যালাড, ছাট, ষ্ট্রাফ, ও ফন-এসির পরে সেলেন ভাল থাকে। (৩) পারদঘটিত ঔষধ বা গয়ক দ্বারা পাঁচড়া বসিয়া গেলে অনেক সময়ই সেলেনের প্রয়োজন পড়ে।

সোরিনগম ।

(Psorium)

সোরা-ধাতু-ছষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী

পুরাতন রোগ-চিকিৎসায় যখন স্নিগ্ধাচিত্ত ঔষধে কোন উপকার বা স্থায়ী ফল দর্শে না (তরুণ রোগে, সতর্ক) ; এবং যখন রোগীতে সলফার উপযোগী মনে হয় কিন্তু সলফার ব্যবহারে কোনও ফল প্ৰাপ্ত হয় না।

তরুণ রোগের ভয়ঙ্কর আক্রমণের পরে প্রতিক্রিয়ার অভাব।

পাণ্ডুর, স্ফুমার ও রুগ শিশু শিশু রুগাবস্থায় দিবারাজি কোনও সময় ঘুমায়ে না, কেবল জাগ্রতন করে, থিট থিট করে ও জন্মন করে (জ্যালাপ) ; স্নানর প্রকৃতির বালক বালিকা, সারাদিন খেলা করে, অশান্ত, বিরক্তিপ্রদ, সারারাজি চিকিৎসার কারী, শিশু (লাইকোর বিপরীত)।

শারীর-রসের ক্ষয় বশতঃ তরুণ রোগের পরবর্তী শারীরিক যন্ত্রাদির বিকার ব্যতীত বা স্বপ্নভূত, অথবা দৃশ্যমান কোনও কারণ ব্যতীত ; অতিশয় দুর্বলতা ও পানি।

জান করা সত্বেও শরীরে দুর্গন্ধ।

সমগ্র দেহের বেদনা, সহজেই শরীর ঘুট ও আঘাতিত হইয়া থাকে।

শীতল বায়ুতে বা বাতাতপের পরিবর্তনে অত্যন্ত অনুভবা-

ধিক্য ; প্রথর গ্রীষ্মকালেও পাণকের টুপী, ওভার কোট বা শাল ব্যবহার।

ঝড়ের সময়ের তীব্রতাহ্রতব ; ঝড়-বজ্রকালে বা উহার কতিপয় দিবস পূর্ব হইতেই অস্থিরতা বোধ (ফস) ; গ্রীষ্মকালে অন্তর্হিত ও শীতকালে প্রত্যাবৃত্ত শুষ্ক, সশক উদ্ভেদ ।

পাঁচড়া বা অপর কোনও চর্মরোগ বসিয়া গিয়া নানাবিধ উপসর্গ উৎপন্ন হইলে এবং সলফার ব্যবহারে উপশম না জাগিলে ; যৎসামান্য মানসিক আবেগে (emotion) উৎপন্ন ভয়ানক রোগ

রোগাক্রমণের পূর্বদিন অস্বাভাবিকরূপ ভাল বোধ ।

তীব্র সোরা-বিষ-ছঃ রোগী ; নাস্তবিকতা, অস্থিরতা, সহজেই চকিততা ।

অতিসার, প্রদর, ঋতু, ষর্ষ প্রভৃতি সকল প্রাবেরই শবের ন্যায় দুর্গন্ধ ।

উৎকর্ষা, ভয়পূর্ণতা ; পূর্বেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মন বলা ।

ধর্মবিষয়ক বিষয়তা ; অত্যন্ত অবসাদ, আত্মহত্যার ছঃথ জনক চিন্তা ; মুক্তি সম্বন্ধে (মেলি) ও আরোগ্য সম্বন্ধে নৈরাশ্য ।

হতাশা —রোগী মরিয়া যাইবে বলিয়া এবং তাহার কারবারে লোকসান হইবে বলিয়া ভীত হয় ; রোগের চরমকালে হতাশা ; নিজের জীবন ও তাহার আত্মীয় স্বজনের জীবন ছঃসহ করিয়া তোলা ।

তীব্র কণ্ঠস্বন সহকারে আরোগ্যাশা পরিশূন্যতা

শিরঃপীড়ার পূর্বে চক্ষুর সম্মুখে ঝিলিমিলি দর্শন, দৃষ্টির ক্ষীণতা বা অন্ধতা (ল্যাক-ডি, কালী-বাই) ; কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু অথবা মণ্ডল দর্শন ।

শিরোবেদনার সময়ে সবর্বদাই ক্ষুধাবোধ ; আহারকালে বেদনার হ্রাস ; উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া অথবা ঋতু হইয়া শিরোবেদনা ; নাসিকা হইতে রক্ত পাতে বেদনার হ্রাস (মেলি)

শুক, চাকচক্য পরিশূন্য, সহজেই জড়াইয়া যায়, 'জটা বাঁধিয়া যায় (লাই) এরূপ ; চুল । কেশ রোগ (Plica Polonica, পোল্যান্ড দেশীয় কেশ-রোগ বিশেষ) (ব্যারা, সান্সা, টিউব)

শুক, সশক বা আর্দ্র, দুর্গন্ধ পূর্ণ-পূর্ণ পীড়কা বিশিষ্ট, মস্তক-জক ; পীড়কা হইতে একপ্রকার আঠা আঠা ; দুর্গন্ধ রসস্ফরণ (গ্রাফ, মেজ)

অগ্নি-পুটের প্রদাহ সংযুক্ত তীব্র আলোক-দেহ, চক্ষু মেলিতে অসামর্থ্য ;
বালিশে মুখ ঝুঁজিয়া শয়ন ।

কর্ণ কানের উপরে ও পশ্চাতে আর্দ্র খুসকি এবং অবদারণ, দুর্গন্ধ আঠা
আঠা স্রাব নিঃসরণ (গ্রাফ)

কর্ণ-স্রাব —পাতলা, রসানির মত, পচা মাংসের ছায় ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ স্রাব ;
হাম বা কালোটিনার পরবর্তী পুরাতন কর্ণস্রাব ।

বয়ঃপ্রঃ —সাধারণ ও গোলাপী সকল প্রকারের ; ঋতুকালে, কফি, চর্কি,
চিনি ও মাংসে উপচয় ; সুনির্ঝাচিত ঔষধেও যখন উপকার হয় না বা ক্ষণিক
উপশম জন্মায় ।

মধ্য রাত্রিতে ক্ষুধানুভব, কিছু না খাইয়া পারা যায় না (সিনা,
সলফ) ।

পচা ভিষের গন্ধ বিশিষ্ট উদ্গার (আর্গ, এন্ট-টা, গ্রাফ) ।

তালু-মূল-প্রদাহ (Quinsy), টনসিলের অতিশয় ক্ষীণতা ; গিলিতে
কষ্ট ও বেদন, জালা ও দগ্ধবৎ অনুভব ; চিহ্নিত্বের সময় কর্ণ পর্যন্ত প্রসারিত,
কর্তন ও ছেদনবৎ তীব্র বেদনা (বেদনা শূল, ব্যারাক) , প্রভূত দুর্গন্ধ লালা ;
গলায় শক্ত স্ফেয়া, অনিরত থক থক করিতে হয় । এই ঔষধ এই রোগের তরুণ
আক্রমণেই যে কেবল উপশমপ্রদ এমন নহে, তালু-মূল-প্রদাহ প্রবণতার
মূলোচ্ছেদেও এই ঔষধ কার্য্যকারী

শবগন্ধি, বিসাদ, মটরের আকারের পানীরের ডেলারমত দলাদল স্ফেয়া থক
থক করিয়া কাসিয় উঠাইতে হয় (কালী-মি) ।

অতিসার ।—সহস, প্রবল (এলো, সলফ) ; জলবৎ কপিলবর্ণের,
পচা শবেরমত গন্ধ বিশিষ্ট মল ; অনিচ্ছায় নির্গত, রাত্রি ১টা হইতে ৪টার
মধ্যে উপস্থিত ; সাংঘাতিক তরুণ রোগের পরবর্তী ; দস্তাদগমকালে ; বাণক
বালিকাদিগের ঋতুপরিবর্তনের সময় অতিসার

কোষ্ঠ বদ্ধ । কটবেদনাসহকারে, দুর্দমনীয়, সরলাস্ত্রের নিজ্জিহতা বশতঃ
সমুৎপন্ন, কোষ্ঠকাঠিন্য ; সলফার বিফল হইলে এই ঔষধে উপকার হয়

মূত্রাশয়ের আংশিক পক্ষাঘাত বশতঃ পূর্ণিমার সময়ে উপস্থিত, একজিমা-
রোগে আক্রান্ত পারিবারিক ইতিবৃত্ত সম্বলিত দুর্দম্য ; অব্যাহত মূত্র

বহুবৎসরের পুরাতন প্রমেহ, উহা আরোগ্যও হয় না প্রদগ্ধিতও হয় না ;
অনির্বাচিত ঔষধেও ফল না দর্শিলে

বৃহৎ, ছর্গন্ধ, সংযত (চাকাচাকা) শব্দ ; ত্রিকাস্থিতে (Sacrum) তীব্র
বেদনা ; দৌর্বল্য ; রক্তঃ নিষ্কৃতির সময়ে ; শ্বেত প্রদর ।

গর্ভাবস্থায় হৃদম্য বমন, জ্বরের অতিক্রান্ত সঞ্চালন ; যখন অনির্বাচিত ঔষধে
কোনও উপকার হয় না গর্ভস্থ শিশুর সোণাধাতুদোষ দূর করিতে এই ঔষধ
ব্যবহৃত হয়

সকল যন্ত্রণার শান্তি সহকারে (কাণাড, ছাট-মি) তরুণ
রোগের পরবর্তী প্রভূত ষর্মাশ্রাব

শ্বাসরোগে (হাঁপানি) শ্বাস ক্রুদ্ধঃ—বিযুক্তবায়ুতে উঠিয়া বসিলে বুদ্ধি (লরো) ;
শয়ন করিলে ও ছই বাছ ছইদিকে অতিদূরে প্রসারিত করিয়া দিলে
উপশম (আসেনিকের বিপরীত) ; নিরাশা, রোগী মনে করে সে আর বাঁচিবে না ।

প্রতি শীতকালে কাসের আক্রমণ

ঔষধিগন্ধজ-জ্বর (Hay fever) —শ্বাসকাস মোরা বা পামার ইতি-
বৃত্ত সহকারে প্রতিবৎসর নিয়মিতরূপে কাসের একই দিনে প্রত্যাঘর্জন রোগের
গ্রীষ্মকালের আক্রমণ নিবারণার্থে ও রোগের ধাতুদোষ খালনার্থে পূর্বে শীতকালে
চিকিৎসিত হওয়া আবশ্যক ।

কাসি —একজন্ম অথবা পাঁচড়া বসিয়া যাইবারপরে বহুবৎসরের পুরাতন ;
প্রাতে নিজ্জা হইতে আগরণান্তে ও সম্যায় * মনে বিবর্জিত (ফস, টিউব) ; হরিৎ, গীত
বা লবণাক্ত মিষ্টবন বিশিষ্ট ; পুষ্পেরছায় ; মিষ্টবন ত্যাগের পূর্বে অনেককণ
ধরিয়া কাসিতে হয় একরূপ ; কাস

চর্ম —চর্মরোগে অক্রান্ত হইবার অস্বাভাবিক প্রবণতা (মলক) ; উদ্ভেদে
সহজেই পুষ্পোৎপত্তি (হিপার) প্রবণ শুষ্ক, নিষ্ক্রিয়, কচিৎ ঘর্ষা সংযুক্ত
নোংরা, মনেহয় কখনও প্রক্ষালন করা হয়না একরূপ কর্কশ, আঠা আঠা,
তৈলসিক্তবৎ ; গন্ধক ও মীসার মলম ব্যবহারের মন্দফল সংযুক্ত ; চর্ম

হৃদম্য কণ্ডূরন, অথবা চোর ভাঁকাত ও বিপদের ভয়পূর্ণ স্বপ্ন (ছাট-মি)
সংযুক্ত নিজ্জাহীনতা

সোরা বা সোরাধাতুদোষের অর্থাৎ যে কেবল সোরিণঃম ব্যবহৃত হইবে তাহা নহে, অপরাপর ঔষধের মত লক্ষণ সমষ্টির সহিত মিলাইয়া ইহা ব্যবহার করিতে হয়, এবং তখনই আমরা ইহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি।

সম্বন্ধ।—সলফার ও টিউবারকিউলিনামের সহিত অম্লপূরক সম্বন্ধ

এলুমি, বোরা, হিপার, সলফ, টিউব, সোরিণঃমের পরে ভাল খাটে।

গর্ভাবস্থার বমনে ল্যাটিক এসিডের পরে ; ডিম্বাশয়ের আন্তিস্ফাতিক রোগে আর্নিকার পরে সোরিণঃম ভাল খাটে।

স্তনের ক্যান্সারে সোরিণঃমের পরে সলফার ভাল কাজ করে।

J.B Bell—“বিগত স্বর্ণ অথবা অতিশয় ঘৃণ্য যে কোনও বস্তু হইতেই ঔষধ প্রস্তুত হউক ন কেন, উহার আশ্চর্য্য কার্য্যকারিতা শক্তির নিকট আমরা কৃতজ্ঞ, উহা কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানিবার কোনও আবশ্যক করে না।”

স্পঞ্জিয়া টোস্টা।

(*Spongia Tosta*)

ওটিকা-ধাতুতে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। পাতলা চুল, শিথিল দেহ-তন্তু, স্কলর মুখাকৃতি বিশিষ্ট (ব্রোম) বালক-বালিকা ও জী-লোকনিগের পক্ষে স্পঞ্জিয়া বিশেষ উপযোগী

গ্রন্থির ক্ষীণতা ও দৃঢ়তা ; গলগণ্ড (ব্রোম)।

ভীত হইয়া নিজা হইতে আগরন এবং শ্বাস-রোধ অনুভব ; বোধ হয় যেন স্পঞ্জের অন্ত্যস্তর দিয়া শ্বাস-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে।

প্রত্যেক মানসিক উত্তেজনার কাসের বৃদ্ধি

নিজাশ্ব বা নিজ যাইতে যাইতে বৃদ্ধি (ল্যাক)।

গলা-ব্যথা, মিষ্টজব্য আহারে উহার বৃদ্ধি গল-গ্রন্থির ক্ষীণতা ; তৎসহ স্নাত্তিতে শ্বাস-রোধের আক্রমণ। গলগণ্ড।

গল মধ্যে স্বরযন্ত্র, কণ্ঠনালী, বায়ু-নলী-ভুজ (bronchi) প্রভৃতি বায়ু-পথের
মৈথিলিক ঝিল্লীর অতিশয় শুষ্কতা—“যেন শূঙ্গের চায় শুষ্ক ”

কাস — শুষ্ক, কুকুর-রববৎ, জুপ-রোগের কাস ; উহার ঘর্ষণসদৃশ বন বন
শব্দ বিশিষ্ট, সাঁইসাঁই, শুন শুন সংযুক্ত কাস ; সকলই সম্পূর্ণ শুষ্ক,
শ্লেষ্মার ঘড়ঘড় শব্দ শুন যায় না ।

কাস ।—দেবদারুণ তক্তার ভিতর দিয়া করাত টানার মত
শুষ্ক হিস্ হিস্ শব্দ বিশিষ্ট কাস, মিষ্টিদ্রব্য, শীতল পানীয়,
ধূমপান, মাথা নীচু করিয়া শয়ন ও শুষ্ক, শীতল বাতাসে
উহার আধিক্য ; পঠনে, গানে, আলাপনে, ও গলাধঃকরণে বৃদ্ধি ; উষ্ণদ্রব্য
আহারে বা পানে হ্রাস

জুপ —আকুলিত সাঁইসাঁই শব্দ বিশিষ্ট, নিশ্বাস-কালে
বিবর্দ্ধিত (প্রথমে বিবর্দ্ধিত, একন) ; ও দুই প্রহর রাত্রির পূর্বে বর্দ্ধিত
(প্রাতঃ-কালের পূর্বে বর্দ্ধিত, হিপ) ; জুপ

হৃৎকম্প ।—যাতনা ও হাঁপানি সহকারে প্রবল হৃৎকম্প ; মধ্যরাত্রির পরে
শ্বাস রোধ ও ব্যাকুলতা সহকারে সহসা নিজা হইতে আগমন ; হৃৎকম্পাটের
অপ্রাচুর্য্য (valvular insufficiency) ; ধতুর পূর্বে ও ধতু-কালে
উপস্থিতি ।

হৃদশূল ; আকুঞ্চক বেদনা, উত্তাপ, প্রাণ্ডি, শ্বাস-রোধ, উৎকর্ষ ও ঘর্ম ;
মধ্য-রাত্রির পরে বৃদ্ধি ।

শুক্রবাহিনী নাড়ী বক্ষীততা ও ব্যথিততা ; অণ্ডকোষের ক্ষীততা, স্থূষ্টতা,
ও নিষ্পেষণ ; বিলুপ্ত প্রমেহ অথবা কুচিক্রিসিত অণ্ড-প্রদাহের পর উহার
উৎপত্তি ।

সম্বন্ধ —(১) কাস ও জুপরোগে, শুষ্কতার প্রধাতা থাকিলে একন,
ও হিপের পরে স্পঞ্জিয়া ভাল খাটে ; শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করিতে আরম্ভ করিলে
স্পঞ্জিয়ার পরে হিপার ভাল খাটে ; নিষ্ঠীবন মিথিল হয় কিন্তু রোগীকে
উহ গিলিয়া ফেলিতে হয়, এই লক্ষণে আর্গ, কষ্ট, আইওড, ল্যাক, ও নক্স-মর
সহিত স্পঞ্জিয়ার তুলনা হয়

স্পাইজিলিয়া ।

(*Spigelia*)

মৌরক্ত, দুর্বলভূত ; আমবাতিক শারীরিক প্রকৃতির ব্যক্তি ; এবং ক্ষুদ্র ও দীর্ঘ ক্রমি বিশিষ্ট গণ্ডমালা-ধাতু-দৃষ্ট বালক-বালিকাদিগের পক্ষে স্পাইজিলিয়া উপযোগী ।

লবু-কেশ ; পাণ্ডুর, গীণ, ক্ষীত, দুর্বল ; ও কুঞ্চিত, পীত, মূৰ্গদ্বক বিশিষ্ট ব্যক্তি ।

স্পার্শে শরীরের যাতনায়ুক্ত অনুভূতি ; স্পৃষ্টস্থানে শীতলতা অনুভব, স্পর্শে সর্ব শরীরের অভ্যন্তর দিয়া কম্পের সংকরন (কালী-কা) হঠাৎ আলপিন প্রভৃতি স্ফাট, ধারাল বস্তুর ভয় ।

হৃৎপিণ্ডের আমবাতিক রোগ (ক্যালী, লিড, স্ফাট) ; হৃদগ্রা প্রদেশে হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চনজনিত শব্দ । মমণীর অর্কুদ (aneurism) ।

স্নায়বীয় শিরোবেদনা — নির্দ্ধারিত সময়ে উপস্থিতি, মস্তিষ্কের ভূমিদেলে প্রাতে আরম্ভ, মস্তকের উপর প্রসারণ এবং বামদিকের চক্ষু, চক্ষু-কোটর ও শঙ্কায়ানে অবস্থিতি (দক্ষিণ পার্শ্বে, স্ফাট, সিলি) ; স্পন্দনজনক, দপদপকর, প্রবল বেদনা ।

সূর্যোদয়ে শিরঃপীড়া, মধ্যাহ্নে উহার চরম বৃদ্ধি, সূর্যাস্ত পর্যন্ত হ্রাস প্রাপ্তি (স্ফাট, ট্যাব) ।

অক্ষি-গোলকে অসহ্য প্রচাপনী বেদনা ; সর্বশরীর না ঘুরাইয়া চক্ষু ঘুরাণ ঘরনা, পা ফসকিয়া গেলে উহার বিশেষ আধিক্য ।

চক্ষু যেন গহ্বর অপেক্ষা অতিরিক্ত বৃহৎ একপ অসুভব (এক্ট, কোম) ; স্পার্শে অতিরিক্ত অনুভূতি ; মাথার চারিদিকে যেন বন্ধন রহিয়াছে এ প্রকার অসুভব (ক্যাষ্ট, কার্স-এসি, সলফ,)

নাসিকার পশ্চাভাগের রক্ত হইতে দুর্বল প্রচুর স্লেথ গলার অভ্যন্তরে পতন, তদ্বারা স্নায়িতে গল-রোধের উৎপত্তি (হাইড্রা) ।

অক্ষি-গোলকের অভ্যন্তর দিয়া পশ্চাদিকে মস্তকের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত তীব্র, বেধন, ও ভেদনবৎ শীতল, আর্দ্র, বাষ্ণুকালে উহার উৎপত্তি ।

মুখমণ্ডলের প্রায়শূল ; নির্দিষ্ট সময়ে উহার উপস্থিতি ; বামভাগের স্ফুটকোটর, চক্ষু, হৃদয় অস্থি ও দন্তের আক্রান্তি ; প্রাতঃকাল হইতে সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত অবস্থিতি, ছিঁড়িয়া যাওয়া ও আলার স্থায় বেদনা, গালের মলিন আরক্ততা ; শীতল, বাষ্ণু-কালে ; ও চা পানে উহার উৎপত্তি ।

তাত্রকূটের ধূম-পান জনিত দন্ত-বেদনা ; কেবল শয়ন করিয়া থাকিলে ও আহার-কালে উপশম (প্লাণ্ট) । শীতল বায়ু ও জলে বৃদ্ধি ; উহার বিষয় চিন্তা করিলে প্রত্যাবৃদ্ধি ।

স্থলান্তের শেষ বক্রাংশে (sigmoid) অথবা সরলান্তে কঠিন কক ট (scirrhous) উহাতে অসহ্য নির্দারক বেদনা (এলুমেন) ।

শ্বাস-ক্লম্ব ; দক্ষিণ পার্শ্বে অথবা মাথা উচ্চ করিয়া শয়নের আবশ্যিকতা (ক্যাঠি, স্পঞ্জ) ; বক্ষঃস্থলে হৃদী-বেধবৎ বেদনা ।

নাড়ীর স্পন্দনের সহিত যুগপৎ হৃদী-বেধবৎ বেদনা বিশিষ্ট বক্ষঃস্থলের রোগ, সঞ্চালনে ও শীতল আর্দ্র ঋতুতে উহার আতিশয্য ।

হৃৎকম্প ; প্রবল, দৃশ্যমান ও শ্রুতমান স্পন্দন ; অত্যন্ত মাত্র নড়িলে চড়িলে ; ও সম্মুখদিকে অবনত হইলে উহার উপস্থিতি ; হৃদগ্রাণদেশে (apex) হৃৎপিণ্ডের আকৃষ্টজনিত শব্দ

উদরের রোগ ; ও কৃমি-রোগ সহযোগে তৌতলামি, প্রথম সন্ধাংশ তিন চারিবার বলিতে হয়

উপচয় ।—নড়িলে চড়িলে, শব্দ, স্পর্শ, চক্ষু ঘুরাইলে ; বাঁকি লাগিলে অথবা সংঘর্ষণে ; বৃদ্ধি ।

উপশম ।—মস্তক উচ্চ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে শ্বাস (শ্বাস, ক্যাঠি, স্পঞ্জ) ।

সম্বন্ধ ।—হৃদ্রোগে, একন, শ্বাস, ক্যাঠি, ভিজি, কালী-কা, নাজা, ক্যালমিয়া ও স্পঞ্জিয়ার সহিত স্পাইজিলিয়ার তুলনা হয় ।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া ।

(Sanguinaria)

নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত সবমন শিরঃপীড়া, প্রাতে উহার আরম্ভ, দিবাভাগে বৃদ্ধিপ্রাপ্তি, সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত অবস্থিতি ; মাথা যেন ফাটিয়া পড়িবে, অথবা চক্ষু প্রচাপিত হইয়া বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ অস্বভাব ; নিদ্রান্তে উপশমপ্রাপ্তি ।

আমেরিকার সবমন শিরঃপীড়া, অন্ধকার গৃহে সম্পূর্ণরূপে শাস্ত হইয়া থাকিলে উহার দ্বাস (অতিরিক্ত মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম বশতঃ শিরঃপীড়া, ইপি-জিয়া, সবমন শিরঃপীড়ার পরিশ্রম-কালে বৃদ্ধি এবং বর্ষণে, প্রচাপনে ও সঞ্চালনে দ্বাস, ইতিগো)

শিরঃপীড়ার মস্তকের পশ্চাভাগে আরম্ভ, উপরের দিকে প্রসারণ ও দক্ষিণ চক্ষুর উপরে অবস্থিতি (মিলি ।—বাম অক্ষি-কোটরের উপরে বা মধ্য অবস্থিতি, স্পিজি)

নিবৃত্ত-রজকালে প্রত্যাবৃত্ত, শিরঃপীড়া ; প্রতি মণ্ডম দিবসে উপস্থিতি (আঁবাড, মিলি, মলফ —অষ্টম দিবসে, আইরিস) ।

মুখমণ্ডলের মাঝ-শূল, নিহিত-জানু (kneeling down) হইয়া ভূতলে পৃষ্ঠরূপে মস্তক চাপিয়া রাখিলে উহার উপশম ; উপরের হস্ত হইতে সকল দিকে বেদনার প্রসারণ ।

ব্রফাইটিস নিউমোনিয়া ও থাইসিস রোগে, অপরাধে গণ্ডবয়ের সীমা-বিশিষ্ট আরক্ততা ; কর্ণে জালা ।

দক্ষিণ বাহু ও দক্ষিণ ক্রক্ষে বাতের বেদনা (বাম, ফির), বাহু উপরে উঠাইতে পারা যায় না, সন্নিহিতে উহার বৃদ্ধি

দীর্ঘাঙ্গি, কর-পৃষ্ঠ প্রভৃতি যে যে স্থানের অস্থি অত্যন্ত আবৃত্ত তথায় বেদনা (ব্রঃস-ভেনি)

গল-কোষ ও গল নালীতে জালা । শ্বসনযন্ত্রের ও নাসিকার বহুপাদ (polypus) (আদ, সোরি, টিউক) ।

নিবৃত্ত-রক্তক্ষানিগের পীড়া।—তাণ্ডা বেষণ ও শ্বেতপ্রদর, করতল ও পদতলের জালা ; শয্যায় গাঁজাবরণ ফেলিয়া দিতে হয় ; শুনের বেদনাবিশিষ্ট বিবৰ্জন ; যখন ল্যাকেসিস ও সলফারে উপকার দর্শে না।

ওযধিগন্ধজ জরের পরবর্তী খাস রোগ, গর্বে উহার বৃদ্ধি।

কাস — শুষ্ক কাস, তজ্জন্তু রাত্রিতে নিজ হইতে জাগরণ এবং যে পর্য্যন্ত না শয্যায় উঠিয়া বসিয়া যায় ও বায়ু-নিঃসরণ হয় সে পর্য্যন্ত উহার অবিকৃতি ; গণ্ডদ্বয়ের সীমাবদ্ধ আরক্ততা ; নৈশ ঘর্ষ ; অতিসার

হৃৎ-শব্দ-কাসের পরে উগ্র কাস ; রোগীর যতবার শর্দি লাগে ততবারই কাস প্রত্যাবৃত্ত হয়।

যুবতী জীদিগের, বিশেষতঃ স্বল্প রক্ত-কালে, মৃথমণ্ডলে উদ্ভেদ (বেলিস, ক্যাক, ইউজিন, সোরি)।

সম্বন্ধ।—(১) সবমন শিরঃপীড়ায়, বেল, আইরিস, মেলিলোটের সহিত ; বিরক্ত-কালের রোগে, ল্যাক ও সলফের সহিত ; পুরাতন ব্রুকাইটিস বা প্রচ্ছন্ন নিউমোনিয়ায়, চেলি, সলফ, ফস, ভিরে-ভির সহিত স্ত্রীমূর তুলনা হয়। (২) স্কালোটিনায় বেলেডোনা বিফল হইলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় (৩) ওপিয়ামের মত্ততা নিবারণার্থে ইহার ব্যবহার হয়।

স্যানিকিউলা।

(Sanicoula)

নিম্নাভিমুখ গতিতে ভয় (বোরা)।

শিশুর দুর্দমনীয়তা ও অবাধ্যতা, ক্রন্দন ও পদাঘাত করণ, বিরক্তচিত্ততা ও কোপনতা, আবার মত্তর হাওয়া ; স্পর্শ করিতে দিতে অনিচ্ছা।

অবিরত কার্যের পরিবর্তন

নিজা কালে বালক-বালিকানিগের মাথার ও ঘাড়ের সমধিক ঘর্ষ ; উহাতে অনেকদূর পর্য্যন্ত বালিশ ভিজিয়া যায় (ক্যাক, মিলি)

মস্তকের কেশাবৃত্তভাগে, চক্ষুর জাতে, এবং দাড়িতে শব্দবৎ প্রভূত খুস্কি ।
কর্ণের পশ্চাতে ক্ষত এবং উহা হইতে শুভ্র, ধূসর, আঠা আঠা রস নিঃসরণ
(গ্রাফ, সোরি) ।

মিহ্র —বৃহৎ, লোলিত মিহ্রা ; উহাতে জালা দীতল রাখিবার ক্ষমতা বাহির
করিয় রাখিতে হয় ; মিহ্রার উপর দক্ষ (ছাট-মি) ।

শকটারোহণ বশতঃ বিবমিষা ও বমন । পিপাসা ; বারবার অল্প অল্প জল
পান ; জল আমাশয়ে পৌছিবামাত্র বমন হইয়া পতন (আম, ফস) ।

অবিরত লক্ষণের পরিবর্তন (ল্যাক-ক্যান, পলস) ।

অনিচ্ছায় মল ও মূত্র নিঃসরণ ; ধারাবরণী পেণীর (sphincter) উপর
নির্ভর করিতে পারা যায়না (এলো) ; অপানের বেগ-কালে মল নিঃসৃত না হয়
একজন্ম জন্মাবধি আড়াআড়ি করিয়া রাখিতে হয়

কোষ্ঠ-বদ্ধতা —যে পর্য্যন্ত অধিক মল সঞ্চিত না হয় সে পর্য্যন্ত মল-প্রবৃত্তি
পরিশুদ্ধতা ; অতি কুশনে আংশিক নিঃসারিত মলের পুনরায় ভিতরে প্রবেশ
(গিলি, থুলা) ; অধিক পরিমাণে ধূসর বর্ণ, শুষ্ক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্তুলাকার মল
নিঃসরণ, হাতদ্বারা বাহির করিতে হয় (সেলে) ।

মল ।—শক্ত, পরিত্যাগ করা অসাধ্য ; দৃঢ় চূণের স্থায় ধূসরাত শুভ্র গোলা
সদৃশ ; মলবারের প্রান্ত হইতে ষণ্ড ষণ্ড হইয়া পতিত (ম্যাগ-মি) মল ; মলে
পনিরের গন্ধ ।

অতিসার ।—বিরেচনের প্রকৃতি ও বর্ণের পরিবর্তন ; ওষধিধের স্থায় আকৃতি ;
ফেনিল, ঘাসের স্থায় সবুজবর্ণ, খানিক থাকিলে পর সবুজবর্ণ, তাদ-পড়া পুরুরের
গানের মত,—মল ; আহাৰাঙ্কে তাড়াতাড়ি মল-ত্যাগ করিতে যাইতে হয়

মান করিলেও মলের গন্ধ যায়না (সলফ) ।

মল-বারের সমীপবর্তী স্বকের অবলম্বন (সলফ) ; মূলধার (perineum)
আবৃত্ত করিয়া জননাদ পর্য্যন্ত উহার প্রসার ।

লোণা মৎস্তের জলের স্থায় উগ্রগন্ধবিশিষ্ট প্রদর (সরলাঙ্গ হইতে লোণা-
মৎস্তের জলের স্থায় রস-ক্ষরণ, ক্যাঙ্ক ; কর্ণ হইতে, টেলু) ।

দুর্বলতা, বস্তি-গহবরের আধেয় (contents of pelvis) যেন বাহির হইয়া
পড়িবে এরূপ আবেগ (bearing down) ; হাঁটিলে, পদ-অলিত হইলে, বা

সংঘর্ষে উহার বৃদ্ধি, বিশ্রামে ও শয়ন করিয়া থাকিলে হ্রাস ; ভ্রমের সম্মুখে হাত রাখিয়া জননাজ তুলিয়া ধরিবার ইচ্ছা (লিলি, মিউর) ; অনায়ুর স্পর্শ-ধেষ ।

পদ-ঘর্ষ ।—পদাঙ্গুলীর মধ্যবর্তী স্থানে ঘর্ষ, ও তজ্জন্ত উহাদের ক্ষত ; দ্রুগন্ধ ঘর্ষ (গ্রাফ, সোরি, সিলি) ; যেন শীতল জলে পা ফেলা হইয়াছে পদতলে এরূপ ঘর্ষ

পদতলের জালা, উহা আবৃত করিতে বা শীতল স্থানে রাখিতে হয় (ল্যাক, মেডে, ছাট, সলফ) ।

শিশু অত্যন্ত শীতকালেও পদাঘাত করিয়া কাপড় ফেলিয়া দেয় (হিপ, সলফ)

ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল শীর্ণতা, শিশুকে অধিক বয়স্ক, মলিন, তৈলাক্ত ও দীর্ঘ কপিশ বর্ণ দেখায় ; উহার ঘাড়ের নিকটের ত্বক্ কুঞ্চিত হইয়া বলিতে বলিতে ঝুলিতে থাকে (এব্রোট, আইওড, ছাট-মিউ, সাস)

সম্বন্ধ ।—এলম, এব্রোট, বোরা, ক্যাক, গ্রাফ, ছাট-মিউ, সিলি ও অত্যাঁচ প্রধান প্রধান দোষ-দোষের ঔষধের সহিত সম্বন্ধ ।

স্যাভাডিল্লা ।

(*Sabadilla.*)

লঘু-কেশ, স্নানর মুখাকৃতি, দুর্বলীভূত শিথিল পেশীমণ্ডলীবিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী ।

বালক-বালিকাবর্গের ক্রমিক্রান্ত রোগ (সিনা, সিলি, সিলিজি) ।

স্মারবিক রোগ ।—স্পন্দন, আক্কেপিক-কম্পন, ক্যাটালেন্সি ; ক্রমিক্রান্ত উৎপত্তি (সিনা, সোরি)

সূত্র-ক্রমিক্রান্ত নারীবর্গের কামোন্মাদ

অনেক লক্ষণের দক্ষিণ হইতে বামদিকে গতি (লাই, পড) ; পা হইতে মাথার শীতের উৎপত্তি

লাঙ্গি ।—যেন রোগ হইয়াছে ; অঙ্গগুলি যেন শীর্ণ হইয়াছে, রোগীর এরূপ
ভ্রাঙ্গি, বায়ুজন্তু উদরের ক্ষীণতা দেখিয়া রোগিণীর গর্ভ বলিয়া ভ্রম ; রোগিণী
মনে করে যেন তাহার কোন ভয়ঙ্কর গল-রোগ জন্মিয়াছে, উহাতে তাহার মৃত্যু
হইবে ।

সধিরাম জ্বরের ভোগকালে প্রলাপ (পড)

শিরঃপীড়া —অতিরিক্ত চিন্তা করাতে, অতিরিক্ত মনোনিবেশ করাতে
(আজ্ঞানা) ; ও পট্ট-কৃমি (tape-worm) হইতে উৎপন্ন, শিরঃপীড়া

হাঁচি ।—আকস্মিক, আবেশে আবেশে উপস্থিত, হাঁচি; তৎপরে অশ্রুপাত ;
প্রচুর জলবৎ স্রাব নিঃসরণশীল নাসিকার প্রতিষ্ঠা ; মুখমণ্ডলের উত্তপ্ততা এবং
অগ্নিপুটের আরক্ততা ও জ্বালা ।

ডিফথেরিয়া, টেনিসাইটিস (তালুমুল-প্রদাহ) ; অপেক্ষাকৃত অনায়াসে
উষ্ণদ্রব্য গিলিতে পারা যায় ; স্তম্ভ-বেধবৎ যাতনা ও অজ্ঞান অধিকাংশ
লক্ষণ, বিশেষতঃ গল-লক্ষণের বাম হইতে দক্ষিণদিকে গতি (ল্যাকেক,
ল্যাক-ক্যান) ।

গলার মধ্যে যেন একখণ্ড চর্ম্ম শিথিলভাবে স্থলিয়া রহিয়াছে এপ্রকার অসুভব,
উহার উপর দিয়া গিলিতে হয় (পিণ্ডবৎ অসুভব, ল্যাক) ।

গল-কোষ ও গল-গহ্বরের পরিপুষ্কতা ।

হকের পার্চমেন্টের মত শুষ্কতা ।

উপচয় ।—শীতলতায় ; শীতল বায়ুতে ; বিশ্রাম-কালে ; ও পূর্ষাঙ্কে ;
বৃদ্ধি ।

সম্বন্ধ ।—(১) অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৮ট পর্য্যন্ত বৃদ্ধি লক্ষণে, কলোস,
কলচি, লাইকোর সহিত ; এবং অনবৃত্ত বায়ুতে হ্রাসে, পলস, ও স্রাবিনার
সহিত স্রাবাভিলার তুলনা হয় ; (২) প্লুরিসি রোগে ব্রাই ও রাগ-বল্‌বের
পর স্রাবা ভাল খাটে, এবং একন ও ব্রাই বিফল হইলে পরেও এতদ্বারা
উপকার নর্শে ।

স্যাবিনা ।

(Sabina.)

জীলোকদিগের পুরাতন পীড়া মদ্যিবাত্তর বেদনা , বিশেষতঃ তৃতীয় মাসে গর্ভজ্ঞাবের অভিসুখতা ।

গীত-ব'দ্যে অসহ্যত উহাতে কায়নীয়তার উৎপত্তি যেন অস্থি ও মজ্জার (marrow) অভ্যন্তর দিয়া সংপ্রবেশ অত্রাপাতের উৎপত্তি, থুজা) ।

প্রায় সকল রোগেই ত্রিকাস্থি হইতে মণিপূর পর্য্যন্ত (from sacrum to pubes) কটিদেশে আকর্ষণী বেদনা ; পৃষ্ঠ হইতে শরীরের চারিদিক-দিয়া মণিপূর পর্য্যন্ত বেদনার গতি (ভাইবারনঃম)

গর্ভজ্ঞাব বা অকাল-প্রসব জনিত পীড়া ; অরায়ু হইতে রক্তজ্ঞাব ; আংশিক ফিকা লাল আংশিক সংযত রক্তের প্রবাহ , অত্যন্ত সঞ্চলনে উহার আধিক্য (সিকেলি) ; বিচরণে সতত ক্লাস , ত্রিকাস্থি হইতে মণিপূর (pubes) পর্য্যন্ত বেদনার সংপ্রসারণ ।

ঋতু ।—নির্জারিত সময়ের অনেক পূর্বে, অত্যন্ত অধিক পরিমাণে, অতিরিক্ত দীর্ঘকালস্থায়ী ঋতু ; আংশিক তরল আংশিক সংযত (ফির) রক্ত ; (বাহাদের অতি অল্প বয়সে প্রথম রক্তোদর্শন হইয়াছিল, তাহাদের) ; থাকিয়া থাকিয়া ঋতু-প্রবাহ নিঃসরণ ; তৎসহ উদর বেদনার ও প্রসব-বেদনার চার বেদনা ; ত্রিকাস্থি হইতে মণিপূর পর্য্যন্ত বেদনা ।

সংসর্গ-লালসার উত্তেজনা সহকারে ঋতু-কালের ব্যবধান-সময়ে রক্ত-জ্ঞাব (ঋতু)

অরায়ুর দৌর্বল্য বশতঃ অমরা-রোধ (ফুল না পড়া) ; দারুণ প্রসবাস্তিক বেদনা (কলো, সিকে) ।

পূর্বে গর্ভজ্ঞাবিণী ; ও অল্পবয়সে প্রথম ঋতুবতী নিবৃত্ত-রক্তজ্ঞাদিগের অতিশয় রক্ত-জ্ঞাব ।

গর্ভপাত বা অকাল-প্রসবের পর ভিষাশয় কিংবা গর্ভাশয়ের প্রবাহ

এই ঔষধে, অরায়ু হইতে অর্কদ কিংবা অন্তবিধ শৈল্য (foreign body) নিঃসারণের সহায়তা হয় (ক্যান্থ) ।

অসহ্য কণ্ঠ্যুন্ন ও শ্বাসা সংযুক্ত ডুধুর-বৎ তাচিল ; উহাতে মাংসাক্তরের (granulations) প্রাচুর্য (থুজা, নাই-এসি)

উপচয় ।—অত্যন্ত সঞ্চালনে (সিকেলি) ; উষ্ণবায়ুতে অথবা উষ্ণগৃহে (এপিস, পলস) ; ঘৃকি

উপশম ।—শীতল, বিমুক্ত, বিমল বায়ুতে হাস

সম্বন্ধ ।—(১) থুজার সহিত অল্পপূরক সম্বন্ধ (২) উপমাংস ও মাংসকদোষ অনিত পীড়ায় থুজার পরে স্থাবি ভাল খাটে । (৩) ক্যাক, ক্রোক, মিলিকো, সিকে, ও টিলের সহিত স্থাবির তুলনা হয়

শ্যাম্বুকঃস নাইগ্রা ।

(Sambucus Nigra)

গণ্ডমালা-ধাতুগ্রস্ত বালক-বালিকাদিগের রোগে ; বিশেষতঃ বায়ু-পথের (air-passage) রোগে এই ঔষধ উপযোগী ।

সবল ও মাংসল ব্যক্তিদিগের সহসা শীর্ণতা প্রাপ্তি (আইওড, টিউব) ।

প্রবল চিত্ত-বিকার ; উৎকর্ষা, শোক, অথবা সন্তোষ-লিপ্সার অতি পরি-
তৃপ্তির মন্দ ফল (ফস-এসি, কালী-ফস)

শরীরের নানাস্থানে, বিশেষতঃ জজ্বায়, শুষ্কফে, পদে অল্পপূর্ণ দীপ্ততা

শিশুদিগের শুষ্ক প্রতিশ্রায় ; নাসিকার শুষ্কতা ও সম্যক অবরুদ্ধতা,

উহার শ্বাসের ও স্তন-পানের প্রতিবন্ধকতা ; নাকে ঞ্ণ্ ঞ্ণ্ করা (এম-কা, নক)

শ্বাস-কৃচ্ছ্র ; শিশু সহসা নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়, তাহার শ্বাস প্রায় বন্ধ হয়, মুখমণ্ডল সীমবর্ণ ও নীলবর্ণ ধারণ করে, সে শ্বাস উঠিয়া বইসে ; নীল-বর্ণ হইয়া উঠে, শ্বাসের জন্ত স্থাবি ধার (gasps for breath), অবশেষে শ্বাস ছাড়িতে পারে ; রোগের আক্রমণ নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু পুনরায় উপস্থিত হয় ; শিশু নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে

পারে না (ক্রোর, মেফা) , রোগের আক্রমণের মধ্যে নিদ্রা যায় (ল্যাক,—
এরম-ড্রাক, তুলনা করুন) ।

ক্রুরোগে শেষাবস্থায় যে প্রকার শ্বাস-রোধের আক্রমণ অগ্নো তক্রপ শ্বাস-রোধের আক্রমণ

ক্রন্দনপরায়ণ বালক-বাচ্চিকাদিগের শ্বাস-রোধ-কর কাস, মধ্য রাত্রির সময় উহার আতিশয্য; শূল-গর্ভ, গভীর হৃৎপদ্যবিশিষ্ট বক্ষঃস্থলের আগ্রহ সংযুক্ত; এবং নিয়মিত শ্বাস, ও দীর্ঘশ্বাস সম্বলিত প্রশ্বাস বিশিষ্ট; কাস।

জরের অবশেষের পূর্বে গভীর কাস

অর — নিদ্রাকালে শুষ্ক উত্তাপ; নিদ্রিত হইবার অব্যবহিত পরে; শয়নের পরে; পিপাসা-পরিশূণ্য উত্তাপ গাত্র উন্মুক্ত করিতে আশঙ্কা (জরের সকল অবস্থায়ই আবৃত থাকিবার আবশ্যিকতা—নয়)।

জাগ্রৎ সময়ে, সর্বশরীরে প্রভূত ঘর্ষা; নিদ্রিত হইবামাত্র শুষ্ক উত্তাপের প্রত্যাবৃতি (নিদ্রা যাইবার ক্ষণ চক্ষু বুজিবামাত্র ঘর্ষা, সিক, কোনা)

উপচয়।—বিশ্রাম কালে; মধ্যরাত্রির সময় ও মল আহারের পরে; বৃদ্ধি।

উপশম।—শয্যায়া উঠিয়া বসিলে; ও সঞ্চালনে; হ্রাস অধিকাংশ যাতনা বিশ্রাম কালে উপস্থিত ও সঞ্চালনে তিরোহিত হয় (হ্রাস)।

সম্বন্ধ।—(১) সিক, ক্লোর, ইপি, মেফা, মলফের সহিত শ্বাস তুলনা হয়। (২) আসেনিকের অপব্যবহার জনিত গীড় শ্বাস দ্বারা উপশমিত হয়। (৩) ভয়-প্রাপ্তির মলফলে ও ওপিয়মের পরে শ্বাস ভাল থাকে।

হাইড্রোসায়ামাস।

(*Hyoscyamus Niger*)

কোপন-স্বভাব, উত্তেজনশীল, স্নায়বীয়, হিষ্টেরিয়া-প্রাপ্ত রক্ত-প্রধান ধাতুর ব্যক্তি।

হিষ্টেরিয়া বা মদাত্যয় (delirium tremens) প্রভৃতি রোগে যেকোন দৃষ্ট হয় তক্রপ অপ্রদাহিত প্রকৃতি বিশিষ্ট কিন্তু মস্তিষ্কের বিবর্তিত ক্রিয়া-নীলতা সংযুক্ত রোগ

টফার।—ভয় বা অশ্রের ক্রমি অথ বাগক-বাগিকাদিগের টফার (মিনা)
প্রসব-কালে কিংবা স্তন্যপানকালে টফার ; আহাৰ্য্যাস্তে শিশুর বমন, তৎপরে
মহমা চিৎকার কাগিয়া অচেতন হইয়া পড়ন।

আক্ষেপ —সংজ্ঞাশূন্যতা ও অতিশয় অস্থিরতা সহ আক্ষেপ ; চক্ষু হইতে
পদাঙ্গুলো পর্যন্ত শরীরের প্রত্যেক পেশীর স্পন্দন (সংজ্ঞাসহ
আক্ষেপ, নক)

প্রলাপ —অস্থিরতা, শয্যা হইতে লাফাইয়া পড়া, পলাইয়া যাইবার চেষ্টা
অপ্রামাণিক উত্তর দান; রোগী মনে করে যে সে ঠিক স্থানে নাই ; সে নানাবিধ
কাল্পনিক আচারের (doings) কথা বলে, কিন্তু কোন অভাব জানায় না, এবং
কোন অভিযোগ করে না।

প্রলাপে বেলেডোনা ও ট্র্যামোনিয়মের মধ্যবর্তী অবস্থায়ই হাইওসায়েরমাস
ব্যবহৃত হয় ; এই ঔষধে বেলেডোনা ব লক্ষণের জ্বাশ সন্ধিদা মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চয়
এবং ট্র্যামোনিয়মের ভয়ঙ্কর জোষ ও উন্মাদবৎ প্রলাপ থাকেনা।

ভয়।—একাকী থাকিতে ভয় ; বিযাক্ত হইবে, দংশিত হইবে ও বিক্রীত
হইবে বলিয়া ভয় ; থাইতে ; ও কিছু নিলে তাহা লইতে ভয়।

ভয়প্রেমের মন্দ ফল ; তৎসহ বিবেচ, জোষ, অসম্বন্ধ কথা অথবা প্রত্যেক
বিষয়েই হাস্য করিবার প্রবৃত্তি ; তৎপরে অপস্মার।

কাঁমোয়াদ ; লজ্জাহীনতা, আবৃত থাকিতে অনিচ্ছা, পদাঘাত
করিয়া কাগড় ফেলিয়া দেওয়া, গুপ্তাঙ্গ উন্মুক্ত করা ; অশ্লীল গান
গাওয়া ; বিবজ হইয়া শয্যায় শুইয়া থাকা ও বক্ বক্ করিয়া বকা।

কাস —শুষ্ক, নৈশ, আক্ষেপিক কাস ; শয়ন করিলে উহার বৃদ্ধি,
ও উঠিয়া বসিলে হ্রাস (হ্রাস) ; স্নাত্তিতে আহাৰ্য্যাস্তে, পানে, আলাপনে,
ও গানে আধিক্য (হ্রাস, ফস।—শয়নে উপশম, ম্যাঙ্গ-মি)।

প্রসবের পরে যুক্তশস্ত্র কিংবা অব্যাহিত মূত্র-প্রাণ সহকারে মূত্রাশয়ের
পক্ষাঘাত ; প্রসূতীদিগের মূত্র-ত্যাগে অনিচ্ছা (আর্গ, ওপি)।

আক্ষেপিক রোগের অপস্মারের প্রবণতা।

কোপন-স্বভাব, উত্তেজনশীল ব্যক্তিদিগের উৎকট নিদ্রা-

হীনতা ; কাথকর্শের উপদ্রব হইতে উহার উৎপত্তি , অনেক সময় কল্পিত কারণে উহার উদ্ভব ।

অর ।—নিউমোনিয়া, স্কাগেটিনা, সস্তর উহার সম্বন্ধিতাবস্থা প্রাপ্তি, যন্ত্রকের আবিলতা (sensorium clouded), চক্ষের একতান দৃষ্টি, কিছু যেন ধরা যাইতেছে একপভাবে শূন্যে হস্ত প্রসারণ অথবা শয্যা-বস্ত্র খুঁটন, দস্ত-শর্করাবৃত্ত দস্ত, জিহ্বার শুষ্কতা ও গুরুতা, অনিচ্ছায় মল-মূত্র নিঃসরণ ; কণ্ডুরা-স্পন্দন (subsultus tendinum) ।

উপচয় ।—সন্ধ্যাকালে ; রাত্রিতে ; ষড়্-কালে মানসিক পীড়ায় ; বিষেষে, অল্পখকর প্রেমে ; ও শয়ন করিলে বৃদ্ধি ।

উপশম ।—মস্তক অনবত করিলে (শিরোলক্ষণ) ও উঠিয়া বসিলে (কাস), হ্রাস ।

সম্বন্ধ ।—(১) বেল, ট্রায়, ও ভিরেট্রমের সহিত হাইওসের তুলনা হয় (২) হাইওসে উপকার না দিলে অনেক সময় ফস প্রয়োগে কামোন্মাদদের আরোগ্য জন্মে । (৩) মস্তপায়ীদিগের রক্ত-কাসে হাইওস । বফল হইলে নব্য বা ওপি ব্যবহৃত হয় । (৪) সম্যাসের পরবর্তী বধিরতায় বেলেডোনার ৭ রে হাইওস ভাল খাটে ।

হাইড্রাস্টিস ক্যানডেনসিস ।

(*Hydrastis canadensis*)

আঠা আঠা গোয়া-জীববিমিষ্ট দুর্বলীভূত ব্যক্তি ।

আম্বাশয়ের ও যকৃতের ক্রিয়ার স্পষ্ট বৈলক্ষণ্য সহকারে ধাতু-বিক্রতি ; অপরিমিত যদিরাপানে শরীরের ভগ্নতা ।

কঠিন, সংলগ্ন ক্যান্ডার উহার বৃক্ কলঙ্কিত ও কুঞ্চিত , ছুরিকা দ্বারা কর্তনবৎ তীব্র বেদনা ; শুন-বৃত্ত আকুঞ্চিত

স্তন্যদানজনিত মূণ-ক্ষত, জিহবার বৃহত্তরতা ও উহাতে দস্তাক।

প্রদর ;—গাঢ়, আঠা আঠা, পীতবর্ণ, রজ্জুবৎ স্রাব ; উহা অপত্য-পথের (vagina) মূণ হইতে দীর্ঘ দড়ির স্থায়ী বুলিয়া থাকে (বোভ, কালী-বাই) ; ভগকণ্ডুয়ন

নাশা-পথ হইতে গাঢ় পীতবর্ণ, রজ্জুবৎ, প্রভূত স্লেষা নিঃসরণ (কোরে-র)

নাসিকার পশ্চাৎ-রক্ষা ও গল-কোষ হইতে কাসিয়া পীতবর্ণ ও আঠা আঠা স্লেষা উত্তোলন ; মারকিউরি কিংবা ক্লোরেট-অব পটাশ সেবনের পর ক্ষত ; উপদংশ-জনিত গলা-বেদনা।

হাইপারিকঃম।

(Hypericum)

পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার ভৌতিক উপঘাত (mechanical injury) ; পৃষ্ঠবংশের মজ্জাবর্ষ (spinal concussion) ; পতনের পর কোকিল-চঞ্চু-অস্থিতে (coccyx) বেদনা

বিক্ষত্রণ (punctured wound), ছিন্নত্রণ বা বিদারিত ত্রণ ; উহাতে স্পর্শ-ষেয, বেদনা (লিড), বিশেষতঃ অনেক দিনের ত্রণ (ঘৃষ্টত্রণ, আর্গ, হেম) ।

উপঘাত ।—প্রোক, সূচী, আলপিন, চৌচ প্রভৃতির উপর পদ-মর্দিত হওয়াতে উপঘাত (লিড) ; ইন্দুরের কামড়ের উপঘাত ; হনু-স্তম্ভের প্রতিষেধক ।

এই ঔষধে প্রায় সম্যকরূপে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন ছিন্ন ও বিদীর্ণ অঙ্গের যোড়া লাগে ('ক্যালোও)

হস্তাঙ্গুলী, পদাঙ্গুলী, নখ-তল, করতল, পদতল, প্রভৃতি যে সকল স্থানে জ্ঞান-জনক স্নায়ুর (sentient nerve) আধিক্য সেই সকল স্থানের উপঘাত, বেদনার অসহ্যতা দ্বারা তীব্রভাবে স্নায়ুর আক্রান্ততা বুঝা যায় ; হস্ত-পদাঙ্গুলির বিধান-তন্ত্রের উপঘাত ।

সজ্জরণ বা শঙ্কোপচারের পরবর্তী স্নায়বীয় অবসাদন ; ভয়াতির মন্দাফল
 এতদ্বারা সর্বদাই ক্ষতের রূপান্তর জগো এবং সময়ে সময়ে উহার গতি ও
 পচলা অবরুদ্ধ হয় (ক্যালোস) ; হস্তাঙ্গুলীর অগ্রভাগের স্বপ্নতা ও পিষ্টতা
 অভিঘাত জনিত অপকার হইতে উৎপন্ন ধনুর্দাকার (ফাইং মের গতিত তুলনা
 করুন) ।

শিরোঘূর্ণন ।— মস্তক যেন সহসা লম্বা হইয়া পড়িয়াছে এপ্রকার অনুভব ;
 স্নাত্তিতে মূত্র বেগ সহকারে শিরোঘূর্ণন

শিরঃপীড়া ; মস্তকের পশ্চাত্তাগের উপর পতিত হওয়াতে যেন শূন্যে
 উচ্চ তুলিতেছে এরূপ অনুভব ; রোগিণী পাছে উচ্চ হইতে পড়িয়া
 যায় এজন্য বড়ই উৎকর্ষ ।

পৃষ্ঠবংশ ।—পতনের পরে, বাহুদ্বয়ের বা ঘাড়ের অত্যন্ত মাত্র সঞ্চালনে রোগীর
 চিৎকার করা ; স্পর্শে পৃষ্ঠবংশের অতিশয় অনুভূতি

গৃধ্রন (bunions) ও কড়ার দ্বায়ুর আক্রান্ততানুচক নির্দারক বেদনা
 মস্তকে আঘাত বা সংঘর্ষ বশতঃ টঙ্কার ।

সম্বন্ধ ।—(১) আর্গ, ক্যালোস, ক্রুটা ও ষ্ট্র্যাফের সহিত তুলনা হয়
 (২) সজ্জরণে পূর্বে যে সকল স্থলে পর্যায়ক্রমে একন ও আর্গ ব্যবহৃত হইত,
 একন সেই সকল স্থলে হাইপারিকম প্রয়োগে আরোগ্য জগো ।

হিপার সংলফঃর ।

(Hepar Sulphur)

নিশ্চেষ্ট লসিকা-প্রধান-দাতু ; এবং পাতলা চুল ও পাতলা মুখাকৃতি, কার্যে
 ধীরতা, এবং পেশীর কোমলতা ও লোলিততাবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে হিপার
 উপযোগী

সলফারের স্নায় সোরা-দোষ, ও গণ্ডমালা-দোষেও হিপার উপযোগী ।

সলফারের লক্ষণে চর্ম-রোগে শুষ্ক, কণ্ডুরন থাকে কিন্তু স্পর্শে অনুভূতি

থাকে না, বরং চুলকাইলে ও ঘর্ষণ করিলে উপশম হয় ; কিন্তু হিপার সমস্যার লক্ষণে চর্মের অস্বস্তি, ও পুণ-নিঃসরণ থাকে, এমন কি ঈষৎ উপঘাতেও প্ৰযোৎপন্ন হয় (গ্রীক, মার্ক), স্পর্শে অত্যন্ত অনুভূতি জন্মে, তবুও রোগস্থানে বস্ত্রের স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারা যায় না (ল্যাক — অর্থাৎ স্পর্শে অনুভূতি, কিন্তু লজ্জা চাপ সহ্য হয়, মিক) ; বেদনায় অনেক সময় মুর্ছ উপস্থিত হয় ।

যে সকল রোগে প্ৰযোৎপত্তি অনিবার্য, এবং পারদের অপব্যবহারে যে সকল স্থলে শরীরের অপকার জন্মিয়াছে, সেই সকল স্থলে হিপার ব্যবহৃত হয় ।

রোগীর অপর্যাপ্ততা, যৎসামান্য বিষয়ে ক্রোধের উদ্ভব, অবসাদ-বায়ুর ভাব, অসঙ্গত উৎকর্ষা, শারীরিক ও মানসিক অতিরিক্ত অনুভূতি ; যৎসামান্য কারণে বিরক্তি ; ক্রমশঃ, ব্যস্ত সমস্ত কথা এবং তাড়াতাড়ি অলপান

শীতল বায়ুতে অত্যন্ত অনুভূতি, পাশের ঘরের দরজা খুলিলেও বায়ুর স্পর্শ অসহ্য করিতে পারা যায় বলিয়া অনুমান । গ্রীষ্মের সময়ও বসন পর্য্যন্ত বজ্রাবৃত রাখিবার আবশ্যিকতা (সোরি) ; অনাবৃত থাকা সহ্য করিতে পারা যায় না (নজা—বজ্রাবৃত থাকা সহ্য করিতে পারা যায় না, ক্যান্টন, মিক) অত্যন্তমাত্র বিমুক্ত বায়ু ভোগে শর্দি লাগে (টিউব) ।

মূত্র ।—মূত্রের প্রবাহের প্রতিরুদ্ধতা ; ধীরে ধীরে মূত্র-নিঃসরণ, শক্তি-শূন্যতা, সরলভাবে পতন ; মূত্র পরিত্যক্ত হইবার পূর্বে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, মূত্রাশয়ের দুর্বলতা, মূত্র-ক্রিয়া পরিসমাপ্ত করিতে পারা যায় না, বোধ হয় যেন খানিকটা মূত্র সর্বদাই অবশিষ্ট থাকে (এলম, মিলি) ।

কাস ।—শরীরের কোন অংশ অনাবৃত হইলে কাস (হ্রঃ) ; শ্বাস-রোধকর ও গল-রোধকর ক্রুপজন্মিত কাস ; পশ্চিম দিকের শুষ্ক ভূ-বায়ু ভোগ বশতঃ কাস (একন)

ক্রুপ । শুষ্ক শীতল বাতাস লাগাইবার পর ক্রুপ (একন) ; গভীর, ককশ কুক্ষের ডাকের ছায় কাস, তৎসহ স্বরভঙ্গ ও শ্বাসের বড় বড় শব্দ ;

শীতল বায়ু ও শীতল পানীয় জ্বব্য, এবং ছুই প্রহর গাজির পুটে কিংবা প্রাতঃকালের প্রাকালে উষ্ণর বৃদ্ধি

গলার মধ্যে টোট, মাছের কাঁটা অথবা গোঁজ পাঁকার ঠাণ্ডা অম্লভব (জাজ্জ-না, নাই-এসি) পাকিবার সম্ভাবনা বিশিষ্ট তালু-মূল-প্রদাহ; অতিশক্তির ক্লান্ততা সহ উষ্ণ পুরাতন বিরুদ্ধি (ব্যাঙ্গা, লাই, গম, মোরি ।

ক্ষত, দক্ষ, উষ্ণ চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপচ্যমান (pimple) বা পচ্যমান পীড়কা (pustules) সম্মিলিত হইয়া প্রসার

নিম্ন ওষ্ঠের মধ্যস্থানের বিদারণ (এম-কা, ছাট — ওষ্ঠের বিভেদস্থলে বিদারণ, কণ্ডু)

অতিসার ।—অল্পগন্ধ বিশিষ্ট বালক-বালিকাদিগের অতিসার (ক্যাঙ্ক, মাংগ-কা—শিশু ও মলের অল্পগন্ধ, রিউম) ; কর্দিমের বর্ণ মল (ক্যাঙ্ক, পড)

অগ্নিগোলক ।—স্পর্শে যাতনা, উষ্ণ বেন মস্তকের মধ্যে জ্বালা হইবে একপ বেদনা (ওলিন, পারিস) ।

ঘর্ম —ক্ষান্তি ব্যতীত দিবাংগি প্রভূত ঘর্ম, ঘর্মের অল্পত ও দুর্গন্ধ ; প্রত্যেক শারীরিক বা মানসিক শ্রেমে ঘর্ম-নিঃসরণ (মোরি, সিপি) ।

উপচয় ।—ব্যথিত পার্শ্ব শয়নে (কালি-কা, আইওড) ; শীতল বায়ুতে অনাবৃত হইলে ; শীতল জ্বব্য পান বা আহারে ; রোগাক্রান্ত স্থান স্পর্শ করিলে ; ও গারদের অপব্যবহারে ; বৃদ্ধি

উপশম ।—সাধারণতঃ উষ্ণতায় (আস) ; উষ্ণরূপে গাঢ়, বিশেষতঃ মস্তক বজাবৃত করিলে (মোরি, সিপি) ; সেই তেমতে আর্দ্রকালে (কষ্ট, নক্স, ছাট-মলের বিপকীত) ; হাস

সম্বন্ধ ।—(১) কোমলাংশের উপধাতে হিপার ক্যালোজুগার অম্লপূরক । (২) হিপার, পারদ ও অক্সালা ধাতু আইওডিন, আইওডাইড অব পটাশ, ও কডলিন্ডার অয়েলের ফুফলের দোষ নিবারণ করে । এতদ্বারা বাতাতপের পরিবর্তন ও শীতল বায়ুর অসহ্যতার কতকটা হাস অয়ে (৩) সোঁরা দোষজনিত চর্মরোগে মলফারের সহিত হিপারের তুলনা হয়

হেমোমেলিস ।

(Haemamelis)

নাসিকা, মুখস্থ অন্ন, গর্ভাশয়, মূত্রাশয় প্রভৃতি শরীরের কোন স্থান হইতে রক্ত-স্রাব হইলে ইহা উপমোক্ষা

শৈল্পিক রক্ত-স্রাব — তৎ ও শৈল্পিক শিল্পীর অপ্রবল রক্ত-স্রাব ; শিরা-প্রদাহ, শিরা-ক্ষতি, শির-ক্ষতি সংযুক্ত ক্ষত, উহাতে হ্র বেধ ও কণ্টকবেধবৎ বেদনা ; অর্শ ।

শিরা-ক্ষতি বিশিষ্ট রোগীর সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলে, বিশেষতঃ উষ্ণ আর্দ্র বা-য়ুতে সহজে শর্দি লাগে

হেমোমেলিস “শৈল্পিক শিরামণ্ডলীর (Venous Capillary System) একোনাইট স্বরূপ”

আক্রান্ত স্থানের ঘর্ষেবৎ স্পর্শ-দ্বেষ (আর্শ), শির ও পেশীর বাত ।

মণ্ডরন (wound) ।—ছিদ্র, বিদারিত, ও ঘৃষ্ট এং ; পতনজনিত উপঘাত ; এতদ্বারা রক্ত স্রাব অবরোধিত, এবং বেদনা ও স্পর্শ-দ্বেষ প্রমিত হয় (আর্শ) ।

আভিঘাতিক উপঘাতের পুরাতন মণ্ডরন (কোনা)

আভিঘাতিক শুক্রমণ্ডল প্রদাহ (conjunctivitis), চক্ষু-কক্ষে নীলবর্ণ চিহ্ন অথবা রস-স্রাব, উগ্র কাস বশতঃ উহার উৎপত্তি ; তীব্র স্পর্শ-দ্বেষ (আর্শ, ক্যাণেঙ, লিভ) ।

নাসিকার রক্তস্রাব ।—অপ্রবণ, অনেক সময় স্থায়ী অসংযত (ক্রোট) রক্তস্রাব ; প্রভূত রক্তস্রাবে নিবোদনের মণ্ড (মেল) ; স্বল্পত, আভিঘাতিক, অমুকল (Vicious) ও বাণ্যকালের রক্তস্রাব ।

রক্তস্রাব ।—প্রভূত, মণিন, গাঢ়, অল্পের ক্ষত হইতে উৎপন্ন (ক্রোট), অরায়ু হইতে নিগত প্রবল বা অপ্রবল ; এবং পতন বা প্রচণ্ডভাবে অঘাতে হন জনিত রক্তস্রাব ; রক্তের অমুকলে আস্থানিক রক্তস্রাব ; মানসিক উৎকর্ষার অস্তাব ।

রক্ত-কাম, রক্ত-ব-৫৫কের স্বাভাবিক গলকত্বজনক কাম, প্রস্রাব বা কাম ব্যতীত রক্তপাত, সময়ে সময়ে অনেক মাসাবধি বা বৎসরাবধি উহার অবস্থিতি

প্রভূত স্রাব নিঃসরণ, রক্তস্রাবে সহিত উহার সাদৃশ্য এবং রক্তস্রাবের দ্বারা উহাতেও ক্রমে ক্রমে শরীরের ক্ষয় প্রাপ্তি।

অর্শ অধিক রক্তপাত, তৎসহ জালা, স্পর্শ-দেয়, পূর্ণতা ও গৌরব, বোধ হয় যেন পিঠ ভাঙ্গিয়া যাইবে; মল-বেগ; বলির জ্বলন্ত লোমবর্ণ; মলদ্বার টাটায় ও হাজিয়া যাওয়ার মত বোধ হয়।

ধাতু।—মলিন, প্রভূত প্রবাহ, উদরে স্পর্শ-দেয়; ভিখাশয়ে আঘাত প্রাপ্তির অথবা পতনের পর উৎপত্তি; ধাতুকালে সকল যাতনার আতিশয়া (এক্টে, পলস)।

গর্ভাশয় হইতে প্রবল বা অপ্রবল রক্তস্রাব; কর্ণে রাস্তায় অধারোহণে ব্যাকি লাগিয়া উহার উৎপত্তি; গৃষ্ঠে কুহনবৎ বেদনা

অর্শ হইতে রক্তস্রাবের পর পতিত রক্তের অল্পপাতাপেক্ষা অবসন্নতার আতিশয়া (হাইড্রা)

রক্ত-স্রাবের মন্দফল (মিক)

সম্বন্ধ।—(১) রক্ত-স্রাবে ও রক্ত-স্রাব-প্রবল ধাতুতে ফিরনের সহিত অল্পপূরক সম্বন্ধ। (২) আতিঘাতিক রক্ত-স্রাবে এবং চক্ষুর অভ্যন্তরের রক্ত-স্রাব পরিশোধনার্থে আর্গ ও ক্যালেক্টের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ।

হেলিবোরস নাইজার।

(*Helleborus Niger*)

ছক্কল, স্কুমার, সোরা-দোম ছষ্ট বালক-বাণিকা; মস্তিষ্কের উপজবের প্রবণতা (বেল, ক্যাক, টিউব); তৎসহ মস্ত-সঞ্চয়।

বিষাদ। টাইফয়েড জ্বরের পরে; বালিকানিগের বয়ঃপ্রাপ্তির পরে, অথবা

রাজ প্রকারের পরে পুনরায় যত্ন প্রত্যাবৃতি না হইলে ; বিষঃতা, আশাশূন্যতা, ও নীরবতা ।

কোণনতা, সহজে কোষের উদ্বোধন, সাধনায় বুদ্ধি (হইলে, ছাট, সিপি, সিএ), বিরক্ত হইতে অনিচ্ছ (জেল, ছাট)

সংজ্ঞাশূন্যতা ; বিমূঢ়তা ; কিছু জিজ্ঞাস করিল আশে আশে উত্তরান ; তরুণ অড়বের প্রতিকৃতি (পুরাতনের, ব্যাঙ্গ-কা)

দস্তোস্তেন-কালে মস্তিষ্ক-লক্ষণ (বেল, পড) ; রস-সঞ্চয়ের আশঙ্ক (এপিগ, টিউব) ।

মস্তিষ্ক মিজীর প্রদাহ । তরুণ, মস্তিষ্ক-পৃষ্টবংশীয় শুটিকাঞ্জনিত, রস-ক্ষরণ সংযুক্ত মিনিজাইটিস ; অজ্ঞাধিক পূর্ণ পক্ষাঘাত মস্তিষ্ক-রোগঞ্জনিত বিশেষ চিৎকার ধ্বনি ।

চিন্তা শূন্য একতান শূন্যদৃষ্টি ; চক্ষুর বিস্তৃত বিকাশ ; আলোক জ্ঞানশূন্যতা ; চক্ষুতারা পেসারিত অথবা পর্যায়ক্রমে প্রসারিত ও সংকুচিত । প্রগাঢ় নিদ্রা, নিদ্রার চীৎকার করা ও চমকিত হইয়া উঠা ।

হাইড্রোক্যেফেলোস , ফাল্গেটিনার পরে অথবা শুটিকাঞ্জন উহার দ্রুত বিকাশ (এপিগ, মলফ, টিউব) , একবার ও অজ্ঞার অনিচ্ছায় সঞ্চালন ।

মস্তক বা মস্তক-পশ্চাৎ ব্যতীত শরীরে অভ্যন্তরীণ শীতলতা সংযুক্ত টঙ্কার, মস্তক ও মস্তক-পশ্চাৎ উত্তপ্ত থাকিতে পারে (আর্গ)

অতিশয় আগ্রহপূর্ণক শীতল জল গলাধঃকরণ ; (জলের) চামচ দংশন ; কিন্তু জ্ঞানশূন্য অবস্থায় অবস্থিতি

মূথের চর্কণবৎ সঞ্চালন, মূথের কোণের ঘা ও বিক্ষারণ ; মলিন, কুলমাখান-বৎ, শুষ্ক নাসা-রন্ধ

সর্বদা ওষ্ঠ ও বদন খুঁটন, অথবা নাগারক্ষে, অঙ্গুলী প্রবিষ্ট করণ (সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায়, এরম) ।

বালিশে মস্তক প্রবিষ্ট করণ ; একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে মস্তক অবলুণ্ঠন ; হস্তদ্বারা মস্তকে আঘাত করণ ।

অতিসার — তরুণ হাইড্রোক্যেফেলোস, দস্তোস্তেন ও গর্ভকালে অতিসার ;

জলবৎ মল ; পরিষ্কার, হৃদেহৃত বর্ণশূন্য আম ; শুভ্র, লেহবৎ আম , বেজের ভিষের মত ; অনিচ্ছায় নির্গত ; মল ।

মূত্র ।—লোহিত, কৃষ্ণবর্ণ, স্বল্প, কফি-চূর্ণের ন্যায় অধঃপতিত
পদার্থ ; মস্তিষ্কের উপক্রমে ও শোণে মূত্রবিলোপ ; মাণ্ডলাল মূত্র

শোণ —মস্তিষ্ক, বক্ষঃস্থল, ও উদরের শোণ ; ক্যালোটিনা, সবিরাম এরের রবর্তী শোণ ; তৎসহ জ্বর, হৃদ্বলতা ও মূত্র-বিলোপ ; উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া ৎপত্তি (এপিস, মিক্স)

সম্বন্ধ ।—মস্তিষ্ক বা মস্তিষ্ক-বিজ্ঞার রোগে এপিস, এপোসা, আস', বেল, হই, ডিম্ব, ল্যাক, মলফ, টিউব ও মিক্সের সহিত হেলিবোরের তুলনা হয় ।

হেলোনিয়াস ।

(Helonias)

দৌর্বল্য বশতঃ কন্দ, আগ্রা ও ভোগ-বিলাসে হৃদ্বলতা ; মানসিক বা শারীরিক বঠিন পরিশ্রমে জীর্ণা ; জীলোক্ষের পক্ষে উপ-
যাগী ; অতিশয় পেশীর জালা ও বেদনা ; এত প্রাপ্তি যে নিদ্রা যাইতে
পারা যায়না ।

যখন কার্যে নিবিষ্ট থাকে যায়, পীড়ার বিষয় ভাবা যায়না তখন সর্বদাই
গল থাকে যায় (ক্যান্ড-ফস, অক-এসি)

অস্থিরতা, অবিরত নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে হয়

কোপনতা, দোষ-গ্রাহিতা , যৎসামান্য প্রতিবাদ সহ করিতে অথবা ইঙ্গিত
গহণ করিতে পারা যায়না (এনাক) ।

গভীর বিষাদ ; প্রগাঢ় মানসিক অবসাদ

বহুমূত্র ।—প্রথম অবস্থা ; প্রভূত, পরিষ্কার, সশর্কর মূত্র ; ওঠের শুষ্কতা, উহা
একত্র আটকিয়া থাকে ; অতিশয় পিপাসা , অস্থিরতা ; শীর্ণতা ; কোপনতা ; ও
বেম্বলতা ।

সাঁওলালমূত্র (albuminuria) :—তরুণ বা পুরাতন ; গর্ভাবস্থায়, অতিশয় দুর্বলতা, অলসতা ও তন্দ্রালুতা সংযুক্ত ; এলবুমিনুরিয়া । সাধারণতঃ রোগীর অতিশয় শ্রান্তি বোধ হয়, অথচ রোগী তাহার কারণ জানে না ।

ধতু —রক্তস্রাব বসন্তঃ দুর্বলীভূত নারীদিগের জরায়ুর শ্লীলতাজনিত নিয়মিত সময়ে অনেক পুঙ্খ, অতি প্রচুত রক্ত-স্রাব ; ঋতুস্রবের ব্যবহিত সময়ে স্রাবের যে পরিমাণ রক্তে জন্মে তদপেক্ষা অধিক রক্তের অপচয় ; স্তন-স্রবের ক্ষীণতা, স্তন-বৃন্তের ব্যথিততা ও স্পর্শ-দ্বেষ (কোনা, ল্যাক-ক্যান) । ঋতু-রক্তের অপ্রবল, মালিন সংযত, ও দুর্গন্ধ প্রবাহ

বস্তি-গহবরে (pelvis), স্পর্শ-দ্বেষ ও গৌরব অমুভব (লাগ্না) ; জরায়ুর বিদ্যমানতা উপলব্ধি ; রোগিনী নড়িলে চড়িলে জরায়ুও নড়ে-চড়ে বলিয়া অনুভূত হয়, উহাতে অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ (লাইসি)

গর্ভ-পাত ও গর্ভ-স্রাবের মন্দ ফল ।

সম্বন্ধ ।—(১) এলিট্রিস, কির, লিপি, ফস-এসির সহিত হেলোনের তুলনা হয় (২) কন্ড, দীর্ঘকালস্থায়ী রোগ, ও অসম্যক পরিপোষণজনিত দুর্বলতার হেতন এলিট্রিসের অনুরূপ ।

রোগানুক্রমে

সংক্ষিপ্ত

ঔষধ প্রদর্শিকা ।

অগ্নিদাহ (বঃরগস)—ক্যাথ, রস,
ক্রিয়ো বা আটিকা ।

অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য (ডিসপেপ-
সিয়া) তরুণ—একন, ইপিক, নয়া-ভ,
বাই ।

পুরাতন—কা-বাইক্র, কার্বো-ভে,
নয়া-ভ, আস' ।

বালকদিগের—ক্যাম, পলস, নয়া,
সলফ, এণ্ট-কু ।

বৃদ্ধদিগের—এণ্ট-কু কা-বাইক্র,
কার্বো, নয়া, আস' ।

সর্দিজনিত—একন, আস', মার্ক
বাই ।

বসা বা ঘুত-পক্ক আহার জনিত—
পলস, এণ্ট-কু ।

ক্রোধজনিত—ক্যাম ।

শোকাদিজনিত—ইথে, চায়, নয়া,
পলস ।

অণুকোষবৃদ্ধি (হাইড্রোসিস)

পলস, ক্রিম, স্পজ, আর্গ, অর, একন ।

অতিসার (ভায়ারিয়া) অপাচ্য

আহারজনিত—এণ্ট-কু, পলস, ইপিক ।

সর্দিজনিত—একন, ডক, মার্ক,
ক্যান্ড ।

কৃমিজনিত—মিনা, আস', মার্ক ।

উদরবেদনাসহ—কলোম, ভিরেট ।

রাত্রিকালীন—পলস, চায়, রস ।

প্রাতঃকালীন—এপিস, সলফ,

এসি-ফস

দ্রৌণকালীন—চায়, ভিরেট, ক্যাম,

আস', আইরিস ।

বালকদিগের—ক্যাম, মার্ক, স্লিউম,
ইপিক, ডক, আস', আইরিস ।

বৃদ্ধদিগের—ফস, আস', চায়
এণ্ট-কু ।

অন্ত্র-প্রদাহ (এণ্টেরাইটিস)—

একন, বেণ, কলোম, মার্ক-ক, আস',
বাই ।

অপস্মার (এপিলেপ্সি)—বেল,
ফুগ, হাইয়স, ট্রাম, ভিরেট ভি,
ইথের; আস, জিক, ক্যাক, কা-
ব্রোম।

অবদরন (এককোরিয়েশন)
ক্যাম, ক্যাক, লাইক, সলফ।

অবসাদ-বায়ু (হাইপোকণ্ড্রিয়া-
সিস)—অর, আর্জ-মে, ইথের, নক্স
লাইক, এনাক।

অভিযন্দ (অপথোগমিয়া) সন্ধি-
জনিত—একন, মার্ক, ইউক্রে, বেল,
পলস।

পুরাতন ক্রিম, ক্যাক, সলফ,
মার্ক, হিগার, আস

রোমাত্তীর পর—পলস, সলফ।

বসন্তের পর—মার্ক, সলফ

গণ্ডমালাজনিত—ক্যাক, আইয়োড,
এফ, হিপ, সলফ, মার্ক-ক, আস।

উপদংশজনিত—মার্ক-ক, নাইট-
এসি, থুজা, অর

শিশুদিগের—আর্জ-নাইট, ক্যাক,
সলফ, মার্ক

অরুণ্যিকা (এফরাইগে) গুহা
ঘাটের—নাইট-এসি, সলফ

জননেন্দ্রিয়ের উর্দ্ধদেশের—একন,
সলফ, সিপি, লাইক, কোলিন;
বোরাফ্রা ধাবন (লোশন)

অণুকোষের—পেট্রো, মার্ক-ক,
নাইট-এসি, রস, একন।

অর্শ (হেমরয়েডস) ৩০ ফ, হেম,
কোলিন, এলোজ, নক্স, ইসকিউ।

অশ্মারি (টিথিয়াসিস)—লাইক,
নক্স, ক্যাক, ক্যান

অস্থি-ক্ষত (কেরিজ)—সিল,
ফস-এসি, সলফ, ক্যাক

বক্রতা—ক্যাক, সিল, সলফ।

বিবর্জন—অর, মার্ক-আইয়োড।

বেদনা—মার্ক, অর, মেজ, আস,
মার্ক-আইয়োড, ইউপ-পর

অস্থি-বিকৃতি (রিক্লেটস)—
সিলি, ক্যাক, সলফ

অক্ষুটভাষণ (ট্যামারিং)—
বেল, হাইয়স, ট্রাম।

আক্লেপ (স্পাথম)—বেল,
ক্যাম, ভিরেট-ভি, জেলস, ওপি।

গুহাবায়ুজনিত—ক্যাক, মক্স, ইথের,
হাইয়স।

আক্লেপ ও থলো (স্পাথম ও
ক্র্যাম্পস)—ক্যাক, নক্স, কলোস,
ভিরেট, কক, জেলস।

আণ্ডলালিকমূত্র (এলবুমিনুরিয়া)
—আস, ফস, মার্ক-ক, টেরেব, ক্যাক

আতপঘাত (সংনৈট্রোক)—
ক্যাক, বেল, গন, জেলস, ভিরেট-ভি।

ଆସ୍ଥାନ (ଷ୍ଟେଟୁଏସ)—ନବା,
କାର୍ବୋ, ଜାହୈକ, ଚାୟନା

ଆସ୍ଥାତ (ରିଡିମେଟିଫିକାସନ୍) :—ବେଗ, ର
—ରୋଡ, ମିମିମି, କା-ହାହିଡ

ଅଂଶିକେତ—ମିମିମି, ମିମିମି, କା-ହାହିଡ,
ବ-ହୈ, ଡିଞ୍ଜି

ସମ୍ପାଦ—କାଟା, ବାହି, ରସ, ମିମିମି,
କଟି, କା-ହାହିଡ

ଶ୍ରୀବାର—ବାହି, ରୋଡ

ପୁରାତନ—ରସ, ଆର୍ଗ, ମଲକ, ରୋଡ,
ମିମିମି, କା-ହାହିଡ ।

ଆସ୍ଥାତ-କ୍ଷୁର (କମେଟିକ ଫିଡାର)
ଏକନ, ବାହି, ବେଗ, ମିମିମି ।

ଆସ୍ଥା (ଟିଉସାର)—କାଟା, ଆର୍ଗ,
ଆହିରୋଡ, ମିମି, କା-ହାହିଡ

ଇନ୍ଦ୍ରନୁଷ୍ଠ (ଏନୋମିନିଆ) :—ପୁର-
ରୋଗଜନିତ—କମ-ଏମି, ହେଗେ, କା-ହାହିଡ,
ମିମି, ଚାୟ, କା-ହାହିଡ ।

ପାରମ୍ପରିକ—କାର୍ବୋ, ହିପାର ।

ମିମିମି-ପୋଡାମୟୁକ୍ତ—କୋର-ଏମି, ନା-
ହିଡ-ଏମି, କମ, ମିମି, ମଲକ, କା-ହାହିଡ ।

ଉଦରୀ (ଏସାହିଟିସ)—ଏମୋମାହି,
ଆମ, ଏମି, ଡିଞ୍ଜି, ଚାୟ, ଜାହୈକ ।

ଉଦ୍ଗାର (ହେକ୍ଟେନ)—ବାହି, ନକ,
ମଲକ, ମଲକ-ଏମି, ଜାହୈକ, କାର୍ବୋ,
ଆମ ।

ଉପକ୍ରମ (ଏପିଥ)—ବୋର, ମାର୍କ,
ଆମ, ମଲକ ।

ଉପାଦାନ (ମିମିମିନ)—ମାର୍କ, ନା-
ହିଡ-ଏମି, ଖୁଜା, ଆର୍ଜ-ନାହିଡ, ଅରସ ।

ଉପାଦାନ କ୍ରମ—ମାର୍କ, ନାହିଡ-ଏମି,
କା-ହାହିଡ, କାହିଡୋ

ଓଷ୍ଠ-ବିଦାରଣ-କାୟ, ମାର୍କ ଆର୍ଗ,
କା-ହେଗେ-ମଲକ

କଚୁ କେବିସ)—ଗହକେର ମଲକ ;
କାର୍ବୋ, କଟି, ମାର୍କ, ମିମି, ରସ, ହିପାର ।

କଟିବନ୍ଧବଂ ଦକ୍ଷ (କୋନା)—ରସ,
କା-ବେଗ, ଏକନ, ମଲକ, ଜାହୈକ

କଟିବାତ (କେବେଗୋ)—କେ-ଟି-ଟା,
ଆର୍ଗ, ରସ, ମିମିମି ।

କଦର (କର)—କା-ହାହିଡ, ମଲକ,
ଆର୍ଗ ବା ଭିରେଟ-ଡି ।

କନ୍ଦ (କୋମାମ) ହିଡିଟିରାହି—କୋନ,
ମିମି, ବେଗ, ମିମି, ନକ ହେଗୋନ ।

କକ୍ଷି (କା-ହାହିଡ)—ଆମ, ବାହି-
କୋନ, କୋନା, କାହିଡୋ ।

କର୍ମସ୍ଥ-ପ୍ରାଦାହ (ପ୍ୟାରୋଟାହିଟିସ)—
ମାର୍କ-ଆହିରୋଡ, ମାର୍କ-ମଲ, ମାର୍କ-କର,
ବେଗ, ମଲକ

କର୍ମ-ବେଦନା—ବେଗ, ମଲକ, ମାର୍କ,
କା-ହାହିଡ, ଏକନ, ଭିରେଟ-ଡି ।

କା-ହାହିଡ—ହିପାର, କା-ହାହିଡ, ମଲକ,
କ କର୍ମ-ଏମି, ମାର୍କ, କଟି ।

କ୍ରମ—ମିଉର-ଏମି, ମଲକ, କଟି ।

କ୍ରମାହ—ଏକନ, ବେଗ, ମଲକ, ମାର୍କ-
ମଲ ।

নাদ—একন, চিন-সলফ, পলস,
মফ, নকা, সলফ ।

কালিমা (একিমোসিস)—হেম,
আর্গ, রস, মিউর-এসি)

কাস—সর্দিজনিত—একন, বেল,
বাই, কষ্ট

পুরাতন—কা-বাইক্র, সলফ, বাই

স্বরজনিত—স্পঞ্জ, হিপার, কুপ্র

হপ*কক—ইপিক, ড্রস, কোরাল,
নাইট এসি, ভিরেট-ভি, জেলস বা
বেল

গুণ্যবায়ুজনিত কোরাল, হাইরস,
ইগে

কুষ্ঠ (লেপ্রসি)—আস', মার্ক,
সলফ, আইরোড

কুমি—স্বত্রাকার—সিনা, টিউক,
ইগে, আর্ট-ইউ, স্ট্রাট, চায়না

দীর্ঘ ও গোলাকার—মার্ক, স্পিজি,
সলফ, একন

ফিতার স্তায়—ফিল-মাস, সিন,
সলফ

কুমি-জ্বর—একন, সিন, সি

কোষ্ঠবদ্ধতা—নক্স, বাই বা
ওপি, লাইক, সলফ, কোলিন বা
ইস্‌কিউ, প্লথ ।

খল্লী (ক্র্যাম্পস) —জজ্বায়-
ভিরেট, নক্স, আর্গ, বেল, কুপ্র,
জেলস ।

পাকশয়ে—নকা, ডাইরোস, কক ।

খুসকী (ড্যানড্রিক)—আস',
গ্রাফ, লাইক, সলফ, রস ।

গর্ভস্রাব (এবর*ন)—সিকে,
কক, ক্রোক, ইপিক, সিঙ্গ, আর্গ,
বেল

আশঙ্কিত—পলস, ক্যাম, বেল,
স্রাব, আর্গ, সিকে ।

প্রতিষেধক — সিকে, ক্যাক্‌ সিমিসি,
চায়, সিঙ্গ

গর্ভাবস্থায় বিবমিষা—ইপিক,
ক্রিয়োজ, নকা, পলস, আইরিস ।

গলগণ্ড (গমটার)—স্পঞ্জ, মার্ক-
আইরোড, আইরোড, ব্রোম

গলাবেদনা (সোর-থো ট)—
একন, বেল, মার্ক, ফাইটো

গলকণ্ঠদুঃখ—আর্জি-নাইট, সলফ,
আস', মেজ, ভিরেট-ভি

গুণ্যবায়ু (হিষ্টিরিয়া)—ইগে,
প্লাট, এসা, ভেলার, কফ, জেলস,
পলস, হাইরস ।

গৃহ্যদ্বার :—কণ্ঠদুঃখ—সলফ, নাইট-
এসি, সিন, ইগে বা মার্ক, আস',
একন ।

ভ্রংশ—ইগে, নক্স, পলফ, মার্ক

গৃঞ্জন (বিউনিয়ন)—ভিরেট-ভি,
আর্গ বা ক্রটা ।

গৃহসী (মায়েটিকা)—কলোস
রস, আস, নকা, ক্যান

গ্রাফি-বিবর্দ্ধন মার্ক-আয়োড,
বারাই-কা, বেল, হিপার, আইয়োড,
সিল, ক্যাক ফস, ফাইটো ।

গ্রীবাশুস্ত্র (ট্রিফ নেক)—
একন ও বেল ; সিমিসি, ব্রাই

ঘূর্ষট্রন (কটিউজন)—আর্গ
আণাভাব—পলস, মার্ক, জেলস
একন, ক্যাক, শাল, পদ ।

চক্ষু :—সাত—মার্ক, ক্রিম,
নাইট-এসি, ইউফ্রে বেল, মার্ক-ক

তিথ্যক দৃষ্টি—বেল, হাইয়স, জেলস,
ট্রাম ।

দৌর্ধ্বা—সলফ, ফস, আইয়োড,
বেল ।

সত্ত্বন—আর্গ ও একন ; বেল,
হেম ।

চক্ষুর কালিমা—আর্গ, হেম
জতুক (নিভাস) থুজা, ক্রিয়ো
খিলিক প্রদাহ (ডিপথিরিয়া)
বেল, ফাইটো, ক'-পার্মেজ, মার্ক-আই-
য়োড, আস, মিউর-এসি

তল্লা (কোমা) ওপি, একন,
বেল ; লাইক ।

তাণ্ডব (কোরিয়া) কুপ, এগার,
ভিরেট-ভি, বেল, ইগে, সিমিসি, আস ।

ভাল-মূল-প্রদাহ (টেলিগাইটিস)
—বেল, বারাই, মার্ক-আইয়োড ; কা-
পার্মেজ ।

তিমির (ম্যামোরোসিস)—
বেল, ইউফ্রে, মার্ক-কর সিল, হাইয়োস,
জেলস, নকা, চায়

তিল (মোগ) কার্কা, সলফ ;
ক্যালেন্ড

তিথ্যক দৃষ্টি (ট্রাবিসমাস)—
বেল, হাইয়স, জেলস বা ট্রাম ; সিনা ;
স্পিজি, ফস ।

দল্লাঃ—(হার্পিজ) শুক—মার্ক,
আইয়োড, আস, পেট্রো ।

রক্তপ্রাবী—একন, রস, আস,
ফাইটো গ্রাক, ক্যাক, সলফ

দল্লাঃ—মস্তকের—সিপি
চর্ম্মের—টোলার, রস, সিপি,
সলফ ।

দল্ল-পুশুট (গঃম বরেল)—
একন ও বেল ; মার্ক, সিলি, হিপার ;
ফস

দল্লশূলঃ—(টুথেক)—একন
ও বেল ; পলস

দল্লজল—ক্রিয়ে, মার্ক, টাক, ফাইটো,
মায়ীর—কফ, ক্যাম, ইগ, জেলস ।

বালকদিগের—ক্যাম, ক্রিয়ো
গর্ভাবস্থায়—বেল, নকা ক্যাম, কফ ।

দন্তোদ্ভেদ-বিলম্ব- ক্যাঙ্ক, ক্যাম,
একন, ক্রিয়ে, ভিরেট-ভি, মার্ক

দংশন ও ছল-বেধ লিডম,
এপিস, রস, ক্যাঙ্ক ।

দাহিকা (কার্বকল) —বেল ও সলফ,
এপিস ; আস' ; একন ; সিল

দুর্বলতা (ভিবিগিটি) —চায়না,
ফির, ফস, ফস-এসি, ইগে মফ, আই-
রোড, নক্স

ধ্বজভঙ্গ (ইম্পোটেম) —ফস এগ-
নস্-কা, নক্স, ফির, ব্যারাই, ফুফ,
চায়না ফস-এসিড ।

নাড়ীব্রণ (ফিষ্টল —সিলি ফ্লোর-
এসি, ক্যাঙ্ক হাইড্রাস ।

নাসিকাঃ —রক্তস্রাব —একন, আই,
ইপিক, হেম ; পলস ; চায়না, আর্গ
কত —আস', সলফ, গ্রাফ, অয়,
কষ্ট ; আইরোড

নিদ্রাহীনতা —কফি, বেল, হাইরস
জেলস ভিরেট-ভি, গ্লন, ইগে

নিদ্রালুতা —ওপি, বেল, একন ;
লাইক

নিরুদ্ধপ্রকাশ (ট্রীকচার) —
একন, নক্স, ক্যাঙ্ক, ক্যান ।

নিশ্বাস-দুর্গন্ধ —মার্ক, কার্ব,
সিগি, অয়, একন, পলস

নীলপাণ্ডু (সায়েনোমিস) —ভিজি,
অস', কুপ ভিরেট

পক্ষাঘাত (প্যারালিসিস) —
ব্যারাই-কা, নক্স, আঙ্ক-নাইট, পথ গ্লস,
ফস, জেলস, একন

পাকাময় (ট্রমাক) অয় —পলস,
নক্স, আই, লাইক, কার্বো, ক্যাঙ্ক ।

প্রদাহ —একন, আস', বেল, ফস
কত —আস', হাইড্রাস, কা-ফ
বাইক্রম

পানিবসন্ত (ডেরিমেন্টা) —রস,
সলফ, এন্ট-টা ।

পাণ্ডু (জিওস) —একন, আই, মার্ক
চেল, আস' ; ফস ; চায়, নক্স ।

পানাত্যয় (ডিলিরিয়ম ট্রিমেন্স)
ট্রাম, ওপি, বেল, হাইরস, নক্স ।

পামা (একজিমা) —আস', ক্যাঙ্ক,
মার্ক, রস, ক্রোট-টিগ, সলফ

পারদ-দোষ —নাইট-এসি, হিপার,
কার্বো

পিচ্ছিতব্রণ (কন্টিউজন্ড উণ্ড) —
আর্গ ; হেম ; কোনা ; ক্রটা

পিত্তশিলা (গল-ষ্টোন) —একন,
মার্ক, পডফ, নক্স, চায়না ।

পৃষ্ঠবংশের উপদাহ (স্পাইণাল
ইরিটেশন) —চায়না, ইগে, নক্স,
জেলস ।

পৃষ্ঠ-বেদনা — পরিপ্রায়জনিত—
আর্গ, রস, ব্রাউ, জেলস

রমোক্রচ্ছ জনিত—বেল, পলস,
সিক, কক প্লাট

পৃষ্ঠবংশের উপদাহ জনিত—চাম,
ইপ্পে, নক্স, জেলস।

প্রতিশ্রায় (ক্যাটার) মস্তকের
একন, আস, মার্ক; নক্স, ইউক্রো,
কা-বাইক্র, কা-হাইড, সলফ।

বক্ষঃস্থলের—ব্রাই, ও একন বা
ফস।

প্রমেহ (গনোরিয়া)—ক্যান,
জেলস, মার্ক, একন, ক্যাফ, থুজা,
কোপ।

প্রসব-বেদনা (লেবর)—ক্যাম
পলস, কফি, জেলস

ক্লিম—পলস, সিমিসি, কক, নক্স
বেল।

প্রসবান্তিক বেদনা (আফটার-
পেইন্স)—সিক, কফি, পলস, আর্গ
ক্যাল, ক্রোক

ফুসফুস-প্রদাহ (নিউমোনিয়া)
একন ও ফস, ব্রাই, চেল, এন্ট-টা

ফুসফুস-বেফট-প্রদাহ (প্লুরাই-
টিস)—একন ও ব্রাই, ফস, আই-
য়োড, আস।

বধিরতা (ডেফ নেস) : সর্দি-

জনিত—একন, মার্ক, বেল, পলস,
ডক

রোমাণ্টীয় পর—পলস, সলফ,
বেল

বসন্তের পর—মার্ক, সলফ, বেল।

স্নায়বীয় রোগের পর—ফস, ফস-
এসি, চায়না, পেট্রোল

বক্ষ্যাত্ত (টারিলিটি)—ফস, প্লাট,
কোন, ব্যারাই, ক্যান, সিমি, বোরাক্স।

বমন (ভমি টিং) : অপাচ্য আহার
জনিত—পলস, এন্ট-ক্রু, ইপিক,
আইসিস

পুরাতন—ক্রিমো, আস, হাইড্রাস।

রক্ত—ইপিক, হেম, নাইট-এসিড,
চায়না।

বসন্ত (ভেরিওলা)—এন্ট-টা, মার্ক,
বেল, ব্রাই, সলফ।

বহুপাদ (পলিপাস)—মার্ক-আই
য়োড, কা-বাইক্র, টিউক, ক্যাফ।

বহুব্যাপকপ্রতিশ্রায় (ইনফ্লু-
য়েন্স) ক্যাম; একন; আস;
কা-বাইক্র

বাতকর্টক (প্রোণ) রস, আর্গ,
বা ক্রটা।

বাতরক্ত, গ্রন্থিবাত (গাউট)—
একন ও বেল, কলচ, বা ব্রাই; রোড,
সিমিসি, পলস, নক্স, লাইক, আর্গ।

বায়ুনলী-ভুজপ্রদাহ (ত্রফাইটিস)

তরল—একন, এন্ট-টার্ট ব্রাই, ইপিক, ফস, কা-বাইক্র।

বালকদিগের—ফস, এন্ট টা, লোব
বৃদ্ধদিগের কার্কে, এট টা,
গিনেগা, পুইল।

পুরাতন কা-বাইক্র, হিপার, ফস
কার্কে, আস, কা হাইড

বিচরণ-বিলম্ব—ক্যাক, ফস,
সলফ।

বিদগ্ধ-দৃষ্টি (ক্যাটারাক্ট)—কোনা,
ফস, ক্যান, ক্যাক, সিল, সলফ, ড্রাফ,
বেল।

বিবমিষা (নশিরা)—ইপিক,
ক্রিয়োজ, এন্ট-ক্রু লোব, টাবে, পলস,
নক্স-ভা।

বিমর্ষতা (মিলানকোলি)—ইথে
অরম, চায়না, নক্স, প্লাট, মার্ক বা
পড-ফ

বিষমজ্বর (ইন্টার-মিটেন্ট ফিবার)
—চায় বা কুইন; আস; ভিরেট-এ,
ফস-এসিড; নক্স বা ইপিক; সলফ-
কুইন ইথে।

বিষাদ-বায়ু (মিলানকোলিয়া)
—অর, ইগ, প্লাট, ফস, ড্রাক, সলফ

বিসর্প (এরিসিপেলস)—একন
বেল, রস, ভিরেট-ভি, এপিস, ক্যাক
আস।

বিসূচিকা (কলেরা): সাংঘাতিক

—ক্যাক, ভিরেট, ফুগ, আস

বুকজ্বালা (কার্ডিয়ালজিয়া)—
কার্কে-ভে, ব্রাই, নক্স; লাইক; পলস,
ভিরেট-এ।

বৃকক প্রদাহ (নিফ্রাইটিস)—
ক্যাক, টেরেব, একন, বেল।

ত্রণশোথ (ম্যাবসেস):—তরল—
বেল বা একন ও হিপার; মার্ক,
আইয়োড, আস।

পুরাতন—সিল, ক্যাক, সলফ,
ফস; চায়

স্তনের—ফাইটো, ব্রাই; বেল ও
হিপার; ফস (পুরাতন); মার্ক,
চায়

মস্তিষ্কঃ—বিকল্পন (কঙ্কশন)—
মার্গ ও একন বা বেল।

রক্তসঞ্চয়—গ্রন, বেল, একন

প্রদাহ—একন, বেল, ভিরেট-ভি,
ব্রাই, আইয়োড, ওপি।

মাষক (ওয়াটস)—থুয়া, রস;
সলফ

মুখের পচাফত—কা-ক্লোর, মার্ক
আস; কার্কে, নাইট-এসি

মুখ-প্রসেক (পাইরোসিস) লাইক
নক্স, কার্কে ব্রাই, আস

মুখমণ্ডল-বেদনা (ফেসেক) একন;

বেল, কলোস, স্পিজি ; মিগি ম
ক্যাম, ডিক্টো ।

মধুমেহ—(ডায়েবিটিস) যম-
এসি, আস, নক্স, হেলোন

মূত্ররেণু—(গ্রাভেল) লাইক,
এন্ট-জু, নক্স, ডাই

মূত্রস্তম্ভ—(রিটেনশন অভ ইউ-
রিণ) ক্যাফ, নক্স, ওপি, একন, ক্যাফ
ক্যান ।

মূত্রাশয় (ব্লাডার) প্লেগ্মাশ্যাব-
এন্ট-জু, পলস, ফির, ক্যাফ, ক্যান

প্রদাহ—ক্যাফ, টেরেব, এপিস
একন ।

পক্ষাঘাত-ব্যারাই কার্স, একন,
নয় আস বেল ।

মূত্রাশয়-প্রদাহ (সিষ্টাইটি)
ক্যাফ, টেরেব, এপিস ।

মূত্রাশয়ের মুখশায়ী-গ্রন্থির
প্রদাহ (প্রোষ্টেটাইটিস)—বেল, পলস,
কা-হাইড ।

মুচুর্মা (সিনকোপ)—মক্স, ক্যাফ,
ইগ্রে, ডিরেট, আইয়োড, চায়না,
কক ।

মুৎপাণ্ডু (এনিমিয়া) ফির পলস,
সিপি, কোনা ।

মেদ রোগ (ওবিসিটি) আস
ফির, ক্যাফ, সলফ

মেদাপকর্ষ (ফ্যাটিডিঅেনারেশন)

ফস, আস, ফির

যকৃৎকাঠিন্য—ফস, মার্ক-ক,
ডিজি, আস

যকৃৎ বিবর্জন—মার্ক-আইয়োড

প্রদাহ—একন, আই, মার্ক-ক ।

নিজ্জন্মতা মার্ক, পডফ ।

রক্তঃস্রাব (মেনষ্ট্রুয়েশন) প্রথম
বিকল্প—পলস, ফির, সিপি, সলফ,
ফস, সিকেক, সাইক্রে

অনিয়মিত—সিপি, পলস, সলস,
মিনিমিও

যদ্রণাযুক্ত—সিমিসি, কক, জোফ,
বেল, ক্যাম, পলস, প্লাট, হেম, ইগ,
ফেলস, সিকেক, ডিরেট

অধিক পরিমাণ সিকেক, জোফ ;
প্রাব একন, ক্যাফ, ইপিক ; চায় ।

স্বল্প—সিপি ফির, পলস, কোনা
সলফ, হিলোন ।

অবরুদ্ধ—একন, পলস, বেল ;
কোনা ; সিপি. প্লাট, রস ।

নিরমিত কালের পূর্বে—ক্যাফ
প্রাব, ইগ ; জিয়ো ; সিকেক, নক্স-ড

নিরমিত কালের অধিক পরে—
পলস, ফস, ফির, সিপি ।

আলুকাঙ্ক (ডাইক্রেসিয়স) . .

হেম, আই, পলস ফস মিনিমি

নিবৃদ্ধি (সেমেশন)—চায় বা

ফির ; গলফ, গ্লন, জ্যাক বা স্মাচ ;
সিমিসি, জেলস ।

রক্ত-সঞ্চয় (কংজেশন) :
মস্তিষ্ক—একন, বেল, গ্লন
ওপি, জেলস

যকুতের—মার্ক, বেল, এলোজ,
ব্রাই চার, আস', আইয়োড একন
ফুসফুসের—একন, এস, ডিরেট-
ভি এন্ট-টা, ব্রাই ।

রক্ত-স্বল্পতা (এনিমিয়া) , ফির,
চার, ফস-এসি, আস' সিগ, হেলোন

রক্তাতিসার (ডিসেণ্টি) মার্ক-
ক, ইপিক, আস', এলোজ ; হেম

রোমান্টী (মিক্সেল্) একন ও
পলস ; জেলস, ব্রাই, বেল ; কা-
বাইক্র ; সলফ

লালমেহ (প্লীট)—সিনেবা,
কাহু, ক্যান, পলস নক্স সলফ,
ম্যাটিকো ।

লিঙ্গবক্র (কডি)—একন ;
জেলস, বেল, কাহু, ক্লোরাল

লিঙ্গোথান (ইরেকশন) লাইক
ফস-এসি, ফুফর, একন বেল,
জেলস ।

শয্যা-ক্ষত (বেড সোর) গ্লিসারিণ-
ক্রিম বা ক্যালেক্স লোশন

শরীর-ক্ষয় (মারাসমাস) , আই-

য়োড, ক্যাক, সলফ, ফস, আস',
পলস ।

কুমিল্ল—সিনা, মার্ক, "এন্ট-কু ।
শারীরব্রণ (অংগার)—হাইড্রাস,
সিলি বা কা-বাইক্র, বেল, লাইক ;
আস' ; মার্ক , কষ্ট ।

শিরা-প্রসারণ (ডেরিসিস)—
হেম, পলস য়োর-এসি

শিথিলিত গলমধ্য (সিল্যাক্সড
থ্রোট)—কা-বাইক্র, হিগার, বারাই
ফাইটো, ফস

শিরোধূর্গন (ভাটিগো)—একন,
বেল, নক্স, কক, ব্রাই, পলস, জেলস ।

শীতপিত্ত (আটিকেরিয়া)—এপিস,
রস, পলস ; ক্লোরাল ।

শীতান (সার্ভি)—মার্ক, নাইট-
এসি, কার্বো-ভে, আস' ।

শুক্রমেহ (স্পার্মেটোরিয়া)—
ফস চার, ফির, ফস-এসি, আর্জ-মে,
জেলস ।

শূল (কলিক)—কলোস, নক্স,
প্লব : আইরিস, কোলিন ।

সীমশূল—ওপি, এলম, সলফ-এসি
রজোশূল—কক, প্লাট, নক্স, সিক,
ইথে ।

শোথ (ড্রুপসি) : আস', এপিস,
ভিলি, ব্রাই, চার এপোসাই ।

উদরেশ—এপোগাই, আস', এ-
পিস, ডিজি, চায়না

মস্তিষ্কেশ—হেল, বেল, এপিস,
ভিরেট-ভি বা জেন্স

বক্ষঃস্থলেশ—ডিজি, আস', ব্রাই,
হেল

শাখার—চায়, ফির, এপিস,
আস'।

অণুকোষেশ—আইয়োড, রোড,
গ্রাফ, অরম।

শৈল্পিকপাণ্ডু, হরিৎপাণ্ডু (ক্রে-
রোসিস)—ফির, পলস, ফির-আই
য়োড, সিপি, ক্যাক।

শ্বাস (শ্বাসযন্ত্র) আস', একন
লোব, ইপিক, ইউক্রে, কুপ।

বালকদিগেশ—এট টাট, শ্বাসু,
ইপিক আস', কুপ।

শ্বেতপ্রদর (লিউকোরিয়া)—
সিপি, কক, পলস, ক্যাক, সিপি;
ক্রিয়োজ; কোনা।

সন্নিপাত-জ্বর (টাইফয়েড ফি-
ভার) ব্যাপ্ট, আস' মিউর-এসি,
রস)।

সর্বমন শিরঃশীড়া (সিক্‌হেডেক)
—আইরিস, ইপিক, পলস, নকা
সিপি।

সংস্থাস (এপোথেসিস) একন,
ওপি, বেল, পলস, নকা)

সামান্য জ্বর (সিম্পল ফিভার)—
একন ভিরেট-ভি।

সূতিকাজ্বর (পিউরারপারল
ফিভার)—একন বেল, আই, ট্রাম
স্ক্যু শ্বল বা রক—পলস, এগুনস;
একন; বেল।

অতিরিক্ত—ক্যাক ফস, আই-
য়োড; চায়না

স্ক্যু-জ্বর (মিক-ফিভার)—ব্রাই
একন, ক্যাম, ভিরেট-ভি, বেল।

স্নায়ু-শূল (নিউরালজিয়া) মুখ-
মণ্ডলে—একন, আস', বেল, কলোস,
ক্যাম জেন্স।

মস্তকে—পলস, বেল, নকা, টিক্টা,
সিমি

পৃষ্ঠে নকা অকা-এসি, সিমিসি,
ভিরেট।

উরাত্তে—কলোস, আস', নকা
ক্যান।

পার্শ্বে—রোড, আস', সিমিসি।

শ্বেকটক (বয়েল,—বেল) সলফ,
আইওড বা হিগার।

স্বরস্র (জুপ)—একন, স্পঞ্জ,
হিগার, আর্ন, এপিস।

স্বরভঙ্গ (হোস'নেস):—একন,
কষ্ট; ব্যারাই-কা, ফস, মার্ক ইয়ে
বা বেল; কা—হাইড আর্ন।

পুরাতন কা-বাইক্রাম, হিগার ফস
কার্ধা, কষ্ট, মার্ক

স্বল্প-বিরামজুর (রেমিটেণ্ট-ফিবার)
জেলস, আস, ভিরেট, চামনা,
ইপিক, বস

স্বাদ-বৈলফণ্য পলস, মার্ক,
প্লম

হনুতন্ত (লক্জ) একন, বেল,
আর্গ, নক্স, জেলস।

হিম-স্ফোট (চিল্লেন) পেট্রোল,
পলস হেম বা রস; ফস, ক্যালোড
ক্রিমোজ।

হুপশব্দককাশ (হুপিংকাফ)
ইপিক ড্রস কোরাল কুপ ভিরেট;
জেলস ভিরেট, ভি বা বেল।

হুৎকম্প (গ্যালিটেশন) মস্ক;
একন, স্পিজি বেল ক্যাট্ট, ফস, পলস,
আস।

হুদ্রোগ (হার্টডিজিজ)

ডিজি, নাজা, একন, স্পিজি, আস,
ফস।

হুৎশূল (এঞ্জাইনা পেট্টেরিস)
আর্গ, ডিজি, ড্রাস, ভিরেট-এ, ক্যাট্ট,
গ্যাক, ভিরেট-ভি, ট্রিক।

ক্ষয়, যক্ষমা (থাইসিস): ফস,
আস, ফস-এসি, ফির আইয়োড,
ড্রস, ক্যাঙ্ক, আইয়োড লাইক; একন,
বা লাই।

অগ্নের-- আইয়োড, ক্যাঙ্ক, ফির,
মলফ, মার্ক আইওড আস।

ক্ষুধা: অ-ব, চামনা, নক্স, পলস,
রস, আস ফির

অতিরিক্ত বা বিকৃত ক্যাঙ্ক সিন,
নক্স সিল, ভিরেট

ক্ষৌরকণ্ড (সাইকোসিস) এন্ট-
টা সিনেবা আস

সম্পূর্ণ।



